


本草綱目

(八十)

張紹棠重訂



商務印書館發行



本草綱目

(八十)

張紹棠重訂

國學基本叢書

萬有文庫

種千一集一第

者 築 編 親
五 雲 王

行發館書印務商

本草綱目

卷二十八

菜之三

蔬菜類一十一種

茄開寶

苦茄拾遺

壺盧日華

苦瓠本經

敗瓢綱目

冬瓜本經

南瓜綱目

越瓜開寶

瓜稍嘉祐

胡瓜即黃瓜

絲瓜綱目附

苦瓜羅勒附

苦瓜救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四

水菜類六種

紫菜食療

石蓴拾遺

石花菜食鑑

鹿角菜食性

龍鬚菜綱目

睡菜綱目

菜之五

芝櫟類一十五種

芝本經

木耳本經

杉菌圖經

皂角蕈綱目

香蕈日用

葛花菜綱目

天花蕈日用

磨

菰蕈綱目

鷄棧綱目

舵菜綱目

土菌拾遺

地芩鬼蓋附

鬼筆附

竹蕈食療

蘿菌本經

石耳日用

石耳別

右附方舊七新二十六

互攷諸菜

香薷 苗紫蘇 蔡菜 紫菀 麥菜 蒜蒲 牛膝苗 防風苗 青葙 苗薄荷 馬蘭 蕓根 漢蘭紅花
車前苗 茄子 苗 薤草 苦蘆 穀麥 苗 龍葵 苦苣苔 蘿蔴根
蕪荑 豆芽 昆布 苦蘆 烟管 菊蒲 苗牛蒡 苗甘藍 蕓根
枸杞 豆莢 地榆 菖蒲 苗海藻 海苔菜 莊根
阜英 苗地榆 苦蘆 苦蘆 苦蘆 苦蘆 苦蘆
菜之三 蔬菜類 五十一種

茄音伽○
宋開寶

【釋名】落蘇拾

遺崑崙瓜御草鼈甲

知所自也。時珍曰：陳藏器本草云茄一名落蘇，名義未詳。按五

代賄子錄作酪酥，蓋以其味如酥酪也。於義似通。杜蓋以鼈甲能治寒熱，故云落蘇。

王隱君養生主論治瘧方用乾茄，譚名草鼈甲。蓋以拾遺錄云隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜。

【集解】用黃茄其餘惟可作菜茹爾江南一種藤茄作蔓生皮薄似蘆菔亦能治寒熱，故爾。

頌曰：「茄子處處有之。其類有數種：紫茄黃茄南北方通有之。」今中國已遍有之。時珍曰：中藥土有之。入藥多以黃茄爲一團，自夏至秋開紫花，五瓣相連，於九月成熟。種宜於九月，棱如桔梗者，長四五寸者有之。青茄惟北土有之。種似未深究也。王楨農書云：「青茄一種，紫者爲水茄，形長味甘，一種水茄形長味異，也可。」

劉恂嶺表錄云：「浙西常茄皆皮紫，白者爲水茄，江西安吉州亦名銀茄，更勝青者。」諸茄至老皆黃，蘇如脂麻，葉大如掌，自夏至秋開黃花，五瓣相連，於九月成熟。種宜於九月，棱如桔梗者，長四五寸者有之。青茄惟北土有之。種似未深究也。王楨農書云：「青茄一種，紫者爲水茄，形長味甘，一種水茄形長味異，也可。」

其實如瓜也。茄葉摘布路上以灰圍之，則子必繁，謂之嫁茄。按多食之，人不可多食，損人動氣，發瘡及癰疾。李廷飛曰：「秋後食茄子，性寒無毒。」甘寒，多食則傷子，利多食必腹痛，利下利女，能傷子。」

也

【主治】寒熱五臟勞。孟治溫疾傳尸勞氣。醋摩傅腫毒。大老裂者燒灰治乳裂。亨散血止痛消腫寬腸。

珍時

【發明】宗奭曰蔬圃中惟此無益。開寶本草並無主治。正說損人後人雖有處治之法。終與正文相失。圃人又下於暖庭。厚加糞壤。遂於小滿前後求貴價以售。既不以時。損人益多。不時不食。烏可忍也。震亨曰茄屬土。故甘而喜降。大腸易動者忌之。老實治乳頭裂。茄根煮湯漬凍瘡。折蒂燒灰治口瘡。俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。時珍曰一段成式酉陽雜俎言。茄厚腸胃。動氣發疾。蓋不知茄之性滑。不厚腸胃也。

【附方】

舊五婦人血黃。黃茄子竹刀切陰乾爲末。每服二錢。溫酒調下。摘玄方。腸風下血。經霜茄連蒂燒存性爲末。每日早晚服二錢。七靈苑方。久患下血。大茄種三枚。每用一枚。溼紙包煨熟。安瓶內。以無灰酒一升半。沃之。蠟紙封閉三日去茄。暖飲。普濟方。腹內龍癰。陳醬茄兒燒存性。入麝香。輕塗。茄懸門上。每日抱兒視之。二三次釘鍼于上。十餘日消矣。劉松石保壽堂方。久患下血。大食熱痰。用黃老子五十斤切洗。以水五斗煮取濃汁。濾去滓。更入小蠅中煎至一升。以來卽入生栗粉同煎。令稀稠得所。入砂末同丸。如梧子大。每日用秫米酒送下三十丸。近暮再服。一月乃瘳。男久食。大者切片。如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥。墜損跌撲。散血止痛。老茄皮。研爲末。欲臥。墜損跌撲。陽日收老茄。經本草。砸撲青腫。老黃茄極大者。切片。如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥。墜損跌撲。散血止痛。重者。取新磚承覆。勿犯地氣。至正月後。先鋪茄子一重。乃下消石一重。如此。鋪令盛。以封安。置淨處。上以新磚。傾出。則痛止。而愈矣。若膏中久乾硬。卽以薄綿蓋頭。又舉至動用。則新器中。以飯飲化。至成膏。乃可用。圖經本草。調發背惡。半二紙子。數百枚。空月層枚。腹度飲。茄已爛。開瓶傾出。則血散。則止。而愈矣。若膏中久乾硬。卽以薄綿蓋頭。又舉至動用。則新器中。以飯飲化。至成膏。乃可用。圖經本草。調發背惡。

瘡瘍 用上方以酒服半匙更以膏塗瘡口四圍覺冷如冰。瘡乾便癢其有根本在膚腠者亦可內消。同上。熱毒瘡腫生茄子一枚割去二分去瓤二分似再用取瘥。聖濟總錄。牙齒腫痛隔年糟茄燒灰頻乾蟲牙疼痛之效。黃茄種燒灰擦。橘茄或醬茄細嚼。秋月冷茄子裂開者陰乾燒婦人乳裂存性研末水調塗補遺方。

蒂 [主治] 燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔。吳瑞燒灰治口齒瘡蠶生切擦癥風。珍。

[發明] [時珍曰] 治癰風用茄蒂蘿蔔附末摻之。取其散。

[附方] [新] 風蛀牙痛末等分日用之。仁存方。

花 [主治] 金瘡牙痛珍。

[附方] [新] 牙痛秋茄花乾之旋燒研末立止。海上名方。

根及枯莖葉 [主治] 凍瘡皴裂煮湯漬之良。寶散血消腫治血淋下血。血痢陰挺齒齦口蕈。時珍。

[附方] [新] 血淋疼痛。茄葉熏乾爲末每服二錢溫酒或水服之。鹽湯下隔年者尤佳。經驗良方。腸風下血。方同上。米飲下久痢不止。茄根燒灰石榴皮等分爲末以沙糖水服之。簡便單方。女陰挺出。茄根燒入內一日一上。乾坤生意。米醋調稀時時擦之。摘玄方。牙齒齧痛。茄根搗汁頻塗之。○陳茄樹燒灰傳之。牙痛取牙。茄科以馬屎浸三日曬炒爲末。鮑氏方。夏月趾腫不下逐日煎湯洗之。行走者九月收茄根懸簡便。

【集解】藏器曰「苦茹野生嶺南樹小有刺」

子【主治】醋磨塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣

藥

壺蘆華日

【釋名】瓠瓜說匏瓜論語時珍曰「壺酒器也。盧飲器也。此物各象其形。又可爲酒飯之器。因以名如泡如漂也。凡蓏屬皆得稱瓠。故曰瓠瓜匏瓜。古人壺瓠匏三名皆可通稱。初無分別。故孫愬瓠音壺。又音謾。瓠瓢也。陶隱居本草作瓠瓢。云是瓠類也。許慎說文云瓠匏也。又云瓠瓢也。匏大腹云瓠也。陸機詩疏云壺瓠也。又云匏瓠也。莊子云有五石之瓠。諸書所言其字皆當與壺同音。瓠無柄而圓大形扁者爲匏。而後世有短以柄大腹者爲壺。壺之細腰者爲蒲蘆。各分名色迥異於古。以今參詳其形狀雖各不同。而腹壺以其腹有約束也。亦有大小二種也。」

【集解】弘景曰「一瓠與冬瓜氣類同輩。又有瓠瓢亦是瓠類。小者名瓢。食之乃勝瓠。此等皆利水形則異。瓠形似越瓜。長尺餘。頭尾相似。夏中便熟。秋末便枯。瓠瓢形狀大小非一。夏末始取其爲器。經霜乃堪。瓠與甜瓠體性相類。啖之俱勝。冬瓜陶言不及是。未悉此等原種名別也。」珍曰「長瓠懸瓠。虛匏蒲蘆。名狀不一。其實一類。各色也。處處有之。但有遲早之殊。陶氏言瓠冬瓜葉而稍圓。有柔毛嫩時可食。故詩云幡幡瓠葉。采之烹之。五六月開白花。結實白色。大小長短有種色。瓠中之子齒列而長。謂之瓠犀。縞謂壺匏之屬。既可烹曬。又可爲器。大者可爲甕盎。小者可爲各似。與瓢樽爲要。舟可以浮。水爲室。可以灌燭。其利溥矣。」恭曰「甘平滑無毒。」王叔和曰「甘冷多食令人吐利。」扁鵲曰「患脚氣虛脹冷氣者食之永不除也。」

【主治】消渴惡瘡。鼻口中肉爛痛。思利水道。景消熱服丹石人宜之。孟曉除煩治心熱利小腸潤心肺治石淋明。

【發明】時珍曰按名醫錄云。浙人食匏瓜多吐瀉。謂之發。

【附方】新一腹脹黃腫。用亞腰壺盧連子燒存性。每服一個。食前溫酒下。不飲酒者白湯下。十餘日見效。簡便方

葉【氣味】甘平無毒。

【主治】爲茹耐飢。思。

蔓蠶花【主治】解毒。時珍

【附方】新一預解胎毒。七八月或三伏日。或中秋日。翦壺盧蠶如環子脚者。陰乾於除冬煎湯浴。小兒則可免出痘。唐瑤經驗方

子【主治】齒斷或腫或露齒搖疼痛。用八兩同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。日三四次。御藥院方

苦瓠

本經

【釋名】苦匏。國語苦壺盧。

【集解】別錄曰一苦瓠生晉地。弘景曰。今瓠忽有苦者。如臍不可食。非別生一種也。又有瓠用無所主療。亦不堪啖。瓠與瓠瓢原種。各別。非甘者變爲苦也。保昇曰瓠即匏。謂瓠中苦者。大誤矣。瓠中時有苦者。又有瓠者大苦者小。機曰瓠有原種。是甘忽變爲苦者。俗謂以雞糞壅之。或牛馬踐踏也。有甘苦二種。或指苦瓠也。瓠壺同音。陶氏以瓠作護。音釋之所以不穢也。應劭風俗通云。燒瓠可濟而已。瓠皆通材於人共濟。或指苦瓠而首脫甘藥圃。亦有所見。未可盡非也。

家不燒穠種瓜之家不焚漆物性相畏也。蘇恭言服苦瓠過分吐利不止者以
黍穠灰汁解之蓋取乎此凡用苦瓠須細理。瑩淨無麤翳者乃佳不爾有毒。

瓢及子【氣味】苦寒有毒。

【主治】大水面目四肢浮腫下水令人吐。本經利石淋吐呀嗽囊結症疊痰飲又煮汁瀆陰療小便不通。恭言服苦瓠過分吐利不止者以
恭煎汁滴鼻中出黃水去傷冷鼻塞黃疽藏器吐蛇蟲明治癰疽惡瘡疥癬齷齒有蟲齶者又可制汞。參

【附方】舊八新急黃病汁滴入鼻中去黃水陳藏器黃疽腫滿苦瓠如大棗許以童子小便二
深吸氣待黃水出良○又方用瓠熬黃爲末每服大水脹滿頭面洪大用瑩淨好苦瓠
牛錢日一服十日愈然有吐者當詳之傷寒類要大水脹滿粒以麪裹者一沸空心服七枚至午當
出水一斗二日水自出不止大腹乃瘳二年內忌鹹物
○聖惠用苦瓠一兩微炒爲末每日粥飲服一錢通身水腫小豆大每服五丸日三水下止○又丸
用苦瓠膜五分大棗七枚搗丸一服三丸如人行十里許又服三丸水出更服一丸卽止並千金方
日三水下止水盛洪腫苦瓠一枝水二升煮至一升煎至可丸如小豆大每飲下十丸兩
聖濟總錄水盛洪腫大每米飲下十九丸待小便利作小豆羹食勿飲水小便不通。張急者用苦瓠
個焙爲末每冷水服一錢並聖濟總錄小兒閃癖取苦瓠未破者煮令熱解
立愈除根勿以昏運爲疑乾者浸汁亦效其子爲末吹入亦效年久頭風皆愈普濟方鼻窒氣塞苦瓠子爲末醇酒浸之夏一日聖惠方眼目昏暗月七日
同以微火煎減半每日取沫納眞中神效千金弩肉血臂小處鋸斷內空一小孔如眼孔大遇有此病
苦病將眼皮上用手指開之陳藏器本草風痰頭痛苦瓠膜取汁以葦管灌入鼻中其病立
方風蟲牙痛之莖葉子半升水五升煎三度苦然瘻皮上醫皆漸下不傷睛也。劉松石經驗方齒齶口臭含一丸仍塗齒斷丸半生涎出吐去妙大瓠如四鹽了

靈者各穿一孔如指大湯煮數沸取一竹筒長一尺一頭插瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易之用遍乃止千金方
良摘下部懸癰擇入神不在日空心用井華水調百藥煎末一盞服之微利後卻用秋壺一灸遂愈一名腦後洗
鈴玄方卒中蠱毒或吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮一升服立死胎不下苦瓠燒存一錢空性心研
海熱酒下海上名方竚耳出膿乾瓠子一分黃連半錢爲末以紙先鼻中蘸肉少許爲末紙擦丁香等分入惠
花【主治】一切瘻瘍煎湯浴之卽愈時珍○出蔓【主治】麻瘡煎湯浴之卽愈時珍○出
【附方】一小兒白疕瓠藤同裏鹽荷葉煎瀉

蔓【主治】一切瘻瘍煎湯浴之卽愈時珍○出
【附方】一小兒白疕瓠藤同裏鹽荷葉煎瀉

敗瓢目

【集解】藥亦時用之當以苦瓠者爲佳年久者尤妙

【氣味】苦平無毒

【主治】消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白

時珍

【附方】新六中滿鼓脹浸之如此三五次將瓠燒存性研末每服三錢酒待熱以瓠於炭火上炙入潤下血空心溫酒服二錢等分研末每赤白崩中舊瓠飄炒存性蓮房煅存性等分研水調服三服有汗爲度卽止甚者五服止最妙忌二房錢大便發物生冷海上方腦漏流膿破瓢白雞冠花白螺蟬殼各燒上存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒潤腋下

瘤瘻用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消爲度。一府校老遇右腋生一瘤漸長至尺許瀕湖集簡方湯火傷灼壺
虛飄燒傅之同上

冬瓜上品

校正今併入白瓜子

【釋名】白瓜本經水芝同地芝廣雅

○「志曰」冬瓜經霜後皮上白如粉塗其子亦白故名白冬瓜而

月種之若十月種者結瓜肥好乃勝春種則冬瓜之名或又以此也

○「經瓜子之下宋開寶本草加作白瓜子復分白冬瓜爲別錄也」

一

○「諸註辯說紛今併爲一本」

○「集解」蔓下大者如斗而更長皮厚而有毛初生正青綠經霜則白粉人多藏蓄年作菜果入藥苗

須霜後取置之經年破出核洗燥乃播取仁用之亦堪單作服餌

一

○「時珍曰」冬瓜三月生苗引蔓大者徑尺餘三四尺嫩時綠色有毛老則蒼色有

一

葉圓而有尖莖葉皆有刺毛六七月開黃花結實大者徑尺餘三四尺嫩時綠色有毛老則蒼色有

一

粉其皮堅厚其肉肥白其瓤謂之瓜練白虛如絮可以浣練衣服其子謂之瓜庫在瓢中成列霜後取

一

之其肉可煮爲茹可蜜漬果其子仁亦可食蓋兼蔬果之用凡收瓜忌酒漆麝香及糯米觸之必爛

一

○「白冬瓜氣味甘微寒無毒」

弘景曰

冷利

○「主治小腹水脹利小便止渴別錄擣汁服止消渴煩悶解毒」

弘景曰

蘇頌

○「利大小腸壓丹石毒蘚」

明

蘇頌

○「發明」「說曰」熟者食之佳冷者食之瘦人煮食練五臟爲其下氣故也欲得體瘦輕健者則可長

食

之若要肥則勿食也

宗奭曰

「凡患發背及一切癰疽者削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良」

靈亨曰

「冬瓜性走而急寇氏謂其分散熱毒氣蓋亦取其走而急也久病者陰

虛者忌之孫真人言九月勿食令人性反胃須被霜食之乃佳

○「說曰」

「取瓜一顆和桐葉與豬食之

一冬更不要與諸物食

自然不饑長三四倍也

【附方】舊八積熱消渴。白瓜去皮每食後喫三二枚。削皮埋溼地中一日取出破開。土泥厚五寸。燒熟絞汁飲之。或燒熟絞汁飲之。聖濟錄。消渴骨蒸。大冬瓜一枚去瓤入黃連三十丸研丸梧子大。每服三四十丸。煎冬瓜湯下。經驗產後痢渴。口舌乾燥。用冬瓜薦滿安窓內待瓜消盡。久病津液枯竭。四肢浮腫。治傷寒病渴。古今錄驗亦小兒渴利。冬瓜汁飲之。千金小兒腹病。水三升煎湯浴之。千金方。嬰孩寒熱。冬瓜炮熟絞汁。水病危急。神效無比。兵部手集。子母祕錄。水病危急。神效無比。兵部手集。十種水氣。浮腫喘滿。用大冬瓜一枚切蓋以日乾。用糯米兩大羅。入瓜在內。煨至火盡。取出切片。同豆焙乾爲末。水糊丸。楊氏家藏方。發背欲死。瘡上瓜爛截去頭合。更合之。瓜未盡。瘡已小斂。乃用膏貼之。肘後方。痔瘡腫痛之。冬瓜煎湯洗。馬汗入瘡。乾冬瓜燒研。食魚中毒。冬瓜汁飲之。面黑。聖濟總錄。

瓜練瓜 **【氣味】**甘平無毒。

【主治】絞汁服止煩躁熱渴。利小腸。治五淋。壓丹石毒。飄權。洗面潔身。去黴。令人悅澤。白晳。時珍。

【附方】新二。消渴煩亂。冬瓜瓤乾者一兩。聖惠方。水腫煩渴。汁淡飲之。聖濟總錄。

白瓜子仁也。八月采之。有青白二種。其子色黃。主療與冬瓜全異。但冬瓜經霜有白衣。其子亦白。瓜之號因斯而得。况諸方惟用冬瓜子。不見用甘瓜子者。蘇說不可憑也。

【氣味】甘平無毒。**【別錄】**甘平。

【主治】令人悅澤。好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。本經除煩滿不樂。可作面脂。**【別錄】**去皮膚風及黑點潤。

飢膚明治腸癱珍時

【發明】頌曰冬瓜仁亦堪單作服餌。又研末作湯飲及作面脂藥並令人好顏色光澤。宗奭曰：服食方亦稀用之。

附方

舊五服食法。取冬瓜仁七升以絹袋盛投三沸湯中須臾取曝乾。如此三度。又與清苦酒漬之。

附方

新五服食法。二宿曝乾爲末。日服方寸匕。令人肥悅。明目延年不老。又法：取子三五升去皮爲

附方

丸空心日服三十丸。人補肝明目。治男子五勞七傷。明目同上。外臺祕要：白瓜仁五兩桃花四兩爲末。食後飲服。

附方

方寸匕日三服。欲白加瓜仁。欲紅加桃花。三十日面多年損傷不瘥者。瓜子末溫酒消渴不止。小便多。

附方

白五十日手足俱白。一方有橘皮無楊皮。肘後方驗。孫真人方：白瓜仁五兩爲末。食後飲服。

附方

瓜子參鬚各二兩水煎飲之。冬瓜苗葉俱治消渴。不抱新乾。摘玄方。男子白濁水飲服五錢。救急易方。女子白帶上同。

附方

瓜皮【主治】可作丸服亦入面脂。主驢馬汗入瘡腫痛陰乾爲末塗之。又主折傷損痛。

附方

新二跌撲傷損。用乾冬瓜皮一兩真牛皮膠一兩剉入鍋內炒存性研末每服五錢。

附方

新酒熱服仍飲酒一甌厚蓋取微汗其痛即止。一宿如初極效。摘玄方：損傷腰痛。

附方

一冬瓜皮燒研酒服。生生編。

附方

新一積熱瀉痢。冬瓜葉嫩心搗麪煎餅食之。海上名方。

附方

新石時。藤【主治】燒灰可出繡線。煎湯洗黑廩并瘡疥。大毒汁服解木耳毒。煎水洗脫肛燒灰可淬銅鐵伏砒。

【集解】引時珍曰：「南瓜種出南番，轉入閩浙。今燕京諸處亦有之矣。二月下種，宜沙沃地。四月生苗，月開黃花，如西瓜花，結瓜正圓，大如西瓜。皮上有棱，如甜瓜一本可結數十顆。其色或綠或黃，或紅，經霜收置暖處，可留至春。其子如冬瓜子，其肉厚，色黃，不可生食。惟去皮瓤，渝食，味如山藥。同豬肉煮食，更良。亦可蜜煎。按王禎農書云：浙中一種陰瓜，宜陰地種之。秋熟，色黃，如金皮膚，稍厚，可藏至春。食之如新，疑此即南瓜也。」

【氣味】甘溫無毒。主治補中益氣。

【主治】補中益氣。

越瓜

宋開寶

【釋名】稍瓜。食菜瓜。

時珍曰：越瓜以地名也。

【集解】

藏器曰：越瓜生越中，大者色正白。越人當果食之，亦可糟藏。

時珍曰：越瓜南北皆有，二月下種，生苗就地引蔓，青葉黃花，並如冬瓜花葉而小。夏秋之間，結瓜有青白二色，大如瓠子，一
種長者至二尺許。俗呼羊角瓜，其子狀如胡瓜子，大如麥粒。其瓜生食可充果蔬，醤、豉、糖、醋藏浸皆宜，亦可作菹。

【氣味】甘寒，無毒。小兒天行病後，不可冷中動氣，令人心痛，臍下癰結發諸瘡，又令人虛弱不能行，不益能暗人耳目，觀鰐馬食之，卽眼爛可知矣。

【主治】利腸胃，止煩渴，利小便，去煩熱，解酒毒，宣洩熱氣，燒灰傅口吻瘡及陰莖熱瘡，器利飯作餌。

久食益腸胃。

心寶：人耳目觀鰐馬食之，卽眼爛可知矣。

胡瓜

宋嘉祐

【釋名】黃瓜。〔藏器曰〕北人避石勒諱改呼黃瓜。至今因之。**〔時珍曰〕張騫使西域得種故名胡瓜。土瓜也。見草部。**

〔集解〕〔時珍曰〕胡瓜處處有之。正二月下種，三月生苗。引蔓葉如冬瓜葉，亦有毛。五月開黃花。結瓜圍二三寸，長者至尺許。青色皮上有瘡癟如疣子。至老則黃赤色。其子與菜瓜子同一種。五月種者霜時結瓜，白色而短，並生熟可食。兼蔬菜之用。糟醬不及菜瓜也。

〔氣味〕甘寒，有小毒。〔洗曰〕不可多食。動寒熱，多瘧病，積瘀熱發疰氣，令人虛熱上逆，少氣損陰血。

〔主治〕清熱解渴利水道原。

〔附方〕舊二新五。小兒熱痢，嫩黃瓜同蜜食十餘粒，良。海上名方。水病肚脹，四肢浮腫，用胡瓜一個破開連子，以醋煮一水下。錢乙小兒方。咽喉腫痛，爲末，每以少許吹之。醫林集要。杖瘡膿腫，中水浸之，每以水掃於瘡瓶上，立效。五月取老黃瓜一條，上開小孔去瓢，入芒消令滿，待消透出，刮下留點眼，甚效。壽域神方。湯火傷灼，瓶內封掛簷下，取水入刷之，良。醫方摘要。

葉〔氣味〕苦平，有小毒。

〔主治〕小兒閃癖，一歲用一葉，生搊攪汁服，得吐下良器。根〔主治〕擣傅狐刺毒腫，大明。

絲瓜綱目

【釋名】天絲瓜。本天羅合璧布瓜上蠻瓜事魚鱗。時珍曰：此瓜老則筋絲羅織，故有絲羅之名。瓜花蕊瓣俱黃，其瓜大寸許，長一二尺，甚則三四尺，深綠色，有皺點。瓜頭如鼈首，嫩時去皮可烹，可曝，惟可藉韃履滌金器，故村人呼爲洗鍋羅瓜。內有微似胡屬，其花苞及嫩葉卷鬚皆可食也。

瓜【氣味】甘平無毒。老者入藥用。

【主治】痘瘡不快，枯者燒存性，入朱砂研末，蜜水調服，甚妙。煮食除熱利腸。老者燒存性，服去風化痰涼血解毒，殺蟲，通經絡，行血脈，下乳汁，治大小便下血，痔漏崩中，黃積，痘痛，卵腫，血氣作痛，癰疽瘡腫，齒齦，痘疹胎毒。時人暖胃補陽，固氣和胎。生者入藥用。

【發明】穎曰：絲瓜老者筋絡貫串，房隔聯屬，故能通人脈絡，臟腑而去風解毒，消腫化瘀，祛痛殺蟲，及治諸血病也。

【附方】新二。痘瘡不快，初出或未出，多者令少，少者令稀。老絲瓜近蒂三寸，連皮燒存性，研末，砂糖水服，直指，痘疽不斂，汁頻抹之。太深用絲瓜搗熱，腮腫，絲瓜燒存性研末，水調搽之。嚴月軒方，肺熱面瘡，苦絲瓜牙皂莢並燒灰，玉莖瘡潰，子未頻搽之。丹溪方，坐板瘡疥，絲瓜皮搗乾爲末，燒酒泡溼瘡粉，頻搽之。妙方，天泡溼瘡，絲瓜汁調辰手足凍瘡，老絲瓜燒存性和臘研，海上方，肛門酒痔，存性研。

末酒服二錢。痔漏脫肛。絲瓜燒灰。多年石灰雄黃各五錢爲末。以豬膽雞腸風下血。霜後乾絲瓜燒
嚴月軒方。子清及香油和調貼之。收上乃止。孫氏集效方。腸風下血。性爲末。空心酒服。
二錢。一名蠻瓜。一名天羅。一名乾研。不可救者。絲瓜卽天羅一個燒存性。槐花酒痢便血。腹痛或
天絲瓜是矣。許叔微本事方。下血危篤。減半爲末。每空心米飲服二錢。普濟方。酒痢便血。如魚腦
五色者。乾絲瓜一枚。連皮燒研。空心酒服二錢。血崩不止。鹽酒或鹽湯服。奇效良方。經脈不通。乾
錢一方。燒食之俗名魚鱉是也。經驗良方。經脈不通。乾絲瓜連子燒存性。研酒服一二錢。乾血氣痛。婦
末用白鵝血調成餅。日乾研末。每服二錢。海上名方。乳汁不通。錢被覆取汗即通。簡便單方。乾血氣痛。婦
空心酒下先服四物湯三服。海上名方。乳汁不通。錢被覆取汗即通。簡便單方。乾血氣痛。婦
上衝心膈變爲乾血氣者。用絲瓜一錢。透膈衝心。連蒂老絲瓜燒存性。研末。每服。卵腫偏墜。瓜
枚燒存性。空心溫酒服。壽域神方。小腸氣痛。三錢熱酒調下。甚者不過二三服。卽消。卵腫偏墜。絲
架晚上初結者。留下待瓜結盡葉落取下燒存性。爲末。煉蜜調成膏。腰痛不止。天羅布瓜子仁炒焦。擂酒
每晚好酒服一匙。如在左睡在右。右睡在左。左睡在右。右睡在左。劉松石保壽堂方。腰痛不止。服以渣傅之。熊氏補遺
喉閉腫痛灌之。普濟卒然中風。漿半錢和勻灌之。如手足麻癱以羌活煎湯洗之。唐瑤經驗方。化
痰止嗽。天羅卽絲瓜燒存性。爲末。棗肉和丸彈子。風蟲牙痛。經霜乾絲瓜燒存性。直指方。風氣牙痛者。用此大
痰。每服一丸。溫酒化下。攝生妙用方。風蟲牙痛。爲末。擦之。直指方。風氣牙痛者。用此大
能去風。惟蛀牙不效。天羅卽生絲瓜一個。擦鹽火燒存性。研末。頻擦涎盡。卽愈。食積黃疸。絲連子燒
腮腫以水調貼之。馬敏叔云。此乃嚴月軒家傳屢效之方。一試卽便可睡也。食積黃疸。存性爲末。每
服二錢。因麪得病。麪湯下。因酒得病。衛生易簡方。小兒浮腫。天羅燈草葱白等分。煎濃水。蠭腹脹。老絲瓜去皮一
溫酒下。連進數服愈。巴豆逐水。絲瓜象人脈絡。借其氣以引之也。此乃元時杭州名醫宋會之方。鮮于樞鉤玄
氣同炒豆黃去豆。以瓜同陳倉米再炒熟去瓜。研米爲末。糊丸梧子大。每服百丸。白湯下。蓋米收胃
生蛆。頭皮內時有蛆出。以刀切破擠絲瓜葉。同炒豆黃去豆。以瓜同陳倉米再炒熟去瓜。研米收胃
生蛆。汁搽之。蛆出盡絕根。李樓怪證方。湯火傷灼。生者撲傅一日。卽好也。海上名方。魚臍疔瘡。

葉主治癰瘡頻接摻之療癰疽丁腫卯癰時

【附方】
新蟲癬。清晨采露水絲瓜葉七片。逐片擦七
六。蟲癩下如神忌雞魚發物。攝生衆妙方。陰子偏墜。二錢溫酒調服。余居士選奇方。頭瘡
生蛆。頭皮內時有蛆出。以刀切破擠絲瓜葉。湯火傷灼。生者撲傅一日。卽好也。海上名方。魚臍疔瘡。

練瓜葉卽虞刺葉也連鬚蕊白韭菜等分同入石鉢內研爛取汁以熱酒和服以渣貼腋下病在左腋貼左膀右腋貼右膀在中貼心臍用帛絰住候肉下紅線處皆白則散手矣如有潮熱亦用此法卻令人抱住危氏得效方刀瘡神藥古石灰新石灰絲瓜根爲末擦之止血定痛生肌如神等恐其顛倒則難救矣

傳侍御蘇海峯所

董炳集驗方

藤根氣味葉同

【主治】齒齦脳漏殺蟲解毒時

珍

【附方】新預解痘毒五六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯母父只合瘡久潰絲瓜老根熬水掃之喉風腫痛浸飲之絲瓜根以五瓶盛水海上名方腦崩流汁鼻中時流臭黃水腦痛名控近根三五尺燒存性每服一錢牙宣露痛惠生堂方用絲瓜藤陰乾臨時火燄存性研溫酒下以愈爲度醫學正傳吐其痛立咽喉骨鯁七月七日取絲瓜根陰乾燒存性每服一錢神效捷存性爲鄧筆峯雜興腰痛不止二錢神效甚捷爲鄧筆峯每溫雜酒汁漱○

【附錄】天羅勒拾遺藏器曰生江南平地主天羅凝卽此物然無的據姑附之

苦瓜
莖

【釋名】錦荔枝。救荒癩蒲萄。時珍曰「苦以實及莖葉相似得名。瓜及荔枝

【集解】周憲王曰「錦荔枝卽癩蒲萄蔓延草木莖長七八尺莖有毛澤葉似野蒲萄而小又開黃蔓莖葉卷鬚並如蒲萄而小七八月開小黃花五瓣如盤形結瓜長者四五寸短者二三寸青色辨葉如癩及荔枝殼狀熟則黃色自裂內有紅瓤裏子瓤味甘可食其子形扁如瓜子亦有辨癩南人

以青皮煮肉及鹽醬充蔬苦澀有青氣按費信星槎勝覽云蘇門答刺國一等瓜皮若荔枝未剖時甚臭如爛蒜剖開如糞味如醜香甜可口疑此卽苦瓜也

瓜氣味苦寒無毒

【主治】除邪熱解勞乏清心明目時珍曰○葉曬乾爲末治一切丹火毒氣金瘡結毒爲末散瘡瘍大疔瘻不可忍酒下三錢神效花疼淡湯下目痛生編葉麻疔大疔疼不可忍酒下三錢神效花疼淡湯下目痛

子氣味苦甘無毒

【主治】益氣壯陽時珍

菜之四水菜類六種

紫菜食療

【釋名】紫蘚音

【集解】海邊悉有之大葉而薄彼人接成餅狀曬乾貨之其色正紫亦石衣之屬也時珍曰「時珍曰」閩越

【氣味】甘寒無毒「藏器曰」多食令人腹痛發氣吐白沫飲熱醋少許卽消

【主治】熱氣煩寒咽喉煮汁飲之孟子病瘻瘤脚氣者宜食之時珍

【發明】震亨曰「凡癰結積塊之疾宜常食紫菜乃鹹能軟堅之義

石蓴拾遺

【校正】自草部移入此

【集解】附石而生似紫菜色青

【氣味】甘平無毒

【主治】下水利小便。主風祕不通。五膈氣。并臍下結氣。煮汁飲之。胡人用治瘧疾。李珣

石花菜食

【釋名】瑞枝。『時珍曰』並以形名也。

【集解】一時珍曰一石花菜生南海沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二色。枝上有細齒。以沸湯泡去砂屑。沃以薑醋食之甚脆。其根埋沙中可再生枝也。一種稍粗而似雞爪者謂之雞腳。味更佳。二物久浸皆化成膠凍也。郭璞海賦所謂水物則玉珠。海月土肉石華卽此物也。

【氣味】甘鹹。大寒滑無毒。

【主治】去上焦浮熱。發下部虛寒。寧

鹿角菜食

【釋名】猴葵。『時珍曰』按沈懷遠南越志云。猴葵一

名鹿角蓋。鹿角以形名。猴葵因其性滑也。

【集解】一士良曰一鹿角菜生海南島。登萊沂密諸處海中。『時珍曰』鹿角菜生東南海中石厓間。長三四寸。大如鐵線。分丫如鹿角狀。紫黃色。土人采曝。貨爲海錯。以水洗醋。并則脹起如新味。極滑美。若久浸則化如膠狀。女人用以梳髮黏而不亂。

【氣味】甘大寒滑無毒。『洗曰』微毒。丈夫不可久食。發痼疾。損腰腎經絡血氣。令人腳冷痹少顏色。

【主治】下熱風氣療小兒骨蒸熱勞服丹石人食之能下石力良解麵熱大

龍鬚菜綱目

【集解】以時珍曰龍鬚菜生東南海邊石上叢生無枝葉狀如柳根鬚長者尺餘白色。

【氣味】甘寒無毒

【主治】癰結熱氣利小便時珍

睡菜綱目

【釋名】膜菜膜音綽菜

醉草

嬌婦歲記事未詳

【集解】時珍曰按稽含南方草木狀云綽菜夏生池沼間葉類慈姑根如藕條南海人食之令人熟記有卻睡草食之令人不睡卻睡與此相反也按苦菜龍葵皆能使人不睡卻睡之草其此類乎時珍按

【氣味】甘微苦寒無毒

【主治】心膈邪熱不得眠時珍

菜之五芝栢類一十五種

芝本經 上品
校正併入本經青赤黃白黑紫六芝

【釋名】茵音因時珍曰芝本作之篆文象草生地上之形後人借之字爲語辭遂加草以別之也

爾雅云茵芝也註云一歲三華瑞草或曰生於剛處曰菌生於柔處曰芝昔四皓采芝葦仙

服食者故移入菜部可

其山水皆玉亦如鮮明水晶曰七孔九光芝生於臨水石崖之間狀如盤盤有莖葉此芝葉有七孔夜見樹乃石也光明味辛曰石腦芝石中黃皆石芝類也千歲燕千歲蝙蝠千歲龜萬歲蟾蜍山中見小山芝土芝石芝金芝水芝火芝雷芝甘露芝青雲芝雲氣芝白虎芝車馬芝天芝地芝人形下芝六畜形又按段成一芝西陽雜俎不芝者齧虫如牛馬者遠役如蛇者齧耗時云張人形人言始知芝乃腐朽餘氣所生正也人又生瘤贊以木積溼今皆處用藥傅之卽生服五食色可仙嘉誠爲中迂王謬金近讀生成以式之珍屬

青芝一名龍芝錄別

【氣味】酸平無毒。『時珍曰』五色之芝配以五行之味蓋亦據理而已未必其味便隨五色也卽芝並以薯蕷爲之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂甚益人惡常山畏扁青茵陳蒿

【主治】明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙本不忘強志唐

赤芝一名丹芝本經

【氣味】苦平無毒

【主治】胸中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙本經

黃芝一名金芝本經

【氣味】甘平無毒。

【主治】心腹五邪。益脾氣。安神。忠信和樂。久食輕身不老。延年神仙。本經。

白芝。一名玉芝。本經。

【氣味】辛平無毒。

【主治】欬逆上氣。益肺氣。通利口鼻。強志意。勇悍。安魄。久食輕身不老。延年神仙。本經。

黑芝。一名玄芝。本經。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】癰利水道。益腎氣。通九竅。聰察。久服輕身不老。延年神仙。本經。

紫芝。一名木芝。本經。

【氣味】甘溫無毒。曰一平。甄權。

【主治】耳聾。利關節。保神。益精氣。堅筋骨。好顏色。久服輕身不老。延年。本經。療虛勞。治痔。時珍。

【附方】新一紫芝丸。治虛勞。規氣。胸脇苦傷。手足逆冷。或時煩躁。口乾。目視盻盻。腹內時痛。不思飲食。此皮根實去瓢殼炒各三錢。生地黃焙。麥蘆冬去心焙五分。瓜子仁炒。澤瀉各五錢。爲末。煉蜜丸梧子大。每服十五丸。日三服。聖濟總錄下。

木耳本經中品

校正自桑根皮條分出

【釋名】木櫚

而軟二音

木菌

舊捲二音

木堤

縱

樹雞

文

木蛾

氣

所生

耳

曰蛾

象形也

曰櫚

以軟

溼者佳

也

曰雞

余

乃貝子之名

似也

南楚人謂雞爲

增

曰菌

猶蠅也

亦象形也

蟲

人曰蛾

南人曰蕈

【集解】

別錄曰

五木耳生健爲山谷

六月多雨時采

卽暴乾

弘景曰

此云五木耳而不顯言

柳此爲五木耳

軟者並堪啖

椿耳人常食

椿耳療痔

安諸木上以草覆之

卽生蕈爾

時珍

木各木皆生其良毒亦必隨木性不可不審然今貨者亦多復藥用

恭曰

桑槐椿榆

之耳爲多云

古槐桑樹上者良柘木者次之其餘樹上多動風氣發瘡疾令人

惡蛇蟲從下過者有毒楓木上生者

楓木上生者令人笑不止采歸色變者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者並有毒並生

瘡

冬瓜蔓汁解之時珍曰

按張仲景云

木耳赤色及仰生者並有毒並生瘡

【主治】益氣不飢輕身強志

本斷穀治痔

時珍

【發明】

胃

木耳衰精

言老柳之蛾能補胃理氣

木耳乃朽木所生得一陰之氣故有衰精冷腎之害也

補

附方

新

眼流冷淚

木耳一兩燒存性

木炭一兩爲末

每

血注腳瘡

桑耳

椿耳牛屎

各五錢

胎髮

之或乾塗

之崩中漏下

木耳半斤炒見烟爲末

每服二錢

一分頭髮

灰三分共二

新久洩痢

乾木耳

兩炒

鹿角

一錢

水煮

鹽

醋

食之以汁送下

普濟方

一切牙痛等

分煎湯

芥角

灰

桑耳頻漱方

【釋名】桑櫚

唐本

桑蛾

宋本

桑雞

綱目

桑黃

性

桑臣

藥

桑上寄生

寄生

名同物異也

時珍曰

桑櫚又呼爲桑

以上

下皆軟耳之名。桑黃以下皆硬蕊之名。其功性則一也。

【氣味】甘平有毒。「說曰」寒無毒。大明曰溫微

毒。

【主治】黑者主女人漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子。

本經

療月水不調其黃熟陳白者。

止久洩益氣不饑其金色者治癬飲積聚腹痛金瘡別錄治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痃癖甄止血衄腸風瀉血婦人心腹痛大利五臟宣腸胃氣排毒氣壓丹石人發熱和葱豉作羹食。

孟洗

【附方】舊四少小鼻衄仁大塞鼻中數度即可斷時後方待孔卒痛如鳥啄狀取大小豆各一升合搗作兩囊蒸之不止用桑黃一兩熟附子一兩爲末煉血淋疼皮各二錢白

水煎服日一月水不斷服之桑黃焙研每服二錢食前熱酒下日二服普濟方

次聖惠方月水不斷服之桑黃焙研每服二錢食前熱酒下日二服普濟方

酒服方寸匕日三服效千金方赤白帶下服蘇頌圖經遺尿且澀七日三服

聖濟總錄留飲宿食豆一兩去皮

米下蒸過和棗膏搗丸麻子心下急痛桑耳燒存性熱酒

集簡方瘻瘍潰爛桑黃五錢水紅豆一兩百

大每服一二丸取利止范汪方心下急痛服二錢

大每服一丸利以車前艾咽喉痹痛碎綿包彈子大蟹湯浸含之立效便民方面上黑斑燒研

每食後熱湯服一錢足趾肉刺先以湯浸刮去一層用黑木耳

摘玄方貼之自消爛不痛近效方

槐耳釋名槐櫟唐本槐菌唐本槐雞蜀本赤雞綱目槐蛾權曰此槐樹上菌也當取堅如桑耳者

煮漿粥安槐木上草覆之卽生蕈耳

【氣味】苦辛平無毒

【主治】五痔脫肛下血心痛婦人陰中瘡痛。蘇恭治風破血益力。權

【附方】舊二 腸痔下血。槐樹上木耳爲末飲服方。崩中下血。不問年月遠近用槐耳燒存性爲末每服方寸七溫酒下。產寶方。產後血瘀欲死者。槐雞半兩爲末酒溫煎飲服立愈。婦人良方。蛇蟲心痛。槐木耳燒存性爲末水服。許若不止飲。月水不斷。勞損黃復發。小勞榔刺者。槐蛾炒黃赤石脂各一兩。各一兩。聖惠方。臘毒下血。槐耳燒二兩乾漆燒一兩爲末。食前熱酒服二錢。染黃亦可。八月榆耳采之。

【主治】令人不飢。珍。

【附方】新一 服食方。淮南萬畢術云。八月榆櫛以美酒漬曝同青染米紫

柳耳【主治】補胃理氣。珍。

【附方】新一 反胃吐痰。柳樹蕈五七個煎湯服即愈。活人經統。

柘耳【釋名】柘黃。

【主治】肺癰欰唾膿血腥臭。不問膿成未成。用一兩研末同百齒霜二錢糊丸梧子大。米飲下三十九效甚捷。時珍。

楊櫨耳【藏器曰】出南山山。

【氣味】平無毒。

【主治】老血結塊。破血止血。煮服之。藏

杉菌宋圖經

【集解】頌曰 杉木上狀若菌采無時

【氣味】甘辛微溫無毒

【主治】心脾氣疼及暴心痛蘇頌

阜莢蕈綱目

【集解】時珍曰 生阜莢樹上木耳不可食采得焙乾備用

【氣味】辛有毒

【主治】積垢作痛泡湯飲之微泄效未已再服又治腫毒初起磨醋塗之良時珍

【附方】新一 腸風瀉血阜莢樹上瓦錢溫酒下 許學士本事方

香蕈日用

【釋名】時珍曰 蕈從蕈也。蕈味雋永有蕈延之意。

【集解】瑞曰 有蟲殺人。穎曰：香蕈生桐柳枳椇木上，深山爛楓木上，小於菌而薄黃黑色，味甚香美，最成佳品。一云芝菌皆因溼氣蒸而生，山僻處亦甲羣彙仙居介乎天臺括蒼之間，叢山入天仙靈所宮，爰產異菌，林居巖栖者，自商山茹芝而五色至勝，近或以羞王公。登玉食矣。一曰合蕈，又名臺蕈，生於臺之章莞山，寒極以雪收售，香味減於生土者，乃藜臺也。他芽蔓天時處，其質外褐色，肌理玉潔芳香，韻味一發，蓋高聞於百步山人，噪乾以售，春氣欲動，生土者乃他芽蔓天時處。

雖產其柄高而香劣不及矣。二曰稠膏蕈生孟溪諸山中雨零露浸釀山膏木腴發爲菌花生時生松陰采無時。凡物松出無不可愛者。四曰麥蕈生溪邊沙壤中味殊美絕類麌菰五曰玉蕈初如蕊珠圓瑩類輕酥滴乳淺黃白色味尤甘已乃張傘大若掌味頓渝矣。春時亦生而膏液少頂紫色產山中爲下品。八曰四季蕈生蒲蕈六曰黃蕈叢生山中黃色俗名鵝膏黃蕈生高山中狀類鵝子紫蕈久而諸寒松少頂蕈相亂不可不慎杜蕈土菌也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣不飢治風破血。吳瑞松蕈治溲濁不禁食之有效。菌

葛花菜綱目

【釋名】葛乳華也。秋霜浮空如芝菌涌生地上其色赤胞蓋蕈類也。精

【氣味】苦甘無毒。

【主治】醒酒治酒積。時珍○

天花蕈日用

【釋名】天花菜。

【集解】〔瑞曰〕天花菜出山西五臺山形如松花而大香氣如蕈白色食之甚美。『時珍曰』五臺胡孫眼其氣而生故味美其價頗珍段成式酉陽雜俎云代北有樹雞如桺櫻俗呼頂此類與其

【氣味】甘平無毒。時珍曰一接正要云有毒

【主治】益氣殺蟲。吳瑞

蘑菇蕈綱目

【釋名】肉蕈。

【集解】時珍曰 蘑菰出山東淮北諸處埋桑楮諸木於土中澆以米泔待菰生采之長二三寸。本有蜂窠眼者名羊肚菜。

【氣味】甘寒無毒。正要曰氣發病不可多食

【主治】益腸胃化痰理氣。時珍○生生編。

雞棤綱目

【釋名】雞菌。雞棤皆言其味似之也。

【集解】時珍曰 雞棤出雲南生沙地間丁蕈也。高腳繖頭土人采烘寄遠以充方物點茶烹肉皆老故名作蒸甚美亦如雞此數種其價並珍。

【氣味】甘平無毒。

【主治】益胃清神治痔。時珍

蛇菜綱目

【集解】時珍曰此卽海舶蛇

【氣味】鹹甘寒無毒

【主治】癰癩氣痰飲

珍時

土菌拾遺
【校正】自草部移入此

【釋名】杜蕈。地蕈。拾菰子。

物地雞。爾雅。獐頭。雅。

藏器曰「地生者爲菌。木生者爲櫚。江東人呼爲蕈。爾

郭璞註云地蕈似釘。蓋江東名爲土菌。可啖。凡菌從地中出者皆主血病。」時珍從曰「鍾馗神名。又槌牛糞上黑菌尤佳。若燒灰如地頭。則故以名之。」

【氣味】甘寒。有毒。微痛。發五臟風。擁經脈。動痔病。令人昏多睡。背脅四肢無力。藏器曰「菌冬中者無毒。夏秋有毒。有蛇蟲從下過也。夜中有光者欲爛無蟲者煮之不熟者。煮訖照人無影者。上有毛下無紋者。抑卷赤色者並有毒殺人。地中者有黑者殺人。否則無毒。」時珍曰「按菌譜云杜蕈生地中。其毒與山中鵝膏蕈相似。亂俗以苦茗白礬勾新水成汁滴地生上。乾爲末。入酒供食。色赤。人遇再飲酒發立死。又陳氏拾方云廣南人以殺蛇蔓草覆之。以草以水灑之。數日菌生上。采生菌收之。」

【主治】燒灰傅瘡疥。藏器記之。○馬勃亦菌類。見草部不知。

【附方】新疔腫上用水和末一錢入筒內少頃沸起則根拔出未出再作二三次醫學正傳

【附錄】鬼蓋別錄有名未用曰味甘平無毒主小兒寒熱瘡叢生垣牆下赤色且生瘡赤和醋傅腫毒惡瘡馬脊腫杜正倫曰鬼繖也藏器曰一名鬼屋生陰溼處如菌其蓋黑而時珍曰此亦土菌之類朝生夕死者燒灰治療腫以鍼刺破四邊納灰入內經宿出根地苔別錄曰味苦無毒主小兒瘡除邪養胎風痹洗洗寒熱目中青翳女子帶下生腐木積草拾遺大兩生蓋如朝生黃白色四月采之時珍曰此卽鬼蓋之色黃白者其功亦相近鬼筆藏器曰鬼筆生叢磯處頭如筆紫色朝生暮死名朝牛糞生上落花小兒呼爲狗溺臺主治瘡疽疥癬瘻並者日乾研末和油塗之凡菌從地出者皆主瘡疥牛糞生上黑菌尤佳時珍曰此亦鬼蓋之類而無繖並者

竹蓀食療

【校正】併入拾

【校正】遺竹肉

【釋名】竹肉拾竹菰綱竹蕈時珍曰草更生曰蕈得海溼之氣

【集解】詵曰慈竹林夏月逢雨滴汁着地生蕈似鹿角白色可食藏器曰竹肉生苦竹枝上如雞子似肉鬻有大毒以灰汁煮三度煉乾然後依常菜茹食之不熟者入喉出血手爪上盡脫應別有功人未盡識之時珍曰此卽竹菰也生竹根節上狀知木耳紅色段成式西陽雜俎云江淮有竹肉大如彈丸味知白樹雞卽此物也惟苦竹生者有毒耳

【氣味】甘鹹寒無毒

竹肉有大毒

【主治】一切赤白痢和蕈醬食之孟苦竹肉灰汁鍊過食殺三蟲毒邪氣破老血藏器

藿菌音桓郡○本經下品

【校正】自草部移入此部

【釋名】藿蘆本經下時珍曰藿當作萑乃蘆葦之屬此菌生於其下故名也若萑音觀乃鳥名與萑蘆無關

【集解】別錄曰：「舊菌生東海澤及渤海，八月采陰乾。」弘景曰：「出北來此亦無有形狀，葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾。非鶴屎所化生也。其菌色白輕虛表裏相似與衆菌不同。療蛇有效。」保昇曰：「今出滄州，秋雨以時，卽有天旱久霖，卽稀日乾者良。」

【氣味】鹹平有小毒。

別錄曰：「甘微溫，一苦得酒良。畏雞子。」權

【主治】心痛溫中去長蟲。白癰燒蟲。蛇蟹毒癥。瘕瘕諸蟲。本經疽蠅去。蟄寸白惡瘡。除腹內冷痛。治白禿。

【附方】一、蛻蟲攻心。如刺吐清汁者，種菌一兩，杵末，羊肉和食之，日一頓，大效。外臺祕要。

【附錄】蜀格。別錄曰：「味苦平，無毒。主山陽如雀園而有刺。」

地耳
別錄

校正
自有名未用

移入此

【釋名】地踏菰。綱目

【集解】別錄曰：「地耳生丘陵知碧石青也。」時珍曰：「地耳亦石耳之屬，生於地

【氣味】甘寒無毒。

【主治】明目益氣，令人有子。別錄曰：

石耳
用

【釋名】靈芝。靈苑方

【集解】瑞曰石耳生天臺四明河南宣州黃山巴西邊微諸山石崖上。遠望知煙。時珍曰廬山亦多狀如地耳。山僧采曝腕遠洗去沙土作茹勝於木耳佳品也。

【氣味】甘平無毒。一段成式曰「冷熱」。

【主治】久食益色至老不改。令人不饑。大小便少。吳瑞明目益精。

時珍

【附方】新瀉血脫肛。石耳五兩炒白枯礬一兩密陀僧半兩爲末。

普濟方

卷二十九

果部

李時珍曰。木實曰果。草實曰蓏。熟則可食。乾則可脯。豐儉可以濟時。疾苦可以備藥。輔助粒食。以養民生。

故素問云。五果爲助。五果者。以五味五色應五臟。李杏桃栗棗是矣。古書欲知五穀之收否。但看五果之

盛衰。

主小豆粟主稻黍主大麥

梅

禮記內則列果品。菱根榛瓜之類。周官職方氏辨五地之物。山林宜阜物。梓

屬川澤宜膏物。

灌莢

丘陵宜核物。

李

甸師掌野果蓏場人樹果蓏珍異之物。以時藏之。觀此。則果蓏之

土產常異。性味良毒。豈可縱嗜欲而不知物理乎。於是集草木之實號爲果蓏者爲果部。凡一百二十七

種。分爲六類。曰五果。曰山。曰夷。曰味。曰蓏。曰水。

舊本果部三品。共五十三種。今移一種入菜部。四種入草部。自木部移入併附。三十一種草部移入四種菜部移入。

一種外類
移入四種

神農本草經十一種

梁陶弘景註

名醫別錄十七種

同上唐本草十一種唐蘇恭

本草拾遺二十種

唐陳藏器註

海藥本草一種

唐李珣

食性本草一種

唐陳士良

食療本草一種

唐孟詵

開寶本草十九種

宋馬志

嘉祐

本草二種

宋掌禹錫

圖經本草五種

宋蘇頌

日華本草二種

宋人

大明

明汪穎

食物本草一種

明汪穎

日

【附註】魏吳普本草

唐蕭炳四聲

李當之本草

宋雷斅炮炙論

蜀韓保昇重註

齊徐之才藥對

宋寇宗奭衍義

唐甄權藥性

孫思邈千金

元朱震亨補

周憲王救荒

陳嘉謨蒙筌

經
李別錄
徐李附
仲思棗實
苦棗食性

果之一
五果類一十一種

榔梅綱目

桃本經

栗別錄

天師栗綱

棗本

右附方舊一百一十三新一百零八
果之一

五果類
十一種

李
下品
別錄

【釋名】嘉慶子。時珍曰：「按羅頤爾雅翼云：李乃木之多子者，故字從木子。謂木之多子者多矣。」何獨李稱木子耶？按素問言：李味酸屬肝，東方之果也。則李於五果屬木，故得專稱耳。今人呼乾李爲嘉慶子。按章述兩京記云：東都嘉慶坊有美李人，稱爲嘉慶子。久之稱謂館熟，不復知其所自矣。梵書名李曰居陵迦。

【集解】 子形景曰：「李類甚多，京口有麥李、麥秀時熟，小而肥甜，核不入藥。姑熟有南居李，解核如杏核，仁入藥。」頌曰：「李處處有之，郭璞註爾雅休乃無實李也。一名趙李，座音砂，乃接處李也。一名白花樹，能耐久，其種近百。其子大者如桺，小者如彈，如櫻，其味有甘酸苦澀數種。其色有青綠、黃赤、纏綿、烟脂、青皮、紫灰之殊。其形有牛心馬肝、柰李、杏李、水李離核合核無核，區緣之異。其產武陵房陵諸李，早則麥李、御李，四月熟，遲則晚李、柰李、十月熟，又有季春李、冬花春實也。按王有紫葉，其法夏李色黃，時摘之以鹽擦去核，曬乾，蘆酒作釘，皆佳。」

實 **【氣味】** 苦酸，微溫，無毒。時珍曰：「李味甘酸，其苦澀者不可食。不沉水者有毒，不可食。」大明曰：蜜食損五臟。宗奭曰：「不可合藥水食，發霍亂。」經氣血，然服尤人忌之。

【主治】 曝食去痼熱，調中，除骨節閒勞熱，止肝病，宜食之。**思**

核仁 **【氣味】** 苦平，無毒。

【主治】 僵仆，踒折，瘀血骨痛。**別錄**：令人好顏色。吳普治女人少腹腫滿，利小腸，下水氣，除浮腫。權治面野黑子，蘇子頌。

【附方】 **新舊** 一、女人面野，用李核仁去皮細研，以雞子白和如稀餳塗之，至旦以漿水蠍蟻蟹痛，嚼塗之。良，古今錄驗。

根白皮【修治】時珍曰李根皮取東行者刮去蕊皮矣黃入藥用別錄不言用何等李根亦不言皮則甘苦二種皆可用與。

氣味大寒無毒。一涼無毒

主治消渴止心煩逆奔豚氣別錄治瘡。吳普煎水含漱治齒痛。景煎汁飲主赤白痢。大明灸黃煎湯日再飲之治女人卒赤白下有驗。孟時治小兒暴熱解丹毒。時珍苦李根皮味鹹治脚下氣主熱毒煩躁煮汁服止消渴。權

附方一 小兒丹毒從兩股走及陰頭用李根燒爲末以田中流水和塗之。新千金咽喉卒塞近根皮磨水塗喉外良驗。葛園雜記

花【氣味】苦香無毒。

主治令人面澤去粉滓。時珍

附方一 面黑粉滓用李花梨花櫻桃花白葵花白蓮花紅蓮花旋復花秦椒各六兩。桃花木瓜花丁未瓶收每日盥顛用洗手面。新沉香青木香鍾乳粉各三兩。珍珠玉屑各二兩。蜀葵花一兩。大豆末七合爲細丁。百日光潔如玉也。普濟方

葉【氣味】甘酸平無毒。

主治小兒壯熱痞疾驚癇煎湯浴之良。大明

附方一 惡刺瘡痛點之效。李葉棗葉搗汁干金。

樹膠 **氣味** 苦寒無毒。

主治 目翳定痛消腫時珍

附錄 徐李別錄有名未用曰生太山之陰樹如李而小其實青色無核熟則采食之輕身益氣延年時珍曰此卽無核李也唐崔奉國家有之乃異種也謬言龍耳血墮地所生

杏下品

釋名 甜梅時珍曰杏字篆文象子在木枝之形或云從口

集解 別錄曰杏生晉川山谷五月采之頌曰今處有之有數種黃而圓者名金杏相傳

其扁而青黃者名木杏味酢不及之山杏不堪入藥杏仁今以從東來人家種者爲勝

杏深紫色核大而扁乃接成者其味最勝又有白杏熟時色青白或微黃味甘淡而不酢生杏可曬

作乾果食之山杏輩只可取仁用耳時珍曰諸杏葉皆圓而有尖二月開紅花亦有千葉者不結

實甘而有沙者爲沙杏黃而帶酢者爲梅杏青而帶黃者爲柰杏大如梨黃如橘西京雜記載結

蓬萊杏花五色蓋異種也按王禎農書云北方肉杏甚佳赤大而扁謂之金剛拳凡杏熟時榨濃汁塗盤中曬乾以手摩刮收之可和水調麩食亦五果爲助之義也

實氣味 酸熱有小毒生食多傷筋骨別錄曰頌曰杏性皆熱小兒多食致瘡癰隔熱

杏性皆熱小兒多食致瘡癰隔熱

主治 曝脯食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之邈人曰言聚眉落

核仁 **修治** 別錄曰五月采之宏景曰凡用杏仁以湯浸去皮尖炒黃或用麪裹炒過

凡用杏仁以湯浸去皮尖每斤入白火石一斤烏豆三合以東流水同煮從巳至午取出

中乾用時珍曰治風寒肺病藥亦有連皮尖用者取其發散也

主治 曝脯食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之邈人曰言聚眉落

核仁 **修治** 別錄曰五月采之宏景曰凡用杏仁以湯浸去皮尖炒黃或用麪裹炒過

凡用杏仁以湯浸去皮尖每斤入白火石一斤烏豆三合以東流水同煮從巳至午取出

中乾用時珍曰治風寒肺病藥亦有連皮尖用者取其發散也

氣味甘苦溫冷利。有小毒。兩仁者殺人。可以毒狗。

【震亨曰】杏仁性熱。因寒者可用。【思邈曰】宿者動冷氣。時珍曰。凡杏桃諸花皆五出者六出必雙仁爲其反常。故有毒也。○徐之才曰。得火良惡黃芩黃芪葛根畏襄草。

主治欬逆上氣。雷鳴喉痺下氣。產乳金瘡。寒心奔豚。經驚癇。心下急滿痛。殺狗毒。別錄解錫毒。才治腹痺不通。發汗。主溫病腳氣。欬嗽上氣。喘促。入天門冬煎潤心肺。和酪作湯潤聲氣。飄除肺熱。治上焦風燥。利胸膈氣逆。潤大腸氣祕。元素殺蟲。治諸瘡疥。消腫去頭面諸風氣。散胞時。

發明元素曰。杏仁氣薄味厚潤而沉墜降也。陰也。入手太陰經。其用有三。潤肺也。消食積也。散大便祕。營分氣血。晝則便難行陽氣也。夜則便難行陰氣也。故虛人便閉不可過泄。脈浮者屬氣。用杏仁陳皮脈沉者屬血。用桃仁陳皮。手陽明與手太陰爲表裏。故門主往來。魄門主收閉爲氣之通道。故並用陳皮佐之。好古曰。張仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆。並用杏仁者爲其利氣瀉肺。解肌也。時珍曰。杏仁能散能降。故解肌散風降氣。潤燥消積治傷損藥中用之。治療殺蟲用其毒也。數服愈。又野人閑話云。凡索麵豆粉近杏仁則爛。頃一兵官食粉成積。醫師以積氣丸。杏仁相半研末。土遜在青城山道院中。夢黃姑謂曰。可服杏仁令汝聰明。老而健。壯心力不倦。求其方。則用杏仁一味。每盥漱畢。以七枚納口中。良久脫去皮。細嚼和津液。頓嘔日日。仁細嚼至盡。和津吞下。久則能潤五臟。去塵滓。驅風明目。治肝腎風虛。瞳人帶青。眼翳風癢之病。珍之按。杏仁食方。唐慎微收入本草。云久服至千萬。其說妄誕。可鄙。

附方

舊十五

杏金丹。左慈祕訣云。

亦名草金丹。方出渾皇子。服之長年不死。夏姬服之。壽年七百。

今唐慎微收入本草。云久服至千萬。其說妄誕。可鄙。

新十八

杏金丹。左慈祕訣云。亦名草金丹。方出渾皇子。服之長年不死。夏姬服之。壽年七百。

今唐慎微收入本草。云久服至千萬。其說妄誕。可鄙。

新十八

杏金丹。左慈祕訣云。亦名草金丹。方出渾皇子。服之長年不死。夏姬服之。壽年七百。

今唐慎微收入本草。云久服至千萬。其說妄誕。可鄙。

杏樹地下通陽氣二月除樹下草三月離樹五步作畦壘以通水亢旱則引泉灌漑有霜雪則燒火樹日宿疾皆除瘡盲擊跛瘡癆瘡腫萬病皆愈久服通靈不死云云衍文不錄○一頌曰古方用杏仁脩治如法自朝蒸至午便以慢火微炒至七日乃收之每旦空腹噉之久久不止駐顏延年云是夏姬之法然杏仁能使人血溢少誤必出血不已或至委頓故近人少有服者或云服至二三年往往或瀉或滯或臍中出杏酥法白蜜一斗五升攪勻封於新甕中勿洩氣三十日看酒上酥出卽掠取納盞器中貯之取其酒津圍如梨大置空屋中作格安之候成餡脯狀旦服一枚以前酒又法宗奭曰治下○一藏器曰一杏酪服之潤五臟去痰嗽生熟喫俱可若半生半熟服之殺人又法肺燥喘熱大腸入祕潤五臟用杏仁去皮研細每一升入水一升半搗稠汁入生薑四兩甘草萬病丸治男婦五勞七傷一莖銀石器中慢火熬成稀膏入酥二兩同收每夜沸湯點服一匙一莖禹錫傳信方欬嗽寒熱加重斗二升童子小便煮七次以蜜四兩拌勻再以童便五補肺丸治咳嗽用杏仁二大升山中者不用去升於碗內重蒸取出日曬夜露數日任意嚼食卽愈日秋冬二七日連皮尖於砂盆中研濾取汁煮令魚眼沸候軟如麵糊卽成以粗布攤一丸卽丸服之食前後總須服三五十丸茶酒任下忌自水溺禹錫傳信方欬嗽寒熱加重少喜多嗔面色不潤忽進忽退積漸少食脈弦緊者杏仁半兩去皮尖童子小便浸七日漉出水淘洗砂盆內研如泥以小便三升煎如膏每服一錢熟水下婦入室女服之尤妙千金方久患噪之可丸卽丸服之食前後總須服三五十丸茶酒任下忌自水溺禹錫傳信方欬嗽寒熱加重肺氣喘急至欬甚者不過二劑永瘥杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月三四換滿半月取肺氣出焰乾研細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞子大水一鍾煎七分食後溫服忌腥物勝金方欬嗽寒熱加重效逆上氣膏入蜜一升杵熟每食前含之嚥汁干金方頭面風腫頭面風腫上厚裹之乾則反塗不遇七妙水研末水九升研濾汁煎如麻腐狀取和羹粥食七頭面湯下微利爲度喘促浮腫和米煮粥空心喫二合妙聖濟總錄頭面風腫頭面風腫上厚裹之乾則反塗不遇七妙水研末水九升研濾汁煎如麻腐狀取和羹粥食七頭面千金方頭面風腫頭面風腫上厚裹之乾則反塗不遇七帛車轄至釜底以紙塞孔勿令泄氣初着棊火一日三動車轄以袞其汁五日有露液生十日白霜起又去滓以新鐵釜用酥三斤以棊火及炭然釜少磨酥至盡乃內汁入釜釜上安盆盆上鑽孔用弦懸下以救花苞至五時杏熟自落收仁六斗以湯浸去皮及雙仁者用南流水三石和研取汁兩石八斗車轄至釜底以紙塞孔勿令泄氣初着棊火一日三動車轄以袞其汁五日有露液生十日白霜起又

諸風眼瞼鼻塞眼出冷淚用杏仁三升研細水四五沸洗頭待冷汗盡三度愈。千金偏風不遂失音不語生吞杏仁七枚不去皮尖逐日度外。臺祕要破傷風腫杏仁杵膏厚塗上然。醉二升煎取一升服心腹結氣服三十丸白湯下無忌。孟詵食療○喉痺痰嗽杏仁去皮熬黃三分之取汗瘡類要。陳藏器本草喉熱生瘡方同。丹溪方卒失音聲方同上文。丹溪方卒不小便杏仁二七枚去皮尖炒黃研保壽五痔下血杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾汁。方同米煮粥食之。食醫心鏡穀道癰痛頻傳之。時時傳產門蟲疽痛癢不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛身面疣目日日塗之。千金方面上疔胞。

臥以綿裹之着鹽如小豆許以器盛於飯上蒸熟令病人側中良久又以一裹滴之取效。外臺耳出膿汁日三四易之妙梅師方。中赤脈癰痛時見黑花用初生杏子仁一升古五銖錢七文入瓶埋門限下一百日化爲水每夕點之聖濟總錄胎亦眼疾一錢入石器中以柳枝一透握緊束研至色黑以熱艾一團安碗內燒烘之令氣入兩臂甚妙聖濟總錄人用杏仁去皮二錢半。研匀點錢同上。傷目生弩肉膩粉半錢研勻綿裹筋頭點之同上。目生弩肉或癰或痛漸覆瞳人用杏仁去皮細嚼杏油去皮透油每裹吐仁

於掌中乘熱以綿裹筋頭點燙肉上不過四五度愈。○總錄用杏仁研膏人乳化開日點三次。小兒血眼人輕則外胞赤腫上下弦爛用杏仁二枚去皮尖嚼乳汁三五匙入膩粉少許蒸熟絹包點重者加黃連朴消最良全幼心鑑。子母祕錄。杏仁去皮研入肉內調貼其鍼自出。瑞竹堂方箭鏞在咽或刀刃在咽隔諸隱處。肘後方。狐尿瘡痛及熱浸之冷即易必效。狗咬傷瘡爛嚼杏仁塗。小兒咽腫杏仁炒黑研方食狗不消心下堅脹口乾發熱妄語。杏仁一升去皮尖水三解狼犬毒。杏搗爛水和眼一切食停氣滿膨脹用紅杏仁三百粒巴豆二十粒同炒色變白癩風斑。杏仁連皮尖每之千金方。去豆不用研杏爲末橘皮湯調下。楊氏家藏方。令赤色夜臥再諸瘡腫痛。杏仁去皮研濕取膏入粧粉麻油。鮑氏小兒頭瘡。杏仁燒研傳之。蛆蟲入耳搗泥死扶壽精方。取油滴入非出則

花[氣味]苦溫無毒。

【主治】補不足女子傷中寒熱癰厥逆。別錄。

【附方】新婦人無子。二月丁亥日取杏花桃花陰乾爲末。戊子日粉淬面。七日洗面三七遍極妙。在內煩悶者用東引杏樹枝三兩細剉微和井華水服方寸匕日三服衛生易簡方。煎水一升。熬好酒十餘沸分二服塞上方。

總錄聖濟

葉【主治】人卒腫滿身面洪大煮濃汁熱漬亦少少服之後。

枝【主治】墮傷取一握水一升煮減半入酒三合和匀分服。大效。蘇頌

【附方】一、墮撲瘀血。在內煩悶者用東引杏樹枝三兩細剉微熬好酒一升煎十餘沸分二服塞上方。

根【主治】食杏仁多致迷亂將死切碎煎湯服卽解珍時

巴旦杏

【釋名】八擔杏。要正忽鹿麻。

【集解】小而肉薄其核如梅核殼薄而仁甘美點茶食之味如榛子西人以充方物尖

【氣味】甘平溫無毒。

【主治】止欬下氣消心腹逆悶飲膳正要出

梅

本品經中

本經

【釋名】時珍曰一梅古文作果象子在木上之形梅乃杏類故反杏爲果書云若作和羹爾惟驪梅而梅字亦從果也陸佃埤雅以梅爲梅皆誤矣梢卽梢木荆爲人呼爲梅見陸機草木疏

言

梅入

北方

變爲

杏

郭璞註爾雅以

梅爲

梅

皆

誤矣梢

卽梢木

荆爲

梅

見

陸機

草木疏

矣

從

【集解】別錄曰一按陸機詩疏云梅杏類也樹葉皆略似杏葉有長尖先衆木而花其實酢曝乾爲腊入時

香

子

小而硬

消梅實圓

鬆胞

多波

無澤

惟可生斂

不入煎

造成大梅

譜云江

梅野

生者不經栽接

花枝

跗皆綠

重葉

梅花葉

重疊結實

多雙紅

梅色如杏

杏梅色淡紅

實扁而斑

味全似杏

鴛鴦

梅即多葉紅梅也

一帶雙實

一云苦

以棟接

杏而本強者

其實甘

梅實采半黃者

以烟接

杏而本強者

其實甘

梅實采半黃者

以烟接

管之爲烏梅青者鹽淹曝乾爲白梅亦可蜜煎糖藏以充果飴然者汁曬收爲梅醬推烏梅白梅可入藥梅醬夏月可調渴水飲之○物類相感志云梅子同詔粉食則不酸不軟食牙

實【氣味】酸平無毒。大明曰一多食損齒齶者嚼胡桃肉解之○物類相感志云梅子同詔粉食則不酸不軟食

牙

【發明】〔宗奭曰〕食梅則津液泄者水生木也。津液泄則傷腎。腎屬水外爲齒故也。〔時珍曰〕梅開於冬而實熟於夏得木之全氣故其味最酸所謂曲直作酸也。肝爲乙木膽爲甲木人之舌下有四竅兩竅通膽液故食梅則津生者類相感應也。故素問云氣以津又云酸走筋筋病無多食酸不然物之味酸者多矣何獨梅能生津耶。

【烏梅】修治〔宏景曰〕用須去核微炒之。〔時珍曰〕造法取青梅籃盛於突上熏黑若以稻灰淋汁潤溼蒸過則肥澤不蠹。

【氣味】酸溫平澀無毒。〔果曰〕寒。忌豬肉。

【主治】下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣蝕惡肉。本經去癆利筋脈止下痢好睡。口乾錄水瀆汁飲治傷寒煩熱。〔景〕止渴調中去痰瘡瘍止吐逆霍亂除冷熱痢器治虛勞骨蒸消酒毒令人得睡和建茶乾丸爲薑服止休息痢大驗。〔大明〕斂肺澀腸止久嗽瀉痢反胃噎膈蛻厥吐利消腫涌痰殺蟲解魚蟲馬汗毒硫黃毒時珍。

白梅〔釋名〕鹽梅霜梅。

【修治】取大青梅以鹽汁漬之日曬夜漬十日成矣久乃上霜。

【氣味】酸鹹平無毒。

【主治】和藥點痣蝕惡肉。〔景〕刺在肉中者嚼傅之卽止。〔孟珙〕治刀箭傷止血研爛傅之。〔大明〕乳癰腫毒杵爛貼之。〔汪輝〕除痰。〔蘇頌〕治中風驚癇喉瘡瘍厥僵仆牙關緊閉者取梅肉揩擦牙齦涎出卽開又治瀉痢煩渴霍亂吐下血崩功同烏梅。〔時珍〕

【發明】「宏景曰」生梅烏梅白梅功應相似。一好古曰「烏梅脾肺二經血分藥也。能收肺氣治燥。厥蹠應之用鹽水梅肉一枚研爛合臘茶入醋服之一啜而安。大丞梁莊肅公亦病血百餘日。醫不能愈。卻有物理之妙。說出本經。其法載於劉涓子鬼遺方。用烏梅肉燒存性研。傳惡肉上一夜立盡。聖惠大月餘不消。醫作餅貼者。其力緩。按楊起簡便方云。起臂生一疽。瘻潰百日方愈。中有惡肉突起。如蠶豆。得此方試之一。日夜去其大半。再上一日而平。乃知世有奇方。如此豆始途留心搜刻諸方也。

【附方】舊新二十三諸瘡弩肉。上方見瘡疽瘡腫。已潰未潰皆可用鹽白梅燒存性爲末。入喉痹乳蛾。用青梅丸。二十枚鹽十二兩淹五日。取梅汁入明礬三兩桔梗白芷防風各二兩。豬牙臙角三十條。俱爲細末拌汁和梅入瓶收之。每用一枚噙津液。凡中風痰厥牙關不開。用此擦之尤佳。○總錄用白梅包生蠶或末作丸含嚥。消渴煩悶。去滓入豉二百粒。炒爲末。每服二錢。水二盞。煎一盞。泄痢口渴。烏梅煎湯日飲。要濟衆方。產後痢渴。烏梅肉二十個麥門冬十二分。每升煮七合。細呷之。必效方。赤痢腹痛。直指用陳白梅同真茱萸水各半煎飲之。冰糖珍杵梧桐子大。每服二三十丸。茶湯下。日三服。大便下血。及酒痢久痢不止。用烏梅三兩燒存性研。梧桐子大。每空心米飲服二服。○子聖大丸。每米飲服三服。便痢膿血。烏梅一兩去核燒過爲末。每服久痢不止。聖濟總錄。久痢水一盞。煎六分。食前分二服。○子聖濟丸。生日三服。小便尿血。梧子大。每服四十丸。酒下。血崩不止。研末米飲服之。日二服。大便不通。烏梅十個。湯浸少去核。梧桐子大。納入下部。霍亂吐利。鹽梅煎湯細細飲之。如宜方。細蛇蟲上行。井含之。卽安。大升。食療本草。食鹽本草。水四升。煮三升納。梅核膈氣。取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹。一日夜漚乾。又浸又曬。至水盡乃止。用青錢三個夾二梅核線縛定。通裝磁罐內封。

埋地下百日取出。每用一枚含之。嚥汁入喉即消。收一心腹脹痛。短氣欲絕者。烏梅二七枚。水五升。煮分爲末。每服二錢。蜜湯調下。勞瘧劣弱。烏梅十四枚。豆豉二合。桃柳枝各一虎口。甘草三寸。生薑久炒不已。烏梅肉微炒。粟米去筋膜。蜜炒等分。爲末。每服二錢。疔厥頭痛。如破者。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三撮。酒止。肘後方。傷寒頭痛。壯熱胸中煩痛。四五日不睡。時蜜湯調下。痰厥頭痛升。煮一升。頓服取吐即愈。肘後方。傷寒頭痛。解烏梅十四枚。鹽五合。水一升。煎半升。頓服取吐。即止。圖經本草。久歎不已。烏梅燒存性。傳之馬汗入瘡。作痛用烏梅連核搗爛。以頭醋和傅。仍吐後避風良。梅師方。折傷金瘡。一宿瘥。千金方。馬汗入瘡。先刺瘡出去紫血。乃傅之。縛定。猶大傷毒。烏梅末。酒服。一千金。指頭腫毒。痛甚者。烏梅肉和魚鮓搗封之。妙。李樓奇方。傷寒癰瘡。生下部者。烏梅肉三兩。炒梧子大。以石榴根皮煎末。常時含之。硫黃毒發。梅肉焙一兩。沙糖半兩。炒漠漠。烏丸。食前下三十小兒頭瘡。烏梅燒末。生油香口去臭。常時含之。硫黃毒發。梅肉焙一兩。沙糖半兩。炒漠漠。烏湯。聖惠方。燒末。生油香口去臭。常時含之。硫黃毒發。梅肉焙一兩。沙糖半兩。炒漠漠。烏丸。一大盞。煎七分。呷之。總錄。

核仁氣味】酸平無毒。

【主治】明目益氣。不飢。吳普除煩熱。孟诜治代指忽然痛腫。搗爛和醋浸之。時珍方。

花氣味】微酸。澆無毒。

【發明】時珍曰。白梅花古方未見用者。近時有梅花湯。用半開花。溶蠟封花口。投蜜罐中。過時。以又梅花粥法。用落英入熟米粥再煮食之。故楊誠齋有蜜點梅花帶露餐。及脫蕊收將熬粥喫之句。皆取其助雅致清神思而已。

葉氣味】酸平無毒。

【主治】休息痢及霍亂。煮濃汁飲之。大明。藏器曰。嵩陽子言。清水採梅葉洗。葛衣經夏不胞有驗。時珍曰。夏衣生蠍點。梅葉煎湯洗之。卽去甚妙。

【附方】舊二中水毒病。初起頭痛惡寒心煩拘急。旦醒暮下部蟲蠶器中隔布坐蒸之。蟲盡死也。內小臺祕月水不止。梅葉搗汁三升飲之良。肘後下部蟲蠶器中隔布坐蒸之。蟲盡死也。外小要。

月水不止。梅葉搗汁三升飲之良。肘後下部蟲蠶器中隔布坐蒸之。蟲盡死也。外小要。

根【主治】風癆。別錄○土者殺人。初生小兒取根同桃李根煮湯浴之。無瘡熱之患。崔氏要煎湯飲治霍亂止。休息痢大明。

糊梅綱目

【集解】如其言。今樹尚在五龍宮北。樹木梅實杏形桃核。道士每歲采而蜜漬以充貢獻焉。糊乃榆樹

實氣味】甘酸平無毒。

【主治】生津止渴清神下氣消酒時。

桃本經

【校正】木部有拾遺桃

【校正】木部有拾遺桃

【釋名】木時珍曰。桃性早花易植而子繁故字從兆。十億曰。非言其多也。或云從兆。諧聲也。從入藥當用本生者爲佳。今市肆賣者多雜接核之仁。爲始華者花多子少。不堪噏。惟堪取仁。入藥汗中有油液。則多延數年。其子於衆桃光如塗油。不益脾胃。太原有金桃。種且早結實。五年宜以刀剗其皮。出其脂液。則性桃狀如香餅。其花有紅紫白千葉。二色之殊。其實甚多。易於栽培。色桃

形辨桃碧桃紅桃白桃烏桃金桃銀桃胭脂桃皆以色列名者也有五月早桃十月冬桃春秋桃霜桃皆以時名者也並可供食惟山中毛桃卽爾雅所謂橩桃人桃卽崑崙桃形如苦棗表裏微赤得霜始熟方桃形微方盧桃出南番形匾內潤核狀如盒其仁甘美番人珍之名波淡樹樹甚高大偏核桃出波斯形薄而尖頭偏狀如半月其仁酷似新羅桃子可食性熱又楊維禎宋濂集中並載元朝御庫蟠桃核大如盤以爲神異按王子年拾遺記載漢明帝時常山獻巨核桃霜下始花隆暑方熟玄中計載積石之桃大如斗斛器西陽雜俎載九疑有桃核半扇可容米升及蜀後主有桃核杯半扇容水五升良久如酒味可飲此皆桃之極大者昔人謂桃爲仙果可食種樹書云柿接桃則爲金桃李接桃則爲李桃納甕中蓋口七日瀝去皮核皆封物性之微妙也。

實氣味】辛酸甘熱微毒多食令人有熱○訖曰「能發丹石毒生者尤損人」思邈曰「黃帝書云令人膨脹及生癰癧有損無益五果列桃爲下以此○瑞曰「桃與鼈同食患心痛服尤人忌食之殆此類歟生桃切片渝過可食種樹書云柿接桃則爲金桃李接桃則爲李桃納甕中蓋口七日瀝去皮核皆封物性之微妙也。」

【主治】作脯食益顏色大肺之果肺病宜食之。思邈曰「能發丹石毒生者尤損人」時珍曰「能發丹石毒生者尤損人」思邈曰「黃帝書云大

核仁【修治】別錄曰「七月采取仁際乾」數曰「凡使須去皮用白朮烏豆二味同於坩鍋中煮

湯浸去皮尖炒黃用或麥麸同炒或燒存性各隨本方雙仁者有毒不可食說見杏仁下。

【氣味】苦甘平無毒景曰「桃仁作酪性冷○香附爲之使」

【主治】療血血閉癥瘕邪氣殺小蟲本經止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止心腹痛別治血結血祕血燥通潤大便破蓄血元素殺三蟲又每夜嚼一枚和蜜塗手面良孟主血滯風痹骨蒸肝瘡

寒熱鬼疰疼痛產後血病珍時

【發明】果曰一桃仁苦重於甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰經血分藥也苦以泄滯血甘三也行皮膚凝滯之血四也一成無已曰一肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急食甘以緩之桃仁者又有當汗失汗熱毒深入吐血及血結胸煩躁語者亦以此湯主之與虻蟲水蛭大黃同用

【附方】舊十九年延年去風同研絞汁令盡溫洗面極妙千金翼偏風不遂及癥疾用桃仁二千枚去皮尖雙仁以好七酒一斗三升浸二十一日取出鹽乾杵細作丸如梧子大每服二十丸以原酒吞之外臺祕要風勞毒腫尖熬令黑烟出熱研如脂膏以酒三升和服燒臥取汗不過度瘧疾寒熱桃仁一百枚去皮尖乳鉢內研成膏不得犯生水入黃丹三錢丸梧子大每服三丸當發日面北溫酒吞下五月五日午時合之忌雞犬婦人微草骨蒸作熱量飲酒至醉仍須任意喫水隔日一劑百日不得食肉外臺祕要上氣喘息見唐慎方見杏仁上氣欬嗽胸滿氣喘桃仁三兩去皮尖以水一大升研汁和粳米二合煮粥食之心鏡大卒得欬嗽日乾絹袋盛浸二斗酒中七日密封蒸杏仁見上氣欬嗽升研汁和粳米二合煮粥食之心鏡大卒得欬嗽日乾絹袋盛浸二斗酒中七日密封蒸杏仁乃五尸疰鬼疰乃五尸之一又挾鬼邪爲祟其病變動有三十六種至九十九種大略使人急以桃仁五十枚研泥水煮取四升服之取下部生蟲食崩中漏下不死者桃仁七枚下部蟲蠶病痛服之合爛研之人好癲寐桃仁熬去皮尖研人難產字一日不出桃仁一個劈開一片書出字香之卽生人也桃仁十五枚苦酒二升鹽水煎人難產數字一日不出桃仁一千二百枚去皮尖仁產後百病千金桃仁煎治婦人產後搗極細諸氣清酒桃仁一千金一斗

半研如麥粥納小瓶中麪封入湯中煮一伏時每服一匙溫酒和服日再圓經本草。產後身熱如火皮如粟粒者桃仁研泥同臘。產後血閉桃二十枚去皮尖蘸一塊水煎服之良。唐瑤經驗方。水產後陰腫研傳之婦人陰癢塞之。肘後方。男子陰腫未酒服方寸匕日仍搗傅之。外臺小兒卵癩方同。小兒爛瘡初起腫漿似火滌桃仁研爛傳之。祕錄。小兒聰耳。桃仁炒研裹日塞之。千金方。風蟲牙痛。桃仁炒香為燈上燒烟出吹滅安痛齒上咬之。唇乾裂痛脂傳海上大便不快。裏急後重用桃仁三兩去皮吳茱萸二兩食鹽一兩同炒熟去鹽茱萸七粒總錄急勞欬嗽煩熱用桃仁三兩去皮尖。每嚼桃仁五粒。木臼內搗爛入蒸餅和丸梧子大每溫水下三十丸。聖惠方。冷勞減食。漸至乘用桃仁五百顆。吳茱萸三兩同入鐵鑄中微火炒一炊久將桃仁去皮微黃色卽漸加火待微烟出黑瘦至粒愈。收入新瓶內厚紙封住勿令洩氣每日空心取桃仁二十粒去皮嚼之以溫酒下至重者服五百粒。惠方。預辟瘡瘍。茱鹽將桃仁去皮尖每嚼一二十枚山居尤宜之。全居士選奇方。

桃毛。毛桃實上毛也。刮取用之。

【氣味】辛平微毒。

【主治】破血閉下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾。錄崩中破瘀氣明大治惡鬼邪氣。洗

桃梔。釋名。桃奴。別錄。梔景上神桃珍曰。此是桃實着樹經冬不落者正月采之中實者良。當時寶方謂之神桃言其辟惡也。千葉桃花結子在樹不落者名鬼髑髏。雷駁炮炙論有脩治之法而方書未見用者。一歌曰。一鬼髑髏十一月采得以酒拌蒸之從已至未焙乾以銅刀切焙取肉用。

【氣味】草微溫有小毒。

【主治】殺百鬼精物。本經殺精魅五毒不祥。療中惡腹痛。中惡毒氣蠱注。有桃梔湯治肺氣腰痛破血療

心痛酒磨燒服之。明主吐血諸藥不效燒存性研末米湯調服有驗。汪穎治小兒虛汗婦人妊娠下血破伏梁結氣止邪瘡燒烟薰痔瘡燒黑油調傅小兒頭上肥瘡軟瘍時。

【附方】

舊三

伏梁結氣在心下不散桃奴三兩爲末

滴水丸梧

華水下良空心溫酒每服二錢聖惠鬼瘡寒熱樹上自乾桃子二七枚爲末滴水丸梧

聖濟總錄

五種瘡疾家寶通神丸用神桃卽桃奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻以冷水和丸梧

不可言王隱

妊娠下血不止用桃

鼻燒存性研

君養生主論葛洪方

盜汗不止樹上乾桃子一個霜梅二個慈根七個燈

二鍾煎服

盜汗不止心二莖陳皮一錢稻根大麥芽各一撮水

經驗方

白禿頭瘡乾桃一兩黑豆一合爲

研入膩

聖惠小兒頭瘡樹上乾桃燒研入膩

陸光祿說有人食桃不消化作病時於林間得槁桃燒

眼登時吐出卽愈此以類相攻也張仲景備急方

花修治別錄曰三月采陰乾之數曰桃花勿用千葉

花令人鼻衄不止目黃收花揀淨以絹袋盛懸簷下令乾用

【氣味】苦平無毒

【主治】殺疰惡鬼令人好顏色本經悅澤人面除水氣破石淋利大小便下三蟲別錄消腫滿下惡氣恭治心腹痛及禿瘡孟利宿水痰飲積滯治風狂研末傅頭上肥瘡手足癰瘡時。

【發明】

宏景曰一肘後方言

服三樹桃花盡則面色紅潤悅澤如桃花也

頌曰太清草木方

桃花面云令面妍華光悅蓋得本草令人好顏色悅澤人面之義而陶蘇二氏乃引服桃花法則因本草兒言

之言而謬用者也桃花性走泄下降利大腸甚快用以治氣實人病水飲腫滿積滯大小便閉塞者則本草兒言有功無害若久服卽耗人陰血損元氣豈能悅澤顏色耶按張從正儒門事載一婦滑泄數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時以棘鹹刺取數十萼勿犯人手以麪和作餅煨熱食之米飲送下

不一二時瀉下如傾六七日行至數百行昏困惟飲涼水而平觀此則桃花之峻利可徵矣又蘇鶴杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷櫺登桃樹上食桃花幾盡及旦家人接下自是遂愈也。

【附方】十三治大便艱難寸匕卽通千金產後閉塞未每空心葱白湯服二錢卽利集驗方分爲心發狂用承氣湯畜血發狂夾敗血遂致發狂偶得桃花利瘀飲散滯血之功與張仲景治積熱。

腹積痛服二錢七良孟诜食療本草瘧疾不已寸匕良梅師方痰飲宿水爲未溫酒服一合取桃花散收桃花陰乾。

利覺虛食少弱不似轉下腳氣腫痛呻之一宿卽消外臺祕要細腰脊作痛一升井華水二斗麴六斗。

升米六斗炊熟如常釀酒每膳瘦不止桃花爲未豬脂和頭上禿瘡堪赤者等分作末以豬脂和先取桑灰汁洗去痂即頭上肥瘡一百五日寒食節收桃花爲未食後以水半盞水面瘡上方同足上瘡瘡食鹽花。

塗之食療頭上肥瘡蓋調服方寸匕日三甚良崔元亮海上方黃水面瘡上方同足上瘡瘡食鹽花。

等分杵勻醋和雀卵面炮分蜜調傅之○聖惠乾糞塞腸餛飩煮熟空心食之日午腹鳴如雷當下惡冷。

傳物也面上粉刺癩子如米粒用桃花丹砂各三兩爲末小便當出黑汁面色瑩白也聖惠方令面光華收桃花七日後。

聖惠方面上粉刺日三服粒知二日小便當出黑汁面色瑩白也聖惠方令面光華收桃花七日後。

脫月七日收雞血和塗面上三日後。

下則光華顏色也聖濟總錄二日後。

葉名桃心入藥尤勝。

【氣味】苦平無毒。

【主治】除尸蟲出瘡中小蟲別治惡氣小兒寒熱客忤大明療傷寒時氣風痺無汗治頭風通大小便止霍亂腹痛時。

【發明】七斗安床。簾下厚被蓋臥。床上乘熱薰之。少時當雨汗。汗邇去湯速粉之。并灸大椎穴。則愈。又取陳廩丘小品方。有阮河南桃葉蒸法。云連發汗。汗不出者死。可蒸之。如中風法燒地令熱去火。以少水灑之。布乾桃葉於上。厚二三寸。安席葉上。臥之溫覆得大汗。被中傅粉極燥。便瘥也。凡柏葉麥麸蛋沙。

皆可如此。法用張苗言。曾有人疲極汗出。臥簾受冷。但苦寒倦。四日凡八發汗。汗不出。用此法而瘥。及召徐文伯診之。是時武帝有九錫之命。期在旦夕。雲恐不預求速愈。文伯乃以火煅地布桃柏葉於上。令靈臥之。少頃汗出粉之。翌能汗出。謂曰。此甚易。政恐二年後不能汗出。夫桃葉發汗妙法也。猶有此戒。可不慎與。

【附方】舊十一。風襲項強。不得顧視。穿地作坑。燶赤以水灑之。令冷鋪生桃葉於內。臥席上。以項着坑上。蒸至汗出良久即瘥。千金方。小兒傷寒時氣。用桃葉煮十沸。取汗日五六遍。淋之後燒。傷寒類要。二便不通。用桃葉杵汗半升。服冬孫真人方。霍亂腹痛。桃葉三升切水五升煮。外臺祕要。腸痔出血。桃葉一斛杵。納小口器中坐。女人陰瘡。如蟲咬癢痛者。生搗桃葉綿。足上癰瘍。桃葉搗和苦酒。傅之。肘後方。鼻內生瘡。無桃葉嫩心杵。簡便方。身面癰瘍。汁擦之。千金諸蟲入耳。桃葉取援熟。

【氣味】苦平無毒。

【主治】除邪鬼中惡。腹痛去胃中熱。別錄。治疰忤心腹痛。解蠱毒。辟疫癘。療黃疸。身目如金。殺諸瘡蟲。時方。舊十四。天行疫癘。常以東行桃枝煎熬。黃疸如金。晴明時清晨勿令雞犬婦人見。取東引桃根。細如筋。若斂股者。一握切細。以水一大升煎。枕一夕。自出。梅師方。

一小升空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散開百日方平復也黃散後可時時飲清酒一盃則眼中易散否則散遲忌食熱麪豬魚等物此是徐之才家秘方也初虞世必效方肺熱喘急水集驗治肺熱悶喘急客熱往來欲死不堪服藥者用桃皮芫花各二升以升煮取一升以故布納汁中取薄胸口溫四肢益數刻即止虛健忘令耳目聰明用戊子日取東引桃枝三寸枕之○又方五月五日日干金翼卒得心痛切以酒一升煎經喉痺塞痛服桃皮煮汁三升心半升頓服大鬼疰心痛東引桃枝刻作三寸木入着衣帶領中佩之千金翼半升頓服大鬼疰心痛二升煎半升頻服崔氏解中蠱毒用東引桃白皮烘乾大戟斑蝥去足翅效肘後方鬼疰心痛二升煎半升頻服崔氏即出不出更服或因酒得以酒服因食得以飲眼初虞世云此乃李餽州法也亦可以米泔丸服蘇頌圖經卒得惡瘡屑納之孫眞人方卒患瘰癧不痛桃樹白皮貼瘡上灸二熱病口瘡部有瘡納入之下部疊瘡膿少許以綿蘸藥納入下部瘡類要七壯良孫眞人方孫眞人方取桃皮作梅師五痔作痛桃根水煎汁浸上小兒濕癬頻傳之子母祕錄狂狗咬傷煎桃白皮煮取濃汁如稀鴟入熊短桃皮三斤去內外皮穢米一斗女麪一升以水二斗煮桃皮取汁一斗以一半漬麪一牛漬穢飯人經閉數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿脹或腫桃根煎主之用桃樹根牛蒡根調馬鞭草根牛膝蓬蘽各一片剉以水三斗煎一斗去滓更以慢火煎如湯狀收之每以熱酒服一匙聖惠牙疼頰腫桃白皮柳白皮等分煎小兒白疕桃皮五兩煎汁入白桃膠修治收以桑灰湯浸過曝乾用如服食當依本方脩鍊時珍曰桃黃盛時以刀割樹皮久則膠溢出采

【氣味】苦平無毒

【主治】鍊服保中不飢忍風寒別下石淋破血治中惡疰忤蘇主惡鬼邪氣孟和血益氣治下痢止痛。

時珍

【發明】中頌曰「本草言桃膠練服保中不飢。按仙方服膠法取膠二十斤絹袋盛於櫟木灰汁一石。服身輕不老。」時珍曰「按抱朴子云桃膠以桑灰汁漬過服之除百病數月斷穀久則晦有夜光如月。又列仙傳云高丘公服桃膠得仙古方以桃膠爲仙藥而後人不復用之豈其功亦未必如是之殊耶。」

【附方】舊二新三虛熱作渴含之佳外臺石淋作痛和服日三服當下石盡即止。古方錄驗血淋作痛煎桃膠炒木通石膏各一錢水一盞。產後下痢赤白裏急後重腹痛用桃膠焙乾沉香蒲黃各等分爲末每服二錢食前米飲下。婦人良方痘癰發搐黑陷者用桃膠煎湯飲之或水熬總微論。

桃符主治中惡精魅邪氣水煮汁服之。孟

【發明】時珍曰「典術云桃乃西方之木五木之精仙木也味辛氣惡故能厭伏邪氣制百鬼今人衆鬼之義許慎云羿死於桃棓棓杖也故鬼畏桃而今人用桃梗作杖擲以辟鬼也。」東海蟠桃樹下主領祝以桃荔前引以辟不祥荔者桃枝作帶也博物志云桃根爲印可以召鬼異傳云王弔則巫爾據此諸說則本草桃之枝葉根核桃梟桃擲皆辟鬼崇疰忤蓋有由來矣。錢乙傳云鬼但畏東南枝巫兒方疏取稱熱及結胸用巴豆硝汞之藥以桃符煎湯下亦是厭之之義也。」

桃擲拾遺○時珍曰「擲音擗卽杖也。」

桃擲人多釘於地上以鎮家宅三載者良。○

【主治】卒心腹痛鬼疰破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功。藏器

【附方】新一風蟲牙痛門下桃擲燒取汁少少納孔中以蠟固之聖惠方

桃寄生見木部

桃蠻蟲移入蟲部

栗別錄

【釋名】象花實下垂之狀也。梵書名萬迦時珍曰：「栗說文作櫟，從肉音條。」
【集解】而甜乃佳。別錄曰：「栗生山陰九月采。」
色長條似胡桃花實有房，大者若拳中子三五小者若桃李中子惟一二將熟則掉拆子出。諸島上栗大如雞子味短不美。桂陽有栗叢生實大如杏仁皮子形色與栗無異。但小耳又有皆與栗同子圓而細惟江湖有之或云卽桑也。桑音櫟詩云樹之桑栗是矣。恭曰：「板栗雖極類櫟，四月開花青黃薄多按陸機詩疏云栗五方皆有之周秦吳揚特饒惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者不及也。倭韓國亦皆大茅栗似板栗而細如橡子其樹雖小葉亦不殊。但春生夏花秋實冬枯爲異耳。」宗奭曰：「一時珍曰：『栗但可種成不可移栽。』按事類合璧云：栗木高二三丈。苞生多刺如蠍毛每枝不熱其下如湖二奧樹栗種大如筋頭長四五寸可以點燈栗之大者爲莘栗小者爲板栗。」
種旋栗頂圓末尖卽櫟栗象櫟子形也。栗欲乾收莫如曝之欲生收莫如潤沙藏之至夏初尙五個苞有青黃赤三色中子或單或雙或三或四其殼生黃熟紫殼內有膜裹仁九月霜降乃熟。其下如湖二奧樹栗自裂而子墜者乃可久藏。苞未裂者易腐也。其花作條大如筋頭長四五寸可以點燈栗之大者爲莘栗小者爲板栗。中心扁子爲栗楔稍小者爲山栗。山栗之圓而末尖者爲錐栗圓小如橡子者爲莘栗。小者爲板栗。頂者爲板栗。山中有石栗卽爾雅所謂柵栗也。一名柵栗可炒食之。劉恂嶺表錄云廣中無栗惟新州爲茅栗。一年方熟圓如彈子皮厚而味如胡桃得非栗乃水果不宜於炎方耶。
【氣味】鹹溫無毒。洗曰：「吳栗雖大味短不如北栗。凡栗日中曝乾食卽下氣補益不爾猶有水氣不補益也。火燒去汗亦殺水氣。生食則發氣。煮蒸炒熟食則壅氣。凡患風水人不宜食。味鹹生水也。」恭曰：「栗作粉食勝於菱芡。但以飼孩兒令齒生。」宗奭曰：「小兒不可多食。生則難化。熟則滯氣。膾食生蟲往往致病。」
【主治】益氣厚腸胃。補腎氣令人耐飢。別錄：生食治腰腳不遂。療筋骨斷碎。腫痛癰瘍。血生嚼塗之有效。

栗楔音屑○時珍曰一
三顆其中扁者栗楔也

【主治】筋骨風痛。士良活血尤效。合活血丹用之。

瘻癰腫毒痛。大明

【發明】思邈曰栗是補腎之果也。腎病宜食之。宏景曰相傳有人患腰脚弱。往栗樹下食數升便其氣也。時珍曰栗於五果屬水。水潦之年則栗不熟。類相應也。有入內寒暴洩如注。令食煨栗二三十枚。頓愈。腎主大便。栗能通腎。於此可驗。經驗方治腎虛腰腳無力。以袋盛生栗懸乾。每旦喫十餘顆。次喫猪腎粥助之。久必強健。蓋風乾之栗勝於日曝而火煨油炒。勝於煮蒸。仍須細嚼。連液吞嚥。則有益。若頓食至飽。反致傷脾矣。按蘇子由詩云。老去自添腰脚病。山翁服栗舊傳方。客來爲說晨興晚發。五苑棗白玉榮。此得食栗之訣也。王禎農書云。史記載秦饑應侯請栗厚腸胃。補腎氣令人耐飢之說。殆非虛語矣。

【附方】舊新三、小兒疳瘡。生嘴粟子。傳董刺入肉上。同馬汗入肉上成瘡者。方同馬咬成瘡。獨顆栗子燒研熊虎爪傷。方同小兒口瘡。大栗煮熟。日日與衄。血不止。宣州大栗七枚。刺破連皮燒存性。出火毒入麝。金刃斧傷。卒嚼傳亦可。集簡方。

栗疾音孚一恭曰

栗疾音孚一恭曰

栗疾音孚一恭曰

【主治】揭散和蜜塗面。令光急去皺文。恭。

【附方】新一、骨鯁在咽。栗子內薄皮燒存性。研末吹入咽中。卽下。○聖濟總錄用栗子肉上皮半兩爲末。鯁魚肝一個。乳香二錢半。同搗丸梧子大。看鯁遠近。以線繫綿裹一丸。水潤吞之。

提線釣
出也

栗殼 栗之黑
殼也

氣味 同
疾

【主治】反胃消渴。煮汁飲之。孟诜煮汁飲止瀉血。大明

【附方】新一鼻衄不止。累醫不效栗殼燒存性研末。粥飲服二錢。聖惠方

毛毬 栗外刺
包也

【主治】煮汁洗火丹毒腫。恭

花 主治癩癧。吳瑞

樹皮 主治煮汁洗沙蠶溪毒。蘇恭療瘡毒。頌治丹毒五色無常。剥皮有刺者煎水洗之。孟诜洗○出

根 主治偏腎氣酒煎服之。汪穎

天師栗
綱目

【集解】時珍曰按宋祁益州方物記云。天師栗惟西蜀青城山中有之。他處無有也。云張天師學道於此所遺故名似栗而味美。惟獨房若櫟爲異耳。今武當山所賣娑羅子恐即此物也。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】久食已風摶。時珍○出

【釋名】高時珍曰

按陸佃埤雅云大曰棗小曰棘棘駿棗也棗性

【集解】多

別錄曰一州生河東平澤一宏景曰世傳河東猗氏縣

【集解】多

別錄曰一近北州郡皆出棗惟青州之種特異今青州出者形大而虛少脂好者亦可用心而核

【集解】多

別錄曰一南郡人煮而曝乾皮薄而皺味更甘於他棗謂之天蒸棗亦不入藥按郭璞註爾雅

【集解】多

別錄曰一晉州皆可曬曝入藥益脾胃餘者止可充食用耳青州人以棗大而虛厚故也江

【集解】多

別錄曰一出河東猗氏縣大如雞卵而細猶

【集解】多

別錄曰一星齋民要術云一毫無道也核

【集解】多

別錄曰一齊民要術云一毫無道也核

[氣味]甘平無毒。〔思邈曰〕甘辛熱滑無毒。〔果曰〕溫。〔大明曰〕有齒病疳病蟲蟲人不宜啖。〔今人蒸棗多用糖蜜拌過久食最損脾助溼熱也。啖棗多令人齒黃生蠶故嵇康養生論云齒處晉而黃蠶處頭而黑。

[主治]心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年。本經○〔宗奭曰〕一煮補中益氣堅志強力除煩悶療心下懸除腸澼久服不飢神仙別錄潤心肺止嗽補五臟治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢。大明小兒患秋痢與蛀棗食之良。既殺

鳥頭附子天雄毒才和陰陽調榮衛生津液。李果。

[發明]〔宏景曰〕道家方藥以棗爲佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也。〔果曰〕大棗氣榮衛生發脾胃升騰之氣張仲景治奔豚用大棗滋脾土以平腎氣也。治水飲脇痛有十棗湯益土而勝妾水也。〔震亨曰〕棗屬土而有火味甘性緩甘先入脾補脾者未常用甘故今人食甘多者脾必受病也。〔時珍曰〕素問言棗爲脾之果脾病宜食之謂治病和藥棗爲脾經血分藥也若無故頻食則生蟲損齒貽害多矣。按王好古云中滿者勿食甘令人生満故張仲景建中湯心下痞者減鶴棗與甘草同例此得用棗之方矣。又按許叔微本事方云一婦病臟燥悲泣不止祈禱備至予憶古方治證用大棗湯遂治與服盡劑而愈古人識病治方妙絕如此又陳自明婦人良方云程虎卿內人妊娠四五個月遇晝則慘戚悲傷淚下數欠如有所憑元方治此證用紅棗燒存性酒服三錢亦大棗湯變法也。

[附方]舊七新十二調和胃氣以乾棗去核緩火逼燥爲末量多少入少調和胃氣甚良。衍義反胃吐食一枚去頭翅入在內煅熟去蝥空心食。小腸氣痛一枚去核用班蝥一枚去頭翅入棗內紙糊心舉澄茄湯下直指傷寒熱病後口乾咽痛喜睡乃愈虎卿借方治藥一投而愈方見下條又摘元方治此證用紅棗燒存性酒服三錢亦大棗湯變法也。

十枚搗入蜜丸。含一杏。婦人臘燥。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎服之。亦補脾氣。妊娠腹痛。棗大仁。嚼汁甚效。千金方。婦人臘燥。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎服之。亦補脾氣。妊娠腹痛。棗大仁。四枚燒焦爲末。以小便服之。梅師。大便燥塞。大棗一枚去核。入輕粉半錢。縛定。直指。呪棗治瘡。執棗一枚。呪曰。吾有棗一枚。病勢火燒之念。七遍吹棗上。與人食之。卽愈。嶧嶧神書。煩悶不眠。大棗十四枚。葱白七莖。水一升。煮一升。頓服。千金上氣欬嗽者。用棗二十枚去核。以酥四兩。微火煎入棗肉中。漬盡。酥取收之。常含一枚。微微嚥之。取瘥。聖惠方。肺疽吐血。因啖辛辣熱物致傷者。用紅棗連核燒存性。百耳聾鼻塞。不聞聲音。香臭者。取大棗十五枚去皮核。取麻子三百枚去皮。和搗綿裹塞耳。久服。香身。用大棗鼻日一度。三十餘日聞聲及香臭也。先治耳後治鼻。不可並塞。孟詵食療。心白瓜仁。松樹皮爲丸。走馬牙疳。新棗肉一枚。同黃藥燒焦。爲末。油和桂枝少許。更妙。王氏博濟。久服之。食療本草。痔瘡疼痛。大肥棗一枚剥去皮。取水銀掌中。以唾研下。部蟲癢。蒸大棗取膏。以水銀和桂枝。久服。香身。用大棗令極熟。傳棗瓤上納入下部。良。外瘻。夜納下部。中。明日蟲皆出也。三寸。肘以綿。卒急心疼。海上方訣云。一個烏梅。二個棗。七枚杏仁。一食椒閉氣也。京棗食之。卽解方。老。一害心疼。直到老。

三歲陳棗核中仁。【氣味】是衍父苦平無毒。

【主治】腹痛邪氣。別錄。惡氣。卒疰忤。孟珙核燒研。摻脰瘡良。珍時。

【發明】時珍曰。按劉根別傳云。道士陳孜如癱人江夏袁仲陽敬事之。孜曰。今春當有疾可服核中仁。二十七枚。後果大病服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗核有治邪之說矣。又道書云。常含棗核治氣。令口行津液。嚥之佳。謝承後漢書亦云。孟節能含棗核。不食可至十年也。此皆藉棗以生津。受氣而嚥之。又能達黃宮。以交離坎之義耳。

葉【氣味】甘溫。微毒。使人瘦。久則嘔吐。

【主治】覆麻黃。能令出汗。本經。葛粉揩熱瘡良。別錄。治小兒壯熱。煎湯浴之。大明。

【附方】新二小兒傷寒。五日已後熱不退。用棗葉半握。麻黃半兩。葱白豆豉。反胃嘔噦。乾棗葉一兩。薑香每服二錢。薑三片。水一盞。煎服。聖惠方。

木心 **氣味** 甘溫。有小毒。

【主治】中蠱腹痛。面目青黃。淋露骨立。剉取一斛水淹三寸。煮至二斗。澄清。煎五升。旦服五合。取吐即愈。又煎紅水服之。能通經脈。時珍○出小品方。

根 **主治** 小兒赤丹。從脚趺起。煎湯頻浴之。時珍○出千金。

【附方】 一令髮易長。取東行棗根三尺。橫安甑上蒸之。兩頭汗出。收取傳髮。卽易長。聖惠方。

皮 **主治** 同老桑樹皮。並取北向者等分燒研。每用一合。井水煎。澄取清洗目。一月三洗。昏者復明。忌葷酒房事。時珍。

仲思棗宋開寶

【釋名】仙棗。志曰「北齊時。有仙人仲思得此棗種之。因以爲名。仲

【集解】 志曰「仲思棗形如大棗。長二寸。正紫色。細文小核。味甘。今亦少有。時珍曰。按杜實大業拾遺記云。隋時信都郡獻仲思棗。長四寸。圓五寸。肉肥核小。有味。勝於青州棗。亦名仙棗。觀此則廣志之西王母棗。皆此類也。穀城紫棗。皆此類也。

【氣味】 甘溫。無毒。

苦棗食性

【主治】補虛益氣潤五臟。去痰嗽冷氣。久服令人肥健。好顏色。神仙不飢。

【釋名】蹶洩。爾雅○名義未詳。

【集解】士良曰一苦棗處有之色青而小味苦不堪人多不能食。

實氣味苦大寒無毒。

【主治】傷寒熱伏在臟腑。狂蕩煩滿。大小便閉澀。取肉煮研和蜜丸服。

卷三十

果之二 山果類三十四種

梨	別錄	鹿梨	圖經	棠梨	綱目	海紅	綱目	木瓜	別錄	楂子	食療	榦楂	圖經	榅桲	開寶
山楂	唐本草	山楂	開寶	菴蘿果	開寶	柰	別錄	林檎	開寶	柿	別錄	椑柿	開寶	君遷子	拾遺
石榴	別錄	橘	本經	柑	開寶	橙	開寶	柚	日華	枸櫞	圖經	牛蟠柿	拾遺	枇杷	別錄
開寶	櫻桃	別錄	山櫻桃	別錄	銀杏	日用	即白果	胡桃	開寶	金橘	綱目	楊梅	安	阿月渾子	拾遺
拾遺	鉤栗	拾遺	橡實	唐本草	即櫟子	槲實	唐本草	榛子	開寶	褚子				褚子	

右附方舊五十二新一百七十四
果之二 山果類三十四種

梨別錄
下品

【釋名】快果。果宗。玉乳。蜜父。

「震亨曰」梨者利也。其性下行流利也。宏景曰「快果不入藥用。」

【集解】頌曰：「梨處處皆有，而種類殊別。醫方相承，用乳梨出宣城，皮厚而肉實，其香則過之。其餘水梨消梨紫糜梨赤糜梨，亦有之。」

青梨茅梨甘棠梨，梨兒梨之類甚多，俱不入藥也。一種桑梨，惟堪蜜煮食之。止口乾生食不益人。冷利多食損人，故俗人謂之快果。又有紫花梨，療心熱，唐武宗有此疾，百藥不效。青城山邢道人以此梨絞汁進之，帝疾遂愈。復求之，已無種。今人不得而用之。古語云：「利口乾，害口濕。」

一時珍曰：「梨忽有一株，因纖封以進，帝多食之，略無殊效。歲久木枯，不復有種。今人得之，結實必佳，故古語云：『利口乾，害口濕。』」

此亦一異也。梨即棠梨也。梨品甚多，必須棠梨接過者，則結子早，而佳。梨樹接過者，則結子晚，惟一二子生梨，餘皆黃紅紫青色，皆生乳，惟北國爲佳。梁武帝嘗言：「勝山甘乳，不若馬野梁苑如史國，唯陽城大如玉乳，堪之訛。或云藥梨，有青黃紅紫四色，皆生乳，惟北國爲佳。」

鉅鹿弘農縣，嘉定縣見漢書註，其他青皮早穀半斤沙糜梨，諸梨皆粗，惟一青黃紅紫四色，皆生乳，惟北國爲佳。梁武帝嘗言：「勝山甘乳，不若馬野梁苑如史國，唯陽城大如玉乳，堪之訛。或云藥梨，有青黃紅紫四色，皆生乳，惟北國爲佳。」

秦千株兆梨，易水煮熟，則甜美不損人也。昔於北人言，梨皆以常城山真定者爲佳。梁武帝嘗言：「勝山甘乳，不若馬野梁苑如史國，唯陽城大如玉乳，堪之訛。或云藥梨，有青黃紅紫四色，皆生乳，惟北國爲佳。」

年志記云：「洛陽人每於樹上包裹，過蒂破，則可食。」

河濟辛氏云：「梨其人與千戶侯等也。又魏文帝須詔云：『真定縣惟宣城者，皆以常城山真定者爲佳。』」

藏也。物類相感，經年不爛，今亦妙。

中人不食，多成冷痢。本云：「梨生食冷寒。」

實氣味：甘微酸，寒無毒。多食令人寒中，萎困，金瘡，乳婦血虛者尤不可食。多食成冷痢。

【主治】熱嗽止渴。切片貼湯火傷止痛不爛。蘇治客熱中風不語。治傷寒熱發解丹石熱氣驚邪利大小便。寶除賊風止心煩氣喘熱狂作漿吐風痰。大明卒喑風不語者生搗汁頻服。胸中痞塞熱結者宜多食之。孟潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒時。

【發明】〔宗奭曰〕梨多食動脾少則不及。用梨者當斟酌之。惟病酒煩渴人食之甚佳。終不能卻

〔鄭州馬醫趙鄂診之言與梁同。但請多喫消梨咀齶不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽也。〕時珍曰：別錄著梨止言其害。不著其功。陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病多主風寒。用藥皆是桂附故。不知梨有治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功也。今人瘧病火病十居六七。梨之有益。蓋不爲少。但不宜過食爾。按類編云：一士人狀若有疾。厭厭無聊。往謁楊吉老診之。楊曰：君熱證已極。氣血消鑠。此去三年當以疽死。士人不樂而去。聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴。乃衣僕衣詣山拜之。願執薪盡。則取乾者泡湯食。津飲汁。疾自當平。士人如其戒。經一歲復見吉老。見其顏貌腴澤。脈息和平。驚曰：君必遇異人不然。豈有痊理。士人備告吉老。具衣冠望茅山設拜。自咎其學之未至此。與瑣言之。

說彷彿觀夫二條則梨之功豈小補哉。然惟

梨鵝梨消梨可食。餘梨則亦不能去病也。

【附方】

舊六三消渴飲水。用香水梨或鵝梨或江南雪梨皆可取汁。以蜜湯熬。亮海上方用好元梨去核搗汁。一椀入椒四十粒。煎一沸去滓。納黑餳一大兩。消訖細細含嚥立定。○洗曰：用梨一顆刺五十孔。每孔納椒一粒。麪裹灰火煨熟停冷去椒食之。又方：搗汁一升。入酥蜜各一兩。地黃汁一升。煎成含嚥。凡治嗽須喘急。梨剝空定時冷食之。若熱食反傷肺令嗽更劇。不可救也。若反可作羊肉湯餅飽食之。卽佳。痰氣急。納小黑豆令滿留蓋。搗作餅每日食之。至效。穢火煨熟。暗音生梨搗汁一椀飲之。小兒風熱昏憊躁悶不能食。用消煮汁一升。入粳米一合。煮粥食之。聖惠方：赤目弩肉。日夜痛者。取好梨浸汁。仰臥點之。圖經：赤眼腫痛。鵝梨一枚搗汁。半兩。膩粉一字。黃連二字。和連取梨食之。

勻綿浸梨汁中。日點之。聖惠反胃轉食入梨內溼紙包四五重。煨熟食之。總錄刺

花【主治】去面黑粉澤。時珍○方見李花下。

葉【主治】霍亂吐利不止。煮汁服作煎治風。恭治小兒寒疝。蘇頌搗汁服解中菌毒。吳瑞

【附方】新舊三、小兒寒疝。腹痛大汗出。用梨葉瀉煎七合。分作數服。中水毒病。初起頭痛惡寒拘急心煩。圖經本草。中水毒病。用梨葉一把搗爛以酒一盞攪飲。出黃水用梨葉汁塗之乾卽易。總錄刺中方。食梨過傷之。葉煎汁解

木皮【主治】解傷寒時氣。時珍

【附方】新舊四、傷寒溫疫。已發未發。用梨未皮大甘草各一兩。黃穢殼一合。爲末。鍋底煤一錢。煮汁飲。聖惠氣積鬱冒。人有氣從脾左右起上衝胸滿。氣促鬱冒厥者。用麻黃去節等分。爲末。糊丸梧子大。每服十九丸。酒下亦可。爲末服方寸匕。或煮湯服。紫苑總結氣欬逆。三十年者服之。亦瘥。方同上。

鹿梨圖經
【校正】原附梨下

云棧卽鹿梨也。一名鼠梨。
【釋名】鼠梨。詩疏。山梨毛。陽機雅羅。注云。棧有樹機。毛雲。也。一名鼠梨。

【集解】亦有但采實作乾。不知入藥也。時珍曰。爾雅云。棧羅也。其木有紋如羅。故名。詩云。隰有樹棧。毛密赤。者文急白者文緩。按陸機云。鹿梨齊郡堯山魯國河內皆有人亦種之。實似梨而酢。亦有美肥者。

實【氣味】酸澀寒無毒。

【主治】煨食治痢。蘇。

根皮【氣味】實。

同

【主治】瘡疥煎汁洗之。蘇。

【附方】新二一切瘡。鹿梨散用鹿梨根蛇牷子各半斤。真翦草四兩。硫黃三錢。輕粉一錢。一切癬。鹿梨根爛醋和麻布包擦之。乾者爲末。以水和搗。唐瑤經驗方。

棠梨綱目

【釋名】時珍曰爾雅云杜甘棠也。赤者杜白者棠。或云澤者杜甘者棠。杜者澤也。棠者艶也。三說俱通。未說近是。

【集解】有鋸齒色頗似梨也。處處山林有之。樹似梨而小。核似杏核而小。葉似杏葉亦有圓者。三叉者葉邊微苦嫩時煤疏云白棠甘棠子多酸美而滑。代茶甚嘉。有甘酢赤自二種。皆可食。其樹接梨甚嘉。有甘酢赤自二種。皆可食。木理亦可作弓材。救荒本草云其葉楊味。

實【氣味】酸甘澀寒無毒。

【主治】燒食止滑痢。時珍。

枝葉【氣味】實。

同

【主治】霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取一握同木瓜二兩煎汁細呷之。時珍○

【附方】新一反胃吐食。棠梨葉油炒去刺爲末。每旦酒服一錢。山居四要。

海紅綱目

【釋名】海棠梨。〔時珍曰〕按李德裕花木記云：凡花木名海棠者，皆從海外來。始海棠之自海外有據矣。

【集解】〔時珍曰〕食腊正要果類有海紅不知出處此卽海棠梨之實也。狀如木瓜而小。二月開條暢其葉類杜大者縹綠色小者淺紫色或三萼五萼成叢其蕊如金粟中有甘棠沙開宿妝淡粉其蒂長寸餘淡紫色可食味甘酸大抵海棠花以紫綿色者爲正餘皆棠梨耳。海棠花小而鮮垂絲海棠花粉紅向下皆無子惟蜀之嘉州者有香。其核大而堅其枝葉密生者也。

【主治】洩痢。時珍○

木瓜別錄

【釋名】林瓜音茂。

〔時珍曰〕按爾雅云：楙木瓜。郭璞註云：木實如小瓜，酢而可食，則木

〔集解〕〔宏景曰〕木瓜山陰蘭亭尤多。彼人以爲良果，又有模櫟大而黃，有櫟子小而黃，似梨而酢。江外常爲果，宣城者爲佳。木狀如柰，花似桔，子形似橘，皮似橘，肉似梨，味酸得木之正氣，故名。亦通楙。從林矛諧聲也。

其實大者如瓜，小者如拳，上黃似着粉，宣人種蒔處處有之。而宣城者爲佳，則嫩紙花黏於上，開花深日紅，烘色甚香。

漸變紅花色。其文如生。本州以充土貢。故有宣城花木瓜之稱。模擬酷類木瓜。但看蒂間別有重蒂。如乳者爲木瓜。無者爲模榦也。一穀曰。眞木瓜皮薄色赤黃。香而甘酸。不澀。其向裏子頭尖。一面方。食味絕苦澀。不堪。子如大樣油麻餌之。令人目澀目赤。筋痛也。一宗奭曰。西洛大木瓜。其味和美至熟。止青白色。入藥絕有功。勝宣州者味淡。一時珍曰。木瓜可種可接。可以枝壓其葉光而厚。其實如瓜而有鼻津潤味。不木者爲木瓜。圓小於木瓜。味木而酢澀者爲木桃似木瓜而無鼻大於木桃。木李性堅可蜜煎及作糕食之。木瓜燒灰散池中。可以毒魚說。

枝一尺有百二十節。可爲數號。又廣志云。木瓜出淮南萬畢術。又廣志云。木瓜

實修治。一穀曰。凡使木瓜勿犯鐵器。以銅刀削去硬皮。并子切片曬乾。入藥爾。按大明會典宣州歲貢烏蠣未待如膏煎。乃曬用也。一時珍曰。今人但切片曬乾。入藥爾。按大明會典宣州歲貢烏蠣。

蟲蛀木瓜入御藥局亦取其陳久。

無木氣如栗子去木氣之義爾。一說

氣味酸溫。

無毒。一思邈曰。不可多食。損齒及骨。

【主治】溼痹腳氣霍亂。大吐下轉筋不止。錄治腳氣衝心。取嫩者一顆。去子煎服佳。強筋骨。下冷氣。止嘔逆。心膈痰唾。消食止水利後渴。不止作飲服之。器止吐瀉奔豚。及水腫冷熱痢。心腹痛。大調營衛。助

穀氣。去溼和胃滋脾益肺。治腹脹善噫。心下煩痞。好古。

【發明】一杲曰。木瓜入手足太陰血分。氣脫能收。氣滯能和。一宏景曰。木瓜最療轉筋。如轉筋時但呼其名。及書上作木瓜字皆愈。此理亦不可解。俗人拄木瓜杖云。利筋脛也。一宗奭曰。木瓜得木之正酸。能入肝故。筋與血病。腰脚膝無力。皆不可缺也。人以鉛霜或胡粉塗之。則失醉味。轉筋則由溼熱。寒溼之邪。襲傷脾胃所致。故筋轉必起於足。肺脾及宗筋皆屬陽明。調營衛助脾而伐肝也。土病則金衰。而木盛。故用酸溫。以收肺脾之耗散。而藉其走筋。以平肝邪。乃土中益筋而益

瀉木以助金也。木平則土得令而金受蔭矣。素問曰：酸走筋，病無多食酸。孟詵云：多食木瓜，損齒及胃。皆伐肝之明驗。而木瓜入手足太陰爲脾肺藥，非肝藥益可徵矣。又鍼經云：多食酸令人癰。酸入於利胃，其氣滯以收兩焦之氣，不能出入流入胃中。下去膀胱胞薄以軟，得酸則縮卷約而不通，故水道不通，則曰此食酸所致也。但奪食則已。陰之所生，本在五味。陰之所營，傷在五味。五味太過，皆能傷人。

附方

舊十二項強筋急牛二味入木瓜內縛定，飯上蒸三四次，爛研成膏，每用三錢，入生地黃汁半盞，

無灰酒二盞，煖化溫服。許叔微云：有人患此，自午後發黃昏時定，予謂此必先從足起，少陰之筋自此時予授此及都梁丸服之而愈。多本事。腳氣腫急，用木瓜切片，置盆中，以足踏之。廣德顧安中患脚氣筋，制木瓜袋中何物？曰：宣州木瓜也。及歸，腳筋攀痛，痛處以繩裹之，冷即換日三五度，食療本草。臍下絞痛，三木瓜三片，桑葉七片，大棗三枚，水半升，煮半升，頓服即愈。食療之，千金方：雀亂轉筋，木瓜一兩，酒一升，煮服。不飲酒者，聖惠方：桑葉三片，棗肉四蒸木瓜圓。治肝腎脾三經氣虛爲風寒暑溼相搏流注，其足趾不和，必至發動，或腫滿或經遇氣化更變，七情不和，必至發動，或腫滿或經。瘡瘍寒壯熱，嘔吐自汗，霍亂，利用宣州大木瓜四個切蓋剜空，聽用一個入烏藥、黃松節末各半兩于內，一個入黃茅蘆根末各半兩于內，一個入烏藥、黃松節末各半兩于內，一個入威靈仙苦蕁，各半兩于內，以原蓋簪定用酒浸透，入瓶內，蒸熟，曬三日，取下，御藥院方：黃茅蘆根末各半兩，以水和糊丸如梧子大，每服五十丸，溫酒送下。驛湯任下。

濟瀝總錄內髮槁不澤，木梳瓜頭浸水，或經頑絡。

瘡瘍滿痛，用大木瓜三十枚去皮核剜空，以甘菊花末，每米飲下，三十丸，日二服。

聖惠方：反花痔瘡，貼之以紙護住。醫林集要：辟除壁蠶，席下木瓜切片鋪于。

木瓜核【主治】霍亂煩躁，氣急，每嚼七粒，溫水嚥之。時聖珍惠。

枝葉皮根〔氣味〕並酸澗溫無毒。

〔主治〕煮汁飲並止霍亂吐下轉筋療腳氣別枝作杖利筋脈根葉煮湯淋足可以已歷木材作桶灌足甚益人。蘇頌曰枝葉煮汁飲治熱痢出千金。

花〔主治〕面黑紛滓方見李花。

楂子音渣○食療。

〔校正〕原附木瓜

下今分出

〔釋名〕木桃。埤雅和圓子。時珍曰

一木瓜酸香而性脆木桃醉澀而多渣故謂之楂雷公炮炙論和圓子卽此也。

〔集解〕藏器曰「楂子生中都似楂梨鑽之謂鑽去核也。鄭元不識以爲梨之不臧者郭璞以爲似梨而醉澀古以爲果今不入例矣。」時珍曰「楂子乃木瓜之醉澀者小於木瓜色微黃蒂核皆粗核中之子云楂梨橘柚皆可於口淮南子云樹

小圓也。按王贊農書云：楂似小梨。西川唐鄧問多種之味劣於梨與木瓜同入蜜煮湯則香美過之莊子云楂梨橘柚食之則美嗅之則香皆指此也。

〔氣味〕酸澗平無毒傷氣損齒及筋。

〔校正〕原附木瓜

下今分出

〔主治〕斷乳去惡心咽酸止酒痰黃水。

器煮汁飲治霍亂轉筋功與木瓜相近。孟诜

榦音冥渣○宋圖經

〔校正〕原附木瓜

下今分出

〔釋名〕櫟志通瘡瘍。捨木李詩經木梨。埤雅謂之櫟櫟俗呼爲木梨則櫟蓋櫟之訛也。

〔集解〕一頌曰「櫟木葉花實酷似木瓜但比木瓜大而黃色辨之惟看蒂間別有重蒂如乳者無此則櫟木可以進酒去痰道家生壓取汁和甘松元參末作溼香甚爽神也。」

一卽爲

曰「榦榦氣辛香置衣箱中殺蟲。」時珍曰「榦榦乃木瓜之大而黃色無重蒂者也。榦子乃木瓜甚相遠但木瓜得木之正氣爲可貴耳。」

【氣味】酸平無毒。

【主治】解酒去痰。食之去惡心止心中酸水。藏器燶食止痢。浸油梳頭治髮白髮赤。大明煮汁服治霍亂。

轉筋。吳瑞

榦
檉音溫李○

【釋名】一時珍曰「榦榦性溫而氣辟故名。」音字香氣也。

【集解】一志曰「榦榦生北土似榦子而小。」頌曰「今關陝有之。沙苑出者更佳。其實大抵類榦。但食之須淨去浮毛不爾損人肺花白色亦香最多生蟲少有不蛀者。」時珍曰「榦榦蓋榦榦之類生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣南海藥錄言關中謂林檎爲榦榦。按述征記云林檎佳美。榦榦微大而狀醜有毛。其味香關輔乃有江南甚希。觀此則林檎榦榦蓋相似而二物也。李氏誤矣。」

【氣味】酸甘微溫無毒。一士良曰「發毒熱祕大小腸聚胸中痰壅澀。」瑞曰「同車螯食發痼氣。」

【主治】溫中下氣消食除心閒酸水去臭辟衣魚。開宜。蘇頌「宗奭曰」臥時主水瀉腸虛煩熱散酒氣並宜生食。李敏此太多亦痞塞胃脘也。

木皮【主治】搗末傅瘡頸。

山楂音渣○唐本草。

校正唐本草木部赤爪木宋圖經外類棠棣子丹溪補遺山楂皆一物也今併于一但以山楂標題。

釋名赤爪子側巧切。唐本草鼠楂本猴楂危音求樹如梅其子大如指頭赤色似小奈可食此卽山楂也世俗作查字誤矣查音楂乃水中浮木與核何關郭璞註爾雅云諸名也唐本草赤爪木當作赤棗蓋棗爪音訛也楂狀似赤棗故爾范成大廣衡志有赤棗子王璆又百有二選方云山裏紅果俗名酸棗又名鼻涕圓正合此義矣。

集解恭曰赤爪木赤楂也出山南申安隨諸州小樹高五六尺葉似香櫟子似虎掌大如小楂而赤人食之頌曰棠棣生林槩山楂一物也舌方罕用故唐本雖有赤爪後人不知卽此也自丹溪朱氏始著山楂之功而後遂爲要藥其類有二種皆生山中一種小者山人呼爲棠杌子茅楂猴楂可入藥用樹高數尺葉有赤黃二色肥者如小林檎小者如指頭九月乃熟小兒采而賣五個同而采藥者不收。

實修治曝乾或蒸熟去皮核搗作餅子日乾用。

氣味酸冷無毒嘈煩易飢損齒齒人尤不宜也。

主治煮汁服止水痢沐浴頭洗身治瘡瘍本煮汁洗漆瘡多瘧景治腰痛有效頌消食積補脾治小腸疝氣發小兒瘡瘍吳瑞健胃行結氣治婦人產後兒枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效震化飲食消。

肉積癰瘕。痰飲痞滿。吞酸滯血。痛脹時化。血塊氣塊活血寧原。

【發明】震亨曰：「山楂大能尅化飲食，若胃中無食積，脾虛不能運化，不思食者，多服之，則反尅伐佳。但不可多用，恐反尅伐也。」按物類相感志言，煮老雞、硬肉入山楂數顆，即易爛，則其消肉積之功，蓋可推矣。珍隣家一小兒，因食積黃腫腹脹，如鼓，偶往羊杌樹下取食之，至飽歸而大吐淡水，其病遂愈。羊杌乃山楂同類，醫家不用而有此效，則其功應相同矣。

【附方】新六偏墜疝氣。山棠核肉茴香炒各一兩，爲末糊丸梧子大。老人腰痛及腿痛，分爲未蜜丸梧子大，每服一百丸。空心白湯下。衛生易簡方。又名鼻涕團，乾者爲未，艾湯調下，應手卽愈。百選方。痘疹不快，乾山楂爲末，湯活。又法：猴楂五個酒煎入。危氏得效方。痘疹乾黑，危困者用棠核子爲末，紫草全幼心鑑，食肉不消，山楂肉四兩水煮食之。并飲其汁。簡便方。

核【主治】吞之化食磨積治癰瘡。珍。

【附方】新二難產。山楂核七七粒，百草霜。海上方。陰腎瀕腫，橄欖見。

赤爪木【氣味】苦寒無毒。

【主治】水痢頭風身癢。唐本時珍。

根【主治】消積治反胃。時珍。

莖葉【主治】煮汁洗漆瘡出肘後。

【釋名】菴摩羅迦果。出佛香蓋。

時珍曰。菴摩羅梵音三合者也。華言清淨是也。菴

摩羅梵音二合者也。菴

【集解】志曰。菴羅果樹生若林擒而極大。

宗奭曰。西洛甚多梨之類也。其狀似梨。先諸梨熟。

時珍曰。按一統志云菴羅果俗名希。

香蓋乃果中極品種出西域亦柰類也。

北梨五六月熟多食亦無害。今安南諸番亦有之。

【氣味】甘溫無毒。

士良曰。酸微寒。志曰。動風疾。凡天行病。

【主治】食之止渴。開竇主婦人經脈不通。丈夫營衛中血脈不行。久食令人不飢。

良。葉

【主治】渴疾煎湯飲良。

柰別錄

【釋名】頻婆。音波○時珍曰。篆文柰字象子綴于木之形。梵言謂之頻婆。

今北人亦呼之。猶云端好也。

【集解】宏景曰。此有三種。柰江南雖有而北國最豐。

奈與林檎一類。二種也。樹實皆似林檎。作脯食之不宜。

丹柰亦上朱柰青者爲綠柰。皆夏熟。

柰圓者爲林檎。皆夏熟。小者可栽。

京雜記言上林苑柰皆夏熟。

雲西方記言多柰家收切暴乾爲脯。數十百斛以爲漆著衣不可染。色孔氏六帖言涼州白者爲柰。青者爲柰。

納金中勿令蠅入。六七日乾爲末。調物甘酸得所也。

則乾日名果。劉熙釋名載下水柰更油以奈搗汁。良久去滓。上清燥汁傾其郭。義恭取恭。赤頭者爲柰。志爲柰。

在下引汁盡。剗入六七日乾爲末。待爛以酒醃滿拌令如粥狀。

名單。是矣。不味實甘酸者可。而可以奈搗皮子。良久去滓。上清燥汁。用其郭。義恭取恭。赤頭者爲柰。志爲柰。

佳果則又似日給零落虛櫟。僞子與取耳矣。

眞汁實塗相器似中也暴則乾日名果。劉熙釋名載下水柰更油以奈搗汁。良久去滓。上清燥汁傾其郭。義恭取恭。赤頭者爲柰。志爲柰。

柰今關西人以赤柰。柰實而日給零落虛櫟。僞子與取耳矣。

柰實又似日給零落虛櫟。僞子與取耳矣。

木槿花亦名桔梗。柰則又似日給零落虛櫟。僞子與取耳矣。

實【氣味】苦寒。有小毒。多食令人肺壅膿脹。有病人尤甚。**別錄**○**時珍曰**一酸苦寒。瀉無毒。**主治**補中焦諸不足。氣和脾。治卒食飽氣壅不通者。搗汁服。孟獲心氣耐飢。千金生津止渴。要正。

林檎宋開寶

校正併入拾遺

文林郎果

【釋名】來禽帖文林郎果。以藏器曰「文林郎生渤海間。云其樹從河中浮來。有文林郎南人呼爲榅桲。是矣。」時珍曰「案洪玉父云此果味甘。能來衆禽于林。故有林禽來禽之名。又唐高宗時紀王李謹得五色林檎似朱柰。以貢帝大悅。乃有江南甚希。據此則林檎是文林郎非榅桲矣。」

【集解】志曰「林檎在處有之。樹似柰。皆二蘭開粉紅花子。亦如柰而差圓。六月七月熟。」頌曰「林檎散。」時珍曰「林檎卽柰之小而圓者。其味酢者。卽楸子也。其類有金林檎。紅林檎。水林檎。蜜林檎。曾贊寧物類相感志云。林檎樹生毛蟲埋蠶蛾于下。或以洗魚水澆之。卽止。皆物性之妙也。」

【氣味】酸甘溫。無毒。一思邈曰。酸苦平溫。無毒。多食令人百脈弱。志曰「多食發熱及冷痰。澀氣令人好睡。或生瘡癰閉百脈。其子食之。令人煩心。」

【主治】下氣消痰。治霍亂肚痛。明消渴者宜食之。蘇大升。林檎半熟者十枚。水二升煎。并林檎食之。

附方舊水痢不止。升。小兒下痢。林檎構子同杵汁。任蘇心鏡。小兒心癬。時

瘦弱者。乾林檎脯研末。和醋傅之。同上。

東行根主治白蟲。蟻蟲。消渴。好睡。孟诜

柿 音士〇別
錄中品

正字 布篆文从木正書宜作**柿** 聲

【釋名】 一時珍曰「柿從刃音津諧聲也」

【集解】 圓非矣。柿音肺削木片也。胡名鎮頭迦。

俗呼爲牛糞柿。世傳柿有七絕。一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可玩六嘉實可啖七落葉肥大可。可以臨書。宗奭曰「一柿有數種著蓋柿子蒂下別有一重又有牛心柿狀如牛心蒸餅狀如市肥賣蒸餅。華州朱柿小而深紅塔柿大于諸柿去皮挂木上風日乾之佳火乾者味不甚佳其生者可以溫水養去澀味也。」時珍曰「一柿高樹大於諸葉圓而光澤四月開小花黃白色結實青綠色八九月乃熟。」如生柿置器中自紅者謂之烘柿。日乾者謂之白柿。火乾者謂之烏柿。水浸藏者謂之酈柿。其核甚固謂之柿盤。案事類合璧云「柿朱果也。大者如櫻八棱稍扁其次如拳小狀如櫻八棱稍扁其核形扁。」

如或如雞子鴨子牛心鹿心皆以核少者爲佳。如拆二錢者謂之猴棗。皆以核少者爲佳。

如如蜜歐陽脩歸田錄言襄鄧人以楨榦或榦榦或橘葉于中則熟亦不必

烘柿。時珍曰「烘柿非謂火烘也。卽青綠之柿收置器中自然紅熟如烘成澀味盡

俱寒也。」時珍曰「按王璆百一選方云一人食蟹多食紅柿至夜大吐繼之以血昏不省人一道者云惟木香可解乃磨汁灌之卽漸甦醒而愈也。」

【氣味】 甘寒澀無毒。大寒食之引疾爲其味甘也。日乾者食多動風。凡柿同蟹食令人腹痛皆涼不至

【主治】 通耳鼻氣治腸胃不足解酒毒。壓胃閒熱止口乾。續經脈氣。既

【發明】 一藏器曰「飲酒食紅柿令人易醉。或心痛欲死。別錄言解酒毒失之矣。」

白柿 ○ **柿霜** 修治。一時珍曰「白柿卽乾生霜者其法用大柿去皮搯扁日曬夜露至

【氣味】 甘平澗無毒。宏景曰「日乾者性冷。」

生柿彌冷火熏者性熱。冷

【主治】補虛勞不足。消腹中宿血。瀉中厚腸。健脾胃氣。既開胃瀉腸。消痰止渴。治吐血。潤心肺。療肺痿。心熱咳嗽。潤聲喉。殺蟲。大溫補。多食去面黑。藏器治反胃咯血。血淋腸澼。痔漏下血。時霜清上焦心肺熱。生津止渴。化痰寧嗽。治咽喉口舌瘡痛。時珍曰

【發明】震亨曰：「乾柿屬金而有土，屬陰而有收意，故止血治嗽亦可爲助也。」時珍曰：「柿乃脾而胃之子也。真正柿霜乃其精液，入肺病上焦藥尤佳。按方勺泊宅編云：外兄劉掾云：病嘯毒下血，凡半月自分必死。得一方，只以乾柿燒灰飲服，二錢遂愈。又王璆百一方云：曾通判子病下血十年，亦用此方一服而愈。爲散爲丸皆可。與本草治腸澼消宿血解熱毒之義相合，則柿爲太陰血分之藥，益可食之。其病遂愈。此又一徵也。」

【附方】舊四十腸風臟毒方見上。小便血淋。葉氏用乾柿三枚燒存性研末，陳米飲服。○水煎日飲。朱氏方：小兒秋痢，以梗米煮粥，熟時入乾柿末再煮。凡男女脾虛腹薄，食不消化，面上黑點者，用乾柿煎勻，下柿煮十餘沸，用不津器貯之。每日空腹食三五枚，甚良。孟詵食療：瘀嗽帶血，青州大柿餅開，每用一枚，摻真青黛一錢，臥時食之。薄荷湯下丹溪纂要：產後欬逆，氣亂心煩，用乾柿切碎，水煮汁呷。產寶：婦人蒜髮，乾柿五枚，以茅香煮熟，枸杞子酒浸焙研，各等分，搗丸梧杞子大，每服五十丸。茅面生黑點，乾柿日日食。鼻窒不通，乾柿同梗米煮，聖濟耳聾鼻塞，乾柿三枚細切，豆蔻少許，以梗米三合，豆蔻細切，以食之。聖惠痘瘡入目，食白柿日日食之。良。烏柿火熏，日空心，食之。普濟方：膿瘍，用柿霜搗蒂等分，燒研，解桐油毒。之。筆峯雜興：解桐油毒。之。普濟食。

烏柿乾火熏者，氣味甘溫無毒。

【主治】殺蟲。療金瘡火瘡。生肉止痛。別錄治狗齧瘡。斷下痢。去服藥口苦及嘔逆者。食少許卽止。

酈
柿
音
修
治
又
有
以
熟
柿
用
灰
汁
漂
三
四
度
令
汁
盡
着
器
中
經
十
餘
日
卽
可
食
治
病
非
宜

【主治】溼下焦。健脾胃。消宿血。洗。

柿餅
脩治
乾柿五十個。同搗粉蒸食。如乾入煮棗泥和拌之。

【主治】作餅及餛與小兒食。治秋痢。洗。黃柿和米粉作糗蒸。與小兒食。止下痢下血有效。藏。

柿蒂
氣味
溼平無毒。

【主治】欬逆。嘔氣。煮汁服。洗。

【發明】震亨曰：「人之陰氣依胃爲養。土傷則木挾相火直冲清道而上作欬逆。古人以爲胃寒逆皆誤矣。」嚥者乾嘔有聲也。欬逆有傷寒吐下後及久病產後老人虛人陰氣大虧。陽氣暴逆。自降氣或吐或下可能也。古方單用柿蒂煮汁飲之。取其苦溫能降逆氣也。濟生柿蒂散加以丁香生薑之。或加良薑甘草等分。○衛生寶鑑加青皮陳皮○王氏易簡加半夏生薑。

【附方】一、欬逆不止。濟生柿蒂散治欬逆胸滿。用柿蒂丁香各二錢。生薑五片。水煎服。或爲末白湯皮陳皮○王氏易簡加半夏生薑。

木皮【主治】下血。曬焙研末米飲服二錢兩服可止。頌湯火瘡燒灰調油傅時根【主治】血崩。血痢。下血。時珍。

椑柿音卑士。○

宋開寶

【釋名】漆柿。日華綠柿。日青椑。廣烏椑。寶花椑。日赤棠椑。時珍曰：椑乃柿之小而卑者，故謂之椑。他諸物故有漆柿之名。

【集解】一志曰：椑柿生江淮以南似柿而青黃。潘岳閒居賦所謂梁侯烏椑之柿是也。頌曰：椑柿出宣歙荆襄閩廣諸州。柿大如杏，惟堪生啖，不可爲乾也。

【氣味】甘寒澀無毒。宏景曰：椑生啖性冷，服石家宜之，不入藥用不可與蟹同食。

【主治】壓丹石藥發熱利水解酒毒去胃中熱久食令人寒中。寶止煩渴潤心肺除腹臟冷熱。日

君遷子拾遺

【釋名】樸棗。千金作軟棗。康志記名義莫詳。樸棗其形似棗而軟也。司馬光名苑云：君遷子似馬糞，卽樸棗葉如柿子亦如柿而小。唐宋諸家不知君遷子似馬糞，卽樸棗。牛嫋柿皆一物，故詳證之。崔豹古集解曰：藏器曰：君遷卽樸棗。其木類柿而葉長，但結實小而長狀如乳汁，如牛糞美矣。吳都賦平仲君遷是也。時指珍頭大者名丁香柿，味尤美，救荒本草以爲少核，可以供御，卽此。大柿最佳，廣志云：樸棗味小，柿也，肌細而厚，少核，可以接。

【氣味】甘澀平無毒。

【氣味】甘澀平無毒。

【主治】止消渴去煩熱令人潤澤器鎮心久服悅人顏色令人輕健。

安石榴別錄

【釋名】若榴廣古今金罍城得塗林安石榴種以歸故名安石榴又按齊民要術云漢張騫出使西須安僵石枯骨于根下卽花實繁茂則安石之名義或取此也若木乃扶桑之名榴花丹頴似之故有丹若之稱傳元榴賦所謂灼若旭日栖扶桑者是矣筆衡云五代吳越王錢鏐改榴爲金罍西陽故也

此果言榴甜者名天漿道家書謂榴爲三尸酒

言三尸蟲得此果則醉也故范成大詩云玉池咽清肥

彭跡如蟠生作叢種極易息折其條盤土中便生也花有黃赤二色實有甘酢二種甘者可食酢者入藥又

山生石榴形頗相類而絕小不作房生青齊閒甚多不入藥用蜜漬以當果甚美

宗奭曰石榴又名紅子白瑩澈如水晶者味有一酸種

淡二種旋開單葉花旋結實中紅孫枝甚多秋後經霜則白拆裂一種子白瑩澈如水晶者味有一酸種

謂之水晶石榴惟酸石榴須老木所結收留陳久者乃佳時珍曰榴五月開花有紅黃白亦有黑斑點皮中如蜂窠有黃膜隔之子形如人齒淡紅色亦實

色單葉者結實千葉者不結實或結亦無子也實有甜酸苦三種抱朴子言苦者出積石山或云

石榴名三十八者其中只有三十八子也卽又山三甘酸

石榴也酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙瑣碎錄言河陰石榴名三十八者其

皆異種也案事類合璧云榴大如盃赤色有黑斑點皮中如蜂窠有黃膜隔之子形如人齒淡紅色亦實

有潔白如雪者潘岳賦云榴者天下之奇樹九州之名果千房同膜千子如一粟飢療渴解醒止醉

○震亨曰多食損齒令黑凡服食藥物人患

甘石榴氣味甘酸溫濶無毒多食損人肺食之

○震亨曰榴者留也其汁酸性滯戀成疾

酸石榴氣味酸溫濶無毒

別錄能理乳石毒孟制三尸蟲時

【主治】赤白痢腹痛。連子搗汁頓服一枚。孟诜止瀉崩中帶下時。

【發明】時珍曰：榴受少陽之氣，而榮于四月，盛于五月，實于盛夏，熟于深秋，丹花赤實，其味甘酸。

云：白榴皮治白痢，紅榴皮治紅痢，亦通。

【附方】新五腸滑久痢。黑神散用酸石榴一個，煅烟盡出火毒，一久瀉不止。方同上。並普濟方：痢血五色，或膿或不調，酸石榴五枚連子搗汁，存性無則用枝燒灰代之。每服二錢，用柏白皮切焙二升，每服五合。神妙聖濟小便不禁，酸石榴燒一盡入榴灰再煎至八分，空心溫服，晚再服。聖惠撚鬚令黑紫，定牛屎封護待經霜摘下，傾出壳內水以魚鱠籠指蘸水擦鬚，久自黑也。封之，硫定牛屎封護待經霜摘下，傾出壳內水以魚鱠籠指蘸水擦鬚，久自黑也。普濟

【氣味】同實。

【主治】止下痢漏精，別治筋骨風腰腳不遂，行步欒急疼痛，澀腸。取汁點目，止泪下。櫻煎服下，或防風湯下，或金匱止瀉痢，下血脫肛崩中帶下時。

珍

【附方】集六：赤白痢下，腹痛食不消化者，食療本草用醋石榴皮炙黃爲末，裹肉或粟米飯和丸梧子大後方，用皮燒存性爲末，每米飲服三十九日三服，以知爲度。如寒滑加附子赤石脂各一倍。○肘飲服方寸匕七日三服，效乃止。糞前有血，令人面黃，用酢石榴皮炙研末，每服一錢，用茄子枝煎湯服。孫真人方：腸滑久痢，用石榴一個劈半，入全蠍五枚，黃泥固濟，煨存，卒病耳聾，八九月間取聖濟錄，卒病耳聾，石榴一個，糊上。

輕忽之也。小兒風癟，性爲末，每服半錢，割去項，剝空入全蠍五枚，黃泥固濟，煨存，卒病耳聾，八九月間取聖濟錄，卒病耳聾，石榴一個，糊上。

作孔如龜子大內米醋令滿以原皮蓋之水和麪裹煨熟取起去蓋入少黑李子仙沼子末取水滴耳中勿動腦中若動勿驚如此三夜再作必通○案唐慎微本草收采此方云出孫真人而黑李子不知爲何物也其仙食榴損齒石榴黑皮炙黃研末棗肉和丸梧子大普濟丁腫惡毒上以鐵刺四畔用榴皮着瘡爲度仍內榴末傅上急裹經宿腳肚生瘡疾初起如粟搔之漸開黃水浸淫癢痛潰爛遂致達脛而成瘻醫學正宗獨

酸榴東行根【氣味】皮同

【主治】蛇蟲寸白錄青者入染鬚用櫟治口齒病頤止澀瀉痢帶下功與皮同時

【附方】舊二金蠶蠱毒吮白礬味甘嚼黑豆不腥者卽是中蠶也石榴根皮寸白蛇蟲酢石榴東引根三升煎取半盞五更溫服盡至明取下蟲一大團亦絕根本食女子經閉不通用酢石榴根東生者一握洗剉用水補之崔元亮海上方用榴皮煎水煮米作粥食之亦良女子經閉不通用酢石榴根東生者一握心服之未通斗門赤白下痢方同

再服

上

榴花【主治】陰乾爲末和鐵丹服一年變白髮如漆藏器○鐵丹飛鐵爲百葉者治心熱吐血又研末吹鼻止衄血立效亦傅金瘡出血頤

【附方】舊二金瘡出血石榴半斤石灰一升搗和陰乾每鼻出衄血末每服一錢水一盞煎服效乃止

濟錄九竅出血石榴花採塞之

濟錄

取效葉亦可

橘本經

校正木部移入此

【釋名】時珍曰橘從爾音鵠諸聲也又雲五色爲慶二色爲爾爾雲外赤內黃剖之香霧粉郁有似乎爾雲橘之從爾又取此意也

【集解】肉亦如橘有甘酸者名胡柑今俗謂橙爲柚非矣案郭璞云柚似橙而實酢人子橘孔安國云小曰橘大曰柚皆爲柑也頌曰橘柚今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈與枳無辨刺出莖間夏初生白花六七月成實至冬黃熟舊說小爲橘大爲柚今醫家乃用黃橘青橘不言柚豈青橘是柚之類乎宗奭曰橘柚自是兩種本草云一名橘皮後人誤加柚字妄生分別且青橘黃橘治療尙殊况柚爲別種乎惟郭璞所言乃真識橘柚者若不如此分別誤以柚皮爲橘皮是貽无窮之患矣時珍曰橘柚蘇恭所說甚是蘇頌不知青橘卽橘之未黃者乃以爲柚誤矣夫橘柚柑三者相類而不同橘實小其瓣味微酢其皮薄而紅味辛而苦柑大于橘其瓣味酢其皮稍厚而黃味辛而甘柚大小皆如橙其瓣味酢其皮最厚而黃味甘而不甚辛如此分之卽不誤矣按事類合璧云橘樹高丈許枝多生刺其葉兩頭尖綠色光面大寸餘長二寸許四月著小白花甚香結實至冬黃熟大者如孟包中有瓣瓣中有核也宋韓彥直著橘譜三卷甚詳其略云柑橘出蘇州臺州西出荊州南出閩廣撫州皆不如溫州者爲上也柑品有八橘品十有四多是接成惟種成者氣味尤勝黃橘扁小而多香霧乃橘之上品也朱橘小而色赤如火綠橘紺碧可愛不待霜後色味已佳隆冬采之生意如新乳橘狀似乳柑皮堅瓤多味絕酸芳塌橘狀大而扁外綠心紅瓣巨多液經春乃甘美包橘外薄內盈其脈瓣隔皮可數綿橘微小極軟美可愛而不多結沙橘細小甘美油橘皮似油飾中堅外黑乃橘之下品也早黃橘秋半已丹凍橘八月開花冬結春采穿心橘實大皮光而心虛可穿荔橘出橫陽膚理皺枝橘出橫陽膚理皺密如荔枝也俗傳橘下埋鼠則結實加倍故物類相感志曰橘見戶而實繁涅槃經云如橘見鼠其果實多周禮言橘踰淮而自變爲枳地氣然也餘見柑下

【主治】甘者潤肺酸者聚痰器止消渴開胃除胸中膈氣明

【發明】此時珍曰一橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲表裏之異如凡物皆然今人以蜜煎橘充果食甚佳亦可醬菹也

黃橘皮【釋名】紅皮湯液陳皮爲食療。○好古曰：「宏景曰：」橘皮療氣大勝以東橘爲好。西江者不如須陳久者曰橘皮以色紅日久者爲佳。故曰紅皮陳皮去白者曰橘皮。

也紅

【脩治】〔敷曰〕一凡使勿用。柚皮柑子皮二件用不得。凡脩事須去白膜一重。劉細以鯉魚皮裹之。患宿亦苦。或以皮之繁慢分別。又因方土不同。亦互有繁慢也。〔時珍曰〕橘皮紋粗色黃而厚。內多白膜。其味辛甘。柚皮最厚而虛紋更粗。色黃。內多膜無筋。其味辛甘。柚皮性溫。柑皮性冷。不可不知。天下多以廣中來者爲勝。江西者甘。甘者爲無窮之一患宿次之。然亦多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柚皮則懸絕矣。凡橘皮入鹽湯入鹽洗潤透刮皮入和中理胃藥則留白。入下氣消痰者。各隨本方。

【氣味】辛苦溫無毒。

【主治】胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭。下氣通神經。下氣止嘔欬。治氣衝胸中吐逆霍亂。療脾不能消穀。止洩除膀胱留熱。停水起淋利小便去寸白蟲。別錄清痰涎治上氣欬嗽。開胃主氣痢破癥瘕痃癖。

【發明】〔吳果曰〕橘皮氣薄味厚。陽中之陰也。可升可降。爲肺脾二經氣分藥。留滯氣三益脾胃。加青皮減半。用之去滯氣推陳致新。但多用久服能損元氣也。〔原曰〕橘皮能散皮苦能瀉能燥。辛能散溫能和。其治百病總是取其理氣燥溼之功。同補藥則補同瀉藥則瀉。但隨所配而補瀉升降藥則升降。

【服法】〔理肺氣同白朮則補脾胃同甘草則補肺獨用則瀉。肺損脾其體輕浮一能導胸中寒邪二破則升。同降藥則降脾利其氣之母。肺乃攝氣之箭。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降藥則升降。橘皮寬膈降氣消痰飲極有殊功。他藥貴新惟此貴陳外舅莫莫。桃仁治大腸血闊皆取其一。橘皮爲湯因取譬之似相宜連日飲之。其一為湯潤點。然之。橘皮爲湯。其一為湯潤點。

散婦人乳癰未成者卽散已成者卽潰痛不可忍者卽不疼神驗不可云驗也用真陳橘皮湯浸去耳出汁陳皮燒研一錢麝香少許爲末日掺名立效散魚骨哽咽橘皮常含咽汁能行履者濃煎陳皮湯浸良久之卽安醫林集要

青橘皮脩治時珍曰青橘皮乃橘之未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多以小

氣味苦辛溫無毒

主治氣殼下食破積結及膈氣頸破堅癖散滯氣去下焦諸溼治左脅肝經積氣元治胸膈氣逆脅

痛小腹疝氣消乳腫疏肝膽瀉肺氣時珍

【發明】元素曰青橘皮氣味俱厚沉而降陰也入厥陰少陽經治肝膽之病杲曰青皮乃足經氣分藥故人多怒有滯氣脇下有鬱積或小腹疝氣加青皮炒黑則入血分也時珍曰青橘皮古无用者至宋時醫家始用先二入肺氣分青皮沉而降入肝膽氣分一體二用物理自然也必結癖塊宜多服青皮最能發汗有青皮疏利肝邪則癥自不結也

【附方】舊二快膈湯治冷膈氣及酒食後飽滿用青橘皮一斤作四兩用鹽湯浸四兩用白沸湯浸四兩用醋浸四兩用酒浸各三日取出白切絲以鹽一兩炒微焦研末每用二錢以茶末四分水煎溫服亦可點服理脾快氣青橘皮一斤日乾焙研末甘草末一兩檀香末半法制青皮常服安神

宗解酒益胃不拘老人小兒宋仁宗每食後咀數片乃邢和璞真人所獻名萬年草劉跂改名延年草仁
宗以賜呂丞相用青皮一斤浸去苦味去瓤煉淨自鹽花或蜜水一斗煮之不任攪勿令著底候水盡慢火焙乾勿令焦甘草六兩柏齒香四兩甜水一斗煮去草茴香只取青皮密收用王氏易簡方瘧疾寒熱青皮一兩燒存性研末發前溫傷寒呃逆聞
四隣四花青皮全者研末每服二錢白湯下醫林集要產後氣逆青橘皮爲末葱白童子小婦人乳嵐因久積憂鬱乳房內有
成癰名乳廩不可治也用青皮四錢水一盞半丹溪方聾耳出汁青皮燒研末如指頭不痛不癢五七年核
煎成一盞徐徐服之日一服或用酒服經驗後方婦人乳嵐如指頭不痛不癢五七年核
橘瓢上筋膜【主治】口渴吐酒炒熟煎湯飲甚效明

橘核【脩治】焙香去殼取仁研碎入藥

【氣味】苦平無毒

【主治】腎疰腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每溫酒服一錢或酒煎服之大治酒皶風鼻赤炒研每服一錢

胡桃肉一個搗酒服以知爲度宗小腸疝氣及陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服甚效時

【發明】時珍曰橘核入足厥陰與青皮同功故治腰痛癰疽在下之病不獨取象于核也和劑局

【附方】新一腰痛服橘核杜仲各二兩炒研末每

簡便方

葉【氣味】苦平無毒

【主治】導胸膈逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癰脅痛用之行經

靈亨

【附方】新一肺癰緣橘葉洗搗絞汁一盞服之

經驗良方

桔
寶宋開

【釋名】木奴。

時志曰：「柑未經霜時猶酸，於武陵洲上甚甜，故名柑子。」

【集解】

「頌曰：乳柑入藥，山柑皮療咽痛，餘皆不堪用。又有沙柑，青柑體性相類。」藏器曰：「柑生有青

朱柑黃柑。

「李衡種柑于武陵洲上，號爲木奴焉。」

朱柑黃柑，乳柑石柑沙柑，橘有朱橘、乳橘、塌橘、山橘、黃淡子。此輩皮皆去氣調中，實俱堪食，就中以橘但

刺少耳。柑皮比橘皮厚，色黃而稍厚，理稍粗而味不苦，橘可久留，柑易腐敗。

「人多混用，不可辨詳。見橘下案：韓彥直橘譜云，柑樹畏留之，其木婆娑，其葉纖長，其花香濃，惟泥山略可此柑子。」

如澤蠟似大六七寸，其皮薄而味珍，柑似以佗柑爲假矣。其木婆娑，其葉纖長，其花香濃，惟泥山略可此柑子。」

「柑中絕品也。生其熟最早也。朱柑類洞庭而大，每顆必八瓣，不待霜而冷，多食令人陰火，肺寒。」

「其味酸，人不重之。」

【附方】

「新難產，柑橘瓤陰乾燒存性研末，溫酒服二錢，集效。」

【氣味】

甘大寒無毒。生啖脾冷，發癩癬，利發熱，利水，止渴利小便。」

【主治】

利腸胃中熱毒，解丹石，止暴渴，利小便。」

「治產後肌浮，爲末酒服。」

「傷寒飲。」

「下氣調中，解酒毒及酒渴，去白焙研末，點湯入鹽飲之。」

「治產後肌浮，爲末酒服。」

「食勞復者，濃煎汁服。」

「時珍曰：橘皮苦辛溫，柑皮辛甘寒，外形雖似而氣味不同。」

「說曰：多食令肺燥。」

核【主治】作塗面藥。蘇頌
葉【主治】聾耳流水或膿血取嫩頭七個入水數滴杵取汁滴之卽愈。閩氏

橙宋開寶

【釋名】金毬。

鵝殼也。時珍曰：案陸佃埤雅云：橙，柚屬可登而成之，故字從登，又諧聲也。

【集解】實似柚而香，葉有兩刻缺，如兩段，亦有一種氣臭者。柚乃柑屬之大者，早黃難留，橙乃橘屬之大者，晚熟耐久，皆有大小二種。案事類合璧云：橙樹高枝，葉不甚類橘，亦有刺，其實大者如盈頰似朱

櫻，經霜早熟，色黃皮厚，蹙如沸，香氣馥郁，其皮可以熏衣，可以芼鮮，可以和菹醢，可以爲醬，可以蜜煎，可以糖製爲橙丁，可以蜜制爲橙膏，嗅之則香，食之則美，誠佳果也。一宗奭曰：一橙皮今止以爲果，或合湯待賓，未見入藥宿酒，未解者食之速醒。

【氣味】酸寒無毒。

心，士良曰：暖多食傷肝氣，發虛熱與猪肉同食，發頭旋惡。

【主治】洗去酸汁，切和鹽蜜煎成貯食，止惡心，能去胃中浮風惡氣。

寶行風氣，療癰氣，發癰瘍，殺魚蟹。

毒士良

皮【氣味】苦辛溫無毒。

【主治】作醬醋，香美散腸胃惡氣，消食下氣，去胃中浮風氣，開甘美，消痰下氣，利膈中寬解酒，時。

【附方】新二，香橙湯，寬中快氣，消酒用橙皮二斤切片，生薑五兩，切焙搗爛，入炙甘草末，同研，和鹽貯食，止惡心，解酒病，孟珙糖作橙丁。

橙子橘內燒煙熏之。
神效。醫方摘要之。

核主治面野粉刺溼研夜夜塗之時。

【附方】新閃挫腰痛橙子核炒研酒服三錢卽愈。

柚音又○

【釋名】橘俄柚條爾壺柑本臭橙性朱纈黃而小者爲蜜橘正油然其狀加齒故名壺亦象形今人呼之其大者謂之朱纈亦取團纈之

象最大者謂之香纈爾雅謂之橘音廢又亦壺也桂海志謂之臭柚皆一物但以大小古今方言稱呼不同耳。

【集解】橙爲柚非矣案吳氏春秋云果之美者江浦之橘雲夢之柚郭璞云橘有甘酸者名壺柑今俗人謂

如橘禹貢云揚州厥包橘孔安國云小曰橘大曰柚皆爲柑也。

橘黃白色而大囊唐間柚色青黃而實小其味皆酢皮厚不堪入藥。

橘有大小二種小者如柑如橙大者如瓜如升有圍及尺餘者亦可食其花甚香南人種其呼爲朱纈形長成朱纈而實比

柑柑但皮厚而粗其味甘其氣臭其瓣堅而酸惡不可食者亦花甚香南人種其核長成朱纈形接色圓正其實比

柑柑自明矣郭璞云橘屬故其皮苦而辛柚乃柑屬故其皮少味厚而臭成大味甘而辛云廣南臭如

可食其皮甚厚而味酸墨打丹而味酸其皮可代鯉刷且不損皮厚二三寸子似枳食之少味厚而臭成大味甘而辛云廣南臭如

青實丹而味酸墨打丹而味酸其皮可代鯉刷且不損皮厚二三寸子似枳食之少味厚而臭成大味甘而辛云廣南臭如

【氣味】酸寒無毒。

【主治】消食解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣療妊娠不思食口淡大

皮【氣味】甘辛平無毒。

【正誤】〔時珍曰〕案沈括筆談云：本草言橘皮苦，柚皮甘，誤矣。柚皮極苦，不可爲據。

【主治】下氣，宜食。不入藥。宏景消食快膈，散憤懣之氣化痰。

【附方】〔新〕痰氣欬嗽，用香藥去核切，砂餅內浸酒封，一夜煮爛，蜜拌勻，時時含咽。

葉〔主治〕頭風痛，同葱白搗貼太陽穴，時

花〔主治〕蒸麻油作香澤，面脂長髮潤燥。

〔珍〕時

枸櫞〔宋圖經〕○〔校正〕原附荳蔻，下今分出。

〔釋名〕香櫞，俗作佛手柑。〔時珍曰〕義未詳，佛手取象也。

〔集解〕〔藏器曰〕藏器曰：「枸櫞生嶺南柑橘之屬也。其葉尖，其實大如小瓜狀，其皮若橙而光澤可愛，肉甚厚，白如蘿蔔，而鬆虛，雖南國廣間木似朱欒，而葉尖長，枝間有刺，植之近水乃生。其實狀如人手，有指，俗呼爲佛手柑。」時珍曰：「枸櫞一株生長，其味不甚佳，而清香襲人，南人雕上雕鑄，則雖尺產味告香，更充溢異物志云：漫汁浣葛紵勝似酸漿也。」

皮瓢〔氣味〕辛酸無毒。〔宏景曰〕性溫。〔陶說誤矣〕〔藏器曰〕性溫，不冷。

〔主治〕下氣除心頭痰水，藏器煮酒飲治痰氣欬嗽，煎湯治心下氣痛。

根葉〔主治〕同皮，橘。

金橘
目

【釋名】金柑。橘書漢志。廣州山橘錄北戶給客橙。魏王花木志。○時珍曰。此橘生時青。盧色熟則如金故有金橘。盧橘之名。盧黑色也。或云盧酒器之名。其形肖之故也。註文選者以枇杷爲盧橘誤矣。案司馬相如上林賦云。盧橘夏熟。枇杷橘如柿。橙可供客也。

【集解】橘不甚高大。五月開白花。結實。秋冬黃熟。大者徑寸。小者如指頭。形長而皮堅。肌理細瑩。生則似深綠色。熟乃黃如金。其味酸甘而芳香可愛。糖造蜜漬皆佳。案魏王花木志云蜀之成都臨邛江源諸處有給客橙一名。盧橘似橘而非。若橘而香。夏冬花實常相繼。或如彈丸。或如櫻桃。通歲食之。又劉恂鴟鴞表錄云。山橘子大如土瓜。次如彈丸。小樹綠葉夏結冬色薄皮而味酸。偏能破氣交廣人連枝價耳。藏之入牕。醋尤加香美。韓彥直橘譜云。金柑出江西人不識。景祐中始至汴都。因溫成皇后嗜之。遂貴重。栽綠豆中可經時不變。蓋橘性熱。豆性涼也。又有山金橘。一名山金橘。俗名金豆。木高尺許。實如櫻桃。內止一核。俱可蜜漬。香味清美。已上諸說皆指今之金橘。但有一類較種之異耳。

【氣味】酸甘溫無毒。

【主治】下氣快膈。止渴解醒。辟臭皮尤佳。時珍。

枇杷
別錄

【釋名】形似琵琶。故名。其葉

【集解】葉大如驥耳。背有黃毛。陰密婆娑可愛。四時不凋。盛冬開白花。至三四月成實。作核。生大枝。長如臂。葉微似栗。冬花春實。其子簇結有毛。四月熟。大者如雞子。小者如龍眼。白者爲上。黃恭廣志云。枇杷易種。葉微似栗。冬花春實。其子簇結有毛。四月熟。大者如雞子。小者如龍眼。白者爲上。黃恭廣志云。枇杷熟時色如黃杏。微有毛皮。肉甚薄。核大如芋栗。黃褐色。四月采葉。暴乾用。時珍曰。案郭義

次之無核者名魚子出廣州又楊萬里詩云大葉蠻長耳一枝堪滿盤荔
支分與核金橘卻無酸頗盡其狀註文選者以枇杷爲盧橘誤矣詳金橘

實氣味甘酸平無毒傷脾同炙肉及熟麪食令人患熱黃疾

主治止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤五臟明

葉脩治〔恭曰〕凡用須火炙以布拭去毛不爾射人肺令欬不已或以粟稈作刷刷之尤易潔淨
〔數曰〕凡采得秤溼葉重一兩乾者三葉重一兩乃爲氣足堪用粗布拭去毛以甘草湯洗一遍用錦再拭乾每一兩以酥可錢半塗上炙過用時珍曰治胃病以薑汁塗炙治肺病以蜜水塗炙乃良

氣味苦平無毒〔權曰〕甘微辛

〔宏景曰〕煮汁飲之則小冷

主治卒嘯不止下氣煮汁服別錄○〔宏景曰〕若治嘔噦亦瘥治嘔噦不止婦人產後口乾大明煮汁飲主渴疾
治肺氣熱嗽及肺風瘡胸面上瘡訥和胃降氣清熱解暑毒療腳氣時

發明〔時珍曰〕枇杷葉氣薄味厚陽中之陰治肺胃之病大都取其下氣之功耳氣下則火降痰
熱久嗽身如火炙肌瘦將成勞以枇杷葉木通款冬花紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半如常治訥爲未蜜丸櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終劑而愈矣

附方新七溫病發噦因飲水多者枇杷葉去毛炙香茅根各半麗安常方反胃嘔噦人參二兩每服三錢水一盞三片煎服聖惠衄血不止一二錢日二服同上酒飯亦鼻枇杷葉卮子各等分爲末每服面上風瘡方上痔瘡腫痛先以烏梅湯洗貼之集要痘瘡潰爛枇杷葉煎湯摘元

花〔主治〕頭風鼻流清涕辛夷等分研末酒服二錢日二服時珍

木白皮【主治】生嚼咽汁止吐逆不下食。煮汁冷服尤佳。思

楊梅宋開

釋名 杭子。音求。○一時珍曰。其形如水楊子而味似梅故。

集解 一志曰。楊梅生江南嶺南山谷樹若荔枝樹而葉細陰青子形似水楊子而生青熟紅肉在上无皮壳。四月五月采之南人醃藏爲果寄至北方。一時珍曰。楊梅樹葉如龍眼及紫瑞香。冬月不凋。二月開花結實。形如楮實子。五月熟有紅白紫三種。紅勝于白。紫勝于紅。顆大而核藏。蜜漬糖收皆佳。東方朔林邑記云。邑有楊梅。其大如盃。青時極酸。熟則如蜜。用以釀酒。號爲梅香。耐甚。珍重之。贊寧物類相感志云。桑上接楊梅則不酸。楊梅樹生癩。以甘草釘之。則無皆物理之妙也。一藏器曰。張華博物志言。地瘴處多生楊梅。驗之信然。

實氣味 酸甘溫無毒。一詵曰。熱微毒。久食令人發熱。損齒。忌生葱同食。一瑞曰。一發瘡致疾。

主治 腸藏食去痰止嘔噦。消食下酒。乾作屑。臨飲酒時服方寸匕。止吐酒。開止渴。和五臟能滌腸胃。除煩憤惡氣。燒灰服。斷下痢甚。驗鹽者常含一枚。咽汁利五臟下氣。洗。

附方 一舊新下痢不止。楊梅燒研每米飲服。頭痛不止。許嵩鼻取嚏妙。頭風作痛。荷茶服二錢。或以消風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸彈子大。每食後葱茶嚼下一丸。朱氏集驗。一切損傷止血生肌。令無瘢痕。用鹽藏楊梅和核搗如泥。做妙經驗方。經

核仁 【主治】脚氣。一時珍曰。案王性之揮麈錄云。會稽楊梅爲天下冠。童貫苦腳氣。或云楊梅仁可治之。郡守王龜鈞五十石。質用之而愈。取仁法。以柿漆拌核暴之。則自裂出也。樹皮及根。【主治】煎湯洗惡瘡疥癬。大樹皮及根。【主治】煎湯洗惡瘡疥癬。大樹皮及根。【主治】煎水漱牙痛。服之解砒毒。燒灰油調塗湯火傷。時珍。

【附方】新二 中砒毒。心腹絞痛。欲吐不吐。面青肢冷。用楊梅樹皮煎湯二三盞服之。卽愈。
王碩易簡方。風蟲牙痛。兩川芎。薑五錢。麝香少許研末。每用半錢。鼻內噙之。口中含水涎出。痛止。○摘要方。用楊梅根皮。韭菜根。腐案上油泥等分搗勻。貼于兩腮上。半時辰其蟲從眼角出也。屬用有效之方。

櫻桃別品

櫻桃上品。

【釋名】鶯桃。註舍桃。月荆桃。一宗奭曰。孟蒼本草言此乃櫻非桃也。雖非桃類。以其形肖桃故曰櫻。色者謂之朱櫻。紫色皮裏有細黃點者謂之紫櫻。味最珍重。又有正黃明者。謂之蠟櫻。小而紅者謂之櫻珠。味皆不及極大者。有若彈丸。核細而肉厚。尤難得。時珍曰。櫻桃樹不甚高。春初開花繁英如雪。葉團有尖及細齒。結子一枝數十顆。三月熟時須守護。否則鳥食無遺也。蠟藏蜜煎皆可。或同蜜搗作餡食。唐人以酪蘆食之。林洪山家清供云。櫻桃經雨則蟲白。內生人莫之見。用酒浸良久。則蟲皆出。乃可食也。試之果然。

【氣味】甘熱。澆無毒。人不可食。食之立發。李廷飛曰。傷筋骨敗血氣。有寒熱病人不可食。

【主治】調中益脾氣。令人好顏色。美志。別止洩精水穀痢。孟

【發明】宗震曰。小兒食之過多。无不作熱。此果三月末四月初熟。得正陽之氣。先諸果熟。故性熱。案張子和儒門事親云。舞水一富家有二子。好食紫櫻。每日啖一二升。半月後長者發肺癰。幼者發肺癰相繼而死。嗚呼。百果之生。所以養人。非欲害人。富貴之家。其縱嗜欲。取死是何天耶。命耶。邵堯夫詩云。飽食不須愁。內熱大宜還。有蘇槩寒蓋。謂寒物同食。猶可解其熱也。王維詩云。飽食口物多終作疾。直格言哉。觀此則寇朱二氏之言。益可證矣。

葉【氣味】甘平無毒。煮老鴨軟熱。

【主治】蛇咬搗汁飲，并傳之頸。

東行根【主治】煮汁服立下寸白蛇蟲。

枝【主治】雀卵斑、黑同紫萍牙皯白梅肉研和日用洗面時。

花【主治】面黑粉滓方見李花。

山嬰桃別錄上品

【校正】唐本退入有名

未用今移入此

【釋名】朱桃錄別麥櫻吳英豆錄李桃名柰桃前櫻桃俗名櫻非桃也。

【集解】「別錄曰」嬰桃實大如麥多毛四月采陰乾。宏景曰「櫻桃卽今朱櫻可煮食者。嬰桃形相似而實乖異。山間時有之。方藥不用。」時珍曰「樹如朱櫻但葉長尖不圓子小而尖生青熟黃赤亦不光澤而味惡不堪食。」

實【氣味】辛平無毒。

【主治】止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好顏色美志別止洩精。洗孟

銀杏日用

【釋名】白果。用鴨脚子。時珍曰「原生江南葉似鴨掌因名鴨脚。宋初始入貢。改呼銀杏。因其形似初入貢銀杏貴中州是矣。」

【集解】時珍曰：銀杏生江南以宣城者爲勝。樹高二三丈，葉薄縱理，微如鴨掌形，有刻缺，面綠背黃，去肉取核爲果。其核兩頭尖，三棱爲雄，二棱爲雌。其仁嫩時綠色，久則黃須。雌雄同種，其樹相望，乃結實。或雌樹臨水亦可，或鑿一孔，內雄木一塊泥之，亦結陰陽相感之妙。如此其樹耐久，肌理白膩，術家取刻符印云能召使也。文選吳都賦註平仲果其實如銀，未知即此果否。

核仁 **氣味**甘苦平，濶無毒。

時珍曰：一然食小苦微甘，性溫，有小毒。多食壅氣，動風。小兒多食昏憊，發驚，引疳。同鯉魚食，患軟風。

【主治】生食引疳解酒，熟食益人。李廷飛熟食溫肺益氣，定喘嗽，縮小便，止白濶，生食降痰，消毒殺蟲，嚼

漿塗鼻面手足去皺皰，及疥癬。

時珍

【發明】時珍曰：銀杏宋初始著名，而脩本草者不收。近時方藥亦時用之。其氣薄味厚，性濶而收，白屬金，故能入肺，經益肺氣，定喘嗽，縮小便，生搗能浣油膩，則其去痰濶之功可類推矣。其花夜開，人不得見，蓋陰毒之物，故又能殺蟲消毒。然食多則收令太過，令人氣壅，脹脣，頓故物類相感，志言銀杏能醉人，而三元延壽書言白果食滿千個者死。又云昔有饑者同以白果代飯食飽，次日皆死也。

【附方】一、寒嗽痰喘，白果七個，煨熟以熱艾作丸，每果入一丸，每丸每果入一錢，每丸每果入一錢，散用銀杏五個，麻黃二錢，半夏一錢，甘草一錢，大棗三枚，水煎八分，臥時服。○又金陵一鋪治哮喘，白果定喘湯，服之無不效者。其人以此起家，其方用白果一個，炒黃麻黃三錢，蘇子二錢，款冬花三錢，法半夏一錢，桑白皮一錢，蜜炙各二錢，杏仁去皮尖，黃芩一錢，甘草一錢，水三鍾，煎二鍾，隨時欬嗽失聲。白果仁四兩，白茯苓一錢，桑白皮二兩，烏豆半升，炒蜜半斤，大棗二十枚，水煎八分，分作二服，不用薑，並攝生方。二、小便頻數，白果十四枚，七生，五十九丸，白湯下。三、神效余居士方，小便頻數，白果十四枚，七生，五十九丸，白湯下。四、江米各五錢，胡椒一錢，半爲末，用烏骨雞一隻，去腸盛藥瓦器煮爛，空心食之。五、集簡方，腸風下血，銀杏煅熟，出火，食之。六、米飲下，腸風臟毒，生研入百藥煎末，去壳。

丸飲送下。每服二三丸。空心細嚼。牙齒蟲齧。生銀杏。每食後嚼一粒。戴原禮證治要訣。牙齒蟲齧。生銀杏。每食後嚼一粒。永類鉛方。手足皴裂。生白果嚼爛。鼻面酒皺。銀酒糟同嚼。夜塗之。且洗醉醫林集要。頭面癬瘡。生白果仁切斷。頻擦之。白果杵塗。陰蝨作癢。如蟲或紅或白癩不可忍者。白果仁嚼細。劉長春方。狗咬成瘡。白果仁嚼細塗之。色黃麻木不痛。暗疔瘡凸色紅。使人昏狂。並先刺四畔。後用銀杏去壳浸油中。年久者搗盦之。趙原陽。陰蝨作癢。毛際肉中生

頻擦之。取效。邵氏經驗方。下部疳瘡。生白果杵塗。

趙原陽。陰蝨作癢。如蟲或紅或白癩不可忍者。白果仁嚼細。劉長春方。狗咬成瘡。白果仁嚼細塗之。色黃麻木不痛。暗疔瘡凸色紅。使人昏狂。並先刺四畔。後用銀杏去壳浸油中。年久者搗盦之。普濟方。

胡桃

宋開寶

【釋名】羌桃。名物志。核桃。名之。頌曰。此果本出羌胡。漢時張騫使西域始得種。還植之秦中。漸及東土。故如胡名。或以此或作梵書名。播羅師。

【集解】頌曰。胡桃生北土。今陝洛間甚多。大株厚葉多陰。實亦有房。秋冬熟時采之。出陳倉者薄皮多肌。出陰平者大而皮肥。急捉則碎。汴州雖有而實不佳。江表亦時有之。南方則無。時珍曰。胡桃樹高丈許。春初生葉長四五寸。微似大青葉。兩兩相對。頤作惡氣。三月開花。如栗花穗。著黃色。結實至秋如青桃狀。熟時溫爛。皮肉取核爲果。人多以檸柳接之。案劉恂嶺表錄云。南方有山胡桃。底平如檳榔皮。厚而大堅。多肉少穰。其壳甚厚。須椎之方破。然則南方亦有但不佳耳。

核仁。【氣味】甘平。溫無毒。頌曰。性熱不可多食。思邈曰。甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水。

胃火動。

【發明】震亨曰。胡桃屬土而有火性。熱本草云。甘平是無熱矣。然又云。動風脫人眉。非熱何以傷嗽。酷心及癘風諸病。而酒家往往醉後嗜之。則食多吐水。吐食脫眉。及酒同食。咯血之說。亦未必盡然也。但胡桃性熱能入腎肺。惟虛寒者宜之。而痰火積熱者不宜多食耳。

【主治】食之令人肥健。潤肌黑鬚髮。多食利小便。去五痔。搗和胡粉拔白鬚髮。內孔中。則生黑毛燒存性。和松脂研傅。瘰癧瘡。食之令人能食。通潤血脈。骨肉細膩。洗○方治損傷石淋。同破故紙蜜丸服。補下焦頑。補氣養血。潤燥化痰。益命門。利三焦。溫肺潤腸。治虛寒喘嗽。腰脚重痛。心腹疝痛。血痢腸風。散腫毒。發痘瘡。制銅毒。時。

油胡桃〔氣味〕辛熱有毒。

【主治】殺蟲。攻毒。治癰腫。癰瘍。風疥癬。楊梅。白禿。諸瘡。潤鬚髮。時。

珍。

【發明】〔韓愈曰〕破故紙屬火。能使心包與命門之火相連。胡桃屬木。主潤血養血。血屬陰。惡燥。故能入北方。通命門。利三焦。益氣養血。與破故紙同爲補下焦藥。夫命門氣與腎通。藏精血。有令人肥健用之。參胡桃。如前數以告其妻。夜夢還玉堂。方令服之。及旦而桃花轉急。取新羅人洪澤湯。消渴止。又用人洪澤湯。治渴。亦可。洪氏夷堅志。止言胡桃治渴。嗽者宜之。下通于肺。而虛寒喘嗽者。宜之。上通于肺。而瘡科取之。用其毒也。胡桃制銅。此又物。即飲湯兩匙。能散腫毒。發痘瘡。制銅毒。時。

連枚煎湯一蚬壳許灌之喘卽定明日以湯剝去胡桃皮用之喘復作仍

連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

【附方】舊五新二十八

服胡桃法〔洗行〕凡服胡桃不得併食須漸漸食之初日服二十顆止周而復始常服令人能食骨肉細膩光澤鬚髮黑澤血脈通潤養

老痔青娥丸方見草部胡桃丸益血補髓強筋壯骨延年明目悅心潤肌能除百病用胡桃仁四兩搗任搗至

一切老痔青娥丸補骨脂膏入破故紙杜仲萆薢各四兩杵勻梧子大每空心溫酒鹽湯任乾

消腎溢精胡桃丸治消腎病因房慾無節及服丹石或失志傷腎遂致水弱火強口舌瘙瘍崔元亮海上方

四兩附子一枚去皮切片薑汁蛤粉同焙爲末小便頻數胡桃煅然臥時石淋痛楚便中有石子者胡

蜜丸梧子大每服三十九米飲下普濟方產後氣喘胡桃肉人參各一錢久

下五十丸蜜丸梧子大每服三十丸米飲下普濟方研膏入煉蜜少許和丸彈子大每臥時嚼一丸薑湯下

嗽不止核桃仁五十個煮熟去皮入參五兩杏仁三百五十個炒

研膏入煉蜜丸梧子大每空心細嚼一丸入參湯下臨臥再服

下立止傳食酸齒齦細嚼胡桃卽解誤吞銅錢多食胡桃自化出也胡桃與銅錢

信適用方傳食酸齒齦細嚼胡桃卽解誤吞銅錢共食卽成粉可證矣李樓方楷齒烏鬚胡桃燒過貝殼

不蛀者一挺新瓦上燒存性研爲細末分作八服每血崩不止胡桃肉五十枚燈上燒

母各等分聖惠眼目暗昏下僵臥覺鼻孔中有泥腥氣爲度衛生易簡方赤痢不止各七個阜

痛一核桃一個橐子一枚去核夾桃紙裹煨熟以生薑湯趙氏經驗

鍾細嚼送下水久不發名盡落湯趙氏經驗

研末熱酒服之奇效良方便毒初起和

儒門事親用胡桃七個燒研酒服不過三服見效

楊氏經驗用胡桃三枚夾銅錢一個食之卽愈魚口毒瘡時全燒爲末黃酒服少行

三大便平無膿即消二一切癰腫槐花附骨疽未成膿者胡桃十個煨熟去壳古今錄驗

研末勻熱酒調服

連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

內合在瘡上。煥甚效。普濟痘瘡倒陷。研勻胡荽煎酒調服。儒門事親。小兒頭瘡。盪出火毒。入輕粉少許。生油。保信幼。大全。酒飯鼻赤。橘核。聰耳出汁。胡桃仁燒研。狗膽汁和作。傷耳成瘡。出汁者用胡桃杵同上火燒。黑桃仁燒。壓撲傷損。胡桃仁搗和溫酒。便瘥。圖經本草。疥瘡瘡瘍。油核。桃一個。雄黃一錢。艾葉一錢。勿洗。舊簡方。熱一錢搗。

胡桃青皮

氣味苦澀無毒

【主治】染髭及帛皆黑。和脣糖香塗毛髮色如漆也。

志行

仙方取青皮壓油。

【附方】四烏髭髮。胡桃皮。蝦蟆等分。搗泥塗之。一染即黑。○總錄用青胡桃三枚。和皮搗細。療瘡風。青桃皮搗泥入醬清少許。砕砂少許。合勻。先以泔洗後傅之。外塗白癩風子。大研勻。日日摻之。取效。嵌甲。胡桃皮。

皮

主治

止水痢。春月研皮汁。沐頭至黑。煎水可染褐。

【附方】一染鬚髮。胡桃根皮一秤。蓮子草十斤切。以瓮盛之。入水五斗。浸一月去滓。然至五斤。入芸薹裏一夜洗去。用七日卽黑也。總錄。

殼

主治

燒存性。入下血崩中藥。珍時。

櫟子

宋開寶

【釋名】案古櫟字「時珍曰」案羅氏爾雅翼云科記鄭元註云闢中甚多此果闢中秦地也櫟之從秦蓋取此意左傳云女鬢不過櫟栗棗脩以告虔也則櫟有隸至之義以其名告己之虔也

古作櫟。從辛從木俗作華誤矣華音曉

【集解】多。一頌曰。櫟生遼東山谷。樹高丈許。子如小栗。軍行食之當糧。中土亦有。鄭元云。關中郿坊初生櫻桃葉白最良。時珍曰。櫟樹低小。如荆叢生。冬末開花如櫻花。成條下垂。長二三寸。二月生葉。其壳厚而堅。其仁白而圓。大如杏仁。亦有皮。尖形如樣子。然多空者。故諺云。十櫟九空。案陸機詩疏可。以爲燭詩所謂樹之櫟栗云。櫟有兩種。大明曰。新高丈餘枝葉如水蓼子作胡桃味。遠代上薰甚多。久留亦易油壞者也。

仁【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣力。實腸胃。令人不飢健行。開止飢調中。開胃。甚驗。大明

阿月渾子

拾遺

【校正】自木部移入此併

【釋名】胡榛子。拾無名字。海藥。

【集解】一藏器曰。阿月渾子生西國諸番。與胡榛子同樹。一歲胡榛子。二歲阿月渾子也。珣曰。案徐表南州記云。無名木生嶺南山谷。其實狀若榛子。號無名子。波斯家呼爲阿月渾子也。

仁【氣味】辛溫濡無毒。

【主治】諸痢去冷氣。令人肥健。藏器治腰冷陰腎虛瘦弱。房中術多用之。得木香山茱萸良。

海藥【氣味】辛大溫無毒。

【主治】陰腎萎弱。囊下濕癢。竝煎汁小浴極妙。珣

無名木皮

海

藥【氣味】辛大溫無毒。

櫧子

拾遺

【校正】原附鈎粟

今拆出

【集解】藏器曰：「儲子生江南皮樹如栗，冬月不凋。子小如橡子，穎曰：『儲子有苦甜二種。治作葉，稍尖而厚堅，光澤鋸齒，鋒利凌冬不凋。三四月開白花成穗，如栗花結實大如槲子，外有小苞。霜後文細白，俗名麪櫧。苦櫧子粒大，木文粗赤，俗名血櫧。其色黑者，名鐵櫧。案山海經云：前山有木，其名曰櫧。郭璞註曰：櫧子似柞子而圓小，又有雀子相似，而圓黑，久食不飢。詳櫧子下。」

仁 **氣味** 苦澀平無毒。

酸甘微寒不可多食。

【主治】 食之不飢，令人健行，止洩痢，破惡血，止渴。

藏器

皮葉 **【主治】** 烹汁飲止產婦血，嫩葉貼臙瘡一日三換良。

鉤栗 拾遺

【釋名】 巢鉤子，遺甜櫧子。拾遺曰：鉤栗卽甜櫧子。時珍曰：「鉤

【集解】 藏器曰：「鉤栗生江南山谷，木大數圍，冬月不凋。」

似栗而圓小，又有雀子相似，而圓黑，久食不飢。詳櫧子下。

仁 **氣味** 甘平無毒。

【主治】 食之不飢，厚腸胃，令人肥健。

器 拾遺

橡實 唐本草音象

【校正】 自木部移入此

【釋名】 橡斗。

說文：阜斗，同櫟。求歷

柞子，音序。同序音許。

禹錫曰：『案爾雅云：櫟，盛實之房也。其實名櫟，有櫟葉，自裏之。詩唐風云：集于苞柟。秦風云：山有苞柟。今京洛河內亦謂之柟，或謂之柟，亦謂之柟也。』

人謂之柟，徐人謂之柟，或謂之柟，亦謂之柟也。』

亦謂之柟也。』

亦謂之柟也。』

斗謂其斗利刃象斗一物也。時珍曰：「櫟柞木也。實名櫟斗。」

【集解】卓斗櫟皆有斗而以櫟爲勝。宗奭曰：「櫟葉如栗葉所在有之木堅而不堪充材亦木之性也。爲炭則他木皆不及其殼雖可染卓若曾經雨水者其色淡槲亦有殼但小而不及櫟也。」時珍曰：「一櫟有二種不結實者其名曰械其木心赤詩云瑟彼柞械是也。一種結實者其名曰柶其葉如櫟葉而文理皆斜句四五月開花如栗花黃色結實如荔枝北枝其實珍人亦種之其木高二三丈堅實而重有斑文點點大者可作柱棟小者可作柱樑。其嫩葉可煎飲代茶。」周憲王曰：「霜後收採去殼蒸之從已至未剗作五片日乾用。」周子換水浸十五次淘去澀味蒸極熟食之可以濟飢。

【氣味】苦微溫無毒。

【主治】下痢厚腸胃肥健人恭瀝腸止瀉煮食止飢禦歲大。

【發明】思邈曰：「櫟子非果非穀而最益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消飢甚捨櫟實而食唐杜甫客秦州采櫟栗自給是矣。」

【附方】新水穀下痢日夜百餘行者櫟實二兩楮葉一兩爲血痢不止上方加縮砂仁半兩下痢脫肛燒存性研末。猪脂和痔瘡出血櫟子粉糯米粉各一升炒黃滾水調作果子飯上蒸熟食之不過四五次效。李樓奇方石癰堅硬枚以醋于青石上磨汁一度塗之乾則易不平即平千金方。

斗殼脩治「大明日」入藥並宜搗細炒焦或燒存性研用。

【氣味】澀溫無毒。

【主治】爲散及煮汁服。止下痢，并可染皂。恭止腸風崩中帶下。冷熱瀉痢，并染鬚髮。大

【附方】
一、下痢脫肛。橡斗殼燒存性研末，和豬脂和。腸風下血。橡斗殼用白梅肉填滿兩個合定鐵線，用硫黃填滿研酒服。余居士選奇方。走馬牙疳。橡斗殼燒透出火毒研末，每服二錢米飲下一方。
入鹽在內同研末，日擦三五次。荆芥湯漱之良。經驗良方。

木皮根皮遺。【氣味】苦平無毒。

【主治】惡瘡因風犯露致腫者。煎汁日洗令膿血盡乃止。亦治痢器。止水痢消瘰癧。大

【附方】
一、蝕爛癰腫。及疣贊瘤瘻。梓櫟木灰四斗，桑灰四斗，石灰一斗，五升。以沸湯調溼，甑中蒸一剪五色深，投入消盡，歸盛密收。每以少許挑破點之，煎時勿令雞犬婦人小兒見。普濟方。

【校正】自木部移入此。

槲實音射。

唐本草。

【釋名】槲榦。速。槲榦。並爾。大葉櫟。俗。櫟櫃子。之。時珍曰。槲榦猶殼也。栗子綻縣有頭櫟之象，故謂然之貌。其樹偃蹇，其葉荒茂，故也。俗稱衣物不整者爲槲榦。本此其實。木彌，故俗謂之櫟櫃子。史言武后挂敕書于槲樹人，遂呼爲金雞樹云。

【集解】藥一頌曰。槲處處山林有之。木高丈餘，與櫟相類，亦有斗木，雖堅而不堪充材。止宜作柴爲炭，不及櫟木。時珍曰。槲有二種。一種叢生，小者名泡。音字見爾雅。一種高者名大葉櫟。樹葉俱似栗，長大粗厚。冬月凋落三四月開花，亦如栗。八九月結實，似樣子而稍短小。其蒂亦有斗，但小不中用耳。不拘時采，其皮葉入

樟木所謂櫟樹
之材者指此

仁氣味苦澀平無毒。

【主治】蒸煮作粉澀腸止痢功同橡子時
槲若〔脩治〕頌曰一若卽葉之名也入藥須微炙令焦

【氣味】甘苦平無毒。

【主治】療痔止血及血痢止渴恭活血利小便除面上皺赤時

【附方】舊三卒然吐血煎七分和滓服簡要濟衆鼻衄不止槲葉搗汁一小盞頓服日二聖惠方腸風痔瘡尤佳槲葉研末每服三錢水一盞葱白孩子淋疾煎湯服一片中良聖惠腋下胡臭後用辛夷細辛杜衡末醋浸一夜傅之千金方

葉微炙末一錢槐花炒研末一錢冷淋莖痛槲葉研末每服六分去滓食前溫服日二孩子淋疾煎湯服一片雞子壳小便卽時嫂姑漏疾洗瘡後乃納灰少許于瘡中聖惠方鼻上皺炮出膿血者以泔水煮槲葉取汁拭乾納槲葉取汁洗之

下也孫真人方嫂姑漏疾洗瘡後乃納灰少許于瘡中聖惠方鼻上皺炮出膿血者以泔水煮槲葉取汁拭乾納槲葉取汁洗之

巢灰少許于腋中聖惠方鼻上皺炮出膿血者以泔水煮槲葉取汁拭乾納槲葉取汁洗之

中良聖惠腋下胡臭後用辛夷細辛杜衡末醋浸一夜傅之千金方

木皮〔俗名赤〕**【氣味】**苦澀無毒。

【主治】煎服除蟲及漏甚效恭煎湯洗惡瘡良權能吐瘻瘻澀五臟大止赤白痢腸風下血時

【附方】舊四赤龍皮湯治諸般爛瘡乳瘡用槲皮切三升水一斗煮五升肘後肘骨疽瘡服方寸匕千金方下部生瘡槲皮擦皮煮汁熬如餚一切瘻疾千金用槲樹北陰白皮三十斤剉以水一石煮一枚燒

三白 淚一頻皮水汁
服沙煎斗洗去八盡
卽糖膏煎升研和之納溫酒一升和勻瘦人食
吐十和酒五聖切令泣盡去津再煎成膏日服五
而挺取惠方蠱毒下血升槲木北服一陰許合
愈煎服去升槲木北服一陰許合當
取一升分久痢不止槲白皮許合當
村後方爲末每服一升并當有
二汁錢空皮並當有
米五腹一分大瘡蟲
飲度酒一分大瘡蟲
下兩下兩上出宜也○
乾卽吐毒出也水三首崔氏纂要用槲白皮
聖蠱濟炮鹽飯以助之以瘥切
繩半兩赤白久痢不以槲皮一拘爲五度小兒癩癩
錄久瘡不已水木一斤大去黑皮切以新樹槲
入切水木一斤大去黑皮切以新樹槲