

3

金鎰訴心傷寒論陽明玉步陰

御纂醫宗金鑑卷六

訂正仲景全書傷寒論註太陰全篇目錄

理中丸

乾薑黃連黃芩人參湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

御纂醫宗全錄卷七

訂正仲景全書傷寒論註少陰全篇目錄

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

附子湯

四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

吳茱萸湯

四逆散

黃連阿膠湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

辨陽明病脈證并治全篇

陽明主裏內候胃中外候肌肉故有病經病府之分如論中身熱煩渴目痛鼻乾不得眠不惡寒反惡熱者此陽

明經病也潮熱譯語手足脛下濶然汗出腹滿痛大使硬者此陽明府病也而其侯各有三經病則有邪已傳陽明而太陽之表未罷兼見頭痛惡寒無汗之太陽證者有太陽之邪○罷亦傳陽明但見壯熱有汗心煩不眠口渴引飲之陽明證者有陽明之邪未已後轉少陽兼見胸脇痛寒熱往來口苦而嘔耳聾之少陽證者府病則有太陽陽明謂太陽病或發汗或吐或下或利小便亡其津液胃中乾燥太陽之邪來胃燥而轉屬陽明致小便反數大便硬者所謂脾約是也有正陽陽明謂陽氣素盛或有宿食太陽之邪一傳陽明遂入胃府致大便不通者所謂胃家實是也有少陽陽明謂病已到少陽當和解而反發汗利小便亡其津液胃中燥熱復轉屬陽明致大便難者是也其治陽明經病則以葛根湯或桂枝加葛根湯發之或以白虎湯清之或以柴胡白虎湯和之隨其證而施之可也其治陽明府病雖均為可下然不無輕重之分或攻以三承氣湯下之或麻仁丸通之或當煎膽汁導之量其病而治之可也此陽明病之大略也姑以在經在府二者詳疏於篇俾讀者易為分別則臨證施治自不紊矣

陽明之為病胃家實是也註陽明經內以候肌膚陽明之為病由太陽之邪傳於其經則為陽明病外證由太陽之邪傳入胃府則為胃家實也集註方有執曰陽明經也胃府也實者大便結為難而不得出也雖則遲早不同而非日數所可拘也

傷寒三日陽明脈大註傷寒一日太陽二日陽明三日少陽乃內經言傳經之次第非必以日數拘也此云三日陽明脈大者謂不兼太陽陽明之浮大亦不兼少陽

陽明之弦大而貳正陽陽明之大脈也蓋由去表傳裏邪犯入胃而成內實之證故其脈象有如此者集註方有執曰傷寒三日該中風而大約言也脈大者陽明氣血俱多也○沈明宗曰此正陽明之正脈也仲景謂言陽明脈大因陽明乃多氣多血之府風寒傳入邪盛於中故服顯大是為陽明邪實之正脈但病陽明務具此脈方可下奪或兼太陽之浮緊少陽之弦細或遲寒滑澀虛弱乃屬氣血陰陽之虛雖見大實大滿亦當詳審顧慮或以小承氣湯試之或用審煎導法不得直施攻下也

本太陽初得病時發其汗先出而不透徹乃為汗不如法故未盡之邪因而轉屬陽明也邪在經則為外證邪入府則為胃家實

也集註方有執曰此言由發太陽汗不如法致病入胃之大意

陽明病若能食名中風不能食名中寒註太陽之邪傳陽明病有自中風傳來者有自傷寒傳來者當於食之能否辨之若能食名中風是自中風傳來者以風乃陽邪陽能化穀故能食也不能食名中寒是自傷寒傳來者寒乃陰邪不能化穀故不能食也註方有執曰此以食之能否驗風寒之辨蓋陽明主水穀風能食陽能化穀也寒不能食陰不殺穀也名猶言為也中寒即傷寒之互詞大意推原風寒自太陽傳來其辨驗有如此者非謂陽明自中而然也○汪琥曰仲景云中寒與傷寒同義非真寒證也若係真中寒是胃家虛冷藥宜理中湯之類今不

能食者胃氣和但亦未入府不作營熱耳因名中寒實與傷寒無異

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也註陽明病有外證內證潮熱自汗不大便內證也身熱汗自出不惡寒反惡熱則知為陽明外證故不與中風外證同也然陽明之熱發於肌內必蒸蒸而然又不似太陽之陣陣發熱可知矣集方有執曰此以太陽中風傳入陽明之外證言○魏荔彤曰病有太陽中風不解傳入陽明者何以辨之故設問曰陽明未知其裏之何時傳來必先驗其外之何所見證答曰太陽病有身熱汗自出而惡風者此太陽中風之本證也若身熱汗自出竟不惡風寒而反惡熱則病已去太陽而入陽明矣此陽明病由太陽中風而傳入者也集問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也註太陽而當惡寒陽明病當惡熱今陽明病有初得之一日不發熱而惡寒者是太陽去表之邪未盡故仍惡寒也然去表未盡之邪欲傳陽明不能久持故惡寒必將自罷即日當自汗出而惡熱矣集方有執曰此以太陽傷寒傳入陽明之外證言○程應旄曰陽明惡寒終是帶表至於府病則惡熱矣表之罷否須於比驗之○鄭重光曰此辨陽明傷寒之外證不發熱而惡寒起自傷寒也惡寒將自罷邪過表也即自汗出邪熱鬱於肌肉腠理開汗外洩也○魏荔彤曰太陽傷寒亦有傳入陽明者又何以辨之故設問曰病有得之一日起初之時不見發熱而但見惡寒者何病也答曰得之一日惡寒雖為太陽傷寒之證而惡寒亦將自罷即自汗出而惡於此是陽明病由太陽傷寒而傳入者也可知太陽中風則發熱惡風汗自出為正病太陽傷寒則惡寒無汗為正病若傳入陽明則必以汗出惡熱為正病也○問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日即止此為陽明病也註此釋上條陽明惡寒偏夢之義陽明屬胃居中土也土為萬物所歸故邪熱歸胃則無所復傳亦萬物歸土之義陽明初病一日雖仍惡寒是太陽之表未罷也至二日惡寒自止則是太陽之邪已悉歸併陽明此為陽明病也集方有執曰惡寒二日自止者熱入裏而將惡熱此以正陽陽明言也○程應旄曰六經雖分陰陽而掌之者胃五藏六府皆朝宗而貫令焉一有燥熱無論三陽傳來之邪從而化熱即三陰傳來之邪亦轉屬而變於陰陽之邪皆歸胃土故曰萬物所歸無所復傳也○問曰何緣得陽明病答曰太陽病者於汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也註問曰何緣得陽明胃實之病答曰由邪往太陽時發汗若下若利小便皆為去邪而設治之誠當則邪解而愈矣如其不當徒亡津液致令胃中乾燥則未盡之表邪乘其燥熱因而轉屬陽明為胃實之病者有二不更衣即太陽陽明脾約丸及蜜煎土瓜根桔梗汁導法之所由分也集方有執曰古人大便必更衣不更衣言不大便也○程應旄曰轉屬脅氣素盛胃有宿食即未經汗下而亦入胃之實也故已經汗下者為奪血致燥之陽明以滋燥為主未經汗下者為熱盛致燥之陽明以攻熱為急此三承氣湯脾約丸及蜜煎土瓜根桔梗汁導法之所由分也集方有執曰古人大便必更衣不更衣言不大便也○程應旄曰轉屬脅次不止有表罷不能之分而表罷入裏者復有崇實甚小實之辨所以有不更衣之易明病者為實之易明病者為虛之易明病者

未必復成內審答云方其太陽初病時下之不當徒立津液胃中之物去之不盡邪傳陽明而成燥瘘故有內實之證○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也註陽明可下之證不止於胃家實是也其綱有三故又設問答以明之也太陽之邪乘胃燥熱傳入陽明謂之太陽陽明不更衣無所苦名脾約者是也太陽之邪乘胃宿食與燥熱結謂之正陽陽明不大便內實滿痛名胃家實者是也太陽之邪已到少陽法當和解而反發汗利小便傷其津液少陽之邪復乘胃燥轉屬陽明謂之少陽陽明大便澀而難出名大便難者是也集程知曰言三陽皆有胃府之證也陽明為水穀之海中土為萬物所歸故三陽經皆能入其府邪自太陽傳入胃府者謂之太陽陽明即經所謂太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞶者是也由脾之飲約故用小承氣微下以和之邪自陽明經傳入胃府者謂之正陽陽明即經所謂發熱汗出胃中燥鞶譖語者是也乃胃中邪實故用太承氣以攻下之邪自少陽轉屬胃府者謂之少陽陽明即經所謂少陽不可發汗發汗則讞語此屬胃者是也係津液內竭故用麻仁丸潤下以和其津液也若三陽外證未除則陽明正治之法又不可用矣○陽明病脈浮而緊者必熱潮發作有時但浮者必盜汗出按自汗是陽明證盜汗是少陽證盜汗當是自汗之義始屬註陽明病在經脈當浮長入府脈當實大今脈浮而緊潮熱有時者是陽明病而見太陽傷寒脈也則知是從傷寒傳來太陽傷寒之邪未罷必無汗故雖見陽明潮熱發作有時之證仍當從太陽陽明傷寒治之宣麻黃加葛根湯汗之若見潮熱發作有時之證而脈但浮不緊是陽明病而見太陽中風脈也則知是從中風傳來太陽中風之邪未罷必自汗出當從太陽陽明中風治之宜桂枝加葛根湯解之註沈明宗曰此陽明證而見太陽脈也脈浮而緊太陽表寒未罷之脈潮熱發作有時則陽明裏證已具但浮者太陽風傷衛脈故必汗出也○陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯按汗出多之下當有發熱二字若無此二字脈遲汗出多微惡寒乃是表陽虛桂枝附子湯證也豈有用桂枝湯發汗之理乎必是傳寫之遺註陽明病脈當數大今脈遲汗出多設不發熱惡寒是太陽表邪已解矣今發熱微惡寒是表猶未盡解也故宜桂枝湯解肌以發其汗使初入陽明之表邪仍還表而出也註程知曰此言中風傳陽明表邪未解仍宜用桂枝湯以解肌也○汪琥曰此太陽病初傳陽明經中有風邪也脈遲者太陽中風緩脈之所變傳至陽明邪將入裏故脈變遲汗出多者陽明熱而肌腠疏也微惡寒者在表風邪未盡也故仍從太陽中風例治之又曰雖從太陽例治但既云陽明病仲景濟還宜用桂枝加葛根湯為是○陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯註陽明病脈應浮大證應汗出今脈但浮善病脈也無汗而喘表實證也是太陽之邪未悉入陽明猶在表也當仍從太陽傷寒治之發汗則愈宜麻黃湯註張路曰陽明蒙衝難辨辨之全藉於脈證風邪之脈傳至陽明自汗已多則緩去而遲在寒邪之脈傳至陽明發熱甚則緊去而浮既皆邪氣在經之徵若入府則遲者必數浮者必實矣設不數不實非胃實也必不勝攻下矣○汪琥曰無汗而喘但浮不緊何以定其為陽明病必其人目痛鼻乾身熱不得眠故云陽明病也○魏荔彤曰此太陽陽明之證入陽明未深故令其邪仍自表出不致歸於胃而無所復傳也○陽脈微而

汗出少者為自和也汗出多者為太過陽脈實因發其汗出多者亦為太過太過者為陽絕於裏亡津液大便因鞶也註此承上條互詳其脈以其證也脈陽微謂脈浮無力而微也陽脈實則熱盛因熱而發其汗出多者亦為太過汗出太過則陽極於裏亡津液大便因鞶而成內實之證矣勢汗出多者為太過不解也陽脈實則熱盛因熱蒸表作汗若汗出少者為自和欲解不得不用下法故欲發其汗者不可不早慮及此也集注喻昌曰陽微者中風之脈陽微緩也陽實者傷寒之脈緊實也陽絕即亡津液之互解仲景每於亡津液者悉名無陽玩本文陽絕於裏亡津液大使因鞶甚明傷寒發太陽膀胱經之汗即當顧慮陽氣以膀胱主氣化故也發陽明胃經之汗即當顧慮陰津胃中藏津液故也所有陽多有熱越之證謂胃中津液隨熱而盡越於外汗出不止耳然則陽明病不論中風傷寒脈微脈實汗出少而邪將自解汗出多則陰津易致竭絕也○陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也註陽明病法當汗多反無汗其身如蟲行皮中狀者以其人胃氣久虛邪鬱於太陽之表陽明肌腠不能宣發作汗故也且葛根湯小劑微汗和其肌表自可愈也集注汪琥曰按此條論仲景無治法常器之云可用桂枝如黃耆湯邪雖云宜用桂枝麻黃各半湯不知上二湯皆太陽經藥今係陽明無汗證仍宜用葛根湯主之○魏荔彤曰陽明病法應多汗今反無汗但見身如蟲行皮中狀者此邪熱欲出表作汗而正氣衰弱不能達之也○陽明病初欲食不便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有創狀是太陽之表未除也奄忽也亟然發狂汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脈緊則愈註陽明病初欲食知其從中風熱邪傳來也陽明受邪當小便數大便鞶今小便反不利大便自調知津未傷而胃自和不成裏實也既不成實則在經之邪本輕可自愈也若其人骨節疼翕翕如有創狀是太陽之表未除也奄忽也亟然發狂汗出而解者蓋以太陽傳來之邪本輕陽明所受之邪自淺津未傷而胃自和仍當還表作解也然待發狂而解者胃中水氣不勝初欲食之穀氣穀氣長陽化熱水不勝熱讓汗共併而出所以發狂作解也凡將汗解脈必先浮今言脈緊則愈者亦邪還於表欲解應見之脈也○傷寒發汗無汗嘔不能食而反汗出濶濶然者是轉屬陽明也註傷寒發熱無汗嘔不能食為太陽之邪欲傳也若無汗為太陽陽明之表尚在汗之可也今反汗出濶濶然者是邪已轉屬陽明之府可下不可汗也集注成無己曰傷寒發熱無汗嘔不能食者太陽受病也若反汗出濶濶然者是太陽之邪轉屬陽明也故經曰陽明病法多汗方有執曰嘔不能食入胃也反汗出者肌肉著於膚腠反閉也○程應旄曰太陽本證現在而反汗出濶濶然者雖表證未罷已是轉屬陽明也濶濶連綿之意即俗云汗一身不干又一身是也○傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之註傷寒之邪傳入陽明脈浮發熱無汗其表不解者雖有燥渴乃青龍湯證不可與白虎湯即有陽明渴欲飲水熱證應與白虎者亦必審其無太陽表證始可與也加人參者以其脉浮不滑非有餘也且欲於大解熱中速生其津液也集注鄭重光曰此申明用白虎湯之法以白虎但能解熱而不解表若稍帶外感有無汗惡寒身痛頭疼之表證慎不可用也

白虎加入參湯方於白虎湯方內加人參三兩餘依白虎湯方

傷寒脈浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之按王三陽石經文案序當邪字解亦然也

陽證龍邪傳陽明表裏俱然而未成胃實之病也脈浮滑者浮為表有熱之脈陽明表裏有熱當發熱汗出滑為裏有熱之脈陽明裏有熱當煩渴引飲故曰表有熱裏有熱也此為陽明表裏俱熱之證白虎乃解陽明表裏俱熱之藥故主之也不加人參者以其未經汗吐下不虛故也

註程知曰滑則裏熱云浮脈則表裏俱熱矣大熱之氣得辛涼而解猶之暑暘之令得金風而爽故清涼之劑以白虎名之又曰厥陰條中有傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之可證此條之非裡有寒矣○魏荔彤曰此裏尚為經絡之裏非藏府之裏亦如衛為表榮為裏非指藏府而言也

白虎湯方

知母
石膏
石膏
甘草
粳米

二兩
一斤
二兩
二兩
六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

註柯琴曰

陽明邪從熱化故不惡寒而恐熱熱蒸外越故熱汗出熱燙胃中故渴欲飲水邪盛而實故脈滑然猶在經故兼浮也蓋陽明屬胃外主肌肉雖內外大熱而未實終非苦寒之味所宜也石膏辛寒半能解肌熱寒能勝胃火寒能沉內半能走外此味兩擅內外之能故以為君知母苦潤苦以濡火潤以滋燥故用為臣甘草粳米調和於中宮且能濡火土中稼穡作甘寒制之緩其寒苦剝得平甚苦使二味為佐庶太寒太苦之品無傷損脾胃之慮也者湯入胃輸脾歸肺水精四布大煩大渴可除矣白虎為西方金神取以名湯秋金得令而炎暑自解方中有更

加人參者亦補中益氣而生津也用以協和甘草粳米之補承制石膏知母之寒渴火而土不傷乃操萬全之術者也

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯註病人謂病太陽經中風傷寒之人也太陽病煩熱汗出則應解矣今又寒熱如瘧狀每至日晡所即發潮熱日晡者乃申酉陽明王時故曰屬陽明也證雖如此當審其果盡歸陽明耶抑或尚兼太陽也故又當以脈辨之若脈實者邪已入裏則汗出潮熱為陽明下證宜與大承氣湯氣下之若脈浮虛者邪尚在表則寒熱如瘧仍屬太陽當汗之證也宜與桂枝湯汗之註程知曰病人得汗後煩熱解太陽之邪將盡未盡其人復如瘧狀日晡時發熱則邪入陽明審矣然雖已入陽明尚未離太陽故必重辨其脈脈實者可下若脈浮虛者仍是陽明兼太陽便宜汗而不宜下也

○太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞶者與小承氣湯和之愈註太陽病若吐若下若發汗後不解入裏微煩者乃施子政湯

證也今小便數大便因鞶是津液下奪也當與小承氣湯和之以其結熱未甚入裏未深也註喻昌曰微煩小便數大便因鞶皆是邪漸入裏

之機故與小承氣湯和之○程應旄曰吐下汗後而見煩證徵之於大便鞶固非虛煩者比然煩既微而小便數當由胃家失潤燥氣客之使

然胃雖實非太實也以小承氣湯取其和也非大攻也

小承氣湯方

大黃
厚朴
枳實

四兩
二兩
三枚大

右

上

三味以水四升煮一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若

更衣者勿服之

趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則鞶其脾為約麻仁丸主之註趺陽胃經脈也趺陽脈浮而濇陽浮則胃氣強陰濇

則小便數陰陽相搏則鞶盛而液竭矣故大便則鞶也其名為約者謂脾為邪所約束不能為胃行其津液故名脾約也以麻仁丸主之養液

潤燥清熱通坐其不敢恣行承氣者以脈濇故也。譙程知曰言胃脈浮濇不可大攻宜用麻仁九潤法也。趺陽胃脈也在足跗上動脈應手浮則陽熱盛而胃強濇則陰津少而小便數脾主為胃行其津液者也。胃陽強則脾陰弱不能為胃行其津液故約其食物如一二彈丸也。此不當下而當潤之。程應旄曰麻仁九潤燥通幽傷寒不可恣行大承氣湯可知矣。所以然者以其為太陽陽明非正陽陽明胃家實者此也。推之少陽陽明其不可以正陽陽明胃家實之法治之更可知矣。汪琥曰以胃強脾弱為脾約作解蓋以胃中之邪熱盛為強陽故脈浮脾家之津液少為陰弱故脈濇用麻仁丸者以漏胃中之陽而扶脾之陰也。

麻仁丸方 麻仁二升 芒硝半升 枳實半升 大黃一兩

皮酒浸去皮去皮 厚朴一兩 杏仁一升去皮尖

右六味蜜合丸如桐子大飲服十九日三服漸加

以和為度。譙方有執曰麻子仁能潤乾燥之堅實厚朴能導固結之滯為藥斂液以輔潤大黃推陳以致新牌雖為約比能疏之

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯註傷寒吐後胸不脹滿而腹脹滿者是表邪已去胃中壅熱故也。宜與調胃承氣湯下具熱而和之以無鞭痛故不用大小承氣也。譙程知曰言吐後腹脹滿宜調胃也。熱在上焦則吐後腹脹滿則邪不在胸其為裏實可知然脹滿而不鞭痛自不宜用急下之法但與調胃承氣和其胃熱可耳。內經云諸脹腹大皆屬於熱也。○程應旄曰吐傷津液燥氣不能下達遂成土鬱是以腹脹滿用調胃承氣一奪其鬱可耳。

調胃承氣湯方 大黃四兩去皮酒浸半升 甘草二兩 甘硝半升 右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更煮兩沸少少溫服之。方名調胃承氣

者有調和承順胃氣之義。非若大小承氣專攻下也。經曰溼熱於內治以鹹寒火淫於內治以苦寒君大黃之苦寒臣芒硝之鹹寒二味並舉攻熱濕火之力備矣。攻其速下故佐甘草之緩又恐其過下故少少溫服之其意在不峻而和也。

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯。陽明病謂之傳陽明不吐不下心煩者謂未經吐下而心煩也。其為熱盛實煩可知故與調胃承氣湯。濶熱而煩自除也。譙成無已曰吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩則是胃有鬱熱也。與調胃承氣湯以下其鬱熱。○喻昌曰胃氣及津液既不由吐下而傷則心煩明係胃中熱熾故可與調胃承氣湯。陽明發熱汗多者急下之宜大承氣湯。註陽明病不大便發熱汗多不止者雖無內實亦當急下之。蓋因秋氣太蒸於內恐致陰津暴亡於外故以全津液為急務也。宜大承氣湯下之。譙喻昌曰汗多則津液外滲加以發熱則津液盡隨散就蒸蒸騰達於外更無他法以止其汗惟有急下一法引熱勢從大腸而出庶津液不致盡越於外耳。○程應旄曰此等之下皆為救陰而設不在奪實。奪實之下可緩救陰之下不可緩。○沈明舌曰陽明裏實以潮熱微汗為正症見發熱汗多乃裏熱熾盛之極矣。腸胃中津液盡越於外非正奪其邪以救津液不可故宜大承氣湯急下也。

大承氣湯方 大黃四兩酒洗厚朴半兩助火枳實五枚芒硝三合右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服。肺諸積熱結於裏而成滿瘡實者均以大承氣湯下之以滿者腹脹急腹脹故用厚朴以消氣壅者心下痞塞便堅故用枳實以破氣結燥者腸中燥屎乾結故用芒硝潤燥軟堅實者腹痛大使不通故用大黃攻積為熱然

必審西證之輕重四藥之多少適其宜始可與也若邪重則邪氣不退則陽虛不可不慎也柯琴曰諸病皆由於氣物之不去由於氣之不順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯方分大小有一義馬厚朴倍大黃是氣藥為君名太承氣大黃倍厚朴是氣藥為臣名小承氣味多性猛制大其服欲令大渴下也因名曰大承氣法不同此可見仲景欲使芒硝先化燥義太承氣用水一升煮朴枳取五升去滓內大黃再煮取二升內芒硝何哉蓋生者氣銳而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒硝先化燥屎太黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同一大黃而前法不同此可見仲景微和之意也○程知曰調胃承氣大黃用酒浸太承氣大黃用酒洗皆為芒硝之鹹寒而以酒制之若小承氣不用芒硝則亦不事酒浸洗矣

陽明病下之心中懊惱而煩冒中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞦後必溏不可攻之若有燥屎者宜太承氣湯註陽明病下之後心中懊惱而煩者若腹大滿不大便小便數知胃中未盡之燥屎復鞦也乃可攻之若腹微滿不可攻也誤攻必致脹滿不能食飲水則噦等逆矣若果有燥屎宜下者以太承氣湯下之集譙方有執曰可攻以上以轉失氣言懊惱懊惱痛恨之意益藥力不足以勝病燥鞦欲行而不能故曰可攻言當更服湯以促之也腹微滿以下以不轉失氣言頭鞦後溏裏熱輕也故曰不可攻之言當止湯勿服也○程知曰言有燥屎即可大攻下也下後心中懊惱而煩者虛煩也當與梔子豉湯若胃有燥屎則非虛煩故可攻腹不甚滿則無必下之法有燥屎則非先鞦後溏者也故可攻又曰便鞦與燥屎不同便鞦者大便實滿而鞦燥屎者胃中宿食因胃熱而結為燥鞦之屎也故便鞦猶有用小承氣者若燥屎則無用芒硝之鹹寒也○程應旄曰末句乃申可攻句以決治法得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩燥心下鞦至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞦後必溏未足成鞦攻之必溏須小便利屎定鞦乃可攻之宜大承氣湯註得病二三日無太陽少陽證煩燥心下鞦至四五日不大便若脈太虧正陽明胃實之證也下之無疑今脈弱雖胃和能食不可輕下祇可與小承氣湯少少與而微和之令其小安次日仍不大便繼與小承氣湯促之若六七日竟不大便而小便少者即不能食亦屬胃中尚未乾燥屎未定鞦如大攻之初見鞦後必溏也須待小便利知屎定鞦乃可攻之宜大承氣湯集譙方有執曰太陽不言藥以桂枝麻黃之不同也少陽言藥以專主柴胡也凡以此為文者皆互發也以無太少二經證故知此屬陽明以脈弱故宜微和至六日以下乃歷叙可攻不可攻之節度也○程應旄曰能食以結在腸間而胃火自盛也先以小承氣湯少少與之和胃中之火令小安後以前藥增至一升去腸中之結既用小承氣矣而又減去分數接續投之以脈弱之胃甚者素虛而為日久未也○張璐曰此段之能食不能食全與辨風寒強弱無涉言能食者不可以為胃强而輕下不能食者不可以為胃中有燥屎而輕下也○陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濶然汗出者此大便已鞦也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外求解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下註陽明病脈遲雖汗出不惡寒外證欲解而脈不實尚可攻也若其人身重然困於體也短氣而喘熱壅於上也腹滿潮熱聚於中也手足濶然汗出大便已鞦熱結於下也斯為外邪已解內實已成始可攻之

主以太承氣湯可也若汗出微發熱惡寒者則外猶未解其熱不潮者裏猶未實也不可與承氣湯即有裏急腹大滿不通等證亦祇宜與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下蓋以脈遲故也註方有執曰潮熱陽明王於申酉戌故熱作於此時如潮之有信也手足濶然而汗出者脾主四肢而胃為之合胃中燥實而蒸蒸騰達於四肢故曰大便已轉也○林潤曰此節辨脈遲內結之或宜太承氣攻之或但可以小承氣微和之也陽明病脈遲證兼汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘似屬可攻然必有潮熱者為外證已解裏證已具足濶然而汗出者為大便已轉主以太承氣湯攻之矣疑若汗出雖多猶見發熱惡寒則表尚在也其熱不潮汗亦非手足濶然之汗安可與承氣攻之乎即腹大滿不通亦祇可與小承氣微和勿令大泄下此何以故脈遲便非必下之脈雖內結亦豈太承氣所宜哉○陽明病潮熱大便微轉者可與太承氣湯不轉者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭轉後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後轉者必大便復轉而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也註陽明病潮熱大便微轉者可與太承氣湯不轉者不可與之也若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣氣則為有燥屎乃可攻之若不轉失氣此但初頭轉後必溏是尚未成轉也不可攻之攻之必寒氣乘虛上述脹滿不能食也欲飲水者得水則噦亦由虛寒之氣上述不能化水而下輸也若其後所發潮熱不退必是大便再轉但已經下後所轉者無多祇以小承氣湯和之可也故凡服承氣湯不轉失氣者慎不可攻也此蓋仲景戒人不可輕下之意註方有執曰此以潮熱轉失氣次第而詳言之以決當下之候也轉失氣反屁出也脹滿樂寒之過也噦亦寒傷胃也復轉而少者重下故也末句重致叮嚀之意○喻昌曰若腹中氣仍不轉則不但用太承氣大差即小承氣亦差矣○程知曰上條曰外欲解可攻裏曰外未解未可與承氣曰可與小承氣微和胃氣勿令大泄下此條曰可與曰不可與曰乃可攻之不可攻之曰少與小承氣曰以小承氣和之慎不可攻多少商量慎重之意故惟手足濶然汗出大便燥轉者始主之以太承氣若小承氣猶是微和胃氣之法也○汪琥曰轉失氣則知其人大便已轉腸胃中燥熱之甚故其氣不外宣時轉而不轉失氣則腸胃中雖有熱而滲孔未至於燥此但初頭轉後必溏也○陽明病譏語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者勿更與之明日又不大便脈反微濶者裏虛也為難治不可更與承氣湯也註陽明病譏語潮熱脈滑而疾者是可攻之證脈也然無濶滅然之汗出與小便數大便轉燥實等證則不可驟然攻之宜先與小承氣湯一升試之若腹中轉失氣則知腸中燥屎已轉以藥少未能遽下所轉下者但屎之氣耳可更服一升促之自可下也若不轉失氣則勿更與服俟明日仍不大便診其脈仍滑疾則更服之今脈反見微濶則是裏虛無氣不能運送故為難治○傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡證祇宜以小承氣湯下之下之而脉反微濶證變裏虛故為難治○傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語加見鬼狀多劇首候則不識人猶衣摸床物而不安寐而直視脈皮者生傷寒之證者曰脉微而緩者曰脉微而急者曰脉微而利者曰脉微而利則止

服接趙嗣真曰活人書云發者陽也濇者陰也陽病見陽脈者生在仲景脈法中發濇屬陰不屬陽乎今觀本太內脉弦有之發字當是濇字若是眩字弦為陰負之脈豈有必生之理惟滑脈為陽始有生理滑者通濇者塞凡物理皆以通為生塞為死玩上條脈滑而疾者小承氣主之脈微濇者裏虛為難治益見其誤註傷寒若吐甚後津液已亡而表不解邪因人裏不大便五六日上至十餘日仍不大便日晡所發潮熱不惡寒者此乃表邪悉罷裏熱漸深也仍宜太承氣湯滿盡餘邪以存陰液自可愈也若因循失下以致獨語如見鬼狀病勢劇者則不識人循衣摸床驚惕不安微喘直視見一切陽亢陰微孤陽無依神明擾亂之象當此之際惟診其脈滑者為實堪下則生濇者為虛難下則死若病勢微者但見潮熱譏語不大便之證而無前神昏等劇者宜以太承氣湯下之若一服利即止後服益恐其過也按循衣摸牀危惡之候也一以陰氣未竭為可治如太陽中風火劫變速捻衣摸床小便利者生不利者死是也一以陽熱之極為可攻如陽明裏熱成實循衣摸床脈滑者生濇者死是也大抵此證多生於汗吐下後陽氣大虛精神失守經曰四肢者諸陽之本也陽虛故四肢擾亂失所倚也以獨參湯救之汗多者以參耆湯厥冷者以參附湯治之愈者不少不可概謂陽極陰竭也註喻昌曰此條舉諺語之勢重者為言而勢重之中復分二等劇者主死微者主生故以太承氣湯下之程知曰裏全善治循衣摸床每以補益得愈亦因其脈證之不足也劉守真每以承氣治熱病法雖主於仲景而辨證其未能如此詳悉故開後人幽禁之端又曰喘則氣逆上脫微喘者邪實於內而又不能大喘也不識人循衣摸牀心欲絕也動惕不安肝欲絕也微喘肺欲絕也直視腎欲絕也內經所謂三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行藏府不通故脈濇者死也

(一)汪琥曰日晡所發潮熱者二府寢燥甚故當其經氣王時發潮熱也獨語者卽諺語也病人自言為諺獨語如見鬼狀乃陽明府而妄見妄聞劇者甚也成註曰熱甚昏冒正氣故不識人循衣摸牀者陽熱偏勝而躁動於手也惕而不安者胃熱冲膈心神為之不寧也又胃熱甚而氣上逆則喘直視則邪干臟矣故其生死之機須於脈候決之

(二)陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也註陽明病本應自汗出醫誤以為風邪更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞕故也然無或滿或痛之苦者以重汗亡津液中乾燥故大便鞕本無宿食也則當問其小便日幾行若本一日三四行今日祇再行可知大便不久則出蓋小便數少則津液當還入胃中故知不久必大便自出不須藥也註方有執曰水穀入胃其精者為津液粗者成渣滓水精滲出腸胃之外清者為津液渴者外而欲大便宜審前導而通之若土瓜根及大豬胆汁皆可為導註此承上條詳其義以明其治也陽明病自汗出或發汗小便自利者此為津液內竭雖大便鞕而無滿痛之苦不可攻之當得津液還胃自欲大便燥屎已至直腸難出肛門之時則用蜜煎潤劑導利之或土瓜根宣氣通燥或猪胆汁清熱潤燥皆可為引導法擇而用之可也註成無己曰津液內竭腸胃乾燥大便因鞕此非結熱故不可攻宜以潤柴外治

而導引之。○張璐曰：凡係多汗傷津及屢經汗下不解或尺中脈遲弱元氣素虛之人常攻而不可攻者並宜導法。程應旄曰：小便自利者津液未竭與胃中津液內竭而鞭故自欲大便但苦不能出耳須有此光景時方可從外導法瀆潤其腸腸潤則水流其須津液自歸還於胃故不但大便通而小便亦從內轉矣。

蜜煎連方：蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令集者欲可丸併手搣作挺子令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內轂道中以手急抱欲大便時乃去之。內臺方用蜜五合煎凝時加兒角末五錢龍膽作挺以豬胆汁或油潤轂道內之。

豬膽汁方：大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌轂道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效。

內臺方不用醋以小竹管插入膽內留一頭用油潤內入轂道中以手將膽搣之其汁自入內此方用之甚便。

土瓜根方：缺按土瓜即俗名赤瓈也附也附後方治大便不通採根搗汁用筒吹入肛門內此與上豬膽汁方同義內臺方用土瓜根削如挺內入

轂道中誤矣蓋蜜挺入轂道能烊化而潤大便土瓜根不能烊化如削挺用之恐失仲景製方之義。

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯註少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜大承氣湯者乃因熱勢甚速消灼腎水津液不能到咽故不必待其有可下之證而急下之是下其熱以救將絕之水緩則腎水乾竭陽必無依躁冒自焚而死也目中不了了而睛和者陰證也睛不和者陽證也今傷寒六七日目中不了了睛不和者是腎水為胃陽所竭水既不能制火則火上熏於目而眸子矇矇為之不了了也此熱結神昏之漸危惡之候也雖外無陽證惟身微熱內無滿痛祇大便難亦為熱實故曰此為實也急以大承氣湯下之渴陽救陰以全未竭之水可也睛不和者謂睛不活動也謬方有執曰了了猶矇矇也素問曰陽明主肉其脈伏鼻絡於目靈樞曰足陽明之正上循咽出於口還繫目系合於陽明也又曰足陽明之筋其支者上頭上俠口合於頤太陽為目上綱陽明為目下綱所以目中不了了睛不和知胃實也急下者任脈循面入目督脈上繫兩目中央諸脈皆屬於目而人之精神注焉是以宜急下也。○喻昌曰：少陰有急下三法以救腎水一本經水竭一本邪涌水一土邪凌水陽明亦有急下三法以救津液一汗多津越於外一腹滿津結於內一目睛不慧津枯於中合兩經下法以觀病情生理如身在冰壺腹飲上池矣。○張錫駒曰：陽火亢極陰水欲枯故使目中不了了而睛不和急下之所以抑亢極之陽火而救垂絕之陰水也。○魏荔彤曰：陽明燥屎應下胃實應下俱詳考其脈證矣乃有表裏無他證獨於陽明胃脈所發見端倪處體認其證如傷寒六七日太陽已罷陽明已成其目昏暗矇昧若隔雲霧而不了了明白者此證名為睛不和也陽明熱盛循經絡而發其晝夜之象以致睛失其光此內熱盛而為實其機已兆兼以大便鞭而難身有微熱者則胃實已直故曰此為實也急下之宜大承氣湯。病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯。陽明病之人小便自利大便當鞭小便不利大便不鞭是知鞭不鞭不在熱不熱而在液之竭與不竭也今小便不利而大便乍難乍易者蓋欲將欲作結而液未竭也有時微熱者熱入裏也喘者熱乘肺也胃者熱乘心也不能卧者熱併陽也此皆一派熱結便鞭之微神昏譯狂之漸雖無滿痛亦必有表

林淵曰太水氣下之自愈也。王三陽曰此雖不宣子動必以手按之。脣脰有熱塊。喘冒不能卧。則有燥屎已的自宣下逐裏實為急安。可復以小便利屎定轉始可攻之。常法拘哉。○汪琥曰此條病本經下而有燥屎。乃醫人不易識之證。成無己云小利便則大便軟。此有燥屎乃理之。常令病人小便不利。大便乍難乍易。何以知其有燥屎耶。蓋大寶大滿之證。則前後便皆不通。大便為燥屎。壅塞其未堅結者。或有時而併出。設乍易其極堅結者。緩著於大腸之中。故乍難燥屎結積於下濁氣。攻衝於上。以故時有微熱微熱者。熱伏於內。不得發洩也。後條辨云。渴氣乘於心肺。故既冒且喘也。不得卧者。胃有燥屎。所礙即胃不和。則卧不安也。凡此者。皆是有燥屎之徵。故云宜大承氣湯。○病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁發作。有時者。是燥屎結於上。攻則煩躁不攻則不煩躁。故發作有時也。不須以小承氣湯試之。直以大承氣湯下其燥屎。大便利。自可愈也。辨方有執曰。病人謂凡有病之人。而證犯如此者。則皆當如此治之。此示人辨凡百胃實之大旨也。○程應旄曰。攻法必待有燥屎。方不為誤攻。所以驗屎之法。不可不備。無恃轉失氣之一端也。病人雖不大便五六日。屎之燥與不燥。未可知也。但繞臍痛則知腸胃乾屎無去路。滯滯在一處。而作痛。煩躁發作。又有時伏而不動。亦不煩躁而有繞臍痛者。斷其不大便當無差矣。何大承氣湯之不可攻耶。○大下後六七日。不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。註此承上條以明其治也。下之未盡。仍當下之。乃大下之後。六七日後。不大便。煩亦不解。腹仍滿痛者。此有燥屎下之未盡也。所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。復下之自愈也。註程知曰。大下之後。宜乎病解矣。乃復六七日。不大便。煩不解。而腹滿痛此必有燥屎未盡。而然蓋宿食因煩復為之結硬也。○陽明病下之。其外有熱。手足溫不結胸。心中懊憹。不能食。但頭汗出者。梔子豉湯主之。註陽明經病下之身熱未除。手足溫不結胸者。是所陷之邪淺也。心中懊憹。機不能食。但頭汗出者。是陽邪蒸鬱於胸膈間也。故宜梔子豉湯涌其熱也。註程知曰。其外有熱者。經邪未解也。手足溫者。熱入未深也。○程應旄曰。懊憹擾胃。故饑不能食。熱鬱氣蒸。故但頭汗出。○魏荔彤曰。表邪未全入裏。乃即以為胃實。而遞下之。則其外仍有熱。究不能隨下藥而湯滌也。於是雖熱而不潮。手足雖溫而無澌然之汗出。則是在表者。仍在表而下之徒傷其裏耳。即不至於全在太陽者。誤下成結胸而心下懊憹。機不能食。但頭汗出。其陽明蒸蒸之熱為陰寒之藥所鬱。但凝塞於胸膈之上。其證已昭然矣。但病仍帶表。既不可再下。且已入裏。又不可復發汗。惟有主以梔子豉湯。仍從太陽治也。○傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。註傷寒三陽。多有嘔證。以其風寒之毒未除。胸中陽氣為寒所鬱。故皆不可攻下也。其乾嘔而惡寒。發熱者。屬太陽也。喜嘔而寒熱往來者。屬少陽也。今雖祇有惡寒。不惡寒。大便軟之陽明證。而嘔多亦不可攻之。其氣逆在上。而未欲在實也。註沈明宗曰。惡寒發熱之嘔。屬太陽。明然嘔多。則氣已上逆。邪氣偏侵上脘。或帶少陽。故雖有陽明證。慎不可攻也。○陽明中風口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。若下之。則腹滿小便難也。註陽明謂陽明裏證。中風謂太陽表證也。口苦咽乾。少陽表證也。腹滿陽明裏證也。微喘發熱惡寒。脈浮而緊。傷寒脈也。此為風寒兼傷表裏同病之證。當審表裏施治。太陽陽明病。

多則以桂枝加大黃湯兩解之少陽陽明病多則以大柴胡湯和而下之若惟從裏治而遂以腹滿一證爲熱入陽明而下之則表邪乘虛而陷故腹更滿也裏熱愈竭其液故小便難也據程知曰此言陽明兼有太陽少陽表邪即不可攻也陽明中風熱邪也腹滿而喘熱入裏矣然喘而微則未全人裏也發熱惡寒脈浮而緊皆太陽未除之證口苦咽乾爲有少陽之半表半裏若誤下之則表邪乘虛而腹益滿矣兼以重亡津液故小便難也○程應旄曰此條與太陽大青龍證同太陽以風寒持其榮衛故有煩躁證而無腹滿證此以風寒持住陽明故有腹滿證而無煩躁證然口苦咽乾實與煩躁同其機兆也○陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譖語若加溫鍼必怵陽煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊惱舌上胎者梔子政湯主之若渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也註此承前條互發其義以明其治也前條表證居多戒不可誤下此條裏裏混淆脈證錯雜不但不可誤下亦不可誤汗也若以脈浮而緊誤發其汗則奪液傷陰或加燒鍼必益助陽邪故譖語煩躁怵陽憤亂不眠也或以證之腹滿惡然誤下之則胃中亦虛客氣邪擾動胸膈心中懊惱舌上胎者梔子政湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者爲太陽表邪已裏陽明燥熱正甚宜白虎加人參湯滋液以生津若發熱渴欲飲水小便不利者是陽明飲熱並盛宜猪苓湯利水口乾舌燥者爲太陽病煩熱無汗而渴小便利者大青龍湯證也小便不利者小便不利者青龍湯去半夏加花粉梔苓證也太陽病煩熱有汗而渴小便利者桂枝合白虎湯證也小便不利者五苓散證陽明病煩熱無汗而渴小便利者宜葛根湯加石膏主之小便不利者以五苓散加石膏寒水石滑石主之陽明病煩熱有汗而渴小便利者宜白虎湯小便不利者以梔子湯少陽病寒熱無汗而渴小便利者當以小柴胡湯去半夏加花粉梔苓證也太陽病煩熱有汗而渴小便利者當以小柴胡湯加梔子大陰無濕少陰陽邪煩嘔小便亦而渴者以梔子湯少陰陰邪下利小便白而渴者以真武湯厥陰陽邪消渴者白虎加人參湯厥陰陰邪轉屬陽明渴欲飲水者少與之則愈證既不同法亦各異當詳審而明辨之註喻昌曰發熱以上與前條同而汗出不惡寒反惡熱身重者皆陽明之見證所以汗下燒鍼俱不可用古上胎則膈熱盛故涌以梔子而撤去其膈熱斯治太陽而無碍陽明矣若前證更加口乾舌燥則宜用白虎湯以解熱生津更加小便不利則宜以梔子湯以導熱滋潤也其汗多而渴不可與梔苓湯者以熱邪傳入陽明必先耗其津液加以汗多復食之於外又利小便更奪之於下則津液有立亡之患汝示懸樞曰然在上焦故用梔子政湯熱在中焦故用白虎加人參湯熱在下焦故用梔苓湯

猪苓

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

各一

兩碎

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消溫服七合日三服

註趙

景製猪苓一湯以行陽明少陰二經水必然其吉全在益陰不專利水蓋傷寒表虛最忌亡陽而裏虛又患亡陰亡陰者亡腎中家之淮液也故陰虛之人不但大便不可輕動即小水亦不可下通倘陰虛過於利水則津液反致耗傷方中可此皆非所宜

於太陽用五苓者以太陽職司寒水故加桂以溫之是煖腎以行水也於陽明少陰用諸苓者以二經兩關津液特用阿膠滑石以潤之是滋養無形以行有形也利水雖同寒溫迥別惟明者知之

脈浮而大心下反鞭有故屬藏者攻之不令發汗屬府者不令漫數洩數則大便鞭汗多則越愈汗少則便難脈遲尚未可攻註屬藏謂屬裏也屬府謂屬表也漫謂小便也脉浮而大太陽陽明脉也浮屬表大屬裏今太陽脉浮之表未解而心下反鞭陽明之裏又急權乎汗下可也設裏有熱實攻之無疑不須先汗以解外也如無熱實而有脈浮之表不但不令攻之即小便不利亦不令利小便仍當解外也蓋恐洩數汗多亡其津液致大便鞭則熱愈實也若汗少脈遲即有便鞭裏尚未實不可攻也謙玉青堂曰論言脈浮大反發汗反下之為逆此以心下鞭有熱知傳邪人裏故舍脈而從證也大便則許攻之小便則不許利何也曰攻大便則內熱除利小便則津液傷也○林淵曰心下鞭與腹鞭滿不同腹鞭邪已結聚成實此但在心下自與非下不可者異矣肺與臟對舉而言一為入裏一猶屬表之義也○陽明病脈遲食難用飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也註陽明病不更衣已食如饑食輒腹滿脈數者則為胃熱可下證也今脈遲遲為中寒中寒不能化穀所以雖饑欲食食難用飽飽則煩悶是健運失度也清者阻於上升故頭眩濁者阻於下降故小便難食鬱濕瘀此欲作穀疸之微非陽明熱濕腹滿發黃者比雖下之腹滿漸減頃復如故所以然者脈遲中寒故也謙方有執曰遲為寒不化穀故食難用飽濕鬱而蒸氣逆而不下行故微煩頭眩小便難也疸黃病也穀疸水穀之濕蒸發而身黃也○張璐曰下之腹滿如故蓋腹滿已是邪陷脈遲則胃不實徒下其糟粕病既不除而反害之耳夫陽明證本當下陽明而至腹痛尤當急下獨此一證下之腹滿必如故者緣脈遲則胃氣空虛津液不充其滿不過虛熱內壅非結熱當下之比也可見脈遲胃虛不但下之無益即發汗利小便之法亦不可用惟當用和法如甘草乾薑湯先溫其中然後少與調胃微和胃氣可也○程應旄曰熱蓄成黃之腹滿下之可去此則穀氣不得宣洩屬胃氣虛寒使然下之益虛其虛矣故腹滿如故○陽明病若中寒者不能食小便不利手足厥然汗出是可下之證也今中寒不能食小便不利雖手足厥然汗出不可下也此為中寒欲作固瘕何以知之以大便必初鞭而後溏也所以然者胃中虛水穀不分故小便不利而大便必溏也禁不能食與上條食難用飽同一不能腐熟水穀也小便不利與上條小便難同一不能下輸膀胱也惟手足厥然汗出與上條飽則微煩頭眩不同彼欲作穀疸此欲作穀不別故也註陽明病內熱則不大便能食小便利手足厥然汗出是可下之證也今中寒不能食小便不利雖手足厥然汗出不可下也此便難欲作穀疸以其尚能少食微煩猶有陽氣故也此條中寒不能食手足冷汗小便不利欲作固瘕則是寒濕不化純陰故也固瘕者大瘕鴻也俗謂之溏鴻固者久而不正之謂也按人之汗以天地之兩名之陰陽和而後有雨陽亢則然而雨少陰盛則寒而雨多入之汗亦若是也四肢手足屬土土主脾胃若脈大其汗蒸然而熱則為陽盛可下之證也若脈遲其汗蒸然而寒則為陰盛可溫之證也謙程應旄曰水穀

不別屬濕熱偏滲者多此點出胃中冷飲人知病本於寒宜從寒治不下便也○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必硬不更衣十日無所苦也渴欲飲水少與之但以法救之渴者宜五苓散按但以法救之五字當是若小便不利方與上文小便數下大渴者之義相合此條病勢不急救之之文殊覺無謂必有遺誤王三陽亦云此處五苓散難用不然經文渴者之下當有闕文也註太陽病浮緩而弱中風脈也發熱汗出惡寒中風證也不嘔則裏氣和緣何而有心下痞證此必以醫下之故也如其不經醫下邪熱自傳於裏病人不惡寒而渴者此邪去太陽已轉屬陽明也若小便數者大便必硬然便不更衣十餘日而無或滿或痛之苦是仍屬虛燥不實之較不可議下俟之可也如或渴欲飲水必是胃中乾燥當少少與之以滋其胃可耳其或小便不利而渴者是又為水停不化宜五苓散以導其所停之水參益病在膀胱故仍治太陽而不治陽明也集張兼善曰十日不更衣而不用攻伐何也曰此非結熱雖不大便而無潮熱證語可下之證當須審慎勿以日數久而輒為攻下也○喻昌曰寸緩關浮尺弱發熱汗出惡寒純是太陽中風未罷之證設非誤下何得心下痞結耶如不誤下而太陽證必漸傳經乃至不惡寒而渴邪入陽明審矣然陽明津液既偏滲於小便則大腸失其潤而大使硬與腸中結自是不同所以旬日不更衣無所苦也○汪琥曰小便數大便硬仲景論中何以無治法耶蓋此正是仲景不須用藥處係其陰陽自和則小便漸少大便必自出也○陽明病心下硬滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈註此申上條痞硬不更衣十日無所苦誤攻之變也陽明病非胃家實而心下硬滿者不可攻之若攻之其人利不止者則正脫而死其人利自止者邪退則猶可愈也集汪琥曰或問結胸證同是心下硬滿又屬可下何也蓋結胸證心下硬滿而痛者為胃中實故可下此證不痛當是虛硬虛滿與半夏瀉心湯之心下痞略同故云不可攻也○諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇註虛者下之是為虛虛陰津消亡自然大渴其求水者陽氣猶存故易愈若惡水者陽氣已絕則難愈矣集程應旌曰諸虛者陽津陰液必有所亡故下之則大渴求水者亡陰惡水者亡陽故有愈劇之分觀此知仲景慮誤下之亡陰矣

陽明病下血證語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之瀉然汗出則愈註婦人病傷寒經血適至則有熱入血室之證宜刺期門男子病傷寒有下血證語者亦為熱入血室也若熱隨血去必通身汗出而解矣若血已止其熱不去蓄於陽明不得外越而上蒸但頭汗出而不解者亦當刺期門隨其實而瀉之則亦必通身瀉然汗出而愈也集方有執曰血室頭汗期門註皆見太陽屬中陽明之脈其直者從缺盆下乳內廉下伏膚入氣街中血室之脈起於氣街上行至胸中而散所以婦人經來熱入血室則似結胸而證語從陽明裏也男子下血熱入血室但頭汗出亦當攝於陽明外也故血宜刺期門

下血亦當攝於陽明外也故血宜刺期門

和而心氣上通故微然汗出而解○陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄註陽明屬胃開竅於口陽明有熱故口燥也但欲漱水不欲嚥者雖燥而不渴知熱在經而不存府在血而不存氣也熱在經血迫血妄行必致衄也謙喻昌曰口中乾燥與渴異漱水不欲嚥知不渴也陽明病口燥但漱水不欲嚥知邪入血分陽明之脈起於鼻故知血得熱而妄行必由鼻而出也○沈明宗曰陽明病口燥漱水而不欲嚥乃邪鬱於經未入於府也○脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄註此承上條詳出脈證以互發其義也陽明病脈浮發熱口鼻乾燥熱在經也若其人能食則為胃和胃和則邪當還表作解也然還表作解不解於衛則解於榮汗出而解者從榮解也衄血而解者從榮解也既能食衄血則知欲從榮解也謙張錫駒曰此論陽明經脈燥熱也夫熱在經故脈浮發熱循陽明經脈而上故口乾鼻燥不傷胃氣故能食能食者則衄言病不在胃府非因能食而致衄也○陽明證其人喜忘者必有瘀血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖硬大便反易其色必黑者宜抵當湯下之註經曰血併於下亂而喜忘喜忘者好忘前言往事也今陽明病其人喜忘者本有久瘀之血與然上併於心故令喜忘也蓄血之屎雖硬然大便反易其色必黑蓋以血與糟粕共併故反易而色黑也不用桃仁承氣湯而用抵當湯下之者以其人本有久瘀之血故也集張志聰曰太陽蓄血在膀胱故驗其小便之利與不利陽明蓄血在腸胃故驗其大便之黑與不黑○張璐曰大便色黑雖曰瘀血而燥結亦黑但瘀血則黏如漆燥結則晦如煤此為明辨也○鄭重光曰太陽熱結膀胱證輕者如狂重者發狂如狂者發狂之重剎何也蓋太陽經少血陽明經多血所以宜用抵當湯峻攻太陽云主之乃確然不易之法此云宜用則證有輕重在於臨時酌量耳○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脈數不解而下不止必協熱便膿血也註此承上條言蓄血喜忘熱結而無表裏證者當下之義也病人無表裏證是無太陽表陽明裏證也但發熱而無惡寒七八日雖脈浮數不可汗也若屎硬可下之假令已下脉不浮而數不解是表熱去裏熱未去也至六七日又不大便若不能消穀善饑是胃實熱也以大承氣湯下之既能消穀善饑是胃和合熱非胃邪合熱故屎雖硬色必黑乃有瘀血熱結之不大便也宜用抵當湯下之若脈數不解不大便硬而下利不止必有久瘀協熱腐化而便膿血也則不宜用抵當湯下之矣謙張璐曰病雖七八日尚發熱脈浮數仍屬太陽表證因誤下引邪內入所以脈數不解內外合邪而見消穀善饑般人既多反至六七日不大便且不煩渴是知其證非熱結在胃乃熱結在血以其表證誤下尚兼太陽隨經之熱未盡故以抵當為至當也若脈數不解而下利不止又當隨其下血與不下血而異治之倘血分之熱邪不除必協熱而便膿血也○傷寒發汗已身目為黃所以然者以表有寒裏有濕未解也夫表寒裏濕鬱而發黃自非熱濕內燃鬱而成黃者比故不可下惟當於表寒裏濕中求其治法宜發其表寒利其裏濕可也謙喻昌曰傷寒發汗已熱邪解矣何由反蒸身目為黃所以然者寒濕搏聚過在軀殼之裏故爾發黃也裏者在內之通稱非謂寒濕深入在裏蓋身目正屬軀殼與藏府無關

也於寒濕中求之求其寒濕中之治法也○程應旄曰其人素有濕邪在裏表寒雖經發汗而其為裏濕所持者終在裏而無從解散也發汗後之寒與濕鬱蒸為病非實熱也故不可下仍當於寒濕中責其或淺或深而治之可也○傷寒瘀熱在裏身必發蓄麻黃連軻亦小豆湯主之註傷寒表邪未解適遇其人陽明素有濕邪熱人裏而與濕合濕熱蒸於外薄肌表身必發黃也若其人頭有汗小便不利大便硬則或清或下或利小便自可愈也今乃無汗小便利是裏之瘀熱未深表之微溫猶其故用麻黃連軻亦小豆湯外發其表內逐其濕也譙喻昌曰傷寒之邪得濕而不行所以熱瘀身中而發黃設泥裏字豈有邪在裏而反治其表之理哉○程應旄曰凡傷寒瘀熱在裏者由濕蒸而來故身必發黃此之於然未深祇從表一邊開其鬱滯而散除濕熱麻黃連軻亦小豆湯是其主也○林瀨曰麻黃連軻一證雖曰在裏必因邪氣在表之時有失解散今雖發蓄猶宜兼汗解以治之也○汪琥曰夫寒邪自外而來若挾內濕瘀於經絡之中則鬱而變熱故令其人身目發黃此條乃是太陽傷寒理宜用麻黃湯極因邪傳陽明致瘀於裏裏非胃府陽明經居太陽之裏即尚論篇所云軀殼之裏是也惟其裏有熱所以方中用麻黃湯而去桂枝之辛熱更加亦小豆薑棗之甘辛以祛散在表之寒濕復加速軻生梓白皮之苦寒以清解肌裏之瘀熱也

麻黃連軻赤小豆湯方

麻黃二兩
去節

赤小豆一升

杏仁四十枚
去皮尖

生薑二兩

甘草二兩
炙

連軻二兩

大棗十二枚
擘

生梓白皮一升

以上

八味以潦水一升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥者取三升分溫三服半日則盡解濕熱發黃無表裏證熱盛者清之小便不利者利之一裏實者下之表實者汗之皆無非為病求去路也用麻黃湯以開其表使黃從外而散去桂枝者避其熱也佐薑棗者和其榮衛也加連軻梓皮以渴其熱亦小豆以利其濕共成治表實發黃之效也連軻即連翹根無梓皮以茵陳代之解周易俊曰此亦兩解表裏法也故用外汗之藥必兼滲濕之味傷寒發黃者必其人太陰素有濕熱更兼寒邪未散而邪相合因而蒸鬱為黃也

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之註身黃濕熱之為病也濕盛於熱則黃色晦熱盛於濕則黃色明如橘子色者謂黃色明也傷寒七八日身黃色明小便不利其腹微滿此裏熱深也故以茵陳蒿治痘病者為君佐以大黃使以梔子令濕熱從大小二便漏出則身黃腹滿自可除矣陳氏不嚴曰熏黃陰黃也橘子黃陽黃也○程知曰此驅濕除熱法也傷寒七八日可下之時小便不利腹微滿可下之證兼以黃色鮮明則為三陽入裏之邪無疑故以茵陳除濕梔子清熱用大黃以助其驅除此證之可下者猶必以除濕為主而不專取乎攻下有如此者

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩

梔子十四枚
枝擘

大黃二兩
去皮

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分三服小便當利尿

如見炎汁狀色正赤一宿腹減黃從小便出也

傷寒身黃發熱梔子藥皮湯主之註傷寒身黃發熱者設有無汗之表宜用麻黃連軻亦小豆汗之可也若有成實之裏宜用茵陳蒿湯下之

亦可也今外無可汗之表證內無可下之裏證故惟宜以梔子藥皮湯清之也林瀨曰傷寒身黃胃有瘀熱須當下之此以發熱而然未實

其鬱以退其黃則發然自愈。魏荔彤曰此三條雖皆外寒挾濕之邪客而感熱之證然在表在裏溫勝熱勝尤當加意也。豈可概以為裏證而混下耶。

梔子蘖皮湯方 梔子一枚

甘草一兩

黃藥二

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服。按北方之甘草當是的陳嵩筆寫之。

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃。註陽明病無汗不以葛根湯發其汗而以火劫取汗致熱盛津乾引飲水停為熱上蒸故額上微汗出而周身反不得汗也。若小便利則從燥化必煩渴宜白虎湯。小便不利則從濕化必發黃。宜茵陳蒿湯。此喻昌曰：陽明病溫停於鬱而煩渴有加勢必發黃。然汗出熱從外越則黃可免。小便多熱從下洩則黃可免。若誤攻之其熱邪愈陷津液愈傷而汗與小便愈不可得矣。誤火之則熱邪愈熾。津液上奔額雖微汗而周身之汗與小便愈不可得矣。發黃之變安能免乎。程知曰：太陽發黃由寒鬱濕滯不得解。陽明發黃由溫鬱熱熱不得越。故宜分經論治。○陽明病無汗小便不利心中懊惱者身必發黃。宜麻黃連轺亦小豆湯外發內利可也。若經汗吐下後或小便利而心中懊惱者乃熱鬱也非濕瘀也。便鍼者宣調胃承氣湯下之便軟者宜梔子豉湯涌之可也。譙方有執曰：無汗小便不利則溫停懊惱濕停熱鬱所以知必發黃也。○張璐曰：外不得汗下不得漏而濕熱鬱於胸中不得泄勢必蒸身為黃也。○陽明病面合色亦是熱邪猶怫鬱在經尚未入裏而成實也。故雖不大便不可攻之。若攻之則怫鬱在經之邪不解必令發熱色黃。若其人裏燥小便利則同燥化當不發黃而必大便鍼矣。譙方有執曰：合應也。亦熱色也。胃熱上行而應亦色攻則亡。津液故發熱色黃因小便不利也。○程知曰：言熱在陽明之經不可攻也。熱在於經陽氣怫鬱在表也。攻之則經中之熱未得表散必發熱色黃因小便不利也。○程應旄曰：熱阻於肌膚之間故發熱而小便為之不利鬱而成黃也。○陽明病發熱汗出此為熱越不得發黃也。但頭汗出身無汗剝頭而還小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏身必發黃。茵陳蒿湯主之。註陽明病發熱汗出者此為熱越小便若利大便因鍼不能發黃也。但頭汗出身無汗是陽明之熱不得外越而上蒸也。小便不利濕蓄膀胱也。渴飲水漿瘀灼胃府也。此為濕熱瘀蓄在裏外薄肌膚故身必發黃也。茵陳蒿湯主之者通利大小二便使濕熱從下竅而出也。譙方有執曰：越散也。頭汗熱然後發黃。註皆見太陽篇中。茵陳逐濕瘀之黃。梔子除胃家之熱大黃推壅塞之瘀三物者皆以泄熱泄熱則黃散矣。○程應旄曰：頭汗出身無汗剝頭而還足微陽熱之氣鬱結於內而不得越故但上蒸於頭頭為諸陽之首故也。氣不下達故小便不利。府氣過燥故渴飲水漿瘀在裏指無汗言無汗而小便利者屬寒無汗而小便不利者屬濕熱兩邪交鬱不能宣泄故會而發黃解熱除濕無如茵陳梔子清上大黃滲下通身之熱得泄又何黃之不敢耶。○傷寒脈浮而緩手足自溫者是為鬱在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鍼者為陽明證也。註此太陰轉屬陽明證也。傷寒脈浮而緩手足自溫者。

者太陽也今手足自溫非太陽證是為繫在太陰也然太陰脈當沉緩令脈浮緩乃太陽脈也證太陰而脈太陽是邪由太陽傳太陰也故繫在太陰也若小便自利者則不從太陰濕化而發黃至七八日大便硬者則是從燥化此為陽明也註程應旄曰陽明為病本於胃家實胃家之實不特三陽受邪能致其轉屬陽明即三陰受邪亦能致其轉屬陽明聊舉太陰一經例之脈浮而緩是為表脈然無實熱頭痛惡寒等外證而手足不溫是邪不在表而在裏但人裏有陰陽之分須以小便別之小便不利濕蒸熱瘀而發黃以其人胃中原無燥氣也小便自利者胃乾便軟而成實以胃中本有燥氣也病雖成於七八日而其始證却脈浮而緩手足自溫實是太陰轉屬而來也即太陰陽明推之少陰三太承氣證厥陰一小承氣證何非轉屬陽明之病故○魏萬彤曰病在太陽熱為濕鬱鬱聚於裏必有歸者既不能發黃小便自利則邪何歸乎不得不歸之於萬物所歸之胃至於七八日小便自多大便自硬而為陽明病矣傷寒轉繫陽明者其人濶然微汗出也註凡傷寒無論三陰三陽若轉繫陽明其人必有濶然微汗出之證始為轉屬陽明也○太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也註太陽病吐之表解者當不惡寒裏解者亦不惡寒今反不惡寒不欲近衣者是惡熱也此由吐之後表解裏不解內生煩熱也蓋無汗煩熱在表太青龍證也有汗煩熱在裏白虎湯證也吐下後心中懊惱無汗煩熱大便雖硬猶在內梔子豉湯證也有汗煩熱大便已硬熱悉入府調胃承氣湯證也今因吐後內生煩熱是為氣液已傷之虛煩非未經汗下之實煩也已上之法皆不可施惟宜用竹葉石膏湯於益氣生津中清熱寧煩可也註張璐曰此以吐而傷胃中之液故內煩不欲近衣雖顯虛煩之證較關上脈細數而成虛熱脾胃兩傷者稍輕雖不致逆亦誤吐之過也○太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱是表已解也關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中饑口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆按欲食冷食之下當有五六日吐之者六字若無此一句則不喜糜粥欲食冷食與朝食暮吐之文不相聯屬且以上文一二日三四日之文細玩之則可知必有五六日吐之一句由淺及深之謂也註太陽病不解當惡寒發熱是表已解也關上脈細數胃不和也細者胃氣虛數者胃氣虛證脈不和詢其故知以醫吐之過也一二日病在太陽正氣未衰吐之者傷胃未深故腹中知饑口不能食也三四日病在陽明胃中已熱吐之者復傷津液故不喜糜粥欲食冷食也五六日病將轉入陰經正氣已衰吐之者胃中虛冷故朝食暮吐也此皆醫吐之所致尚在可治故曰此為小逆也註程知曰本太陽病醫吐之則表邪乘虛傳入陽明傷動胃氣而關脈細數矣○程應旄曰陽明之氣下行為順上行為逆以醫吐之所致則非脾胃本來之病此為小逆更勿誤治使小逆變成大逆也○食穀欲嘔屬陽明也喜米羹湯主之得湯反劇者屬上焦也註食穀欲嘔屬陽明者以胃主受納也今胃中寒不能納穀故欲嘔也以吳茱萸湯溫中降逆而立其體可也若得湯反劇者此必非中焦陽明之裏寒乃上焦太陽之表熱也喜米羹氣味俱然藥病不合故反劇也法當從太陽陽明合病不下利但嘔之例治之宜葛根加半夏湯集方有執曰食穀欲嘔胃寒也故曰屬陽明言與惡寒嘔逆不同也上焦以膈言也○病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客

吐食當青胃之陽虛也陽受氣於胸中發汗過多令陽氣微隔氣虛客熱外越故脈數也客熱不能消穀而吐者當責其胃之虛冷若因其數真寒究其根由祇由發汗令陽氣微然則陽氣之珍重何如而可誤汗乎○陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故其熱必噦陽明病不能食者為中寒即有脈數客熱上條既戒以不可汗此又言亦不可攻若攻其熱則寒甚胃陽亦必作噦矣所以然者客熱雖除胃亦虛冷故也以其人本來胃虛故攻其熱必噦噦即乾嘔也集方有執曰攻熱皆寒藥故必噦胃中虛以不能食言此亦戒謹之意林瀨曰陽明證語潮熱不能食者可攻由燥屎在內也乃亦有胃中虛冷不能食者須詳別之未可便以不能食為實證也若誤攻之熱去噦作矣然則安得以陽明概為宜下哉○若胃中虛冷不能食者飲水則噦註此承上條不攻亦噦之義也若其人胃中虛冷不能食者雖不攻其熱飲水則噦蓋以胃既虛冷復得水寒故噦也宜理中湯加丁香吳茱萸溫而降之可也集喻昌曰表熱裏寒法當先救其裏太陽經中亦用四逆湯其在陽明更可知矣此條以前條虛寒更甚故不但攻其熱必噦即飲水亦噦也○汪琥曰若胃中虛冷不能飲水則水寒相搏氣逆而亦為噦矣法當大溫○趺陽脈浮浮則為虛浮虛相搏故令氣餉言胃氣虛竭也脈滑則為噦此為醫咎責虛取實守空迫血脈浮鼻中燥者必衄血也註誤攻飲冷皆可致飼固矣今趺陽胃脈浮而不大無力而虛則是胃虛與邪相搏即不誤下飲冷亦令餉也若趺陽胃脈滑為噦者乃熱氣擁鬱之餉非胃氣虛竭之餉醫何可取實責虛以自取其咎耶若趺陽胃脈浮而鼻中燥者此熱據榮分禁熱迫血妄行必作衄也世有以噦為呃逆者不知噦即乾嘔也以其有噦噦之聲故又名噦也觀令病呃逆之人與飲冷水則氣自臍下衝上出口而作格兒格兒之聲聲長時止者為實可治聲短不已者為虛難治集方有執曰此又出趺陽脈而以噦與衄言皆逼汗而不得汗之所致也咎過愆也責虛言病於虛取實反以虛為實而攻取之也血屬陰而為內守故曰守空迫血言故汗也○寸口脈浮大而醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人必餉按令汗大出四字當是衍文註寸口脈浮大指六脈皆浮大也非陽明接之大脈乃太陽不按之大脈也醫反下之此為大逆則從前浮脈變而為無血之虛大脈變而為胃冷之遲虛寒相搏則為腸鳴醫見脈大以為有熱飲以冷水欲以水寒勝熱而作汗裏先虛寒又得冷水與之相搏則冷結上焦必致咽喧塞而氣逆矣○傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈集註傷寒噦而不腹滿者為正氣虛寒寒燒湯證也噦而腹滿氣上而不下也視其前後有不利者即利之以降其氣前部小便也後部大便也○程知曰前部不利後人治以五苓後部不利後人治以承氣是也○沈明宗曰邪傳於胃胃氣壅遏而氣相搏

氣逆上衝則為噦矣○張錫駒曰傷寒至噦非胃氣敗即胃中寒然亦有裏實不通氣不得下洩反上逆而為噦者宜詳辨之

夫實則譯語虛則鄭聲鄭聲音重複其聲微短正氣虛也○註譯語一證有虛有實則譯語陽明於其上乘於心亂言無次其聲高朗邪氣實也虛則鄭聲精神衰乏不能自主語言重複其聲微短正氣虛也○譯戴元禮曰譯語屬陽鄭聲屬陰經曰實則譯語虛則鄭聲譯語者顛倒錯亂出無倫常對空獨語如見鬼狀鄭聲者鄭重煩語雖謬而諄諄不已老人遇事則許語不休以陽氣虛不精明也此譯語鄭聲虛實之所以不同也二

者本不難辨但陽盛裏實與陰盛格陽皆能錯語須以他證別之隨證施治可也○婁全善曰余用參耆歸朮等劑治譯語得愈者甚多宜可不分虛實一概用黃連解毒大小承氣等湯以治之乎按其所云亦鄭聲也○張錫鉤曰實則譯語者陽明燥熱甚而神昏氣亂故不避親疎妄言罵詈也虛則鄭聲者神氣虛而不能自主故聲音不正而語言重複也○傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譯語註傷寒四五日入裏之時也脈沉而喘滿乃為在裏之喘滿而反發其汗津液越出則表虛也汗出胃乾大使為難則裏實也久則胃熱熾盛必發譯語也○譯方有執曰越出謂枉道而出也○張璐曰傷寒四五日正邪相傳裏之時況見脈沉在裏之喘滿而反汗之必致燥結譯語矣蓋燥結譯語頗似太承氣證此以過汗傷津而不致大實大滿腹痛祇宜小承氣為允當耳○陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大使必軟硬則譯語小承氣湯主之若一服利譯語止慎不可更服也○註張璐曰多汗譯語下證急矣以其人汗出既多津液外耗故不宜大下但當略與小承氣湯和其胃氣譯語自止若過服反傷津液也○沈明宗曰此汗名胃燥非同實治也○汗出譯語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之苔舌譯語必亂以表虛裏實故也下之愈宜大承氣湯註病自汗出而譯語者以素有燥屎在胃中此為太陽風邪之所傳也須當下之然必須太陽之邪已過陽明之經而入陽明之府乃可下之若下之早則裏熱未結不但熱去不盡且虛其中熱乘虛而上干於心語言必亂此表虛汗出裏實譯語所以待過經入府而後下之則愈宜大承氣湯譯方有執曰過經謂寧遲遲非謂必待十三日後也○程知曰此言譯語不當下早也既出汗矣而譯語則必有燥屎在胃此當屬風風為陽邪陽邪入裏故譯語然須六七日乃可下之下之早則風邪未解於表盡入於裏裏邪燥實語言更亂也○陽明病譯語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但軟爾宜大承氣湯下之按宜大承氣湯下之句應在必有燥屎五六枚之下始合當用大承氣湯下之之義若但便軟而用大承氣湯下之殊失仲景顧慮訛下慎下之古註陽明病譯語有潮熱反不能食者知胃中必有燥屎已結實也宜大承氣湯下之若能食者知胃將和但大便軟耳當導之不可下也○譯張璐曰此以能食不能食辨燥結之微甚也潮熱譯語皆胃中熱其所致胃熱則能消穀今反不能

食此必熱傷胃中津液氣化不能下行燥屎遂攻於胃之故宜大承氣湯急祛亢極之陽以救垂絕之陰若能食者胃中氣化自行熱邪不盛津液不致大傷大使雖軟不久自行不必用藥反傷其氣也○下利譯語者有燥屎也宜小承氣湯註下利裏虛譯語裏實若服滑大證兼裏急和其中必自得食也下利之物又當何如也○此句指是歲口快其固全人之而為之也○此句指是歲口快其固全人之而為之也

實大熱之證胃中糟粕為邪所壅留著於內其未成便者或時得下其已成便者終不得出則燥屎為下利之根燥屎不得出則邪熱上乘於心所以譴語要之此證須以手按臍腹當必堅痛方為有燥屎之徵

直視譴語喘滿者死下利者亦死註上條下利譴語為可治此條下利譴語者死要知譴語不死於下利而死於直視也直視者精不注乎目也譴語者神不守乎心也已屬惡候加之喘滿陽上脫也故曰死下利陰下脫也故曰亦死也集方有執曰直視精不禁於目也譴語神不主乎心也喘則陽爭於上利則陰爭於下胃中土也陰陽爭奪於上下而中氣不守故無法可治而皆死也

發汗多若重發汗者亡其陽譴語脈短者死脈自和者不死註太陽病發汗過多不解又復重發其汗以致氣液兩亡熱邪乘燥傳入陽明而生譴語譴語者胃歎陽也脈短者氣衰陰也陽病見陰脈為陰勝於陽故死也若脈不短為陰陽自和故不死也註喻昌曰方註以此為太陽經脫簡不知太陽經無譴語之例必日久而兼陽明少陽方有譴語故此言太陽經得病時發汗過多及傳陽明時重發其汗因有二陽而譴語之一證也亡陽之人所存者陰氣耳故神魂不定而妄見妄聞與熱邪乘心之候不同脈短則陰陽不附脈和則陰陽未離其生死但從脈定耳○汪琥曰譴語者脈當大實或洪滑為自和自和者言脈與病不相背也病雖甚不死若譴語脈短為邪熱盛正氣衰乃陽證見陰脈也無法可施○發汗多亡陽譴語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈註此又承上條以出其治也譴語者屬陽明熱實可下之證也若發汗過多亡氣液而發譴語者乃津枯致燥之譴語非於其內實之譴語不可下也裏有熱宜白虎加入參湯表不解與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈也按發汗過多亡陽譴語以無大便轉滿痛故不可下以無身寒汗出惡寒故不可溫於此可知發太陽汗出過多致譴語者必無發熱汗出惡寒也發陽明汗出過多致譴語者必有潮熱惡熱不大便也此則發少陽汗多致譴語者即論中少陽不可發汗發汗則譴語是也然舍小柴胡湯別無治法若祇用柴胡又恐升散非亡陽所宜故合桂枝和其榮衛通其津液自可愈也

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後脰刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯服但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治按續浮之浮者是弦字但與文義相屬則可與小柴胡湯若俱是浮字則上之浮又如何用麻黃湯耶註中風傳陽明病太陽未窮緩當和脈今脈弦浮大弦少陽脈也浮太陽脈也太陽明脈也脈既兼見證亦如之腹滿太陽陽明證也脇下及心痛久按之氣不通快少陽證也鼻乾陽明證也不得汗太陽證也嗜卧陰證也面目悉黃太陰證也小便難太陽府證也潮熱陽明裏證也噦逆胃敗證也耳前後脰少陽證也短氣氣衰證也凡仲景立法無方之條皆是此等陰陽錯雜表裏混淆之證但教人俟其病勢所向乘機而施治也故用刺法待其小差若外病不解已成危候如過十日脈續絃不浮者則邪機已向少陽可與小柴胡湯和之使陽明之邪從少陽而解若脈但浮不大而無餘證者則邪機已向太陽

當與麻黃湯汗之使陽明之邪從太陽而解若已過十餘日病勢不減又不歸於胃而成實更加不眠腹滿噦甚等逆即有一二可下之證胃氣不如候氣之自回猶可漸引其邪從外出也○程應旄曰此條含是表證未解而無汗出燥渴之證故不可用白虎雖有潮熱而無粳滿證語濶汗出之證故不可用承汗耳○脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熟其陽則絕註脈浮而芤浮為陽盛芤為陰虛陽盛則發熱陰虛則汗出二者相搏則胃氣生熟愈盛胃中津液立亡其陽則絕者言陽亡津液絕也註方有執曰浮為氣上行故曰陽芤為血內損故曰陰胃中生熱者陰不足以和陽津液乾而成枯燥也○張璐曰此言脾約當下不下則浮濶轉為浮芤津液竭而難下矣其陽則絕即陽絕於裏下津液之互辭也○趙良曰胃中陽熱亢甚脾無陰氣以和之孤陽無偶不至燔灼竭絕不止耳○沈明宗曰此辨陽明津竭之脈也浮為邪氣強芤為陰血虛陽邪盛而陰血虛為浮芤相搏胃氣生熟故曰其陽則絕即亡津液之互詞也嘗見此脈當養津液不可便攻也○陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必古頭痛若不欬不嘔乎足不厥者頭不痛註陽明病多汗反無汗而小便利是寒氣內攻也至二三日嘔而欬寒氣上逆也手足厥者寒氣見於四支也氣上逆則欬而苦頭痛矣若不欬不嘔不厥則頭不痛此證之頭痛者標也欬逆手足厥者本也註程知曰無汗小便利嘔欬肢厥頭痛曷不謂太陽病蓋初起無頭痛諸表證也此頭痛是二三日後嘔欬而厥所致非因頭痛致嘔欬而厥也嘔欬二證太陽少陽俱有之其表證未解則屬太陽病其寒熱往來者則謂之少陽病也厥則厥陰有之但無嘔欬也○張璐曰陽明無汗嘔欬手足厥者得之榮衛俱傷而邪入深也然小便利則邪不在內而在外不在下而在上故知必苦頭痛仍宜小青龍主之若不嘔不欬不厥而小便利者邪必順水道而出豈有逆攻頭項之理哉○林淵曰須識陽明亦有手足厥證胃主四肢中虛寒氣所致也然頭苦痛而欬自與陰寒但厥者莫此類數條最為難解○吳人駒曰嘔欬手足頭痛皆由反無汗之故也○陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛右不欬者咽不痛註陽明病當惡寒不惡寒若從傷寒傳來則不能食人從中風傳來故能食也傷寒挾寒邪則有頭痛證今中風挾風邪則有頭痛證今中風挾風邪則有頭痛證中風則有頭眩證以不惡寒而能食知其鬱熱在裏也寒上攻能令欬其欬兼嘔故不能食而手足厥熱上攻亦令欬其欬不嘔故能食而咽連也風故不惡寒能食旅遊氣也咽門胃之係也胃熱而氣逆攻咽則欬而咽傷也○程知曰陰邪下行故無汗而小便利陽邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨也○程應旄曰陽明以下行為順逆則上行故中寒則有頭痛證中風則有頭眩證以不惡寒而能食知其鬱熱在裏也寒上攻能令欬其欬兼嘔故不能食而手足厥熱上攻亦令欬其欬不嘔故能食而咽痛以胃氣上通於肺而咽為胃府之門也夫咽痛惟少陰有之今以欬致痛若不欬則咽不痛況更有頭眩不惡寒之證益可知其為陽明之鬱熱也○病人有寒復發汗胃中冷必吐衄註病人有寒謂胃中寒也復發汗謂汗而復汗也胃寒復汗陽氣愈微胃中冷甚衄不能安必吐衄也宜理中湯送烏梅丸可也註程應旄曰汗生於穀精胃中陽氣所驅也有寒復發汗知胃陽不復存於內矣衄何能安○發汗後水藥不得入口為滿若更發汗必吐下不止按必吐下不止二字當是衍文注此承上條誤而人訛心變而風逆也即中寒之本也因誤衍水藥

不得人口人口即吐而為逆也若更發其汗則胃逆益甚不能司納不特水藥入口方吐且必無時而不吐遂也証成無已曰汗後水藥不得人口為之吐逆發汗亡陽胃中虛冷也若更發汗則愈損陽氣胃氣大虛故吐不止○程應旄曰發汗後見此者由未汗之先其人已是中虛而寒故一誤不堪再誤也脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之註陽明病脈浮而遲主表熱裏寒今其證下利清穀則為裏寒太甚法當溫之宜四逆湯主之集注王琥曰陽明經病脈當從長今脈但浮此在表之熱凝也腑病脈當從數今脈過遲此在裏之寒甚也故見下利清穀其所利之穀食色不變氣不臭即完穀化也此裏寒已極故與四逆湯也○陽明病欲解時從申至戌上註凡陽明病無論在府必乘其旺時而解申酉戌陽明旺時也經氣旺則邪氣自退故解也註張志聰曰經云日西而陽氣衰陽明之所主也從申至戌上乃陽明氣之時表裏之邪欲出必隨時而解

音切

奄音厭趺音夫搏音圓屎音不摸音摸捻音臘糞音曉塘庭上繞音慢憒姑對休砌律痘音旦寢僵牙漱音處昭時饒藥普伯潔郎到沸音
芾尿同漏轉株戀飼音曉蛇音回

卷五

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陽病脈證并治全篇 少陽主春其氣半出地外半出地中人身之氣亦如之故主半表半裏也半表者謂在外之太陽也半裏者謂在內之太陰也邪入其間陰陽相移寒熱交作邪正相持進退互拒此際汗吐下三法俱在所禁故立小柴胡湯和解法加減施治然小柴胡加減法中又有口不渴身有微熱者加桂枝以取汗及下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出往來寒熱者用柴胡桂枝乾薑湯汗之又柴胡證具而反下之心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之及柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之更有本柴胡證醫以丸藥下之微利胸脇滿而嘔日晡潮熱者小柴胡加芒硝湯下之等法是仲景亦有汗下之法惟在臨證詳察因病施治不可執一也○少陽之為病口苦咽乾目眩也註少陽者膽經也其脈起於目鏡皆從耳後入耳中挾咽入頤領中邪傷其經故口苦咽乾目眩也口苦發熱蒸眼氣上溢也咽乾者耗其津液也目眩者耗薰眼筋黑也此揭中風傷寒邪傳少陽之總綱凡篇中稱少陽中風傷寒者即具此證之謂也謝林瀨曰論中言少陽病胸脅痛耳聾柱來寒熱心煩喜嘔胸脇痞半表半裏之證詳矣此何以曰口苦咽乾目眩也大抵病於經絡者此篇諸條已悉之矣若膽熱府自病則又必有此證也○沈明宗曰此雖少陽總證然偏裏矣少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脅痛而耳聾仲景另出手眼以補口苦咽乾目眩之裏證乃括少陽風傷寒傷榮風寒兩傷而言也○吳人駒曰少陽者一陽也少陽之上相火主之苦從火化火盛則乾故口苦咽乾也少陽屬木木主肝肝主目故病則目眩也○魏荔彤曰膽府與少陽經為表裏而非半表半裏之謂半表者對太陽之全表言半裏者對太陰之全裏言故少陽在半表半裏之間總以經絡之界為言又曰經中所謂

不必悉具看指或中餘證而少陽經膽府之主病未有不悉具而遽可指為少陽病者。少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下。吐下則悸而驚。註少陽即首條口苦咽乾目眩之謂也。中風謂此少陽病是從中風之邪傳來也。少陽之脈起目锐眥從耳後入耳中其支者會歧益下胸中循脇表邪傳其經故目赤耳聾胸中滿而煩也。然此乃少陽半表半裏之胸滿而煩非太陽證具之邪陷胸滿而煩者比故不可吐下。若吐下則虛其中神志虛怯則悸而驚也。此掲中風邪傳少陽之大綱也。註程知曰少陽惟宜和解若吐之則虛其陽而悸下之則虛其陰而驚。汪琥曰少陽有吐下之禁祇因煩滿故誤行吐下之法成註謂吐則傷氣是虛者悸下則亡血虛者驚不知驚悸皆主於心謬。且下則津液衰耗神志虛怯故悸而驚也。沈明宗曰胸中煩滿似乎可吐但在少陽其邪已下胸循胸吐之徒傷胸中之氣使邪內併逼迫神明則悸而驚也。○魏荔彤曰此條仲景不出方小柴胡條中有心煩心下悸之證想可無事他求也。汗吐下三法既不可行則當和解之小柴胡為少陽對證之藥斯用之宜決耳。○傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸。註不曰少陽傷寒而曰傷寒略言之也。謂此少陽病是從傷寒之邪傳來也。脈弦細少陽之脈也上條不言脈此言脈者補言之也。頭痛發熱無汗傷寒之證也。又兼見口苦咽乾目眩少陽之證故曰屬少陽也。蓋少陽之病已屬半裏故不可發汗者發汗則益傷其津而助其熱必發譫語既發譫語則是轉屬胃矣若其人津液素充胃能自和則或可愈否則津乾結胃不能和不但譫語且更煩而悸矣。此掲傷寒邪傳少陽之大綱也。

集解

王肯堂曰凡頭痛發熱俱為在表惟此頭痛發熱為少陽者何也以其脈弦細故知邪入少陽之原也。○喻昌曰少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義互舉其旨蓋傷寒之頭痛發熱宜於發汗者尚不可汗則傷風之不可汗更不待言矣。傷風之胸滿而煩似可吐下者尚不可吐下則傷寒之不可吐下更不待言矣。脈弦細者邪欲入裏其在胃之津液已為耗盡復發汗而驅其津液外出安得不譫語乎。○汪琥曰誤發其汗譫語者奪其津液而胃乾故言亂也。此少陽之邪已屬轉胃胃和則愈者言當用藥以下胃中之熱而使之和平也。胃不和不但譫語更加煩擾忪悸此言胃熱上犯於心故藏神不自寧也。傷寒五六日中風往來寒熱五更見往來寒熱胸脇苦滿默然不欲飲食心煩喜嘔即知是中風傷寒兼見俱有之證也。少陽之邪進可傳大陰之裏退可還太陽之表中處於半表半裏之間其邪外井於表半表不解則作寒內井於裏半裏不和則作熱或表或裏無常故往來寒熱不定也。少陽之脈下胸循脇邪湊其經故胸脇苦滿而煩者則知是從中風傳來也。今五六日更見往來寒熱胸脇苦滿默然不欲飲食心煩喜嘔則知是中風傷寒兼見俱有之證也。少陽之邪進可傳大陰之裏退可還太陽之表中處於半表半裏之間其邪外井於表半表不解則作寒內井於裏半裏不和則作熱或表或裏無常故往來寒熱不定也。少陽之脈下胸循脇邪湊其經故胸脇苦滿也。少陽之邪近乎陰故默然不欲飲食也邪在胸脇火無從泄上逼於心故心煩也邪欲入裏裏氣外拒故嘔即木氣舒故喜之也。此皆柴胡應榮衛之分故風寒之辨宜就其邪分其治者何也蓋以太陽有中風者是或傷寒或中風非傷寒再中風中風復傷寒也五六日邪自表傳裏多時邪在表則愈在裏則久矣。但裏之間未有定處故

往來寒熱也邪在表心胸不和精神不寧心腹脹滿令言胸脹支滿亦是住裏之陽也邪在裏則內煩經云陽人之陰則靜默默由邪方自表之裏住裏之間也邪在表則能食邪在裏不能食不欲食者未至於必不能食故亦為在表裏之間也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔煩而喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未有定處所傳不一故有或見之證也○方有執曰五六日大約言也往来寒熱者邪在軀殼之裏藏府之外幽深之隙地所謂半表半裏乃少陽所主之部位也故入而併於陰則寒出而併於陽則熱出入無常故寒熱間作也太陽一經有榮衛之不同所以風寒異治陽明功近太陽榮衛之道住過風寒之辨尚嚴少陽一經越陽明去太陽遠矣風寒無異治經以傷寒中風五六日住來寒熱父母為文者發明風寒至此同歸於一致也

小柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩三兩

人參三兩

半夏半升

甘草三兩

生薑三兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升

去渣再煎取三升溫服一升日三服

加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加桔梗半錢銀四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫

服微汗愈

若欬者去人參太棗生薑加五味子半升乾薑三兩

附解

太陽陽明曰汗口吐下三法皆

在所禁以其邪在半表半裏而角於軀殼之內界在半表者是客邪為病也在半裏者是正氣受病也邪正住兩界之間各無進退而相持

故立和解一法既以柴胡解少陽住經之表寒當以解少陽惟宜和解汗吐下三法皆

參和中而預壯裏氣使裏不受邪而和還表以作解也世俗不審邪之所據果在半表半裏之間與所以應否和解之宜及陰陽疑似之辨

總以小柴胡為要

利醫家辛其自處無過病者當益其半

藥味平和殊不知循誤人實為不淺故凡治病者當識其本然圖機於早也

程應

施曰方以小柴胡名者取配乎少陽之義也

至於制方之旨及加減法則所云上焦得通津液得下胃氣因和盡之矣方中以柴胡疏木使

半表之邪得從外宣發少清火使半裏之邪得從內徹半夏略破飲降裏氣之逆人參補內虛助生發之氣甘草佐柴芩

佐

參夏通達榮衛相須相濟使邪不至內向而外解也

至若煩而不嘔者火氣燥實逼胸也故去人參半夏加桔梗也渴者燥已耗液逼肺

也故去半夏加桔梗根也腹中痛者木氣散入土中胃陽受困故去黃芩以安上加芍藥以散木也

脇下痞硬者邪既留則木氣實散去大

棗之甘而緩加牡蠣之鹹而寒也

心下悸小便不利者水邪侵心故去黃芩之苦寒加茯苓之淡決也不渴身有微熱者半表之氣尚滞

於肌故去人參加桂枝以解之也欬者半表之寒湊入於肺故去參兼加五味子易生薑為乾薑以溫之雖肺寒不減黃芩恐乾薑助熱也

總之邪在少陽是半表半裏之熱鬱而不升故以小柴胡治之所謂升降浮沉則順之也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具註此承上而言無論傷寒中風邪傳少陽病在半表半裏有柴胡證但見一證便以小柴胡隨證加減治之不必待其悉具也謙方有執曰此承上條辨認少陽一經為病之大旨○鄭重光曰有柴胡證但見一證便是不必悉具者言住

來寒熱是柴胡證此外兼見胸脇滿轉心煩喜嘔及諸證中凡有一證者即是半表半裏故曰嘔而發熱者小柴胡湯主之因柴胡為樞機之劑風寒不全在表未全在裏者皆可用故證不必悉具而方有加減法也至若柴胡有疑似證不可不審者如脇下滿痛者渴而飲水嘔者柴胡不中與也及但欲嘔胸中痛微溏者亦非柴胡證此等又當細為詳辨者也○傷寒三日少陽脈小者飲也註傷寒該中風而言也其邪三日少陽受之脈大者為邪盛欲傳令脈小為邪衰欲自己也集程應旄曰脈小則陽得陰以和是邪盡退而正來復矣○張錫駒曰三日乃少陽主氣之期脈小則病退也○傷寒四五日身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之註傷寒四五日邪在三陽之時身熱惡風太陽證也頭項強太陽陽明證也脇下滿手足溫而渴陽明少陽證也此為三陽合病之始固當權宜就緩就急以施其治然其人脇下滿手足溫而渴是已露去表入裏歸併少陽之機故獨從少陽以為治也主以小柴胡湯者和解其表裏也此三陽合病不必悉具柴胡證而當用柴胡之一法也集方有執曰三陽俱見病而獨從少陽小柴胡以為治者太陽陽明之邪微少陽近裏而裏證見故從少陽一於和而三善備也○喻昌曰本當從三陽合病之例而用表法但手足溫而渴是外邪逼湊於少陽向裏之機已著更用辛甘發散則重增其熱而大耗其津矣故從小柴胡之和法使陽邪罷而陰津不傷一舉而兩得也小柴胡湯當從加減法不嘔而渴者幸矣夏加桔梗根為是○張志聰曰手足溫者手足不冷也非病人自覺其溫乃診者按之而得也不然何以既曰身熱而復云手足溫耶○汪琥曰此條係三陽經齊病而少陽之邪居多也太陽傷寒已至四五日之時不曰發熱惡風祇曰身熱者此太陽之邪漸衰也其兼陽明證不曰鼻乾不得卧而祇曰頭頸強者此陽明之邪亦將衰也惟脇下滿為少陽經之專證況兼手足溫而又渴此為邪將傳裏之機已著也○陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者與小柴胡湯註陽明病發潮熱當大便輕小便數也今大便溏小便如常非陽明入府之潮熱可知矣況有胸脇滿不去之少陽證乎故不從陽明治而從少陽與小柴胡湯主之也集王肯堂曰陽明為病胃家實火令便溏而言陽明病者惟有陽明外證身熱汗出不惡寒反惡熱也○程應旄曰如得陽明病而發潮熱似乎胃實之徵矣但胃實必大便硬而小便數今大便溏小便自可是躁非入府之熱也再以胸脇微之則主以小柴胡湯無疑矣○陽明病脇下輕滿不大便而嘔舌上白苔者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身少陽汗出而解註陽明病不大便脇下輕滿而嘔是陽明傳少陽病也若舌上黃胎滑者為陽明之熱未盡則當與大柴胡湯兩解之今舌上白胎滑者是已傳少陽故可與小柴胡湯和解之俾上焦得通則嘔可止津液得下則便可通胃氣而輕滿除則身必微汗出而解矣集程知曰此言陽明兼少陽宜用小柴胡也不但大便溏為胃未實即使不大便而嘔亦為邪未入裏輕滿在脇而不在腹舌胎白而不黃皆少陽之見證多故當從小柴胡分解陰陽則上下通和微汗出而表裏之邪為之一撤矣○程應旄曰脇下輕滿不大便而嘔是大柴胡湯證也其用小柴胡湯者以舌上白胎猶帶表寒故也若胎不滑而濡則所謂舌上乾燥而煩欲飲水數升謂裏熱已耗及津液此湯不可主矣又曰上焦得通照脇下輕滿言津液得下照舌胎與嘔言胃氣因和照不大便言上條陽明病從潮熱上見此條陽明病從不大便上見凡柴胡湯病證而下之者柴胡證不罷者及與柴胡湯參差而服却發熱汗出而解註凡柴明陽病證下與柴胡湯而後

諸仍在者可復生於桂枝湯則無但以誤下之證也此亦必如此而後解者以下後裏虛故也○程知曰邪氣還表故蒸蒸而熱下後正虛故振振而動○得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水區者柴胡湯不中與也食穀者噦按食穀者噦四字衍太食穀區者有之從無噦者得病六七日少陽太陰時也脈遲太陰脈也脈弱太陽脈也惡風寒太陽證也手足溫太陰證也醫不以柴胡桂枝湯解而和之反二三下之表裏兩失矣今不能食脇下滿痛雖似少陽之證而實非少陽也面目及身發黃太陰之證已具也頸項強則陽明之邪未已也小便難者數下奪津之候也此皆由醫之誤下以致表裏雜擇陰陽同病若更以有少陽脇下滿痛之一證不必悉具而又誤與柴胡湯則後必下重是使邪更進於太陰也雖有渴證乃係數下奪津之渴其飲水即嘔亦非少陽本證之區緣誤下所致故柴胡湯不中與也註程知曰前言柴胡證但見一證便是此更言脇下滿痛亦有不見柴胡者以為戒也○程應旄曰以一渴證辨之前條之手足溫而渴者熱在裏未經數下自能消水今本渴而飲水則嘔知其渴為腸燥津乏渴數下中虛不能消水究於胃陽無涉然則柴胡湯於少陽柴胡之半以散少陽區結之病而不名桂枝柴胡湯者以太陽外證雖未去而病機已見於少陽裏也故以柴胡冠桂枝之上意在解少陽為主而散太陽為兼也支者側也小也支結者即心下側之小結也註方有執曰支節四肢骨節也支結言支飲搏聚而飲也發熱至微嘔太陽之表也故曰外證未去○程知曰此邪入少陽而太陽證未去者也發熱惡寒支節煩疼太陽證也乃惡寒而微但支節煩痛而不頭項強痛則太陽證亦稍減矣嘔而支節少陽證也乃嘔逆而微但結於心下之偏旁而不結於兩脅之間則少陽亦尚淺也若此者惟當以柴胡湯和解少陽而加以桂枝湯發散太陽此不易之法也

柴胡桂枝湯方

柴胡四

桂枝半

一兩

人參半

一兩

甘草

一兩

半夏

二合

黃芩

一兩

芍藥

一兩

大棗

六枚

生薑

半切

右九味

以水七升者取三升去滓溫服一升

集解

柯琴白仲景書中最重柴桂二方以桂枝解太陽肌表又可以調諸經之肌表小柴胡解少陽

半表亦可以和三陽之半表故於六經病外獨有桂枝證柴胡證之稱見二方之任重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自為桂枝證之

註

釋血弱氣虛條是仲景自為柴胡證之註釋桂枝有壞病柴胡亦有壞病桂枝有疑似證柴胡亦有疑似證如病似桂枝證腳掌急與胸

中痞鞕者及病似柴胡證本渴而飲水嘔與但欲嘔胸中痛者是已此條言傷寒六七日寒熱當退之時反見發熱惡寒諸表證更見心下

註

方有執曰支節四肢骨節也支結言支飲搏聚而飲也發熱至微嘔太陽

之表也故曰外證未去○程知曰此邪入少陽而太陽證未去者也發熱惡寒支節煩疼太陽證也乃惡寒而微但支節煩痛而不頭項強痛

則太陽證亦稍減矣嘔而支節少陽證也乃嘔逆而微但結於心下之偏旁而不結於兩脅之間則少陽亦尚淺也若此者惟當以柴胡湯和

解少陽而加以桂枝湯發散太陽此不易之法也

當去人參以六七日邪雖未解而正已虛故仍用之外證雖在而病機已見於裏故方以柴胡冠桂枝之上為雙解兩陽之輕劑也

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之註傷寒五六日已發其汗表未解而復下之若邪陷入陽明之裏則必作結胸痞鞕協熱下利等證今邪陷入少陽之裏故今胸脇滿微結也小便不利渴而不嘔者非傳水之故乃汗下損其津液也論中有身無汗獨頭汗出發熱不惡寒心煩者乃陽明表熱鬱而不得外越之頭汗也今但頭汗出往來寒熱心煩者無陽明證知為少陽表熱鬱而不和上蒸之頭汗也此為少陽表裏未解之證故主柴胡桂枝乾薑湯以專解半表之邪兼散半裏之結也註林瀾曰五六日已經汗下之後則邪當解今胸脇滿微結寒熱心煩者是邪猶在半表半裏之間也小便不利而渴乃汗下後亡津液內燥也若有熱飲其人必嘔今渴而不嘔知非飲熱也傷寒汗出則和今但頭汗出餘處無汗津液不足而未和也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏而復津液也○汪琥曰傷寒頭汗出者乃陽鬱於表非陽虛於上也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半
桂枝兩
乾薑兩

桔梗根兩

黃芩三

牡蠣二

甘草二兩

芍藥一

大黃一

甘草一兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

解少陽表裏未解故以柴胡桂枝合劑而主之即小柴胡湯之變法也去人參

者因其正氣不虛減半夏者以其不嘔恐助燥也加桔梗根以其能止渴兼生津液也倍柴胡加桂枝以主少陽之表加牡蠣以與少陽之結乾薑佐桂枝以散往來之寒黃芩佐柴胡以除往來之熱且可制乾薑不益心煩也諸藥寒溫不必須甘草以和之初服微煩藥力未及復服汗出即愈者可知此證非汗出不解也

服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之註風寒之邪從陽明而傳少陽起初不渴今服柴胡湯已反渴者是少陽轉屬陽明也以法治之謂當分其經府見證而治之也葛根白虎調胃間各從其宜而用之可耳註方有執曰已畢也服柴胡湯已畢而渴則非暫渴其為極已入胃亡津液而渴可知故曰屬陽明也沈明宗曰服柴胡湯已渴者乃少陽之邪不傳三陰而轉入陽明矣即當隨陽明現證而治故謂以法治之○鄭重光曰少陽陽明之病機在嘔渴中分渴則轉屬陽明嘔則仍在少陽如嘔多雖有陽明證不可攻之因病未離少陽也服柴胡湯渴當止若服柴胡湯已加渴者是熱入胃府耗津消水此屬陽明胃病也傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便軟脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉人在裏此為半在裏半在外也脈雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得尿而解按脈細當是脈沉細觀本條下文脈沉亦在裏也之亦字自知脈雖沉緊之緊字當是細字本條上文並無緊字如何說脈雖沉緊雖字何所謂耶必是傳寫之誤註傷寒五六日雖表有頭汗出微惡寒之陽邪未罷裏有心下滿口不欲食大便軟之陽結已形但手足冷脈沉細則陽邪所結殊微也故曰此為陽微結必有表復有裏也然脈沉細似乎裏陰盛而頭汗出則為表陽鬱也假令純陰結則不得復有頭汗出之外證始合悉人在裏之純陰結矣夫既非悉人在裏之純陰結必為半在裏半在表之陽微結也故脈雖沉細不得為少陰病所以然者三陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯者

不微結是純陰邪內結則不得復有外證等語其義甚明○程知曰此言少陽病有似少陰者當細玩其脈證也○程應旄曰凡脈細脈沉皆陰脈也今與陽證同見則為陽氣鬱結之診無關少陰也可見陽氣一經鬱結不但陽證似陰並陽脈亦似陰矣○沈明宗曰得屎而解當用大柴胡之法也○吳人駒曰此證嘗見有誤作陰寒而施溫熱以致大逆者蓋因其惡寒手足冷脈細而況不究其證之始末由來也○周揚俊曰此條惡寒肢冷不欲食脈細或沉有似乎陰最難辨斷仲景特出陽微結三字昭示千古以頭汗出為陽陰不得有汗也至五六日頭痛發熱證原屬陽也故縱見少陰之脈不得為少陰之病然獨未見少陽一證何遂得為少陽病耶此仲景所以又明言半在表半在裏也爾時裏證既多不得純以表藥汗之外證似陰不得復以裏藥溫之故取小柴胡提出其邪於表裏之半而大便硬不了了者則當下之得屎無疑也仲景恐人未明白為詳辨然後知手足冷微惡寒者正因陽氣鬱結不外通於體故獨頭汗出也○傷寒陽脈濫陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之註傷寒脈得浮濡榮衛不足也脈得浮弦木入土中也榮衛不足則表虛木入土中則裏急惟表裏急腹中急痛所以先用小建中湯以其能補榮衛兼緩中急則痛可差也或不差必邪尚滯於表知溫為榮衛不通遂為少陽本脈故與小柴胡湯按法施治也成無已去黃芩加芍藥疏外調中其說亦是詳○汪琥曰弦脈不除痛猶未止者為不差此為少陽經有留邪也○傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之註傷寒未解嘔吐者胸中有熱邪上逆也腹中痛者胃中有寒邪內攻也此熱邪在胸寒邪在胃陰陽之氣不和失其升降之常故用黃連湯寒溫互用甘苦並施以調理陰陽而和解之也然此屬外因上下寒熱之邪故有如是之證若內雜病嘔吐而腹痛者多因宿食由此推之外因內因證同而情異概可知矣詳○程知曰陰邪在腹則陽不得入而和陰為腹痛陽邪在上則陰不得入而和陽為欲嘔逆○汪琥曰尚論篇皆以風寒二邪分陰陽寒就殊不知風之初來未必非寒寒之既入亦能化熱不可拘也○鄭重光曰此熱邪中於上焦寒邪中於下焦陰陽不相入失其上下升降之常也

黃連湯方 黃連兩 甘草三兩 乾薑三兩 人參兩 桂枝三 半夏半升 大棗十二枚

二
筋傷寒邪氣入裏因人藏氣素有之寒熱而化病如陽病輕滿不大便而嘔舌上白苔者以小柴胡湯及太陽病下之裏虛寒嘔舌上如胎者以梔子豉湯之類是隨胸中有寒丹田有熱化者也此則隨胃中有寒胸中有熱而化腹中痛欲嘔吐故以是方主之君黃連以清胃中之熱臣乾薑以溫胃中之寒半夏降逆佐黃連嘔吐可止人參補中佐乾薑腹痛可除桂枝所以安外太棗所以培中也然此湯寒溫不一甘苦並投故必加甘草協和諸藥此為陰陽相格寒熱並施之治法也

太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者外已解也證胸滿脹痛者與小柴胡湯證太陽病十日以上無他證脈浮細而嗜卧者外邪已解不須藥也設有胸滿脹痛等證則口少陽之外邪未解故與小柴胡湯和之若脈但浮不細而有頭痛發熱惡寒無汗等證則仍太陽之外邪未解當與麻黃湯汗之按論中脈浮細太陽少陽脈也脈弦細少陽脈也脈沉細少陰脈也脈浮細身熱嗜卧者陽也脈沉細

身無熱者臥者陰也脈緩細身和身和者臥者已解也是皆不可不察也。王肯堂曰此條當是太陽少陽合病胸滿而脈浮細嗜卧則為表邪已解脇痛為少陽有邪故與小柴胡湯若脈但浮者又當先治太陽也。故與麻黃湯此是設為變通之言非為服柴胡而脈浮也。○傷寒發熱汗出不解心中痞硬嘔吐而下利者大柴胡湯主之極下利之下字當是不字昔是下字喜者上吐下利而以大柴胡湯下之之理乎。註傷寒發熱汗出不解表尚未已也心中痞硬大便不利裏病又急矣嘔吐少陽陽明兼有之證也。少陽陽明兩急心中熱結成痞故以大柴胡湯外解少陽發熱木盡之表內攻陽明成實痞硬之裏也。按太陽病發熱汗出不解心下痞硬下利不嘔吐者此表裏俱虛桂枝人參湯證也。若嘔吐不利者此表裏俱實太柴胡湯證也。彼則脉微弱此則脈必有力也。○太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也。由大柴胡湯下之則愈註太陽病傳過三陽之經十餘日醫不隨經施治反二三下之未致變逆四五日惟見少陽寒熱往來之柴胡證仍在者宜先與小柴胡湯解表和裏如或不愈其嘔不止心下滿急鬱鬱微煩此為少陽表裏均未解也。與太柴胡湯下之攻裏知表自可愈也。集方有執曰過經與壞病同不知何逆而二三下之適所以致逆故曰反也。下而又下陽明雖未傷而少陽亦未除故曰柴胡證仍在也。嘔不止鬱鬱微煩乃邪擾一陽故曰未解也。程知曰此言過經誤下有用大小柴胡兩解法也蓋其人之邪因屢下而深入若表證未罷必先用小柴胡和其半表而後可兼攻其裏也。○程應旄曰此條與陽明經嘔多雖有陽明證不可下之條細酌量陽明證嘔在上而邪亦在膈之上未入府故不可下此條嘔不止心下急乃邪在膈之下已屬胃乃可下也可下不可下此等處最不容誤也。○林淵曰嘔不止則半表裏證猶在然心下急鬱微煩必中有燥屎也非下除之不可故以大柴胡兼而行之。

大柴胡湯方 柴胡解
黃芩 三
半夏半升 芎藥 三
甘草二兩 枳實 四枚
大黃二兩 生薑 五兩

升去滓再煎溫服一升日三服。按許叔微曰大柴胡湯一方無大黃一方有大黃此方用大黃者以大黃有湯滌蘊散之功為傷寒中藥王叔和云若不用大黃恐不名大柴胡湯且經文明言下之則愈若無大黃將何以下心下之急乎應從叔微為是。

柴胡證在裏有裏故立少陽兩解之法以小柴胡湯加枳實芍藥者解其外以和其內也去參草者裏不虛也少加大黃所以鴻結熱也倍生薑者因嘔不止也。

太陽病過經十餘日心中溫溫欲吐而胸中痛大便反溏復微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也。梅子青堂曰溫溫當是溫溫又云以嘔之下當有闕文註太陽病過經十餘日曾經吐下不解者以極吐則虛其胸邪熱乘虛入胸故心下溫溫欲吐而胸中痛也極下則虛其裏邪熱乘虛入裏故大便反溏腹微滿鬱鬱微煩也詢知先時若果經極吐下則為在表之邪熱悉陽胸腹而所見者皆是裏證未和故宜與調胃承氣湯下而和之若不爾者謂不因極吐極下而有斯證則又不可與是湯也夫但欲嘔者少陽也胸中痛者太陽也微溏者太陽少陽合病之利也並無心中溫溫鬱鬱微煩等證固不可與承氣湯矣然此亦非柴胡證故柴胡湯亦不可與也須從太陽少陽合病下利。

膈也者當極吐則應有心下溫溫欲吐之狀何也以胃口已被吐傷邪熱上搏於膈故欲吐而不得吐也腹微滿微熱微煩亦在胃也若曾極下則應大便微溏何也以下則胃虛邪雖實於胃大便反不能結硬也故曰先此時自極吐下者與調胃承氣湯言當滿其熱以和其胃也不爾言未經極吐下也但欲嘔至未申明上文之意喻昌曰太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而不吐其人胸中痛大便反溏腹微滿微熱微煩者此有一辨若曾經大吐大下者裏邪從吐解且已入裏可用調胃承氣之法若未經極吐下但欲嘔不嘔胸中痛微溏者是病非吐所傷滯非下所致調胃之法不可用矣○程知曰過經者謂病過七八日至十三日經氣已調猶不解也豈惟十三日且有二十餘日者矣蓋過經十餘日必皆在陽經留連若在陰經則又宜能若是之持久耶久持且不能安寧其生乎○程應旄曰大便溏則氣得下腹不應滿煩不應鬱鬱今仍腹微滿微熱微煩必曾有阻留而下後仍不快暢也病屬陽明證反無陽明而祇有少陽其中必有所誤故直將其所以致證之由而後可從證上認病○傷寒十三日不解胸脅滿而嘔日晡所發熱潮之而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之註凡傷寒過經不解者邪轉屬胃府者多皆當下之今傷寒十三日不解過經胸脅滿而嘔日晡所發潮熱者已而微利此本大柴胡證也下之而不通利今反利者詢知為醫以丸藥迅下之非其治也迅下則水雖去而燥者仍存恐醫以後之利為虛故復指曰潮熱者實也是可再下者也但胸脅之邪未已故尤宜小柴胡湯以解少陽之外復以小柴胡湯加芒硝以下少陽之裏不用大黃而加芒硝者因裏不急急經迅下惟其與堅潤燥耳是又下中兼和之意也集內臺方議曰蓋潮熱雖屬實然已先用丸藥傷動藏府若再用大黃下之則脾氣傷而成壞證矣祇用芒硝潤燥以取利也○方有執曰十三日過經也不解壞證也非其治也以上方原其壞由於醫之誤以下至末救誤之治也

柴胡加芒硝湯方 於小柴胡湯方內加芒硝六兩餘依前法服不解再服

傷寒十三日不解過經讓語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當硬而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若大便不利者脈當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之註此承上條互發其義以詳其治也傷寒十三日不解過經讓語者以有熱也當以湯樂下其熱但上條潮熱之熱熱在表裏當大便不硬此條讓語之熱熱歸胃府當大便硬若小便利者大便當硬今大便不硬而反下利脈調和者知為醫以丸藥下之之利非其治也如未經丸藥下之自下利者則為內虛而利脈當微弱而厥今反和而不微厥此為內實有熱非內虛有寒也雖下利乃熱利也仍當下其熱故以調胃承氣湯主之集內臺方議曰傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也註成無已曰表邪傳裏不和則不能食而嘔今反能食而不嘔是邪不傳陰但在陽也○方有執曰陽以表言陰以裏言能食不受邪也謂成無已曰表邪傳裏不和則不能食而嘔今反能食而不嘔可徵裏氣之和而少陽之邪自解也裏既和而少

陽之邪解則其不傳三陰斷斷可必故三陰不受邪也○傷寒六七日無大熱其人煩躁者此為陽去入陰故也註傷寒六七日邪欲入裏之時也無大熱表熱微也躁煩者裏熱盛也此為陽去入陰也陽去入陰者謂陽邪去表人裏傳於三陰也集成無已曰內熱為煩謂心中鬱煩也外熱為躁謂身外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治○方有執曰去往也言表邪去而入於裏所以外無他熱而內則煩躁也

婦人中風發熱惡寒表病也若經水不來熱必無由傳於血室今經水適來得之七八日後脈遲熱除身涼似乎表欲解矣若復見胸脇下滿口結胸狀讖語之證則知非表解入裏乃表邪之熱因經水適來來虛而入於血室也法當刺期門為肝之穴肝為藏血之所今邪入血室故刺期門隨其血分實然而渴之也集方有執曰血室為榮血停留之所經血集會之處即衝脈所謂血海是也其脈起於氣衝並少陰之經夾脅上行至胸中而散故熱入而病作其證則如是也期門二穴在不容兩傍各去同身寸之一十五分肝之募也肝納血故刺期門所以渴之實熱也○汪琥曰邪傳少陽熱入血室故作讖語等證仲景恐人誤認為陽明府實證輕用三承氣以伐胃氣故特出一刺期門以療之婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之註婦人中風大白續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室血與熱搏其血必結然雖結而無胸脇滿如結胸狀等證是為結而未實也尚有如瘧狀之寒熱發作有時乃為邪在少陽半表半裏也故用小柴胡湯以和表裏熱自解也集方有執曰有經水適來者因熱入血室血出而熱遂遺也此適斷者熱乘血來而遂入之與後血相搏俱留而不出故曰其血必結也○程知曰前證經水來而胸脇滿結讖語是邪實於藏也故用刺以渴之此證因血結而寒熱如瘧是邪發於經也故用小柴胡湯和之○婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讖語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈註上二條發明風邪熱入血室之證此條發明寒邪熱入血室之證婦人傷寒發熱無汗經水適來則必熱入血室故晝則明了知邪不在陽也暮則讖語如見鬼狀者是為邪在陰也無犯胃氣及上二焦者通謂三焦也蓋禁人汗吐下三法皆不可輕用當俟其經行必熱隨血去而愈也集方有執曰必自愈者言俟其經行血下則邪熱得以隨血而俱出猶之鼻衄紅汗故自愈也蓋嘗人勿妄攻以致變亂之意林淵曰傷寒發熱者寒已成熟也經水適來則血室空虛邪熱乘虛入於血室若晝日讖語為邪客於府與陽爭也此晝日明了暮則讖語如見鬼狀者是邪不入府而入於血室與陰爭也陽盛讖語宜下此不可下者犯胃氣也彼熱入血結寒熱者與小柴胡湯散邪發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗藥犯其上焦也若熱入胸脇滿如結胸者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門以犯其中焦也必自愈者以經行則熱隨血去血下則邪熱悉除而愈矣血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默然不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也一云藏府相連其痛必下脇膈中痛小柴胡湯主之註此詳申上三條婦人中風傷寒經水適來過多以致血弱氣盡腠理不密邪熱之氣乘虛入於血室邪與正相搏結於少陽之界故邪結於脇下也邪正相爭

學於陽則熱矣於陰則寒故往來寒熱也舉已必寢衣則止故休作有時也少陽病已人半裏村近厥陰故點點不欲飲食也少陽膽與厥陰肝相為表裏故曰藏府相連也少陽之脈下胸中循脇表厥陰之脈抵少腹循脇裏故其痛必及於脇下而少陽之邪從胸而下脇因胸而病及於脇故曰邪高痛下也邪從胸循脇入裏裹氣上拒故使嘔也仲景重出此條仍主之以小柴胡湯者便知法不外少陽不必另從厥陰血室中求治也註喻昌曰四條皆互文見意也一云經水適來一云經水適斷一云七八日熱除而脈遲身涼一云七八日續得寒熱發作有時一云胸脇下滿一云邪氣因人與正氣相搏結於脇下一云如結胸狀一云邪高痛下一云讖語一云晝日明了暮則讖語如見鬼狀一云如瘧狀一云往來寒熱休作有時一云刺期門一云用小柴胡湯一云毋犯胃氣及上二焦皆互文以明太意而自為註脚也學者試因此而細繹全書思過半矣口結胸狀四字仲景尚恐形容不盡重以藏府相連邪高痛下之語暢發病情益血室者衝脈也下居腹內厥陰肝之所主也而少陽之膽與肝相連府邪在上藏邪在下胃口逼處二邪之界所以默默不欲飲食而但喜嘔耳期門者肝之募也隨其實而瀉之瀉肝之實也刺期門之註脚也小柴胡湯治少陽之正法也毋犯胃氣及上二焦則舍期門小柴胡湯更無他法矣嘔而發熱者小柴胡湯主之衍文已見太陽中篇半夏湯條上少陽病欲解時從寅至辰上註雷卯辰木旺之時也經云陽中之少陽通於春氣故少陽之病每乘氣旺之時而解經氣復理固然也集魏病形曰病在少陽乘其正旺如法治之何病不已

音切 少去聲濤音色溫切骨腠音湊

卷六

訂正仲景全書傷寒論註

辨太陰病脈證并治全篇

六氣之邪感人雖同人受之而生病各異者何也蓋以之形有厚薄氣有盛衰藏有寒熱所受之邪每從其人之藏氣而化故生病各異也是以或從虛化或從實化或從寒化或從熱化譬諸水火水盛則火滅火盛則水耗物盛從化理固然也誠知乎此又何疑乎陽邪傳陰變寒化熱而遂以為奇耶自後漢迄今千載以來皆謂三陰寒邪不傳且以傷寒傳經陰邪謂為直中抑知直中乃中寒之證非傳經之邪耶是皆未曾熟讀仲景之書故有此誤耳如論中下利腹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯此三陽陽邪傳入太陰邪從陰化之寒證也如少陰病下利白通湯主之此太陰寒邪傳少陰之寒證也如下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之此少陰寒邪傳厥陰之寒證也皆歷歷可據豈得謂傷寒陰不相傳無陽從陰化之理乎夫太陰濕土統陰之藏也故病一入太陰則邪從陰化者多陽化者少從陰化者如論中腹滿吐食自利不渴手足自溫時腹自痛宜服理中四逆輩者是也從陽化者如論中發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯腹滿大疼痛者宜桂枝加大黃湯主之者是也蓋脾與胃同處腹中故腹滿腹痛兩皆有之然腹滿為太陰主病心下滿為陽明主病其陽明亦有腹滿者以陽明腹滿與熱同化故必有潮熱自汗不大便之證而不似太陰與濕同化有發蓄暴煩下利穢腐之證也誠能更於腹之時痛大實痛腹滿痛處詳審虛實酌酌溫下則了無餘義矣故以此括之自知太陰之要

法也○太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞶按吳人駒曰自利益甚四字當在必胸下結鞶句之下其說甚是若在吐食不下句之下則是已吐食不下而自利益甚矣仲景復曰若下之無所謂也註太陰脾經也其脈布胃中絡於嗌寒邪傳於太陰故腹滿時腹自痛寒邪循脈犯胃故吐食不下此太陰裏虛邪從寒化之證也當以理中四逆輩溫之若腹滿嗌乾不大便大實痛始為太陰裏實邪從熱化之證當以桂枝加大黃湯下之矣若以太陰虛寒之滿痛而誤認為太陰實熱之滿痛而下之則寒虛相搏必變為藏結痞鞭及自利益甚此太陰病全篇之提綱後凡稱太陰病者皆指此證而言也註程應旄曰陽邪亦有腹滿得吐則滿去而食可下者今腹滿而吐食不下則滿為寒脹吐為寒格也陽邪亦有下利腹痛得利則痛隨利減者今下利而時腹自痛則利為寒利痛為寒痛也曰胸下陰邪結於胸下之陰分異於陽邪結胸之在胸且按之而痛也曰結鞭無陽以化氣則為堅陰異於痞之濡而與也彼皆陽從上陷而阻留此為陰從下逆而不歸寒熱大別也○吳人駒曰自利益有時而腹自痛非若積蓄而常痛者若以諸痛為實從而下之其滿益甚必令胸下皆為結鞭而自利益甚矣○傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也註傷寒四五日邪入太陰之時也腹中痛若不轉氣下趨者屬陽明也今腹中痛轉氣下趨少腹者乃太陰欲作自利之候也此仲景示人不可以諸痛為實而妄議下之意也註方有執曰腹中痛轉氣下趨者裏虛不能守而寒邪下迫也○張璐曰腹痛亦有屬火者其痛必自下而上攻若痛自上而下趨者定屬寒痛無疑矣○魏荔彤曰此重在預防下利而非辨寒熱也玩若字欲字可見其辨寒邪者自有別法○自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩註凡自利而渴者裏有熱屬陽也若自利不渴則為裏有寒屬陰也今自利不渴知為太陰本藏有寒也故當溫之四逆輩者指四逆理中附子等湯而言也註程知曰言太陰自利為寒宜溫者也少陰屬腎水熱入而耗其水故自利而渴太陰屬脾土寒入而從其濕則不渴而利故太陰自利當溫也○程應旄曰三陰同屬藏寒少陰厥陰有渴證太陰獨無渴證者以其寒在中焦總與龍雷之火無涉少陰中有龍火底寒甚則龍升故自利而渴厥陰中有雷火故有消渴太陽一照雷雨收聲故發熱則利止見厥而復利也○魏荔彤曰自利二字乃未經誤下誤汗誤吐而成者故知其藏本有寒也

理中圓方

人參

白朮

甘草

乾薑各三兩

右四味擣篩蜜和為丸如雞子黃許大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服

腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依而數切用水八升者取三升去渣溫服一升日三服

加減法

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

吐多者去朮加生薑三兩

下多者還用木朮者加茯苓二兩

渴欲得水者加木足

許微自溫勿發揭衣服

謂陽虛即中氣失守膻中無發宣之用六府無麗陳之功猶如釜薪失焰故下至清穀上失滋味五藏凌奪者證所由來也參木足草斤以

守中州屹立平以溫中止利人之以然金子乃為易人之以然

水火互勝即當脾腎雙溫加之以附子則命門益而土母溫矣白朮補脾得人參則壅氣故陰下動氣吐多腹滿皆虛也加桂以伐腎邪加生薑以止嘔也加附子以消陰也卜多者濕勝也還用本燥濕也渴欲飲水飲渴也加朮使飲化津生也心下悸停水也加茯苓導水也腹中痛倍人參虛痛也寒者加乾薑寒甚也

傷寒本自寒下醫復吐之寒格更逆吐下若食人口即吐乾薑苗連黃芩人參湯主之按經論中並無寒下之病亦無寒下之文玩本條下文寒格更逆下可知寒下之下字當是格字文義始相屬註家皆釋胃寒下利不但文義不屬且與今連之藥不合註經曰格則吐逆格者吐逆之病名也朝食暮吐脾寒格也食入即吐胃熱格也本自寒格謂其人本自有朝食暮吐寒格之病也今病傷寒雖見可吐可下之證遂執成法復行吐下是寒格更逆於吐下也當以理中湯溫其太陰加丁香降其寒逆可也若食人口即吐則非寒格乃熱格也當用乾薑人參安胃黃連黃芩降胃火也

乾薑苗連黃芩人參湯方 乾薑 黃連 黃芩 人參各三 右四味以水六升煮取二升去渣分溫再服

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯註傷寒醫不分表裏寒熱虛實而誤下之續得下利清穀不止者寒其裏也雖有通身疼痛之表未除但下利清穀不止裏寒已盛法當急救其裏俟便利自調仍

身疼痛不止再救其表可也救裏宜四逆湯溫中勝寒救表宜桂枝湯調榮和衛也集王三陽曰此證當照顧協和利須審其利之色何如與

清穀太陰寒邪已傳少陰即有身痛不可攻表若誤攻其表即使汗出太陽表解而太陰寒凝必脹滿矣下利腹脹滿身體疼痛者先溫其

裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯註此承上條互發其證以明先裏後表之治也下利腹脹滿者裏寒邪也身體疼痛者表寒邪也

凡表裏寒邪之證同見總人裏溫為急故當先溫其裏後攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯集方有執曰裏虛表實惟其虛也故必先之

惟其實也故可後焉○發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之註發汗後表已解而腹滿者太陰裏虛之脹滿也故以厚朴生薑

甘草半夏人參湯主之消脹散滿補中降逆也集成無己曰吐後脹滿與後脹滿皆為實者言邪氣虛人裏而為實也發汗後則外已解腹脹滿知非裏實由太陰不足脾氣不通故壅而為滿也與此湯和脾胃而降逆氣宜矣○汪琥曰此條乃汗後氣虛腹脹滿其人雖作脹滿而

內無實形所以用人參炙甘草等甘溫補藥無疑也○張錫駒曰此言發汗而傷其脾氣也脾主腹故腹滿為太陰主病發汗後而腹脹滿則

知其人脾氣素虛人脾氣愈虛則不能轉輸陽氣不降清氣不升而脹滿作矣

厚朴生薑半夏甘草人參湯方 厚朴半斤炙 生薑半斤 半夏半升 甘草二兩

人參一兩 右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯註此詳申上條互發其義以別其治也發汗後表已解腹滿不痛者乃腹滿時減減復如故之虛滿也當溫之厚朴生薑半夏甘草人參湯證也今發汗後表不解腹滿大痛者乃腹滿不減減不足言之實滿也當下之宜大承氣湯蓋以裏急先攻裏後和表也集喻昌曰減不足言四字形容腹滿如繪見滿至十分即減去一二分不足殺其勢也此所以縱有外邪未解而當下無疑矣○程應旄曰下之而腹滿如故即減去一二分算不得減下之不妨再下必當以減盡為度也○劉完素曰太陰無可下之法也設在經則各經已無可下之理在藏則太陰尤無受下之虛桂枝加大黃湯安能無疑乎不知脾與胃相表裏也太陽誤下太陰受邪過胃有宿食則脾因胃之實而實亦即因太陽之邪而痛矣既大滿大痛已成胃實又非此湯之所能治故宜太承氣湯也○太陰病脈浮者可於汗宜桂枝湯註太陰經病脈當浮緩太陰藏病脈當沉緩今邪至太陰脈浮不緩者知太陽表邪猶未全罷也故即有吐利不食腹滿時痛一二證其脈不沉而浮便可以桂枝發汗先解其外俟外解已再調其內可也於此又可知論中身痛腹滿下利急先救裏者脈必不浮矣集王肯堂曰病在太陽脈浮無汗宜麻黃湯此脈浮當亦無汗而不言者謂陰不可有汗不必言也不用麻黃湯而用桂枝湯蓋以三陰兼表病者俱不當大發汗也須識無汗亦有用桂枝者○程知曰此言太陰宜散者也太陰病謂有腹痛下利證也太陽脈尺寸俱浮今脈浮則邪還於表可知矣故宜用桂枝解散不用麻黃者陰病不得大發其汗也桂枝湯有和裏之意焉○程應旄曰此太陰中之太陽也雖有裏病仍從太陽表治方不引邪入藏○本太陽病醫不以桂枝湯發之而反下之因而邪陷入裏餘無他證惟腹滿時痛者此屬太陰裏虛痛也故宜桂枝加大黃湯主之註本太陽中風病醫不以桂枝湯發之而反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝芍藥湯以外解太陽之表而內調太陰之裏虛也若大滿實痛則屬太陰熱化胃實痛也故宜桂枝加大黃湯以外解太陽之表而內攻太陰之裏實也集趙嗣真曰太陰腹滿證有三有次第傳經之邪有真人中寒之邪有下後內陷之邪不可不辨○喻昌曰太陽病之誤下其變皆在胸膈以上此之誤下而腹滿時痛無胸膈等證則其邪已入陰位所以屬在太陰也仍用桂枝解肌之法以升發太陽之邪倍芍藥者以調太陰之氣本方不增一藥斯為神耳太實大滿宜從急下然陽分之邪初陷太陰未可峻攻但於桂枝湯中少加大黃七表三裏以分殺其邪與大柴胡湯同其義也○程應旄曰誤下太陽而成腹滿時痛太陰之證見矣然表邪內陷留滯於太陰非藏寒病也仍用桂枝湯升發陽邪但倍芍藥以調和之倘太實而痛於證似可急下然陰實而非陽實仍從桂枝例升發陽邪但加大黃以破結滯之物使表裏兩邪各有去路則寒隨實去不溫而自溫矣然此二證雖屬之太陰實從太陽傳來則脈必尚浮可知

枝加芍藥湯方 於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

枝加大黃湯方 桂枝三兩

大黃兩

芍藥六兩

甘草三兩

生薑三兩

大棗數枚

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三

卦柯琴曰腹滿為太陰陽明俱有之證然位同而職異太陰主出太陰病則腐穢氣凝不利故滿而時痛陽明主內陽明病則腐穢燥行故太實而痛是知太實痛是陽明病而非太陰病矣仲景因表證未解陽邪已陷入太陰故倍芍藥以益卑周中而余夏禹之奇病

此用陰和陽法也若表邪未解而陽邪陷入陽明則加大黃以潤胃通結而除其太實之痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃之氣液胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相搏故轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明則腹滿太實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆太實而痛是燥屎之徵故倍加芍藥小變建中之劑少加太奮微示調胃之方也太陰為病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱動故也註太陰為病必腹滿而痛治之之法當以脈消息之若其人脈弱則其中不實雖不轉氣下趨少腹然必續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以胃氣弱難堪峻攻其便易動故也由此推之可知大便鞞者不論在陰在陽凡脈弱皆不可輕下也註程知曰此言太陰脈弱恐續自利雖有腹痛不宜用攻與建中湯和發明也○喻昌曰此段叮噹與陽明篇中互相發明陽明曰不轉失氣曰先鞞後瀉曰未定成鞞皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱恐續自利雖有腹痛減用大黃芍藥又是恐傷陽明胃氣也○汪琥曰或問太黃能傷胃氣故宜減芍藥能調脾陰何以亦減之答曰脈弱則氣餒不充仲景以溫甘之藥能生氣芍藥之味酸寒雖不若太黃之峻要非氣弱者所宜多用故亦減之○傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰富於身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腹穢當攻也註程知曰此言自利之證脈浮緩手足溫則為脾實也太陰脈本緩故浮緩雖類太陽中風而手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰厥陰之厥逆所以為繫在太陰也太陰濕熱相蒸熱必發黃然小便利則濕下泄而不發黃矣此雖暴煩頻利有似少陰之證然其利當自止所以然者以脈浮緩手足溫知其人脾氣實而非虛寒之比其濕熱所積之腐穢自當逐之而下也若不辨晰而以四逆法治之則誤矣○程應旌曰太陰得浮緩手足溫之脈證則胃陽用事自無藏寒之痛陰營或有之小便不利必發黃雖發黃不為陰黃若小便自利者不能發黃陰欲鬱而陽必驅至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止所以然者脈不沉且弱而浮緩手足不涼而自溫陰得陽以周護則不寒不寒則不虛是為脾家實也經曰陽道實陰道虛陰行陽道豈肯容邪久住此則腐穢當去故耳○汪琥曰下利煩燥者死此為先利而後煩是正氣脫而邪氣擾也茲則先煩後利是脾家之正氣實故不受邪而與之爭因暴發煩熱也○太陰中風四肢煩痛陽微陰濶而長者恐欲愈註程知曰此言太陰病是從太陽中風傳來者故有四肢煩疼之證也陰陽以浮沉言夫以浮微沉濶之太陰脈而兼見陽明之長脈則為陰病陽脈藏邪傳府故為欲愈也也故自利宜用四逆傷風陽邪也故煩痛見於四肢凡太陰病脈浮者多是太陰中風○喻昌曰微濶之中更察其脈之長而不短知元氣未漓其病當自愈也○太陰病欲解時從亥至丑上註程知曰此言太陰所旺之時亥子丑乃太陰所旺之時也當此旺時故邪不能勝而自解矣

音切 趙叔向

揭音計 腐音府 穢據廢

卷七

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陰病脈證並治全篇 少陰腎經水火之藏邪傷其經隨人虛實或從水化以為寒或從火化以為熱寒之邪是其本也火化為陽熱之邪是其標也少陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細而數至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽邪雖欲寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽邪背惡寒則口中燥陰邪咽痛不腫陽邪咽痛腫陰邪腹痛下利清穀陽邪腹痛下利清水或便膿血也陰邪外熱面色赤裏寒大便利小便白陽邪外寒手足厥裏熱大便祕小便赤此少陰標本寒熱之脈證也凡從本之治均宜溫回陽從標之治均宜攻熱救陰回陽救陰其機甚微總在臨證詳究辨別標本寒熱以急施其治庶克有濟稍緩則不及矣○少陰之為病脈微細但欲寐也註少陰腎經陰盛之藏也少陰受邪則陽氣微故脈微細也衛氣行陽則寤行陰則寐少陰受邪則陰盛而行陰者多故但欲寐也此少陰病之提綱後凡稱少陰病者皆指此脈證而言也註方有執曰少陰腎經也居於極下其脈於小趾之下靈樞曰是主所生病者嗜卧但欲寐蓋人尚天地天地之氣行於陽則動而寤行於陰則靜而寐凡病人但欲寐者邪客於陰故也○張璐曰此言少陰之總脉總證也蓋少陰屬水主靜即使熱邪傳至其經在元之脈雖是大此時亦必變為沉細在先之證雖煩熱不寧此時亦必變為昏沉嗜卧但須辨出脈沉細數口中燥為熱證脈沉微細口中和為寒證以此問辨萬無差誤矣○程應旄曰太陰脈皆沉異乎太陽之浮不必言矣陽明脈大微者大之反少陽脈弦細者弦之反沉兼微細陰證定矣少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之註少陰病謂但欲寐也脈沉者謂脈不微細而沉也今始得之當不發熱而反發熱者莫非少陰之裏寒兼有太陰之表熱也故宜麻黃附子細辛湯溫中發汗顧及其陽則兩感之寒邪均得而解之矣註方有執曰發熱邪在表也脈沉少陰位北而居裏也以其居裏邪在表而發熱故曰反也以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫通於少陰用之以佐主治者以其專經而為向導也○程知曰三陰表法與三陽不同三陰必以溫經之藥為裏而少陰尤為繁闊故用散邪溫經之劑俾外邪之深入者可出而內陽亦不因之外越也○程應旄曰一起病便發熱兼以陰經無汗世有計日按證者類能用麻黃而忌在附子不知脈沉者由其人腎經素寒裏不能協應致沉而不能浮也沉屬少陰不可發汗而始得病時即發熱則兼太陽又不得不發汗須以附子溫經助陽託住其裏使陽不至隨汗而越其麻黃始可合細辛用耳○林淵曰傳邪與陰寒皆有沉脈沉但可為病之在裏而未可專以沉為寒也夫少陰證中微細而沉與細數而沉其為寒熱之殊蓋大有別矣

麻黃附子細辛湯方 麻黃二兩

細辛二

附子一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一

升日二服

少陰病耳之二三日麻黃附子甘草湯

附子甘草湯微發其汗也蓋謂三日不見吐利裏寒之證知利已衰然禁仍在外尚當汗之但不可過耳故不用桂草而用甘草此二條與太陽篇發熱頭痛脈沉用四逆者同一證彼以不差則期過三日可知病已入裏雖尚冒太陽頭痛直以少陰法律之此少陰病在初得二三日雖無頭痛證不容竟作少陰治之故仍兼太陽之法以律之一出一入不啻是晝假今前條得之二三日後二條過二三日不差則四逆之與麻黃易地皆然矣○汪琥曰上條反發熱脈沉此亦反發熱脈沉但上言始得之為急此言得之二三日為緩病勢稍緩治法亦緩

麻黃附子甘草湯方 麻黃二兩 附子一枚炮去
一升日三服 集柯琴曰彼太陽病其脈反沉便用四逆以急救其裏是裏寒陰盛也此少陰脈而表反熱便於表剤中加附子以預固其陽是表熱陽衰也夫以發熱無汗太陽之表脈沉但欲寐少陰之裏設用麻黃開腠理細辛散浮熱而無附子以固元陽則太陽之微陽外亡惟附子與麻黃並用則寒邪散而陽不亡也此裏病及表脈沉而當發汗者與病在表脈浮而發汗者逕庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又少間矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濡者復不可下之註少陰病脈微雖有發熱亦為少陰裏寒外熱非太陽發熱者可比故不可發汗於汗則亡陽然陽已虛津液已涸即見少陰口燥咽乾可下之證若尺脈弱濡者復不可下之又恐亡陰也集方有執曰微者陽氣不充故曰無陽無陽則化不行故汗不可發也尺以候陰弱濡者陰血不足也故謂復不可下其當亟行溫補又可知矣○程應旄曰少陰多自利證人固無肯輕下者但拈出尺脈弱濡字則少陰之有太承氣湯證其尺脈必強而滑也伏見於此處矣

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利註病人脈陰陽俱緊發熱無汗者太陽傷寒證也發熱汗出不止者太陽亡陽證也今脈緊無汗而反汗出此屬少陰少陰證法當咽痛而復吐利也上條脈微無汗不可發汗者是以脈為主也此條有汗脈緊不可發汗者是以證為主也從脈從證不可不察集程知曰陰陽俱緊傷寒之脈也法當無汗而反汗出太陽之陽外亡也若以少陰亡陽之證而認為太陽中風之證則誤矣少陰之寒上逼則咽痛而吐下逼則下利也少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者為欲解也雖煩下利必自愈註此承上條互發其義以別陰陽寒熱也少陰病脈沉微細寒邪脈也脈沉數細熱邪脈也若脈緊汗出是少陰寒虛證也今脈緊無汗乃少陰寒實證也因循至七八日之久而自下利若寒實解則脈必緊去而暴微其證必反足由冷而反溫是知邪隨利去為欲解也故此時雖煩下利乃陰退陽回故知其必自愈也集方有執曰緊寒邪也自下利脈暴微者陰寒內渴也故謂手足為反溫言陽回則陰退故謂緊反去為欲解也夫寒邪在陰而脈緊得自利脈暴微手足溫緊去為欲解者猶之邪在陽脈數而熱得汗出脈和

身涼數考欲愈之意同陰陽勝復之機也○程應旋曰脈於利後頓變緊而為微手足於利後變不溫而為溫則微非諸微工陽之微乃緊去人安之微蓋以前之寒已從下利而去故陽氣得回而欲解也雖煩下利必自愈少陰病得之二三日口中和其背惡寒者當之附子湯主之註背惡寒為陰陽俱有之證如陽明病無大熱口燥渴心煩背微惡寒者乃白虎加人參湯證也今少陰病但欲寐得之三日口中不燥而和其背惡寒者少陰陽虛之背惡寒非陽明熱蒸之背惡寒也故當久之更主以附子湯以助陽消陰也口燥口和誠二者之確微矣詳程知曰言初得之證口中和不渴不燥全無裏熱也內經曰背為陽背惡寒則陽虛陰盛寒深可知若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣之以助陽消陰與附子湯以溫經散寒論中二傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎湯加人參主之彼是陽氣來陰虛而內陷之惡寒與此之陰寒盛者不同陽入陰者則口燥心煩陰寒盛者則不能銷津液故口中和○張璐曰太陽表氣太虛邪氣得人犯少陰故得之一日尚背惡寒不發熱此陰陽兩虧較之兩感更自不同兩感表裏皆屬厥邪猶堪發表攻裏此則內外皆屬虛寒無邪熱可以攻擊惟當溫經補陽以溫補其不足更灸關元以協助之雖其證似緩於發熱脈沉而危殆尤甚焉○汪琥曰此條論仲景不言當灸何穴常器之云當灸鬲俞關元分背俞第三行邪雅云此有錯字當灸鬲俞關元穴也鬲俞是背俞第二行穴按鬲俞實係背俞部第二行穴然常器之所云第三行穴者當是鬲關非鬲俞也圖經云鬲關二穴在第七椎下兩旁相去各三十隔中正坐取之足太陽氣脈所發患治背惡寒脊強俯仰難可灸五壯益少陰中寒必由太陽而入故寘灸其穴又關元一穴在腹部中行臍下三寸足三陰任脈之會可灸百壯常器之所謂灸鬲關者是溫其表以散外邪灸關元者是溫其裏以助其元氣也○少陰病身體痛手足寒骨節痛是裏寒故主附子湯溫裏以散寒也謀方有執曰少陰腎也腎主膏寒淫則痛○程應旋曰身體痛手足寒骨節痛太陽傷寒同此有證也以脈沉辨之沉屬陰寒重者所致裏陰有餘表陽不足故以附子湯主之

附子湯方

二枚去皮生破八片

茯苓

三兩

人參

二兩

白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服解少陰為寒水之藏故寒傷之重者多入少陰所以少陰一經最多死證方中君以附子二枚者取其力之銳且以重其任也生用者一以壯少火之陽

一以散中外之寒則身痛自止惡寒自除手足自溫矣以人參為臣者所以固生氣之原令五藏六府有本十二經脈有根脈自不沉骨節可和矣更佐白朮以培土芍藥以平木茯苓以伐水水伐火自旺則陰翳消本平土益安安則水有制制則生化此誠萬全術也其有

畏而不敢用以致因循有誤者不誠可惜哉

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯註少陰病但欲寐脈沉者若無發熱口燥之證則寒邪已入其藏不須遲疑急溫之以四逆湯消陰助陽可

集吳人駒曰脈沉須別虛實及得病新久若得之多日及沉而實者須從別論

解方名四逆者主治少陰中外皆寒四肢厥逆也君以甘草之甘溫溫養而無臣以薑附之辛溫助陽而無使則可也此即謂附子之溫助陽藥也附子味辛性溫能散寒而溫助陽氣也

水中暖土之功薑附得甘草通關節走四肢有逐陰回陽之力腎陽鼓寒消則陽氣外達而脈自升手足自溫矣謹汪琥曰少陰病本脈微細但欲寐今輕用之微脈不見重取之細脈幾亡伏匿而至於沉此寒邪深入於裏殆將入藏溫之不容以不急也稍遲則惡寒身蜷吐利煩躁不得卧寐手足逆冷脈不至諸死證立至矣四逆湯之用可稍緩乎

少陰病下利白虎湯主之註少陰病但欲寐脈微細已屬陽為陰困矣更加以下利恐陰降極陽下脫也故君以葱白大通其陽而上升佐以

薑附急勝其陰而緩降則未脫之陽可復矣集方有執曰少陰病而加下利者不獨在經而亦在藏寒甚而陰盛也治之以乾薑附子者勝其陰則寒自散也用葱白而曰白通者通其陽則陰自消也○程知曰此言下利宜通其陽也少陰病謂有脈微細欲寐證也少陰下利陰盛之極恐致格陽故用薑附以消陰葱白以升陽通之著一以溫之而令陽氣得入以發之而令陰氣易散也○汪琥曰腎虛無火不能生故下利用白通湯者溫裏以散寒也

白通湯方葱白四莖乾薑附子一枚生去皮破八片右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服註汪琥曰此方與四逆湯相類獨去甘草蓋驅寒欲其速猛烈之性取其驟發直達下焦故不欲甘以緩之也而猶重在葱白少陰之陰天之寒氣亦為陰兩陰相合而偏於下利則與陽氣隔絕不通薑附之力雖能益陽不能通陽氣令陰得陽而利庶可愈矣蓋大辛大熱之藥不過藉以益入陽氣非有以通之令真陽和會而何以有濟也耶

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生註此承上條詳由其脈以明病進之義也少陰病下利脈微者與白通湯下利當止今利不止而轉見厥逆無脈更增乾嘔而煩者此陰寒盛極格陽欲脫之候也若喘以熱藥治寒既甚必反格拒而不入故於前方中加入尿猪膽之陰以引陽藥入陰經曰逆者從之此之謂也無脈者言診之而欲絕也服湯後更診其脈若暴出者如燭燼燔高故主死若其脈徐徐微續而出則是真陽漸回故可生也故上條所以續見下利即用白通以治於未形誠善法也註程知曰些言陰盛格陽用膽汁通陰法也以白通與之宜乎陽可救今乃利不止反致厥逆無脈則陰邪愈無矣乾嘔而煩則陽藥在膈而不入陰矣此非藥不勝病乃無鄉導之力也加入尿猪膽之陰寒則可引薑附之溫入格拒之寒而調其逆此內經從治之法也○程應旄曰脈暴出者死無根之陽驟逆於外也微續者生陽氣漸交陰肯納也

白通加猪膽汁湯方葱白四莖乾薑附子一枚生用去皮破八片人尿合五合猪膽汁一合以上三味以水三升煮取一升去滓加膽汁人尿和令相得分溫再服若無膽亦可用方是方即前白通湯加入尿猪膽汁也加尿膽者從其類也下咽之後冷體既消熱性便發情且不違而致太益則二氣之格拒可調上下之陰陽可通矣

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能

制水故令色白也註少陰病欲吐不吐心中煩但欲寐五六日自利而渴者此屬少陰傳邪寒熱俱有之證也若是少陰熱而燥引水之渴小便必色赤乃少陰燥不能生津下焦有熱也今為少陰虛而引水自救之渴故小便則色白是少陰虛冷不能化液下焦有寒也於此可知少陰病形悉具而渴者有寒熱一端之別也譙成無已曰欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時若自利不渴寒在中焦屬太陰也此自利而渴為寒在下焦屬少陰也腎虛水燥故渴欲引水自救下焦虛寒故小便色白非裏熱可知矣○方有執曰此反覆申明曉人勿認煩渴均為熱證以致誤之意○程應旄曰煩證不盡屬少陰故指出但欲寐來渴證不盡屬少陰故指出小便白來結以下虛有寒教人上病治在下也蓋上虛而無陽以溫也二虛字皆由寒字得來又曰吐利少陰故指出小便白來結以下虛有寒教人上病治在下也蓋上虛而無陽以溫也二虛字皆由寒字得來又曰吐利而渴與猪苓湯證同其別在但欲寐且猪苓證小便必不利而色赤飲水與白頭翁證同彼曰以有熱故也小便亦必不白○林瀾曰欲吐不吐心煩陽虛格越於上但欲寐自利小便白裏之真寒已深要知此渴與口燥舌乾之渴不同皆兼腹滿便閉諸語諸證自當作陽邪傳裏治之既裏虛自利小便白其為虛寒明其特曰下焦者足見陰既盛於下陽必格於上豈可以煩渴而誤攻其熱哉○汪琥曰以今文觀之大似熱證惟小便色白知為真寒之證此但欲寐與欲邪不同其寐必不昏濁其呼吸必促而細目屬少陰者以別其非陽邪之渴乃內無津液引水自救之渴誠以冷水飲之必不多也細察其小便若色白者此少陰虛寒之證悉具也非熱邪可知矣○沈明宗曰此少陰虛寒似乎熱證之辨也世但知四肢厥逆為虛寒證詎知小便色白乃為的驗乎○吳人駒曰陽明之欲吐則不得寐在少陰則但欲寐引此以為盛虛之別○少陰病飲入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯按溫當是溫溫嘔者乃吐飲之狀也註此承上條欲吐不吐詳別脈證以明其治也飲食入口即吐且心中溫溫欲吐復不能吐惡心不已非少陰寒虛吐也乃胸中寒實吐也故始得之脈弦遲者飲也遲者寒也而手足寒者乃胸中陽氣為寒飲所阻不能通於四肢也寒實在胸當因而越之故不可下也若膈上有寒飲但乾嘔有聲而無物出此為少陰寒虛之飲非胸中寒實之飲也故不可吐惟急溫之宜四逆湯或理中湯加丁香吳茱萸亦可也註程知曰此言少陰欲吐為腎邪上逆當溫不當吐也欲吐不吐陰邪上逆之證也若始得病時邪未深入其手足但寒而不厥脈但弦遲而不沉細則為邪實胸中寒尚在表屬於陽分當吐而不當不吐者有物嘔則無物兩者須辨若膈上有寒飲但見乾嘔而不能吐出則是陰寒上逆當溫而不當吐也曰急溫者明不溫則見厥逆無脈諸變證也○程應旄曰寒在胸中法不可下而屬實邪但從吐法一吐而陽氣得通吐法便是溫法若膈上有寒飲乾嘔者虛寒從下而上阻留其飲於胸中究非胸中之病也直從四逆湯急溫其下可矣○少陰病脈微細沉但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐者死註此發明上條互詳脈證失於急溫致變之義也脈微細沉但欲卧少陰寒也當無汗今反汗出不煩者少陰一陽也且自欲吐陰寒之邪上逆正當急溫失此不治因循至五六日加之自利復煩躁不得卧寐者此少陰腎中真陽擾亂外越欲絕之死證此時即溫之亦無及矣註方有執曰脈微沉細但欲卧少陰本病也汗出而不作煩熱無陽也欲吐經中之邪不退也自利藏泄也更復煩躁不得卧寐者死註此發明上條互詳

日今時論治者不至於忘失歸目四肢逆冷等證歸員則不敢不知也。到此溫之何及。況諸證有至死不一見者。則真武本論中之要旨一一申詳之。少陰病脈必沉而微細。論中首揭此益已示人以可溫之脈矣。少陰病但欲卧論中又已示人以可溫之證矣。汗出在陽經不可溫在少陰宜急溫。論中又切示人以亡陽之故矣。況復有不煩自欲吐。陰邪上逆之證乎。則真武四逆誠不啻三年之文矣。乃不知預為綱領延緩至五六日前欲吐令自利矣。前不煩今煩。今煩且躁矣。前欲卧今不得卧。妄陽虛擾亂陰盛轉加焉。有不死者乎。○少陰病二三日不已至四五日復痛小便不利。四肢沉重疼痛自下利者。此為有水氣其人或欲或小便不利或下利或嘔者。真武湯主之。註論中云。下有水氣發熱有汗煩渴引飲小便不利者屬太陽中風。五苓散證也。發熱無汗乾嘔不渴小便不利者屬太陽傷寒。小青龍湯證也。今少陰病二三日不已至四五日腹痛下利。陰寒深矣。設小便利是純寒而無水乃附子湯證也。今小便不利或欲或嘔。此為陰寒兼有水氣之證。故水寒之氣外攻於表。則四肢沉重疼痛內盛於裏。則腹痛自利也。水氣停於上焦。胸肺則欬喘而不能卧。停於中焦。胃府則嘔而或下利。停於下焦。膀胱則小便不利。而或少腹滿。種種諸證。總不外乎陰寒之水而不用五苓者。以非表熱之飲也。不用小青龍者。以非表寒之飲也。故惟主以真武湯。寒府同為寒水府。邪為陽邪。藉用麻桂為青龍藏邪為陰邪。藉用附子為真武。

真武湯方

茯苓兩

芍藥兩

生薑切三兩

白朮兩

附子一枚泡去皮切八片

右五味以水八升煮取三升。每服一合。日三服。

若欲加

芍藥

乾姜各一兩

若小便利者去

茯苓

若下利者去

芍藥

加乾薑二兩

若嘔者去

附子

加生薑足前成半斤

附小青龍

湯治表不解。有水氣中外皆寒。實之病也。真武湯治表已解。有水氣中外皆寒。虛之病也。真武者。北方司水之神也。以之名湯者。賴以鎮水之義也。夫人一身制水者脾也。主水者腎也。督為胃關。聚水而從其類者。倘腎中無陽。則脾之樞機雖運。而腎之關門不開。水雖欲行。孰為之主。故水無主制。泛溢妄行。而有是證也。用附子之辛熱。杜腎之元陽。而水有所主。兵白朮之苦燥。建中土。而水有所制矣。生薑之辛散。佐附子以補陽。温中有散水之意。茯苓之淡滲。佐白朮以健土。制水之中有利水之道焉。而尤妙在芍藥之酸飲。加於制水主水藥中。一以渴水使子盜母。虛得免妄行之患。一以斂陽。使歸根於陰。更無飛越之虞。孰謂寒陰之品無益於陽乎。昧者不知序制之理論。中誤服膏龍發汗亡陽。用此湯者亦此義也。然下利減芍藥者。以其陽不外散也。加乾薑者。以其溫中勝寒也。水寒傷肺則欬加細辛。乾薑者。散水寒也。加五味子者。收肺氣也。小便利者去茯苓。以其雖寒而水不能停也。嘔者去附子。倍生薑。以其病非下焦水停於胃也。所以不須用溫腎。以行水。柢當溫胃以散水。佐生薑者。功能止嘔也。解程知曰。白通通脈。真武皆為少陰下利而設。白通四證。附子皆生用。惟真武一證熟用者。蓋附子生用則溫經散寒。炮熟則溫中去飲。白通諸湯以通陽為重。真武以益陽為先。故用藥有輕重之殊。乾薑能佐附。以溫經生薑能資熟附以散飲也。張璐曰。按真武湯方本治少陰病。水飲力結。所以首推水附。兼扶苓生薑之運。脾添水為務。此人所易明也。至用芍藥之微旨。非仲景不能盡此證。雖曰少陰本病而實緣水飲力結。所以腹痛自利。四肢沉重而小便反不利也。若極虛極寒。則小便必清。

自無禁矣安有反不利之理哉此證不但真陽不足真陰亦必素虧或陰中伏有陽邪所致若不用芍藥固護其陰豈能勝附子之雄烈乎人身大熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身太寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也註身體為表藏府為裏此以內外分表裏也皮膚為表骨髓為裏下府為表五藏為裏此以身體之淺深藏府之陰陽分表裏也病人已病之人也身大熱謂通身內外皆熱三陽證也反欲得近衣者乃是假熱雖在皮膚之淺而真寒實在骨髓之深陽極似陰證也按以此人之苦欲測其寒熱真假而定陰陽之證也當與少陰厥陰病論中表熱裏寒裏熱表寒脈滑而厥惡寒不欲近衣口燥咽乾等條參看註成無己曰皮膚言淺骨髓言深皮膚言外骨髓言內身熱欲近衣表寒裏寒也身寒不欲近衣表寒裏熱也大抵表熱寒裏脈沉遲裏熱表寒脈滑數須當辨之鄭重光曰皮膚者骨髓之外浮淺之分也骨髓者皮膚之內沉深之分也欲得近衣借外以禦內此真寒也體有著而成忤不在表之厚薄此假寒也不察人之苦欲何以測其真寒真熱而定標本乎

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之註少陰腎也腎象乎坎一陽陷於二陰之中一陰若盛則一陽必衰陰邪始得內侵孤陽因之而外越也下利清穀手足厥冷脈微欲絕裏陰盛極也身反不惡寒面色赤其外反熱格陽於外也故雖有腹痛乾嘔咽痛等證亦當倣白通湯之法加葱於四逆湯中以消其陰而復其陽可也註程應旄曰熱因寒格無論腹痛乾嘔咽痛皆下利中格陽之證即使利止而脈仍前欲絕不出亦不得謂裏寒已退輒妄去其外熱也須循四逆湯例消陰翳於下部但加葱白宣陽氣於上焦使陽氣通而脈亦出始為真愈○林淵曰格拒格也亦曰隔陽陰陽隔離也又曰戴陽浮於上如戴也夫真寒之裏陰氣未有不感者然其劇不過陽愈微陰愈甚

通脈四逆湯方

甘草三兩

足

乾薑三兩

可四兩

人

附子一枚生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者愈

面色赤者加葱九莖

腹中痛者加芍藥一兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止脈不出者去桔梗加人參

二兩病皆與方相應者乃服之

附論中扶陽抑陰之劑中寒陽微不能外達主以四逆中外俱寒陽氣虛甚主以附子陰盛於下格陽

於上主以白通陰盛於外主以通脈是則可知四逆運行陽氣者附子溫補陽氣者也白通宣通下之陽者也通脈通達內

外之陽者也今脈微欲絕裏寒外熱是腎中陰盛格陽於外故主之也倍乾姜加甘草佐附子易名通脈四逆湯者以其能大壯元陽主持

中外皆招外熱返之於內蓋此時生氣已離亡在俄頃若以柔緩之甘草為君何能疾呼外陽故易以乾薑次之加甘草與乾薑等分者恐

滲漫之餘薑附之猛不能安養元氣所謂有制之師也若重者加葱以通格上之陽腹痛者加芍藥以和在裏之陰嘔逆者加生薑等分者恐

嘔痛者加桔梗以利咽利止脈不出氣少者俱倍人參以生元氣而復脈也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯註少陰吐利法當溫冷令不逆冷反發熱首是陽未衰故曰不犯有脈不至

用灸法是裏寒外熱手足不逆冷而脈不至者也少陰動脈在足內踝○喻昌曰前條背惡寒之證灸後用附子湯陰寒內凝非一灸所能勝此條手足反熱祇因陰外故但灸本經引之內人不必更用溫藥也○汪琥曰經云腎之原出於太谿灸少陰七壯當灸太谿穴在內踝後跟骨動脈陷中○少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之註名曰少陰病土厥陰樂者以少陰厥陰合多病證同情異而治別也少陰有吐利厥陰亦有吐利少陰有厥逆厥陰亦有煩躁此合病而證同者也少陰之厥有微甚厥陰之厥有寒熱少陰之煩躁則多躁厥陰之煩躁則多煩蓋少陰之病多陰盛陽故主以四逆之薑附逐陰以回陽也厥陰之病多陰盛陽故主以吳茱萸之辛烈迅散以通陽也此情異而治別者也今吐而不吐胱手足厥冷故以少陰病名之也蓋厥冷不過肝脾多煩而躁欲死故屬厥陰病主治也所以不用四逆湯而用吳茱萸湯也註程知曰吐利厥邪在裏上干脾胃也厥冷陽不溫於四肢也煩而躁則陰盛之極至於陽氣暴露擾亂不寧也證至此幾瀕危矣非茱萸之辛溫無以降陰氣之上逆非人參薑棗之甘溫無以培土中而制陽邪也躁煩與煩躁亦有別躁者陰蹠煩者陽煩躁煩者言自躁而躁是陽氣猶內爭也其輕重淺深之別學者宜詳審之○程應旄曰溫法原為陰寒而設故真寒類多假熱凡陰盛陽陰證似陽等皆少陰虛寒入耳目處須從假處助出真來方不為之牽制如吐利而見厥冷是言陽衰而腎陰併入也誰不知為寒者顧反見煩躁欲死之證以註之是皆陰被陽拒而置身無地故有此象吳茱萸湯扶木力以益火勢則土得溫而水寒却矣

吳茱萸湯方 吳茱萸一升 人參三兩 生薑一兩 大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升溫服七合日三服

解羅益曰仲景之法於少陰則重固元陽於厥陰則重固生氣厥陰肝木雖為兩陰交盡而一陽之真氣嘗起其中此之生氣一虛則三陰濁氣直逼中上惟本經

諸證悉具將陽明之健運失職以致少陰之真陽浮露而吐利厥逆煩躁欲死食慾欲嘔種種叢生參茱萸等東方震氣辛苦大然能達木鬱直入厥陰降其陰盛之濁氣用以為君人參秉中和正氣甘溫大補能接天真挽回性命升其垂絕之生氣用以為臣倍薑棗和胃而行四末斯則震坤合德木土不害一陽之妙用成而三陰之間無非生氣之氣矣諸證有不退者乎○方有執曰吐則傷陽利則損陰厥冷不能回溫獨陰不化故曰死也註程應旄曰由吐利而躁煩陰陽離脫而擾亂可知之四逆其陽絕矣不死何待使早知溫中宜有此乎○張瑞曰此條與上條不殊何彼可治而此不可治耶嘗是已用溫中不愈轉加煩躁故主死耳○少陰病惡寒身踴而利手足厥冷者不治註此溫中降逆之所須也

少陰病吐利煩躁四逆者死註此承上條互明其義以別可治不可治也此條吐利煩燥厥逆皆與上條同一用吳茱萸湯治之一曰死不治者何也蓋以少陰煩躁多躁少煩躁者陰也厥陰手足厥冷不過肝脾微陽未絕故可治也少陰四肢逆冷不能回溫獨陰不化故曰死也註程應旄曰由吐利而躁煩陰陽離脫而擾亂可知之四逆其陽絕矣不死何待使早知溫中宜有此乎○張瑞曰此條與上條不殊何彼可治而此不可治耶嘗是已用溫中不愈轉加煩躁故主死耳○少陰病惡寒身踴而利手足厥冷者不治註此

互詳上條手足厥冷不治之義也。惡寒身踰而卧雖係少陰證而不至於死。若下利不止手足逆冷不回是有陰無陽即不吐利躁煩亦不可治也。註喻昌曰：陰盛無陽即用四逆等法回陽氣於無何有之鄉。其不能回者多矣。故曰：不治。○少陰病四逆惡寒而身踰脈不至不煩而躁者死。註此總承上三條以明不治之死證也。四逆謂四肢逆冷過肘膝而不回也。表陽虛故踰脉不伸也。表陽虛故惡寒也。陰主屈故踰脉不伸也。脈不至則生氣已絕。若有煩無躁是尚有可回之陽。今不煩而躁則是有陰無陽故曰死也。註程應旄曰：諸陰邪見而脈又不至陽先絕矣。不煩而躁派陰無附將自盡也。經曰：陰氣者靜則神藏。躁則自盡。躁則陰之神外亡也。亡則死矣。便早知復脈以通陽寧有此乎。○少陰病下利脈微濶區而汗出必數更衣反少者當溫其上。次之註脈微陽虛也。濶無也必數更衣者下利勤也。反少者欲下而反少也。即今之陽虛血少裏急後重下利病也。嘔而汗出者陰盛內於上逆而作嘔也。陽虛失護故汗出也。當溫其上。宜次之。註程應旄曰：少陰病下利陽微乃知其脈微而且濶則不但陽微而陰且竭矣。陽微故陰邪逆上而嘔。陰竭故汗出而勤。努責一法之中既欲助陽兼欲推陰則四逆附子輩俱難用矣。惟灸頂上百會穴以溫之既可代薑附輩之助陽而行上更可避薑附之辛窓而燥下故下利可止。究於陰血無傷可見病在少陰不可以難用溫者遂棄矣。溫也。汪琥曰：按此條論仲景不言當灸何穴。脈經云：灸厥陰俞常器之曰灸太衝。皆誤。郭雍曰：灸太谿雖係少陰經穴亦誤。仲景曰：宜溫其上方有執曰：上謂頂百會穴是也。圖經云：一名三陽五會。在前頂後一寸五分頂中。脅治小兒脫肛久不愈可灸七壯。此條亦灸之者升舉其陽以調太陰也。少陰病下利止而頭眩時時自冒者死。註少陰病利止若胃和能食神清氣爽是為欲愈也。今利止頭眩時時自冒不省是氣脫神去故下利雖止仍主死也。註方有執曰：頭眩俗謂昏暈也。諸陽在頭下利止而頭眩者陽無依附浮越於外神氣散亂故時時自冒也。死可知矣。○張錫駒曰：此條死證全在頭眩自冒上看。出若利止而頭不眩不冒此中已和矣。安能死乎。○張璐曰：人身陰陽相為依附者也。陰亡於下則諸陽之上聚於頭者紛然而動所以頭眩時時自冒。陽脫於上而主死也可見陽回利止則生陰盡利止則死矣。○汪琥曰：下利止則病當愈。今者反為死候非陽回而利止乃陽脫而利盡也。○少陰病六七日息高者死。註少陰病但欲寐息並氣和順也。今息高氣促逆也。凡病卧而息高氣促者多死。註喻昌曰：六七日字辨證最細。蓋經傳少陰而息高與三日太陽作喘之表證過殊也。○程應旄曰：夫肺主氣而腎為生氣之源。蓋呼吸之門也。關係人之死生者最鉅。息高者生氣已絕於下而不復納故浮息僅喚於上而無所吸也。死雖成於六七日之後而機自兆於六七日之前既值少陰受病何不預為固護。預為提防致令真陽溫散而無可復返乎。凡條中首既諄諄禁汗繼即急急重溫無非是此耳。魏荔彤曰：七日之久。高氣逆者與時時自高二脫也。眩冒而陽升不返。自高而氣根已剝同一理而分見其證者也。故仲景慎以死期之。○少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗。註少陰病但欲寐若脈細沉微是邪從寒化也。今脈細沉數是邪從熱化也。即有發熱亦是將轉屬陽明非若前所言少陰病始得之反發熱脈沉不數宜麻黃附子細辛湯發汗者可比也。故曰：病為在裏不可發汗。註程知曰：言熱邪在裏有發汗之禁也。少陰之脈微細其常也。乃沉而加之以數正為熱邪在裏之微發汗則動經而增脉熱有奪血之變矣。○鄭重光曰：脈細沉而數裏有伏陽矣。

表熱裏寒下利清穀是虛為無陽病為在裏又不得以浮為在表而發汗也要知陰中有陽沉亦可汗陽中有陰浮亦當溫此條脈細沉數數則為熱沉為在裏此陽邪入裏故以發汗而示戒也○少陰病但厥無汗而強發之心動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭為難治註此條申明強發少陰熱邪之汗則有動血之變也少陰病脈細沉數加之以厥亦為熱厥陰本無汗即使無汗亦不宜發汗若發其汗是為強發少陰熱邪之汗也不當舉而強發之益助少陰之熱炎火沸騰必動其本經之血或從口鼻或從目出是名下厥上竭下厥者少陰熱厥於下也上竭者少陰血竭於上也故為難治註張路曰強責少陰汗而動其血勢必逆行而上升陽竅以發汗皆陽藥故也○程應旄曰五液皆主於腎強發少陰之汗周身之氣皆逆血隨奔氣之從逼而見故不知從何道而出也○沈明宗曰少陰病但厥無汗其病在裏當以四逆散和陰散邪其病自退而厥自愈矣○皇可強發其汗耶○魏荔彤曰厥而有汗乃內寒迫陽外之象故為寒化陰邪無汗而厥則熱邪伏於裏而不外越邪熱內耗也斯可議為熱化陽邪無疑矣○少陰病欲而下利諧語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也註少陰屬腎主水者也少陰受邪不能主水上攻則欬下攻則利邪從火化真武湯證也邪從熱化猪苓湯證也今被火氣劫汗則從熱化而轉屬於胃故發諧語津液內竭故小便難是皆由強發少陰之汗故也欲救其陰白虎猪苓二湯擇而用之可耳○註方有執曰強責謂渴求利然耗津液故渴挾擾於心故煩不得眠宜猪苓湯利水滋燥飲熱之證皆可愈矣○註趙嗣真曰少陰欲而下利嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之註凡少陰下利清穀欬嘔不渴屬寒飲也今少陰病六七日下利黏穀欬而嘔渴煩不得眠是少陰熱欲為病也飲熱相搏上攻則欬中攻則嘔下攻則利然耗津液故渴挾擾於心故煩不得眠宜猪苓湯利水滋燥飲熱之證皆可愈矣○註趙嗣真曰少陰欲而下利嘔渴心煩不得眠則傳邪之欲飲水者是皆傳邪之熱脉必沉細數故以黃連滑石等清利之其少陰自利而渴欲吐不吐心中煩但欲寐小便色白者是本虛之寒也脈必沉微故以附子乾薑溫之○汪琥曰下利欬而嘔渴心煩不得眠為知非少陽陽明之病然少陽陽明若見此證為裏實脈必弦大而長此病脈必微細故知其為少陰之病無疑也○林瀾曰下利則邪升於下矣其嘔而且欬何也蓋至六七日渴而心煩不眠則傳邪之上客者又盛渴則必慾飲多飲必停水是邪熱既不能解而水蓄之證復作也○傳邪傳陷之下利非陰寒吐利並作之可比嘔而渴者蓋先嘔後渴為邪欲解先渴後嘔多為水停況又有水寒射肺為欬之可兼察乎是以知必有挾飲於內耳○沈明宗曰黃連阿膠湯之心煩不得眠較此條頗同而治異何也蓋此條乃少陰風熱轉入陽明而致下利故以猪苓湯導水邪還從膀胱而去急救胃中津液為主彼條之心煩不得眠而無下利乃腎水枯少故用黃連阿膠湯滋陰清火急救腎陰為主也○魏荔彤曰欬而喫不痛渴而口不乾則知邪雖為傳經而入之熱惟其有水飲相混故熱勢不能其肆其猛烈雖上衝為欬嘔而不致咽痛隔阻正津為口渴而不致乾燥兼以心煩不得眠於少陰但欲寐陰證中見陽證豈非傳經之熱兼水濕者乎其所以不發苗者以少陰病原有一利濕不能留熱不能蓄故也由此觀之熱邪兼水飲昭然矣○少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之註凡少陰四逆雖屬陰盛不能外溫然亦有陽為陰鬱

不得宣達而令四肢逆冷者故有或欬或悸或小便不利或腹中痛泄利下重諸證也今但四逆而無諸寒熱證是既無可溫之寒又無可下之熱惟宜疏暢其陽故用四逆散主之集註李中梓曰按少陰用藥有陰陽之分如陰寒而四逆者非薑附不能療此證雖云四逆必不甚冷或指頭微溫或脈不沉微乃陰中涵陽之證惟氣不宣通是以逆冷故以柴胡涼表芍藥清中此本肝膽之劑而少陰用之者為水木同源也以枳實利七衝之門以甘草和三焦之氣氣機宣通而四逆可痊矣○程知曰蓋傷寒以陽為主四逆有陰進之象下之則陽益虧陷而不出故謂諸寒邪傳經至手足逆冷最難辨認謂為寒深於裏則無脈微欲絕之象謂為欬深於裏則無煩渴之證蓋祇是欬邪入結於裏而陽氣不得順行於四肢也此證當用和解不當用寒下故經中用劑之輕少者無如此方則其輕緩解散之義可見矣○程應旄曰初得之四逆固非熱證亦非深寒欬悸而或小便不利既似乎水蓄腹痛泄利又似乎寒凝其中更兼下重一證得母氣滯在趺陽而經絡失宣通也耶○汪琥曰四逆散乃陽邪傳變而入陰經是解傳經之邪非治陰寒也凡陽熱之極六脈細弱語言輕微神色慚靜手足清溫有似陰證而大便結小便數齒燥舌乾其熱已伏於內必發熱也若用熱藥則內熱愈熾用涼藥則熱被寒束而不得散法惟宜和表解肌疏通氣血而裏熱自除此仲景四逆散所由設也

四逆散方

甘草炙 枳實 破水漬

柴胡 芍藥 右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服

欬者加五味子乾薑各五分并主下

利

悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分

腹中痛者加附子一枚炮令折 濕利下重者先以水五升煮薤白三升者取三升

去滓以散三方寸七內湯中者取一升半分溫再服

解方名四逆散與四逆湯均治手足逆冷但四逆湯治陰邪寒厥此則治陽邪熱厥

熱厥者三陽傳厥陰合病也太陽厥陰麻黃升麻湯甘草乾薑湯證也陽明厥陰白虎湯大承氣湯證也

此則少陽厥陰故君柴胡以疏肝之陽臣芍藥以瀉肝之陰佐甘草以緩肝之氣使枳實以破肝之逆三物得柴胡能外走少陽之陽內走厥陰之陰則肝膽疏泄之性遂而

厥可通也或欬或下利者邪飲上卡為病加五味子乾薑溫中以散飲也或悸者飲停侮心加桂枝通陽以益心也或小便不利者飲蓄膀胱加伏苓利水以導飲也或腹中痛者寒凝於裏加附子溫中以定痛也或濕利下重者寒熱結結加薤白開結以疏寒熱也

集註方有執曰人之四肢溫和為順故以不溫和為逆但不溫和而未至於厥冷則熱猶未深入也故用柴胡以解之枳實以瀉之芍藥以收之甘草以和之也

少陰病利若利自止惡寒而踰利手足溫者可治

註少陰病惡寒厥冷下利不止者陰寒盛也今下利能自止手足能自溫雖見惡寒踰

利加伏苓利水以導飲也或腹中痛者寒凝於裏加附子溫中以定痛也或濕利下重者寒熱結結加薤白開結以疏寒熱也

集註方有執曰人之四肢溫和為順故以不溫和為逆但不溫和而未至於厥冷則熱猶未深入也故用柴胡以解之枳實以瀉之芍藥以收之甘草以和之也

少陰病陽氣有挽回之機故可溫而救之也○沈明宗曰手足溫者乃真陽未離急用白通四逆之類溫經散寒則邪退而真陽復矣故曰可

治○少陰病惡寒而踰利自煩欲去衣被者可治

註少陰病惡寒而踰利寒證也若時自煩欲去衣被者此陽回陰退之徵故曰可治○少陰病

得之二三日以上心中煩不得卧當連阿膠湯主之

註此序上條以其治也少陰病得之二三日以上謂或四五日也言以二三日少陰病

之但欲寐至四五日反變為心中煩不得卧且無下利清穀欬而嘔之證知非寒也是以不用白通湯非飲也亦不用猪苓湯乃熱也故主

以黃連阿膠湯治少陰不受燔灼可愈也註程知曰三日邪在少陰四五日已轉屬陽明故無嘔利麻逆諸證而心煩不得卧者是陽明之熱內擾少陰故不欲寐也當以解就滋陰為主治也

黃連阿膠湯方 黃連四兩 茯苓二兩 芍藥二兩 雜子黃枝 阿膠三兩 右五味以水六升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雜子黃
攏令相得溫服七合日三服 韶柯琴曰此少陰之濁心湯也凡濁心必藉連苓而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下虛軟者虛則加參甘補之實則加大黃下之病在少陰而心中煩不得卧者既不得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃也故用芩連以直折火用阿膠以補腎陰雜子黃佐芩連於濁心中補心血芍藥佐阿膠於補陰中斂陰氣斯則心腎交合水升火降是以拔陰濁陽之方而變為

滋陰和陽之劑也是則少陰之火各歸其部心中之煩不得眠可除矣經曰陰平陽秘精神乃治斯方之謂歟少陰病下利咽痛胸滿心煩猪膚湯主之註身溫腹滿下利太陰證也身寒欲寐下利少陰證也身熱不眠咽痛熱邪也少陰之脈傍喉嚨其支者從肺出絡心注胸中是以少陰之熱邪上逆則所過之處無不病也以猪膚湯主之解少陰上焦之熱兼止下焦之利也註喻昌曰下利咽痛胸滿心煩此少陰熱邪充斥上下間無所不到寒下之藥不可用矣故立猪膚湯一法也蓋陽微者用附子溫經陰竭者用猪膚潤燥溫經潤燥中同具散邪之義也

猪膚湯方 猪膚一斤右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服 方解猪膚者煮革外之膚皮也其體輕其味鹹輕則能散鹹則入腎故治少陰咽痛是於解熱中寓散之意也註成無已曰猪水畜也其氣先入腎解少陰之客熱加蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯註少陰病二三日咽痛無他證者乃少陰經客熱之微邪可與甘草湯緩瀉其少陰之熱也若不愈者與桔梗湯即甘草湯加桔梗以開鬱熱不用苦寒者恐其發鬱於陰經也註喻昌曰用甘草者和緩其熱用桔梗者開提其邪也此在二三日他證未具故可用之若五六日則少陰之下利嘔逆諸證皆起此法又未可用矣

甘草湯方 甘草二兩 右一味以水三升煮取一升去滓溫服七合日二服

桔梗湯方 桔梗二兩 甘草二兩 右二味以水三升煮取一升去滓溫分再服

少陰病咽中痛半夏散及湯主之註少陰病咽痛者謂或左或右一處痛也咽中痛者謂咽中皆痛也較之咽痛而有甚焉甚則延續於咽中故主以半夏散散風邪以逐涎也集方有執曰此以風邪熱甚痰上壅而痽痛者言也故主之以桂枝祛風也佐之以半夏消痰也和之以甘草除熱也三物者是又為咽痛之一治法也

半夏散及湯方 半夏洗 桂枝 甘草等分 右三味各別搗碎已合治之白飲和服方寸七日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸七更煮三沸下火令小冷少少嚥之半夏有毒似不當散服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之註少陰病咽痛不愈若劇者咽中為痛所傷漸乃生瘡不能言語聲音不出所必然也以苦酒湯主之用半夏滌涎蛋清飲瘡苦酒消腫則咽清而聲出也註程知曰咽痛忌汗忌寒下故甘草桔梗苦酒三方皆用和解之法惟半夏散及湯在前條為半散溫解之法也

苦酒湯方 半夏洗破如棗核

雞子酒各雞子一枚去黃內上苦

不差更作三劑

解李杲曰大抵少陰多咽傷咽痛之證古方用醋者雞子主咽喉失音取其酸收固所宜也

半夏辛燥何為用之蓋少陰多寒證取其辛能發攻一發遂有理咽之功也○程智按邱白象天卯黃象地前黃連阿膠湯用雞子黃義取入腎滋陰此苦酒湯用

雞子白義取入肺潤瘡也

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也註邪傳少陰不從陰化而見寒證亦不從陽化而見熱證是其人腎氣素充所以藏雖受邪留連八九日仍復傳府外散也太陽主表故一身手足盡熱若熱還衛分非汗不解熱還榮分非衄不解熱甚於上則頭痛目瞑衄血甚於下則腹痛尿難便血理必然也凡熱少血多瘀成血蓄熱多血少熱迫其血不得蓄今為少陰邪熱復轉膀胱而傷榮分迫使走下竅故便血也註程知曰前少陰病手足不逆冷反發熱者不死陽未全虧也此八九日一身及手足盡熱陰盛於裏也○張璐曰少陰病難於得熱熱則陰盡陽復故少陰篇中謂手足不逆冷反發熱者不死然病至八九日陰邪內解之時反一身手足盡熱少陰必無此證當是減邪傳府腎移熱於膀胱以膀胱主表故一身及手足盡熱也膀胱之血為少陰之熱所逼其趣必出陰竅以陰主降故也

少陰病二日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之註少陰病二日無陰邪之證至四五日始腹痛小便不利乃少陰陽邪攻裏也若腹痛口噤咽乾而從燥化則不可下之證矣今腹痛小便不利是故瘀於裏水無出路熱必下迫大腸而作利也倘利久熱傷其榮養為火化血腐為臍則為可清之證也今下利晝夜不止便膿血則其熱已隨利減而下焦清脫可知矣故以桃花湯主之益中以固脫也註成無己曰要略云陽證內熱則溢出鮮血陰證內寒則下紫黑如豚肝也○喻昌曰治下必先固中冲氣不下墮則滑脫無源而自止註家見用乾薑謂是寒邪傷胃不知熱邪挾少陰之氣填塞胃中故少佐乾薑之辛以散之也○程知曰此下利膿血之治法也腹痛小便不利少陰熱邪也而下利不止便膿血則證為傷血且有中氣下脫之虞矣故用桃花湯固腸止利也○魏荔彤曰此證乃熱在下焦而重塞中焦使氣化因熱鬱而不行大便因熱盛而自利也久而下利不止將腸胃穢濁之物如膿帶血盡隨大便而下熱一日不消利一日不止也○沈明宗曰此邪挾內濕凝滯血分則便膿血也

桃花湯方 赤石脂一兩一斤半全
一服愈餘勿服

少陰寒邪多利清殺少陰熱邪多便膿血日久不止關門不固下焦滑脫矣此方君以體膏吐濁之石脂養陽以固脫

左以甘味多液之糯米益氣以滋中則雖下利日久中虛液枯未有不愈者也其妙尤在用乾薑少許其意不在溫而在散火鬱借此以開

糯米升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服六合赤石脂末方寸匕日三服若

體血無由而化也若一服愈餘勿服以其粘滯之性甚也

少陰病下利便膿血者桃花湯主之註少陰病諸下利用溫者以其證屬虛寒也此少陰下利便膿血者是就傷榮也而不徑用苦寒者蓋以日久熱隨血去腎受竅邪關門不固也故以桃花湯主之○少陰病下利便膿血者可刺註少陰病下利便膿血用桃花湯不止者刺於陰分也則可刺本經之穴以洩其熱去則膿血自止矣集張璐曰先下利日久而後便膿血則用桃花湯若不先下利而下利便膿血則可刺經穴若刺經穴不愈則當從事白頭翁湯設更咽乾心煩不得眠則又須薑連阿膠湯為合法也○林淵曰刺者瀉其經氣而宣通之也下利便膿血既主桃花湯矣此復云可刺者如痞證利不止復利其小便與五苓散以救石脂禹餘糧之窮故此一刺亦以補桃花湯之所不逮也○少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯註邪至少陰二三日即口燥咽乾者必其人胃火素盛腎水素虧當以大承氣湯急瀉胃火以救腎水若復遷延時日腎水告竭其陰必亡雖下無及矣集成無己曰與大承氣湯急下之以全胃何也經云三陰經受病已入於府者可下而已則是上條少陰病乃入府證也少陰邪轉屬於府胃府實故消灼腎水故口燥咽乾用大承氣以瀉府而實熱自除且少陰之藏本腎屬水胃府屬土所以救水也○方有執曰口燥咽乾者少陰之脈循喉嚨挾舌本邪熱客於其經而腎水為之枯竭也然水乾則土燥土燥則水愈乾所以急於下也○張璐曰按少陰急下三證一屬傳經熱邪抗極一屬熱邪轉入胃府一屬溫熱發自少陰皆刻不容緩之證故當急救欲絕之腎水與陽明急下三法同源異派○汪琥曰少陰病得之二三日者非繼得病二三日即口燥咽乾謂少陰口燥咽乾之病已得之二三日也○少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯註少陰病自利清水謂下利糟粕也色純青謂所下者皆污水也下無糟粕純是污水此屬少陰實熱所以心下必痛口燥咽乾其為少陰急下之證無疑矣故當急下之宜大承氣湯集程知曰陽邪熱結口必乾燥設襲陰邪口中和而不燥矣故宜急下之以救陰也○沈明宗曰邪傳陽明必俟大便堅硬而攻下者迺未傷胃中津液之謂此利清水因少陰邪熱熾盛乘逼胃中津液頃刻勢已濱危不得不以通因通用急奪而救胃腎將絕之陰也少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜太承氣湯註少陰病六七日腹脹不大便者蓋因其人陽氣素盛胃有宿食故也所以傳邪已入少陰復轉屬陽明而成胃實故宜太承氣湯急下之也集張璐曰少陰之證自利者最多虛寒則下利清穀虛熱則下利膿血故多用溫補傳經陽邪內結則自利純青水溫熱病則自利煩渴並宜下奪清熱此以六七日不大便而腹脹可見邪熱轉歸陽明而為胃實之證所以宜急下也○少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈註少陰中風脈若見陽浮陰弱乃風邪傳入少陰則是其欲方感未易言愈今陽脈反微陰脈反浮陽微則外邪散而表氣和陰浮則裏氣勝而邪外出故為欲愈也○少陰病欲解時從子至寅上註丑寅陽生漸長之候也病在少陰而解於陽生之際所謂陽進則陰退陰得陽而邪自解也少陰所重在真陽從可見矣

手足溫而渴是已露去表入裏歸併少陽之
機故獨從少陽以爲治也主以小柴胡湯者
和解其表裏也此三陽合病不必悉具柴胡
證而當用柴胡之一法也

集註 方有執曰三陽俱見病而獨從少陽小柴胡
以爲治者太陽陽明之邪微少陽近裏而裏
證見故從少陽一於和而三善備也

喻昌曰本當從三陽合併病之例而用表法
但手足溫而加渴是外邪逼奏於少陽向裏

之機已著更用辛甘發散則重增其熱而大耗其津矣故從小柴胡之和法使陽邪罷而陰津不傷一舉而兩得也小柴胡湯當從加減法不嘔而渴者去半夏加栝蔞根爲是張志聰曰手足溫者手足不冷也非病人自覺其溫乃診者按之而得也不然何以旣曰身熱而復云手足溫耶

汪琥曰此條係三陽經齊病而少陽之邪居多也太陽傷寒已至四五日之時不曰發熱

惡風祇曰身熱者此太陽之邪漸衰也其兼
陽明證不曰鼻乾不得臥而祇曰頸項強者
此陽明之邪亦將衰也惟脇下滿爲少陽經
之專證况兼手足溫而又渴此爲邪將傳裏
之機已著也

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者
與小柴胡湯

註 陽明病發潮熱當大便硬小便數也今大便
溏小便如常非陽明入府之潮熱可知矣况

有胸脇滿不去之少陽證乎故不從陽明治而從少陽與小柴胡湯主之也

集註

王肯堂曰陽明爲病胃家實也今便溏而言陽明病者謂有陽明外證身熱汗出不惡寒反惡熱也

程應旄曰如得陽明病而發潮熱似乎胃實之徵矣但胃實必大便硬而小便數今大便溏小便自可是熱非人府之熱也再以胸脇徵之則主以小柴胡湯無疑矣

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濁然汗出而解

註陽明病不大便脇下鞭滿而嘔是陽明傳少

陽病也若舌上黃胎滑者爲陽明之熱未盡則當與大柴胡湯兩解之今舌上白胎滑者是已傳少陽故可與小柴胡湯和解之俾上焦得通則嘔可止津液得下則便可通胃氣因和而鞭滿除則身必濁然汗出而解矣

註 集

程知曰此言陽明兼少陽宜用小柴胡也不
但大便溏爲胃未實即使不大便而嘔亦爲
邪未入裏鞭滿在腸而不，在腹舌胎白而不
黃皆少陽之見證多故當從小柴胡分解陰
陽則上下通和濁然汙出而表裏之邪爲之
一撤矣

程應旄曰肠下鞭滿不大便而嘔是大柴胡
湯證也其用小柴胡湯者以舌上白胎猶帶
表寒故也若胎不滑而滯則所謂舌上乾燥

而煩欲飲水數升謂裏熱已耗及津液此湯不可主矣又曰上焦得通照腸下鞭滿言津液得下照舌胎與嘔言胃氣因和照不大便言上條陽明病從潮熱上見此條陽明病從不大便上見

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

註凡柴胡湯病證不與柴胡湯而反下之不變他病柴胡證仍在者可復與柴胡湯則解但

以誤下其謐必虛故解必蒸蒸而熱振振而
寒邪正交爭然後汗出而解也

集註 方有執曰蒸蒸而振作戰汗也必如此而後
解者以下後裏虛故也

程知曰邪氣還表故蒸蒸而熱下後正虛故
振振而動

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下
之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便
難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡

湯不中與也食穀者曠

按食穀者曠四字衍文食穀嘔者有之從無曠者

註得病六七日少陽入太陰之時也脈遲太陰
脈也浮弱太陽脈也惡風寒太陽證也手足
溫太陰證也醫不以柴胡桂枝湯解而和之
反二三下之表裏兩失矣今不能食脇下滿
痛雖似少陽之證而實非少陽也面目及身
發黃太陰之證已具也頸項強則陽明之邪

未已也小便難者數下奪津之候也此皆曲醫之誤下以致表裏雜採陰陽同病若更以有少陽脇下滿痛之一證不必悉具而又誤與柴胡湯則後必下重是使邪更進於太陰也雖有渴證乃係數下奪津之渴其飲水卽嘔亦非少陽本證之嘔緣誤下所致故柴胡湯不中與也

集註 程知曰前言柴胡證但見一證便是此更言脇下滿痛亦有不宜柴胡者以爲戒也

程應旄曰以一渴證辨之前條之手足溫而渴者熱在裏未經數下自能消水今本渴而飲水則嘔知其渴爲膈燥津亡之渴數下中虛不能消水究於胃陽無涉然則柴胡湯之於少陽豈可云但見一證便是乎又豈可云下之而柴胡證不罷者復與柴胡湯乎

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

註 傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支結者是太陽之邪傳少陽也故取桂枝
之半以散太陽未盡之邪取柴胡之半以散
少陽嘔結之病而不名桂枝柴胡湯者以太
陽外證雖未去而病機已見於少陽裏也故
以柴胡冠桂枝之上意在解少陽爲主而散
太陽爲兼也支者側也小也支結者卽心下
側之小結也

集註方有執曰支節四肢骨節也支結言支飲搏
聚而結也發熱至微嘔太陽之表也故曰外

證未去

程知曰此邪入少陽而太陽證未去者也發
熱惡寒支節頑疼太陽證也乃惡寒而微但
支節頑痛而不頭項強痛則太陽證亦稍減
矣嘔而支結少陽證也乃嘔逆而微但結於
心下之偏旁而不結於兩脇之間則少陽亦
尚淺也若此者惟當以柴胡湯和解少陽而
加以桂枝湯發散太陽此不易之法也

柴胡桂枝湯方

可加

今附

柴胡

桂枝

人參 一兩半

甘草 一兩

半夏 二合半

黃芩 一兩半

芍藥 一兩半

大棗 六枚

生薑 一兩半

擘
筭

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升

集解 柯琴曰仲景書中最重柴桂二方以桂枝解

太陽肌表又可以調諸經之肌表小柴胡解少陽半表亦可以和三陽之半表故於六經

病外獨有桂枝證柴胡證之稱見二方之任
重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自爲
桂枝證之註釋血弱氣盡條是仲景自爲柴
胡證之註釋桂枝有壞病柴胡亦有壞病桂
枝有疑似證柴胡亦有疑似證如病似桂枝
證脚攣急與胸中痞鞕者及病似柴胡證本
渴而飲水嘔與但欲嘔胸中痛者是已此條
言傷寒六七日寒熱當退之時反見發熱惡
寒諸表證更見心下支結諸裏證表裏不解

法當表裏雙解之矣然惡寒微則發熱亦微
可知支節煩疼則一身骨節不疼可知微嘔
心下亦微結故謂之支結是表證雖不去而
已輕裏證雖已見而未甚故取桂枝之半以
散太陽未盡之邪取柴胡之半以解少陽微
結之證口不渴身有微熱者法當去人參以
六七日邪雖未解而正已虛故仍用之外證
雖在而病機已見於裏故方以柴胡冠桂枝
之上爲雙解兩陽之輕劑也

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

註 傷寒五六日已發其汗表未解而復下之若

邪陷入陽明之裏則必作結胸痞鞕協熱下利等證今邪陷入少陽之裏故令胸脇滿微結也小便不利渴而不嘔者非停水之故乃汗下損其津液也論中有身無汗獨頭汗出

發熱不惡寒心煩者乃陽明表熱鬱而不得

外越之頭汗也今但頭汗出往來寒熱心煩者無陽明證知爲少陽表熱鬱而不和上蒸之頭汗也此爲少陽表裏未解之證故主柴胡桂枝乾薑湯以專解半表之邪兼散半裏之結也

集註

林瀾曰五六日已經汗下之後則邪當解今胸膈滿微結寒熱心煩者是邪猶在半表半裏之間也小便不利而渴乃汗下後亡津液內燥也若有熱飲其人必嘔今渴而不嘔知

非飲熱也傷寒汗出則和今但頭汗出餘處無汗者津液不足而未和也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏而復津液也

汪琥曰傷寒頭汗出者乃陽鬱於表非陽虛於上也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡

半觔

桂枝

三兩

乾薑

二兩

桔梗根

四兩

黃芩

三兩

牡蠣

二兩

甘草
二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
取三升温服一升日三服初服微煩復服汗
出便愈

方解少陽表裏未解故以柴胡桂枝合劑而主之

卽小柴胡湯之變法也去人參者因其正氣
不虛減半夏者以其不嘔恐助燥也加栝蔞
根以其能止渴兼生津液也倍柴胡加桂枝
以主少陽之表加牡蠣以奠少陽之結乾薑

佐桂枝以散往來之寒黃芩佐柴胡以除往來之熱且可制乾薑不益心煩也諸藥寒溫不一必需甘草以和之初服微煩藥力未及復服汗出卽愈者可知此證非汗出不解也服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之

註

風寒之邪從陽明而傳少陽起初不渴今服柴胡湯已反渴者是少陽轉屬陽明也以法治之謂當分其經府見證而治之也葛根白虎調胃間各從其宜而用之可耳

註

方有執曰已畢也服柴胡湯已畢而渴則非

暫渴其爲熱已入胃亡津液而渴可知故曰屬陽明也

沈明宗曰服柴胡湯已渴者乃少陽之邪不傳三陰而轉入陽明矣卽當隨陽明現證而治故謂以法治之

鄭重光曰少陽陽明之病機在嘔渴中分渴則轉屬陽明嘔則仍在少陽如嘔多雖有陽明證不可攻之因病未離少陽也服柴胡湯

渴當止若服柴胡湯已加渴者是熱入胃府耗津消水此屬陽明胃病也

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞶鞶細者此爲陽微結必有表復有裏也鞶沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也鞶雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

按脈細當是脈沉細觀本條下文脈沉亦在裏也之亦字自知脈雖沉緊之緊字當是細字本條上文並無緊字如何說脈雖沉緊雖字何所謂耶必是傳寫之悞

註

傷寒五六日雖表有頭汗出微惡寒之陽邪未罷裏有心下滿口不欲食大便鞭之陽結已形但手足冷脈沉細則陽邪所結殊微也故曰此爲陽微結必有表復有裏也然脈沉細似乎裏陰盛而頭汗出則爲表陽鬱也假

令純陰結則不得復有頭汗出之外證始合悉入在裏之純陰結矣夫旣非悉入在裏之純陰結此必爲半在裏半在表之陽微結也故衄雖沉細不得爲少陰病所以然者三陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯者和其不通身汗出微惡寒也設不了了者必大便之輒未除自宜利其大便使得屎而解也

集喻昌曰陽微結者陽邪微結未盡散也舊註

作陽氣衰微故邪氣結聚大差果爾則頭汗出爲亡陽之證非半表半裏之證矣果爾則陰結又是陰氣衰微矣玩本文假令純陰結及陽邪若不微結是純陰邪內結則不得復有外證等語其義甚明

程知曰此言少陽病有似少陰者當細辨其脈證也

程應旄曰凡脈細脈沉皆陰脈也今與陽證同見則爲陽熱鬱結之診無關少陰也可見

陽氣一經鬱結不但陽證似陰並陽脈亦似
陰矣

沈明宗曰得屎而解當用大柴胡之法也
吳人駒曰此證嘗見有誤作陰寒而施溫熱
以致大逆者蓋因其惡寒手足冷脈細而沉
不究其證之始末由來也

周揚俊曰此條惡寒肢冷不欲食脈細或沉
有似乎陰最難辨晰仲景特出陽微結三字
昭示千古以頭汗出爲陽陰不得有汗也至

五六日頭痛發熱證原屬陽也故縱見少陰之脈不得爲少陰之病然獨未見少陽一證何遽得爲少陽病耶此仲景所以又明言半在表半在裏也爾時裏證既多不得純以表藥汗之外證似陰不得復以裏藥溫之故取小柴胡提出其邪於表裏之半而大便鞶不了了者則當下之得屎無疑也仲景恐人未明白爲詳辨然後知手足冷微惡寒者正因陽邪鬱結不外通於肢體故獨頭汗出也

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

註 傷寒脈得浮濇營衛不足也脈得沉弦木入

土中也營衛不足則表虛木入土中則裏急

惟表虛裏急腹中急痛所以先用小建中湯

以其能補營衛兼緩中急則痛可差也或不

差必邪尚滯於表知濇爲營衛不通弦爲少

陽本脈故與小柴胡湯按法施治也成無已

去黃芩加芍藥疏外調中其說亦是

註 汪琥曰 弦齶不除痛猶未止者爲不差此爲

少陽經有留邪也

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

註 傷寒未解欲嘔吐者胸中有熱邪上逆也腹中痛者胃中有寒邪內攻也此熱邪在胸寒邪在胃陰陽之氣不和失其升降之常故用黃連湯寒溫互用甘苦並施以調理陰陽而和解之也然此屬外因上下寒熱之邪故有

如是之證若內因雜病嘔吐而腹痛者多因宿食由此推之外因內因證同而情異概可知矣

集註

程知曰陰邪在腹則陽不得入而和陰爲腹

痛陽邪在上則陰不得入而和陽爲欲嘔逆

汪琥曰尚論篇皆以風寒二邪分陰陽寒熱殊不知風之初來未必非寒寒之既入亦能化熱不可拘也

鄭重光曰此熱邪中於上焦寒邪中於下焦

陰陽不相入失其上下升降之常也

黃連湯方

可加今減

黃連三兩

甘草三兩
炙

乾薑三兩

人參二兩
炙

桂枝三兩

半夏半升
洗

大棗十二枚

夜二

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服晝三

方解傷寒邪氣入裏因人藏氣素有之寒熱而化

病如陽明病。鞭滿不大便而嘔舌上白胎者。
以小柴胡湯及太陽病下之裏虛懊憹舌上
如胎者。以梔子豉湯之類是隨胸中有寒丹
田有熱化者也。此則隨胃中有寒胸中有熱
而化腹中痛欲嘔吐故以是方主之。君黃連
以清胃中之熱臣乾薑以溫胃中之寒半夏
降逆佐黃連嘔吐可止人參補中佐乾薑腹
痛可除桂枝所以安外大棗所以培中也然
此湯寒溫不一甘苦並投故必加甘草協和

諸藥此爲陰陽相格寒熱並施之治法也

太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

註

太陽病十日以上無他證脈浮細而嗜臥者

外邪已解不須藥也設有胸滿脇痛等證則

知少陽之外邪未解故與小柴胡湯和之若

脈但浮不細而有頭痛發熱惡寒無汗等證

則仍是太陽之外邪未解當與麻黃湯汗之

按論中脈浮細太陽少陽脈也脈弦細少陽脈

也脈沉細少陰脈也脈浮細身熱嗜臥者陽
也脈沉細身無熱嗜臥者陰也脈緩細身和
嗜臥者已解也是皆不可不察也

集註

王肯堂曰此條當是太陽少陽合病胸滿雖
同而脈浮細嗜臥則爲表邪已解脇痛爲少
陽有邪故與小柴胡湯若脈但浮者又當先
治太陽也故與麻黃湯此是設爲變通之言
非爲服柴胡而脈浮也

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大

柴胡湯主之

按下利之下字當是不字若是下字豈有上吐下利而以大柴胡湯下之之理乎

註傷寒發熱汗出不解表尚未已也心中痞鞭大便不利裏病又急矣嘔吐少陽陽明兼有之證也少陽陽明兩急心中熱結成痞故以大柴胡湯外解少陽發熱未盡之表內攻陽明成實痞鞭之裏也

按太陽病發熱汗出不解心下痞鞭下利不嘔

吐者此表裏俱虛桂枝人參湯證也若嘔吐不利者此表裏俱實大柴胡湯證也彼則脈微弱此則脈必有力也

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

註

太陽病傳過三陽之經十餘日醫不隨經施

治反二三下之未致變逆後四五日性見少

陽寒熱往來之柴胡證仍在者宜先與小柴

胡湯解表和裏如或不愈其嘔不止心下滿急鬱鬱微煩此爲少陽表裏均未解也與大柴胡湯下之攻裏和表自可愈也

集註

方有執曰過經與壞病同不知何逆而二三下之適所以致逆故曰反也下而又下陽明雖未傷而少陽亦未除故曰柴胡證仍在也嘔不止鬱鬱微煩乃邪擾二陽故曰未解也程知曰此言過經誤下有用大小柴胡兩解法也蓋其人之邪因屢下而深入若表證未

罷必先用小柴胡和其半表而後可兼攻其裏也

程應旄曰此條與陽明經嘔多雖有陽明證不可下之條細細酌量陽明證嘔在上而邪亦在膈之上未入府故不可下此條嘔不止心下急乃邪在膈之下已屬胃乃可下也可下不可下此等處最不容誤也

林瀾曰嘔不止則半表裏證猶在然心下急鬱鬱微煩必中有燥屎也非下除之不可故

以大柴胡兼而行之

大柴胡湯方

虛症可加 今時

恨歌

柴胡

半角

黃芩

三兩

半夏

半升
洗

芍藥

三兩

枳實

四枚
炙

大黃

二兩

生薑

五兩
切

大棗

十二枚
擘

溫服一升日三服

按許叔微曰大柴胡湯一方無大黃一方有大

黃此方用大黃者以大黃有蕩滌蘊熱之功爲傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名大柴胡湯且經文明言下之則愈若無大黃將何以下心下之急乎應從叔微爲是

方解柴胡證在又復有裏故立少陽兩解之法以

小柴胡湯枳實芍藥者解其外以和其內也去參草者以裏不虛也少加大黃所以瀉結熱也倍生薑者因嘔不止也

太陽病過經十餘日心中溫溫欲吐而胸中痛大

調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微
溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

按王肯堂曰溫溫當是嘔嘔又云以嘔之下當
有闕文

註太陽病過經十餘日曾經吐下不解者以極
吐則虛其胸邪熱乘虛入胸故心下嘔嘔欲
吐而胸中痛也極下則虛其裏邪熱乘虛入
裏故大便反溏腹微滿鬱鬱微煩也詢知先

時若果經極吐下則爲在表之邪熱悉陷胸
腹而所見者皆是裏證未和故宜與調胃承
氣湯下而和之若不爾者謂不因極吐極下
而有斯證則又不可與是湯也夫但欲嘔者
少陽也胸中痛者太陽也微溏者太陽少陽
合病之利也並無心中嘔嘔鬱鬱腹滿煩熱
等證固不可與承氣湯矣然此亦非柴胡證
故柴胡湯亦不可與也須從太陽少陽合病
下利若嘔者與黃芩加半夏生薑湯可也

註 方有執曰 胸中痛邪在膈也 若曾極吐則應

有心下嘔嘔欲吐之狀何也 以胃口已被吐
傷邪熱上搏於膈故欲吐而不得吐也 腹微
滿鬱鬱微煩邪在胃也 若曾極下則應大便
微溏何也 以下則胃虛邪雖實於胃大便反
不能結鞭也 故曰先此時自極吐下者與調
胃承氣湯言當蕩其熱以和其胃也不爾言
未經極吐下也 但欲嘔至末申明上文之意
喻昌曰 太陽病過經才餘日 心下嘔嘔欲吐

而不吐其人胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱
微煩者此有二辨若曾經大吐大下者表邪
從吐解且已入裏可用調胃承氣之法若未
經極吐下但欲嘔不嘔胸中痛微溏者是痛
非吐所傷溏非下所致調胃之法不可用矣
程知曰過經者謂病過七八日至十三日經
氣已週猶不解也豈惟十三日且有二十餘
日者矣蓋過經不解病必皆在陽經留連若
在陰經則又豈能若是之持久耶久持且不

能安望其生乎

程應旄曰大便溏則氣得下洩腹不應滿煩
不應鬱鬱今仍腹微滿鬱鬱微煩必胃有阻
留而下後仍不快暢也病屬陽明證反無陽
明而祇有少陽其中必有所悞故直窮其所
以致證之由而後可從證上認病

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已
而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知
醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴

胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之

註

凡傷寒過經不解熱邪轉屬胃府者多皆當
下之今傷寒十三日不解過經胸脇滿而嘔
日晡所發潮熱已而微利此本大柴胡證也
下之而不通利今反利者詢知爲醫以丸藥
迅下之非其治也迅下則水雖去而燥者仍
存恐醫以下後之利爲虛故復指曰潮熱者
實也是可再下者也但胸脇之邪未已故先
宜小柴胡湯以解少陽之外復以小柴胡湯

者因裏不急且經迅下惟欲其堅潤燥耳
是又下中兼和之意也

集註

內臺方議曰潮熱者實也何不用大柴胡大
小承氣下之却用芒消何也蓋潮熱雖屬實
然已先用丸藥傷動藏府若再用大黃下之
則脾氣傷而成壞證矣祇用芒消潤燥以取
利也

方有執曰十三日過經也不解壞證也非其

治也以上乃原其壞由於醫之誤以下至末
救誤之治也

柴胡加芒消湯方

今附

於小柴胡湯方內加芒消六兩餘依前法服不
解更服

傷寒十三日不解過經讞語者以有熱也當以湯
下之若小便利者大便當鞶而反下利脈調和者
知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微
厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之

論

此承上條互發其義以詳其治也傷寒十三

日不解過經讞語者以有熱也當以湯藥下其熱但上條潮熱之熱熱在表裏當大便不鞢此條讞語之熱熱歸胃府法當大便鞢若小便利者大便當鞢今大便不鞢而反下利脈調和者知爲醫以丸藥下之之利非其治也如未經丸藥下之自下利者則爲內虛內虛之利鞢當微弱而厥今反和而不微厥此爲內實有熱非內虛有寒也雖下利乃熱利

也仍當下其熱故以調胃承氣湯主之
傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也

註

傷寒之邪一日太陽受之二日陽明受之三

日少陽受之四日太陰受之五日少陰受之

六日厥陰受之此傳經之次第也今傷寒三

日三陽表邪爲盡三陰當受邪其人當不能

食而嘔今反能食而不嘔者此爲裏和三陰

不受邪也然此乃內經以其大概而言究不

可以日數拘也

集成註

成無己曰表邪傳裏裏不和則不能食而嘔今反能食而不嘔是邪不傳陰但在陽也

方有執曰陽以表言陰以裏言能食不嘔裏氣和而胃氣回陰不受邪可知矣

汪琥曰邪在少陽原嘔不能食今反能食而不嘔可徵裏氣之和而少陽之邪自解也裏既和而少陽之邪解則其不傳三陰斷斷可必故云三陰不受邪也

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故也

註傷寒六七日邪欲入裏之時也無大熱表熱微也躁煩者裏熱盛也此爲陽去入陰也陽去入陰者謂陽邪去表入裏傳於三陰也

集註成無已曰內熱爲煩謂心中鬱煩也外熱爲躁謂身外熱躁也內熱爲有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治

方有執日去往也言表邪去而入於裏所以
外無他熱而內則煩躁也

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除
而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譏語者此爲熱
入血室也當刺期門隨其實而瀉之

註

婦人中風發熱惡寒表病也若經水不來熱

必無由傳於血室今經水適來得之七八日
後脈遲熱除身涼似乎表欲解矣若復見胸
脇下滿如結胸狀譏語之證則知非表解入

裏乃表邪之熱因經水適來乘虛而入於血室也法當刺期門期門爲肝之穴肝爲藏血之所今邪入血室故刺期門隨其血分實熱而瀉之也

集註

方有執曰血室爲營血停留之所經血集會之處卽衝脈所謂血海是也其脈起於氣衝並少陰之經夾臍上行至胸中而散故熱入而病作其證則如是也期門二穴在不容兩傍各去同身寸之一寸五分肝之募也肝納

血故刺期門所以瀉血分之實熱也

汪琥曰邪傳少陽熱入血室故作讖語等證仲景恐人誤認爲陽明府實證輕用三承氣以伐胃氣故特出一刺期門法以療之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

註

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室血與熱搏其血必結

然雖結而無胸脇滿如結胸讞語等證是爲
結而未實也尚有如瘧狀之寒熱發作有時
乃爲邪在少陽半表半裏也故用小柴胡湯
以和表裏熱自解也

集註

方有執曰前經水適來者因熱入血室血出
而熱遂遺也此適斷者熱乘血來而遂入之
與後血相搏俱留而不岀故曰其血必結也
程知曰前證經水來而胸脇滿結讞語是邪
實於藏也故用刺以瀉之此證因血結而寒

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譏語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

註

上二條發明風邪熱入血室之證此條發明寒邪熱入血室之證婦人傷寒發熱無汗經水適來則必熱入血室故晝則明了知邪不在陽也暮則譏語如見鬼狀者是爲邪在陰也無犯胃氣及上二焦者通謂三焦也蓋禁

人汗吐下三法皆不可輕用當俟其經行必
熱隨血去而愈也

集註

方有執曰必自愈者言俟其經行血下則邪
熱得以隨血而俱出猶之鼻衄紅汗故自愈
也蓋警人勿妄攻以致變亂之意

林瀾曰傷寒發熱者寒已成熟也經水適來
則血室空虛邪熱乘虛入於血室若晝日讖
語爲邪客於府與陽爭也此晝日明了暮則
讖語如見鬼狀者是邪不入府而入於血室

氣也彼熱入血結寒熱者與小柴胡湯散邪
發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗
藥犯其上焦也若熱入胸膈滿如結胸者可
刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期
門以犯其中焦也必自愈者以經行則熱隨
血去血下則邪熱悉除而愈矣

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇
下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食

藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也

一云藏府相連

其病必下小柴胡湯主之

註

此詳申上三條婦人中風傷寒經水適來過
多以致血弱氣盡腠理不密邪熱之氣乘虛
入於血室邪與正相搏結於少陽之界故邪
結於脇下也邪正相爭爭於陽則熱爭於陰
則寒故往來寒熱也爭已必衰衰則止故休
作有時也少陽病已入半裏將近厥陰故默
默不欲飲食也少陽膽與厥陰肝相爲表裏

故曰藏府相連也少陽之脈下胸中循陽表

厥陰之脈抵少腹循腸裏故其痛必及於脇
下也少陽之邪從胸而下脇因胸而病及於
脇故曰邪高痛下也邪從胸循腸入裏裏氣
上拒故使嘔也仲景重出此條仍主之以小
柴胡湯者使知法不必外少陽不必另從厥陰
血室中求治也

集註

喻昌曰四條皆互文見意也一云經水適來
一云經水適斷一云七八日熱除而脈遲身

涼一云七八日續得寒熱發作有時一云胸
脇下滿一云邪氣因入與正氣相搏結於脇
下一云如結胸狀一云邪高痛下一云讞語
一云晝日明了暮則讞語如見鬼狀一云如
瘧狀一云往來寒熱休作有時一云刺期門
一云用小柴胡湯一云毋犯胃氣及上二焦
皆互文以明大意而自爲註脚也學者試因
此而細繹全書思過半矣如結胸狀四字仲
景尚恐形容不盡重以藏府相連邪高痛下

之語暢發病情蓋血室者衝脈也下居腹內
厥陰肝之所主也而少陽之膽與肝相連府
邪在上藏邪在下胃口逼處二邪之界所以
默默不欲飲食而但喜嘔耳期門者肝之募
也隨其實而瀉之瀉肝之實也又刺期門之
註脚也小柴胡湯治少陽之正法也毋犯胃
氣及上二焦則舍期門小柴胡湯更無他法
矣

嘔而發熱者小柴胡湯主之

衍文已見太陽中篇半夏瀉心湯條上

少陽病欲解時從寅至辰上

註

寅卯辰木旺之時也經云陽中之少陽通於春氣故少陽之病每乘氣旺之時而解經氣之復理固然也

集註

魏荔彤曰病在少陽乘其正旺如法治之何

病不已

音切

少去聲

濱

音色

嘔

乙骨

腠

切

音湊

訂正仲景全書傷寒論註

辨太陰病証並治全篇

六氣之邪感人雖同人受之而生病各異者何也蓋以人之形有厚薄氣有盛衰藏有寒熱所受之邪每從其人之藏氣而化故生病各異也是以或從虛化或從實化或從寒化或從熱化譬諸水火水盛則火滅火盛則水耗物盛從化理固然也誠知乎此又何疑乎

陽邪傳陰變寒化熱而遂以爲奇耶自後漢迄今千載以來皆謂三陰寒邪不傳且以傷寒傳經陰邪謂爲直中抑知直中乃中寒之證非傳經之邪耶是皆未曾熟讀仲景之書故有此誤耳如論中下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯此三陽陽邪傳入太陰邪從陰化之寒證也如少陰病下利白通湯主之此太陰寒邪傳少陰之寒證也如下利清穀裏寒

外熱汗出而厥者通鱗四逆湯主之此少陰
寒邪傳厥陰之寒證也皆歷歷可據豈得謂
傷寒陰不相傳無陽從陰化之理乎夫太陰
濕土純陰之藏也故病一入太陰則邪從陰
化者多從陽化者少從陰化者如論中腹滿
吐食自利不渴手足自溫時腹自痛宜服理
中四逆輩者是也從陽化者如論中發汗後
不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯腹滿大
實痛者宜桂枝加大黃湯主之者是也蓋脾

與胃同處腹中故腹滿腹痛兩皆有之然腹
滿爲太陰主病心下滿爲陽明主病其陽明
亦有腹滿者以陽明腹滿與熱同化故必有
潮熱自汗不大便之證而不似太陰與濕同
化有發黃暴煩下利穢腐之證也誠能更於
腹之時痛大實痛腹滿痛處詳審虛實斟酌
溫下則了無餘義矣故以此括之自知太陰
之要法也

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利甚時腹自

病若下之必胸下結鞶

按吳人駒曰自利益甚四字當在必胸下結鞶句之下其說甚是若在吐食不下句之下則

是已吐食不下而自利益甚矣仲景復曰若下之無所謂也

註太陰脾經也其脈布胃中絡於嗌寒邪傳於太陰故腹滿時腹自痛寒邪循脈犯胃故叶食不下此太陰裏虛邪從寒化之證也當以理中四逆輩溫之若腹滿嗌乾不大便大實

痛始爲太陰裏實邪從熱化之證當以桂枝
加大黃湯下之矣若以太陰虛寒之滿痛而
誤認爲太陰實熱之滿痛而下之則寒虛相
搏必變爲藏結痞鞭及自利益甚矣此太陰
病全篇之提綱後凡稱太陰病者皆指此證
而言也

集註

程應旄曰陽邪亦有腹滿得吐則滿去而食
可下者今腹滿而吐食不下則滿爲寒脹吐
爲寒格也陽邪亦有下利腹痛得利則痛隨

利潤者令下利而膈膜自癟則利爲寒利痛爲寒痛也曰胸下陰邪結於胸下之陰分異於陽邪結胸之在胸且按之而痛也曰結鞭無陽以化氣則爲堅陰異於痞之濡而更也彼皆陽從上陷而阻留此則陰從下逆而不歸寒熱大別也

吳人駒曰自利有時而腹自痛非若積蓄而常痛者若以諸痛爲實從而下之其滿益甚必令胸下皆爲結鞭而自利益甚矣

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也

註傷寒四五日邪入太陰之時也腹中痛若不轉氣下趨者屬陽明也今腹中痛轉氣下趨少腹者乃太陰欲作自利之候也此仲景示人不可以諸痛爲實而妄議下之意也

集註方有執曰腹中痛轉氣下趨者裏虛不能守

而寒邪下迫也

張璐曰腹痛亦有屬火者其痛必自下而上

攻若痛自上而下趨者定屬寒痛無疑

魏荔彤曰此重在預防下利而非辨寒熱也
玩若字欲字可見其辨寒邪者自有別法
自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜
服四逆輩

註凡自利而渴者裏有熱屬陽也若自利不渴
則爲裏有寒屬陰也今自利不渴知爲太陰
本藏有寒也故當溫之四逆輩者指四逆理
中附子等湯而言也

集註 程知曰言太陰自利爲寒宜溫者也少陰屬腎水熱入而耗其水故自利而渴太陰屬脾土寒入而從其濕則不渴而利故太陰自利當溫也

程應旄曰三陰同屬藏寒少陰厥陰有渴證太陰獨無渴證者以其寒在中焦總與龍雷之火無涉少陰中有龍火底寒甚則龍升故自利而渴厥陰中有雷火故有消渴太陽一照雷雨收聲故發熱則利止見厥而復利也

魏荔彤曰自利二字乃未經調下調汗調吐

而成者故知其藏本有寒也

理中圓方

人參 白朮

甘草 乾薑 各三
炙 兩

右四味擣篩蜜和爲丸如雞子黃許大以沸
湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服
腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四
物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服

一升日三服

加減法

若臍上築者腎氣動也去术加桂四兩

吐多者去术加生薑三兩

下多者還用术悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加术足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者加乾薑足前成四兩半

腹滿者去术加附子一枚服湯後如食頤飲

熱粥一升許微自溫勿發揭衣被

集解

程應旄曰陽之動始於溫溫氣得而穀精運
穀氣升而中氣贍故名曰理中實以燮理之
功予中焦之陽也蓋謂陽虛卽中氣失守膻
中無發宣之用六府無灑陳之功猶如釜薪
失焰故下至清穀上失滋味五藏凌奪諸證
所由來也參术炙草所以守中州乾薑辛以
溫中必假之以燃釜薪而騰陽氣是以穀入
於陰長氣於陽上輸華蓋下攝州都五藏六

府皆受氣矣此理中之旨也若水寒互勝卽當脾胃雙溫加之以附子則命門益而土母溫矣白朮補脾得人參則壅氣故臍下動氣吐多腹滿皆去朮也加桂以伐腎邪加生薑以止嘔也加附子以消陰也下多者濕勝也還用朮燥濕也渴欲飲水飲渴也加朮使飲化津生也心下悸停水也加茯苓導水也腹中痛倍人參虛痛也寒者加乾薑寒甚也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食

人口卽吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

按經論中並無寒下之病亦無寒下之文玩本條下文寒格更逆吐下可知寒下之下字當是格字文義始相屬註家皆釋胃寒下利不但文義不屬且與芩連之藥不合

註經曰格則吐逆格者吐逆之病名也朝食暮吐脾寒格也食入卽吐胃熱格也本自寒格謂其人本自有朝食暮吐寒格之病也今病傷寒醫見可吐可下之證遂執成法復行吐

X¹²
下是寒格更逆於吐下也當以理中湯溫其
太陰加丁香降其寒逆可也若食入口卽吐
則非寒格乃熱格也當用乾薑人參安胃黃
連黃芩降胃火也

乾薑黃連黃芩人參湯方

今缺

乾薑

黃連

黃芩

人參

各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當

逆湯救表宜桂枝湯

註

傷寒醫不分表裏寒熱虛實而誤下之續得
下利清穀不止者寒其裏也雖有通身疼痛
之表未除但下利清穀不止裏寒已盛法當
急救其裏俟便利自調仍身疼痛不止再救
其表可也救裏宜四逆湯溫中勝寒救表宜
桂枝湯調營和衛也

集註

王三陽曰此證當照顧協熱利須審其利之

色何如與勢之緩急不可輕投四逆桂枝也
喻昌曰攻裏必須先表後裏始無倒行逆施
之患惟在裏之陰寒極盛不得不急救其裏
俟裏證稍定仍救其表蓋謂救裏後再行救
表也

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

註此詳上條不先救裏而發其表以明太陰少
陰同病之證也下利清穀太陰寒邪已傳少

陰卽有身痛不可攻表若誤攻其表即使汗

出太陽表解而太陰寒凝必脹滿矣

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫
裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

註

此承上條互發其證以明先裏後表之治也
下利腹脹滿者裏寒邪也身體疼痛者表寒
邪也凡表裏寒邪之證同見總以溫裏爲急
故當先溫其裏後攻其表溫裏宜四逆湯攻

表宜桂枝湯

集註

方有執曰裏虛表實惟其虛也故必先之惟

其實也故可後焉

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

註

發汗後表已解而腹滿者太陰裏虛之脹滿也故以厚朴生薑甘草半夏人參湯主之消脹散滿補中降逆也

集註

成無己曰吐後脹滿與下後脹滿皆爲實者言邪氣乘虛入裏而爲實也發汗後則外已解腹脹滿知非裏實由太陰不足脾氣不通

故壅而爲滿也與此湯和脾胃而降逆氣宜

矣

汪琥曰此條乃汗後氣虛腹脹滿其人雖作脹滿而內無實形所以用人參炙甘草等甘溫補藥無疑也

張錫駒曰此言發汗而傷其脾氣也脾主腹故腹滿爲太陰主病發汗後而腹脹滿則知其人脾氣素虛今脾氣愈虛則不能轉輸濁氣不降清氣不升而脹滿作矣

厚朴生薑半夏甘草人參湯方

虛熱

厚朴去皮半動炙 生薑切半動

半夏洗半升 甘草二兩炙

人參一兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升
日三服

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯腹滿不
減減不足言當下之宜大承氣湯

註此詳申上條互發其義以別其治也發汗後

表已解腹滿不痛者乃腹滿時減減復如故

之虛滿也當溫之厚朴生薑半夏甘草人參
湯證也今發汗後表不解腹滿大痛者乃腹
滿不減減不足言之實滿也當下之宜大承
氣湯蓋以裏急先攻裏後和表也

集註

喻昌曰減不足言四字形容腹滿如繪見滿
至十分卽減去一二分不足殺其勢也此所
以縱有外邪未解而當下無疑耳

程應旄曰下之而腹滿如故卽減去一二分

算不得減下之不妨再下必當以減盡爲度也

劉宏璧曰太陰無可下之法也設在經則各經已無可下之理在藏則太陰尤無受下之處桂枝加大黃湯安能無疑乎不知脾與胃相表裏也太陽誤下太陰受邪適胃有宿食則脾因胃之實而實亦卽因太陽之邪而痛矣旣大滿大痛已成胃實又非此湯之所能治故宜大承氣湯也

太陰病衄浮者可發汗宜桂枝湯

註

太陰經病衄當浮緩太陰藏病衄當沉緩今邪至太陰衄浮不緩者知太陽表邪猶未全罷也故卽有吐利不食腹滿時痛一二證其脈不沉而浮便可以桂枝發汗先解其外俟外解已再調其內可也於此又可知論中身痛腹滿下利急先救裏者衄必不浮矣

註

集王肯堂曰病在太陽衄浮無汗宜麻黃湯此衄浮當亦無汗而不言者謂陰不得有汗不

必言也不用麻黃湯而用桂枝湯蓋以三陰兼表病者俱不當大發汗也須識無汗亦有用桂枝者

程知曰此言太陰宜散者也太陰病謂有腹痛下利證也太陽脈尺寸俱浮今脈浮則邪還於表可知矣故宜用桂枝解散不用麻黃者陰病不得大發其汗也桂枝湯有和裏之意焉

程應旄曰此太陰中之太陽也雖有裏病仍

從太陽表治方不引邪入藏

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也
桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主
之

註

本太陽中風病醫不以桂枝湯發之而反下
之因而邪陷入裏餘無他證惟腹滿時痛者
此屬太陰裏虛痛也故宜桂枝加芍藥湯以
外解太陽之表而內調太陰之裏虛也若大
滿實痛則屬太陰熱化胃實痛也故宜桂枝

加大黃湯以外解太陽之表而內攻太陰之裏實也

集註

趙嗣真曰太陰腹滿證有三有次第傳經之邪有直入中寒之邪有下後內陷之邪不可不辨

喻昌曰太陽病之誤下其變皆在胸脇以上此之誤下而腹滿時痛無胸脇等證則其邪已入陰位所以屬在太陰也仍用桂枝解肌之法以升發太陽之邪倍芍藥者以調太陰

之氣本方不增一藥斯爲神耳大實大滿宜
從急下然陽分之邪初陷太陰未可峻攻但
於桂枝湯中少加大黃七表三裏以分殺其
邪與大柴胡湯同其義也

程應旄曰誤下太陽而成腹滿時痛太陰之
證見矣然表邪內陷留滯於太陰非藏寒病
也仍用桂枝湯升發陽邪但倍芍藥以調和
之倘大實而痛於證似可急下然陰實而非
陽實仍從桂枝例升發陽邪但加大黃以破

結滯之物使表裏兩邪各有去路則寒隨實去不溫而自溫矣然此二證雖屬之太陰實從太陽傳來則脈必尙浮可知

桂枝加芍藥湯方

可得

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

桂枝加大黃湯方

可得

桂枝 三兩

大黃 二兩

芍藥 六兩

甘草 二兩

生薑切

八兩枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升
日三服

集解

柯琴曰腹滿爲太陰陽明俱有之證然位同

而職異太陰主出太陰病則腐穢氣凝不利

故滿而時痛陽明主內陽明病則腐穢燥結

不行故大實而痛是知大實痛是陽明病而

非太陰病矣仲景因表證未解陽邪已陷入

太陰故倍芍藥以益脾調中而除腹滿之時

痛此用陰和陽法也若表邪未解而陽邪陷入陽明則加大黃以潤胃通結而除其大實之痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃之氣液胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相搏故轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明則腹滿大實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆大實而痛是燥屎之徵故倍加芍藥小變建中之劑少加大黃微示調胃之方也

太陰爲病，脈弱，其人續自便利，設當行大黃芍藥。

者宜減之，以其人胃氣弱，易動故也。

註

太陰爲病必腹滿而痛，治之之法當以脈消息之。若其人脈弱，則其中不實，雖不轉氣，下趨少腹，然必續自便利。設當行大黃芍藥者，宜減之。以胃氣弱難堪峻攻，其便易動故也。由此推之，可知大便鞭者，不論在陰，在陽，凡脈弱皆不可輕下也。

集註

程知曰：此言太陰脈弱，恐續自利，雖有腹痛

不宜用攻與建中湯相發明也

喻昌曰此段叮嚀與陽明篇中互相發明陽
明曰不轉失氣曰先鞭後塘曰未定成鞭皆
是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱恐續自
利雖有腹痛減用大黃芍藥又是恐傷陽明
胃氣也

汪琥曰或問大黃能傷胃氣故宜減芍藥能
調脾陰何以亦減之答曰虛弱則氣餒不充
仲景以溫甘之藥能生氣芍藥之味酸寒雖

減之

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩

下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

註傷寒脈浮而緩手足熱者爲繫在太陽今手

足溫故知繫在太陰也太陰屬濕濕與熱瘀

當發身黃小便自利者則濕不畜熱不瘀故

不能發黃也若至七八日大便鞶則爲轉屬

陽明今既不鞭雖暴煩下利日十餘行必當
自止何也以脈浮緩手足溫知太陰脾家素
實邪不自容腐穢當去故也

集註

程知曰言自利之證脈浮緩手足溫則爲脾

實也太陰脈本緩故浮緩雖類太陽中風而
手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰
厥陰之厥逆所以爲繫在太陰也太陰濕熱
相蒸勢必發黃然小便利則濕下泄而不發
黃矣此雖暴煩頻利有似少陰之證然其利

當自止所以然者以肺浮緩手足溫知其人
脾氣實而非虛寒之比其濕熱所積之腐穢
自當逐之而下也若不辨晰而以四逆法治
之則誤矣

程應旄曰太陰得浮緩手足溫之脈證則胃
陽用事自無藏寒之痛陰鬱或有之小便不
利必發黃雖發黃不爲陰黃若小便自利者
不能發黃陰欲鬱而陽必驅至七八日雖暴
煩下利日十餘行必自止所以然者脈不沉

且弱而浮緩手足不涼而自溫陰得陽以周
護則不寒不寒則不虛是爲脾家實也經曰
陽道實陰道虛陰行陽道豈肯容邪久住此
則腐穢當去故耳

汪琥曰下利煩燥者死此爲先利而後煩是
正氣脫而邪氣擾也茲則先煩後利是脾家
之正氣實故不受邪而與之爭因暴發煩熱

也

太陰中風四肢煩痛陽微陰濶而長者爲欲愈

太陰中風者謂此太陰病是從太陽中風得來者故有四肢煩疼之證也陰陽以浮沉言夫以浮微沉濇之太陰脈而兼見陽明之長

脈則爲陰病陽脈藏邪傳府故爲欲愈也

集註 程知曰傷寒陰邪也故自利宜用四逆傷風陽邪也故煩痛見於四肢凡太陰病脈浮者多是太陰中風

喻昌曰微濇之中更察其脈之長而不短知元氣未漓其病當自愈也

太陰病欲解時從亥至丑上

註

邪之解也必於所旺之時亥子丑乃太陰所
旺之時也當此旺時故邪不能勝而自解矣

音切

趨

七句
揭音訏
腐音府
穢於廢

切

御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論附註

辨少陰病脈證并治全篇

少陰腎經水火之藏脈邪傷其經隨人虛實或從水化以爲寒或從火化以爲熱水化爲陰寒之邪是其本也火化爲陽熱之邪是其標也陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細而數至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽邪雖欲寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽

邪背惡寒則口中燥陰邪咽痛不腫陽邪咽
痛則腫陰邪腹痛下利清穀陽邪腹痛下利
清水或便膿血也陰邪外熱面色赤裏寒大
便利小便白陽邪外寒手足厥裏熱大便秘
小便赤此少陰標本寒熱之脈證也凡從本
之治均宜溫寒回陽從標之治均宜攻熱救
陰回陽救陰其機甚微總在臨證詳究辨別
標本寒熱以急施其治庶克有濟稍緩則不
及矣

少陰之爲病脈微細但欲寐也

註

少陰腎經陰盛之藏也少陰受邪則陽氣微故脈微細也衛氣行陽則寤行陰則寐少陰受邪則陰盛而行陰者多故但欲寐也此少陰病之提綱後凡稱少陰病者皆指此脈證而言也

集註

方有執曰少陰腎經也居於極下其脈起於小趾之下靈樞曰是主所生病者嗜卧但欲寐蓋人肖天地天地之氣行於陽則闢而曉

行於陰則闔而夜故人之氣行於陽則動而寤行於陰則靜而寐凡病人但欲寐者邪客於陰故也

張璐曰此言少陰之總脈總證也蓋少陰屬水主靜即使熱邪傳至其經在先之脈雖浮大此時亦必變爲沉細在先之證雖煩熱不寧此時亦必變爲昏沉嗜臥但須辨出脈細沉數口中燥爲熱證脈沉微細口中和爲寒證以此明辨萬無差誤矣

程應旄曰凡陰鴟皆沉異乎太陽之浮不必
言矣陽明鴟大微者大之反少陽鴟弦細者
弦之反沉兼微細陰證定矣

少陰病始得之反發熱鴟沉者麻黃附子細辛湯
主之

註

少陰病謂但欲寐也鴟沉者謂鴟不微細而
沉也今始得之當不發熱而反發熱者是爲
少陰之裏寒兼有太陽之表熱也故宜麻黃
附子細辛湯溫中發汗顧及其陽則兩感之

X-8
寒邪均得而解之矣

集註

方有執曰發熱邪在表也脈沉少陰位北而居裏也以其居裏邪在表而發熱故曰反也以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫通於少陰用之以佐主治者以其專經而爲向導也

程知曰三陰表法與三陽不同三陰必以溫經之藥爲表而少陰尤爲緊關故用散邪溫

經之齊側外邪之深八者可出而內陽亦不
因之外越也

程應旄曰一起病便發熱兼以陰經無汗世
有計日按證者類能用麻黃而忌在附子不
知脈沉者由其人腎經素寒裏陽不能協應
故沉而不能浮也沉屬少陰不可發汗而始
得病時卽發熱則兼太陽又不得不發汗須
以附子溫經助陽托住其裏使陽不至隨汗
而越其麻黃始可合細辛用耳

林瀾曰傳邪與陰寒皆有沉脈沉但可爲病之在裏而未可專以沉爲寒也夫少陰證中微細而沉與細數而沉其爲寒熱之殊蓋大有別矣

麻黃附子細辛湯方

可啜今飲

麻黃

二兩
去節

細辛

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日未嘗利二十三日後始利此以

二三日無裏證故微發汗也

註

此詳上條少陰病得之二三日仍脈沉發熱不解者宜麻黃附子甘草湯微發其汗也蓋謂二三日不見吐利裏寒之證知邪已衰然熱仍在外尚當汗之但不可過耳故不用細辛而用甘草蓋于溫散之中有和意也此二證皆未曰無汗非仲景畧之也以陰不得有汗不須言也

集註 張璐曰少陰無發汗之法汗之必至亡陽惟

此一證其外有太陽發熱無汗其內不吐利

躁煩嘔渴乃可溫經散寒取其微似之汗也

程應旄曰旣云微發汗矣仍用以字故字推

原之足見鄭重之意按此二條與太陽篇發

熱頭痛脈沉用四逆者同一證彼以不差則

期過三日可知病已入裏雖尙冒太陽頭痛

直以少陰法律之此少陰病在初得二三日

雖無頭痛證不容竟作少陰治之故仍兼太

陽之法以律之一出一入不啻爰書假令前條得之二三日後二條過二三日不差則四逆之與麻黃易地皆然矣

汪琥曰上條反發熱衄沉此亦反發熱衄沉但上言始得之爲急此言得之二三日爲緩病勢稍緩治法亦緩

麻黃附子甘草湯方

今法

麻黃

二兩去節

附子

一枚炮皮破入片

甘草

二兩

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

集解柯琴曰彼太陽病而脈反沉便用四逆以急

救其裏是裏寒陰盛也此少陰脈而表反熱

便於表劑中加附子以預固其陽是表熱陽

衰也夫以發熱無汗太陽之表脈沉但欲寐

少陰之裏設用麻黃開腠理細辛散浮熱而

無附子以固元陽則太陽之微陽外亡惟附

子與麻黃並用則寒邪散而陽不亡此裏病

及表颶沉而當發汗者與病在表颶浮而發汗者逕庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又少間矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之

註

少陰病脈微雖有發熱亦爲少陰裏寒外熱非太陽發熱者可比故不可發汗發汗則亡陽然陽已虛津液已涸卽見少陰口燥咽乾

可下之證若尺脈弱濇者復不可下之又恐亡陰也

集註

方有執曰微者陽氣不充故曰無陽無陽則化不行故汗不可發也尺以候陰弱濇者陰血不足也故謂復不可下其當亟行溫補又可知矣

程應旄曰少陰多自利證人固無肯輕下者但拈出尺脈弱濇字則少陰之有大承氣湯證其尺脈必強而滑已伏見於此處矣

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法

當咽痛而復吐利

註

病人脈陰陽俱緊發熱無汗者太陽傷寒證
也發熱汗出不止者太陽亡陽證也今脈緊
無熱而反汗出此屬少陰然少陰證法當咽
痛而復吐利也上條脈微無汗不可發汗者
是以脈爲主也此條有汗脈緊不可發汗者
是以證爲主也從脈從證不可不察

集註

程知曰陰陽俱緊傷寒之脈也法當無汗而

反汗出太陽之陽外亡也若以少陰亡陽之證而認爲太陽中風之證則誤矣少陰之寒上逼則咽痛而吐下逼則下利也

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

註

此承上條互發其義以別陰陽寒熱也少陰病脈沉微細寒邪脈也脈沉數細熱邪脈也若脈緊汗出是少陰寒虛證也今脈緊無汗乃少陰寒實證也因循至七八日之久而自

下利若寒實解則蹶必緊去而暴微其證必
手足由冷而反溫是知邪隨利去爲欲解也
故此時雖煩下利乃陰退陽回故知其必自
愈也

集註

方有執曰緊寒邪也自下利蹶暴微者陰寒
內瀉也故謂手足爲反溫言陽回也陽回則
陰退故謂緊反去爲欲解也夫寒邪在陰而
蹶緊得自利蹶暴微手足溫緊去爲欲解者
猶之邪在陽蹶數而熱得汗出蹶和身涼數

去爲欲愈之意同陰陽勝復之機也

程應旄曰脈於利後頓變緊而爲微手足於利後變不溫而爲溫則微非諸微亡陽之微乃緊去人安之微蓋以從前之寒已從下利而去故陽氣得回而欲解也雖煩下利必自愈

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

註

背惡寒爲陰陽俱有之證如陽明病無大熱

證也今少陰病但欲寐得之二三日口中不燥而和其背惡寒者乃少陰陽虛之背惡寒非陽明熱蒸之背惡寒也故當灸之更主以附子湯以助陽消陰也口燥口和誠二者之確徵矣

集註

程知曰言初得之證口中和不渴不燥全無裏熱也內經曰背爲陽背惡寒則陽虛陰盛寒深可知若風寒在表而惡寒則一身盡寒

矣炎之以助陽消陰與附子湯以溫經散寒論中云傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎湯加人參主之彼是陽熱乘陰虛而內陷之惡寒與此之陰寒盛者不同陽入陰者則口燥心煩陰寒盛者則不能銷鑠津液故口中和

張璐曰太陽表氣大虛邪氣得入犯少陰故得之一二日尙背惡寒不發熱此陰陽兩虧較之兩感更自不同兩感表裏皆屬熱邪猶

塊發表攻裏此則內外皆屬虛寒無邪熱可
以攻擊惟當溫經補陽以溫補其不足更灸
關元以協助之雖其證似緩於發熱脈沉而
危殆尤甚焉

汪琥曰此條論仲景不言當灸何穴常器之
云當灸鬲俞關元穴背俞第三行郭雍云此
有錯字當是灸鬲俞關元穴也鬲俞是背俞
第二行穴按鬲俞實係背俞部第二行穴然
常器之所云第三行穴者當是鬲關非鬲俞

也圖經云鬲關二穴在第七椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之足太陽氣脈所發專治背惡寒脊強俯仰難可灸五壯蓋少陰中寒必由太陽而入故宜灸其穴又關元一穴在腹部中行臍下三寸足三陰任脈之會可灸百壯常器之所謂灸鬲關者是溫其表以散外邪灸關元者是溫其裏以助其元氣也少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主

之

此承上條詳舉其證互發其義以出其治也

身體痛表裏俱有之證也如太陽病脈浮發熱惡寒身痛手足熱骨節痛是爲表寒當主麻黃湯發表以散其寒今少陰病脈沉無熱惡寒身痛手足寒骨節痛乃是裏寒故主附子湯溫裏以散寒也

集註

方有執曰少陰腎也腎主骨寒淫則痛

程應旄曰身體痛手足寒骨節痛太陽傷寒同有此證也以脈沉辨之沉屬陰寒重著所

致裏陰有餘表陽不足故以附子湯主之

附子湯方

可加今減

附子二枚去皮
生破八片

茯苓三兩

人參二兩

白朮四兩

芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升

去滓溫服一升

日三服

解方少陰爲寒水之藏故寒傷之重者多入少陰

所以少陰一經最多死證方中君以附子二

枚者取其力之鋒且以重其任也生用者一
以壯少火之陽一以散中外之寒則身痛自
止惡寒自除手足自溫矣以人參爲臣者所
以固生氣之原令五臟六府有本十二經脈
有根脈自不沉骨節可和矣更佐白朮以培
土芍藥以平木茯苓以伐水水伐火自旺旺
則陰翳消木平土益安安則水有制制則生
化此誠萬全之術也其有畏而不敢用以致
因循有悞者不誠可惜哉

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯

註

少陰病但欲寐脈沉者若無發熱口燥之證則寒邪已入其藏不須遲疑急溫之以四逆湯消陰助陽可也

集註

吳人駒曰脈沉須別虛實及得病新久若得之多日及沉而實者須從別論

四逆湯方

損效

可加

今枝

甘草

二兩
炙

乾薑

一兩

附子

一枚生用去皮破八片

右三味以水二升煮取一升二合去滓分溫
再服強人可大、附子一枚乾薑三兩

方解

方名四逆者主治少陰中外皆寒四肢厥逆
也君以甘草之甘溫溫養陽氣臣以薑附之
辛溫助陽勝寒甘草得薑附鼓腎陽溫中寒
有水中煖土之功薑附得甘草通關節走四肢
有逐陰回陽之力腎陽鼓寒陰消則陽氣
外達而厥自升手足自溫矣

集解 汪琥曰少陰病本厥微細但欲寐今輕取之

微脈不見重取之細脈幾亡伏匿而至於沉此寒邪深入於裏殆將入藏溫之不容以不急也稍遲則惡寒身踰吐利煩躁不得臥寐手足逆冷脈不至諸死證立至矣四逆湯之用可稍緩乎

少陰病下利白通湯主之

註

少陰病但欲寐脈微細已屬陽爲陰困矣更加以下利恐陰降極陽下脫也故君以葱白大通其陽而上升佐以薑附急勝其陰而緩

降則未勝之陽一門微矣

方有執曰少陰病而加下利者不獨在經而
亦在藏寒甚而陰盛也治之以乾薑附子者
勝其陰則寒自散也用葱白而曰白通者通
其陽則陰自消也

程知曰此言下利宜通其陽也少陰病謂有
脈微細欲寐證也少陰下利陰盛之極恐致
格陽故用薑附以消陰葱白以升陽通云者
一以溫之而令陽氣得入一以發之而令陰

氣易散也

汪琥曰腎虛無火不能主水故下利用自通
湯者溫裏以散寒也

白通湯方

可微今院

無加歌

葱白

四莖

乾薑

二兩

附子

一枚生去皮破八片

右三昧以水三升煮取一升去滓分溫再服

集解汪琥曰此方與四逆湯相類獨去甘草蓋驅寒欲其速立烈之性取其驟發直達下焦故

寒欲其速立烈之性取其驟發直達下焦故

不欲甘以緩之也而猶重在葱白少陰之陰
天之寒氣亦爲陰兩陰相合而偏於下利則
與陽氣隔絕不通薑附之力雖能益陽不能
使真陽之氣必入於陰中惟葱白味辛能通
陽氣令陰得陽而利庶可愈矣蓋大辛大熱
之藥不過藉以益人陽氣非有以通之令真
陽和會而何以有濟也耶

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈
乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者

死微續者生

註

此承上條詳申其脈以明病進之義也少陰

病下利脈微者與白通湯下利當止今利不

止而轉見厥逆無脈更增乾嘔而煩者此陰

寒盛極格陽欲脫之候也若耑以熱藥治寒

寒既甚必反格拒而不入故於前方中加人

尿猪膽之陰以引陽藥入陰經曰逆者從之

此之謂也無脈者言診之而欲絕也服湯後

更診其脈若暴出者如燭燼焰高故主死若

其雖徐徐微續而出則是真陽漸回故可生也故上條所以纔見下利卽用自通以治於未形誠善法也

集註

程知曰此言陰盛格陽用膽汁通陰法也以白通與之宜乎陽可救今乃利不止反至厥逆無脈則陰邪愈無忌矣乾嘔而煩則陽藥在膈而不入陰矣此非藥不勝病乃無鄉導之力也加人尿猪膽之陰寒則可引薑附之溫入格拒之寒而調其逆此內經從治之法

也

程應旄曰衄暴出者死無根之陽驟逆諸外
也微續者生陽氣漸交陰肯納也

白通加猪膽汁湯方

可微今既

葱白

四莖

乾薑

一兩

附子

一枚生皮破八片去

人尿

五合

猪膽汁

一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁
人尿和令相得分溫再服若無膽亦可用

解是方卽前白通湯加入屎猪臘汁也加屎臘

者從其類也下咽之後冷體旣消熱性便發情且不違而致大益則三氣之格拒可調上下之陰陽可通矣

小陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

註少陰病欲吐不吐心中煩但欲寐五六日自

利而渴者此屬少陰傳邪寒熱俱有之證也
若是少陰熱而燥乾引水之渴小便必色赤
乃少陰燥不能生津下焦有熱也今爲少陰
虛而引水自救之渴故小便則色白是少陰
虛冷不能化液下焦有寒也於此可知少陰
病形悉具而渴者有寒熱二端之別也

集註

成無己曰欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若
腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五
六日邪傳少陰之時若自利不渴寒在中焦

屬太陰也此自利而渴爲寒在下焦屬少陰也腎虛水燥故渴欲引水自救下焦虛寒故小便色白下利而渴小便色白非裏熱可知矣

方有執曰此反覆申明曉人勿認煩渴均爲熱證以致悞之意

程應旄曰煩證不盡屬少陰故指出但欲寐來渴證不盡屬少陰故指出小便白來結以下焦虛有寒教人上病治在下也蓋上虛而

無陰以濟總由下虛而無陽以溫也二虛字
皆由寒字得來又曰吐利而渴與猪苓湯證
同其別在但欲寐且猪苓證小便必不利而
色赤飲水與白頭翁證同彼曰以有熱故也
小便亦必不白

林瀾曰欲吐不吐心煩陽虛格越於上但欲
寐自利小便白裏之真寒已深要知此渴與
口燥舌乾之渴不同若兼腹滿便閉譖語諸
證自當作陽邪傳裏治之旣裏虛自利小便

於下陽必格於上豈可以煩渴而誤攻其熱哉

汪琥曰以全文觀之大似熱證惟小便色白知爲真寒之證此但欲寐與熱邪不同其寐必不昏濁其呼吸必促而細曰屬少陰者以別其非陽邪之渴乃內無津液引水自救之渴試以冷水飲之必不多也細察其小便若色白者此少陰虛寒之證悉具也非熱邪可

知矣

沈明宗曰此少陰虛寒似乎熱證之辨也世但知四肢厥逆爲虛寒證詎知小便色白乃爲的驗乎

吳人駒曰陽明之欲吐則不得寐在少陰則但欲寐引此以爲盛虛之別

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒絃弦遲者此胸中實不可下也當之若膈上有寒飲乾呕者不可吐也當溫之宜

逆湯

按溫溫當是嘔嘔嘔嘔者乃吐飲之狀也

註

此承上條欲吐不吐詳別脈證以明其治也。飲食入口卽吐且心中嘔嘔欲吐復不能吐惡心不已非少陰寒虛吐也乃胸中寒實吐也故始得之脈弦遲弦者飲也遲者寒也而手足寒者乃胸中陽氣爲寒飲所阻不能通於四肢也寒實在胸當因而越之故不可下也若膈上有寒飲但乾嘔有聲而無物出此

爲少陰寒虛之飲非胷中寒實之飲也故不可吐惟急溫之宜四逆湯或理中湯加丁香吳茱萸亦可也

集註

程知曰此言少陰飲吐爲腎邪上逆當溫不

當吐也欲吐不吐陰邪上逆之證也若始得病時邪未深入其手足但寒而不厥脈但弦遲而不沉細則爲邪實胸中寒尚在表屬於陽分當吐而不當下吐者有物嘔則無物兩者須辨若膈上有寒飲但見乾嘔而不能吐

出則是陰寒上逆當溫而不當吐也曰急溫

者明不溫則見厥逆無蹶諸變證也

程應旄曰寒在胃中法不可下而屬實邪但從吐法一吐而陽氣得通吐法便是溫法若膈上有寒飲乾嘔者虛寒從下而上阻留其飲於胃中究非胃中之病也直從四逆湯急溫其下可矣

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

註此發明上條互詳脈證失於急溫致變之義

也脈微細沉但欲臥少陰寒也當無汗今反汗出不煩乃少陰亡陽也且自欲吐陰寒之邪上逆正當急溫失此不治因循至五六日加之自利復煩躁不得臥寐者此少陰腎中真陽擾亂外越欲絕之死證此時卽溫之亦無及矣

註

集方有執曰脈微沉細但欲臥少陰本病也汗

出而不作煩熱無陽也欲吐經中之邪不退

也自利藏病進也更復煩躁不得臥寐者陽
欲絕而擾亂不寧也

程應旄曰今時論治者不至於惡寒踴臥四肢逆冷等證疊見則不敢溫不知證已到此溫之何及况諸證有至死不一見者則盍於本論中之要旨一一申詳之少陰病脈必沉而微細論中首揭此蓋已示人以可溫之脈矣少陰病但欲臥論中又已示人以可溫之證矣汗出在陽經不可溫在少陰宜急溫論

中又切示人以亡陽之故矣况復有不煩自
欲吐陰邪上逆之證乎則真武四逆誠不啻
三年之艾矣乃不知預爲綢繆延緩至五六
日前欲吐今且利矣前不煩今煩且躁矣前
欲臥今不得臥矣陽虛擾亂陰盛轉加焉有
不死者乎

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或
小便不利或下利或嘔者真武湯主之

論中心下有水氣發熱有汗煩渴引飲小便不利者屬太陽中風五苓散證也發熱無汗乾嘔不渴小便不利者屬太陽傷寒小青龍湯證也今少陰病二三日不已至四五日腹痛下利陰寒深矣設小便利是純寒而無水乃附子湯證也今小便不利或欬或嘔此爲陰寒兼有水氣之證故水寒之氣外攻於表則四肢沉重疼痛內盛於裏則腹痛自利也水氣停於上焦胸肺則欬喘而不能臥停於

中焦胃府則嘔而或下利停於下焦膀胱則小便不利而或少腹滿種種諸證總不外乎陰寒之水而不用五苓者以非表熱之飲也不用小青龍者以非表寒之飲也故惟主以真武湯溫寒以制水也

集註

喻昌曰太陽篇中厥逆筋惕肉瞞而亡陽用真武矣茲少陰之水濕上逆仍用真武以鎮攝之可見太陽膀胱與少陰腎一藏一府同爲寒水府邪爲陽邪藉用麻桂爲青龍藏邪

爲陰邪藉用附子爲真武

真武湯方

可升今降

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩
切

白朮

二兩

附子

一枚
皮破
炮去
八片

日三服

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓

若下利者去芍藥加乾薑二兩

若嘔者去附子加生薑足前成半斤

方解 小青龍湯治表不解有水氣中外皆寒實之

病也真武湯治表已解有水氣中外皆寒虛之病也真武者北方司水之神也以之名湯者賴以鎮水之義也夫人一身制水者脾也主水者腎也腎爲胃關聚水而從其類者倘腎中無陽則脾之樞機雖運而腎之關門不開水雖欲行孰爲之主故水無主制泛溢妄

行

而水有所主矣白朮之苦燥建立中土而水有所制矣生薑之辛散佐附子以補陽溫中有散水之意茯苓之淡滲佐白朮以健土制水之中有利水之道焉而尤妙在芍藥之酸歛加於制水主水藥中一以瀉木使子盜母虛得免妄行之患一以歛陽使歸根於陰更無飛越之虞孰謂寒陰之品無益於陽乎而昧者不知承制之理論中誤服青龍發汗亡

陽用此湯者亦此義也然下利減芍藥者以其陽不外散也加乾薑者以其溫中勝寒也水寒傷肺則咳加細辛乾薑者散水寒也加五味子者收肺氣也小便利者去茯苓以其雖寒而水不能停也嘔者去附子倍生薑以其病非下焦水停於胃也所以不須溫腎以行水祇當溫胃以散水佐生薑者功能止嘔也

解集程知曰白通通脈真武皆爲少陰下利而設

白通四證附子皆生用惟真武一證熟用者
蓋附子生用則溫經散寒炮熟則溫中去飲
白通諸湯以通陽爲重真武湯以益陽爲先
故用藥有輕重之殊乾薑能佐生附以溫經
生薑能資熟附以散飲也

張璐曰按真武湯方本治少陰病水飲內結
所以首推术附兼茯苓生薑之運脾滲水爲
務此人所易明也至用芍藥之微旨非仲景
不能蓋此證雖曰少陰本病而實緣水飲內

蓄所以腹痛自利四肢疼重而小便反不利也若極虛極寒則小便必清白無禁矣安有反不利之理哉此證不但真陽不足真陰亦必素虧或陰中伏有陽邪所致若不用芍藥固護其陰豈能勝附子之雄烈乎

病人身大熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

註

身體爲表藏府爲裏此以內外分表裏也皮膚爲表骨髓爲裏六府爲表五藏爲裏此以

身體之淺深藏府之陰陽分表裏也病人已
病之人也身大熱謂通身內外皆熱三陽證
也反欲得近衣者乃是假熱雖在皮膚之淺
而真寒實在骨髓之深陰極似陽證也身大
寒謂通身內外皆寒三陰證也反不欲近衣
者乃是假寒雖在皮膚之淺而真熱實在骨
髓之深陽極似陰證也

按此以人之苦欲測其寒熱真假而定陰陽之
證也當與少陰厥陰病論中表熱裏寒裏熱

表寒鹹滑而厥惡寒不欲近衣口燥咽乾等
條叅看

集註

成無己曰皮膚言淺骨髓言深皮膚言外骨
髓言內身熱欲近衣表熱裏寒也身寒不欲
近衣表寒裏熱也大抵表熱裏寒鹹必沉遲
裏熱表寒鹹必滑數須當辨之

鄭重光曰皮膚者骨髓之外浮淺之分也骨
髓者皮膚之內沉深之分也欲得近衣借外
以禦內此真寒也體有著而成忤不在衣之

寒真熱而定標本乎

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之

註

少陰腎也腎象乎坎一陽陷於二陰之中二陰若盛則一陽必衰陰邪始得內侵孤陽因之而外越也下利清穀手足厥冷脈微欲絕裏陰盛極也身反不惡寒面色反赤其外反

熱格陽於外也故雖有腹痛乾嘔咽痛等證亦當倣白通湯之法加葱於四逆湯中以消其陰而復其陽可也

集註

程應旄曰熱因寒格無論腹痛乾嘔咽痛皆下利中格陽之證即使利止而脈仍前欲絕不出亦不得謂裏寒已退輒妄治其外熱也須循四逆湯例消陰翳於下部但加葱白宣陽氣於下焦使陽氣通而脈亦出始爲真愈林瀾曰格拒格也亦曰隔陽陰陽隔離也又

日戴陽浮於上如戴也夫真寒入裏陰氣未

有不盛者然其劇不過陽愈微陰愈盛耳

通脈四逆湯方

損汗

可服

今取

甘草

二兩炙

乾薑

三兩強人可四兩

附子

大者一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脈卽出者愈

面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止衄不出者去桔梗加人參二兩

病皆與方相應者乃服之

方解

論中扶陽抑陰之劑中寒陽微不能外達主以四逆中外俱寒陽氣虛甚主以附子陰盛於下格陽於上主以白通陰盛於內格陽於外主以通衄是則可知四逆運行陽氣者也

附子溫補陽氣者也白通宣通上下之陽者

寒外熱是腎中陰盛格陽於外故主之也倍乾薑加甘草佐附子易名通脈四逆湯者以其能大壯元陽主持中外共招外熱返之於內蓋此時生氣已離亡在俄頃若以柔緩之甘草爲君何能疾呼外陽故易以乾薑然必加甘草與乾薑等分者恐渙漫之餘薑附之猛不能安養元氣所謂有制之師也若面赤者加葱以通格上之陽腹痛者加芍藥以和

在裏之陰嘔逆者加生薑以止嘔咽痛者加桔梗以利咽利止嘔不出氣少者俱倍人參以生元氣而復脈也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

註

少陰吐利法當逆冷今不逆冷反發熱者是陽未衰故曰不死若脈不至雖有外熱恐是假熱須防陽脫宜急灸少陰速通其陽則脈可復也

註 程知曰前條通竅四逆湯是裏寒外熱手足

逆冷而竅不至者也此條用灸法是裏寒外
熱手足不逆冷而竅不至者也少陰動竅在

足內踝

喻昌曰前條背惡寒之證灸後用附子湯陰
寒內凝非一灸所能勝也此條手足反熱祇
是陰內陽外故但灸本經引之內入不必更
用溫藥也

汪琥曰經云腎之原出於太谿灸少陰七壯

當灸太谿二穴在內踝後跟骨動脈陷中
少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主
之

註

名曰少陰病主厥陰藥者以少陰厥陰多合
病證同情異而治別也少陰有吐利厥陰亦
有吐利少陰有厥逆厥陰亦有厥逆少陰有
煩躁厥陰亦有煩躁此合病而證同者也少
陰之厥有微甚厥陰之厥有寒熱少陰之煩
躁則多躁厥陰之煩躁則多煩蓋少陰之病

多陰盛於陽故主以四逆之藥附逆陽以回
陽也厥陰之病多陰盛鬱陽故主以吳茱萸
之辛烈迅散以通陽也此情異而治別者也
今吐而不吐欬手足厥冷故以少陰病名之
也蓋厥冷不過肘膝多煩而躁欲死故屬厥
陰病主治也所以不用四逆湯而用吳茱萸
湯也

集註

程知曰吐利陰邪在裏上于脾胃也厥冷陽
不溫於四肢也煩而躁則陰盛之極至於陽

氣暴露擾亂不寧也證至此幾瀕危矣非茱萸之辛溫無以降陰氣之上逆非人參薑棗之甘溫無以培中土而制腎邪也躁煩與煩躁亦有別躁者陰躁煩者陽煩躁煩者言自躁而煩是陰邪已外逼也煩躁者言自煩而躁是陽氣猶內爭也其輕重淺深之別學者宜詳審之

程應旄曰溫法原爲陰寒而設故真寒類多假熱凡陰盛格陽陰證似陽等皆少陰蠱惑

人耳目處須從假處勘出真來才不爲之勞
制如吐利而見厥冷是胃陽衰而腎陰併入
也誰不知爲寒者顧反見煩躁欲死之證以
誑之是皆陽被陰拒而置身無地故有此象
吳茱萸湯挾木力以益火勢則土得溫而水
寒却矣

吳茱萸湯方

可微 合洪

達州

吳茱萸一升

人參三兩

生薑

一兩

大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升溫服七合日三

服

集解

羅天益曰仲景之法於少陰則重固元陽於

厥陰則重固生氣厥陰肝木雖爲兩陰交盡

而一陽之真氣實起其中此之生氣一虛則

三陰濁氣直逼中上不惟本經諸證悉具將

陽明之健運失職以致少陰之真陽浮露而

吐利厥逆煩躁欲死食穀欲嘔種種叢生矣

吳茱萸得東方震氣辛苦大熱能達木鬱直

入厥陰降其陰盛之濁氣用以爲君人參秉
中和正氣甘溫大補能接天真挽回性命升
其垂絕之生氣用以爲臣佐薑棗和胃而行
四末斯則震坤合德木土不害一陽之妙用
成而三陰之間無非生生之氣矣諸證有不
退者乎

方有執曰吐則傷陽利則損陰厥冷者陰損
而逆也煩躁者陽傷而亂也茱萸辛溫散寒
暖胃而止嘔人參甘溫益陽固本而補中大

棗助胃益脾生薑嘔家聖藥故四物者爲溫
中降逆之所須也

少陰病吐利躁煩四逆者死

註此承上條互明其義以別可治不可治也此

條吐利煩躁厥逆皆與上條同一用吳茱萸
湯治之一曰死不治者何也蓋以少陰煩躁
多躁少煩躁者陰也厥陰煩躁多煩少躁煩
者陽也厥陰手足厥冷不過肘膝微陽未絕
故可治也少陰四肢逆冷不能回溫獨陰不

化故曰死也

集註

程應旄曰由吐利而躁煩陰陽離脫而擾亂可知加之四逆其陽絕矣不死何待使早知溫中寧有此乎

張璐曰此條與上條不殊何彼可治而此不可治耶必是已用溫中不愈轉加躁煩故主死耳

少陰病惡寒身踰而利手足厥冷者不治

集註

此互詳上條手足逆冷不治之義也惡寒身

跪而臥雖係少陰證而不至於死若下利不止手足逆冷不回是有陰無陽卽不吐利躁煩亦不可治也

集註

喻昌曰陰盛無陽卽用四逆等法回陽氣於無何有之鄉其不能回者多矣故曰不治

少陰病四逆惡寒而身跪脈不至不煩而躁者死

集註

此總承上三條以明不治之死證也四逆謂

四肢逆冷過肘膝而不回也表陽虛故惡寒也陰主屈故跪臥不伸也脈不至則生氣已

絕若有煩無躁是尚有可回之陽今不煩而躁則是有陰無陽故曰死也

集註

程應旄曰諸陰邪具見而脈又不至陽先絕矣不煩而躁孤陰無附將自盡也經曰陰氣者靜則神藏躁則消亡蓋躁則陰藏之神外亡也亡則死矣使早知復脈以通陽寧有此乎

少陰病下利脈微濶嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之

註

脈微陽虛也濇血少也必數更衣者下利勤
也反少者欲下而反少也卽今之陽虛血少
裏急後重下利病也嘔而汗出者陰盛於內
上逆而作嘔也陽虛失護故汗出也當溫其
上宜灸之

集註

程應旄曰少陰病下利陽微可知乃其脈微
而且澁則不但陽微而陰且竭矣陽微故陰
邪逆上而嘔陰竭故汗出而勤努責一法之
中旣欲助陽兼欲護陰則四逆附子輩俱難

用矣惟灸項上百會穴以溫之既可代薑附輩之助陽而行上更可避薑附輩之辛竄而燥下故下利可止究於陰血無傷可見病在少陰不可以難用溫者遂棄夫溫也

汪琥曰按此條論仲景不言當灸何穴脈經云灸厥陰俞常器之曰灸太衝皆誤郭雍曰灸太谿雖係少陰經穴亦誤仲景曰宜溫其上方有執曰上謂項百會穴是也圖經云一名三陽五會在前項後一寸五分項中央原

治小兒脫肛久不差可灸七壯此條亦灸之

者升舉其陽以調夫陰也

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

註

少陰病利止若胃和能食神清氣爽是爲欲愈也今利止頭眩時時昏冒不省是氣脫神去故下利雖止仍主死也

集註

方有執曰頭眩俗謂昏暈也諸陽在頭下利止而頭眩者陽無依附浮越於外神氣散亂故時時自冒也死可知矣

張錫駒曰此條死證全在頭眩自冒上看出
若利止而頭不眩不冒此中已和矣安能死
乎

張璐曰人身陰陽相爲依附者也陰亡於下
則諸陽之上聚於頭者紛然而動所以頭眩
時時自冒陽脫於上而主死也可見陽回利
止則生陰盡利止則死矣

汪琥曰下利止則病當愈今者反爲死候非
陽回而利止乃陽脫而利盡也

少陰病六七日息高者死

註 少陰病但欲寐息平氣和順也今息高氣促逆也凡病臥而息高氣促者多死

集註

喻昌曰六七日字辨證最細蓋經傳少陰而息高與二三日太陽作喘之表證迥殊也

程知曰腎爲生氣之源息高則真氣散走於胸中不能復歸於氣海故主死也

程應旄曰夫肺主氣而腎爲生氣之源蓋呼吸之門也關係人之死生者最鉅息高者生

氣已絕於下而不復納故游息僅呼於上而無所吸也死雖成於六七日之後而機自兆於六七日之前既值少陰受病何不豫爲固護預爲隄防致令真陽渙散而無可復返乎凡條中首旣諄諄禁汗繼卽急急重溫無非見及此耳

魏荔彤曰七日之久息高氣逆者與時時自冒同一上脫也一眩冒而陽升不返一息高而氣根已剝同一理而分見其證者也故仲

景俱以死期之

少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗

詩

少陰病但欲寐若脈細沉微是邪從寒化也

今脈細沉數乃邪從熱化也卽有發熱亦是

將轉屬陽明非若前所言少陰病始得之反

發熱脈沉不數宜麻黃附子細辛湯發汗者

可比也故曰病爲在裏不可發汗

集註

程知曰言熱邪在裏有發汗之禁也少陰之脈微細其常也乃沉而加之以數正爲熱邪

在裏之徵發汗則動經而增燥熱有奪血之變矣

鄭重光曰脈細沉而數裏有伏陽矣故曰病爲在裏乃熱邪傳裏之證斷不可發汗發汗則動經氣而有亡血之變少陰發熱脈沉是病爲在表以無裏證故可發汗若脈浮而遲表熱裏寒下利清穀是遲爲無陽病爲在裏又不得以浮爲在表而發汗也要知陰中有陽沉亦可汗陽中有陰浮亦當溫此條脈細

沉數數則爲熱沉爲在裏此陽邪入裏故以發汗而示戒也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭爲難治

註

此條申明強發少陰熱邪之汗則有動血之變也少陰病脈細沉數加之以厥亦爲熱厥陰本無汗即使無汗亦不宜發汗若發其汗是爲強發少陰熱邪之汗也不當發而強發

之益助少陰之熱炎炎沸騰必動其本經之
血或從口鼻或從目出是名下厥上竭下厥
者少陰熱厥於下也上竭者少陰血竭於上
也故爲難治

集註

張璐曰強責少陰汗而動其血勢必逆行而
上出陽竅以發汗皆陽藥故也

程應旄曰五液皆主於腎強發少陰之汗周
身之氣皆逆血隨奔氣之促逼而見故不知
從何道而出也

沈明宗曰少陰病但厥無汗其病在裏當以四逆散和陰散邪其病自退而厥自愈矣豈可強發其汗耶

魏荔彤曰厥而有汗乃內寒迫陽外亡之象故爲寒化陰邪無汗而厥則熱邪伏於裏而不外越邪熱內耗也斯可議爲熱化陽邪無疑矣

少陰病欬而下利譫語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

少陰屬腎主水者也少陰受邪不能主水上攻則欬下攻則利邪從寒化真武湯證也邪從熱化猪苓湯證也今被火氣劫汗則從熱化而轉屬於胃故發譫語津液內竭故小便難是皆由強發少陰之汗故也欲救其陰自虎猪苓二湯擇而用之可耳

集註方有執曰強責謂過求也小便與汗皆血液也少陰少血劫汗奪血則小便爲之涸竭故難也

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪
苓湯主之

註

凡少陰下利清穀欬嘔不渴屬寒飲也今少
陰病六七日下利黏穢欬而嘔渴煩不得眠
是少陰熱飲爲病也飲熱相搏上攻則欬中
攻則嘔下攻則利熱耗津液故渴熱擾於心
故煩不得眠宜猪苓湯利水滋燥飲熱之證
皆可愈矣

集

趙嗣真曰少陰欬而下利嘔渴心煩不眠及

厥陰下利欲飲水者是皆傳邪之熱動必汎
細數故以黃連滑石等清利之其少陰自利
而渴欲吐不吐心中煩但欲寐小便色白者
是本經陰邪之寒也脈必沉微故以附子乾
薑溫之

汪琥曰下利欬而嘔渴心煩不得眠焉知非
少陽陽明之病然少陽陽明若見此證爲裏
實脈必弦大而長此病脈必微細故知其爲
少陰之病無疑也

林瀾曰下利則邪井於下矣其嘔而且欬何
也蓋至六七日渴而心煩不眠則傳邪之上
客者又盛渴則必恣飲多飲必停水是邪熱
既不能解而水蓄之證復作也熱邪傳陷之
下利非陰寒吐利并作之可比嘔而渴者蓋
先嘔後渴爲邪欲解先渴後嘔多爲水停況
又有水寒射肺爲欬之可兼察乎以是知必
有挾飲於內耳

沈明宗曰黃連阿膠湯之心煩不得眠較此

條頗同而治異何也蓋此條乃少陰風熱轉入陽明而致下利故以猪苓湯驅導水邪還從膀胱而去急救胃中津液爲主彼條之心煩不得眠而無下利乃腎水枯少故用黃連阿膠湯滋陰清火急救腎陰爲主也

魏荔彤曰欬而咽不痛渴而口不乾則知邪雖爲傳經而入之熱惟其有水飲相混故熱勢不能甚肆其猛烈雖上衝爲欬嘔而不致咽痛隔阻正津爲口渴而不致乾燥兼以心

煩不得眠於少陰但欲寐陰證中見陽證豈
非傳經之熱兼水濕者乎其所以不發黃者
以少陰病原有下利濕不能留熱不能蓄故
也由此觀之熱邪兼水飲昭然矣

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中
痛或泄利下重者四逆散主之

註

凡少陰四逆雖屬陰盛不能外溫然亦有陽
爲陰鬱不得宣達而令四肢逆冷者故有或
欬或悸或小便不利或腹中痛泄利下重諸

證也今但四逆而無諸寒熱證是旣無可溫之寒又無可下之熱惟宜疏暢其陽故用四逆散主之

集註

李中梓曰按少陰用藥有陰陽之分如陰寒而四逆者非薑附不能療此證雖云四逆必不甚冷或指頭微溫或脈不沉微乃陰中涵陽之證惟氣不宣通是以逆冷故以柴胡涼表芍藥清中此本肝膽之劑而少陰用之者爲水木同源也以枳實利七衝之門以甘草

和三焦之氣氣機宣通而四逆可痊矣

程知曰蓋傷寒以陽爲主四逆有陰進之象下之則陽益虧陷而不出故經謂諸熱邪傳經至於手足逆冷最難辨認謂爲寒深於裏則無脈微欲絕之象謂爲熱深於裏則無煩渴之證蓋祇是熱邪入結於裏而陽氣不得順行於四肢也此證當用和解不當用寒下故經中用劑之輕少者無如此方則其輕緩解散之義可見矣

程應旄曰初得之四逆固非熱證亦非深寒
欬悸而或小便不利旣似乎水蓄腹痛泄利
又似乎寒凝其中更兼下重一證得母氣滯
在趺陽而經絡失宣通也耶

汪琥曰四逆散乃陽邪傳變而入陰經是解
傳經之邪非治陰寒也凡陽熱之極六脈細
弱語言輕微神色懶靜手足清溫有似陰證
而大便結小便數齒燥舌胎其熱已伏於內
必發熱也若用熱藥則內熱愈熾用涼藥則

熱被寒束而不得散法惟宜和表解肌疏通

氣血而裏熱自除此仲景四逆散所由設也

四逆散方

今註

甘草

炙

枳實

破水漬
炙乾

柴胡

芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸七日三

服

欬者加五味子乾薑各五分併主下利

悸者加桂枝五分

小便不利者加茯苓五分

腹中痛者加附子一枚炮令折

瀉利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸七內湯中煮取一升半分溫再服

解方

方名四逆散與四逆湯均治手足逆冷但四逆湯治陰邪寒厥此則治陽邪熱厥熱厥者三陽傳厥陰合病也太陽厥陰麻黃升麻湯甘草乾薑湯證也陽明厥陰白虎湯大承氣

湯證也此則少陽厥陰故君柴胡以疏肝之
陽臣芍藥以瀉肝之陰佐甘草以緩肝之氣
使枳實以破肝之逆三物得柴胡能外走少
陽之陽內走厥陰之陰則肝膽疏泄之性遂
而厥可通也或欬或下利者邪飲上下爲病
加五味子乾薑溫中以散飲也或悸者飲停
侮心加桂枝通陽以益心也或小便不利者
飲蓄膀胱加茯苓利水以導飲也或腹中痛
者寒凝於裏加附子溫中以定痛也或瀉利

解集

方有執曰人之四肢溫和爲順故以不溫和爲逆但不溫和而未至於厥冷則熱猶未深入也故用柴胡以解之枳實以瀉之芍藥以收之甘草以和之也

少陰病下利若利自止惡寒而踰臥手足溫者可治

註

少陰病惡寒厥冷下利不止者陰寒盛也今下利能自止手足能自溫雖見惡寒踰臥乃

陰退陽回之兆故曰可治

集註

程應旄曰少陰病下利而利自止則陰寒亦得下祛而又不致於脫雖有惡寒踴臥不善之證但使手足溫者陽氣有挽回之機故可溫而救之也

沈明宗曰手足溫者乃真陽未離急用白通四逆之類溫經散寒則邪退而真陽復矣故曰可治

少陰病惡寒而踴時自煩欲去衣被者可治

少陰病惡寒而踰陰寒證也若時自煩欲去
衣被者此陽回陰退之徵故曰可治

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿
膠湯主之

註

此承上條以出其治也少陰病得之二三日
以上謂或四五日也言以二三日少陰之但
欲寐至四五日反變爲心中煩不得臥且無
下利清穀欬而嘔之證知非寒也是以不用
白通湯非飲也亦不用猪苓湯乃熱也故主

集
註

程知曰二三日邪在少陰四五日已轉屬陽

明故無嘔利厥逆諸證而心煩不得臥者是陽明之熱內擾少陰故不欲寐也當以解熱滋陰爲主治也

黃連阿膠湯方

可加今去

黃連

四兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩

雞子黃

二枚

阿膠

三兩

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內

膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

集解

柯琴曰此少陰之瀉心湯也凡瀉心必藉連
芩而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和
而心下痞鞕者虛則加參甘補之實則加大
黃下之病在少陰而心中煩不得臥者旣不
得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃也
故用芩連以直折心火用阿膠以補腎陰雞

子黃佐芩連於瀉心中補心血芍藥佐阿膠
於補陰中歛陰氣斯則心腎交合水升火降
是以扶陰瀉陽之方而變爲滋陰和陽之劑
也是則少陰之火各歸其部心中之煩不得
眠可除矣經曰陰平陽秘精神乃治斯方之
謂歟

少陰病下利咽痛胸滿心煩猪膚湯主之

註身溫腹滿下利太陰證也身寒欲寐下利少
陰證也身熱不眠咽痛熱邪也身寒欲寐咽

痛寒邪也今身寒欲寐下利咽痛與胸滿心

煩之證並見是少陰熱邪也少陰之脈循喉嚨其支者從肺出絡心注胸中是以少陰之熱邪上逆則所過之處無不病也以猪膚湯主之解少陰上焦之熱兼止下焦之利也

集註

喻昌曰下利咽痛胸滿心煩此少陰熱邪充

斥上下中間無所不到寒下之藥不可用矣

故立猪膚湯一法也蓋陽微者用附子溫經

陰竭者用猪膚潤燥溫經潤燥中同具散邪

之義也

猪膚湯方

猪膚一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服

解方猪膚者乃革外之膚皮也其體輕其味鹹輕則能散鹹則入腎故治少陰咽痛是於解熱中寓散之意也

集成無已曰猪水畜也其氣先入腎解少陰之

客熱加蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗
湯

詮少陰病二三日咽痛無他證者乃少陰經客
熱之微邪可與甘草湯緩瀉其少陰之熱也
若不愈者與桔梗湯卽甘草湯加桔梗以開
鬱熱不用苦寒者恐其熱鬱於陰經也

集註喻昌曰用甘草者和緩其勢用桔梗者開提
其邪也此在二三日他證未具故可用之若

五六日則少陰之下利嘔逆諸證皆起此法
又未可用矣

甘草湯方

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七

合日二服

桔梗湯方

虛火何懾鵲叫歌

桔梗一兩

甘草一兩

右二味以水三升煮取一升去滓溫分再服

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

註

少陰病咽痛者謂或左或右一處痛也咽中痛者謂咽中皆痛也較之咽痛而有甚焉甚則涎纏於咽中故主以半夏散散風邪以逐涎也

集註

方有執曰此以風邪熱甚痰上壅而痺痛者言也故主之以桂枝祛風也佐之以半夏消痰也和之以甘草除熱也三物者是又爲咽痛之一治法也

半夏散及湯方

半夏

洗

桂枝

甘草

炙各等分

右三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸
七日三服若不能散服者以水一升煎七沸
內散兩方寸七更煮三沸下火令小冷少少
嚥之半夏有毒似不當散服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯

主之

言少陰病咽痛不愈若處者咽中爲病所傷潤乃生瘡不能言語聲音不出所必然也以苦酒湯主之用半夏滌涎蛋清斂瘡苦酒消腫則咽清而聲出也

集註程知曰咽痛忌汗忌寒下故甘草桔梗苦酒三方皆用和解之法惟半夏散及湯在前條爲辛散溫解之法也

苦酒湯方

半夏

洗破如棗核大十四枚

雞子

一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環
中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更
作三劑

集解

李杲曰大抵少陰多咽傷咽痛之證古方用
醋煮雞子主咽喉失音取其酸收固所宜也
半夏辛燥何爲用之蓋少陰多寒證取其辛
能發散一發一斂遂有理咽之功也

程知曰按卵白象天卵黃象地前黃連阿膠
湯用雞子黃義取入腎滋陰此苦酒湯用雞

子白義取入肺潤瘡也

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

註

邪傳少陰不從陰化而見寒證亦不從陽化而見熱證是其人腎氣素充所以藏雖受邪留連八九日仍復傳府外散也太陽主表故一身手足盡熱若熱還衛分非汗不解熱還營分非衄不解熱甚於上則頭痛目瞑衄血熱甚於下則腹痛尿難便血理必然也凡熱

少血多瘀成血畜熱多血少熱迫其血血不得畜今爲少陰邪熱復轉膀胱而傷營分迫使下竅故便血也

集註

程知曰前少陰病手足不逆冷反發熱者不死陽未全虧也此八九日一身及手足盡熱陰盛於裏也

張璐曰少陰病難於得熱熱則陰盡陽復故少陰篇中謂手足不逆冷反發熱者不死然病至八九日陰邪內解之時反一身手足盡

熟少陰必無此證當是藏邪轉府腎移熱於膀胱以膀胱主表故一身及手足盡熱也膀胱之血爲少陰之熟所逼其趨必出陰竅以陰主降故也

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

註少陰病二三日無陰邪之證至四五日始腹

痛小便不利乃少陰陽邪攻裏也若腹痛口燥咽乾而從燥化則爲可下之證矣今腹痛

小便不利是熱瘀於裏水無出路勢必下迫大腸而作利也倘利久熱傷其營營爲火化血腐爲膿則爲可清之證也今下利晝夜不止而便膿血則其熱已隨利減而下焦滑脫可知矣故以桃花湯主之益中以固脫也

集註

成無己曰要畧云陽證內熱則溢出鮮血陰證內寒則下紫黑如豚肝也

喻昌曰治下必先固中中氣不下墜則滑脫無源而自止註家曰用乾薑謂是寒邪傷胃

不知熱邪挾少陰之氣填塞胃中故少佐乾
薑之辛以散之也

程知曰此下利膿血之治法也腹痛小便不
利少陰熱邪也而下利不止便膿血則證爲
傷血且有中氣下脫之虞矣故用桃花湯固
腸止利也

魏荔彤曰此證乃熱在下焦而熏蒸中焦使
氣化因熱鬱而不行大便因熱盛而自利也
久而下利不止將腸胃穢濁之物如膿帶血

行醫金鏡錄卷一
火
盡隨大便而下熱一日不消利一日不止也
沈明宗曰此邪挾內濕凝滯血分則便膿血
也

桃花湯方

損火
今附

赤石脂一斤一半全用

乾薑一兩

糯米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合
內赤石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿
服

方解

少陰寒邪多利清穀少陰熱邪多便膿血日久不止關門不固下焦滑脫矣此方君以體膏性濤之石脂養腸以固脫佐以味甘多液之糯米益氣以滋中則雖下利日久中虛液枯未有不愈者也其妙尤在用乾薑少許其意不在溫而在散火鬱借此以開膿血無由而化也若一服愈餘勿服以其粘濤之性甚也

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

註

少陰病諸下利用溫者以其證屬虛寒也此少陰下利便膿血者是熱傷營也而不徑用苦寒者蓋以日久熱隨血去腎受其邪關門不固也故以桃花湯主之

少陰病下利便膿血者可刺

註

少陰病下利便膿血用桃花湯不止者熱瘀於陰分也則可刺本經之穴以洩其熱熱去則膿血自止矣

集

註 張璐曰先下利日久而後便膿血則用桃花

湯若不先下利而下利便膿血則可刺經穴
若刺經穴不愈則當從事白頭翁湯設更咽
乾心煩不得眠則又須黃連阿膠湯爲合法
也

林瀾曰刺者瀉其經氣而宣通之也下利便
膿血既主桃花湯矣此復云可刺者如痞證
利不止復利其小便與五苓散以救石脂禹
餘糧之窮故此一刺亦以輔桃花湯之所不
逮也

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

註

邪至少陰二三日卽口燥咽乾者必其人胃火素盛腎水素虧當以大承氣湯急瀉胃火以救腎水若復遷延時日腎水告竭其陰必亡雖下無及矣

集註

成無巳曰與大承氣湯急下之以全腎何也經云三陰經受病已入於府者可下而已則是上條少陰病乃入府證也少陰邪熱已轉

屬於府胃府實熱消灼腎水故口燥咽乾用大承氣以瀉府而實熱自除且少陰之藏本腎屬水胃府屬土瀉土所以救水也

方有執曰口燥咽乾者少陰之脈循喉嚨挾舌本邪熱客於其經而腎水爲之枯竭也然水乾則土燥土燥則水愈乾所以急於下也張璐曰按少陰急下三證一屬傳經熱邪亢極一屬熱邪轉入胃府一屬溫熱發自少陰皆刻不容緩之證故當急救欲絕之腎水與

陽明急下三法同源異派

汪琥曰少陰病得之二三日者非纔得病二三日卽口燥咽乾謂少陰口燥咽乾之病已得之二三日也

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

註 少陰病自利清水謂下利無糟粕也色純青謂所下者皆污水也下無糟粕純是污水此屬少陰實熱所以心下必痛口燥咽乾其爲

少陰急下之證無疑矣故當急下之宜大承

氣湯

集註

程知曰陽邪熱結口必乾燥設繫陰邪口中和而不燥矣故宜急下之以救陰也

沈明宗曰邪傳陽明必俟大便堅硬而攻下者迺未傷胃中津液之謂此利清水因少陰邪熱熾盛乘逼胃中津液頃刻勢已濱危不得不以通因通用急奪而救胃腎將絕之陰也

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

註少陰病六七日腹脹不大便者蓋因其人陽氣素盛胃有宿食故也所以傳邪已入少陰復轉屬陽明而成胃實故宜大承氣湯急下之也

集註

張璐曰少陰之證自利者最多虛寒則下利清穀虛熱則下利膿血故多用溫補傳經陽邪內結則自利純青水溫熱病則自利煩渴

並宜下奪清熱此以六七日不大便而腹脹
可見邪熱轉歸陽明而爲胃實之證所以宜
急下也

少陰中風脈陽微陰浮者爲欲愈

註

少陰中風脈若見陽浮陰弱乃風邪傳入少
陰則是其勢方盛未易言愈今陽脈反微陰
脈反浮陽微則外邪散而表氣和陰浮則裏
氣勝而邪外出故爲欲愈也

少陰病欲解時從子至寅上

註 子丑寅陽生漸長之候也病在少陰而解於
陽生之際所謂陽進則陰退陰得陽而邪自
解也少陰所重在真陽從可見矣

音切

蹠

音拳