

# 大主國家的生活

朝鮮文藝創作一年來成績顯著

朝鮮文學藝術過去一年中在創作方面取得了顯著的成績。

文學部門共創作了歌頌解放戰爭中的英雄人物的作品五百七十二件，美術部門發表的創作

共有一千四百三十件，演出戲劇六十齣，新拍的藝術照片有四萬零六百九十張，舞蹈創作有六十三

種，歌謡創作有三百八十八首。這些作品在鼓舞朝鮮人民的鬥爭意志，反映朝鮮人民的英雄年青一代的作用。

進朝鮮人民和各兄弟國家人民的友誼方面，起了很大的作用。許多優秀的作品得到了崇高的評價。如在描述朝鮮少年英勇鬥爭的藝術片「少年游擊隊」，在去年的國際電影賽會中得了「爭取自由鬥爭獎」。

參加第三屆世界青年與學生和平聯歡節的朝鮮人民藝術團演出的節目也得了獎。

羅馬尼亞石油工業的成就

新發的成果已經在蘇聯聯合國總部發表了。

十三。新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

新編的版權已經在蘇聯聯合國總部發表了。

石油是羅馬尼亞重要的財富，產量佔世界第五位。第二次世界大戰前美、英資本控制了羅馬尼亞的油產的第一大國。解放以後，羅馬尼亞在完全平等的原則下和蘇聯合組了蘇羅石油公司，蘇聯還去大量機器設備，保障了羅馬尼亞石油工業的恢復。羅馬尼亞五年計劃規定到一九五五年石油年產量要提高到一千萬噸。一九四九年羅馬尼亞開鑿的新油井比一九四五年增加了二倍多，一九五〇年又比一九四九年增加四倍多。由於採油技術的進步，許多過去的廢井已重新出油，單是一九四九年就從廢井中生產了十萬噸油。

## 華沙建築地下鐵道

現在，設計和指揮工作正在加速地進行準備工作。

車站和信號裝置等項工程已基本完成，車輛工作。

建築工人們正在大規模地進行挖掘地道的工作。

在每一個地道口，都設置了許多機器，包括挖土機、專挖泥土的機器等等。

波蘭的工廠正準備生產建築地下鐵道所用的各種物資。大批去蘇聯的技術人員和工人在蘇聯地下鐵道的工作。

波蘭政府已預備了在華沙建築地下鐵道的決定。

波蘭人民正積極地進行地鐵道的工作。

波蘭人民在前蘇聯的幫助下，正在進行地鐵道的工作。

波蘭人民在前蘇聯的幫助下，正在進行地鐵道的工作。

波蘭人民在前蘇聯的幫助下，正在進行地鐵道的工作。

波蘭人民在前蘇聯的幫助下，正在進行地鐵道的工作。

波蘭人民在前蘇聯的幫助下，正在進行地鐵道的工作。

中國工人畫刊 第五期 出版  
定價一五·〇〇〇元  
工人出版社 舉行 各地書局販售  
中國圖書出版社代銷

## 文藝報

一九五二年第一期 文藝界應展開反貪污、反浪費、反官僚主義的鬥爭（社論）  
由毛澤東的文藝理論來改造我們的工作

一九五二年第一期 在前蘇聯的幫助下，我們的勇氣和信心更加堅定地發展起來，我們的工作中檢討

一九五二年第一期 在前蘇聯的幫助下，我們的工作中檢討

## 然科學

一九五二年第一期 在前蘇聯的幫助下，我們的工作中檢討

# 充分发挥先进生产者在群众运动中的作用

刘 宁 一

近党中央和国务院在北京召开了全国交通运输、基本建設、財貨方面的先进集体和先进生产者代表大会。这次大会，是在党的总路綫的光辉照耀下，全国人民反帝、鼓干勁，掀起了增产节约的群众运动高潮的情况下召开的。出席这次大会的六千五百多名代表，代表着近三十万个先进集体和三百多万名先进生产者。这是一次空前盛大的“群英会”。它反映了我国社会主义建設群众运动的壯闊声势和社会主义建設突飞猛进的宏偉景象。这次大会，检閱了我国工人阶级的偉大力量，总结和交流了大跃进以来先进集体和先进生产者的經驗。无疑地，它将掀起更大的生产建設的群众运动，促进我国国民经济的繼續全面跃进，会发挥巨大的作用。

在革命和建設的群众运动中，总是会涌现出无数的先进人物和英雄模范。对于先进人物和英雄模范的作用，我們党从来是十分重視的。党中央和毛泽东同志一再教导我們，要发揚群众的首创精神，要善于发现和培养群众中的先进人物，大力支持群众的先进創

造和英雄行为。在革命战争时期，我們党在各个革命根据地，曾經多次召开过在革命斗争或是后方生产建設中作出重大貢獻的英雄模范人物大会。建国以来，中央和地方都不断召开过社会主义建設各个战綫上的先进生产者代表大会。党一贯重視宣传先进人物的事迹，总结和推广先进經驗，并且号召群开展向先进人物学习的运动。

我們党所以一貫重視群众运动，一貫重視先进人物，是从历史唯物主义的根本观点出发的。馬克思列宁主义认为，人民群众是历史的創造者，人类社会的历史，归根到底，生产的历史，是生产者的歷史。从这个根本点出发，我們党几十年来，无论是在革命时期还是在建設时期，都一直坚持大搞群众运动。先进人物是群众的优秀代表。重視先进人物就是重視群众。为了领导和开展群众运动，为了貫彻党的集中领导和群众运动相结合的方針，就必须充分发挥先进人物的作用。毛泽东同志曾經指出：“任何有群众的地方，大致都有比較积极的、中間状态的和比較落后的三部分人。故领导者必須善于团结

R24  
7-2

GJX 02124

消癰積聚

痰飲調經

較正醫林狀元壽世保元王集卷之九

大醫院吏目金裕雲林龍達賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

藿香○

外科諸證

惡氣止霍

亂溫中快

氣吐逆○

澤蘭○

治癰疔溫

九竅利膈

節破宿血

生肌利小

腸○

癰疽

夫癰疽瘡癰者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而發爲癰疽也夫此疾多生於豪梁富貴之人以其平昔所食肥膾炙煥安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽六腑之氣所生也其脉浮數疽者沮也平而內發屬乎陰五臟之氣所成也其脉沉數瘡者其總名也癰者有頭小瘡也經云諸痒痛瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯夾心火之熱而主癰疽之類也

荆芥。

散風熱清

頭目風利

咽喉瘡腫

賊風○

薄荷○

治風火發

汗利咽喉

口齒瘡癰

結核○

紫蘇○

葉發汗梗

胎子消

痰喘葉梗

然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵表廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌肉其發猛惡初生一頭如痞癟白色焦枯觸之而痛應心者疽也發熱於皮膚之間是以浮腫根小不過二三寸者癰也夫癰生於六腑若燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內潰骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易痊復夫諸瘡之中惟背疽疔瘡最爲急症其次莫如腦疽腸癰喉癰之類亦其急者也至若瘰疬懸瘡痔漏諸瘡之類其症可緩而治也又有疥癬瞼瘡風疳之類雖云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也夫癰疽之疾須要察其是實是虛是冷是熱或重或輕對症用藥無失先後次序癰便不可輕易待之若視之怠慢以爲常疾每見從微至顯喪命者多矣便宣速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至於燎原之勢不可撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用若已破憤臟腑既虧飲食不進一毫冷藥亦不可用此是先後次第之要訣也夫瘡有五善七

爲末治囊  
脫。

白甘鞠

治目風熱

梗枝葉解

癰疔毒煎

湯洗結毒

陳艾○

用粉糊裹

透日乾杵

去粉并葉

屑則成白

惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清朗四善也體氣和平五善也如恒爍時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡難近二惡也喘篴短氣恍惚嗜臥三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便汚者四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也声嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞咳逆身冷自汗無時目眩耳聾恍惚驚悸語言顛倒皆是惡症五善見三則善七惡見四必危五善併至則吉而安七惡全見必危而死矣

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處卽復者有膿不復者可消若按之都牽强者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也用諸拔毒之藥敷散四圍堅中軟者此爲有膿審也一邊軟亦可有膿都堅者此爲惡核或有氣也都軟者此爲有血血瘤也

外傳詳注  
卷之二十一  
一  
絀謂之熱

艾調經加

硫黃少許

作圓灸百

病○

茵陳○

治黃疸溼

熱通關節

去滯熱利

小便○

青蒿○

七月中節

內生紅蟲

取出共輕

當番堅軟虛實爲要若堅疽積久後若更變熱偏有軟處當軟處切不可針破也軟疽者溫煖裏衣置之耳若針灸刺破不可療也

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌魚羊鵝肉燒酒麪食生冷瓜果醃藏等物瘡口飲百日後不作渴症者方可入房

一凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時如往有喪之家弔孝并拜望等項其瘡腫卽復發切忌切忌

用藥治法

一凡癰疽等項大瘡毒初起一二三日內卽服飛騰神駿膏此藥治瘡初起至

將潰之際俱可服服後汙出將惡毒盡皆發散腫痛立消其妙如神若瘡已潰爛勿服如無神駿膏初起卽服槐花酒或千金消毒散二三劑患處卽用

灸法灸之瘡<sup>初</sup>刀初出至七日內皆可灸七日外不可灸瘡未及灸初起卽以葱

蜜膏或金蟾膏貼之卽消至四五日腫痛未消用芙蓉膏敷之立効敷之至

六七日作膿將潰未潰之時不得頂破用替針丸頻點瘡頭自然皮破出膿

粉砂和

入擣爲丸

如粟粒大

每丸裹以

金薄每歲

一粒乳汁

送服療治

急慢驚風

○夏枯草

○飛腦神駿膏

○麻黃

性寒以治

癰癰從無

一效久服

瘡自初起至此膿將出未出之際卽服真人活命飲一二劑瀉下膿血其瘡潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏搽之內服千金內托散以托瘻毒出外間服蠟燭丸以護膈膜二藥相兼服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣血衰憊脾胃損肌肉不生瘡不斂口用猪蹄湯洗淨將生肌散搽上外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減八味丸可以絕根庶幾再生若平日無瘡時肯預服之尤爲防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏効者皆予百發百中之良法也

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也

方見後諸瘡

○一論癰疽發背瘰疬鼠瘻氣瘻等症此專門之方其効捷如奔馬

○飛腦神駿膏

○麻黃

二斤去節取一斤淨

杏仁四兩熱水泡去皮尖用砂鉢搗爛又入水同搗澄

去滓直用清汁

○防風

去芦頭四兩

○地骨皮

去骨淨四兩

○甘草

四兩

○木鼈子

去壳十四箇

○頭髮

一大把溫水

○燈草

一大把

○黑鉛

一塊

○右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用大鐵鍋一口將前藥入鍋內主清水

則成癰瘍

○

牛蒡子

○

酒拌焙乾

研搗達肺

利咽消痘

瘳毒根莖

葉苦寒無

毒混名氣

殺醫生草

生搗塗消

一切癰毒

逐軟一切

二三桶煮至五六分看藥水濃時藥渣濾起藥水另放缸注又將前渣入鍋內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注前汁內如前法三次去渣將前二次汁并作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草三味不用其味香甜磁罐收貯五年不壞遇病每服三錢好熟酒調膏臨臥服厚被蓋出大汗爲度徐徐去被不可被風吹次早用猪蹄煨食汗後恐致虛人以此補之以復元氣好酒調服隨人酒量以醉爲度汗出立愈此治癰毒初起至潰破時前後皆可服神妙上立視候其紙先乾處即是結疽頭處取大蒜去皮橫切三文錢厚安在頭上用大艾炷於蒜上灸之三壯換一蒜片復灸痛者灸至不痛不痛灸至痛方住最要早覺早灸爲上方發一二日者十灸十愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭一處生者用大蒜搗成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者卽用獨蒜切片如前法灸之次日去痂膜自潰矣

堅肛大爛

葱蜜膏

生葱生蜜猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次

孔拔毒生

金蟾膏

治症同前

肌入膏煎

生白礬末五錢加麝香一分取活蝦膏一箇去腸肚同搗爛如泥四圍留

貼癰癰煎

湯洗楊梅

頂出氣不過一夜即愈

等毒○

○一論發背及一切疔腫毒不問已成未成但厭痛者

續斷○

槐花酒

槐花四五兩炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服其

每卽消

酒浸炒性

○一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜

微溫入肝

黑白牽牛各一兩搗碎好酒一碗煎八分露一宿次日溫服大便下

膿血即愈

家繕筋骨

○一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤瘻瘍疔腫魚口五發癰疽初覺一二日

助血氣消

便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮

血結胎產

肩壯熱大便閉結小便赤澁等症並治妊娠勿服百全南

干金消毒散

跌撲行血

連翹二錢黃芩一錢赤芍一錢當歸尾一錢金銀花

一錢五分

皂角刺一錢

天花粉一錢牡蠣一錢麻黃一錢防風一錢

大黃一錢芒硝一錢

止血○

外科證合

卷上二十二

二三七

二十一

二十一

二十一

二十一

二十一

二十一

卷之二十一

五雜誌

四

善成堂

蒼耳子

右剉一劑酒水各半煎服

去毛故損

○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起卽消已腫卽潰血從大便中出瘡潰後勿服

加減真人活命飲 又名千金內消散

治黃疸脾

當歸尾酒洗一錢五分

赤芍一錢

白芷一錢

木鼈子一錢去壳

穿山甲三大片

蛤粉一錢

天花粉一錢

附註

溼。

○益母草

金銀花三錢

皂角刺一錢

白僵蚕二錢

瓜蒌仁一錢去壳

大黃三錢

甘草節五分

○

右剉一劑水酒煎服

女科諸證

○一論癰疽發背腫痛如錐剜不可忍者登時痛止

皆良活血

芙蓉膏

芙蓉葉

黃荆子

各等分爲末

破血調經

止痛下水

消腫。

麻黃

連根發表

○一治癰疽發背已潰爛者

三神膏

草麻子仁一合

陳醋一碗

鹽一撮

右三味置鍋中用棍條攪成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用雞羽續

用梗不表

甘溫開喉

理凝滯閉

塞○

燈心○

利小便清

心火取活

竹一段兩

頭蓄節中

開一眼以

心塞實外

以原刻下

竹仍填原

眼外加泥

繩繫上其皮卽皺其肉卽生

○一論諸瘡惡毒發背癰疽痛不可忍者此藥能衛護內膜驅解諸毒自然消

加味蠟礬丸

黃蠟

枯白藥

乳香

沒藥

雄黃

蜜水送下

右爲細末用蠟鎔化爲丸朱砂爲衣如梧子大每服五十九粒

○一論癰疽瘡癰皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止

痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之

加味千金內托散

黃芪

益水炒

人參

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

白芷

防風

川厚朴

姜炒

桔梗

官桂

瓜蔞仁

去殼

金銀花

甘草節

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血出者及有汗出此藥之功也不問症候猛惡未成者自散已成者卽潰矣○

痛甚加乳香沒藥倍當歸芍藥

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當觸類而長之

裹入棟火  
內煨至竹

成一炭取

出去泥候

冷去竹炭

內是燈心

炭也治骨

髓敷陰疳

入護心散

○

地黃○

生用性寒

涼血滋陰

收功萬全湯

黃芪

蜜水炒錢五分

人參

一錢

白朮

去芦炒一錢

白茯苓

去皮一錢

當歸身

一錢五分

川芎

七分

白芍

酒炒七分

懷熟地黃

一錢

官桂

三分

白芷

三分

陳皮

五分

甘草

三分

防風

五分

右剉一劑生薑一片水煎溫服○如作渴加麥門冬五味子○如煩躁加生地黃麥門冬○如有痰加姜製半夏○如泄瀉加厚朴姜炒○如小便不利加澤瀉○如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒○如胸膈不寬加厚朴姜炒山楂○右方治癰疽發背諸瘡毒潰膿後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不合口膿清欲作餘症宜之

○一論癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉重困無力

八仙糕

解熱水煮

人參

去芦四兩

白茯苓

去皮四兩

乾山藥

四兩

艾實

去壳四兩

蓮肉

去心四兩

至中心透

裏然後每

斤入滾陳

酒半斤炒

斂瘡止痛生肌散

砂仁末一

官粉

火煅黃色  
一錢

黃柏一錢

黃連一錢

乳香一錢

沒藥一錢

孩兒茶各五分

錢再煮

至汁盡瀝

○一論癰疽發背潰爛便要此湯盪洗

起曬乾仍

猪蹄湯

當歸一錢

赤芍一錢

白芷一錢

羌活一錢

露蜂房一錢

生甘草一錢

一方加黃芩

入收盡原

汁再曬乾

右細剉

看瘡大小用藥如瘡大

加料用之先將

獐豬前蹄兩隻

一斤只用自

水三升煮軟

將汁分爲兩次

撥去上面油花

并下面渣肉

每次用藥一兩投

於汁中再用文武火煎

十數沸去渣以故紙蘸藥湯溫溫徐徐薄揩瘡上死

肉惡血隨洗而下淨洗訖以布帛拭乾貼膏藥仍避風

忌人口氣吹之有胡

臭人并月經見行婦人及猫犬並不許入病人房內

洗瘡切勿以手觸着

○一論一切惡瘡

癰疽發背等症

此藥能

逐毒去死肉有膿無頭

用此點頭上

髓同肉桂

不油白采

去苦米泔浸過一宿切片微炒四兩

白糖霜一斤白粳米二升水淘淨磨極

細末

水淘淨磨極

細末

水淘淨磨極

引火歸元

自然皮破出膿

癆陰分虛

督針丸

人言爲未入鍋內上蓋明礬燒不響爲度一錢

虧○

硇砂五分

巴豆十粒

乳香三分

沒藥三分白雄丁香七分

萃膝○

右爲細末麪糊爲丸如豆大用時以溫水磨化頻點瘡頭上神効

酒拌薑煎

督針散

用木鼈子川烏二味磨水以雞翎蘸掃瘡上留口大一處出膿如

補生用下

藥水乾再用刷上不一時即穿

行補腎強

四肢腰膝

換兩三次不許見風神効

華痛○

○一論治癰疽發背發項發腦等大毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫毒未

潰通敷自消如已潰將此敷周圍腫掀之處其破口處以神異膏貼之每日

逐漸去心酒浸

二合消毒散

文蛤搗碎炒黑色爲末三兩六錢

○去心酒浸

輕粉研三錢黃柏去皮蜜炙爲末二兩

寒水石煅爲末一兩

則補湯泡

右末合爲一處用新涼水一半蜂蜜一半調勻不稀不稠如瘡毒尙未開將

腫處遍敷之用綿紙覆于上但乾卽以水掃之朝夕更換二次如夏月或午

時再換一次亦可若已破將此藥敷于周圍掀腫處正有膿破口處用神異

膏微寒祛

毒浮腫

溴肺中伏

火安臟心

腹。

淡竹葉

解煩熱利  
竅治中風

口瘡日痛

胸淡熱毒

藥店有賣

葉如竹葉

甚薄梗如

柴心甚細

火煎油黑色

右用芝麻油二斤四兩將藥入鍋內浸春五夏三秋七冬十日以桑柴文武火煎油黑色以穿山甲浮起黑爲度絳瀉去渣再熬油滴水成珠陸續下黃

膏滿貼之不必留口亦一日三換

○一論癰疽發背潰爛又不生肌肉用此立効但此方用之不可太早

合口收功散

血竭一錢

乳香

沒藥

輕粉

龍骨各一錢五分

赤石脂一錢朱砂

海螵蛸各五分

右共爲細末散在瘡口上卽生肌內

○「論癰疽發背諸瘡毒不均已成已潰未潰者皆可用之瘡毒甚者每日換兩三治中壽換一次其藥力方能勝毒諸瘡潰膿後不長肌肉不合口者

神異膏

當歸尾五錢

川芎五錢

赤芍二錢

生地黃四錢

防風五錢

羌活五錢

白芷五錢

玄參五錢

黃芪五錢

官桂三錢

桃仁四十九個

杏仁四十九個

木鼈子十四個

何首烏三錢

牛旁子五錢

穿山甲四錢

露蜂房三錢

蛇退二錢

大黃二錢

黃柏二錢

亂髮男者一圓如雞子大者一圓

槐柳枝四十九箇每長一寸

七寸長者  
是今醫家

以開綠花

草誤用可

歎○

葛葵○

根水煎服

可癆白帶

花一兩擣

爛麝香五

分水一大

榦煎服可

瘻二便閉

無花時根

丹十四兩柳條攬不住手成膏軟

更得所再下乳香沒藥各三錢血竭三錢

絳真香末三錢次冷定下射香末二錢水浸二三日去火性攤用

○一論癰疽瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚舌或生黃及未患先渴此腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩燥作渴小便頻數或自濁陽痿飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先瘦服此以生腎水降心火諸症頓止及治口舌生瘡不絕

加減八味丸

懷生地黃

八兩好酒并砂鍋內蒸半日搗膏

山藥一兩

桂心去皮五錢

石楠淨肉四兩酒蒸搗膏

澤瀉切片蒸搗乾

白茯苓去皮各五錢

遼五味子二兩五錢

牡丹皮五錢

右爲末入石膏加煉蜜少許丸如梧子大每服六七十丸空心鹽湯送不

○一凡人久服加減八味丸必肥健而多子晚年服此不生癰疽諸毒

不患消渴等症

○一患癰疽之人雖云有熱皆因虛而得之愈後發渴及先渴而後癰疽非八

味丸不能治

亦可子催  
生落胎花

渴者服此不惟渴止痘亦不作

末酒服可  
下橫生倒  
產○

車前子

○一人平日口乾作渴因飲酒食炙燒補劑房勞凡若此類過多致令腎水枯渴不能上制心火故有此症後必有痘發也宜先服八味丸以絕其源及癰疽後服此尤有益也

○酒拌炒研

○一論癰疽發背諸瘡出膿濃爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒熱往來驚悸少睡以補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門神曲五味黃柏少

酒利小便

○睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白薇一錢肉桂五分如膿多或清倍加參芪補填分理陰○一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實爲切要凡膿血出多陰陽利小便

○見腫平痛竇遂以爲安慢不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉爲他病而危劇者多矣

肝肺強陰  
痢益精養

止痛○

# 附骨疽

外科卷之二

序

上卷卷之二

李本草

馬鞭草

○

苦微寒熬

膏空心酒

服半杯治

癰瘕殺蟲

通經活血

塗癰癩疽

湯熏洗陰

腫洗楊梅

惡毒○

連翹○

瀉心火脾

黃連消毒飲

胃溼熱結

黃連

卷活各一  
黃芩

黃柏

黃柏

藁本

防已

桔梗

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味反勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之症也

又曰環跳空痛不止生附骨疽以蒼朮爲君佐以黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草爲佐作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者恐前藥十數劑發不動少加麻黃一二劑又不動者恐疽將成急掘地坑以火煅坑通紅沃以小便今患者赤體坐于坑中以席或綿衣圍抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而愈

○一論瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅破慢腫行步作痛或不能行

內托黃芪湯

紫胡

連翹

肉桂

大力子

黃芪

黃柏

當歸尾

升麻

白芷

甘草

各八分

右剉一爛酒各一盞煎至一盞食前溫服

○一治附骨疽

熱腫毒心

家客熱通

歸尾

各分

生地黃

知母

獨活

防風

連翹

各四分

黃芪

經。

紫花地

丁子

療癰疔瘻  
堅肛稻麥  
芒黏咽喉  
嚼爛嚥下

卽安。

大黃。

每斤用陳

酒五斤煮

爛白乾名

人參

甘草

陳皮

蘇木

澤鴻

各二分

珍珠象牙膏

楚黃賓工傳

珍珠

用豆腐一塊切兩片將珠鋪在內兩片合住縛定入水煮三炷

象牙

香爲度研細末一不

天花粉

未五分

官粉

末一不

白蠟

一不

香油

五升

右共合一處入碗內重湯煮化澄成膏紙搘貼患處神効

一治諸瘡大疼痛不辨肉色瘦腫光色名曰附骨癌又治瘡口久不合酒調

外和諧治  
熟軍治燥

結熱毒清

服燒灰略存性

露蜂房

蛇蛻 亂髮洗淨各等分

實火下宿

積化停食

生熟功同

熟者純○

菌蘆○

有毒忌鐵

器擣敷石

疽消渴哽

通二便疏

羌活湯

丹溪曰：臂癰者，臂居小腹之後，在下此陰中之陰道遠位僻雖曰太陽多血然氣運不到，血亦罕來。中年後尤慮患此，纔有腫痛，參之脈症，但見虛弱，便與滋補血氣可保終吉。若無此補之功，其禍多在結痂之後，或半年以來，乃病多致失手，慎之慎之。

○一論足太陽經中左右尺脉俱緊，按之無力。尻臂生癰，堅硬腫痛大作，內托疽消渴哽，通二便疏。

洩水腫有

排山倒岳

之力腰腹

羌活

黃柏酒炒各防風

藁本

歸尾不一

黃芪

一分

蒼朮米泔水

連翹

陳皮

甘草五分

肉桂三分

右剉一劑

酒水同煎空心溫服，以衣覆盖患處，使藥力行，常不可去。

之腰腹

力

# 腸癰

大戟○

丹溪曰腸癰常作溫熱積治入風難治

苦寒有毒去附枝水  
煮透去骨切曬消頭

于金調腸癰妄治必殺人其病小腹重強按之則痛小便如淋時時汗出復惡寒身皮甲錯肚腹緊急如腫之狀脉數者微有膿也巢云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水声或達脇生瘡或膿自脇出或大便

膿血急服蠅礬丸酒下兼進後方

腹癰塊癥

○一論腸癰便毒癰疽初起卽消已腫卽潰血隨大便中出宜

桔梗

于金內托散

方見癰疽卽加滅真人活命飲

胎治鼓癰

○一論肚內生癰及癰疽惡毒宜

利二便○

內消沃雪湯

當歸身

白芍

黃芪

甘草節

麝子

連翹

甘遂○

香白芷

皂角刺

貝母

陳皮

穿山甲

乳香

沒藥

每斤用甘

天花粉

金銀花

木香

青皮

甚者加大黃

草四兩煎

右剉酒水煎服秘方是世所奇拔之如神

本草綱目卷之二

三七

本草綱目卷之二

三七

本草綱目卷之二

三七

湯浸三日  
湯黑去湯

河水淘洗

取清水口

淘日浸每

日換水數

次三日後

去心再淘

浸四五日

取一撮入

白朮盆內

隔一宿次

日盆中水

無異色乃

## 囊癰

○一論腸癰腹痛不安或腹滿不食小便赤婦人產後虛熱多有此疾但疑或間便不服服亦無害視其右關脉芤者是也

薏苡仁

二兩

牡丹皮

一兩半

瓜蔞仁

一兩

右剉一兩水煎服

○一方加川芎桃仁

○一婦人腹痛如錐劄每痛至死不敢著手六脉洪數此腸癰毒也用

穿山甲

炒

白芷

貝母

殼蚕

大黃

○右剉一大劑水煎服打下膿血自小便中出卽愈後再無患宜少食煎炒

○一治腸癰曰久潰爛出膿腹內刺痛不可忍者

用鐵打

一尺長三稜針將鴨腸一條貫針在內將鴨腸曲轉輕輕送入糞

門內送到痛處方是瘡癰之處卽將鴨腸扯動針尖出刺破其毒膿隨針而出用手重按痛處膿出盡而愈此仙傳秘法也

安再潤三

四次瀝乾

以麪裹如

圓入棲火

燶爛至麪

露四面皆

黃內藥熱

透取出驅

乾入鍋炒

透磨粉其

苦寒之毒

國老湯

經製則淨

不苦而甜

不寒而溫

水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開等九懸掛水出以輔炭末敷之外以紫蘇葉包裹仰臥之養

○一論癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿

潰皮脫墨九懸者皆不死

○一方用野紫蘇葉面青背紅是也焙乾爲末敷之如燥者以香油調敷囊無皮者外以青荷葉包之其皮自生

## 患癰

○一論癰疽此瘡生谷道外腎之間切發甚痒狀如松子四十日赤腫如松脂遲則破而大小便皆從此出不可治矣

用橫紋大甘草一兩截長三寸許取出山澗中流水一碗不用井河水  
以甘草蘸水文武火慢炙不可急性須用三時久水盡爲度劈視草中潤透却以無灰酒二碗煮至一碗溫服一日一服半月消盡爲度

專消堅結

將軍散

大黃

貝母

白芷

甘草節

安鬼毒核

右爲未酒調空心服○虛弱加當歸一半

○一論肝經濕熱玉莖患瘡或便毒懸癰囊癰腫痛或潰爛作痛小便

澁滯或  
壅滯排

龍膽子

龍膽寫肝湯

龍膽草

酒洗炒黃

澤瀉各一錢

車前子炒

木通

山梔炒

炒

生地黃

酒洗當歸尾

酒洗炒黃

黃芩炒

甘草

石剉水煎空心服

研粉去淨

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

油方安拔  
毒孕婦忌

瘰癧屬血氣痰熱必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此一端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此其屬

用○常山○

膽經生決斷有相火且氣多血少婦人見此其月經如期不作寒熱者易治

積外寒爲潮熱危矣自非斷然食淡神仙不治也

生用損神

喪氣切薄片曬乾每

○一論瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後連及頤領下連缺盆皆爲瘰癧或在胸前及胸之側下連兩脇皆爲馬刀半足少陽主之獨形而小者爲結核續數連結者爲瘰癧形長如蛤者爲馬刀也

一斤用陳酒對浸浸透取漚。○一論選項起核名曰蟠蛇癰延及胸前連腋下者名曰瓜藤癰右耳根腫核者名曰惠袋癰右耳根腫核者名曰蜂窩癰。

○一論瘰癧馬刀生耳前後或項下胸腋間累累如珠者未破已破皆治

乾收盡斤

消毒化堅湯

當歸一錢白芍大分黃芪一錢玄參六分天花粉六分連翹一錢五分

柴胡一錢黃芩五分牛蒡子七分龍膽草四分

海昆布七分升麻七分桔梗一錢

陳皮八分羌活七分薄荷四分

甘草四分

消愛甘草

右剉一劑生姜煎服○一方加甘草節知母貝母海藻更佳

對分截癰升陽調經丸

升麻八錢葛根五錢芍藥三錢連翹五錢

黃連五錢

黃芩酒炒五錢

聖藥○

桔梗五錢

生黃芩四錢黃柏酒炒五錢

莪术酒炒五錢

歸尾三錢

川附子

龍膽草酒洗五錢

甘草錢

○

右藥秤一半另研爲末煉蜜爲丸如菉豆大每服一百二十九白湯不一半

作咀片每服五錢水煎服半月卽痊

○

有痔今民患深山

○一論久患瘰癧流注以致氣血兩虛懷抱抑鬱飲食少思或四肢患腫肉色

家栽種無

毒用水浸

一二宿日

易水浸去

酸麪裹火

煨切片回

乾補腎肝

陰虛治中

風癱瘓陰

陽虛氣○

川烏○

功同附子

性緩助陽

補命門不

○一論瘰疬未破在左爲瘰癧宜

不變或曰晡發熱或潰而不斂久不愈者

益氣養榮湯

黃芪

人參

白朮

去苦炒各當歸酒洗

白芍

炒黃川芎

陳皮

香附

生地黃

貝母

各一錢

柴胡

地骨皮

甘草

右剉一劑水煎食遠服○如有痰加橘紅○如脇下刺痛加青皮或木香○如午後有熱或頭微眩加黃柏炒○如腹水清倍人參黃芪當歸○如女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母○如月經不調加牡丹皮當歸

○一論瘰疬兼諸瘤皆治

抑氣內消散

當歸

川芎

白芍

炒去蘆

白朮

去穢

白芷

半夏

姜炒

陳皮

桔梗

羌活

獨活

厚朴

防風

黃芩

烏藥

香附

枳榔

一蘇子

五兩沉香

三錢木香

人參

粉草

錢各五

右剉水煎溫服十餘服卽消若再發照分兩製爲末酒糊爲丸如梧子大每

服五十丸溫酒送下

足破積冷

內消調經散

山東李西領傳

利○

草烏○

升麻

葛根

龍胆草

黃連

桔梗

連翹

黃芩

有烈毒去

皮取白肉

○一論在右爲馬刀瘡未破宜

右剉水煎服

○稍虛加夏枯草

○有痰加天花粉知母各五分

○少陽加柴胡四分

每斤用綠豆半升同

去豆取烏

補中勝毒湯

柴胡

連翹

歸尾

鼠粘子

甘草

黃芩

○一論癰瘍已破者

柴胡通經湯

三稜

桔梗

黃連

紅花

右剉

一劑水煎熟服

切曬磨粉

○一論瘰疬并頸項結核或腫或痛宜夏枯草水煎食後頓服

一方用夏枯草一

水煎三次去渣熬成膏貼患處立消

黃芪一錢

人參三分

甘草五分

當歸

生地黃

熟地黃

白芍各三分

陳皮三分

升麻

柴胡各五分

連翹一錢

防風五分

右剉水煎熱服

○一論瘰疬并頸項結核或腫或痛宜夏枯草水煎食後頓服

一方用夏枯草一

水煎三次去渣熬成膏貼患處立消

癰結追筋

○一論瘰疬并頸項結核或腫或痛宜夏枯草水煎食後頓服

一方用夏枯草一

水煎三次去渣熬成膏貼患處立消

給寒瘀開

○一論瘰疬并頸項結核或腫或痛宜夏枯草水煎食後頓服

一方用夏枯草一

水煎三次去渣熬成膏貼患處立消

腠理以黑

○一治癰歷元氣無虧用此以去之若歷既去而不收斂眼前益氣養榮湯若

元氣怯弱宜先補後服癰毒已後仍服前湯庶無他疾此方治癰未成者

消已潰者飲須元氣壯者可服

皮炙研醋

調治蛀髮

癬○

半夏○

必效散

南硼砂

二錢輕粉

一錢射香

五分巴豆

五个去皮心

白梔榔

一个斑猫

四十枚去頭足同糯米炒熟去米

選肥者生

鹽明礬湯

浸透煮透

切片日乾

○一治遠年鼠瘻瘡神方

消炎墮胎

千追綠雲膏

生研細末

○一治癰歷元氣無虧用此以去之若歷既去而不收斂眼前益氣養榮湯若

立療乃谷

○一治癰歷元氣無虧用此以去之若歷既去而不收斂眼前益氣養榮湯若

跌破止血

○一婦人患癰瘻久而不愈或以爲木旺之症不宜於春預用散腫潰堅湯腫

松香

半斤鎔七乳香

二錢半沒藥

一錢半

皿蠍

一錢銅綠

一錢半

杏仁

去皮一錢孩兒茶

三分草麻子

去壳二兩

二麻油

二兩乳汁

一盞

蚤休卽

紫河車

草○

去皮毛切

焙微寒治

乳癰疔毒

五味子○

○

鹽水拌蒸

滋腎水不

足強陰固

精主收斂

○

夫疔瘡者由四時迭更陰陽交變此三氣互相激怒必成暴氣然暴氣卒然大風大霧大寒大熱若不能避而遇襲於皮膚入於四體傳注經絡遂便腠理

硬益甚余以爲肝經虧損用六味丸補中益氣湯至春而愈此症若肝經風火自病元氣無虧可用散堅燻青之劑若肝自虧損或水不生木用六味丸

若金來尅木須補脾土生腎水若行攻伐則脾胃傷而反致木尅土矣

○一婦人項核腫痛察其氣血虛實先以必効散一服去之更以七益氣養榮湯

三十餘劑補之而消盡此症初起而血氣虛弱者先用益氣養榮湯待其氣血稍充乃用必効散以去其毒仍用補藥無不奏効若已成膿者卽針而補托之氣血復而核不消者服散堅之劑倘不應而氣血如故仍以必効散養榮湯又不應灸肘火肩鶴二穴用干糙綠雲膏自愈若氣血壯實不用追蝕亦能自腐用藥以腐之者便易於收斂耳若血虛而用追蝕不惟無益適以

取敗凡不慎飲食七情者不治

## 疔瘡

黑白牽牛仁

酒拌曬除

溼熱壅結

通大腸閉

殺蟲祛積

○飛龍奪命丹

方見諸瘡

番木鼈

○水浸半月

入鍋煮數

滾再浸熱

湯中數日

刮去皮心

右爲細末糯米糊爲丸如黃豆大雄黃爲衣每服十三丸小兒五七丸用葱

○結滿陰陽二氣不得宣通遂成疔毒但疔毒之名有十三種心發於手足間  
主黃泡其中或紫色有一帶紅綠道直入者用針於線處刺去毒血水針時  
以知痛出血爲妙否則紅線入腹攻心必致危困凡治疔毒先以麴漿水飲  
之吐則是不吐則非也大抵脉洪而數者難愈也

○一治疔瘡惡毒神姑

方見諸瘡

○一治疔腫及無名瘡毒搘頭去白水以葱蜜搗貼

神姑

○一治無名腫毒疔瘡手指無故生蛇頭指痛腫不可忍有紅筋入心者

蜈蚣二條

歸尾二錢

雄黃一錢

土赤芍二錢

白芷梢二錢

○右剉爲末頭生酒煨服神効

趙府小靈丹

乳香

沒藥

輕粉

血竭

硃砂

細辛

草烏尖

麝香

巴豆霜

麝香減半

川烏尖

入香油銅

中煮至油

沫盡再煮

百滾透心

黑肥以鐵

絲篩撈出

卽入當日

炒透土基

細粉內拌

拌至土粉

有油氣入

粗篩篩去

油土再換

炒紅土粉

○一論一切疔瘡惡毒廰痛神効

類聖散

防風

○一凡患疔瘡癰疽癯毒

此藥能令內消去毒化爲黑水從小便出

各五錢

右爲細末雞清調塗患處留頭

川烏

甘草

各一錢

知母

貝母

皂角刺

金銀花

卽入當日

炒透土基

細粉內拌

拌至土粉

有油氣入

不可輕視

草烏

萬無一失

細辛

白芷

各一錢

細辛

白芨

穿山甲

炒

乳香

各一錢

半夏

天花粉

萬無一失

薄荷

萬無一失

萬無一失

萬無一失

潤濕過一宿自然消不必用第二服藥也忌發物

○一人脚面生疔形雖如粟其毒甚大宜峻利之藥攻之因其怯弱以隔蒜灸  
一五十餘壯瘥遂止再灸片時乃知痛更用膏藥封貼再以人參敗毒散漸愈  
夫至陰之下道遠位僻且怯弱之人用峻利之劑則藥力未到胃氣先傷虛  
虛之禍有所不免不如灸之爲宜

拌一時再

篩去土如

此三次油

淨以木鼈

同細土鍋

內再炒入

盆中拌罨

二夜取鼈

追毒散

當歸尾

赤芍

白芷

金銀花

天花粉

各一錢

大黃

三錢

入藥獨有

芒硝

白姜蚕枝

炒六

木鼈子

什穿山甲片

一方加五靈脂更妙

木鼈之功

右剉一劑好酒煎露

一宿五更熱服厚蓋發汗利

一二行卽愈其硝黃待羣

而無一毫

藥煎將熟方入再二沸用之

○一方加射干去芒硝

之害能搜

○一論魚口便毒方

筋骨入骱

神異散

金銀花

天花粉

木鼈子

各二錢

甘草

三分連翹八

山梔子七分

# 便毒

便毒一名跨馬癰

此奇經衝任爲病而癰見於厥陰經之分野

其經多血又名

血癰或先有瘡瘍而發或卒然起核疼痛而發

皆熱鬱血聚而成也初發宜

疎利之卽散或膿後如常用托裏內補之藥

一論便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸

以生薑煎食前服得利

二三行立効射干開紫花者是

一論便毒極効方

之風溼祛

皮裏膜外

凝結之痰

毒煎木鼈

之油俟熬

化核膏入

用○

天花粉

○治癩熱脣

乾口燥瘡

○治癩熱脣

熱癰排膿

○

天蠶冬

右剉一劑酒水各半煎服

黃芩八分穿山甲炒二錢皂角刺三錢木香五分

大黃三錢右剉一劑酒水煎服

空心

○治便毒腫痛神方 徐完愚傳

大黃

全蝎

蟬退

姜蚕

穿山甲土炒珠白芷稍

貝母

當歸尾各二錢

右合一帖水煎後加入大黃再煎三沸去渣入好酒同服如未散

加蜈蚣一條同煎服

○治魚口瘡方

用猪膽一枚投熟酒一碗溫服卽內消

○治魚口便毒方

木鼈子去壳三十個巴豆去壳火燒二個川山甲四片炒姜蚕三個五倍子五個

○右爲末黃酒調下

○一治魚口便毒方 嘴雲岳傳

姜蚕炒三十個穿山甲土炒三錢蜈蚣二條一甘草節一錢大黃三錢

杏仁去皮尖一錢五靈脂二錢全蝎一個皂角子炒一錢金銀花一錢

○云心酒潤

# 下疳

治陽物不起潤五臟欬嗽消癆下疳瘡乃男子玉莖生瘡皆因所欲不遂或交接不潔以致邪毒浸漬發成瘡毒日久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤又魚口瘡妬精瘡皆其類也俗云疳瘡未已便毒復來生也

降火去風姤精瘡此蓋因婦人陰中先有宿精因而交接虛熱薰蒸卽成此疾初發在陰頭如粟類拂之痛甚兩日出清膿作白孔蝕之大痛婦人有生於玉門內正似疳蝕瘡不痛爲異耳

土茯苓

消疳敗毒散

防風

六分獨活

六分柴胡

一錢連翹

七分荆芥

七分黃柏

八分

黃柏

八分

龍膽草

九分

知母

七分

黃連

七分赤芍

九分蒼朮

七分木通

九分甘草

三分

赤茯苓

九分

○清熱泄瀉

母蒸莉門

右剉一劑

燈心

二十四寸

水煎空心服

如有便毒量人虛實加大黃

一錢

煎服

○一治下疳瘡

天靈蓋

煅

紅褐色

小紅棗

各燒存性各等分

右爲極細末先用好細茶煎濃洗淨摻之

楊梅毒訛

語也未見

○一治下疳痛不可忍如神

官粉

煅五錢冰片二分水銀三分用湯三分

燒成灰

存性

用湯三分

用瘧一人

右爲細末摻瘡上

○一治下疳潰爛

珍珠

燒存性片腦各一分人手指甲足指甲

燒成灰各一分

白蘚

血餘

燒成灰各等分

右爲細末摻患處

苦平無毒

○一薰下疳方

皮硝一碗

乳香

雄黃六分

孩兒茶各五分

生肌止痛

右入小鐸內外用牛糞火煨熟鐸其硝自化薰之晚上使以心口涼爲度

解狼毒

○一治陰頭上疳瘻

何和字傳

毒

○一倍子

燒成灰存性一錢七分

朱砂七分

孩兒茶五分

木通

○一水片

半分

輕粉二分五厘

水銀一分

微寒開末  
開之月經

右共爲細末撒患處○如從一邊爛起加狗骨燒灰二分○如從周圍爛起  
加鼈殼燒灰二分

通閉塞之

○一方疳瘻秘方

經水和血

八寶丹

乳香

沒藥

孩兒茶

紅褐子灰

海巴

煅一

珠珍炒

脈利小便

象牙

煅龍骨

煅各五分

右爲細末先用米泔水洗瘻拭乾摻上神效

小科訣略

卷之二

正集卷九

七

卷之三

清伏熱散

癰腫下乳

○一府瘡膿清不結痂不愈者用

六味地黃丸加黃柏知母麥門冬四五劑而愈

○治下疳瘡摻藥

陳鍾岳傳

防己

水片

珍珠

黃柏

以猪胆塗上火

天靈蓋

火煅白

輕粉

炒三

寒酒潤治

蘆薈

一分

右共研細末

搽患處如有殼

香油

調搽

膀胱蓄熱

○治疳瘡

黃柏去皮以猪胆炙透爲末摻瘡上

利二便瘀

○治陰囊上生瘡

用甘草煎水溫洗却用臘茶末敷之

下部紅癰

○治陰頭生瘡

用溪港中螺螄入乾鍋內煩過先以溫水洗五

七次後以此藥敷之

○治妬精瘡

用大田螺兩箇和壳煩過存性爲末輕粉敷之

金銀花

○治外腎生瘡

用荳豆粉蚯蚓屎二分水研塗乾又敷

○治腎臟風發瘡疥

用紅椒去目水浸半日和生杏仁研爛擦兩手掌

揜外腎極効

消癰毒取

活蓀煎膏

○治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澁食亦減身面微腫

以花拌入

馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻敷上

收曬其解

毒之功勝

花百倍暑

天日取錢

許滚湯衝

當茶○

藤黃○

酸漬有毒

蛀齒點之

便落忌喫

菸○

澤薦○

通利小便

走腎膀胱

○一治下疳瘡

白簪

一兩

黃丹

八錢熬飛紫色

右研爲細末以溝渠中惡水洗過拭乾敷上

○一治臘燭發神方

鍾乳石

三分硃砂

三分珍珠

三分琥珀

一分五厘

人腦

一分五厘

右爲細末每用土茯苓四兩豬蹄二隻煎水三碗早間服一碗調前藥末四厘午間服一碗調藥末四厘晚間服一碗調藥末四厘一日服三次共一分二厘十日服盡其瘡必愈其豬蹄隨用之忌動風發物牛肉燒酒最忌之神良之秘方也

## 楊梅瘡

夫厲瘡者一名楊梅瘡因形相似乃氣受之故堅實凸起又名棉花瘡血受之其形扁瑣而潰又名果子瘡亦類其象而俗呼之也北名曰天泡瘡皆一名異而實同源治療當別自致者重傳染者輕蓋自致者必謂淫慾太妄以致陰處起火及縱口恣味三焦皆精熱竭血結遺滯諸經而成者也俗傳以母

有汎濁者

忌用○

海藻昆

布○

性寒稱治

瘧癆聖藥

邵謬當禁

用○

仙人對

半草○

四季梗葉

長青臨冬

不衰毒蛇

咬擣汁飲

猪犬羊肉雞魚毒物發出謂毒盡殊不知在火上添油矣又右怕露出而求速効者過服敗毒散則傷五內胃氣毒益咱伏以藥線薰脣致使出不得出

收不能收延潰不能杜絕手足心皮枯似白鵝掌風反後筋骨疼痛風塊惡

侯皆未獲良治而然也凡遇此患托裏解毒湯外用千里光明湯頻頻洗浴

托裏解毒湯 當歸一錢川芎一錢赤芍一錢生地黃一錢連翹一錢

荆芥穗七分黃芩二錢黃連一錢防風一錢薏苡仁二錢皂角子二個

生甘草三分苦參酒沙二錢羌活一錢防已一錢木瓜五分土茯苓二兩

右剉水二碗煎一碗溫服渣再煎服○虛弱人加人參一錢○自生者加黃

柏一錢川牛膝一錢川獨活一錢宜服二十帖每帖煎三次一日服一帖

千里光明湯 青木香 黃連 黃柏 黃芪 防風 蛇床子

蒼耳子 荆芥 黃參 羌活 升麻 麻黃 甘草

雞腸草 培凍青葉 培

右剉一劑用布包水煮於無風處服下煎藥卽以此湯浴洗涼了又加熱藥

湯煮熱著實洗微汗拭乾十日後不必頻洗其藥渣并人煎藥渣再洗雞腸

以塗立

癥○

穀芽○

啟脾進食

寬中消食

○

浮麥○

止虛汗盜

汗虛熱○

麥芽○

開胃消食

和中○

大麻仁○

連翹○

金銀花四兩

牙皂二兩

杏仁二十個

蟬退二十個

肥珠子二個

冷飯團一片

草一名千里光明草又名九里明俗名藤枯賣其葉稍尖而岐開花處有之

○一治楊梅瘡初起先服防風通聖散十餘劑後服此收功永無後患

十全丹 雲萊弟驗

雄黃

朱砂

乳香

沒藥

孩兒茶

當歸 白芷

丁香

槐角

各一錢粉

用花椒一錢煎水調蒸入

細辛

一兩三錢

右爲細末飯爲丸如菉豆大每服三十丸土茯苓湯下

○一治楊梅瘡先服防風通聖散加紫草一兩同煎服後服此

白蘚皮二兩

皂角子一百二

防風二兩

細辛

一兩三錢

川烏二兩

草烏二個

鶯粟殼四兩

右剉十劑每劑用土茯苓一斤豬肉半斤同煎服

○一治楊梅瘡

黃左川傳

青藤二兩

當歸尾二兩

皂角刺二兩

金銀花一兩

五加皮一兩

白蘚皮二兩

右剉分作十二劑每劑用土茯苓四兩水煎服先服通聖散

○一治楊梅瘡毒

黃仰溪傳

利大腸熱

燥大便熱

結○

薏苡仁

○一治楊梅瘡良方 胡雲齋傳

歸尾

一兩三錢

牛膝

一兩三錢

黃芩

一兩三錢

大黃

一兩三錢

木瓜

一兩

補肺益脾

金銀花

一兩三錢

皂角刺

八錢

蟬退

五錢

土茯苓

二斤

去溼消水

右剉分作十帖

每帖用紅棗白果

皂角子各十枚

葱白三根

水煎臨晚服

忍豆

○小黑豆

○一治天泡瘡神方

用鐵秀釘釀醋

磨濃搽上立已

同甘草除

○一論凡人患楊梅天泡棉花等瘡致成一切難狀之疾

或楊梅瘡爛見骨經

年不收口者或筋骨疼痛舉發無時

或遍身疙瘩不消或手足皴破出血或

遍身起皮發癰好一層起一層或赤癥白癩鵝掌風癬

或皮好骨爛口臭難

當及年久廉瘡不愈一切頑瘡惡毒並皆神効

通仙五寶湯

鍾乳粉

三分

大朱砂

一分

琥珀

一分

水片

五厘

珍珠

一分五厘

熱臍中結

右爲細末用白飛麪炒三分共一錢

二分分作十二帖

每一日一帖用一分

瘡胃中脾

分五厘

五厘

五厘

五厘

五厘

白豆豉

解魂毒除

痰欬同生

礞石爲丸療

冷哮○神薑○

消食健脾

暖胃止瀉

吐破堅結

○

紅薑○

輕粉一錢

孩兒茶一錢

糯米飯一錢

芝麻一錢

炒消食活

右共搗爲丸作一百个每早茶下十九忌鹽要齋戒

蘋

用土茯苓一斤水煎十二碗每侵晨用半碗和服其十二碗一日俱要吃盡不可別用茶湯一日一服有不盡劑而愈者有終劑而愈者如病重未愈須

再服一料忌雞鴨魚牛羊發物及房勞

雞鴨魚牛羊發物及房勞

○一治楊梅風塊作痛作腫及癰疽瘰疬一切無名腫毒

黑虎膏

草烏四兩

南星二兩

半夏二兩

大黃一兩

黃柏一兩

姜黃一兩

乾生薑五錢

五倍子三兩

同紫豆五兩共炒焦

右各爲細末共和匀用葱汁米醋調成膏貼塊上時常以葱醋潤之毋令乾燥其膏一日又取下加些新的復研再貼以消爲度

○一楊梅瘡愈後遺癬毒一層一層頑皮痒不可當

牛油

香油

柏油

黃蠟

各一兩

搗化待銀硃

一錢

宮粉

一錢

射香五分

右爲末入內攪勻先將火烤癩令痒抓破擦上藥再烤再擦

如神功

○一治楊梅瘡不論遠近先服防風通聖散十數劑後服此丸收功神妙

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

血健脾胃

療癩酒服

除產後惡

血○

白芥子

炒研皮裏

膜外陰塞

之疾非此

不消○

生薑○

溫中去穢

除風邪暖

胃消寒疾

○一治楊梅瘡

雄黃

二錢  
五分  
真輕粉

一錢杏仁去皮尖三十個

拭乾搽藥

右研爲細末入杏仁再研如泥用雄猪胆汁調搽瘡上要先洗淨

二三日

## 疥瘡

夫疥瘡與癬因熱客於皮膚之所以致風毒浮淺者爲疥也毒之深沉者癬也多因風毒夾熱得之疥發於手足或至遍身癬則肌肉癰疹或圓或斜或如苔癬走散內藏汗而外藏有筐曰乾癬苔癬風癬濕癬四者莫不均有蟲者治癬去風殺蟲是也

○一論風瘡疥癬癰疹紫白癰風赤遊風血風瞼瘡丹瘤及破傷風在上部者加桔梗一錢在下部者加木瓜牛膝各一錢如濕氣成患而在下去蟬退蟬祛風敗毒散 枳實 赤芍 前胡 柴胡 各五分 荆芥 薄荷 牛蒡子

獨活

蒼朮 各六分

姜桑

連翹 各七分

川芎

羌活 各八分

蟬退

甘草 各三分

右剉一劑生姜三片水煎服

○一薰疥如掃

銀硃 一錢 雄黃 一錢 木鼈子 一個 好蠶香 一錢 艾葉 三錢

解食菜毒

乾用止嗽

嘔炒成炭

性純陽如

誤服寒劑

非此不解

○一薰瘡疥蟲瘻

蒲公英

○一薰瘡疥蟲瘻

又名乳汁

草甘平無

毒書載療

乳癰結核

皆蔬炙肥

右五味爲末以紙捲條陰陽瓦盛薰兩腿腕以被蓋之留頭而在外先以布包裏一便

○一薰瘡疥蟲瘻

右三味共爲末將紙捲筒放被內薰之

○一洗疥如神

有到水煎湯洗神効

○一治疥如神

馬金坡傳

○一薰疥妙方

油核桃去囊一半留一半搗爛入人言末八厘攬勻仍

合一處放瓦上火燒烟薰之卽已

○一治諸瘡疥癩

一掃光又名玉繡球

大楓子肉四十杏仁泡去皮四十九個二味同研

水銀三錢茶葉另研末一錢

右和勻再研聽用先以槐柳桃楮桑五木枝煎湯洗疥拭乾將煎藥量疥多

少用柏油入鹽少許乘熱和藥擦上一日擦三次忌羊雞魚豬頭等毒物

大楓子五錢水銀渣三錢樟腦一錢五分

大楓子

水銀渣三錢樟腦一錢五分

荆芥 馬鞭草 白礬 花椒 苦參 野菊花

雄黃 蒜艾

存性火酒

卷之十九

送服療胃

○一治乾疥瘡

用香油四兩花椒一兩熬至焦黑研爛入大楓子去壳七個輕粉三錢硫黃一錢人言三分爲末入油內搽之

腕痛○

十香膏

白礬

水銀

雄黃

川椒去目炒研

樟腦各一錢

紅棗○

梔榔

一个研末

杏仁

四十个去皮同研

大楓子

取白肉四十个另研

解烏頭附

子天雄毒

和陰陽調

瘡瘻痒將藥丸子患處滾過

右共和勻用柏油八錢俱入乳鉢內研至不見水銀星爲度丸如彈子大待

一治遍身風痒生疥瘡

土蒺藜苗煎湯洗之

榮衛生津

○一治老人生皮風疥瘻痒

藜蘆根爲末脂油調搽卽愈

波○

○一鼻聞香疥瘡

後山李懷嚴傳

杏仁○

去皮尖除

師熱氣逆

數日卽已或搽亦可

潤大腸氣

右共一處再研用龜碗盛在內用紙蓋口勿令泄氣用時擦手心內以鼻聞

大楓子三十個去壳

樟腦三錢研極

水銀

一錢研至不見水銀星爲度後入

水油核桃肉七个

閉○

# 癬瘻

松子仁

○一風癬瘡疥瘍血風諸瘡腫毒

歸尾

一錢五分

赤芍

黃芩

黃連

黃柏各一錢

潤肺治燥

大黃

三錢

防風八分金銀花

苦參

各二錢

木鼈子去壳一錢

結喉喉同

柏子仁治

虛閉

○一治一切鮮瘡瘍痒甚者

右剉一劑水煎露一宿五更服

○若腸風臘毒下血去木鼈子加槐花一錢

柏子仁治

胡粉另研

雄黃另研

硫黃另研各一錢五分

大草烏三錢生用

安三錢

酸瀉斂肺

安三錢

拔

柏子仁

柏子仁治

烏梅

斑蝥一錢

砒霜五分

全蝎梢三錢

麝香三分

柏子仁治

右爲細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

安三錢

○一治乾癬不瘥

天南星

草烏

各一錢生用

柏子仁治

右爲末用羊蹄根搗勻和調塗

楊梅

○一治遍身頑癬

患瘡病者

大楓子四十九個

川槿皮二兩

斑蝥去翅足五個

川椒一錢

輕粉二錢

杏仁三錢

食燒酒

右共爲末河水井水各一碗浸一夜蘸汁擦之

同食致癰

○一治癬瘡効方一萬嵩鶴傳

○

橙子○

脚醋調塗癬上卽愈

○一切瘡癩癰瘍及諸瘡不能收口者立見收口

腥腥草晒乾爲末爲主

雄黃一錢

銀硃一錢

木鼈子去壳一个

艾葉不拘多少

右爲末紙捲燒烟薰患處立効

○一治疥癬坐板血風痛痒神効 孫方李存吾傳

大楓子去壳四十個

蛇床子二錢

木鼈子去壳二十個

川椒二錢

枯礬二錢

輕粉二錢

水銀一錢

朝腦一錢

○治脾不化 石爲末柏油搗勻先將椒艾湯洗令淨時痒抓破擦患處大効

穀膀胱熱

○一治牛皮癬極痒抓爛

牛脚爪燒灰存性爲末香油調搽立効

利小便殺

○一治癬瘡

寸白蟲去

用錐針磨令極尖快當痒時於癬上各刺百針血出盡煎鹽湯

洗之未愈再刺再洗

白名橘紅

消癢止洩

禿瘡

欬開胃治

吐清水腸

閉解大毒

○

青皮○

順逆氣開

鬱解疔毒

○

山楂○

浸透去淨○

其核曰乾

炒炭除產

後惡血消

肉積積滯

白禿之候頭上白點班剥初似癬而上有白皮屑久則生痂疤或瘻送至偏頭洗刮除其痂頭皮瘻孔如筋頭大要有膿汁出不痛而有微痒時其裏有蟲甚細微難見九蟲論亦云是蟻蟲動作而成瘻乃至自小及長大不瘥頭髮禿落故謂之白禿也宜以後方而治之

○一治禿瘻方

藜蘆

二錢枯礬

二錢

苦參

二錢

五倍子

二錢

右爲細末香油調搽

○一治禿瘻方

臨穎楊子登傳

仙人垢

卽理葬過人棺板底上垢賦也研爛不拘多少

右用鯽魚以香油煎熟去魚將油調仙人垢塗禿上一錢厚一二分愈

○一治禿瘻

先用水洗令淨用燒酒和芥末調塗患處立已

胆礬

三錢乳香

三錢沒藥

二錢

紫草

五錢食鹽

三錢木柏油

兩

右同草鹽煎久下前三味剃禿方搽

○一治禿瘻如神

雲松弟驗

紫草

三錢木柏油

二丙胆礬

一錢石乳

二錢樟腦

三錢淮鹽

炒三錢

兩

兩

兩

兩

兩

宿食○

橄欖。

形尖入心

經清心火

解魚蟹毒

黃柏皮

五錢

枯礬

一錢

硫黃

鉛粉

輕粉各一錢

右爲細末臘月猪油調口擦三次又用大蒜每早揩白處

○治禿頭瘡

生津止渴

醒明礬食

味佳豁痰

用鯽魚一箇重三四兩去腸肚以亂髮填滿紙裹燒存性雄黃二錢共爲未清油調敷先以鹽洗拭後用藥

又方以苦練皮燒猪脂調敷

檳榔○

健脾破結

療癆裏急

○一論紫白癥風并癬及面上酒瘡又名粉瘡面刺俱可服之

胡麻散

## 癥風

紫癥風白癥風乃因心火汗出及醉飽並浴後毛竅開時乘風揮扇得之扇風侵逼皮腠所致宜服胡麻散或追風丸外以洗擦藥滌之

吳茱萸

胡麻子

赤色扁者佳  
另研五兩

白芷

二兩

何首烏

三兩

防風

二兩

荆芥穗

三兩

○

甘菊花

一兩

升麻

二兩

威靈仙

二兩

苦參

酒炒三兩

蔓荆子

一兩五錢

浸熱湯七

次去淨苦

然治瘡生  
炒砂用○

甘蔗○

甜寒絳汁

可療小兒  
衣多罨熱

之病○

蓮鬚○

固精烏髮  
悅色益血

追風丸

○一治白癬風

何首烏

四兩

荆芥穗

兩

蒼米

米泔水四兩

苦參

四兩

右爲細末

每服三錢

食遠服

秋分後

至春分

白酒調服

春分後

至秋分

茶清

調服用

米糊爲細丸

食遠白湯下亦可

薄荷葉

二兩

片黃芩

酒炒二兩

白芍

酒炒二兩

黃連

酒炒二兩

川當歸

二兩

牛旁子

微炒二兩

白蒺藜

三兩

當歸

二兩

○一治汗斑方

白蓮花

半夏

右各等分爲末飛麪糊爲丸如彈子大用六安茶擦之

○一治紫癰風白癬風卽如今汗斑之類

白附子

雄黃

密陀僧

止血○

卷之二十一

王集卷之二十一

三

吉辰堂

右各等分爲細末用帶皮生姜自然汁以茄蒂蘸藥擦之卽愈

芡實○

炒治遺精

獨帶益精

開胃助氣

明目○

山藥○

開瞞補精

血健脾胃

○

柏子仁○

○

甘平無毒

興陽道益

○一治紫白癬風袖方

雄黃二兩

雌黃二兩

硫黃二兩

白砒二兩

白礬二兩

並用透明者佳

右共爲末每用時先一浴令通身出汗次以搗生姜拌藥布包患處擦之良久以熱湯淋洗

○一治白癬風方

用杜蒺藜子生搗爲末作湯服之每服三錢

## 痛風

夫癘風者天地殺物之風燥金之氣也故令瘡而不膿燥而不濕燥金之本濕故一客于人則榮衛之行滯令人不仁而麻木也毛落眉脫者燥風伐其榮衛而表氣不同也遍身癩疹者上氣下血俱病也諸痛屬實諸痒屬虛癘風之痒因多有蟲而衛之虛不可誣也是症也主燥劑以主之白花蛇血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈不油然而潤乎然其性中有毒同氣相求直達癘風毒舍之處豈不居然而効乎皂角之性善於潔身則亦可以潔病苦參

養元潤腸

電神○

松香○

先取胡葱

補氣鴻榮湯

黃芪三分人參二分當歸三分生地黃四分黃連三分黃芩四分

連翹六分升麻六分桔梗五分甘草一錢全蝎二分

重蠶一枚去翅五分

全蝎二分

重蠶一枚去翅

全蝎二分

重蠶一枚去翅

全蝎二分

桃仁二箇蘇木三分麝香少許

胡桐淚一分

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

地龍三分水蛭三枚炒盡煅

煎湯去葱

以湯分三  
次煮香每  
俟湯溫在

洗其油去

○一論治癩風手足麻木毛落肩脫遍身癩瘡搔痒成瘡等症

洗其油去

愈風換肌丹

盡冷凝磨

白花蛇一條頭尾全者酒浸

苦參四兩

皂角五斤去皮弦酒浸一

宿取出以水蒸膏

宿取出以水蒸膏

宿取出以水蒸膏

宿取出以水蒸膏

宿取出以水蒸膏

宿取出以水蒸膏

粉專療濕

右爲末以皂角膏和丸如梧子大每服七十丸以防風通聖散送下

風冷口舌

苦參酒一斤用苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服

生入膏生

苦參丸一斤防風荆芥羌活獨活當歸

王集卷九

川芎赤芍

善成堂

肌○

內桂○

純陽引火○

歸元解陰

如聖丹

全蝎

酒洗一兩五錢

天麻

一兩五錢

殼炒

一兩

蟬退

一兩

苦參

一兩

防風

一兩五錢

荆芥

一兩

羌活

一兩

細辛

一兩

白芷

一兩

川芎

一兩

當歸

一兩

白芍

一兩

人參

五錢

白术

去芦枳殼一兩

桔梗

一兩

黃連

五錢

黃柏

去皮一兩

大黃

一兩

芒硝

五錢

麻黃

一兩

石膏

一兩

滑石

一兩

大楓子

去壳一個

皂角刺

一兩

鬱金

五錢

山梔子

一兩

連翹

一兩

獨活

五錢

寒凝結去  
皮曰桂心  
更純柱枝  
性橫走手  
臂發表○

官桂○

理陰分解  
凝結瘀滯  
疾行血分  
通毛窍○

連翹 金銀花 黃連 黃芩 梶子 滑石 白术 甘草各一兩  
右爲末麪糊爲丸如梧子大每服百丸苦參酒下

一治癲風

遇春分秋分服防風通聖散一帖空心服利三四次以粥補之

方見中風

沈香○

乾研末或

酒磨以煎

劑術服治

腫毒心腹

痛調中補

臟益精神

壯腸○

丁香○

辛溫治霍

亂瘻塊吹

鼻瘻腦疳

反胃開膈

關腹中腫

夫臘瘻者

皆由督臍虛寒風邪毒氣外攻三里之旁灌於陰交之側風熱毒氣

○一治癩風眉髮脫落者

取皂角刺九蒸九晒爲末每服二錢溫酒送下久服眉髮再生

肌膚悅潤  
明目信明

○一治大風惡疾雙目昏暗眉髮自落鼻梁崩倒肌膚瘡爛此方特効

○一治大麻風卽大風瘻

用人蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃煎炒將蟲

連布袋浸之良久取起晒乾再用甘草煎湯浸晒乾又用苦參煎浸晒乾

又用童便浸晒乾又用姜葱煎湯投蟲入內不必取起就放鍋內煮乾就

焙乾爲末每虫一兩加麝香二錢蟾酥三錢共爲一處入磁器內每服一

錢石蘚花煎湯下花卽山中石上生白蘚如錢樣以蒼耳草煎湯洗浴然

後服藥七日見効體厚者一日服弱者二日服神効

## 臘瘻

毒鼻息

肉乳頭爛  
破○

樟腦○

每兩用梔

四生散

白附子

黃芪

羌活

沙苑蒺藜

對合溼紙

右各等分

爲末

每服三錢

用猪腰子

批開入藥

濕紙

裹包煨熟

細辛

煎湯下

風酒下

封口火升

半時則成

黃白散

黃柏

去皮輕粉

一兩

三錢

右爲細末

用猪胆汁

調塗濕則乾

摻

樟冰治中

○一論遠年近日

一切廉瘡

潰爛

至骨疼痛

當止痛生肌

如神

邪腹痛風

三香膏

乳香

一錢

松香

三錢

痰加花椒

右爲細末

真生香油

調用包粽子

筍葉薄者密針刺孔

將藥攤其上

用筍葉

密針刺孔

將藥攤其上

用筍葉

密針刺孔

同升殺牙

蟲止牙癢

一方用松香

爲末入葱根

鬚葉等分

同搗爲餅

外用石乳香

爲末少擦藥餅

○上搭在瘡口布帛緊扎二日一換

換茶淨洗

蓄卽

白膠香

○一治臙瘡方

密陀僧

八錢

石乳

二錢

血竭

一錢

銅青

八分

右爲末將油紙刺孔桐油掃紙上摻藥在油上隔紙貼之効

○一治臙瘡頑瘡裙邊瘡

許敬吾傳

柏油

二兩

黃蠟

三錢

白蠟

三錢

香油

三錢

密陀僧

一兩五錢爲末

右將前四味八粗碗內火上煎化頻頻入陀僧在內搘不住手成膏爲度將油紙刺孔上藥油紙反摺以孔在下貼瘡

○一治兩足生臙瘡久不已

後山李懷嚴傳

輕粉

一錢宮粉

二錢

○一治臙瘡爛脚方

輕粉

一錢

右用猪板油同搗爛閒油紙上貼瘡外帛包緊一日換一次先用鹽茶

貼

洗淨

解疽毒止

即硬磨粉

一錢

研細油調

敷爛孔

○一治臙瘡

先用米泔水洗淨再用川椒艾葉濃煎水洗淨用黃丹不拘多少真香油

調搽碗裏以艾燒烟薰至黃色上用紙隔紙貼之妙

冰片

苦寒治舌

口咽喉火

○一耑治疗瘡發脣腦疽乳癰疽附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不

毒研水調  
春治難產

痛者服之便痛已止者服之立愈此乃惡症藥中至寶病危者立効復甦萬無一失乃家傳之秘方不可輕視寶之寶之

○飛龍奪命丹

乳香○

雄黃

三錢珠砂

二錢輕粉

五分血竭

一錢乳香

二錢沒藥

二錢銅綠

二錢

每斤用燈

胆礬

一錢寒水石

一錢射香

五分蝸牛

二十個吳虫

一條酒浸炙膽酥

錢乾者

心四兩同

炒至圓

脆可粉爲

度扇去燈

心磨粉用

心磨粉用

心磨粉用

心磨粉用

心磨粉用

治癩止痛  
託裏護心  
治遺精症  
數方校正無差

○一切百瘡惡毒兼治痔漏

清毒百應丸

單水雲傳

難○

沒藥○

錦紋大黃

片斤切  
片斤切

蒼朮

黃柏

當歸

槐花

金銀花

皂角

各四兩

製法與乳

香同破堅

敗惡血消

腫生肌墮

胎去翳○

血竭○

散滯血止

諸痛生肌○

○

阿魏○

酒拌鹽研

殺蟲解臭

消痞解死○

右將六味細切水二十碗煎至十碗去渣浸大黃令透取起晒乾又浸又晒以

汁盡爲度爲末。麪糊爲丸。菉豆大每服六十四丸。白湯送下。以大便下帶物爲効。

○一切無名腫毒疼痛瘡疽乳硬等瘡初發時卽用

真香油一杯溫熟飲之則毒不攻心可以緩治

○一切無名腫毒瘡須臾腫起痛難當。卽將妙藥頻敷貼

免使猖狂作禍殃

○一治無名腫毒發背瘡疽疔瘡等毒

白礬不拘多少爲末入新汲水內用粗紙三張浸內將一張搭患處頻頻

貼之更貼十數次立消

○一方用葱頭杵爛炒熟敷患處。冷則易之

○一方用五倍子炒爲末醋調塗患處

○一方用大黃爲末醋調塗患處

○一方以端午日取白礬研爲末。但遇瘡毒初起每服三錢加葱頭切拌勻酒

獸肉毒肉

積○

厚朴○

去皮切片

每斤取帶

皮蘿四兩

切片同煮

汁乾炒透

去蘿溫中

消瘧厚腸

胃除積冷

宿血宿食

○一切無名腫毒初起

用家園生地黃搗爛敷之立已

○敷諸瘡腫未破者

右三味濕搗爲餅陰乾爲細末貼瘡卽効

外消腫毒方

猪苦胆

三个

生姜

半斤取自然汁

好醋

一盞

右三味合和一處以好京墨磨膿抹腫處立消

○治外科諸毒腫痛初起未破

用連鬚葱數根用稻稈燒過半熟搗爛入蜜二匙再搗勻成餅敷患處立

消內服白礬鉛化爲丸朱砂爲衣每服三錢用葱酒送下汗出立已

○治無名腫毒瘡癰

用家園生地黃搗爛敷之立已

○樹上馬蜂窩壁錢扯破乳香 沒藥 孩兒茶各八錢 雞肫皮一錢

金鎰

子卽川棟  
子○

酒拌透蒸

去皮入凡

用核搗細

不用肉入

煎用肉不

用核苦塞

有小毒產

於川者佳

本地者細

以入火燒

存此能託

○敷治久

一切腫毒疼痛如神

鐵箍散

南星

草烏

日葵

白蘞

白薇

黃柏

天花粉

白芨

天花粉

知母

牙皂

乳香

金銀花

半夏

穿山甲

酥炙

貝母

各一錢  
五分

右剉一劑

酒二錘煎

一錘溫服

汗出卽愈

○一切瘡毒腫痛成膿未成膿用火確頒三次卽將膿水拔出而消散矣

洪寶膏

天花粉三兩

赤芍二兩

白芷一兩

姜黃一兩

右爲細末茶調敷之此藥一涼而已能化血爲水涼肌生肉去死肌爛肉及能破血退腫又能止痛出膿或用三分姜汁七分雞清調敷能使血退姜汁性熱能引血潮故血破散而後成膿如熱盛瘡毒恐隨乾隨痛赤腫不退者用雞清調敷取其難乾如湯燒療亦同也

○敷治久

一切腫毒疼痛如神

毒水治久

能託

○敷治久

一切腫毒疼痛如神

毒水治久

能託

○敷治久

一切腫毒疼痛如神

右各爲末桑蘭扯破一錢擴香三根共鋪綿紙上捲作筒線纏蘸入香油點着照患處如腫盛加艾少許○一治諸般惡毒肺痛不可忍者廣昌知縣刊行于世活人多矣

潰爛孔○

吳茱萸

白芷略一芙蓉葉兩

右爲末雞清調敷

杜仲○

一治血風瘡并溫熱生徽其形如釘高起寸許者

去皮每斤

追風解毒湯

連翹

黃連

黃芩

黃柏

防風

荆芥

用蜜三兩

塗久蜜盡

威靈仙

獨活

全蝎

姜蚕

蒺藜

歸尾

爲度肝經

右剉各等分水煎服

藥也補中

○一治血風疥癬瘻瘍瘡瘍痛痒發熱等症

徐完初試驗

益腎補肝

大楓子

去壳樟腦一兩

水銀五錢

輕粉二錢

核桃肉十個

虛堅筋強

右共研爛爲丸如彈子大放手掌心揉擦其瘡自己連擦四五次以愈爲度

志○

或將藥搽瘡上亦可

棟樹根○

一治軟瘡瘍毒久不能開口腫痛不可忍者

巴豆用簪穿燈上燒存性爲末放瘡頂上以膏藥貼之即潰

去皮取白○

一治坐板瘡

瑋四九兄傳

花椒

一錢

胡椒

七分

枯礬

一錢

人言

湯

肉殺腹內

右爲末柏油調搽

諸蟲皮赤

者息用○

皂角刺

名天丁

○一治坐板瘡痛痒經年弗愈

中州傳愛泉傳

入言

一分密陀僧三分硫黃

二錢石膏一錢

五分

右爲末生豬油調搽患處

○一治諸瘡口難歛及多年惡瘡百方不瘥或痛癩走不已者

馬齒莧搗罨口并周圍立効

○一諸般毒瘡臭爛不堪聞者

雄黃

生白礬

右各等分煎水洗之

○一治濕撓瘡方

黃蠟一錢

白蠟一錢

銅綠一錢

黃丹一錢

童女髮一錢

○一治凍瘡

右用香油二兩入銅杓內熬入藥同煎將紙摺作十數層入鍋內煎貼瘡

○一治凍瘡

用茄子根臘煎湯洗并山雀兒腦髓塗之

○一治癰瘡久不瘥年年發不歇先痒後痛然後腫破出黃水不止

○一治頭上虱瘡腫痛臭爛

如治脚手凍瘡用橄欖燒存性爲末入硫粉由調全上

○一治頭上虱瘡腫痛臭爛

○一治頭上虱瘡腫痛臭爛

用包銀硃粗紙燒烟薰髮裏蟲卽死而愈

研麝數次

酒盡如粉

名巴霜拔

毒孕婦忌

用○

桑白皮

○一治蛇頭指  
用鷄子開一竅將指入內待蛋化水又換一个如此三枚卽愈

用葛加石灰搗爛敷上立已

○一蛇頭指痛不可忍臭不可聞

○一又指無名腫毒痛不可忍

用蜈蚣一條焙乾爲末猪胆汁調塗  
白芨末一錢蟾酥三分

右共和爲一處用雞清調塗當時腫消痛止

○一治血風瘡

石膏

硫黃

百草霜

右各等分柏油調搽

○一治肥瘡黃水瘡

紅棗

燒灰

枯藜

黃丹

官粉

松香

各一錢

銀硃三分

右爲細末濕則摻之乾則香油調搽

○一治腳上諸般瘡毒膏藥方

柘樹○

水銀一錢

沒藥五分

黃丹五錢

細辛三錢

大楓子十個去薌

輕粉一錢

菖蒲五錢

石乳香五分

柏片腦三兩

黃麻油一盞

取皮裹白

肉桂溫無  
毒治血結

補損虛○

枳實梗

設○

郎細皮香

圓六月摘

者實八月

摘者散陳

蛀者佳竝

去穰核以

炒實寒

消食積開

胸結散亦

右藥俱研極細末篩過用黃蠟麻油同煎用文武火慢慢煎鎔成膏稍冷方  
下片腦再煎一刻取退用細嫩油紙薄抹隨瘡大小為度不宜太潤二日  
換每貼用後藥煎水洗淨瘡口方貼

大黃

苦參

黃柏

蒼朮

防風

金銀花

艾葉

茶葉

右各等分煎湯洗瘡口

○一多年頑瘡久不愈者共諸瘡不收口者

黃蠟

二兩黃丹

四兩輕粉

乳香

沒藥

各一錢血竭

孩兒茶

各一錢

右爲細末先將真麻油半斤熬熟滴水成珠下黃蠟化開子入黃丹就起離  
火方下諸藥攪勻入罐收用

○一畊花瘡及似花之狀右爲細末先用溫漿水洗淨後敷之

胭脂

貝母

各三錢胡粉

二錢硼砂

沒藥

各一錢

○一月蝕瘡蟲或生小耳內

胡粉

炒黃微

枯白芩

黃丹

蜜黃連

輕粉

各三錢

射香

少許

右爲末以漿水洗之拭乾後搽藥上用麻油調敷即愈

卷之二十一  
三十一  
寒熱門  
寒熱門  
寒熱門

○一腳生雞眼作痛者以擣雞湯剝洗効

胃止吐消

痰除裏急

後重○

拘拘○

陳者佳全

用療子癰

疾存性研

陳酒送服

療疝氣核

治腸風下

血方中橘

核即此往

往以爛橘

○一治瘡疽久不愈

右爲細末用猪肚一箇好酒四壺文武火煮爛搗和藥末爲丸如梧子大每服五十九酒送下忌雞魚牛羊肉

枯礬三錢

密陀僧三錢

龍骨煅二錢

黃丹水飛三錢

○右用油紙將布針刺孔桐油調摻上貼患處

○一治軟癆方

用牛膠將滾水泡軟中留一孔出氣貼患處久之自落

○一人累年遍身生瘡疥風痒熱毒苦楚難禁子製此方服之永不生

○當歸酒洗二兩白芍乳汁炒二兩防風去芦熟地黃酒蒸二兩知母去毛二兩酒炒二兩若參去粗皮四兩甘草一兩懷生地黃酒洗川黃柏百益水炒半童便炒一半各兩

○一治瘧疾久不愈

核誤用蘇

城醫家尚

未認得火  
稿○

山梔炭

右剉姜棗煎服

# 膏藥

黃芪二兩

當歸一兩五錢

白芍二兩

白茯苓一兩

白芷三錢

川芎一兩

厚朴五錢

官桂七錢

陳皮一兩

炙甘草二錢

苦寒無毒  
熟厥頭痛  
痘氣湯火

○一治一切風寒濕氣手足拘攣骨節酸疼男子痞積婦人血瘕及腰脇詶般  
疼痛結核瘰疬頑癰頑瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處  
肚腹疼痛瀉痢瘧疾俱貼臍上面白而寒尤効咳嗽哮喘受寒惡心胸膈脹  
悶面色癥黃心疼氣痛俱貼前心負重傷力渾身痛者貼後心腰眼痛小腸  
氣等症貼臍下治無不効

萸肉○

神異膏 傳參將方

選淨補精

木香

川芎

牛膝

生地黃

細辛

白芷

益腎○

秦艽

歸尾

枳殼

獨活

防風

大楓子

白茯苓

羌活

黃芩

川星

草麻子

半夏

蒼朮

○

貝母

赤芍

杏仁

白芍

茅香

兩頭尖

蒸透切逐

艾葉

連翹

川烏

甘草節

肉桂

良姜

水暖脾生

續斷

威靈仙

荆芥

藁本

丁香

金銀花

津止洩除

丁皮

藿香

紅花

青鳳藤

烏藥

蘇木

虛熱開腠

玄參

白癩皮

姜柂

草烏

桃仁

五加皮

要○

山梔子

牙皂

苦參

穿山甲

五倍子

降真香

赤茯苓

骨碎補

蒼耳頭

蟬退

蜂房

鼈甲

全蝎

破結氣瀉

麻黃

白芨

大黃

蜈蚣

甘草

蛇退

三條

心小腸脅

右用桃柳榆槐桑練楮七色樹枝各三七二十一寸俱切粗片用真麻油十

二斤浸藥夏三宿春五秋七冬十宿後煎藥枯油黑爲度用麻布濾去渣貯

磁器內另以松香不拘多少先下淨鍋溶化後取起每香二片用藥酒四兩

拭水軟硬得法仍濾入水缸中令人扯抽色如黃金卽成膏矣

一治風寒濕氣所侵跌撲閃挫傷損一切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼痛處

呻吟咳嗽貼背心寫癧貼臍上頭疼眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒疔

安魂魄養

茯神

敷行水

工

人扯

膏

矣

血治心

神不安

琥珀

草烏

川烏

大黃絡

當歸

赤芍

白芷

用側柏子

白芨

白芍

烏藥

官桂

木鼈子

絡人

末入瓦鍋

槐柳桃桑穰

合四錢

○一方加苦參皂角絡

五錢

煮有異光

取起入燈

心對分研

粉清肺利

小腸安五

臟定魂魄

消瘀血明

目

天竹黃

○一治杖撲湯火傷損瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈肉已死而用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌最速如棍杖者外皮不破內肉糜爛其外皮因內燄乾縮堅硬不潰爬連好肉在痛故俗云疔癧皮致膿瘍無從而泄內愈脹痛難以潰歎怯弱之人多成破傷風症每致不救若杖瘡內有瘀穿者卽用有鋒芒磁片於患處砭去塗以此藥則疔瘍

○治小兒驚

當歸膏

當歸一兩

生地黃一兩

黃臘一兩

麻油六兩

痰每二錢  
加雄黃半  
牛末各一

錢研勻

右先將當歸地黃入油煎黑去渣入蠟溶化候冷攪勻即成膏矣

當歸地黃膏主生肌止痛補血續筋與新肉相宜白蠟尤妙

當歸地黃膏

當歸地黃膏

當歸地黃膏

和丸粟米  
大每服五

丸薄荷湯

神効萬靈膏

五臺山無窮禪師秘藏方

當歸川芎赤芍生地黃熟地黃防風差活

大黃玄參苦參官桂

天花粉山慈菰紅芽大戟各六錢草麻子八十粒木鼈子四十八粒

杏仁四十個巴豆肉四十個穿山甲十片白芷

獨活連翹山梔桔梗白芨五倍子雨頭尖白蘚

送下治失音不語○

蜂房右剉散用真麻油二斤四兩髮餘四兩入藥浸春秋三日夏一日冬五月油

藥放鐵鍋內文武火熬用槐柳枝長寸許各三十根同熬焦色用麻布濾去

渣再放油鍋內熬滴水成珠不散傾出瓶內秤進油二斤下山東黃丹一斤

子在內者盛天有蜂

集腋研能

托毒療人

消止痛同

頭髮蛇蛻

燒灰日以

酒送錢許

治臘肺風

節惡疽疔

青以炙存

性酒拌服

治失禁遺

溺前湯洗

毒孔無蜂

首不效○

○一打破損傷刀傷貼患處如虛腫貼腫處焙手摩百次

○一熱嗽冷嗽傷刀貼肺俞焙手摩百次

○一無名腫毒貼患處瘡初起焙手摩出汗諸毒發陰陽男子貼丹田婦人貼血海焙手摩百次

○一打破損傷刀傷貼患處如虛腫貼腫處焙手摩百次

松香二兩姜汁煮過黃蜡二兩桐油三兩熬至不老不嫩冷了下乳香沒藥血竭孩兒茶阿魏百草霜各三錢射脊五分或一錢輕粉三錢馬鹿膏三錢俱爲細末藥油將好投下早了恐洩藥氣再熬不粘手爲度將膏藥埋土內三四日出火毒磁瓶內收貯隨意攤貼倘膏嫩加杭粉不拘多少不粘手度爲

○貼諸腫毒疔瘡發背治諸病法于後

○一瘡疽發背燎瘡繩起一日貼將火焙雙手一上一下摩百餘次出汗爲度如有膿血之瘡貼上膏藥便罷不用手摩

○一疔瘡癰瘡搔痒貼上不用手摩

○一風癩皮膚先用木鼈子火煨熱搗爛放腫上貼之

○一咽喉喘嗽貼膏肓焙手摩百次

○一無名腫毒貼患處瘡初起焙手摩出汗諸毒發陰陽男子貼丹田婦人貼血海焙手摩百次

土蜂穿

○一風痰壅塞貼心次痛處焙手摩百次

○在嚴凍大  
雪中以布  
袋裝之能

○一男婦諸痞塊用麪作圈放痞上用皮硝一兩鵝糞五錢大蒜二顆將爲一  
處用膏貼瘡上硝薑蒜放圈內以熨斗火熨藥上要透熱煨木鼈子肉放  
臺內小兒痞塊不用硝熨焙手摩百次

○一男婦偏正頭風俱貼太陽穴焙手摩百次

取入然  
桶蒸死連

○一男子遺精女人白帶煨木鼈子肉男貼丹田女貼血海焙手摩百次

○一蠱脹肺心下臍上煨木鼈子肉焙手摩百次

窠炙研以

○一左癰右瘻濕氣疼痛貼患處煨木鼈子肉焙手摩百次

醋調塗癩

○一暗風貼肺俞穴并心口下三寸焙手摩百次

癩即消以

○一月經不調貼血海焙手摩百次

蛇蛻同服

○一醉後嘔吐貼肺俞心口焙手摩百次

治疔毒走

○一冷氣冲心痛肚腹疼痛依病大小貼焙手摩百次

○一四時傷寒貼脊心焙手摩百次

茶小兒吐

○一已上諸般疼痛照法貼之焙手摩百次其患處即愈

黃乳調服

鴉○

五橫子

○斂肺生津

○消酒毒收

○溼療陰脫

○肛○

○僵蠶○

○糯米泔水

○洗淨炒研

○治中風喉

○瘡陰癰瘍

○消瘰疬風

○瘡陰癰瘍

# 杖瘡

○杖打破脚腿腫痛

金鳳花科一根搗爛如泥敷患處如乾又塗上一夜血散而愈

○杖瘡久不愈者

雄豬骨髓日夜搽破腫處立已

○杖打血侵膿腫痛

石灰三錢入水攪澄清再入香油五錢用金環腳攪打成膏以雞翎掃上使血水長流須臾腫消痛止

○未杖之先

用白蠟細切入碗內滾酒泡服打着不痛

○杖瘡方

用麻油二分水一分黃丹一錢入碗內用銀簪攪成膏用鴨毛刷上外用紙貼日四五次趕血下行立時腫消痛止

○治杖瘡及遠年近日一切頑瘡

黃蠟二兩

黃香

黑渣不妥

香油三兩

乳香未五分

沒藥未五分

三七

白芍

驚瘍疔特

○

蜘蛛○

炙研粉猪

乳調治啞

驚○

蟬蛻○

深湯洗去

泥塑足曉

乾治目晉

翳障痘疹

疗腫○

蠅子○

寄杖神丹

何朴宇傳

此藥服後任行無妨且血不侵瘤

水洗三次

乳膏

沒藥各五分

孩兒茶

三七各一錢

右先將蟬入磁碗內慢火化開用筋敲碗邊墊續入黃香乳未取碗離火入溫香油於內攪勻待冷入水缸內去火毒三日取出油單紙攤藥貼患處

○一杖打傷重敗血攻心欲死  
蘇木三錢紅花三錢大黃二錢歸尾三錢

右共爲末童便一大鍾煎至一鍾不拘時熱服

○一杖打後潰爛久不愈者此氣血虛也

人參

白朮去苦炒

白茯苓去皮

當歸

白芍

陳皮

熟地黃

香附子

貝母

桔梗

甘草名等分

陳皮

右剉一劑水煎空心服○往來寒熱加柴胡地骨皮○口乾加五味子麥門冬○腹痛加黃芪○腹多加川芎○肌肉遲生加白芍肉桂

白龍捧瘡膏 方外異人傳

臘豬油一兩白蟬 輕粉 定粉各五錢黃蠟三錢朝腦二錢乳香一錢沒藥一錢

冰片一分 右爲末先以豬油同二蠟化開入羣藥未調攤貼之

去鹹炙研

木耳  
焰乾

白蠟各二分  
辰砂七分

青木香一錢

海螵蛸五分

用治驚中

琥珀三分

天靈蓋火煅三分

風○

稚車蟲

右爲未沙糖爲丸如苦珠大每服三丸好酒送下卽打着不甚痛如未受責  
用兩手搥背卽消

即蟻唧

○一杖瘡潰爛生蛆用皂莢煅過爲末乾摻其內蛆卽死

五月晴日

有蟲捕入

糞一團如

推車者是

火灸研粉

夫折撲墜隨皮不破而內損者必有瘀血若金刀傷皮破出血或致亡血過多  
二者不可同法而治有瘀者宜攻利之若亡血者兼補行之又察其所傷有

上下輕重淺深之異經終氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛

後調氣養血補益胃氣無不効也

大凡傷損不問仕弱及有無瘀血停積俱宜服熟童便以酒佐之推陳致新其

功甚大

○一論跌傷骨折用藥一厘黃酒調下如重車行十里之候其骨接之有聲初

跌之時整理如舊對住綿衣蓋之勿令見風方服藥休移動端午日製忌婦

和乾糞末敷出多骨忌經水生

小止登台

卷之九

王集卷九

卷之九

三

善成堂

擣爲丸塞

裏門引痔

蟲出盡水

瘧○

癩圓卽

癩蝦蟆

○

大者佳生

用填爛孔

拔深毒轉

年久毒肚

取酥搘老

蟾仰天以

其頭入等

人鷄犬等物

一厘金

大梁孫都督秘傳神効

土龍

一个新瓦  
上陪乾

巴豆

一个  
去壳

半夏

一个  
生用

乳香

半分

沒藥

半分

自然金

同火燒七次  
七次用些  
醋淬須

右爲細末

每服一厘好酒送下不可多用多則補得高起妙不可言

○一被打傷重惡血攻心或木石壓死井跌磕傷從高墜下跌死氣絕不能言

五語取藥未便急勞開口以熱童便灌之

一方用苧麻燒灰調酒服

○一几跌傷打傷腫痛不可忍者以生葱搗爛熱罨之甚妙

○一傷肢折臂者卽將折處膝上拂定用好酒

一碗旋熱將雄雞一隻刺血在

內攏勻乘熱飲之仍將連根葱搗爛炒熟敷上包縛冷再換亦治

刀刃傷血隨止

○一折傷先用止痛法

白礬爲末每用一七沸湯一碗化之以帕蘸熱熨傷處少時痛止然後排

整筋骨貼藥

○一治傷損瘀痛紅腫屬熱毒者并接斷

散內取等

箍緞上喚

濟陰丹

天花粉三兩

黃黃

白芷

赤芍藥各一兩

右爲末濃茶調搽處

之腦中放  
出日藥是  
去瘡以等  
設曬乾刮

○一治跌打損傷骨先用手扯伸後用小奶奶一二隻搗爛搭上外用杉木  
板夾之次日再換取効如神

○一論打撲傷損至重大小便不通瘀血不散肚腹膨脹上攻心腹悶氣至死  
者此藥逐下瘀血方可服補損藥

下配藥消

大成湯

大黃二錢

芒硝二錢

枳殼二錢

厚朴一錢

當歸一錢

桃仁一錢

蘇木一錢

紅花五分

木通一錢

甘草少許

右剉水煎溫服

○一論從高墜下惡血流於肠下痛不可忍

復元湯

柴胡五錢

當歸六錢

穿山甲一錢

炒桃仁二錢

去皮五個

瓜蒌仁二錢

紅花二錢

大黃酒浸一兩

甘草二錢

右剉一兩水二盞酒一盞煎代分溫服以利爲度

○一論墮墮挫閃氣血凝滯攻刺腰痛

毛活桃仁湯

羌活

蒼朮米泔炒

當歸尾

玄胡索

桃仁去皮

取活者吞

油浸死虫

髮癩搏瘡

毛活桃仁湯

羌活

蒼朮米泔炒

當歸尾

玄胡索

桃仁去皮

塗足指雞

服一宿脫

瘡瘍而不

發○

蚯蚓○

藥鋪有賣

破腹去泥

以酒洗曬

乾每四兩

配糯米花

椒各一兩

同炒炒至

米黃透爲

○一治跌撲傷損  
接骨止痛神方  
右二味用水一碗煎至七分加酒一鍾調入火煅過天靈蓋一二錢溫服當

右二味判碎入鍋內同炒焦枯存性爲細末每服五錢好酒一鍾調熟服後

仍飲熱酒二三盞厚蓋得微汗痛即止一宿接完如初極効

○一論跌撲所傷爲敷涼藥或入元氣虛寒腫不消散或不憊軟及癰毒堅硬  
不痛肉色不變久而不滑滑而不斂或筋掣骨節一切冷症並治

回陽玉龍膏

草烏二錢炒

南星一兩煨

乾薑一兩炒

白芷一兩

赤芍一兩

肉桂五錢

右爲末葱湯調搽熱酒亦可

楮根皮

葛花枝

又名合歡樹

又名夜合花

官桂一劑半水半酒煎服

牛膝去芦

紅花

杜仲酒炒

破故紙炒

小茴香酒炒

乳香

右剉一劑半水半酒煎服

乾冬瓜皮一兩

真牛膠

一兩

乾冬瓜皮

一兩

度去椒米

蟹二隻連殼搗爛好酒

二碗煎去渣服渣數匙處

磨粉治厯

○一治打撲青腫疼痛 用苦櫞核磨水頻搗患處其青腫立退

節風痛

○一論打撲跌損傷牙咬刀傷出血諸般腫毒出膜後肌肉不生痛不止者

足不仁疽

○止血定痛生肌散

乳香 三錢

沒藥 三錢

血竭 二錢

黃丹 飛過五錢

毒腎萎肺

白芷 二錢五分

龍骨 火煅 三錢

朝腦 少許

軟石膏

煅去火毒一兩

○蚯蚓糞

右爲細末磁器盛每以捲患處血止痛定肌生

○一治傷損等症失血過多或因冠伐血氣耗損惡寒發熱煩燥作渴

○入火煅紅

八珍湯

熟地黃 各一錢

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍

○每兩人輕

○入火煅紅

萬病無憂酒

方見補益

粉一錢研

至粉內無

星爲度取

○一治打撲損傷落馬墜車一切疼痛

活紫花地

○乳香定痛散

乳香

沒藥

川芎

白芷

赤芍 各一兩

生地黃

丁擣爛絃

○牡丹皮

各二兩

甘草

五錢

右爲細末每服三錢溫酒並童便調下

○一治風損如神膏

謝醫鳳傳

汁調塗爛  
腿日洗自  
塗數日癒

以甘草煎  
汁調塗小

孩腎囊腫

痛○

龍骨○

白淨黏舌

者住捉燕

子破腹葉

腸以骨填

腹懸井內

離水尺許

## 破傷風

夫破傷風者有因卒暴傷損風襲之間傳播經絡致使寒熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入臟有因諸瘡不瘥榮衛虛弱肌內不生瘡眼不合風邪亦能外入於瘡爲破傷風之候有諸瘡不瘻舉世皆言斬艾爲上是謂熱瘡而不知火熱客毒遂經諸變不可勝數微則發熱甚則生風搐或角弓反張口噤目斜亦有破傷風不炙而病者因瘡着白痴瘡口閉塞氣壅於陽故熱易爲鬱結熱甚則生風也古方藥論甚少以此疾與中風同論故不另立條目惟河間論病同傷寒症治通於表裏分別陰陽有在表有在裏有在半表半裏者在表宜汗在裏宜下在表裏之間宜和解不可過其治也故表脉浮而無力者太陽也脈長而有力者陽明也脈浮而弦小者少陽也若明此三

候準一周

時取出生

研水飛麗

乾周蓋龍

有病食燕

而癩得水

而脢忌經

火生肌敷

瘡治鼻紅

○穿山甲

○

○悶使溺閉亦時或汗出脉洪數而弦也宜導之

○尾上細印

良同土炒

法而施治不中者難矣但中風之人尙可淹延歲月而破傷風始雖在表隨卽轉臟多致不救大抵內氣虛弱而有鬱熱者得之若內氣壯實而無鬱熱

者雖傷而無害也

○一論破傷風邪初在表者急服此藥以解之稍遲則邪入於裏與此藥不相合矣

羌活防風湯 羌活 防風 藥本 川芎 白芍 當歸

地榆 細辛 甘草各一錢 右剉水煎熟服

○一論破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪入於裏不可用矣

和解湯 羌活 防風 川芎 菊花 麻黃 石膏 前胡

黃芩 細辛 枳殼 白茯苓 甘草各五錢 薄荷 白芷各二錢

○蔓荆子 右剉水煎熟服

○一論破傷風邪傳入裏一舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅成胸腹滿

○

○通裏湯 川芎 羌活 黃芩 大黃各二錢

○右剉水煎溫服膚脈通和爲度

王欽肥研

通經絡竅

○一論風傷腎而腰痛者或左右疼無常處牽引兩足宜五積散加防風全蝎三箇

方見中集

殺蟲消癰

○一論破傷風及金刀傷打撲傷損并癩狗咬傷能定痛生肌

爲防風所制

防風

逐邪風祛

玉真散

天南星服之不癲

防風

積溼癰瘍

○一論破傷風以藥敷口然後以溫酒調一錢如牙闌緊急角弓

反張用藥二錢童便調下○打傷欲死但心頭微溫以童便灌下一錢并進

二服○癩狗咬破先口噙藥水洗淨用綿拭乾貼藥更不再發無膿大効

蛇蛇不經

○一治破傷風

地者佳泥

裏火煅去泥砂粉治疔腫以蛇

蛇不煅煎

○一治破傷風五七日未愈已至角弓反張牙關緊急服之神効

去頭足土淨五錢

右爲末用好酒一碗煎服之立甦

汗數白點

風洗惡瘡

○一治破傷風

奪命丹

川烏

火煅去黑皮一兩

雄黃一錢

白花蛇

右爲末葱汁爲丸如蓮子大每服一丸用葱葉一片將藥裹內火微燒嚼爛

即斬蛇

黃酒下衣益汗出卽愈

炙法

治破傷風及風火咬傷

方見灸法

鼻向上有

○一治破傷風牙關緊急

方勝花紋

立効散

雄黃 香白芷

去頭尾酒

右各等分好酒煎服如牙關緊急者灌之卽活

浸除皮骨

炙則不蛀

治溼瘻

○凡遇湯火所傷切勿用冷物冷水冷泥蓋熱氣得冷氣則却深搏爛人筋骨慎

石首魚

之慎之先以鹽水和米醋調敷瘻上次以醋泥塗之仍用醋塗不絕暫救病

苦一面急搗生地黃醋調敷瘻上直候疼止雖厚至數寸不妨

○一切湯火傷呪云

龍樹王如來救吾行持北方王癸禁火大法

# 湯火

開胃益氣

首中腦石

燒研入冰

疣治害耳

曠山患肺

疽者終身

戒食○

朱籠○

大如錢腹

赤如血又○

名金錢籠

出深山石

潤中廣德

州最多甘

龍樹王如來君是北方玉癸水收斬天下火星辰千里火星辰必降急急如律令

呪畢卽握真武印吹之卽用少許水洗雖火燒手足成瘡亦可療

○一治湯盃被火燒破瘡毒疼痛三方俱効

○一方用大黃末蜜和塗之立愈

○一方用鷄子清磨京墨塗之上用三層濕紙蓋之

○一方用生白礬爲末香油調掃瘡破處不拘時

○一治湯火傷

用擣猪毛不拘多少焙乾燒灰存性研細末真香油調量患處大小周圍原敷於上中留一孔一日一次慢慢圍攏如敷急速及不留口則潰而有

○一治湯盃火燒此藥止痛解毒生血

清涼膏

生地黃

二兩黃連

山梔子

白芷

各一葱白

右剉細用香油四兩煎至地黃等焦黑瀝去渣再煎入黃蠟五錢慢火熬蠟

化傾磁盞內以雞翎掃瘡上

○一治湯盃火燒瘡

毒氣有

性研粉能

消漏管○

牡蠣○

童便浸七

日硫黃末

酒調塗黃

土裏娘止

夢遺赤白

濁補腎安

神除盜汗

消痰塊○

真珠○

人豆腐煮

○一被虎傷

用生葛根汁服并洗傷處或白礬末納瘡口痛即止

家園生地黃旋取新者搗取自然汁入香油黃蜡少許砂鍋內熬成膏以  
雞翎捕敷瘡上

○一湯火傷用水磨炭末塗○或磨土末塗○或用真桐油塗

○一方用蘋頭切開水磨濃漿敷之立効

○一方用黃柏爲末香油調搽立已

## 虫獸

○一癩狗咬方

斑貓

一日二日三日至七日止用七箇以七日外記日每日一箇至百箇

雄黃二錢

麝香

三分小兒不用亦可用二三厘

滑石

五六錢或二兩亦可

右俱觀人稟氣虛實用糯米一勺與斑貓同炒以赤爲度斑貓去頭尾翅足各爲細末每帖用二三茶匙酒調服如不飲酒米湯亦可服藥去毒物如小便中出或口吐出都是大小塊子毒出後於瘡口下去三寸灸三壯効○先

喫香油一碗次用香油洗瘡口○又沙糖水調塗仍服沙糖水一兩碗

一炷香取

出與燈心

同研極細

去心除翳

障安魂魄

療瞽逐瘀

止遺精白

濁解痘疔

毒下死胎

胞衣生肌

肉○

一田癟○

擣爛塗絺

硬瘻核塗

○一被驃馬咬

用馬鞭草燒灰油調敷之

○一百蟲入耳

用藍汁灌之或葱汁尤良或猪肉稍許灸香置耳邊亦出

或蘆管入耳內口吸之虫隨出

○一癩狗咬傷

番木髓卽馬錢子磨水吃卽看腦頂上有紅頭髮急宜去

○一蝎螫方

朱砂

雄黃

右各等分射香減半端午日取蝦蟆新蟬酥和爲丸一擦立止

○一癩狗咬傷方

斑貓

去翅足七个脊附七分

○右共爲細末作一服燒酒調下如腹痛不可忍者吃豬肉湯一兩口解之卽

止不一時小便出如狗形下來卽已避蠅鼓風一七日

○一蜈蚣入耳以雞肉置耳邊自出

○一蜈蚣咬痛不可忍用燒紙捲緊燒烟薰咬口立止○一方用紡線根擂酒乞立止

○一蜈蚣咬痛不止獨蒜磨碎處痛止○又宜烏鵲糞水調塗之○又宜研之

○一蛇咬

雄黃

五靈脂

白芷

貝母

右各等分爲細末每服二錢熟酒調服又以白簪用滾水泡化洗傷處効

命門通小

○一蛇咬 端午製

雄黃

白礬 生研

便入冰片

○右各等分爲末溶黃蠟如梧子大每服七丸念藥王普薩藥王苦蘗七遍  
熱水送下

痛癉如入

膏內煎必

○一雄蝎螫人痛在一處雌蝎螫人諸處牽痛但將蝎牛搗爛塗傷處毒即解

散蝎牛食蝎故也手浸冷水痛亦止

預敲碎其

○一治蝎螫 天南星三個

胆礬五錢

散以杜油

○右用焰硝半斤化成水入二味末攪勻滴水成錠子每遇蝎螫擦之立愈又

暴暈則近

○治牙疼用燒酒入此錠少許漱口數次即止

人受湯黏

○一治蛇傷

衣○

雉裹金

○用半邊蓮研生酒吃凡被所傷將綿帛扎住勿令氣上行服藥後即當解去不然則所傷之處必潰爛矣

○炙透磨粉

○十九日共七碗百日忌食魚腥終身忌狗肉方得保全否則十傷九死一風

消久停宿

○犬一日咬三人止一人用此方得活親試其驗一用胆礬末傅患處立愈

食療疳瘍

○一辟蚊虫法

外不言治

卷之六

三集卷九

苦參

藜蘆

川芎

白丁香

籠蓋

土炒

芫花

○身細頭圓  
○麻雀矢省  
○翅長者乃

右共爲未棗肉爲丸日乾燃之○又方用黃鱔骨同鋸末捲作筒燒之  
○一辟蛟虫方 用鰻鱈魚乾者於室內燒之卽化爲水矣  
○一凡蛇入七竅傍開蛇尾納川椒數粒以紙封之其蛇自出更煎人參湯飲  
之或飲酒食蒜以解內毒如被蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加灸於  
蒜上灸之其毒自解凡毒虫傷並効

○雄入籠取

○一金猫辟鼠法

椿樹葉

冬青葉

絲瓜梗葉

○矢冬月佳

右各等分每四季燒烟薰于堂中其鼠遠避一年燒四次

○甘草湯冷

○一治虫入耳

○浸一宿焙研咬瘡頭

用猫尿滴耳中卽出取猫尿以生薑擦鼻其尿自出或用麻油滴之則虫  
死難出或用炒芝麻按之則虫亦出更不如猫尿之速也

○拔疔毒○

○一治百虫入耳

○五靈脂

搗葷汁灌耳中卽瘥○又宜川椒末一撮以醋半升調灌耳中行二十四  
步卽出○又宜火熨桃葉捲之取塞耳立出○又宜葱汁灌耳中虫卽出

研末酒飛

日乾止經

水過多赤

帶不絕男

女一應癥

血凝齒痛

○一百虫入耳不出

○山羊矢

○解鮮菌河

○鮑毒傷損

○惡血○

○山羊矢

○一治蟻入耳

用川山甲燒存性爲末水調灌之卽出

○一蜒蟠入耳

黃蜂蟄

用黃荊子爲末入人言未加艾以紙捲燒烟薰之

○一辟壁虱臭虫

用蜈蚣燒烟薰之。一方青鹽水灌洗床帳永絕其迹

少林言活  
驪乾炒成

炭存性入

燥固熄磨

分療潰爛

生肌酒送

二錢療雷

頭風水粉

各一升浸

一夜絞汁

頓熟每午

刻服疳痢

欲死者三

服全瘻。

線膠。

# 反對

## 反對浪費，反對官僚主義運動而鬥爭

反對浪費、反對官僚主義運動而鬥爭

(一九五二年一月六日在西北區一級機關處長以上幹部大會上的講話)

中共中央西北局書記、西北軍政委員會副主席 習仲勳

反對貪污、反對浪費、反對官僚主義的偉大鬥爭，已在西北地區開展了。但是，這個運動的發展情況還不能令人十分滿意，運動還只能說是處在初期狀態中，不僅發展的不平衡，而且是不深、不廣、動頭不大。反對貪污、反對浪費、反對官僚主義的箭，還沒有射中在要害上。也就是說，這個運動還沒有在一般的貪污、浪費現象上打圈子，還沒有發展的和重要的方面去進攻。這就與我們要有的對抗在要在要害上是打摃了一下我們身上的灰塵，而我們有的一般貪污、浪費，官僚主義現象的目的還距離，還沒有去掉。這就是說，還沒有洗滌、浪費西北地區反對貪污、反對浪費、反對官僚主義分子，首先應該自省，然後才能談得上。這只是打摃了一下運動，大體情況就是這樣。

西北地區反報上說得很乾淨，很衛生了呢！戴至不還沒有去地、各部門和各機關中來看，其情況嚴重，並且不為一般人所重視。有些浪費分子甚至認爲：「貪污有罪，浪費無妨」，「爲了完成任務，鼓勵工商業者坦白行贿、漏稅行爲。對他們中的損害遠超過貪污和盜竊。鋪張、浪費分子常常以沒有將國家的財產私有而自得，這是壞的思想。要知道：人民和國家是要我們用一個錢辦一件事情，而不是讓我們花費很多的錢而辦很少的價錢的事，而不是讓我們花費很多的錢而辦很少的事，如果花費大筆款項而辦壞了人民和國家的事業，難道也應該問心自安嗎？這一種對國家財富的損害，比之於貪污和盜竊又有什麼不同呢？因而，貪污可恥，浪費也可恥，貪污有罪，浪費也有罪，不後悔罪名是浪費。

官僚主義是貪污、浪費之母。官僚主義分子常常就是浪費行爲的倡導者，批准者，是浪費行爲的掩護者，縱容者。沒有官僚主義，浪費浪費就不會滋長起來，或不會很多地滋長起來。官僚主義者，又常常把自己身上乾淨而自豪。殊不知，正是由於官僚主義者這樣整天閉着眼睛，才給敵人的侵襲開了大門。官僚主義者的工作，敵人總是指道和說好。這種事並不是那樣具有聲勢，而是缺乏內容，這種情況，在目前還是多數，有的單位，群衆基本上沒有發動起來，他們那裏的領導上還在睡覺，群衆沒有人去領導，好像「世外桃源」。用軍事術語來說：這是一些「死物」。軍事術語來

行，或受奸商引誘的，因此，我們必須同時在工商界開展這個運動，幫助工商業者推動這個運動，鼓勵工商業者坦白行贿、漏稅行爲。對他們中的犯罪行爲也應該按情節輕重，悔改程度去分別處理。機關的坦白運動，將推動工商界的坦白運動，而工商界的坦白運動的開展，又會反過來推動機關的坦白運動。許多有貪污、受賄行爲的人害怕商人檢舉。因此，在開展坦白運動中，必須打擊抗拒坦白的貪污分子，揭露他們威脅利誘阻礙坦白的行為。

但是，問題的重要關鍵還是在於領導。根據一般情況瞭解，有的地方群衆發動不起來，主要是領導上有問題。一種是官僚主義的領導，不是首長負責，親自動手。他們沒有認識到反對貪污、反對浪費是一場嚴重的思想鬥爭和政治鬥爭，用嚴肅認真的態度去待它，而當作刮一陣風的態度去對待，畏首畏尾，拖泥帶水；不積極主動地採取戰鬥姿態，親自「上前線」，而是委託別人去作，自己高高在上。這種人必須改變過來，不然國家的紀律就會找在他們的頭上。另一種是領導幹部自己手上不乾淨，不敢正視這個鬥爭，但是他們沒有想到：自己手上不乾淨，已經是錯誤了，如果現在還不主動地有什麼錯誤就坦白什麼錯誤，自己坦白，自己檢討，那就是一錯再錯了。他們宣稱放寬政策，