

漢書門  
類號函架冊  
一六〇九〇八  
一六〇九〇八

內閣文庫	漢書	類號	冊數	函架
		一六〇八	一六〇八	三〇〇


內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (140)
函號	300 211

百七十九





小兒門	小兒平氣散	小兒疳積散	小兒驚風散	小兒吐乳散	小兒泄瀉散	小兒疳積散	小兒驚風散	小兒吐乳散	小兒泄瀉散
小兒疳積散	小兒驚風散	小兒吐乳散	小兒泄瀉散	小兒疳積散	小兒驚風散	小兒吐乳散	小兒泄瀉散	小兒疳積散	小兒驚風散



重校聖濟總錄卷一百七十九

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

小兒門

小兒下痢煩渴

小兒胃風腹脹泄痢

小兒洞泄注下

小兒下痢後脫肛

小兒諸淋

小兒小便不通

小兒大便不通

小兒諸蟲

小兒盜汗

小兒吐血

小兒鼻衄

小兒下痢煩渴

論曰小兒腸胃虛弱水穀不分冷熱相交赤白相雜痢久不差則津液少而內煩虛陽上燥於胸膈故引飲而渴小便利者為欲愈小便不利者則濕歸胃土土氣衰弱不能制濕散溢皮膚而為肘腫久變水病

黃芩飲方 治小兒下痢兼渴不止

黃芩去黑心 栝樓根 黃連去須各三分 烏梅肉一分

焙 訶梨勒煨去核 樗皮炙各半兩 當歸切焙三分

右七味麤擣篩每一錢匕水一小盞煎至五分去滓分溫徐徐令服更看見大小以意加減

甘草飲方 治小兒痢渴不止

甘草炙一分 烏梅肉焙一分 訶梨勒煨去核三枚

右三味麤擣篩每一錢匕水一小盞入生薑二片棗一枚擘破同煎至五分去滓徐徐溫服隨兒大小以意增減

知母飲方 治小兒下痢虛熱煩渴

知母

焙半兩

栝樓根

去須

麥門冬

去心焙各

三分

糯米炒半合

蘆根

剉半兩

右六味麤搗篩每服一錢匕水六分煎至四分

去滓溫服量兒大小加減

烏梅飲方

治小兒下痢兼渴不止

烏梅

去核焙三分

白茯苓

去黑皮

乾木瓜

各一兩

右三味麤搗篩每服一錢匕水六分煎四分去

滓溫服量兒大小增減服

栝樓湯方

治小兒下痢不止煩渴引飲

栝樓根

一兩半剉

冬瓜

皮

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心焙

知母

焙各一兩

粟米

合一

右六味除冬瓜外麤搗篩一二歲兒每服一錢

匕水六分煎至四分去滓入冬瓜汁半合若渴

即徐徐飲服隨兒大小以意加減

茆根飲方

治小兒熱痢煩渴

茆根

龍骨

白茯苓

去黑皮各三分

人參

半兩

麥

門冬

去心焙三分

厚朴

去麤皮生薑汁炙一分

右六味麤搗篩每錢匕水一盞煎至七分去

滓分作二服令溫徐徐服量兒大小以意增減  
榨皮散方 治小兒下痢兼渴

榨皮 炙一兩 栝樓根 剉 白茯苓 去黑皮 人參 各三分

兩半

右四味擣羅為散每服半錢匕粟米飲調下徐  
徐令服隨兒大小增減

訶梨勒煮湯方 治小兒下痢渴不徹腹脹不能  
食

訶梨勒 煨去核 桑葉 二兩  
一兩半 半

右二味咬咀如麻豆每服一錢匕水一小盞煎  
至五分去滓分溫徐徐服量兒大小以意增減  
龍膽丸方 治小兒疳痢不知行數手足逆冷或  
下鮮血渴不止

龍膽 地龍糞 炒令乾 烏梅 去核炒 龍骨 各一兩

黃連 去須二分

右五味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲  
每服三丸三五歲兒五丸並用新汲水下食後  
服日三隨兒大小以意增減

黃耆湯方 治小兒久痢

黃耆 人參 各一兩

右二味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水一小盞

煎至五分去滓分溫二服空心午後各一服隨

兒大小以意加減

人參湯方 治小兒久痢乃腹痛兼渴

人參 桔梗 炒各半兩 當歸 切焙三分 烏梅 去核焙二枚 艾

葉 微炙 黃耆 剉各半兩

右六味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞入

生薑二片同煎至三分去滓分溫二服空心午

後各一服更隨兒大小以意增減

黑豆飲方 治小兒但渴多熱痢不止

黑豆 炒令微熟半合 甘草 炙剉碎半兩

右二味一處用水二盞同煎至一盞去滓分溫

五服徐徐飲之

人參飲方 治小兒夏秋患痢後渴不止變作疳

人參 龍骨 地龍糞 各半兩 烏梅 七枚去核炒乾

右四味麤搗篩一二歲每服半錢匕水七分一

蓋煎至四分去滓分為二服空心午後各一服  
更隨兒大小以意增減

黃蘗湯方 治小兒大熱痢兼渴增損

黃蘗 去麓皮 炙半兩 黃芩 去黑心 一兩 枳殼 去瓢 炒半兩 石膏  
先搗羅為末 一兩 檉皮 炙一分 竹葉 人參 各半兩

右七味判如麻豆一歲兒每一錢七水七分一  
盞煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服  
量兒大小加減服之

栝樓湯方 治小兒有熱不調渴痢不止

栝樓根 判一兩 知母 焙三分 赤茯苓 去黑皮 半兩 黃芩

去黑心 一兩 甘草 炙半兩 人參 三分 黃蘗 去麓皮 炙半兩

右七味麤搗篩一二歲兒每一錢七水七分煎  
至四分去滓分溫二服空心午後各一服量兒  
大小加減服

黃耆飲方 治小兒渴痢

黃耆 判炒 白茯苓 去黑皮 麥門冬 去心 焙 黃芩 去黑  
心各三分 高良薑 炮一分 烏梅肉 焙二枚 去核 白朮 判半兩

右七味麤搗篩每服二錢七水八分一盞煎去



滓取三分空腹溫服

黃連湯方 治小兒渴痢不止壯熱

黃連去須 犀角屑 甘草炙 阿膠炙令燥各半兩

烏梅二枚焙去核 藍葉一分 黃芩去黑心三分

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎去滓取三分空腹溫服

桃皮湯方 治小兒下痢煩渴肘腫

白桃皮 黃連去須炒 龍骨各一兩 丁香一十四粒

右四味麤擣篩每三錢匕水一盞半煎至八分

去滓分溫三服

小兒胃風腹脹泄痢

論曰小兒肌膚腸胃脆弱若解脫不時風邪易侵客於肌肉搏於胃經則為胃風其狀腹善滿食寒則泄診形瘦而腹大蓋足陽明胃之經其支者起胃下口循腹裏下至氣衝故風冷入中則腹善脹大又胃為水穀之海得寒則食物不化氣血虧損故泄痢而形瘦也

胃風湯方 治小兒胃風泄痢腹脹腸鳴



人參 白茯苓去黑皮 芎藭 桂去麤皮 當歸切

白芍藥 白朮各一兩

右七味麤擣篩每服一錢匕水七分一盞入粟

米半匙煎取三分去滓溫服空心食前日二更

量兒大小加減

黃耆湯方 治小兒胃風腹脹下痢

黃耆剉 芎藭 乾薑炮 人參 黃芩去黑

心當歸切 甘草炙剉各半兩 桂去麤皮一分

右八味麤擣篩每服一錢匕以水七分煎取四

分去滓溫服量兒大小增減

木香湯方 治小兒腹胃怯弱風冷入乘泄瀉飲

食全少漸至羸瘦

木香 白朮 生薑炮裂剉 厚朴去麤皮塗

令香 龍骨 當歸 訶梨勒煨用皮

右七味麤擣篩每一錢匕以水七分入棗二枚

擘破同煎至四分去滓食前量兒大小分減溫

服

訶梨勒散方 治小兒胃風泄瀉兩脇虛脹腹痛

不欲飲食

訶梨勒煨用皮厚朴去麤皮塗生薑汁炙令香熟枳殼麩炒

去瓢當歸剉微炒赤芍藥各等分

右五味搗羅為散每服半錢匕米飲調下日三

更量小兒大小加減服之

訶梨勒湯方 治小兒胃風腹脹得冷則泄痢

訶梨勒煨用皮當歸剉微炒黃連去須剉微炒各一兩甘草

炙微赤剉木香 乾薑炮裂各半兩

右六味麤搗篩每一錢匕以水七分煎至四分

去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

厚朴散方 治小兒腸胃風冷泄痢水穀腹脇脹

滿不欲飲食

厚朴去麤皮塗生薑汁炙令香熟黃連去須微炒各半兩丁香


肉豆蔻去殼當歸剉微炒木香 龍骨 白朮

各一分

右八味搗篩為散每服半錢匕以粥飲調下食

前服日三量兒大小加減服之

厚朴散方 治小兒胃風腹脹泄痢脾胃氣不和



羸瘦食少

厚朴 去麤皮塗生薑汁炙令香熟 人參 各三分 白豆蔻 去殼一枚

乾薑 炮裂剉半兩 訶梨勒 煨用皮 白朮 一兩 黃連 去須微炒

地榆 微炙剉各一分 甘草 炙微赤剉半分

右九味擣羅為散每服以粥飲調下半錢匕食前日三四服量兒大小以意加減

調中湯方 治小兒胃風下痢水穀不止羸瘦腹脹不欲飲食

厚朴 去麤皮塗生薑汁炙令香熟 黃連 去須微炒各一兩 木香 半兩

右三味麤擣篩每一錢匕水七分煎至四分去滓不計時候量兒大小分減服之

白朮湯方 治小兒胃風泄痢不止腹脹羸瘦

白朮 三分 赤茯苓 去黑皮 人參 各一兩 當歸 切焙半兩

厚朴 去麤皮塗生薑汁炙令香熟半兩

右五味麤擣篩每服一錢匕水半盞入生薑二片煎至三分去滓帶熱服至夜三四服隨兒大小以意增減

小兒洞泄注下

小兒洞泄注下

論曰小兒下痢不止食已即泄名為洞泄注下此由風邪客於腸胃所致蓋方春之時為風冷所傷藏在肌肉至長夏陰氣方盛或因飲食居處不慎復被風冷入於腸胃其病下痢冷盛則重故為洞泄注下俗謂之水穀痢是也病本於風若甚則變胃風證

草豆蔻湯方 治小兒洞泄不止

草豆蔻 二枚 去皮 高良薑 人參 甘草 乾木

瓜 剖各一分 白茯苓 去黑皮 桔梗 炒各半兩

右七味麤擣篩每一錢半水七分生薑二片同煎至四分去滓分溫三服乳食前各一更量兒大小加減

胃風湯方 治小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛

人參 白茯苓 去黑皮 芎藭 桂 去麤皮 當歸 切焙

白芍藥 白朮 各一兩

右七味麤擣篩每服一錢匕水半盞入粟米少許同煎至三分去滓空心食前熱服更量兒大



小加減

梁米湯方 治小兒洞泄注下水穀不分

梁米 稻米 黍米 各三分 蠟 如半彈大

右四味以東流水二升煮梁米三沸去滓留汁  
煮稻米三沸去滓復以汁煮黍米三沸去滓置  
蠟於汁中和之候蠟消放溫每以半合分為二  
服空心午後各一更量兒大小加減

人參茯苓湯方 治小兒洞泄不調

人參 赤茯苓 去黑皮各一兩半 枳殼 去瓢麩炒 甘草 炙


一兩 黃芩 去黑心 檉皮 二兩半梁州者佳

右六味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水五分煎  
至三分去滓分溫二服空心午後各一兒大者  
稍增之

乾薑丸方 治小兒洞痢晝夜不止

乾薑 炮 人參 黃芩 去黑心各半兩

右三味擣羅為末鍊蜜丸如棗豆大每服三丸  
米飲下空心日午夜臥各一更量兒大小加減  
厚朴湯方 治小兒泄痢不止



厚朴

去麤皮生薑汁炙

黃連

去須各一兩

右二味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水七分入

生薑二片煎至四分去滓分溫二服空心午後

各一更量兒大小加減

調中葛根湯方 治小兒春夏秋冬晨夕暴冷折

其四肢熱不得泄發為壯熱冷氣入胃洞泄下

痢或赤白頻數小腹脹痛脈洪大或數者

葛根

剉

黃芩

去黑心

芍藥

白朮

藁本

去苗

土甘草

炙剉各一分

赤茯苓

去黑皮半兩

大黃

剉炒一兩

右八味麤擣篩一歲以下兒每一錢匕水七分

煎至四分去滓分溫三服食前日三更量兒大

小增減

大安丸方 治小兒脾胃冷氣洞泄注下腹痛嘔

逆腸鳴脹滿大便青白

木香

訶梨勒皮

人參

白茯苓

去黑皮各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙

白朮

烏藥

各一兩

右八味擣羅為末鍊蜜丸如雞頭大每服一丸

溫米飲化下歲數小者半丸

香橘丸方 治小兒洞泄心腹脹痛不思飲食和

胃氣

陳橘皮 湯浸去白 焙二兩 丁香 訶梨勒皮 甘草

炙 青橘皮 湯浸去白 焙各半兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服一

丸生薑湯化下三歲以上二丸

草節丸方 治小兒洞泄不止

無食子 肉豆蔻 去殼各一枚 吳茱萸 湯浸焙 乾炒 黃

連 去須 炒 乾薑 炮 訶梨勒 炮去核 各一錢

右六味搗羅為末湯浸蒸餅心和丸如菉豆大

每服五丸草節湯下乳食 更量兒大小加

減

黃芩湯方 治小兒洞泄下痢壯熱兼渴增損

黃芩 去黑 心 枳殼 去瓢 炒 檉皮 剉 甘草 炙 剉 黃

蘖 去麤皮 炙 剉 各一兩 女萎 石首 碎 栝樓根 竹

葉 切各一兩半 赤茯苓 去黑皮 一兩三分

右十味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分去



滓分溫二服空心晚後各一更量兒大小加減

香連丸方 治小兒腸胃虛寒洞泄下痢腹痛

黃連 去須炒 半兩 乾薑 炮 吳茱萸 湯浸焙乾 炒各一分 肉

豆蔻 去殼 二枚 草豆蔻 去皮 一枚

右五味擣羅為末燒粟米飯和丸如菉豆大每

服七丸乳食前米飲下更量兒大小加減

木香豆蔻丸方 治小兒泄痢不止進食和氣

木香 草豆蔻 去皮 檳榔 剉 陳橘皮 湯浸 去白

焙 青橘皮 湯浸去白 焙各一兩 京三稜 煨擣碎 四兩 肉豆蔻

去殼 五枚

右七味擣羅為末麩糊丸如小豆大每服五丸

至七丸棗湯下更量兒大小加減

豆蔻丸方 治小兒洞泄不止

草豆蔻 三枚 去皮 烏頭 三枚 剉 鹽水 浸少時炒 益智母 去皮

青橘皮 湯浸去白 焙各一分

右四味擣羅為末生薑汁煮麩糊丸如菉豆大

每服七丸煎本瓜湯或生薑湯下乳食前服更

量兒大小加減

附子丸方 治小兒洞泄日夜數十行

附子 炮裂去皮 劑一枚 訶梨勒皮 一枚 白礬 三分燒 令汁盡

甘草 炙半 兩

右四味擣羅為末飯丸如梧桐子大每服三丸至五丸空腹米飲研下

白石脂丸方 治小兒洞泄

白石脂 厚朴 去麤皮生薑汁炙 當歸 剉炒各一兩 乾薑

炮 赤石脂 訶梨勒皮 各三分 陳橘皮 去白焙半

兩

右七味擣羅為末飯丸如梧桐子大每服五丸空腹米飲下

黃連湯方 治小兒忽洞泄不止

黃連 去須一兩

右一味麤擣篩用漿水二盞煎至一盞去滓分

溫四服空心食前一日服盡更量兒大小加減

訶梨勒丸方 治洞泄注下腹脹不思乳食

訶梨勒皮 二錢 炮 青橘皮 去白焙 乾薑 各一分 炮 白豆

蔻 去皮 烏頭 炮裂去皮臍 木香 葶澄茄 各一錢

右七味搗為細末煮棗肉和丸如菜豆大每服七丸米飲下不拘時候量兒大小加減

大黃湯方 治小兒暴冷洞泄注下或乳冷結不消或吐下嘔逆及赤白痢下若中乳或乳母洗浴水氣未消飲兒為霍亂者

大黃 剉炒一兩半 厚朴 去麤皮生薑汁炙 乾薑 炮 桂 去麤皮

皮甘草 炙各一分 當歸 切焙 人參 白茯苓 去黑皮

白木 各半兩 桔梗 微炒三分


右十味麤搗篩一二百日兒用一錢匕水半盞

煎至三分去滓分溫三服二三歲兒每二錢匕水一盞煎至六分去滓分溫二服空心午後各一更量兒大小加減若已服諸利藥胃中虛冷大下如水乾嘔眼白者可去大黃

小兒下痢後脫肛

論曰肛門者大腸之候若小兒大腸虛冷久痢不已軀氣於下裏急後重或致用力則其氣下墜故令肛門脫出是為下痢脫肛之病

鼈頭丸方 治小兒腹中積冷脫肛疼痛不入



鼈頭炙焦 蝟皮炙焦各一枚 磁石煨醋淬七徧四兩

右三味擣羅為末鍊蜜丸如菜豆大每服五丸至七丸溫酒空腹下三歲以上稍增丸數

治小兒下痢久不差肛腸下脫方

用大蜘蛛濕紙裹燒焦存性入麝香少許同研細先用溫湯淋洗肛邊軟綿搵乾糝藥傅之立效

蝮蛇膽丸方 治小兒痢後腸頭脫出

蝮蛇膽去皮湯浸 烏梅焙乾七枚 蕪荑仁炒 黃

連去須各一兩

右四味擣研三味為細末以蝮蛇膽和擣如鞭更加鍊蜜少許和丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下日三更量兒大小加減

黃連丸方 治小兒脫肛

黃連去須 黃蘗去麤皮炙各半兩

右二味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服五丸至七丸早晚食前米飲下更量兒大小加減地龍散方 治小兒因患瀉痢後脫肛不得收

地龍炒 乾薑炮 當歸切 縮沙仁各一分

右四味擣羅為散每服半錢匕生蜜少許和熱

酒調下日三

蛇牀子散方 治小兒脫肛先用洗藥

蛇牀子 藜蘆 槐白枝 苦參 蕪荑仁

白礬各一兩

右六味擣羅為散每用半兩水三升煎取一升

蜜室中洗肛門一日一度仍傳後方黃耆散

黃耆散傳方 治小兒脫肛

黃耆剉炒三分 附子去皮臍生用 桑黃蜜炙熟各一兩 白礬燒

兩半

右四味擣羅為散以新綿搵藥傳之更以手接

入腸頭

治小兒脫肛方

葇荍子炒 橡實五枚 蔓陀羅一枚

右三味擣羅為末乾糝在上以手按入續令噓

噴更不脫下

鼈頭散方 治小兒脫肛

重刊聖濟總錄 卷之二十一 淋瀝 五

鼈頭一枚燒 葇苣子炒三分

右二味搗羅為散先以新甄一片燒赤以醋半升潑之候冷熱得所即糝藥於甄上坐之三兩次即差

黃連丸方 治小兒久痢腸頭挺出

黃連一兩去須微炒 蚘蛇膽半兩 蕪荑一兩微炒

右三味搗羅為末用軟飯和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小以意加減用之

小兒諸淋

論曰小兒諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎為表裏俱主水入小腸下於胞行於陰為小便也腎氣通於陰津液下流之道也若乳食無節悲啼不恒虛實不調則腑藏不和致腎虛而膀胱熱也膀胱津液之府熱則津液內溢水道不通水不止不下停積於胞腎虛則小便澁膀胱熱則水下少澁而且澀致淋瀝不宣故謂之淋又有熱淋血淋氣淋石淋寒淋三焦壅盛移熱於膀胱則溲便

重刊聖濟總錄 卷之二十一 小兒門 三 燕堂

赤者爲熱淋熱甚而搏於血淋流入胞中溺血者  
爲血淋小腹滿溺濇有餘瀝者爲氣淋溺出沙石  
者爲石淋寒淋之病本於寒客下焦餘皆本於膀胱  
有熱令少腹急痛水道不利故數起而不能出  
也

桑白皮湯方 治小兒淋或澀痛小便如血色

桑根白皮

剉焙乾

山梔子人

蘆根

剉

赤茯苓

去黑皮

冬葵子

茅根

剉

甘草

炙各一分

滑石

研入半兩

右八味麤擣篩五六歲兒每服一錢七水一小

盞煎至五分去滓食前日三量兒大小以意加

減

石燕丸方 治小兒諸淋腹中妨悶

石燕子

研

瞿麥穗

梔子人

滑石

研

木通

剉

葵子

海蛤

研各半兩

右七味擣研爲末鍊蜜丸如棗豆大每服十九  
葱白湯下日三量兒大小加減

石韋湯方 治小兒淋或澀痛小便如血

石韋 去毛

赤芍藥

大黃 剉炒

滑石 研

麥門冬

去心 焙

甘草 炙

升麻

各一分

右七味麤擣篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓食前服日三量兒大小加減

車前子湯方

治諸淋澀心煩悶亂

車前子

石燕

麥門冬

去心 焙 各半兩

右三味麤擣篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服

榆白皮湯方

治小兒淋兼石淋

榆白皮

剉 焙

瞿麥穗

各一兩半

右二味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水一小盞煎至五分去滓分溫二服空心日晚各一隨兒大小加減

滑石散方

治小兒小便淋瀝或尿血

滑石

研

車前子

各半兩

右二味擣羅為散二三歲兒每服半錢匕空心粥飲調下近晚再服量兒大小以意加減

木通湯方

治小兒諸淋



木通 剉碎 桑根白皮 剉焙 滑石 研

芒消 葵子 陳者各三分

右五味麀搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓溫服食前日三隨兒大小加減

蜂房散方 治小兒淋

蜂房 炙 亂髮 各三分

右二味同燒灰研令細每服半錢匕米飲調下日三量兒大小以意加減

桂心蜂房散方 治小兒石淋氣淋

桂 去麀皮一分 蜂房 炙半兩

右二味搗羅為散三四歲兒每服半錢匕煎小麥湯或酒調服空心午時各一量兒大小加減銅器盛溺與石俱出

瞿麥丸方 治小兒淋

之麥穗 龍膽 石韋 去毛

桂 去麀皮 皂莢 炙去皮子 鷄腸草 各半兩

人參 各一兩 車前子 一兩一分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服六

九至十九空腹熱湯研下更量兒加減

麥葱湯方 治小兒諸淋閉澀不通

小麥 一合 葱白 兩莖切

右二味以水一盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小加減

葵子湯方 治小兒諸淋

葵子 三分 石韋 去毛 滑石 別研一兩半

右三味鹿藟篩五六歲兒每一錢匕水一小盞棗二枚同煎取五分去滓分溫二服早晚食前

各一量兒大小加減

小兒小便不通

論曰腎主水與膀胱合為表裏膀胱者津液之府其氣下通故能滲泄而作小便或胞絡有熱津液內燥氣不宣暢故水道熱澀甚則不通

石韋湯方 治小兒小便不通

石韋 去毛 瞿麥 各一兩半 滑石 一兩

右三味鹿藟篩五六歲兒每服一錢匕水八分入小麥一百粒同煎至五分去滓溫服如人行

十里再服量兒大小以意加減

葵根湯方 治小兒小便不通二三日悶絕者

葵根

判一握

壁魚

研七枚

右以水一盞煎葵根取汁六分後入壁魚同煎  
五七沸放溫服量兒大小以意加減

神散方 治小兒小便淋閉不通

石燕

一枚先為細末再研

石韋

去毛半兩

右二味為細散每服一字匕煎三葉酸漿草湯  
調下甚者三服差一方有海金沙一兩

冬葵子散方 治小兒小便不通臍腹急痛

冬葵子

滑石

海蛤

蒲黃

各半兩

右四味搗羅為散每服以葱白湯調下半錢匕  
量兒大小以意加減

葱白湯方 治小兒小便澀少妨悶不通

葱白

二莖

木通

冬葵子

各半兩

右三味剉如麻豆大以水二盞煎取一盞去滓  
量兒大小分減服之

滑石散方 治小兒小便淋澀不通及小便血

滑石 研

車前子 各半兩

右二味細搗羅為散如二三歲兒每服半錢匕空心食前粥飲調下日二服

萬安散方 治小兒小便不通欲死

海金沙

滑石

續隨子

炒各半兩

蝮蝮

七枚炒令黑

右四味搗羅為細散每服半錢匕煎燈心湯溫調下空心食前服

木通黃岑湯方 治小兒熱極小便赤澀不通小

便輒大啼呼疼痛

木通

剉一兩

黃岑

二兩去黑心

滑石

一兩半

冬葵子

三分

車前子

二兩

赤茯苓

去黑皮二兩

右六味麤搗篩五六歲兒每服一錢匕以水一中盞煎至五分去滓溫服如人行十里已來再一服更看兒大小以意加減

瞿麥湯方 治小兒小便不通心悶

瞿麥穗

赤芍藥

陳橘皮

湯浸去白焙

牽牛子

炒

木通

剉

冬葵子

各一分

右六味鹿藟篩五六歲兒每服一錢匕水一中  
蓋入葱白一莖擘碎同煎至四分去滓溫服如  
人行十里已來再服量兒大小以意加減

茯苓湯方 治小兒小便不通

赤茯苓 去黑皮 冬葵子

木通 判 車前子 各半兩

右四味鹿藟篩五六歲兒每服一錢匕以水一  
中蓋煎至五分去滓溫服如人行十里已來再  
服量兒大小以意加減

車前草湯方 治小兒小便不通


車前草 細判 小麥 各一兩

右二味用水二盞煎至一盞去滓下粳米少許  
又煮至半盞三四歲兒為三服如人行一二里  
已來再服量兒大小以意加減

七物浴湯方 治小兒小便不通熱發腹滿

滑石 屑二兩 大黃 二兩 雷丸 三十枚 麻黃 一兩  
苦參 一兩 石膏 半兩 秦皮 一兩

右七味鹿藟篩以水七升煮取五升去滓溫浴



重校聖濟總錄 卷一百一十一  
兒避風處先從臍淋之

小兒大便不通

論曰水穀皆入於上焦至中焦而腐熟下焦而化  
出小兒府藏挾熱三焦壅滯津液枯少不能傳道  
實熱之氣歸於大腸故大便燥澀而不通也

大黃丸方 治小兒大便不通

大黃

剉炒一分

枳殼

去瓢麩炒

梔子人

郁李人

炒去雙人皮尖

大麻人

研各三分

右五味搗研為末鍊蜜丸如麻子大一二歲兒

每服五丸熟水下空心午後各一服更隨兒大

小加減

滑石湯方 治小兒大便不通

滑石

研

大黃

剉

冬葵子

甘草

炙各半兩

右四味麤搗篩三四歲兒每服一錢匕水一盞  
入燈心七莖同煎至五分去滓溫服更隨兒大

小加減

橘皮湯方 治小兒大便不通

陳橘皮

去白焙

牽牛子

炒

甘草

炙

大黃 剉炒各一分

右四味麤擣篩五六歲兒每服一錢匕水一小盞入葱白一莖擘碎同煎至五分去滓溫服未通再服更量兒大小加減

木通湯方 治小兒大便不通

木通 剉 大黃 剉炒 陳橘皮 去白焙各一兩

右三味麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓溫服更量兒大小加減  
丹參湯方 治小兒大便不通妨悶

丹參 消石 碎 甘草 炙各一兩

右三味麤擣篩五六歲兒每二錢匕水一盞棗二枚擘破同煎至七分去滓分溫二服更隨兒大小加減

橘皮湯方 治小兒大便不通

陳橘皮 去白焙一分 大黃 剉炒半兩

右二味麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓溫服更量兒大小加減

調中二黃湯方 治小兒大便不通

大黃一兩 剉炒 牛黃研 甘草炙 人參各一分

右四味擣研為末鍊蜜丸如小棗豆大每服二丸米飲化下日再服得利即止

黃連丸方 治小兒風熱壅滯大便秘澀

黃連去須 大黃剉炒各一分 巴豆三粒去心膜皮出油研

右三味擣研為細末麩糊為丸如麻子大每服三丸至五丸臨睡柳枝湯下

代赭丸方 治小兒大便不通

代赭研 丹砂研 大黃剉炒各二兩 木香

當歸焙各一分 桂去麁皮一兩 生犀角銹三分

巴豆炒熟去皮心擣爛一兩半

右八味擣研為末鍊蜜丸如小豆大每服一丸至二丸空心米飲化下六七歲三丸二百日兒半丸但得溏利為度

鼈甲丸方 治小兒大便不通不能飲食

鼈甲錯炙黃去裙襴 防葵 訶梨勒煨用皮

大黃剉 人參 當歸剉焙

郁李人湯浸去皮尖微炒別研入



右七味等分六味搗為細末入郁李人和勻鍊蜜丸如菜豆大粥飲下五丸微利即差

牛黃散方 治小兒大便不通口燥煩赤

牛黃 研一分 大黃 剉炒 甜消 研各一錢


甘草 炙剉 人參 各二錢

右五味搗研為細散每服半錢匕新水調下乳食後服

小兒諸蟲

論曰小兒有九蟲一曰伏蟲長四分二曰長蟲一

名蛲蟲長一尺貫心則殺人三曰白蟲長一寸長至四五寸亦能殺人四曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿五曰肺蟲狀如蠶令人咳嗽六曰胃蟲狀如蝦蟇令人嘔吐喜噦七曰弱蟲又名鬲蟲令人多唾八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴九曰蟯蟲狀如蝸蟲令人下部痒九蟲之中三蟲最甚而為病之尤者莫如蛲皆由小兒氣血不調府藏虛弱或食生冷或嗜肥甘胃中氣緩故生諸蟲居腸胃之間多則為痔劇則為癩或因瘡瘍變成癰疽惡瘡又有



寸白蟲者長一寸色白形小褊因食生魚牛脂冷  
物後飲乳致生此蟲損人精氣令人心腹痛若長  
及一尺亦能殺人凡此諸蟲品類不可悉數皆可  
通以化蟲藥治之欲知蟲證者凡腹痛之脉當沉  
弦若及洪大者蛭也肘外垢聚甚者蟲也

貫衆丸方 治小兒九蟲

貫衆 一兩一分 藿蘆 三兩去長蟲 蕪荑 去肉蟲

狼牙 去胃蟲 各一兩 雷丸 一兩半去赤蟲 蜀漆 去蟻蟲

白殭蠶 去弱蟲 厚朴 去鹿皮 生薑汁 炙去蝸蟲

石蜜 去蛭蟲 各三分

右丸味擣羅爲末鍊白蜜和丸如麻子大每服  
量兒大小加減四五歲以苦酒漿下五丸空腹  
服之以知爲度未知稍加至十九

雷丸散方 治小兒三蟲

雷丸 微煨 芎藭 各半兩

右二味擣羅爲散一二歲兒每服半錢匕五六  
歲兒一錢匕用米飲調下空心服之日三

桃葉自然汁方 治小兒蟻蟲

重校聖濟總錄 卷一百一十九  
三十一  
桃葉 一兩

右一味搗絞取汁空腹服半合

又方

苦楝根白皮

半兩  
細剉

右一味以水一盞煎至七分空腹溫服未差再服

又方

篇蓄

微者一兩

右一味搗絞取汁空腹服半合日再服

藿蘆湯方

治小兒府藏虛弱或因食甘肥致蚘

蟲動作攻心腹痛痛有休止喜吐涎及清水此蟲貫心者死診其病但腹中痛者脉當沉若茲今反洪大卽是蚘蟲

藿蘆

五兩

黍米

二合

右二味麴搗篩以水五盞煮取二盞去滓每服半合空心午後各一服隨兒大小以意加減

使君子散方

治小兒蚘蟲

使君子

盧會

研

乾楝皮

檳榔 剉 蕪荑 各三兩 肉豆蔻 去殼

丁香 苦參 各二兩 膩粉 研少許

右九味擣羅為散每服一字匕空心飯飲調下

萬安散方 治小兒疳渴蟲動心痛

蝦蟇 蛇蛻皮 蟬殼 各一分燒

右三味擣為散用麝香半錢同研每服一字匕

午時溫水調下午後煎柳枝湯洗浴用青紗帛

子蓋之即蟲自出而安

勝金丸方 治諸疳蟲痛

龍膽 定粉 研 黃連 去須 烏梅肉 炒

右四味等分為末鍊蜜丸如麻子大每服十九

米泔下

麝香散方 治小兒諸蟲但是疳蟲並癩

麝香 研一分 夜明沙 一兩

右二味研為散每服半錢匕葱白湯調下

萬全散方 治小兒虵動卒叫如心痛

乾漆 炒烟出一兩 雄黃 二兩

右二味擣研為細散每服半錢匕油一點溫水

調下量兒大小以意加減

白蕪荑湯方 治諸蟲定痛疼抵

棟實 大者二兩 白蕪荑 半兩

右二味麤擣篩每服一錢匕水一盞煎至四分去滓放冷臨發時服

鶴蝨散方 治小兒諸蟲心痛發歇無時止痛殺蟲

鶴蝨 炒黃 檳榔 剉生用 胡粉 炒黃

苦棟根皮 剉各一兩 白礬 燒過一分

右五味擣羅四味為散入白礬胡粉同研勻細每服米飲下一字匕

白蕪荑散方 治小兒寸白蟲

白蕪荑 一兩半 狼牙草 一兩 白歛 半兩

右三味擣羅為散每服一錢匕以苦酒二合空腹調下立差

又方

東行茱萸根皮 四兩 桃白皮 三兩

右二味細剉以酒一升浸一宿去滓一二歲兒

每服半合三四歲兒一合空心午後各一服量  
兒大小以意加減

千金散方 治小兒疳蚘動心痛面伏地臥口吐  
清水痰涎

白檳榔 剉一錢

紫棟根 剉

石榴根皮 剉

鶴蝨 炒令烟出

盧會 研各半兩

右五味搗研為散空心熱茶調下一錢匕更看  
兒大小加減

檳榔散方 治小兒蟲痛頻發面青嘔吐冷痰漸

至肌瘦

檳榔 炒一枚

酸石榴皮 剉

苦棟根 剉

陳橘皮 湯浸去白焙各一分

右四味搗為散每服半錢匕米飲調下食前服

化蟲散方 治小兒蟲痛不可忍

白丁香 一錢

檳榔 剉一枚

雷丸 一錢

右三味搗為細散每服一字或半錢匕米飲調  
下妳食後服

白鮮皮丸方 治小兒諸蟲大啼時作心腹痛

白鮮皮 苦棟根 鶴蝨炒

青橘皮湯浸去白 定粉 石灰各一分

右六味擣為細末麵糊和丸如棗豆大每服十丸煎使君子湯下不拘時

滴金丸方 治小兒蟲動心腹痛

雄黃半兩 白礬三錢 麝香半錢

右三味細研為末粟米飯和丸如麻子大每服五丸煎苦棟湯下

心痛方 治小兒諸蟲

乾漆燒烟出 雄黃研半兩 麝香研一錢匕

右三味擣研為散每服一錢匕煎苦棟湯調下不計時候量兒大小加減

赤石脂丸方 治小兒胃虛蟲動

赤石脂細研二錢 肉豆蔻燒存性一錢

橡實五枚 葇荇子淘去浮者滿五橡實中

右四味將橡實并葇荇一處炒令黑色與赤石脂豆蔻同擣羅為末入蟾酥少許用麵糊和丸如黃米大每服五丸米飲下蟲痛煎苦棟根湯

下小兒泄瀉頻服良

化蟲丸方 治小兒寒氣傷脾蟲痛瀉青黑色減乳食

木香 一分 檳榔 炮二枚 胡粉

苦棟根 鶴蝨 炒各二分

右五味為細末麩糊丸如麻子大一二歲兒每服十九溫粥飲下日二差即止

乾漆散方 治小兒疳蟲腹痛

乾漆 炒烟出 使君子 取肉十枚 燕蕒 一錢半

棟木瓜 東邊皮厚者暴乾去鹿皮一兩

右四味擣為散每服半錢匕量兒大小加減沙糖熟水調下

化蟲丸方 治小兒疳蟲疔刺腹痛

燕蕒 一分 檳榔 剉二錢 鶴蝨 炒半兩

右三味為末獾豬膽丸如麻子大每服五丸量兒大小加減

棟實散方 治小兒蟲痛

棟實 雞糞 等分



右二味為散每服半錢匕冷水調下

鶴蝨散方 治小兒蟲痛面好伏地口吐清水

鶴蝨炒

苦楝根各一分

檳榔剉一枚

車前子

炒一分

使君子

去皮十枚

右五味擣為細散每服半錢匕米飲調下

乾漆散方 治小兒胃虛蟲動吐逆

乾漆

燒出烟一兩

右一味擣羅為散每服半錢匕煎葱白湯調下

立効

小兒盜汗

論曰小兒盜汗者由心氣不足風邪入於陽經陽經虛故也以其眠睡之間盜人氣血故謂之盜汗久不已令兒皮膚虛疎潮熱時作肌肉消瘦治不宜緩

犀角湯方 治小兒盜汗睡中驚啼

生犀角

屑三分

茯神

去木一兩

麥門冬

去心焙一兩半

白木

一分

甘草

炙剉半兩

右五味鹿擣篩每二錢匕以水一小盞煎至五

分去滓分温二服食後臨臥量見大小加減  
故扇散方 治小兒盜汗

故扇 燒灰一分 麻黃 取根節三分

右二味擣羅爲散每服半錢匕乳汁調下量見  
大小加減

芑胡秦芫湯方 治小兒盜汗

芑胡 去苗 秦芫 去苗土 常山

貝母 去心 甘草 微炙 烏梅肉 焙乾

山梔子人 豉 鼈甲 去裙襴醋炙

黃芩 去黑心各一兩 生薑 切 大黃 剉炒各半兩

桃枝 剉 柳枝 剉 葱白 切

薤白 切各一握 糯米 半合

右一十七味麤擣篩每一錢匕水半盞酒二分  
同煎至四分去滓温服早晨午日臨臥各一五  
歲以下分作二服二歲以下分作三服

豬肚丸方 治小兒骨蒸盜汗乳食減少

鼈甲 去裙襴 芑胡 去苗 木香 青蒿 去莖

生乾地黄 焙各一兩 黃連 去須炒二兩 青橘皮 去白焙半兩

右七味擣羅爲末用一枚嫩小豬肚淨洗入藥末在內繫定烝令極爛研和藥末丸如棗豆大每服十九溫水下食前日午臨臥日三更看兒大小加減

青蒿煎丸方 治小兒盜汗肌熱

青蒿 斤切一 甘草 炙剉爲末 杏仁 湯浸去皮尖雙

白蜜 一分 芫胡 去苗爲末 鼈甲 去裙襴醋炙爲末一兩半

右六味用童子小便五升先洗青蒿取一升去滓更煎令如稀餈入酥少許及蜜諸藥末等熬

成煎丸如棗豆大每服十五丸至二十九空心熟水下更量兒大小加減

地骨皮湯方 治小兒骨蒸壯熱肌肉減瘦多困

少力夜多盜汗

地骨皮 秦艽 去苗土 芫胡 去苗 枳殼 去瓢麩炒

知母 焙 當歸 切焙 鼈甲 去裙襴醋炙

右七味等分麤擣篩每服一錢半匕水八分入桃柳心各五枚薑二片烏梅半枚同煎至四分去滓溫服空心臨臥各一五歲以下分作二服

髓甲 芫胡煎丸方 治小兒骨蒸肌瘦盜汗

髓甲 九肋者一枚 去裙襖醋炙 芫胡 去苗 二兩 甘草 炙

杏仁 湯浸去皮 尖雙人研 桔梗 炒各 一兩 胡黃連

當歸 切焙 地骨皮 赤芍藥 各一兩

木香 半兩 黃連 去須 一分 桂 去鹿皮半兩

人參 一兩 麝香 少許 研 酥 蜜 各三兩

右一十六味除酥蜜外擣研為末用青蒿一斤  
剉童子小便五升好酒一升熬蒿至二升去蒿  
入酥蜜再熬成煎候冷入藥末和丸如棗豆大

每服十九米飲下日二服如秋冬合時更入桃

柳心各七枚宜與後方芫胡人參湯相間服

芫胡人參湯方 治小兒骨熱盜汗肌瘦減食

芫胡 去苗 人參 白茯苓 去黑皮 當歸 切

桔梗 青橘皮 去白 芍藥 芎藭

麥門冬 去心 白朮 升麻 桑根白皮

甘草 各一兩

右一十三味並生剉如麻豆大每二錢匕水一  
盞煎至六分去滓分溫二服食後臨臥與前髓

甲芪胡煎丸相間服速効

重湯丸方 治小兒盜汗潮熱往來

胡黃連 芪胡 去苗等分

右二味擣羅爲末鍊蜜和丸如雞頭實大每服二丸至三丸銀器內用酒少許化開更入水五分重湯上煮三二十沸放溫食後服量兒大小以意加減

丹砂散方 治小兒肌熱盜汗

丹砂 研一兩 白礬 熬汁枯 研二錢

右二味再同研勻細每服半錢匕薄荷自然汁調下

芎藭湯方 治小兒心熱盜汗

芎藭 煨剉 大黃 煨剉 羌活 去蘆頭

甘草 炙剉各一兩

右四味麤擣節每二錢匕水一中盞入薄荷數葉同煎至六分去滓分溫二服量兒大小加減

黃連散方 治小兒盜汗

黃連 去須 三分 牡礪 燒研 如粉 貝母 去心各半兩

右三味搗研為末以米粉一升相和令勻如有汗粉兒身

麻黃根散方 治小兒盜汗

麻黃根

雷丸

牡礪

火煨過各一兩半

甘草

炙一兩

乾薑

炮半兩

梁米

半升

右六味搗羅為散以粉兒身體及頭甚驗

小兒吐血

論曰小兒陽氣盛壯上焦有熱伏於肝心二藏播流脉中血得熱則妄行下入胃中胃受之則張滿

與氣俱上衝擊故令吐血

黃連飲方 治小兒心肺百熱吐血

黃連

去須一分

豉

二百粒

右二味將黃連鹿鹿搗篩每服半錢匕水七分入豉二十粒同煎取三分去滓溫服日三更量兒大小加減

治小兒吐血不定方

刺薊

自然汁不計多少

朴消

半兩

右二味先研朴消為末二百日兒及晬兒每服

用刺薊汁調朴消末一字至半錢七日再服更量兒大小加減

大黃湯方 治小兒吐血

大黃 剉炒 黃芩 去黑心 各一分

右二味麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分入黑豆三十粒同煎至四分去滓溫服日三更量兒大小加減

治小兒積熱攻肺卒吐血方

飛羅麵 二兩 生地黄汁 二盞

右二味相和勻暴乾研為末每服半錢匕新汲水調下日三隨兒大小加減

又方

刺薊花 暴乾不拘多少

右一味擣羅為末每用黃牛乳調下一錢匕日三

地黃飲方 治小兒吐血

地黃 一升研取自然汁

右一味一歲兒服半合二三歲每服一合量兒

大小增減日三

又方

蛇退皮 燒灰研細

右一味乳汁調下一字七日三服隨大小加減

小兒鼻衄

論曰小兒體本挾熱舍於經絡血脉揚溢則為鼻衄蓋血與氣循行經脉通於府藏邪熱乘血血得熱則妄行隨氣上溢出於鼻者為鼻衄血虛受熱散漫失度出於七竅者為大衄

玉屑散方 治小兒中熱積驚及時疾後鼻衄

寒水石 研 馬牙消 研各一分 貝母 去心

知母 各一分半 荷葉 一兩水煮七沸焙乾

右五味搗研為細散每服半錢匕蜜水調下食

後

地黃煎方 治小兒鼻衄

生地黄汁 刺薊汁 各二盞 杏仁 湯浸去皮尖雙入麩

炒黃研一兩 阿膠 炙令燥碾為末半兩

右四味同入銀器中慢火熬為煎每服一錢匕



新汲水化下不計時候量兒大小加減

梔子散方 治小兒卒熱毒氣攻腦鼻中衄血不止

梔子人一兩一半生用 槐花半兩生用

右二味擣羅為細散每服半錢匕加至一錢匕熟水調下日三量兒大小加減

絳雪丹方 治小兒陽毒煩躁吐血衄血漸生赤斑


丹砂研半兩 焰消研一兩

右二味各研令細再同研鍊蜜和丸如梧桐子大每服一九沙糖水調化服取下涎即安

刺薊散方 治小兒鼻衄不止

刺薊焙 蒲黃各半兩 亂髮燒灰一分

右三味擣羅為細散每服半錢匕以新汲水調下不計時候量兒大小加減



皇朝聖朝統鑑

卷一百一十九

七

燕邊宮

