



廿二

内閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (31)
函號	300 211







重校聖濟總錄卷二十二

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校
程 勛懋哉校訂

傷寒門

中風傷寒 傷寒濕溫 傷寒時氣

傷寒疫癘 傷寒結胸

中風傷寒

論曰中風傷寒三陽三陰候各不同太陽中風其
脉陽浮陰弱其證發熱自汗蓋陽浮熱自發陰弱

汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風煽煽發熱鼻鳴乾嘔
又曰太陽病發熱汗出脈緩者名爲中風不可燔
灸若以火發其汗邪風爲火熱所劫血氣流溢榮
衛失常兩陽熏灼其身體枯燥但頭汗出齊頸而
還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讞語甚者
至噦手足躁擾循衣摸牀其小便利者可治陽明
中風卽陽明病能食爲中風其證口苦咽乾腹滿
微熱惡寒脈浮若緊下之則腹滿小便難少陽中

風兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可吐吐之則悸
而驚太陰中風四肢煩疼其脈陽微陰澀而長爲
欲愈少陰中風其脈陽微陰浮爲欲愈厥陰中風
其脈微浮爲欲愈不浮爲未愈凡此六經之病其
狀雖異大抵其脈皆浮經所謂浮爲風是也

大青龍湯方 治傷寒太陽中風脈浮緊發熱惡
寒身痛不汗出躁煩

麻黃 去根節煮 桂 去麤皮 甘草 炙各二兩 杏仁 去皮
仁四 石膏 如雞子 十枚 大碎

傷寒門 二

右咬咀如麻豆大每服五錢入生薑一棗大棗二枚同煎溫服取微汗汗多者以溫粉粉之

桂枝湯方 治中風傷寒陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出惡寒發熱鼻鳴乾嘔等疾

桂去麤皮芍藥各三分甘草炙半兩

右每服五錢入生薑一棗大棗二枚同煎溫服以汗為度未汗更服仍作生薑稀粥投之以助藥力

防風湯方 治中風傷寒

防風 麥門冬 山茱萸 大黃 桂去麤皮各

一兩白朮 白附子 牛膝去苗酒浸半夏湯浸七

薑等分同鍋焙芎藭 肉蓯蓉酒浸黃耆 遠志

乾薑炮各三分甘草炙半兩

右每服五錢入生薑一片大棗二枚同煎空心

日三服

石膏湯方 治中風傷寒頭痛四肢癢痛身體沉重

石膏 甘草炙麻黃去根節沫桂去麤皮芍藥

重校聖濟總錄 卷二十三 傷寒門 三

各二兩

右每服五錢入生薑一塊同煎空心温服

薑附湯方 治傷寒巨陽中風項背强齋齋志寒

汗不出

白附子 去皮臍一兩 乾薑 炮 葛根 甘草 炒

桂 去麤皮各三分 芍藥 半兩 麻黃 去根節煎掠去沫一兩半

右每服三錢入棗二枚去核同煎食前温服取

汗未汗再服

桂附湯方 治中風傷寒頭目四肢疼痛惡寒乾

嘔

桂 去麤皮 芍藥 各一兩半 甘草 炙各一兩 附子 去皮臍三分

右每服五錢入生薑一塊棗二枚去核同煎食

前温服以熱粥投之取汗避風

麻黃桂心湯方 治中風傷寒脈浮緊發熱惡寒

身體疼痛汗不出而煩

麻黃 去根節煎掠去沫二兩 桂 去麤皮 甘草 乾薑 炮各一兩

石膏 乾薄葉 杏仁 去皮尖雙仁半兩

右每服五錢入棗二枚同煎食前服

麻黃湯方 治中風傷寒頭痛沉重

麻黃 去根節先煎 去沫二兩 附子 炮製去皮 臍一兩 細辛 去苗葉

乾薑 各三分 甘草 炙 杏仁 去皮尖雙仁各半兩

右剉如麻豆大每服三錢水煎食前溫服日三

桂心湯方 治中風傷寒頭痛發熱胸中氣逆惡

寒嘔噦小便難足冷

桂 去麤皮一兩 芍藥 附子 麻黃 去根節焙各三分 甘

草 炙 杏仁 去皮尖雙仁 半夏 湯浸七徧生薑等分同搗焙 乾

薑 各半兩

右剉如麻豆大每服三錢用葱白三寸生薑一

塊同煎食前溫服日三

桂枝湯方 治中風傷寒初得其外證頭項疼腰

背強壯熱語澀恍惚唾涕稠黏遍身拘急

桂 去麤皮三分 半夏 湯浸七徧生薑等分同搗 附子 菖蒲

麻黃 去根節煎去沫 羌活 細辛 各半兩 白芷 一分 芎

藞 半兩

右剉如麻豆大每服三錢入生薑一塊同煎食

前溫服蓋覆取汗

天麻湯方 治中風傷寒身體反強

天麻 麻黃去根節煎去沫羌活 附子 桂心各半

兩白木各一分杏仁去皮尖雙仁炒細辛 人參一分

右剉如麻豆大每服四錢生薑一塊同煎食前

溫服

二附散方 治中風傷寒頭痛四肢煩疼

附子炮製去皮臍白附子 半夏湯洗炒各一分

右為散每服五分濃煎生薑湯調下不拘時候

得汗即止

麻黃細辛丸方 治中風傷寒頭痛惡寒四肢頂

疼心躁悶

麻黃去根節一兩細辛 人參 白茯苓 甘草

白木各半兩括樓根三分

右研為末鍊蜜和搗丸如鷄頭大每服一九薄

荷蜜湯研下

白朮湯方 治中風傷寒初受病一日至三日頭

痛肢體疼煩躁惡風身熱憎寒

白朮 石膏各二兩乾薑炮半兩五味子炒炙

甘草 人參 芎藭 麻黃 去根節炙 各一兩

右每服三錢生薑三片棗二枚同煎熱服

石膏芍藥湯方 治中風傷寒壯熱肢節疼痛頭

目昏眩咳嗽喘麤

石膏 芍藥 前胡 葛根 芫胡 各一兩

麻 荆芥穗 桑根白皮 黃芩 各三分

右每服三錢水煎稍熱服

前胡湯方 治中風傷寒頭目昏眩壯熱肩背拘

急疼痛

前胡 去蘆頭 蔓荆實 去白 芎藭 麻黃 去根節煎去沫

乾菊花 防風 羌活 白茯苓 石膏 碎

甘草 各三分 枳殼 麩炒四兩 黃芩 一兩半

右每服三錢生薑二片水煎溫服

石膏獨活湯方 治中風傷寒頭痛體疼發熱惡

寒

石膏 碎一兩 麻黃 羌活 去蘆頭 獨活 甘草 炙

天南星 炮 青橘皮 麩炒 枳殼 麩炒 乾薑

芫胡 益智皮 桂心 各半兩

右每服三錢葱白二寸豉七粒同煎執服蓋覆出汗

荆芥湯方 治中風傷寒頭目昏眩憎寒壯熱四肢煩倦

荆芥穗 木通各四兩 羌活 芎藭 甘草炙

一兩麻黃去根節 獨活一兩

右每服三錢水煎温服

前胡白朮湯方 治中風傷寒百節痠疼

前胡 白朮 防風各二兩 芫胡 薰草 白

薜皮各一兩半 石膏三兩 麻黃四兩 甘草一兩

右每服三錢入薄荷葉五片同煎温服

百解湯方 治中風傷寒身熱頭痛肢體煩痛

前胡 芫胡 甜葶藶微炒 半夏湯浸七遍 麻黃

去根節羌活 獨活 桔梗 人參 陳橘

皮浸去白朮 枳殼麩炒 甘草炙 芎藭

石膏碎 杏仁 白茯苓各等分

右每服三錢入生薑三片同煎温服不拘時候

傷寒濕温

論曰傷寒有五其一為中濕蓋風濕之氣中人為病發熱與溫病相類故曰濕溫也此因汗出當風或因取冷過度致陰濕氣襲入肌膚流傳經絡其證喜汗出關節疼痛發熱而煩小便不利大便反快是謂中濕若風濕相搏則一身盡疼日晡即劇微熱相蒸則身必熏黃凡治風濕者欲其微汗即風氣解而濕自去濕甚者當利其小便不可大發汗大汗則風去濕在其病不去亦不可下之下之早則歲下之而利不止即死診其脈當沉而細難

經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急是也

麻黃湯方 治濕溫病一身盡疼發熱日晡即劇

此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去根節 三兩 杏仁 去皮尖雙仁 三十枚炒 薏苡仁 一兩

甘草 炙 一兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服

桂枝附子湯方 治傷寒八九日風濕相搏身體

疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而畚者桂

枝附子湯主之若其人大便堅小便自利者未

附子湯主之

桂去麋皮附子三枚甘草炙二兩

右咬咀每服五錢入生薑五片棗二枚煎熱服

白朮附子湯方

附子炮製去皮白朮四兩甘草炙二兩

右剉如麻豆大每服五錢入生薑五片棗二枚同煎溫服初一服其人身如痺半日許復之服三服後其人如冒狀勿怪此以附子朮併走皮中逐水氣未得除故使之然耳法當加桂四兩此

本一方二法以大便堅小便自利故去桂也以大便不堅小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之

甘草附子湯方 治風濕相搏骨節疼煩掣痛不

得伸屈近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草炙二兩附子二枚白朮三兩桂心四兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服初服得微汗則解能食汗止復煩者少減服之千金方



身腫者加防風四兩悸氣小便不利者加茯苓三兩既有附子今加生薑三兩

治濕家身煩疼麻黃湯加白朮四兩發其汗為宜

慎不可以大攻之方

麻黃

三兩

桂心

二兩

甘草

炙一兩

杏仁

去皮尖

雙仁七

十枚白朮

四兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服取微汗

則解

治風濕脈浮身腫汗出惡風者防已黃耆湯方主

之

防已

四兩

黃耆

五兩

甘草

炙一兩

白朮

三兩

右咬咀如麻豆大每服五錢入生薑半兩大棗

二枚同煎溫服日三喘者加麻黃胃中不和者

加芍藥氣上衝者加桂下有陳寒者加細辛服

後當如蟲行皮中腰以下如冰後坐被上又以

一被遶腰下溫令微汗差

杏仁湯方

治風濕身體疼痛惡風微腫

杏仁

去皮尖

雙仁

炒二十五枚

桂皮

去麤皮

麻黃

去根節

先煮

一兩焙乾

芍藥 天門冬

去心焙
各一兩

右咬咀如麻豆大每服五錢入生薑半分同煎服

溫風丸方

治濕溫傷寒身涼脈短日逐有汗者

下虛上攻頭目昏痛

白附子

陽起石

滑石

各一兩

寒水石

四兩
燒

右擣羅研末用糯米粥飲和丸如梧桐子大每服二十九丸用荆芥木香湯下

安息香丸

治濕溫傷寒四五日後汗出肢體冷

安息香

一分

五靈脂

二兩

麻黃

去根
半兩

附子尖

七箇

巴豆

去皮醋
煮半兩

右擣羅四味為末研巴豆為膏入眾藥和丸如彈子大每服一丸麩炭上燒存性生薑湯化下

傷寒時氣

論曰春溫夏熱秋涼冬寒是為四時正氣非其時有其氣人或感之病無分少長率相似者謂之時氣如春應溫而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱當冬而溫是也其候與傷寒病相類但可汗可

下之證比傷寒温病藥之宜輕爾

葛根湯方 治時氣二三日不解頭痛壯熱惡寒

葛根一兩 麻黃去根節 炙二兩 陳橘皮湯浸 去白 甘草炙

黃芩 知母 杏仁去皮尖雙 仁各一兩

右每服三錢入生薑二片同煎温服

石膏湯方 治時氣頭痛壯熱

石膏二兩 葛根 梔子仁 芫胡 赤芍藥

各一兩 炙半兩 甘草

右每服五錢入生薑一棗大同煎温服不拘時

前胡湯方 治時氣壯熱頭痛嘔逆

前胡 知母 犀角 赤芍藥各一兩 石膏二兩

右每服五錢生薑半分葱白二寸同煎温服不拘時候

七聖湯方 治時氣頭痛壯熱肢體煩痛

麻黃去根節 焙三兩 蒼朮炒二兩 橘皮湯浸 去白 木通各一兩

桔梗一兩 半 山茵陳一兩 甘草炙二兩

右每服三錢生薑三片同煎温服

人參湯方 治時氣傷寒渾身不仁疼痛壯熱不

解

人參 赤茯苓 白朮 乾葛 甘草 麻

黃 去根節煮去沫一兩半

右每服三錢入葱白豉鹽各少許同煎溫服

八神湯方 治時氣一二日頭痛壯熱心神煩悶

麻黃 一兩炙 大黃 當歸 甘草 白朮 山

梔子仁 各半兩 芍藥 荆芥穗 各一分

右每服三錢入薄荷一葉葱白一寸生薑二片

同煎熱服

芫胡湯方 治時氣一日至三日頭痛壯熱心神

煩悶

芫胡 去苗 石膏 碎 麻黃 各一兩炙 甘草 各半兩

右每服三錢入豉三十粒葱白二寸同煎熱服

併三服汗出效

山茵陳散方 治時行身熱頭疼四肢痠痛

山茵陳 四兩 蒼朮 米泔浸一宿去皮炒三兩 麻黃 去根節炙一兩

石膏 各一兩

右擣羅為散每服二錢葱茶清調下連併三服

衣蓋取汗

麻黃厚朴湯方 治時行憎寒壯熱骨節煩疼頭

疼項強

麻黃去根節尖厚朴去麤皮甘草剉大黃

剉各四兩

右每服三錢入生薑三片葱白二寸豉二十粒

同煎熱服連三服汗出立愈

清涼散方 治時氣頭目昏疼久積熱毒鼻口出

血

麻黃炙大黃芍藥各一兩

右為細散每服一錢沙糖冷水調下食後服

人參乾葛湯方 治時行表不解壯熱惡寒

人參乾葛白芍藥桔梗炒各一兩赤茯苓

三分炙甘草木香各半兩麻黃依前炙三分

右每服三錢水煎熱服併三兩服溫覆出汗

大安湯方 治四時傷寒頭疼遍身壯熱口舌苦

乾

麻黃去根節尖惡實炒各三兩甘草二兩人參

赤茯苓

各半兩

天門冬

麥門冬

各一兩

右每服三錢生薑三片棗二枚同煎溫服併三

服取汗差

五解湯方

治時氣頭痛五心煩熱語言狂亂

麻黃

去根節煮去沫二兩

白朮

桔梗

杏仁

去皮尖雙仁

越桃

半生半炒各一兩

右每服三錢豉七粒葱白一寸生薑三片薄荷

五葉同煎熱服汗欲二服被蓋覆差

茵陳麻黃散方

治時氣頭痛壯熱或暑毒伏心

狀如瘧疾

山茵陳

四兩

麻黃

去根節五兩

石膏

一兩

蜀椒

去目

并合口者炒出汗

蒼朮

水浸去麤皮二兩

右爲細散每服二錢熱茶調下如狂言熱躁沙

糖冷水調下

白朮湯方

治時氣出汗吐下後四肢羸劣嘔逆

減食

白朮

炒一兩

厚朴

生薑汁炙

黃耆

細剉

人參

白茯苓

苓

桔梗

橘皮

湯浸去白

桂

甘草

炙各一兩

右每服五錢水煎温服

麻黃大黃散方 治時氣頭痛壯熱三日宜服

麻黃炙一兩 大黃 桂 黃芩 甘草炙 芍

藥 乾薑炮各一兩

右爲散每服三錢煖酒調下衣被蓋取汗

桂枝湯方 治初得傷寒時氣

桂去麤皮 甘草炙 芍藥 乾薑各半兩 杏仁去

尖雙仁炒 麻黃去根節一兩

右每服三錢水煎併兩服以衣蓋取汗透

五苓散方 治時氣解表出汗

赤茯苓 桂 豬苓去黑皮半兩 澤瀉 白朮一分

右爲散每服五錢以新汲水調頓服訖以葱豉

粥投之衣蓋取汗

葱白湯方 治時氣傷寒發汗

葱白研二兩 生薑二兩 豉一合 細茶末二錢

右以水二盞煎葱并薑至一盞半次下豉煎少

時卽入茶末去滓頓服後衣蓋取汗

解表湯方 治初得傷寒時氣壯熱頭痛

甘草 炙二兩 生薑 二兩 黑豆 二合

右每服五錢煎頓服厚衣蓋覆取汗

附桂散方 治傷寒時氣

附子 去皮各半 桂 各半

右為散每服三錢熱酒調頓服厚衣蓋覆取汗

前胡湯方 治和養三焦調順陰陽升降痞滯祛

遣寒邪溫中散寒煖胃和脾滋助氣血思美飲

食虛寒痼冷痰癖動氣心膈疼痛噎悶嘔逆一

切氣疾不日全愈

前胡 芫胡 秦艽 甘草 炙各半斤 懷香子 炒

木香 桂 去麤皮各一斤 檳榔 十枚 白豆蔻 去殼半斤

芍藥 半斤 青橘皮 半斤 芎藭 半斤 甜葶藶 半斤

微炒 桔梗 四兩

右每服三錢大棗二枚同煎食前溫服

苦參湯方 治時氣熱病狂言心躁

苦參 不拘多少

右焙燥麤擣篩每服二錢水煎連三服差

傷寒疫癘

論曰人居天地間稟氣於陰陽氣和則安氣盪則病故一歲之內節氣不和寒暑乖候皆為疫癘之氣感而為病故名疫癘其狀無問長少率皆相似俗又名天行其病與時氣溫熱等病相類治各隨其證以方制之

神白散方 治疫癘頭痛壯熱惡寒不解

白朮炒二兩 桔梗 細辛各一兩 附子二兩 烏頭四兩

右擣羅為散以絹囊盛帶之居閭里間皆無是

病疫癘者溫酒服方寸覆取汗或得吐即差若

經三四日抄三錢水二盞煎一盞半分溫三服

前胡湯方 治時行疫癘壯熱咳嗽頭痛心悶

前胡 升麻 麥門冬 貝母去心 紫苑去苗

土杏仁去皮尖雙仁 甘草炙一分 石膏一兩一分

右每服三錢竹葉二七片同煎溫服不拘時候

七物赤散方 治傷寒辟毒氣疫癘

丹砂研 烏頭各二兩 細辛 羊躑躅 乾薑

炮白朮各一兩 括樓兩半

右為散每服半錢温酒調服汗出解不解增至一錢

麻黃湯方 治時氣疫癘病頭痛體熱渴躁百骨

節疼痛

麻黃去根 葛根各一兩 黃芩 梔子仁 芍藥

杏仁去皮尖雙仁各三分

右每服三錢入豉五十粒同煎温服

葛根湯方 治時行疫癘兼風熱目痛心中妨悶

葛根一兩 芍藥三分 葱白三莖 豉半合

右用水三盞煎至盞半去滓分温二服

石膏湯方 治時行疫癘病壯熱頭痛唇乾

石膏一兩 葛根三分 芍藥 貝母 百合

升麻各半兩 梔子仁 甘草炙各一分

右每服三錢豆豉五十粒葱白三寸同煎服

麻黃解肌湯方 治時行疫癘一二日頭痛壯熱

煩躁

麻黃去根 升麻 甘草 芍藥 石膏 貝

齒燒一分 杏仁去皮尖雙仁炒半兩

右每服五錢水煎溫服不計時候

桂心湯方 治時行疫癘病未經汗下體熱煩悶

桂心三分 芍藥一分 麻黃去根節 杏仁炒 黃

芩 甘草炙各半兩

右每服三錢生薑三片棗二枚同煎去滓溫服

前胡湯方 治時行疫癘壯熱惡寒食即嘔吐

前胡 生乾地黄 麥門冬 陳橘皮湯浸去白

甘草炙 人參各半兩

右每服三錢竹葉七片同煎去滓溫服

苦參湯方 治時行疫癘發表攻裏不盡形證尚

在其人垂死不瘳者

苦參二兩

右每服三錢酒一盞煎至半盞頓服即差

芫胡湯方 治時行疫癘病數日未得汗渾身壯

熱嘔逆不下飲食

芫胡一兩 麻黃一分 升麻一分 桂心三分 大

黃一分 甘草一分 鼈甲醋炙去裙襴 枳實炒

知母焙各三分 梔子仁一分

右每服五錢入生薑三片同煎溫服

沉香丸方 治時行瘟疫惡氣熱毒攻心脇氣滿
脹急及注忤鬼氣

沉香 丁香 薰陸香各半兩 犀角屑 升麻

木香 羚羊角屑 黃芩 梔子仁各二分

麝香研一錢 鬼臼一分 芒硝 大黃炒各一兩

右研為末令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十
丸至二十丸米飲下

芫胡湯方 治時行疫癘一二日頭痛壯熱

芫胡二兩 芍藥一兩 梔子仁 黃芩各半兩 石

膏 葛根各一兩

右每服五錢葱白三寸豉三十粒同煎溫服不
計時候

葱豉湯方 治疫癘病始得之頭疼壯熱

葱白三莖 豉一合 蜀椒四十九粒去目并合口者炒出汗

右水煎頓熱服汗出差未汗出再煎服

救生散方 治疫癘壯熱煩躁頭痛體疼

人參 五味子 白朮各半兩 麻黃三兩 桂去

皮厚朴薑汁炙 大黃一兩 附子炙半兩 甘草炙半兩

右為散每服二錢新汲水調下後用熱水嗽良久吃生薑熱茶一盞投以衣被覆之如陽毒汗出陰毒瀉下立差

蒼朮湯方 治天行時疫三二內未經汗下


蒼朮炒五兩 豉三兩 麻黃去根節二兩

右每服三錢水煎熱服蓋覆出汗未汗再服差

傷寒結胸

論曰傷寒病發於陽下之早邪毒之氣結聚於胸

膈故名結胸其證心下堅鞭按之則痛項強如柔瘕狀或從心下至少腹堅滿而痛其痛不可近其脉寸口浮關上自沈是其候也若正在心下按之即痛而脈浮滑亦名結胸凡此本太陽病脈浮而動數醫反下之胃中空虛客氣動膈令人短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下堅滿則為結胸又或因得病三二日不能臥但欲起者心下必結若脈微弱者此素有積寒而反下之利止作結胸但下之而脈浮者必結胸皆當下之脈促者不為結胸



也脉若浮即不可下下之则死结胸證具而煩躁者亦死又有水結在胸脇者又有藏結者結胸無大熱為水結似結胸狀飲食如故時時下利陽脈浮關脈小細沉緊者為藏結舌上白胎滑者為難治若心下痞堅按之不痛者非結胸乃痞也宜審察而各依其法治之

陷胸丸方 治傷寒結胸心下堅實大便不利

大黃

醋炒

葶藶子

膈經炒

杏仁

炙各二兩

朴硝

一兩研細

與杏仁同研令如膏

右為末再同研勻入少鍊蜜和更杵三五百下為丸如彈子大每服一丸別入甘遂末半錢蜜一合水煎溫頓服之一宿乃下如不下更服取
下為效

大陷胸湯方 治傷寒結胸頭項強心下痛按之

實鞭

大黃

醋炒二兩

甘遂

濕帟裏煨一錢

朴硝

另研二兩

右各搗研為末每服用水一鍾入大黃末二錢次下朴硝末一錢同煎一二沸次下甘遂末一

字攪勻溫服取快利為度

小陷胸湯方 治傷寒小結胸病正在心下按之

則痛脈浮滑者

黃連去鬚半夏湯浸七遍栝樓實大者一枚

右各細判先以水五盞煎栝樓實取三盞去滓

入黃連半夏各一分煎取一盞分溫三服

葶藶散方 治傷寒結胸心悶汗出

葶藶子隔帛炒大黃醋炙檳榔 桂 陳橘

皮浸去赤茯苓 甘草各一分

右為散每服二錢空心溫熱水調下

治傷寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯用

前方白散亦可服之

桔梗炒三分巴豆去皮心熬黑貝母去心三分

右除巴豆外擣羅為散入巴豆合勻每服強人

半錢弱羸之人減之並溫熱水調服病在膈上

必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利不止進

冷粥一盃身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水

溼之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩

假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

葶藶湯方 治傷寒結胸心下痛如石堅鞭小便

不利

葶藶子 隔帝炒三分 檳榔 半兩 桑根白皮 三分 杏

仁 去皮尖雙仁炒 大黃 醋炒各半兩 朴硝 三分

右每服五錢水煎食前温服

增損理中丸方 治傷寒下後虛氣不理毒復上

攻毒氣相搏結於胸中縱不下者毒已入胃胃

中不通毒還攻上心中結滿厥逆欲絕心起高

胸手不可近當先理其氣

人參 白朮 甘草 炙 括萎根 枳實 炒

去瓢 赤茯苓 去黑皮 牡蠣 熬各二兩 乾薑 一兩半

右搗羅為散鍊蜜和丸如彈子大每服一丸熟

酒化下不歇再服不過五六丸胸中豁然

陷胸青龍湯方 治傷寒結胸毒氣內盛手足逆

冷腹脹喘急大便不通

牽牛子 微炒一兩半 人參 三分 陳橘皮 浸去白半兩 桂

檳榔 各一兩 大黃 醋炒半兩 朴硝 一兩

右每服五錢入生薑半分同煎食前溫服

大黃桔梗湯方 治傷寒熱病飲水結胸鞭滿

大黃 醋炒二兩 桔梗 炒一兩 甘草 炙 朴硝 各半兩

右每服五錢水煎食前溫服

大金鍼丸方 治傷寒結胸氣逆手足厥冷嘔逆

不定

陽起石 不灰木 阿魏 研各半兩 巴豆 二十五枚去皮

心膜不出油研 杏仁 二十五枚去皮尖雙仁

右擣羅為細末用粳粟米飯為丸如彈子大每

服一丸用鍼穿燈焰上燒烟絕為末生薑米飲

調下以利為度

泥金丸方 治結胸傷寒心下痛按之實鞭

木香 丁香 大戟 麩炒各一分 附子 去皮

臍一枚 紫苑 三錢 黑牽牛 一錢半 膩粉 三錢 硫

黃 兩 檳榔 大者一枚 水銀沙子 三錢 巴豆 去皮

用胡餅麩裏慢火燒熟去皮不用二十粒

右研為末再和令勻鍊蜜為丸如鷄頭大看虛

實每服一丸爛嚼燒生薑一塊子同嚥下藥不

得嚼

大戟散方 治傷寒結胸已轉下不除者

大戟炒 甘遂炒各一兩 膩粉半兩 硫黃研一分 水

銀蓋子內同與硫黃研作砂子半兩

右研為散再同研勻每服二錢溫漿水調下

越桃丸方 治傷寒結胸逐利熱

越桃暴乾各一分 大黃生半兩 鬱金二錢 白牽

牛取末五兩 膩粉三錢 郁李仁去皮研一兩 丹砂研一分

巴豆霜研五錢

搗研為末調水丸如小豆大每服一丸蜜水下

陷胃散方 治傷寒結胸伏陽在裏心下堅鞭按

之則痛

前胡 甘遂炒 甜葶藶隔紙炒 大黃炒 杏

仁浸去皮尖雙仁炒 馬牙硝研各一兩

右研為末每服一錢生薑蜜水調下更看虛實

加減

宣毒丸方 治傷寒結胸心下堅鞭

大黃 白牽牛炒各一兩 滑石 朴硝 甘遂炒

郁李仁 去皮尖炒 大戟 一分 續隨子 去皮煮研半兩

右研為末鍊蜜和丸如彈子大看虛實以龍腦

蜜化下一丸

大通散方 治傷寒結胸及瘡疹後毒氣攻心咳

嗽喘急

甘遂 一分 麩炒 生地黃 一兩與甘遂同擣焙乾 檳榔 二枚 麥

藥 炒半兩 鉛白霜 研一分

右研為末看虛實用龍腦漿水調下半錢

金鍼丸方 治傷寒陰氣結伏在胸膈 虛痞 或痛不

可忍者

不灰木 二錢 陽起石 各一錢 阿魏 各一錢 白丁香

丹砂 乳香 膩粉 各一錢半 硫黃 一分 巴豆 去心

膜出油 二七粒

右研勻細糯米粽子丸如梧桐子大每服五

丸至七丸丁香湯下不拘時候

隔毒丸方 治傷寒結胸心下堅痛

郁李仁 去皮 黑牽牛 炒 大戟 甘遂 各二分

牛黃 研 乳香 研各一錢 麝香 研 龍腦 研各半錢

右研為末同再研勻用白麩糊和丸如梧桐子大每服七丸煎燈心小麥湯下臨臥服

聖餅子散方 治傷寒結胸

甘遂 大戟 去皮半下 黑牽牛 生用兩半 輕粉 一錢

粉霜 一錢 巴豆 去皮醋煮十四枚 水銀 一錢入錫錢結砂

子

右先將前三味為末入白麩五錢水和作餅子文武火煨焦黃再為末入後四味拌勻水和為丸如棗豆大捏作餅子每服三餅茶清下

宣風丸方 治傷寒結胸熱氣蘊蓄

大黃末 黑牽牛子 末 郁李仁 去皮研各半兩 巴

豆 一分去心皮膜油燥研

右擣羅為末鍊蜜和丸如棗豆大看人虛實生薑蜜水下丸至二丸

金黃散方 治傷寒結胸心下堅滿

黑牽牛子 大黃 末各一錢 鬱金 胡黃連 末各半錢

右四味作一服入膩粉一錢新水調下傷寒四五日後結胸可服或吐或瀉或汗出即愈小兒

