

附褚氏遺書

康壽珍藏

邯鄲遺稿下

邯鄲遺稿卷之四

趙養葵先生原本 吳趨吳升元一校刊

產後

一凡新產婦人氣血大損諸事必須保重切不可持健勞碌致內傷外感六淫七情諸症爲患莫測故產後症先以大補氣血爲主雖有他症以末治之或欲去邪必兼補劑爲當不宜耑用峻厲再損血氣也

一或問產後症丹溪云當大補氣血爲主雖有雜症以末治之又云產後中風切不可作中風治用風藥然則產後不問諸症悉宜大補氣血乎曰詳主末二字其義自明虛而無他症者合宜大補氣血自愈或因虛而感冒風寒者補氣血藥帶驅風之劑或因脾虛而食傷太陰者補氣血加消導之劑或因瘀血惡露未盡而惡寒發熱者必先逐其瘀血然後

大補經曰有本而標之者有標而本之者又  
曰急則治標緩則治本丹溪之主末二字卽  
標本之意也

一新產婦脈訣歌

新產之脈緩滑寧 實大弦急死來侵  
俱要沉重小者吉 忽然堅牢命不停  
寸口澁疾不調死 沉細附骨不絕生  
審看此疾分明記 方知醫者有神靈

大凡新產之後血氣衰弱脉必沉細緩滑為正  
實大弦牢堅急不調為反正則吉反則凶

一產後切勿側卧免致敗血流經若流至膝輕  
則無妨重則生癱其症難愈豈可不慎也哉  
一總生產時切戒飲酒臟腑皆虛不勝酒力多  
致眩暉宜用黑豆炒出烟同羌活入酒煎飲  
之避風邪養氣血下惡露行乳脈也

一產婦胞衣不下惡露不盡攻冲心腹刺痛或

血暈神昏眼黑口禁宜服黑神散若臨產難  
生及胞衣不下血暈不省人事者敗血冲攻  
心腹刺痛語言狂妄困頓垂死宜用琥珀黑  
龍丹若敗血攻心迷暈或胞衣不下胎死腹  
中垂危者但心頭煖急以童便調花蕡石散  
服之不能服者灌之若胞衣不下寒熱腹痛  
以五箇散去茯苓麻桔主之

黑神散

大熟地

白芍

肉桂

蒲黃

當歸

乾薑

黑豆炒

酒煎入童便服

琥珀黑龍丹

五靈脂

當歸

地黃

川芎

良薑

右入砂鍋內用赤石脂紙筋鹽泥封固濟  
火煅紅去火候冷取去黑色研細入後藥

琥珀

乳香

百艸霜

花蕊石

生硫黃

右研細末入前藥和勻用醋煮和為丸每  
服時用炭火煅紅投入姜汁浸碎以酒童

便調服

花蕊石散

花蕊石一斤煅透

硫黃四兩

右二味拌勻入瓦罐內將泥固口候乾放

磚上以炭火煅經宿候冷取出為末童便

調服

五箇散

肉桂 紫蘇

香附

藿香

厚朴 半夏

白芷

川芎

大腹皮 甘艸

陳皮

枳殼

乾薑 茯苓

桔梗

麻黃

芍藥

一因墮胎胞衣不出及胎死腹中宜牛膝散或  
大黃醋熬成膏為丸醋湯下

牛膝散

牛膝

桂心

赤芍

桃仁

元胡索

當歸

川芎

木香

丹皮

水酒煎服

凡胞衣不下稍久困倦敗血流入胞中因血脹  
滿冲心喘急疼痛危篤先用物繫住臍帶然

後斷之否則胞上掩心危在頃刻須令產母  
口啞髮尾得嘔噦即時下矣或單將草麻子  
搗爛塗脚底若胞下隨即洗去如遲恐傷母  
腸亦下慎之如胞無冲掩等患雖延數日亦  
不害人止要產婦安心終自下也

一產後中風中氣口噤湯藥不能下者用舊油  
編箕燒存性為末擦其牙根即開應驗然後

主意用藥

一婦人分娩昏冒瞑目因陰血暴亡心神無所  
養心與色絡君火相火也得血則安亡血則  
危矣火上熾故令人昏冒火乘肺令人瞑目  
不省人事是陰血暴亡不能鎮撫也經云病  
氣不足宜補不宜瀉瞑目合眼病悉屬陰暴  
去有形之血則火上熾但補其血則神自安  
心得血則能養而神不昏迷矣

一產後滿急神昏口噤不省人事宜破血行血

以黑神散四烏湯琥珀黑龍丹花蕊石散擇  
而用之

四烏湯

當歸

川芎

香附

白芍

烏藥

陳皮

甘艸

餘方見前

一產後用心使力過多虛暉宜補氣血之藥加  
香附薑棗煎服即愈

一產後子腸不收急用枳殼煎湯服即收若素  
多風疾因產乘虛作暈以四烏湯加羌活防  
風方見前

一產後下血過多虛暈神昏煩亂當補其血服  
清魂散

清魂散

人參

澤蘭

荆芥

川芎各一錢

甘草五分

一產後眩暈卒然間難辨其虛實但以勿問散  
治之如餽悶加陳皮蘇子  
勿問散

川芎

荆芥

歸尾

元胡索

丹皮

澤蘭

山楂

貝母

煎好冲入童便服

若血暈昏迷不省冲心悶絕此宜行血醒血理  
之以荆芥散或鹿角散或五靈四物湯主之

荆芥散

荆芥用麻油少許灯艸燃灯以荆芥燒

焦色為末童便調服

鹿角散

鹿角四兩燒灰存性為末

童便酒調下

五靈四物湯

五靈脂半生半炒

地黃川芎當歸

白芍

川芎窮

一產後血暈因氣暴虛痰火汎上作暈以二陳  
湯加貝母竹瀝薑汁童便凡導痰隨氣血加  
減氣虛加氣藥血虛加血藥或以十全大補  
湯加橘紅黃芩黃連

二陳湯

半夏

陳皮

茯苓

甘草

十全大補湯

人參

白朮

茯苓

甘草

熟地當歸

川芎

白芍

黃芪

肉桂

一產後血氣上攻心腹刺痛悶亂宜元胡散加

烏附或用琥珀散治之

元胡散

元胡索

當歸

川芎

赤芍

艾葉

枳殼

桃仁

橘紅

熟地

官桂

生薑

琥珀散

琥珀

蒲黃

赤芍

當歸

延胡索

香附

丹皮

沒藥

木香

蓬术

桂心

烏藥

一產後敗血冲心或歌舞或罵詈或笑怒或踰  
垣咬打神名佛號無一不知似有鬼祟之狀  
此病五死五生宜龍齒清魂散治之

龍齒清魂散

龍齒

遠志

肉桂

人參

附子

當歸

茯神

麥冬

細辛

元胡索

甘艸

黃金

紋銀

生薑

大棗

煎好調麝香一錢服之或將金銀薑棗先  
一煎百餘滾調入麝香一錢在內前藥煎好  
一並服之

一產後敗血沖心衝胃此是危症冲胃則絕悶

嘔逆冲心者則顛狂錯亂速急用藥多主不  
效不可不知

一產後口中暴溢血者名曰暴血冲心宜元胡  
散治之若經惡露已盡日久而嘔嗽出血者  
治法與常人同

一新產禁用芍藥因酸寒能伐發生之氣若腹  
痛非芍藥不能止以酒炒用則不妨若以醋  
炒猶能治兒枕塊痛酸以收之之意也如補

虛時黃芪可代

一產後敗血腹痛寒熱名曰兒枕痛也若無塊  
輕以四烏湯治之若有塊重則以醋筒散治  
之須量人虛實而用大抵產後禁用棗术二  
味必元氣實者方可用之若瘦弱者只可服  
四烏湯若不效嗽加官桂此須亦可以行血  
倘飲食不進而四烏湯不濟事乃用醋筒散  
治之然亦不宜多服

醋箇散

氣本不宜發服

三棱

蓬术

官桂

香附

醋箇散

烏藥

甘艸

赤芍

大黃

醋煎服

四烏湯方

見前

若兒枕塊凝滯小腹刺痛宜琥珀黑龍丹或三聖散或延胡散或桃仁承氣湯三聖散加青

皮山查五靈脂蒲黃治之亦可

三聖散

肉桂

當歸

延胡索

庵仁承氣湯

庵仁

當歸

赤芍

甘艸

蒲黃

川芎

桂心

一產後惡露不行小腹刺痛甚至發熱者用四

烏湯因怒氣相搏刺痛者枳殼散合五積散

加醋童便服

枳殼散方合五積散

枳壳

甘艸

陳皮

川芎

乾薑

桂心

白芷

茯苓

麻黃

桔梗

半夏

厚朴

藿香

生薑

赤芍

甘艸

一腹脣間急痛不止因瘀血未盡行也宜歸鬚  
散佛手散加肉桂丹皮元胡索蒲黃烏藥香  
附童便煎治之若惡露不行腹痛兼冒風勞

碌寒熱者此症以三元散治之則愈矣

當歸鬚散

當歸鬚

桃仁

赤芍

烏藥

紅花

甘艸

香附

蘇木

官桂  
水酒煎服

佛手散

川芎

當歸

酒水各半煎服

三元散

三  
人參

熟地

半夏

川芎

當歸

白芍

黃芩

紫胡

茯苓

生薑

大棗

一產後月餘因怒氣惡露不止如有塊淡紅色

似米粒者以九仙散治之

九仙散

當歸

川芎

芍藥

丹皮

青皮

蒲黃

黃芩

甘艸

將青皮黃芩蒲黃炒黑為末周煎服  
一產後惡露不快小腹急痛有塊者及發熱頭

暉宜用五積散加醋少許童便服之

五積散

蘭黃

甘草

肉桂

白芷

茯苓

麻黃

生姜

陳皮

川芎

芍藥

藿香

甘草

桔梗

半夏

厚朴

當歸

枳殼

一產後兩月餘惡露不止腹痛宜服加艾湯

加艾湯

熟地

艾葉

阿膠

白芍

當歸

川芎

香附

青皮

地榆

蒲黃

甘草

一產後小腹刺痛不止以四烏湯加桂心童便酒煎或佛手散加蒲黃元胡索官桂童便酒煎若小腹攻痛蒲黃必用如腹痛以平胃散

去甘草治之

平胃散  
蒼朮 厚朴 陳皮 小茴 甘草

餘方見前

一如胎前原有陰火証至產後去血過多必大發熱煩躁汗出等証若依前法大補氣血其症必甚當用逍遙散以清肝火養肝血因去血既多肝虛血燥之故不可泥于氣血虛之

論也

逍遙散

白木

此胡

一產後乍寒乍熱有二有陰陽不和有敗血不

散寒蟄相似虛實不同但小腹不痛者是陰

陽不和也宜用芎歸散治之不可作瘻治又

當量其虛實加減四物治之若小腹刺痛者

是敗血不散宜五積散去麻黃加香附  
一產後兩三日覺壯熱頭疼胸膈刺痛不可作  
傷寒治此乃乳脈將行宜服玉露散

玉露散

人參

茯苓

甘艸

當歸

白芷

桔梗

川芎

芍藥

一產後去血過多陰虛內熱頭痛晡時尤甚與  
大病後虛煩相似宜服人參當歸散若小腹

甚痛手足麻木及遍身麻暉如死者瘦與血  
虛也宜二四湯加香附治之益血虛症亦能  
作小腹痛但重按之痛若緩者是血虛也

人參當歸散

人參

當歸

丁香

青皮

吳萸

二四湯方

二陳合  
四物湯

一果係去血過多腰腹空痛者宜用補劑以止

爲愈在於隨症用藥可也

一產後謹語者須問其去血多少產婦雖不能  
言然旁觀可知去血多少宜用治血藥清魂  
散元胡散或用四物加易湯亦可

四物加易湯

熟地

當歸

白芍

川芎

半夏

陳皮

茯苓

甘草

查肉

桃仁

薄荷

姜

一產後去血過多發譫語者論曰心主乎血因  
產耗血過多心神失守故發譫語雖宜大補  
氣血又不可太峻必知真正十分虛極則可  
補又必先用活血藥禁用行血藥也若出汗  
者宜養榮湯麥煎散臨時酌而用之

養榮湯

當歸

芍藥

川芎

熟地

姜黃

生姜

白芷

烏藥

海桐皮 五加皮

麥煎散

柴胡

地骨皮

茯苓

牡蠣

白芍

甘草

麻黃根

白朮

麥門冬

黃芪

一產後狂言譖語如見鬼神者其原不一有因  
驚風語言顛倒心神恍惚不定者宜用琥珀

有因心虛驚悸言語錯亂不如人事目瞪不能  
呼呼宜用龍齒清魂散

有因敗血攻心狂言顛語錯亂者宜用元胡散  
有因風寒致令惡露不行增寒發熱儼如瘧狀  
晝則明夜則昏者此乃熱入血室宜用琥珀  
地黃丸或小茈胡湯或四物湯加紫胡亦可

琥珀地黃丸

琥珀另研元胡索末當歸各二蒲黃炒四兩

生地二兩取

汁留渣

生薑二兩取

汁留渣

用薑汁炒地黃渣地黃汁炒薑渣互炒汁

共為度共為末蜜和丸如彈子大當歸湯

送下一丸

小柴胡湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參去血因

生薑

大棗

若產後譫語熱盛脈大而有力者難治此症不

與之藥為妥也如脈沉細滑小者尚可圖治  
若產後去血過多因虛而發譫語者宜以二四  
湯去地黃畧加山楂薑汁治之不可專以痰  
斷亦不可為血迷心竅也

一產後心虛怔忡不定言語錯亂者宜茯神散

茯神散

人參  
甘草  
山藥  
當歸  
遠志  
麥冬

茯神

桂心

遠志

桂心

遠志

桂心

遠志

桂心

遠志

一產後不語者此乃敗血迷心竅心氣不通氣  
塞于心舌強不語不必恐疑但服七珍散彌  
月愈矣若發狂者加辰砂治之

七珍散

人參

石菖蒲

生地

川芎各二兩

防風

甘草

細辛

加辰砂即名八珍散

一產後冒風不語者以小續命加薑汁治之若

痰閉心竅不語者以二四湯加竹瀝薑汁治  
之若舌強不語眼花發狂及胞衣不下心腹  
脹滿者宜琥珀地黃丸

小續命湯

桂枝

人參

附子

薑

川芎

甘草

黃芩

麻黃

杏仁

芍藥

防風

大棗

一產後乍見鬼神言語顛倒因產暴虛敗血挾

一邪氣攻心醫者悞為風邪謬矣以調經散加龍腦服之則安矣或用琥珀地黃丸亦可

調經散

麝香五分沒藥一錢桂心一錢芍藥二錢  
細辛五分當歸二錢琥珀一錢

右為末每服五分生薑汁溫酒各少許調

一產後發熱自汗日久不止名曰蓐勞宜服逍

遙散

若蓐勞因虛發熱自汗不止或遇風邪復發宜

黃芪湯加麻黃根浮麥治之

黃芪湯

黃芪

白朮

防風

熟地

牡蠣

茯苓

麥冬

甘草

大棗

浮麥

竹葉

一小產後蓐勞有汗以增減柴胡湯治之若半

身出汗又宜二四湯

增減柴胡湯

柴胡 人參

芍藥

川芎

半夏 甘艸

陳皮

生姜

大枣

一產後盜汗如雨服多煎劑血虛生熱自汗不可太補兼以調理為主宜服逍遙散若喜食而痛甚者非養榮湯不能治益補中益氣湯

因有升麻柴胡不能飲汗不若逍遙散又能  
止汗治血虛如氣虛血虛兼者必用八物湯  
養榮湯並治

一產後不可輕發汗如已有汗不可再發汗也  
若虛汗兩手拭不乾者不可治也

一產後中風醫血為要不可先治風敗血得行  
則土也宜清心牛黃丸不語者乃風觸陰戶  
也以小續命湯治之若手足癱瘓者敗血入

經絡也宜五積散或二四湯加桔梗活血入  
薑汁治之若讞語以二四加消食活血之藥  
入薄荷薑汁少許治之產後中風不過痰氣  
血虛也故二四湯不可缺若眼合而痰喘者  
尤宜服之

一小產後因受氣忽跌惡露未盡迷悶不語人  
事不知者以二四湯加紅花山楂薑汁治之  
一產後惡露未盡而中風口噤角弓反張者以

荆芥散加豆淋酒或童便治之又當歸末豆  
淋酒童便治之口噤者吹鼻中尤妙

一產後中風口噤角弓反張以小續命湯或交  
加散治之加竹瀝若中風口噤四肢頑痺不  
仁角弓反張者宜羌活酒服之汗出則愈也

交加散

生地

五兩取  
汁留渣

生薑

五兩取  
汁留渣

互相浸一宿次日各炒乾為細末加竹瀝

酒調服 又方加當歸地黃

羌活酒

羌活 防風

黑豆一升炒黑  
令烟盡

入好酒內于瓶中重湯煮半日候冷開飲

一產後剛柔二症以五積加麝香煎服蓋症者  
口噤不開背強面如癟狀搖頭馬鳴身反折  
氣息如絕者是也

一產後半身不遂言語謇澁恍忽不定以天麻

散治之

天麻散

天麻

硃砂水飛

防風

羌活各一  
兩

殭蚕

炒七錢半乾蝎炒

白附子炮

五靈脂炒各半兩

雄雀糞

炒牛黃另研各二錢半

右為細末糯米飯為丸如桐子大每服二三十丸薄荷酒送下日進二服

一產後惡露不淨半身肉戰半身出汗用二四

四湯加桃仁紅花山楂薑汁治之

一產後麻木血少也宜生血補虛為主以八物  
湯治之

一產後中風惡候歌與男子全看

中風惡候要君知 眼合肝升手撒脾  
心絕口開肺鼻鼾 腎家將絕定遺尿

一凡初產傷寒切不可用小柴胡因有黃芩容  
易停血恐傷人也宜參蘇飲為佳

參蘇飲

人參

紫蘇

枳殼

桔梗

乾葛

前胡

甘艸

橘紅

半夏

茯苓

木香

生薑

一產後中寒以理中湯治之如惡露未盡去參  
宜用五箇散此方不論吐泄有無皆可服也

理中湯

人參

白朮

炮薑

甘艸

一產後傷寒脈象論訣

產後傷寒熱病臨 脈細四肢緩者生  
脈大忽然肢逆冷 便是神仙醫不醒

蓋熱病之脈固當洪大但產後血氣俱虛  
亦所不宜勿以陽病見陰脈論也

一產後內傷與暑病者與常人同治故不書湯  
藥也

一產後惡露未盡而兼傷風咳嗽腹痛者必行

血理氣為先輕則以四烏湯川芎為君重則  
以二四湯如不解以五箇散加行血之劑治  
之如兼瀉者亦以五箇散治之但薑桂少用  
為上若惡露既盡小腹不痛而傷風頭疼者  
不拘咳嗽痰有無有汗者旋覆花湯治之不  
咳嗽而重感者芎蘇散治之虛汗出者參蘇  
飲內傷而瀉者但以五箇散治之不必用行  
血之藥也

一產後勞碌感冒頭痛寒熱者宜服三元散  
一產後重感傷風骨節皮膚皆痛未汗宜服敗  
毒散治之若虛者只可服五箇散若惡露盡  
後兼疲飲十分虛者宜用參蘇飲治之若產  
後虛甚而着風不可專與之發散必須逍遙  
散治之其效雖遲漸解無失也

敗毒散

人參

茯苓

枳殼

川芎

獨活

羌活

前胡

柴胡

桔梗

薄荷

生薑

炙草

一產後蓐勞寒熱頭疼者宜增減柴胡湯治之  
一產後傷風寒熱者以五積散治之

一產後傷風寒熱咳嗽喘急痰壅盛者以旋  
覆花湯但嗽而無痰者加麻黃見汗則止有

一  
汗勿服

旋覆花湯

旋覆花

赤芍

荆芥

半夏麴

前胡

炙艸

茯苓

杏仁

炒

麻黃

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑二片大棗一枚煎至七分去滓食前服有汗者不

宜服

一產後血虛寒熱者治之以逍遙散

若寒熱往來者宜小柴胡湯主之

若久坐多語勞力頭目四肢寒痛寒熱如瘡名  
一曰蓐勞以茯苓散治之

茯苓散

茯苓      當歸

川芎

白芍

人參      熟地

黃芪

桂心

用猪腰子一隻去膜生薑二片大棗二枚  
水二鍾煎湯代水煎前藥

一產後冒寒頭痛發熱足冷者以芎蘇散或五

積散亦可

一產後偏正頭疼宜川芎茶調散治之又不若  
敗毒散之尤勝合五積散原治敗血流經之

劑耳

川芎茶調散

川芎 荆芥 白芷 甘艸  
羌活 防風 薄荷 細辛

等分為細末用茶煎濃調服一方加香附

先

一產後大發熱者必用炮薑治之何也此熱非  
有餘之邪乃陰虛生熱也故乾薑炮用之其  
入肺則利氣入肝則生血其妙在此也

一產後大失血陰血暴亡必大發熱名曰陰虛  
發熱此陰字正調氣血之陰若以涼藥正治  
必斃正所謂証象白虎悞服白虎必死此時  
偏不用四物湯何也有形之物不能速化幾  
希之氣急用獨參湯或當歸補血湯無形生

出有形來陽生陰長之妙不可不知也

### 當歸補血湯

黃芪炙兩一當歸二錢酒洗

空心服

一產後日晡發熱轉甚非柴胡不能治以八物  
湯加柴胡或四物湯合小柴胡湯治之亦可  
一產後咳嗽痰盛者宜旋覆花湯治之如血未  
盡則先治血後發散可也或二四湯加消食

藥為善

一瘦火怔忡嘈雜宜茯苓半夏湯

茯苓半夏湯

茯苓

半夏

黃連

黃芩

熟地

當歸

川芎

香附

杏仁

瓜蔓

竹瀝

一產後食鹽太早而咳嗽者此症難治不輕與

一產後惡露上流肺經咳嗽與平人同治以二

藥

母湯去參為妙

二母湯

知母

貝母

茯苓

桃仁

人參

杏仁

一產後嗽喘者此乃危急之疾若不嗽而獨喘者尤甚不宜與藥不得已以二四湯加薑汁紅花山楂枳殼之類

古曰諸喘皆凶若敗血上薰於肺而喘者名曰

方原缺

孤陽絕陰此症難治勉用奪命丹  
若傷食感寒而喘急者宜用五積散治之若傷風寒痰喘者旋覆花湯治之

一產後勞碌發乾咳嗽者以二四湯加活血藥治之若惡露已盡宜知母淡芩湯或八物湯加黃柏知母治之或用雞蘇散

雞蘇散

黃芪

生地

阿膠

川貝母

茅根

桔梗

麥冬

蒲黃

雞蘇荷

即薄

一產後嘒喘遇產而發者宜以寧肺湯治之

寧肺湯

杏仁

阿膠

半夏

細辛

甘艸

陳皮

茯苓

蘇子

桑皮

枳殼

生薑

烏梅

大棗

一產後外感兼瀉者以五箇散加行血藥

一產後血瀉者以胃苓湯加山楂神麩半夏治  
之若腹痛拒按者加消食藥如有惡露加活  
血藥治之

一產後食瀉者宜養胃湯如惡露不盡者以五  
箇散加桃仁治之或用胃苓湯加茺蔚仁歸尾  
紅花治之若水瀉者以平胃散加香連治之  
一產後暑瀉者以胃苓湯加香茹治之如惡露

未盡以桃仁紅花治之

一產後寒瀉者宜五積散如惡露已盡用白芍亦不必用活血藥也若欬嗽者姜桂少用即理中湯亦可

一產後傷食者如惡露未盡以四烏湯加消食藥若瀉者以五箇治之如惡露去多者宜五苓散若惡露去多而不渴者宜養胃湯治之一產後冷熱不調上吐下瀉名曰霍亂渴而飲

水者宜五苓散寒多不飲水者以理中湯治之霍亂吐瀉又宜藿香正氣散

一產後嘔吐如惡露未盡者以二四湯如治血藥

一產後癰疾如惡露未盡者以五積散加桃仁紅花山楂神曲治之如已盡者以養胃湯加消食藥治之蓋癰雖不瀉然須預防脾胃為要故用此劑也如兼瀉者用之尤妙熱多寒

少以草果飲寒多熱少以生熟飲養胃湯治  
之久而不已者以七寶飲治之

生熟飲

肉豆蔻

艸果

厚朴

半夏

甘草

陳皮

大棗

生薑一半生用一半濕紙裹煨熟用和前

藥煎服

七寶飲

青皮

陳皮

甘艸

當歸

厚朴

艸果

檳榔

一產後惡露未盡而痢以胃苓湯加桃仁雖日夜去百次服之可驗如飽悶加紅花當歸而滑腸者禁用可服神麩五箇亦可

一產後惡露盡而痢者以胃苓湯加半夏神麩治之

一產後不拘赤白痢者以胃苓湯一方而可治

也雖有食積多服幾劑自愈

一產後冷熱病者宜黃連阿膠丸

黃連阿膠丸

黃連去鬚三兩 阿膠碎炒一兩 茯苓去皮二兩

右以黃連茯苓為細末水漬阿膠搜丸如桐子大每服三十九空心米飲送下

一產後痢疾渴飲無度宜用麥門冬烏梅煎湯或用冬瓜汁亦可

一產後赤白痢者宜服香連朮苓散又以四君子湯加黃芪粟殼治之

四君子湯

人參 白朮 茯苓

一產後氣虛下痢宜用當歸芍藥湯

一產後血痢宜三黃熟艾湯

三黃熟艾湯

黃連

黃柏

黃芩

艾葉

大枣

一產後痢疾脉訣

產後痢疾 脈息須知 細小者生

洪大不取 欲絕附骨 無事斷之

一產後須細 痞疾尤宜 浮鈎洪大

必死無疑

一產後下痢宜用參栗散

參栗散

人參

粟殼

白朮

甘艸

肉桂

當歸

烏梅

蒼朮

枳殼

訶子

一產後感寒而腹痛者以理中湯去人參以治之

一產後因受氣而小腹脹痛者以分氣紫蘇飲如停食加消食藥治之

紫蘇飲

人參  
芍藥  
大腹皮  
紫蘇

橘紅  
當歸  
甘艸  
川芎

一產後敗血攻心而胃口痛甚者宜元胡散單  
胃口痛者以養胃湯治之

一產後腰痛而下注兩腹痛如錐刺入骨者敗  
血未盡而停住經絡也腎虛者以四物湯加  
黃柏或五箇散治之蓋此藥能除敗血去風  
濕也如淨後作痛者以四物湯治之則愈矣

若產後去血過多而腰痛者至月外者以補中  
益氣湯及內補湯治之

內補湯

地黃

當歸

白芍

川芎

橘紅

茯苓

白朮

甘艸

一產後半邊腰痛者多因側卧以致敗血流十  
一邊故也以四烏湯或二四湯加紅花桃仁  
治之若非血而痛者祇因受氣而痛以二四

湯併補中益氣去參加活血藥治之如不噉者加香附治之

以上方俱見前

一產後皮肉痛者此外感也若惡露未盡先服行血藥後服芎蘇散若血已盡竟服芎蘇飲然此藥乃發汗之劑不可多服

芎蘇散

川芎

紫蘇

枳殼

桔梗

乾葛

前胡

甘艸

橘紅

木香

茯苓

生薑

一產後骨痛者若惡露未盡宜五箇治之如故  
以四烏湯二四湯治之如小腹痛者加活血  
藥若惡露已盡宜用增減柴胡湯治之赤頭  
一產後遍身骨節疼痛或因氣滯或因血凝或  
感風寒或初產血氣未和或蓐勞血少皆能  
作痛也故腰背不能轉側手足不能運動身

熱頭痛儼如傷寒色樣若作傷寒治之其變  
症不淺宜五積加羌活入醋煎效或薤白亦  
可若蓐勞而筋骨不利者用逍遙散以治之  
一產後血氣刺痛小腹宿冷痃癖者宜葱白散  
葱白散

葱白

官桂

三棱

蓬术

人參

熟地

當歸

白芍

厚朴

神麴

青皮

木香

麥芽

乾薑

茯苓

川芎

川棟子 小茴香

一產後發呃敗血未淨而不行也宜用行血藥  
如已淨而呃者多是受凍宜順氣調胃為上  
如紫蘇飲之類

一產後呃逆不已乃胃寒而氣不順也宜丁香  
散治之或單橘皮湯或用桂心薑汁以火炙  
熱用手承擦摩背上

丁香散

丁香 白蔻仁 伏龍肝

為細末用吳茱萸湯調下或桃仁湯亦可  
一產後嘔逆不已以君陳丸治之若腹痛脹滿  
嘔逆不定多因是食宜丁香消食之劑是瘦  
者宜旋覆花湯是寒者以理中湯加木香青  
皮半夏陳皮治之

君陳丸

白术

大枣

薑香

細辛

四十一

人參

白朮

茯苓

甘艸

半夏

陳皮

藿香

砂仁

一產後腹脹滿不定此由敗血散于脾胃也若  
脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之  
則不能受細五穀而生嘔吐也明矣平胃散  
安胃湯主之

安胃湯

半夏

橘紅

生薑

甘草

神麌  
藿香

一產後吞酸水者宜七氣湯

七氣湯

人參

桂心

半夏

甘草

生薑

一產後腹脹必利小水為主若遍身脹者宜木

香流氣飲治之

木香流氣飲

木香

甘艸

陳皮

青皮

草果

丁皮

厚朴

藿香

木通

人參

檳榔

白芷

香附

官桂

蓬木

大腹皮

蘇叶

麥冬

木瓜

白朮

半夏

旋苓

菖蒲

生薑

一產後沐浴太早或感風濕而筋脉拘急骨節  
疼痛者以五積散加宣木瓜吳茱萸煎服

一產後四肢浮腫而腹大者此乃氣食也宜紫  
蘇飲加消食藥若身熱者當防其有血也蓋  
產後浮腫多端或胎前腫至產後者或產後  
着風寒而腫者或內傷生冷而腫滿者或因  
敗血化水而腫滿腸鳴者或因血虛氣滯而  
浮腫者切不可專用學藥導宜辨其虛實而治  
之雖見虛又不可便用重補須治其氣氣順  
理其血血活則氣血和而病得效矣然順氣

之藥當以黑龍丹黑神丸五積散紫蘇飲調  
經之劑。一產後兩足忽腫疼者腫是濕而疼是熱恐成  
脚氣而有患也以當歸定痛散治之若紅腫  
者恐生毒瘡以皮之熱與不熱為辨也。  
當歸定痛散

人參

當歸

葛根

黃芩

羌活

茵陳

知母

茯苓

宜於

猪苓

澤瀉

蒼朮

甘艸

防風

升麻

一產後肚大筋青小水多不利者或食生冷或瘀血停滯而帶傷者治以胃苓湯起劑加桃仁紅花杏仁蘇葉赤芍歸尾或五箇加桃仁紅花赤芍消食之劑或紫蘇飲加行血消食藥尤妙內加木香愈佳總身有熱者不忌也蓋木香亦能清熱也

一產後因氣或得寒物惡露凝住腹脹如鼓而  
疼痛者以四烏湯治之凡胎前以分氣飲產  
後則服五箇

一產後耳忽聾目忽昏者氣血不足也宜十全  
大補湯

一產後目腫赤而痛者以四物加生地黃連治  
之

一產後吐血嗽血咯血恐血氣冲心急用元胡

湯治之

一產後鼻衄宜紫蘇飲入童便治之或荆芥散  
入童便

荆芥散

小剉不煎取水吹鼻散用少鹽吹鼻香

荆芥

散取水吹鼻散以人血研末之五分

用麻油少許以燈草燃燈燒荆芥焦色為

一末童便調服

以白粉敷鼻孔吹黃吹入赤蘋

一產後尿血者以四物湯加涼血藥治之或八

正散

一產後小便閉者以四物湯去地黃加入赤茯苓木通竹葉之類或用五苓散去桂枝加入木香滑石治之若甚者以八正散治之

一產後小便不通腹脹如鼓者用炒鹽加麝香少許填平臍中再以葱白一束切片如指厚安鹽上又以艾炷滿葱餅以火炙之覺腹內有熱時小便即通

一產後大小便俱不通者如惡露已淨以四物  
湯加黃芩生地黃木通江西枳殼黑山梔如  
未盡者以五箇散加桃仁赤芍歸尾紅花治  
之

一產後大便閉者宜玉燭散或麻仁丸或五仁  
丸或四物湯加枳殼青皮或蘇子麻仁煮粥  
食之並妙

玉燭散

一產後乳汁不通者有四有氣血盛壅閉者有  
氣血虛而不至者有初產風熱相搏而無乳  
者有累產無津而乳無者若虛者補之宜潤  
乳散氣血壅閉者疎通之宜服漏蘆湯血氣  
少而無乳者以天花散治之玉露散亦可或  
用油木梳梳乳上令下

山楂

潤乳散

一猪蹄大野鯽魚而小鐘乳粉

音宜用無灰酒

煎服

漏蘆湯

漏蘆

瓜蔓

性凝存

木通

為末酒服

天花散

天花粉

木通

陳

陳皮

糯米

宜水

猪蹄

人参

白术

茯苓

南水直

炙草

熟地

當歸

白芍

川芎

一產後乳腫硬痛者因兒呼吸不通壅閉乳道  
畜積在內遂成腫硬而疼也名曰吹妳宜瓜  
蔓散皂角散治之

瓜蔓散

瓜蔓根二兩 乳香一錢  
研

為末溫酒下

皂角散

皂角 燒存性 蛤粉生研

為細末熟酒送下

一產後微發熱惡寒此氣血俱虛也宜用大補氣血之劑散表之藥左脈不足補血之藥倍於補氣之藥若右脈不足則補氣之藥多于補血之藥若兼瘦者各以其類治之

產後陰脫名曰產瀕宜用當歸黃芪散治之

當歸黃芪散

黃芪

當歸

白芍

各二錢半

升麻一錢

人參三錢

一產後子腸不收者宜補氣血以八物湯去熟  
地黃茯苓加升麻防風然必以酒黃芪為主  
一產後陰腫煩疼宜桃仁膏或用四物加藁本  
防風

桃仁膏

枯礬末

桃仁

共研膏拌擦

一產後陰腫陰痒者此乃濕也宜小治方

小治方

荆芥

白芷

花椒

細辛

枯礬

煎湯薰洗甚者不過三四次

一產後勞血太過至產則突出種疼名曰疝癩  
用鱉頭燒存性為末搽上忌登高舉重或將  
天麻子肉塗頭頂心如收時即刻去藥或以

五倍子白礬枳殼荆芥蛇床子煎湯薰洗亦妙

一產後玉門不閉此乃氣虛不足也以補中益氣湯倍加升麻治之或八物湯或硫黃湯

硫黃湯

硫黃四兩 吳茱萸 兔絲子各二半

煎湯洗自收

一產後瘀血流入腰膝走注或右或左痛如錐

刺入骨中不能舉動此敗血流注經絡若大  
痛不已必成癰疽宜服荆防交泰散即五積  
敗毒全劑

一產後虛煩渴飲不止短氣眩暈飲食無味者  
宜竹葉湯加烏梅乾薑或四物湯加門冬五  
味烏梅花粉治之

竹葉湯

生地

麥冬

五味

人參

竹葉

茯苓

黃芩

甘艸

瓜蔓

浮麥

大枣

一產後昏迷悶亂口禁眼花不省人事者謂之血暈此症不一或去血過多而虛暈者或下血少而冲上暈者或痰火因虛泛上而暈者或用力過多而作暈者正是暈同而治法各異也苟不諳練而誤治之夭人天年於心何安宜速將產婦扶起用醋炭等法或燒漆氣

或醋洒口鼻噀面或薑汁盛瓶以滾醋沃之  
將瓶口冲產婦鼻令醋氣入內冲醒然後審  
虛實而用藥治之蓋並能去心中滯血又加  
醋氣運用無不効倘或覓藥不及即燒秤錘  
投入醋中薰之切戒冷水噴灌激住敗血多  
致不救倘夏月宜用燒磚如醋炭之法治之  
一臨產因收生婦悞損尿脬致成淋漓不禁宜

用參术膏治之

參术膏

人參

黃芪

茯苓

陳皮

甘草

川芎

當歸

桃仁

先將猪羊脬各一件煎五六沸後入前藥

再煎極飢時服之  
一產後前竅相連後竅大小便易位而出者名  
曰交腸此因氣不循故道清濁混雜宜五苓

散合調氣飲加黃連阿膠木香檳榔桃仁木通治之若止小便出于大便者以五苓散分

利小水

調氣飲方

木香

丁香

檀香

白蔻仁

砂仁

藿香

甘草

一產後血崩不止者以芎芻湯加百草霜側柏汁烏梅炭飛鹽等分煎服

一產後陰頰脫下玉門不閉以石灰少許燒熟  
次煎防風荆芥滾湯置桶內沃灰急坐上使  
氣薰入陰戶待湯溫浸洗候平復為度

一產後覺熱頭疼者不可便作傷風傷寒治之  
或蒸乳或瘀血或血虛或傷食或蓐勞成風  
寒若先乳傍脹痛此乳汁將行也宜玉露散  
治之若腹中刺痛北瘀血不盡也以五積散  
治之若去血過多者以增減四物湯治之若

早起勞碌名曰蓐勞以增減柴胡湯或茯苓  
湯補中益氣湯治之若飽悶噯氣者此乃飲  
食所傷也以枳縮二陳湯治之

一產後小便頻數宜兔絲子丸又豬腰子一隻  
去膜姜三片棗二枚煎服

兔絲子丸

吳萸

白芨

白蔹

茯苓

陳皮各一  
細辛五錢  
桂心

五味

牛膝 厚朴 白附 人參

當歸

乳香

沒藥

菟絲子

各四兩

壬子日合為丸每服十五丸經淨後連二  
服此方無不可者男女皆可服昔承相室

三十九歲無子服此丸後生九子

一產後氣血雖虛不可太補宜當歸散治之即

四物湯去地黃加黃芩白朮也

一產後下血不止以四物湯加生地荊芥粟殼

炭治之凡婦人有子飲乳而經水三四年至者不須服藥乳汁盡即下之為經事也一凡婦人元藏受氣虛弱致令乏嗣及生百病者宜服濟陰丹凡一切癥瘕冷疼白濁白淫崩中帶下若不治則無子然服此劑宿血則去新血則生能令血和而受孕也

濟陰丹

木香

赤茯苓

京墨

秦艽

熟地

甘草

陳皮

石斛

桂心

乾薑

細辛

丹皮

當歸

牛膝

杜仲

白朮

厚朴

蒼朮

大豆

白朮

蜜丸每兩作六丸每服一丸酒磨送下將  
糯米粥補之

一凡婦人生理不順怕產者宜服九龍丹則不  
娠其故何也此藥能令脂膜生滿子室不受

孕矣如後要嗣而受孕者以車前子為末溫  
酒服一錢數服仍可以受孕極善之法也

九龍丹方

枸杞子二兩金櫻子五兩煎膏山楂子一兩

佛座鬚二兩

芡實三兩

山楂子五錢

蓮肉四兩

蓮肉四兩

茯苓二兩

川芎五錢

當歸二兩

為末酒和丸每服三五十丸或酒或鹽湯  
送下男子服之精滿體健女子服之則不

孕

不思毛澤外舊語齋對女半頭以四子

善未酬汝子母罪曰五十九歲西友靈老

矣客三西三紀之歲

萬體

善無歸

萬體

善者不善金時七五西

大驚其也

邯鄲遺稿卷之四終

入學者之轉進乎善未滿

嘉慶元年刊

楷印  
禮部書

靈蘭閣藏板

寶經題

金匱要略

增補卷之三

褚氏遺書序

黃巢造變從亂羣盜發人家墓掘取金寶過大穴焉方丈餘中環石十有八片形制如柳其蓋六石題曰有齊褚澄所歸啟蓋棺骨已蛇蟻所穴環石內向文字曉然盜疑兵書移置穴外視之棄去先人偶見讀徹囁鄉鄰慎護明年具舟載歸欲送官以廣其傳遭時兵革不息先人亦不幸遺命異物終當化去神書理難久藏其以

褚石為吾棺槨之實隱則骸骨全褚石或興吾  
名亦顯淵募能者調墨治刻百本散之餘遵遺  
戒先人諱廣字叔常清泰五代唐懿宗二年五月十九日古

揚蕭淵序

六承碑曰有齊故當世賴為遺骨而無葬地  
六祖大士給中舉凡十百人半耕半讀  
黃巢造變奪諸侯入寇建州金寶國大

褚氏遺書原序

靖康初金人犯順羣盜乘間在處有之去揚城  
北三十五里陳源橋有蕭家世居其間蓋貧不  
能自振矣守一家甚勤曰吾十二世祖墓父於  
此吾家冢凡數百世世惟守此耳盜疑其起家  
者富而厚葬日夕窺之二家因語人曰吾十二  
世祖葬其父明經廣叔常用石刻秘經為櫔從  
治遺命也已而不忍其柩有將廢之兆遂救子欵

孫世守之耳窺者仍故二家因會鄉人啟視之  
漆棺如新刻石十有九片其一蓋蕭淵序也乃  
移柩葬居側而舉石於門外有告蕭得埋寶者  
遂納石於今予時持鉢將為南嶽之遊過蕭門  
官  
結葬緣適見其事謾錄諸策以俟能者二年結  
制前五日衛國釋義堪書

龍泉山金人寺遺老蕭淵序

序

齊褚澄彥道遺書一卷才二千六百二十言發  
揮人身中造化之秘明白要約殆無餘蘊蓋沉  
酣於內經素問靈樞之旨者也其司馬季主扁  
鵲倉公之流乎彥道在當時連媯宗室富貴鮮  
儼而能造詣如此則超出塵表之姿又可想見  
之也方虛谷選詩謂孫思邈十金方三十六卷  
每卷藏一仙方在人自求之耳子觀此書亦寓

思邈之意淵乎微哉今幸有吾郡賢太守西充  
馬公汝礪翻刻傳布敘其出處顯晦甚詳奚俟  
予之置喙邪但若臨席啖讌使人自不忍下咽  
遂僭引數語於篇首亦珍愛之癖云

正德元年歲在丙寅清明日

資政大夫南京戶部尚書舒城秦民悅邦約書

齊齡登高賦書一束七十二千六百二十言稿

卷

褚氏遺書

齊侍中領右軍將軍贈金紫光祿大夫褚澄編

明梅顛道人校

吳趨元一吳升參訂

受形篇第一

男女之合二情交暢

和實

陰血先至陽精後衝血開

裏精精入為骨而男形成矣陽精先入陰血後

參精開裏血血

實

入居本而女形成矣陽氣聚面

故男子面重溺死者必伏陰氣聚背故女子背

重溺死者必仰走獸溺死者伏仰皆然陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆父少母老產女必羸母壯父衰生男必弱古之良工首察乎此補羸女先養血壯脾補弱男則壯脾節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚此疾外所務之本不可不察也

本氣篇第二

天地之氣周於一年人身之氣周於一日人身

臂

陽氣以子中自左足而上循左股左手指左肩  
左腦橫過右腦右肩右臂手指脇足則又子中  
矣陰氣以午中自右手心通右臂右肩橫過左  
肩左臂左腸左足外腎右足右腸則又午中矣  
陽氣所歷充<sup>充</sup>滿周流陰氣上不過腦下遺指趾  
二氣之行晝夜不息中外必偏一為痰積壅塞  
則疚疚生焉疾證醫候統紀浩繁詳其本源痰  
積虛耳或痰聚上或積留中遇氣之流艱於流

轉則上氣逆上下氣鬱下臟腑失常形骸受害  
豎乎氣本衰弱運轉艱遲或有不周血亦偏滯  
風濕寒暑乘間襲之所生疾疾與痰積同凡人  
之生熱而汗產而易二便順利則氣之通也陽  
虛不能運陰氣無陰氣以清其陽則陽獨治而  
為熱陰虛不能運陽氣無陽氣以和其陰則陰  
獨治而為厥脾以養氣肺以通氣腎以泄氣心  
以役氣凡臟有五肝獨不與在時為春在常為

心

仁不養不通不泄不役而氣常生必虛則氣入  
而為蕩肺虛則氣入而為喘肝虛則氣入而目  
昏腎虛則氣入而腰疼四虛氣入脾獨不與受  
食不化氣將日微安能有餘以入其虛烏乎茲此  
謂氣之名理與

平脈篇第三

脈分兩手手分三部隔寸尺者命之曰關去肘  
度尺曰尺關前一寸為寸左手之寸極上右手

之尺極下男子陽順自下生上故極下之地右  
手之尺爲受命之根本如天地未分元氣渾沌  
也既受命矣萬物從土而出惟脾爲先故尺上  
之關爲脾脾土生金故關上之寸爲肺肺金生  
水故自右手之寸越左手之尺爲腎腎水生木  
故左手尺上之關爲肝肝木生火故關上之寸  
爲心女子陰逆自上生下故極上之地左手之  
寸爲受命之根本既受命矣萬物從土而出惟

脾為先故左手寸下之關為脾脾土生金故關  
下之尺為肺肺金生水故左手之尺越右手之  
寸為腎腎水生木故右手寸下之關為肝肝木  
生火故關下之尺為心男子右手尺脈常弱初  
生微渺之氣也女子尺脈常強心火之位也非  
男非女之身感以婦人則男脈應診動以男子  
則女脈順指不察乎此難與言醫同化五穀故  
胃為脾府而脈從脾同氣通泄故大腸為肺府

而脈從肺同主精血故旁光為腎府而脈從腎  
同感交合故小腸為心府而脈從心同以脈為  
竅故膽為肝府而脈從肝澄生當後世傳其言  
而已爾初決其秘發悟後人者非至神乎體修  
長者脈疏形侏儒者脈盛肥人如沉而正沉者  
愈沉瘦人如浮而正浮者愈浮未燭斯理曷愈  
衆疾表裏多名呼吸定至抑皆末也世俗並傳  
茲得畧云爾

津潤篇第四

天地定位而水位乎中天地通氣而水氣蒸達  
土潤膏滋雲興雨降而百物生化人肖天地亦  
有水焉在上為痰伏皮為血在下為精從毛竅  
出為汗從腹腸出為瀉從瘡口出為水痰盡灰  
精竭灰汗枯灰瀉極灰水從瘡口出不止乾卽  
死至於血充充目則視明充耳則聽聰充四肢則  
舉動強充肌膚則身色白瀆則黑去則黃外熱

則赤內熱則上蒸喉或下蒸大腸為小竅喉有  
竅則咳血殺人腸有竅則便血殺人便血猶可  
止咳血不易醫喉不停物毫髮必咳血滲入喉  
愈滲愈咳愈咳愈滲飲溲溺則百不一死服寒  
涼則百不一生血雖陰類運之者其和陽乎

分體篇第五

耳目鼻口陰尻竅也臂股指趾肢也雙乳外腎  
關也齒髮爪甲餘也枝指旁趾附也養耳力者

常飽養目力者常瞑養臂指者常屈伸養股趾  
者常步履夏臟宜涼冬臟宜溫背陰肢末雖夏  
宜溫胸包心火雖冬難熱熱作腫而竅塞血不  
行而肢廢餘有消長無疾痛附有疾痛無生死  
關有生死疾痛無消長有消長疾痛生死者疣  
瘤而已

精血篇第六

飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子為陽陽

中必有陰陰中之數八故一八而陽精升二八  
而陽精溢女子為陰陰中必有陽陽之中數七  
故一七而陰血升二七而陰血溢陽精陰血皆  
飲食五味之實秀也方其升也智慮開明齒牙  
更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身肢  
體手足耳目之餘雖針芥之瀝無有不下凡子  
形肖父母者以其精血嘗於父母之身無所不  
歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一

目虧則子一目不肖其母然雌鳥牝獸無天癸而成胎者何也鳥獸精血往來尾間也精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出內敗小便道澁而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼愈疼則愈欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血

誤行

無子

不生或漬而入骨或變而之腫或雖合而難以  
合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀  
其精血思過半矣

除疾篇第七

除疾之道極其候證詢其嗜好察致疾之由來  
觀時人之所患則窮其病之始終矣窮其病矣  
外病療內上病救下辨病藏之虛實通病藏之  
母子相其者壯酌其淺深以制其劑而十全上  
老

功至焉制劑獨味為上二味次之多品為下酸  
通骨甘解毒苦去熱鹹道下辛發滯當驗之藥  
未驗切戒亟投大勢既去餘勢不宜再藥修而  
肥者飲劑豐羸而弱者受藥減用藥如用兵用  
醫如用將善用兵者徒有車之功善用藥者薦  
有桂之效知其才智以軍付之用將之道也知  
其方授以生付之用醫之道也世無難治之疾  
有不善治之醫藥無難代之品有不善代之人

民中絕命斷可識矣

其大略審微篇第八

疾有誤涼而得冷證有似是而實非差之毫釐  
損其壽命浮栗經二氣篇曰諸瀉皆為熱諸冷  
皆為節熱則先涼藏冷則先溫血腹疾篇曰乾  
痛有時當為蟲產餘刺痛皆變腫傷寒篇曰傷  
風時疫濕暑宿痰作瘡作疹俱類傷寒時人多  
瘡空防為瘡時人多瘴空防作疹春溫夏疫內

宣

溫

證先出中濕中暑試以苓术投之發散劑吐汗  
下俱至此證號宿痰失導必肢廢嗟乎病有微  
而殺人勢有重而易治精微區別天下之良工  
哉

辨書篇第九

尹彦成問曰五運六氣是耶非耶曰大撓作甲  
子隸首作數志歲月日時遠近耳故以當年為  
甲子歲冬至為甲子月朔為甲子日夜半為甲

子時使歲月日時積一十百千萬亦有餘而不  
紊也配以五行位以五方皆人所為也歲月日  
時甲子乙丑次第而及天地五行寒暑風雨倉  
卒而變人嬰所氣疾作於身氣難預期故疾難  
預定氣非人為故疾難頤人測推驗多舛拯救易  
誤俞扁弗議淳華未稽吾未見其是也曰素問  
之書成於黃歧運氣之宗起於素問將古聖詰  
妄邪曰尼父刪經三墳猶廢扁鵲盧出盧醫遂

晚出

經

多尚有黃岐之醫藉乎後書之託名於聖詰也  
曰然則諸書不足信邪曰由漢而上有說無方  
由漢而下有方無說說不乖理方不違義雖出  
後學亦是良師醫故固知君子之言不求貧朽然於  
武成之策亦取二三曰居今之世為古之工亦  
有道乎曰師友良醫因言而識變觀省舊典假  
筌以求魚博涉知病多診識脈屢用達藥則何  
愧於古人

問子篇第十

建平王妃姬等皆麗而無子擇良家未笄女入  
御又無子問曰求男有道乎澄對之曰合男女  
必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖  
十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽氣完實  
而後交合則交而孕孕而育育而為子堅壯強  
壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣蚤洩  
未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育

育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人謀置宮府有男之道也王曰善未再期生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也



褚氏遺書後序

廬州衛武生鄭道出示南齊褚澄遺書凡十篇  
云得之先世故書中考之丁介跋尾當是宋嘉  
泰初劉繼先印本字畫完好如新金讀之既作  
而嘆曰子少時曾於宋史藝文志見有是書日  
又見三元延壽居家必用養生纂要諸書引用  
其說往來京師嘗徧閱書肆博訪蓄書之家求  
其全本無所得迄今三十餘裸始獲經目噫古

書之罕見於世奚獨此哉史稱澄善醫術以勤謹見知沒於永明元年觀是書立論精詣所謂邃於醫而慎於術者非耶褚氏子孫以其書入石殉葬為不朽許其用心勤矣意澄平時所自愛重子孫遵其垂歿之言而慎藏之歟雖其遺墓不幸為盜所廢遺書則幸因盜以傳也自是蕭廣載其石廣子淵復以納廣釋義堪錄諸策劉繼先又以入梓更三數人之手始克流布當

時蓋自永明至嘉泰初上下七百二十餘年至  
于今又幾何年所著之書久埋而復見已棄而  
獲存幾絕而僅有若有神物相之者殆於汲冢  
之周書昭陵之羲帖石室之陰符經佛龕之古  
文苑事相類歐陽子云人之賢者傳遂遠是固  
然矣要知古今載籍或傳或否皆不可必人未  
必皆賢言未必皆粹高文鉅册或散佚無聞片  
楮尺素或珍襲可考金石有不足恃而或出於

破家敗壁之間子孫有不可托而偶得於牧豎  
偷兒之手闕於前或彰於後盛行於一時或湮  
沒於萬世莫不有數存焉耳而物之聚散顯晦  
固有時哉然而非聖之書不經之談迂僻恠誕  
於事無益且不可以為訓使有識者見之必以  
覆醬瓿製帷帳而投之水火也今猶不免加災  
于木增垢于石重為楮墨之費者何限况乎書  
坊所刻大率類家集以徼時名褒程文以逐時

好日以寢廣求如蕭廣輩之嗜古良亦鮮矣金  
於此尤所浩嘆竊謂是書形氣血脈之說明切  
簡備庶幾可為衛生之助其平脈篇有曰澄生  
當後世傳其言而已爾初決其秘發悟後人澄  
蓋以其所得筆之於書與天下後世共之也豈  
若俚俗醫師規規然因病處方隨證著論以覬  
幸於萬一者可及哉乃以元本歸鄭生錄本刊  
寘郡之景賢亭其篇第悉因其舊不敢輒有增

損并附著重刊之由如此同知涂君成文通判  
陳君冕成君傳推官許君賜相與割俸贊成之

疾

嗚呼病固尼父所慎醫亦事親者所當知因是

書得之難而欲其傳之廣且久必有同區區餘

意者矣庶斯文之不泯也

正德元年歲在丙寅春丁後二日

賜進士第中憲大夫知直隸廬州府事西充馬

金致齋南壇謹序

後序

右褚澄遺書一卷初得蕭氏父子護其石而其書始全繼得僧義堪筆之紙而其書始存今得劉繼先錢之木而其書始傳亦可謂多幸矣澄字彥道河南陽翟人宋武帝之甥尚書左僕射湛之之子廬江公主之夫齊太宰侍中錄尚書公淵之弟仕宋自駙馬都尉遍歷清顯仕齊至侍中領右軍將軍永明元年卒南史云永元年卒誤也東

昏侯立其女為皇后追贈金紫光祿大夫實永

元元年去其

卒

時已七十年矣遺書題其贈官

宣蕭廣得其櫻石考之史傳而附題於前乎初

齊高帝愛子豫章王嶷自江陵赴都得疾日臻

帝憂形于色乃大赦天下聞澄傳楊淳秘方召

澄治立愈帝喜甚擢澄左在民尚書以寵之其守

吳郡也民有李道念以公事至郡澄遇見謂曰

汝有奇疾道念曰某得冷疾五年矣澄診其脈

曰非冷也由多食雞子所致可煮蘇一斗服之  
卽吐物如升許涎裏之動抉涎出視乃一雞雛  
翅距已具而能走澄曰未也盍服其餘藥從之  
凡吐十三枚疾乃瘳其妙皆此類也是書幽眇  
簡切多前人所未發而豈徒哉問予篇稱建平  
王當是澄之妻之姪景素其生子六卽延齡延  
年輩云嘉泰元年日南至甘泉寄士丁介跋

平生好喜茶，不取日色至古矣。在士仁歲  
中，始與其道以味以流，時數載於十六世祖。其後每  
齋多啜之，而未幾也。既得於西山經降，以平  
亦十之七八也。其後也，尋其多啜者，蓋以嘗嘗過其  
歸心也。與吾弟共遊也，未可憐也。其深葉，或以  
曾其舊告其先，或以傳紫城之歸心也。其嘗嘗  
曰：「予所由來，食之名於西燕。」平素以

跋

齊東野語

南史澄永元元年卒丁介跋語辨其誤審矣然謂澄遙見李道念知有奇疾令煮蘇一斗服之乃瘳按史蘇作蒜斗作升為是豈介偶爾筆誤或別有所據耶世固有舉正史氏之誤而不自知其誤者亦多矣馬端臨經籍考引益國周公之言曰臣事孝宗奏及文苑英華舛誤不可讀