

宗必齋

九之下



				漢書門
			一 二 三 四	
		五 二 九		
一 八 六				
冊	架	函	號	類

內閣文庫			
三 函	一 二 三 四	五 二 九	漢書
七 架	八 冊	九 號	類

內閣文庫			
番號	漢	12439	
冊數	18 ( 16 )		
函號	301	48	



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak





痰飲稠濁者為痰  
清稀者為飲

經曰太陰在泉濕淫所勝民病飲積又曰歲土

太過雨濕流行甚則飲發又土鬱之發太陰之

復皆病飲發

按痰之為病十嘗六七而內經叙痰飲四條皆

因濕土為害故先哲云脾為生痰之源又曰治

痰不理脾胃非其治也夫飲入于胃游溢精氣

上輸於脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸

膀胱水精四布五經並行何痰之有惟脾土虛


濕清者難升濁者難降留中滯兩淤而成痰故  
 治痰先補脾脾復健運之常而痰自化矣析而  
 言之痰有五飲亦有五而治法因之而變在脾  
 經者名曰濕痰脉緩面黃肢體沉重嗜臥不收  
 腹脹食滯其痰滑而易出二陳湯白朮丸挾虛者六君子湯酒傷者  
 白蔻乾葛挾食者保和丸挾暑者消暑丸驚者妙應丸  
 在肺經者名曰燥痰又名脉澀面白氣上喘促洒泝寒熱悲愁不  
 樂其痰澀而難出利金湯潤肺飲在肝經者名曰風痰  
 脉弦面青四肢滿悶便溺秘澀時有躁怒其痰

青而多泡水煮金花丸防風丸川芎丸在心經者名曰熱痰  
 脉洪面赤煩熱心痛口乾唇燥時多喜笑其痰  
 堅而成塊小黃丸天黃湯在腎經者名曰寒痰脉沉面  
 黑小便急痛足寒而逆心多恐怖其痰有黑點  
 而多稀薑桂丸入味丸胡椒理中丸其人素盛今瘦水走腸  
 間輾轉有聲名曰痰飲心下冷極以溫藥和之  
 桂苓甘朮飲湯主之飲後水流在脇下咳唾引痛名曰懸  
 飲十棗湯下之飲水流于四肢當汗不汗身體疼重  
 名曰溢飲大青龍湯汗之欬逆倚息短氣不得臥其形

醫心方卷之九  
 痰飲  
 三十一

如腫名曰支飲五苓散澤瀉湯利之膈滿嘔吐喘欬寒熱  
腰背痛目淚出其人振振惡寒身暈惕者名曰  
伏飲倍木更有一種非痰非飲時吐白沫不甚  
稠粘此脾虛不能約束津液故涎沫自出宜用  
六君子湯加益智仁以攝之嗟乎五痰五飲證  
各不同治法迥別稍或不詳妄投藥劑非徒無  
益而又害之至如脾肺二家之痰尤不可混脾  
為濕土喜溫燥而惡寒潤故二木星夏為要藥  
肺為燥金喜涼潤而惡溫燥故二母二冬地黃

桔梗為要藥二者易治鮮不危困每見世俗惡  
半夏之燥喜貝母之潤一見有痰便以貝母投  
之若是脾痰則土氣益傷飲食忽減矣即使肺  
痰毋過于涼潤以傷中州稍用脾藥以生肺金  
方為善治故曰治痰不理脾胃非其治也信夫  
**脈候**經曰肝脈奕而散色澤者當病溢飲  
偏弦為飲浮而滑為飲沉而滑者懸飲  
脈皆弦微沉滑左右關脈實者膈上有痰可  
吐之之眼胞及眼下如烟煤者痰也痰得瀆



脈難愈

醫案

刑部主政徐凌如勞且怒後神氣昏倦汗出如浴語言錯亂危困之極迎余療之診其脈大而滑且軟此氣虛有痰也用補中益氣湯料併四貼為一劑用參至壹兩加熟附子壹錢熟半夏三錢四日而稍甦更以六君子加薑汁一鍾服數日兼進八味丸調理兩月而康郡侯王敬如患痰嗽輒服清氣化痰丸漸至氣

促不能食余曰高年服上不足故有是證若服前丸則脾土益虛矣投以六君子湯加煨薑三錢益智一錢五分十劑而痰清更以前方煉蜜為丸約服一觔飲食乃進


翰林李集虛勞而無度醉而使內汗出多痰服寬膈化痰之藥轉覺滯悶診其脈沉而濡兩尺尤甚余謂其婿楊玄潤曰痰得濡脈一時難愈况尺中濡甚精傷之象也在法不治玄潤強之投劑勉用補中益氣加半夏茯苓兩劑有小效

衆皆喜余曰瀆象不減脉法無根死期近矣果  
十餘日而歿  
文學朱文哉遍體如蟲螫口舌糜爛朝起必見  
二鬼執盤食以獻向余慟哭曰余年未滿三十  
高堂有垂白之親二鬼旦暮相侵决無生理倘  
邀如天之力得以不歿即今日之秦越人矣遂  
叩頭流血余診其寸脉乍大乍小意其爲鬼祟  
細察兩關弦滑且大遂斷定爲痰飲之疴投滾  
痰丸三錢雖微有所下而病患如舊更以小胃

丹二錢與之復下痰積及水十餘碗遍體之痛  
減半至明早鬼亦不見矣更以人參三錢白朮  
二錢煎湯服小胃丹三錢大瀉十餘行約有二  
十碗病若失矣乃以六君子爲丸服四劑而痊  
白朮丸治濕痰咳嗽

不南星 半夏 各一兩  
俱湯洗 白朮 一兩  
五錢  
右爲細末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服四錢  
食後生薑湯下

二陳湯治脾胃不和一切痰證



半夏湯洗七次 橘紅各五兩 白茯苓三兩  
炙甘草一兩五錢

每服五錢水二鍾薑七片烏梅一枚煎八分不拘時熱服

六君子湯

人參去蘆 白朮土炒 茯苓各一錢  
半夏 橘紅各一分 炙甘草五分

水二鍾薑五片煎至一鍾溫服

理中化痰丸 治虛寒嘔吐泄瀉飲食難化

人參 白朮炒 茯苓

甘草 乾薑 半夏薑製

等分爲末水丸桐子大每服三錢白湯送下

八味丸 補中益氣湯方見各

導痰湯 治痰涎壅盛痞塞不通

半夏湯洗七次 南星炮去皮 枳實去穢炒  
赤茯苓去皮 橘紅各一分 甘草炙半兩

每服四錢水一盞薑十片煎八分食後服

保和丸 治食積酒積

山查肉 二兩 半夏 薑製 橘紅

神麴 炒 麥芽 炒 白茯苓 各一兩

連翹 萊菔子 炒 黃連 各半兩

右為末滴水為丸加白朮二兩名大安丸

消暑丸 中暑為患藥下即避一切暑藥皆不及此人所未知

半夏 一觔醋五碗煮乾 甘草 生用 茯苓 去皮各半觔

右為末薑汁煮糊丸忌見生水如桐子大每

服五十九丸熱湯送下有痰生薑湯下入夏後

不可缺此

妙應丸 一名控涎丹

甘遂 去心 紫大戟 去皮 白芥子 各等分

右為末煮糊丸如桐子大曬乾臨臥淡薑湯

下七丸至十丸氣實痰猛加丸數不妨加

硃砂二錢全蝎三錢治驚痰極效

利金湯 新製 治氣壅之痰

桔梗 炒 貝母 薑汁炒 陳皮 去白各三錢

枳殼 錢五分 茯苓 二錢 甘草 五分

水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服

醫心方 卷之九 痰飲



潤肺飲

新製

貝母

糯米拌炒

天花粉

各二錢

桔梗

一錢

甘草

五分

麥門冬

去心

橘紅

去白

茯苓

去皮各一錢半

生地黄

二錢半

知母

酒炒七分

水二鍾薑三片煎七分食後服

水煮金花丸

南星

半夏

各一兩俱生用

天麻

五錢

雄黃 二錢

白麵

三兩

右為細末滴永為丸每服五十丸至百丸先

煎漿水令沸下藥煮至藥浮為度漉出淡漿

水浸另用生薑湯送下

防風丸治一切風痰

防風

川芎

天麻

酒浸二宿

甘草

炙各二兩

硃砂

半兩研水飛

右為末煉蜜丸每丸重一錢硃砂為衣每服

一丸荆芥湯化服

川芎丸消風化痰清上利膈

川芎

薄荷葉

焙乾各七兩半

桔梗

十兩

甘草 炙三兩半 防風 去苗二兩半 細辛 洗五錢

右為細末煉蜜丸每丸重三分每服一丸食後臨臥細茶嚼下

小黃丸 治熱痰咳嗽

南星 湯洗 半夏 湯洗 黃芩 各一兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服七丸食後生薑湯下

天黃湯

天花粉 各十兩 黃連 各十兩

竹葉煎湯為丸菘豆大每服三錢薑湯下

薑桂丸 治寒痰咳嗽

十棗南星 洗 小胃半夏 洗 官桂 去麤皮各一兩

右為末蒸餅丸桐子大每服五丸食後生薑湯送下

薑湯送下

胡椒理中丸 治虛寒痰多食少

款冬花 去梗 胡椒 甘草 炙

十草撥 下 日良薑 細辛 去苗

木陳皮 去白 乾薑 各四兩 白朮 五兩

右為細末蜜丸梧子大每服三十丸加至五十丸米飲下日二服

桂苓木甘湯

茯苓 四錢 桂枝 各五錢 白朮 各五錢

甘草 二錢

水二鍾煎一鍾温服

十棗湯 見傷寒 小胃丹 神芎導水丸 舟車神

祐丸 大聖瀆川散 重見 五苓散 見傷寒 青州白

丸子 見遺精

大青龍湯

麻黃 去節 六錢 桂枝 去皮 二錢 甘草 炙 二錢

杏仁 去皮 一錢 生薑 三錢 大棗 二枚 去核

石膏 二錢

水三鍾先煮麻黃減一鍾去上沫內諸藥煮

取一鍾服

澤瀉湯

澤瀉 二兩 白朮 一兩

水二鍾煎一鍾服

倍木丸 治五飲

白木 二兩

桂心

乾薑 各一兩

右為末蜜丸每服三十丸米飲下

滾痰丸 治一切痰百種恠證

大黃 蒸少頃 不可過

黃芩 各八兩

青礞石 稍煨 金色

沉香

百藥煎 以上各五錢

右為末水丸梧子大<sub>十</sub>湯空心服三錢此藥但取痰積自腸次第而下並不刮腸太瀉為痰家聖藥

茯苓丸 治痰滿膈間兩臂抽痛如神

半夏 二兩

茯苓 一兩

枳殼 去瓢 炒五錢

朴硝 二錢五分以<sub>二</sub>稍散在竹盤中少時盛<sub>水</sub>置當風處<sub>三</sub>即乾如<sub>四</sub>芒硝刮取用

右為末生薑汁煮麵糊為丸桐子大每服三十丸薑湯送下

清氣化痰丸 順氣消食化痰

半夏

南星 去皮

白礬

皂角

乾薑 各四兩

右先將白礬等三味用水五碗煎三碗却入

半夏南星浸兩日再煮至半夏南星無白點  
晒乾

橘紅 青皮 去穰 紫蘇子 炒

蘿蔔子 炒另 杏仁 去皮尖 葛根

神麴 炒 麥蘖 炒 山查

香附 各二兩

右為末蒸餅丸桐子大每服七十九食後茶

湯下 薛新甫曰有一人素厚味胸滿痰盛內  
脾胃虛者 多積熱服之而愈彼見有效脩合餽送  
無不受害

欬嗽 有聲無痰曰欬肺由火燥有痰無聲  
曰嗽脾受濕侵有痰有聲曰欬嗽

黃帝問曰肺之令人欬何也 此言欬而不言嗽  
者省文也如秋傷

于濕見于二篇一篇只有欬字一篇兼  
有嗽字則知此篇舉欬而嗽在其中矣 岐伯對

曰五藏六府皆令人欬非獨肺也皮毛者肺之

合也 肺主皮毛肺為內應 皮毛先受邪氣邪氣

以從其合也其寒飲食入胃從肺脉上至于肺

則肺寒 肺脉起于中焦下絡大腸還循胃口上

也肺寒則外內合邪因而客之則為肺欬 皮外則

受邪內則肺經受寒內應外合故 五藏各以其  
欬所謂形寒飲冷則傷肺是也

時受病非其時各傳以與之各以時者如春肝冬腎是也非其時而人與天地相參故五藏各病者乃他藏相傳也

以其時治時感於寒則受病微則為欬甚則為泄為痛各以時治者四時所傷不同法因之而痛寒在裏則腹痛惟其外乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之

四藏各以其時受病及乎肺而肺欬之狀欬而喘息有音甚則嘔血為欬矣

肺屬金主音聲肺自病故喘息有音唾血者隨隨欬而出其病在肺與嘔血咯血不同也

欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺心脉起于心中出屬心系上挾下咽故病喉痺喉間如梗咽腫喉痺介介如有所梗妨礙之意

肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胛下滿肝脉布脇肋故病如此

脾欬之狀欬則右胛下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇脾脉上膈挾咽隸于右故為右胛下痛以動也脾欬則右胛下痛者陰土之氣應于坤出西南也觀平人氣象論曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出于左乳下豈非陽土之氣應于虛里而出東北乎人與天地相參理有無往不合者

腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎腎系

醫宗必讀卷之九

干腸其脈貫脊故相引而痛腎主五液五藏且其脈直者入肺循喉嚨故甚則欬涎也

之久欬乃移于六府因其合而表裏相移也脾

欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長

蟲出脾欬不已胃必受之胃不能容氣逆而嘔長蟲蚘蟲也居腸胃之中嘔甚則隨氣而

上出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁

膽汁苦肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而

遺失遺失甲乙經作遺失矢屎同心欬不已則小腸受之小

腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失小腸之下則大

中於小腸之化故小腸受邪而欬則下奔失氣腎欬不已則膀胱受之

膀胱欬狀欬而遺溺膀胱為津液之府故久欬邪氣干之欬而遺溺

不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食

飲久欬則上中下三焦俱病出納升降皆失其和且三焦火衰不能生土故腹滿不能食飲

此皆聚于胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣

逆也此總結諸欬之證也諸欬皆聚于胃關於肺者胃為藏府之本根肺為藏府之華蓋

如上文所云皮毛先受邪及寒飲食入胃者皆

肺胃之候也陽明之脈起于鼻會于面出于口

故多涕唾而面浮腫帝曰治之奈何岐伯曰治

藏者治其俞治府者治其合浮腫者治其經此法也脈之所注者為俞所入者為合所

醫宗必讀卷之九 三 欬嗽

示從容篇曰欬嗽煩寃者腎氣之逆也腎虛而龍火亢

上則乘金而為欬嗽煩熱寃苦此虛癆之候也

按欬雖肺病五藏六府皆能致之析其條即經文尚有漏義總其綱領不過內傷外感而已風寒暑濕傷其外則先中于皮毛為肺之合肺邪不解他經亦病此自肺而後傳于諸藏也勞慾情志傷其內則藏氣受傷先由陰分而病及上焦此自諸藏而後傳于肺也自表而入者病在陽宜辛溫以散邪則肺清而欬愈自內而

生者病在陰宜甘以壯水潤以養金則肺寧而欬愈大抵治表者藥不宜靜靜則留連不解變生他病故忌寒涼收斂如五藏生成篇所謂肺欲辛是也治內者藥不宜動動則虛火不寧燥癢愈甚故忌辛香燥熱如宣明五氣篇所謂辛走氣氣病無多食辛是也然治表者雖宜動以散邪若形病俱虛者又當補中氣而佐以和解倘專于發散恐肺氣益弱腠理益疎邪乘虛入病反增劇也治內者雖宜靜以養陰若命門火



衰不能歸元則參耆桂附在所必用否則氣不  
化水終無補于陰也至夫因于火者宜清因于  
濕者宜利因痰者消之因氣者理之隨其所見  
之證而調治在老人虛人皆以溫養脾肺為主  
稍稍治標可也若欲速愈而亟攻其邪因而危  
困者多矣可不謹諸

分條治法

脾欬升麻湯 腎欬麻黃附子細辛湯 胃欬烏梅丸 膽欬黃芩加半夏湯  
肺欬麻黃湯 心欬桔梗湯 肝欬小柴胡湯  
夏生薑湯 大腸欬赤石脂禹餘糧湯 小腸欬芍藥甘草湯

湯 勝脫欬茯苓甘草湯 三焦欬錢氏異攻散 感風者惡風

自汗鼻流清涕脉浮桂枝湯加防風杏仁前胡細辛 感寒者惡

寒無汗鼻流清涕脉緊二陳湯加紫蘇乾葛杏仁桔梗 春月風

寒所傷頭痛聲重金沸草散 夏月喘嗽面赤脉洪黃連

解毒 秋月身熱自汗口乾便赤脉虛大白虎湯 冬

月風寒形氣病氣俱實者加減麻黃湯 感濕者身體重痛白朮

熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣痰濃腥臭金沸草散

夏加薄荷荷柞杷葉五味杏仁桑白皮貝母茯苓桔梗 乍寒亦嗽乍熱亦嗽

金沸草散消風 七情饑飽邪氣上逆四七湯加杏仁五味



子桑皮人參阿膠 飲冷致嗽飲紫苑 嗽吐痰食俱

麥門冬枇杷葉 出二陳湯加木香 食積痰嗽二陳湯加瓜蒌菜

藥杏仁細辛枳殼 聲啞外感寒包熱者細辛半夏生薑辛以散

金經年久嗽服藥不瘥餘無他證與勞嗽異味一

百部 咳嗽煩冤八味丸 暴嗽諸藥不效大兒絲

可以其暴嗽而 疑遽補之非 欬而上氣喉中水雞聲射干麻

醋捨而嗽甘草二兩去皮作二寸段中半劈開

九茶清吞二錢 食鹹哮嗽白糖餅灰汁捨作餅子

臨臥時服之錢 爐內燻熱 出加輕粉四錢 另炒將餅切作四

搥參輕粉在內 令患人吃盡吐出病根即愈

肺脹欬而上氣鼻扇擡肩脉浮大者越婢加半

無外邪而內虛之肺脹宜訶子海石香附瓜蒌

為未密調喻之 肺脹躁喘脉浮心下有水小青龍湯

張而左右不得眠此痰夾瘀血碍氣而病四物

桃仁訶子青皮竹瀝韭汁

脉候 脉出魚際為逆氣喘息 欬而脉虛必

苦胃 浮直而濡者易治 喘而氣逆脉數有

熱不得臥難治 上氣喘嗽面腫肩息脉浮大

者久嗽脉弱者生實大數者死 上氣喘

醫心小讀 卷之九 甲六 欬嗽

嗽低昂脉滑手足温者生脉濇四肢寒者死  
欬而脱形身熱脉小堅急以疾爲逆不過十五  
日死 咳嗽羸瘦脉形堅大者死 咳嗽脉沉  
緊者死 浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死  
欬而嘔腹滿泄瀉弦急欲絕者死

醫案

文學金伯含欬而上氣凡清火潤肺化痰理氣  
之劑幾無遺用而病不少衰余診其腎脉大而  
軟此氣虛火不歸元用人參三錢煎湯送八味

九五錢一服而減後于補中益氣湯加桂一錢  
附子八分凡五十劑及八味丸二斤而瘥  
太學史明麟經年欬嗽更醫數十人藥不絕口  
而病反增劇自謂必成虛癆余曰不然脉不數  
不虛惟右寸浮大而滑是風痰未解必多服酸  
收故久而彌甚用麻黄杏仁半夏前胡桔梗甘  
草橘紅蘇子五劑知十劑已愈  
張遠公三年久嗽服藥無功委命待盡一日以  
他事造予居自謂必不可治姑乞診之余曰錢

時胸中痛否遠公曰大痛視其上唇白點如糕者十餘處此蟲嚙其肺用百部膏一味加烏梅檳榔與服不十日而痛若失咳頓止矣冷其家人從淨桶中覓之有寸白蟲四十餘條自此永不復發

麻黃湯 小柴胡湯 升麻湯 烏梅丸 小黃芩加半夏生薑湯 赤石脂禹餘糧湯 麻黃附子細辛湯 茯苓甘草湯 桂枝湯 黃連解毒湯 白虎湯 小青龍湯 以主並見傷寒 二陳湯

見痰 異功散 四物湯 補中益氣湯 見虛

金沸草散 治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽

旋覆花 去梗 麻黃 去節 前胡 去蘆各七分

荆芥穗 一錢 甘草 炒 半夏 湯炮七次

赤芍藥 各五錢

水一鍾半生薑三片棗一枚煎八分溫服

加減麻黃湯 治感寒欬

麻黃 去節 二錢 杏仁 五粒 半夏 姜製各一錢

桂枝 甘草 炙 紫蘇葉 各五分

橘紅一錢

水二鍾薑四片煎一鍾服

射干麻黃湯

射干

細辛

紫苑

款冬花

各三兩

麻黃

生薑

各四兩

五味子

半夏

各半升

大棗

柒枚

水一斗二升

先煮麻黃兩沸

去上沫

納諸藥

煮取三升

分溫三服

麻黃附子細辛湯

治腎藏發欬腰背引痛

麻黃

細辛

各二錢

附子

一錢

水一鍾煎七分服

四七湯

治七情氣鬱上逆為欬

半夏

湯泡五次二錢

茯苓

去皮一分

紫蘇

淨葉八分

厚朴

薑製一錢

水二鍾

生薑七片

紅棗二枚

煎一鍾

服

大兔絲子丸

治腎虛上逆欬嗽

兔絲子

洗淨酒浸

澤瀉

鹿茸

去毛酥炙

石龍芮

去去

肉桂

去麤皮

附子

泡去皮各一兩

石斛去根 熟地黄 白茯苓去皮

牛膝酒浸一宿焙乾 續斷 山茱萸去核

肉苁蓉酒浸切焙 防風去蘆 杜仲去蘆皮炒去絲

補骨脂去毛酒炒 華澄茄 沉香

巴戟去心 茴香炒各三兩 五味子

桑螵蛸酒浸炒 覆盆子去枝葉萼各半兩 芎藭

右為末酒煮麵糊丸如桐子大每服三錢空

心鹽湯送下

安腎丸治腎虛欬逆煩寃

肉桂去蘆皮勿見火 烏頭炮去皮各一觔 桃仁麩炒

白蒺藜炒去刺 巴戟去心 山藥

茯苓去皮 肉苁蓉酒浸去甲 石斛去根炙

草薺 白朮炒 補骨脂各三觔

右為末蜜丸梧子大每服三錢空心鹽湯下

越婢加半夏湯治肺脹喘嗽鼻扇有擡

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩

甘草一兩 半夏半升 大棗十五枚

水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分温三服 然寒濕感濕欬嗽身體重痛

白木酒 感濕欬嗽身體重痛

白木 三兩 泔浸一宿 土蒸 切片 慢火炒黃 用

酒二鍾 煎八分服

觀音應夢 欬嗽定喘止嗽

人參 一錢 胡桃 二枚 去衣

水一鍾 薑五片 棗二枚 臨臥煎服

清音丸 蜜丸 龍眼大 每服用一丸 嚙化

桔梗 訶子 各一兩 甘草 五錢

保和湯 治久嗽成癆 硃砂 青黛 各三錢 冰片 三分

知母 鹽水炒 貝母 去心 天門冬 去心

麥門冬 去心 款冬花 各一錢 天花粉

薏苡仁 炒 杏仁 去皮尖 五味子 十二粒

馬兜鈴 紫苑 桔梗

百合 阿膠 蛤粉 當歸

百部 各六分 甘草 炙 紫蘇

薄荷 各四分

水二鍾薑三片煎七分入飴糖一匙食後服  
吐血加炒蒲黃生地黃小蘗痰多加橘紅  
茯苓瓜蒌仁喘去紫蘇薄荷加蘇子桑皮  
陳皮

本事鼈甲丸 治虛癆咳嗽耳鳴眼花

五味子 二十兩 鼈甲 地骨皮 各三兩

右為末蜜丸梧子大空心食前鹽湯下四錢

婦人醋湯下此方服者必效不可忽也

寧肺湯 治營衛俱虛發熱自汗喘嗽

人參 當歸 白朮

熟地黄 川芎 白芍藥

五味子 麥門冬 桑白皮

白茯苓 去皮 甘草 炙各一錢 阿膠 蛤粉炒一錢半

水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

治嗽補虛方

牛骨 一副 白蜜 八兩 杏仁 四兩去皮尖研

乾山藥 四兩 胡桃肉 四兩去皮另研

右將牛骨髓白蜜砂鍋內熬沸以絹帛濾去



渣盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃參味入瓶攪和以紙密封瓶口重湯煮一日一夜每日早晨白湯化一匙服

紫金散 治久嗽日夜不得眠

天南星去皮 白礬 甘草各五錢

烏梅淨肉二兩

右為籠散用慢火于銀石器內炒令紫色放冷研為細末每服二錢臨臥時身體入被內用薑汁七分溫湯三分煖令稍熱調前藥末

服之嚥下便仰臥低枕想藥入于肺中須臾得睡其嗽立止

救急方

杏仁三升去皮尖及雙仁者炒研如泥 白蜜 一升

牛酥 二升

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨其銅鐺勿令脂垢先傾三升汁于鐺中刻木記其深淺又傾汁二升以緩火煎減至于所記處即內蜜酥等煎還至木記處貯于不津磁

器中每日三度煖酒服一大匙和粥服亦可  
一七唾色變白二七唾稀三七欬斷  
薰方 風寒久嗽非此不除

天南星 款冬花 鸞管石

佛耳草 雄黃

等分爲末拌艾以薑一厚片置舌上次于艾

上燒之須令烟入喉中爲妙

人參清肺湯 治肺胃虛寒欬嗽喘急

地骨皮 人參 去蘆 阿膠 麩炒

杏仁 去皮尖 麩炒 桑白皮 去蘆 知母

烏梅 去核 炙甘草 鬲粟殼 去蒂蜜 蓋炙

右各一錢水二鍾棗子一枚煎一鍾臨臥服

通聲煎 治咳嗽氣促滿悶失音

杏仁 一升去皮尖及雙仁者炒另研如泥 木通

五味子 人參 桂心

細辛 款冬花 菖蒲

竹茹 酥 白蜜

生薑汁 各一升 棗肉 二升

水五升微火煎七沸去渣內酥蜜薑汁棗肉  
再煎令稠每服一匙噲化

*[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]*

喘者促促氣急喝喝痰聲張口擡肩搖

身擡肚短氣者呼吸雖急而不能接

續似喘而無痰聲亦不擡肩但肺壅而不

下哮者與喘相類但不似喘開口出氣

之多而有呀呬之音呬者口開呀者口閉

開口閉口盡有音聲呬呀二音合成哮字

以痰結喉間與氣相繫故呬呬

呀作聲三證極當詳辨

經曰諸病喘滿皆屬于熱火盛為夏熱火衰為

而息微熱病則氣盛而息鼾又寒為陰主乎遲

緩熱為陽主乎急數故寒則息遲氣微熱則息

數氣鼾而五藏生成篇曰欬嗽上氣厥在胸中

過在手陽明太陰上氣喘急也胸中者手太陰

肺之分也手陽明大腸為肺之表二經之氣逆于胸中則為喘嗽也

○秋脉不及則令人喘呼

吸少氣 故云呼吸少氣非有餘之喘也 ○勞

則喘息汗出 疲勞過度則陽氣動于陰分故 ○

邪入六府則身熱不時臥上為喘呼 外傷于邪則陽受之

而不能以時臥也邪盛則實故為喘呼 ○二陽之

病發心脾其傳為息賁 二陽者陽明也為胃與

胃府病必傳于脾藏脾受傷必竊母氣以自救

則心亦病也土不能生金而心火復刑之則肺

傷故息上 賁而喘急 肝脉若搏因血在脇下令人喘逆

肝為血海血瘀則脉搏 腎者水藏主津液主

木病則氣上故為喘逆 腎主納氣腎水不足虛火上越

臥與喘也 則不得靜而臥乃動而喘也 喘

欬者是水氣并陽明也 土虛不能制水則水邪

利故為 夜行則喘出于腎淫氣病肺 此下四

喘欬 屬氣病在陽也陰受氣于夜主靜夜行則勞 有

所墮恐喘出于肝淫氣害脾 墮恐者傷筋損血

乘上故 有所驚恐喘出于肺淫氣傷心 驚恐則

亂肺藏氣故喘出于肺 度水跌仆喘出于腎與

骨 水氣通于腎跌仆 傷于骨故喘出焉

愚按內經論喘其因衆多究不越于火逆上而

氣不降也挾虛者亦有數條非子母情牽即仇

醫宗少微 卷之九  
譬肆虐害乎肺金之氣使天道不能下濟而光明者孰非火之咎耶雖然火則一而虛實則分丹溪曰虛火可補參耆之屬實火可瀉芩連之屬每見世俗一遇喘家純行破氣于太過者當矣干不及者可乎余嘗論證因虛而死者十九因實而死者十一治實者攻之即效無所難也治虛者補之未必即效須悠久成功其間轉摺進退良非易也故辨證不可不急而辨喘證爲尤急也巢氏嚴氏止言實熱獨王海藏云肺氣

果盛則清肅下行豈復爲喘皆以火燥真氣氣衰而喘所謂盛者非肺氣也肺中之火也斯言高出前古惜乎但舉其端未能縷悉請得而詳之氣虛而火入於肺者補氣爲先六君子湯補中益氣湯陰虛而火來乘金者壯水爲亟六味地黃丸風寒者解其邪三拗湯華蓋散濕氣者利其水滲濕湯暑邪者滌其煩白虎湯香薷湯肺熱者清其上二冬二母甘桔梔芩痰壅者消之二陳湯氣鬱者疎之四七湯飲停者吐之吐之不愈木防己火實者清之白虎湯加瓜蒌仁肺癰而湯主之枳殼黃芩神效

醫宗少微 卷之九

喘保金化毒 苡仁甘草節桔梗貝母防風金銀花橘紅門冬 肺脹而喘

利水散邪 肺脹之狀欬而上氣喘而煩躁目如者心下有水小青 腎虛火不歸經導龍入海 龍湯加石膏主之

丸主 腎虛水邪泛濫逐水下流 金匱腎氣丸 別有哮

證似喘而非呼吸有聲呀呷不已良由痰火鬱

于內風寒束其外或因坐臥寒濕或因酸鹹過

食或因積火薰蒸病根深久難以卒除避風寒

節厚味禁用涼劑恐風邪難解禁用熱劑恐痰

火易升理氣疎風勿忘根本為善治也 宜蘇子枳殼桔

梗防風半夏夏瓜萹荻荅甘草如冬月風甚加麻黃夏月痰多加石膏挾寒者多用生薑 證發于冬初者多先于八九月未寒之時用大承氣下其熱至冬寒時無熱可包此為妙法如止諸欬皆其大綱若五藏六府七情六氣何在非致喘之由須知舉一隅即以三隅反方不魏為明通可以司人之命矣

**脉候** 喘逆上氣脉數有熱不得臥者死 上氣面浮腫肩息脉浮大者危 上氣喘息低昂脉滑手足溫者生脉澀四肢寒者死 右寸沉

實而緊為肺感寒邪亦有六部俱伏者宜發散則熱退而喘定喘脈宜浮遲不宜急疾

醫案

太學朱寧宇在監時喘急多痰可以坐不可以臥可以俯不可以仰惶急求治余曰兩尺獨大而軟為上盛下虛遂以地黄丸一兩用桔梗三錢枳殼二錢甘草一錢半夏一錢煎湯送下不數劑而安

給諫黃健庵中氣大虛發熱自汗喘急余診之脈大而數按之如無此內有真寒外見假熱當以理中湯冷飲舉家無主不能信從惟用清火化痰之劑遂致不起

方伯葉震瀛夫人喘急痞悶肌膚如灼汗出如洗目不得瞑余診之六脈皆大正所謂汗出如油喘而不休絕證見矣辭不治越三日而歿社友宋敬夫令愛中氣素虛食少神倦至春初忽然喘急悶絕不知入手足俱冷咸謂立斃矣余曰氣虛極而金不清肅不能下行非大劑溫

補決無生理遂以人參一两乾薑三錢熟附子  
三錢白朮五錢一服即甦後服人參七觔餘薑  
附各二觔遂全愈不復發  
社友孫芳其令愛久嗽而喘凡順氣化痰清金  
降火之劑幾于遍嘗絕不取效一日喘甚煩躁  
余視其目則脹出鼻則鼓弱脉則浮而且大肺  
脹無疑矣遂以越婢加半夏湯投之一劑而減  
再劑而愈余曰今雖愈未可恃也當以參朮補  
元助養金氣使清肅令行竟因循月許終不調

補再發而不可救藥矣

文學顧明華十年哮喘百藥無功診其兩寸數  
而瀉余曰瀉者痰火風寒久久盤踞根深蒂固  
矣須補養月餘行吐下之法半年之間凡吐下  
十次服補劑百餘遂愈更以補中益氣為丸加  
鷄子秋石服年許永不復發

補中益氣湯 見類中風 六君子湯 六味丸 八味

丸 見虛癆 金匱腎氣丸 見水脹 白虎湯 香薷湯 見暑

二陳湯



三拗湯見痰治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃節不去 杏仁尖不去 甘草不炙各等分

每服五錢水一鍾薑五片煎服取汗

華蓋散治肺風痰喘

麻黃節去根 紫蘇子炒 杏仁皮炒去尖

桑白皮炒 赤茯苓去皮 橘紅各一錢

甘草五分

水一鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾服

滲濕湯治濕傷身重而喘

蒼朮一兩 白朮一兩 甘草炙各一兩

茯苓去皮 乾薑炮各二兩 橘紅

丁香各二錢半

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分服

越婢加半夏湯

麻黃六兩 石膏半鈔 生薑三兩

甘草一兩 半夏半升 大棗十五枚

水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服

小青龍加石膏湯

水麻黃去麻黃芍藥桂枝

細辛各半甘草各三乾薑錢五

五味子各半石膏二兩

水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

強人服一升羸者減之日三服

四七湯見欬嗽

加減瀉白散

桑白皮一兩地骨皮一兩知母一兩

陳皮去白桔梗各五青皮去白

黃芩各三炙甘草各三

每服五錢水二鍾煎一鍾食後服

木防已湯

木防已三兩石膏雞子大桂枝二兩

人參四兩

水六升煮取二升分溫再服

十緝湯 治喘急有風痰

半夏七個皂角去皮甘草炙各一寸

水一碗煮減半頓服

半夏丸 傷風痰喘兀兀欲吐惡心欲倒

水半夏 一兩 檳榔 雄黃 各三錢

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服五

十丸薑湯下

定喘奇方 治稠痰壅盛體肥而喘

橘紅 二兩 明礬 五錢 半夏 一兩

杏仁 一兩 瓜蒌仁 去油 炙甘草 七錢

黃芩 酒炒 皂角 去皮弦子燒存性 三錢

右為末淡薑湯打蒸餅糊為丸菘豆大每食後白湯下二錢日二次五日後下痰而愈虛人每服七分

簡易黃丸子 消痰定喘及齶齦


雄黃 研細 雌黃 研細 各三錢 山梔仁 七枚

菘豆 四十粒 明礬 二分 細研

右為末稀糊丸菘豆大每服一二丸薄荷細

茶湯臨臥服

消金丹 治食積痰哮喘遇厚味即發



醫宗金鑑 卷之九

蘿蔔子

淘淨蒸熟晒乾為末一兩

猪牙皂角

燒存性三錢

右以生薑汁浸蒸餅丸菘豆大每服三五

丸嚥下

水哮方

芫花

為末

大水上浮滓

過

大米粉

右三味搜為粿清水煮熟恣意食之

壓掌散治男婦哮喘

麻黃

去節二錢五分

炙甘草

一錢

白果

五个打碎

右水煎臨臥服

