

劉傷寒
河間寒
醫心藏
江提藥
寒證脈
一寒傷

金匱要鑒



劉河間傷寒醫靈

馬宗素撰

叢書集成初成編

(本印補)

劉河間傷寒醫鑒及其他三種

一九三九年十二月初版
一九六〇年一月補印

商務印書館出版

上海市印刷六廠印刷

劉河間傷寒醫鑑

元 平陽馬宗素撰

傷寒醫鑑

天道有遭世而興事有遇時而顯此古今之常理出於自然者也且謂儒書衰滅以後邪說蜂起以淆亂六經之道紅紫亂朱無以折衷孝武皇帝舉用俊茂罷黜百家之非而六經之道始明自漢而降註述繁錯醫書尤甚況醫乃人之司命所係尤重殆非小智所能及也惟昔黃帝岐伯難疑答問上窮天道下極地理中盡人性垂法萬世以爲生民之壽域是以名曰素問於是守真劉先生恐斯文將墜於地民罹橫夭於是分天地陰陽剛柔消長之理察人生風氣血脈寒熱之宜逐一擬一篇無不引素問先標受病之本源所處方用藥注書有四焉一者明天地之造化論運化之盛衰目之曰要旨論一部計三萬六千七百五十三字一者分君臣之佐使定奇耦之逆從又作宣明論一部計八千九百零三字一者又註傷寒六經傳受直格一部計一萬七千零九字又取至真要論一篇病機氣宜之說著玄機原病式一帙計二萬餘言又先生歸世之後恐庸醫不知樞要於宣明論內又集緊切藥方六十道分爲六門亦名直格通計八萬餘言可謂勤矣守真曰自昔以來惟仲景註述遺文立傷寒九十七法合一百一十二方後學者莫能宗之謂如人病傷風則用桂枝解肌傷寒則用麻黃發汗傷風反用麻黃則致強項柔痙傷寒反用桂枝則作驚狂發斑或誤服此二藥則必死矣故仲景曰桂枝下咽陽勝則熑承氣入胃陰盛則亡是

也。守真爲此慮。恐麻黃桂枝之誤。遂處雙解散。無問傷風傷寒。內外諸邪。皆能治療。從下證錯汗者。亦不爲害。如此革誤人之弊。已不少矣。仲景處大承氣湯。小承氣湯。調胃承氣湯。亦各有所宜。熱勢大者。大承氣主之。微者。小承氣主之。胸中有痛大便溏者。調胃承氣主之。守真又恐承氣有三。恐有過焉。不及之患。遂處三一承氣以總之。又慮仲景所著之書。文深義奧。淺學難通。遂芟其枝蔓。撮其本根。十去七八。將三百九十七法。一百一十二方。制三十二藥而總之。使人易於檢閱。一見此書。對形見影。了無障礙。得之對證用藥。人可自療。況醫家者。流業此者乎。兼仲景除傷寒之外。亦無雜病之論。是已備於仲景書也。故守真首論傷寒之差謬。故一切內外所傷。俱有受汗之病。名曰熱病。通謂之傷寒。今春溫夏熱。秋涼冬寒。是隨四時天氣所感。輕重及主療消息不等。合而言之。則一也。冬伏寒邪。藏於肌肉之間。至春變爲溫病。夏變爲暑病。秋變爲濕病。冬變爲正傷寒。冬冒其氣。而內生怫熱。而不病者。以至將來陽熱變動。或又感之。而成熱病也。經曰。冬傷於寒。春必病溫。亦其義也。然其陰證者。止爲雜病。終不爲汗病。由是傷寒汗病。直言熱病。不言其有寒也。三陰證者。邪熱在臟裏。以臟爲裏。爲陰。當下者是也。素問三篇刺熱評熱。兼雜病論熱。不說其寒。非無謂者也。熱論之外。素問更無說傷寒之證。熱論云。熱病者。皆傷寒之類也。又云。人之傷於寒也。則爲熱病。注云。寒者。冬氣也。冬時嚴寒。萬類深藏。固密不傷。於寒觸冒之者。名曰傷寒。傷於四時之氣。皆能病。以傷寒爲毒者。最爲殺厲之氣。中而卽病者。寒毒藏於肌肉間。久而不去。變爲熱病。故曰熱病者。傷寒之類也。古聖訓陰陽爲表裏。此一經大節目。惟仲景深得其旨趣。厥後

朱肱編活人書將陰陽二字釋作寒熱此差之甚也中間誤罹橫天嗟之何及素問言人之臟腑陰陽臟者爲陰腑者爲陽又四時陰陽盡有經紀內外之應皆表裏其信然乎六合爲十二經脈之合太陰陽明爲一合厥陰少陽爲一合少陰太陽爲一合手足之脈是謂六合表裏者諸陽脈皆爲表諸陰脈皆爲裏以此驗之是守真之言不誣矣然恐俗人不悟朱肱活人書之謬且略舉傷寒六經傳受一端而明之肱書云傷寒中病時腠理寒便入陰經脈不微細不經三陽也三陰中寒微則下理中湯稍厥或下利卽乾姜甘草湯若陰毒已深病勢困重六脈附骨取之方有按之則無於腑中用葱熨法或灸艾三百壯以來手足不溫者不可治也守真曰前三日三陽病在表故當汗之後三日三陰病在裏故當下之六經傳受皆是熱證非有陰寒之病也素問云傷寒未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已由此言之守真之說正合素問肱書失之遠矣又如身冷脈微陽厥極深一證肱書云病人身冷脈沉細而疾或時鄭聲指甲面色青黑陰毒已深若服涼藥則渴轉甚躁轉急須急服辛熱之藥如得手足溫更服前熱藥助之若陰氣散陽氣來卽漸減熱藥而調之守真曰傷寒下後熱不退畜熱在內陽厥極深以至陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以至遍身清冷若急下之真陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死此際當以涼膈散或解毒養陰退陽但欲畜熱漸散則心胸復暖脈自漸生至於脈復有力方可三一承氣湯下之守真復慮熱有兩感說復以素問證之曰亢則害承乃制此則正謂陽厥極深不能營運於四肢以至身冷脈微也此略舉一二端耳餘者之謬自可觸類夫肱書暴於當世亦一代之名醫其誤謬猶若是況其餘碎

雜不經之說。何可盡信。至論小兒如閻孝忠曰。凡小兒瘡疹當乳毋慎口。不可令饑。及受風冷歸腎變黑而難治。春夏病爲順。秋冬病爲逆。冬月腎旺盛寒多歸腎變黑。若妄下之。則內虛多歸於腎。此則直以瘡疹爲寒。守真云。閻孝忠不詳錢氏本方。斑疹黑陷牛李膏百祥丸。寒藥下之。多獲痊不救必死。爲熱豈不明哉。經云。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。及斑瘡黑陷。無不腹滿喘急。小便赤澁不通。豈非熱極使然耶。此閻孝忠所以失錢氏之意也。守真如此分別。可謂醫者之龜鑑也。學者當詳其說。無妄謂傷寒有陰毒之證。便投姜附之藥。使實實虛虛。損不足益有餘。以此誤人。不亦冤哉。每觀乎城齋公序曰。譬如宵行冥冥。迷路不知其往。遇明燈炬火。正路昭然。此醫鑑之所作也。然世俗惡寒好熱。蓋亦有說。守真云。病勢輕微。以熱藥強劫開發。誤中而獲効者有矣。如中酒有熱毒。而復飲熱酒以投之。令鬱結得開。而氣液宣通。此謂以熱治熱。亦有痊者。世俗惑於病輕而易痊。謂大疾亦然。殊不知不中。則反爲害也。熱病以熱藥治之者。譬如驕主得佞臣。縱恣禍及滅亡。更不覺佞臣之惡。惟其同好之可樂。使熱勢轉甚。以至陽厥身冷脈微。反陽爲陰。雖死不悟。至於諸熱變證。十損八九。莫不皆然也。如下利不止。瘡熱在裏。若使火艾熨烙。無不悅者也。此世俗好寒惡熱。所以滋肱書之失也。又守真云。病勢熱甚。而依法治之不退者。或失寒涼。或因失下。或熨烙熏灸。使熱極而妄爲陽厥。切不可用銀粉巴豆。性熱大毒。熱燥丸藥下之。反耗損陰氣。而衰竭津液。使熱勢轉甚。而懊憆喘滿。結胸腹痛。下利不止。血溢血泄。或爲淋閉。驚狂譫妄。熱證蜂起。不可勝舉。由此爲瘕癥。堅積之疾。誤人必多。然則世情亦不知醫者之過。未盡究守真之奇效。嘗聞守真之言曰。正

治者以寒治熱以熱治寒病證輕微可如此治之若病重危則當從反治之法其反治者亦名從治蓋藥氣從順於病氣也是故以熱治熱以寒治寒是謂反治以熱治熱者非謂病氣熱甚而更以熱性之藥治之本謂寒性之藥反佐而服之蓋謂病氣熱甚藥氣寒甚拒其藥寒則寒攻不入寒熱交爭則其病轉加也故用寒藥反熱佐而服之令藥氣與病氣不相忤其藥本寒熱服下咽之後熱體既消寒性乃發由是病氣隨愈餘皆倣此然正治之法猶君刑臣過逆其臣性而刑之故病熱不甚治之以寒逆其病氣而病自愈矣反治之法猶臣諫君非順其君性而以悅之其始則從其終則逆可以諫君去其邪而歸於正王冰曰病水猶人火火得草則燔得木則燔得水而滅病火猶救龍火然濕而燔得水而燔以人火不繞逐之則其火自滅耳此謂良醫之治法也夫逆治從治皆是違性之藥病人豈有不惡者是藥病相爭其氣所以得固也然十救其十亦不爲醫之功以謂人之有命也如身冷脈微終不省畜熱在內設以涼膈解毒之藥調治無有不惡又如患形不至有經年終不曉瘀熱在裏設以承氣寒藥下之無有不畏雖得痊愈尚不免於畏惡病勢大藥力小而致死者亦不知杯水救車薪之火爲非只指爲用涼藥之過此二者無他存於世人是非不明而惡寒好熱也

論脈證

活人書陰毒脈疾七至八至以上疾不可數者正是陰毒已深也六脈沉細而疾尺部斷小寸口脈或大若誤服涼藥則渴轉急有此之證者便急服辛熱之藥一日或二日便安若陰毒漸深其候沉重四肢首

冷腹痛轉甚。或咽喉不利。心下脹滿結硬。燥渴。虛汗不止。六脈但沉細而疾。一息七至以來。有此證者。速於氣海關元二穴灸三百壯。以手足和緩爲効。仍兼服正陽散。守真云。然旣脈疾至七至八以上。疾不可數者。正是陽熱極甚之脈也。世俗妄傳陰毒諸證。以素問驗之。皆陽熱亢極之證。但熱於內在裏極深。身表似其陰寒者也。及夫經云。亢則害。承乃制也。謂五行之道。實甚則過極。則反似寃已者也。是謂兼化。如萬物熱極而反出水液。以火煉金。熱極而反化爲水。是以火極而反以水化也。

素問脈要精微論。長則氣治。短則氣病。數則心煩。大則病進。註曰。致急則熱。故煩心也。又云節藏象論。人迎一盛病在少陽。二盛病在太陽。三盛病在陽明。四盛病已上爲格陽。註云。謂人迎脈於寸口一倍。餘盛同法。又云俱盛謂大於平常之脈四倍也。四倍以上爲關格之脈。人羸不能極於天地之精氣。則死矣。

論六經傳受

活人書太陰少陰厥陰。皆屬陰證也。少陰者腎也。厥陰者肝也。太陰者脾也。何謂太陰。太陰者脾之經。主胸膈膩脹。何謂少陰。少陰者腎之經。主脈微細。主心煩欲寐。或自利而渴者。何也。謂中病時。腠理寒。便入陰經。不經三陽也。蓋氣入於大腸。則發熱而惡寒。入於少陰。只惡寒而不發熱也。三陰中寒。微則理中湯。稍厥。或中寒下利。卽乾薑甘草。大段重者。四逆湯。無脈者。通脈四逆湯。何謂厥陰者。肝之經也。厥陰之爲主。主消渴。氣上衝。心中痛熱。饑不欲食。食則吐。衄下之利不止也。若陰氣獨盛。陽氣暴絕。則爲陰毒。其證

四肢逆冷腹臍築痛身如被杖脈沉疾或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令陽復而大汗矣。守真曰人之傷寒則爲熱病古今一同通謂之傷寒病前三日巨陽陽明少陽受之熱在於表汗之則愈後三日太陰少陰厥陰受之熱傳於裏下之則愈六經傳受由淺至深皆是熱證非有陰寒之證古聖訓陰陽爲表裏惟仲景深得其意厥後朱肱編活人書特失仲景本意將陰陽二字釋作寒熱此差之毫釐失之千里矣。

素問熱論云黃帝問曰熱病者皆傷寒之類也或愈或死皆以六七日之間其愈以十日以上者何不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故諸陽主氣也人之傷寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病必不能免於死矣帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭頂痛腰背強二日陽明受之陽明主肌肉其脈夾鼻絡於目故身熱目痛鼻乾不得臥也三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡於目故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟故可汗而已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾故五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺系於舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五臟不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微開十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而曉十二日厥陰病衰囊縮小腹微下大氣皆去病日已矣帝曰治之柰何岐伯曰治之各通其臟脈病日衰矣未滿三日可汗而已其滿三

日可下而已。

論汗下

活人書云。陽明證宜下。少陰證宜溫。又云。少陰病一二日口中和。其背惡寒者。宜著艾并四逆湯。又云。三陽證宜下。三陰證宜溫。少陰病發熱脈沉。麻黃附子湯主之。少陰證二三日常見少陰證無陽者。宜麻黃附子皆陰證表藥也。又云。發熱而惡寒者。發於陽也。麻黃桂枝湯主之。

守真云。夫辨傷寒陰陽之理者。邪熱在表府。病爲陽。邪熱在裏臟。病爲陰。世俗妄謂有寒熱陰陽之異。誤人多矣。寒病固有。然非汗病之謂也。止爲雜病。不可與汗病同科。且造化爲汗液之氣者。乃陽氣之氣。非陰寒之所能也。觀萬物熱極而反出水液。明可知也。況法曰。身熱爲熱在表。飲水爲熱在裏。其傷寒病本末身涼不渴。及小便不黃。脈不數者。未之有也。雖仲景有四逆湯證。表熱裏和。誤以寒藥下之。太早。表熱未入於裏。裏寒下利不止。及表熱裏寒自利。急以四逆湯溫裏。利止。裏和者。急於解表也。故仲景四逆湯證後。復有承氣湯寒藥下熱之說。由是傷寒汗病。經直言熱而不言其有寒也。經言三陽證者。邪熱在藏。在裏。以藏爲裏。爲陰。當下熱者。是也。按素問論傷寒熱病三篇。皆名曰熱。竟無寒說。兼以靈樞諸經運氣之說推之。則明爲熱病。誠非寒也。

素問熱論云。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之各通其藏脈。病日衰已矣。其未滿三日。可汗而已。其滿三日。可泄而已。此言表裏之大體也。註曰。正理傷寒論脈大浮數病在表。可發其汗。脈沉細數病在裏。可下之。由此雖日數過多。但有表證。而脈浮數。猶宜發汗。日數雖少。卽有裏證。猶宜下。

而之正應脈證

論陽厥極深

活人書云。傷寒盛隔陽。病人身冷脈細沉疾。煩躁而不飲水者。又云。大抵陰毒本因腎氣虛寒。或因冷物傷脾。外感風寒。則陽氣下守。遂發頭痛腰重腹痛。眼睛疼。身體倦怠。四肢逆冷。汗不止。或多煩渴。精神恍惚。若誤服涼藥。則渴轉甚。躁轉急。有此病者。便須急服辛熱之藥。或時鄭聲。指甲面色青黑。若陰毒已深。病勢困重。六脈附骨取之。則有按之即無。但於臍中用葱熨法。或者艾三百壯以來。手足不溫者。不可治也。

守真云。或下後熱不退。或畜熱內甚。陽厥極深。以至陽氣怫鬱。不能營運於身表四肢。以致遍身清冷。痛甚不堪。項背拘急。目睛赤痛。昏眩恍惚。咽乾或痛燥渴虛汗。嘔吐下利。腹滿實痛。煩冤悶亂喘急。鄭聲。以其畜熱極深。而脈道不利。以脈沉細欲絕者。俗未明其造化之理。而及傳爲陰毒。或失下熱極。以至身冷脈微。而昏冒將死。若急下之。則殘陰暴絕。陽氣後竭而立死。不下亦死。病人至此。命懸傾刻。然則治法當何如。曰。此當涼膈散。或黃連解毒湯。養陰退陽。但欲畜熱漸漸宣散。則心胸復煖。脈漸以生。至於脈復有力。可以三一承氣湯微下之。或解毒加大承氣湯尤良。俗未明此。故認作陰證。是以陰陽失其治也。

素問五運行大論。岐伯曰。氣有餘則制已所勝。而侮所不勝。不及則已所不勝。侮而乘之。已所勝輕而侮之。水餘則制土。輕侮於金氣不爭。故木恃其餘而欺侮也。又木少金勝土。反傷木。以木不及。妄凌之也。四

氣本同侮謂侮慢也。而凌忽之也。又云以火煉金。熱極反化爲水。又云亢則害。承乃制。

論燥濕發黃

活人書云。一身盡痛。發熱身黃。小便不利。大便反快者。此名中濕。風雨襲虛。山澤蒸氣。人多中濕。濕留關節。須身體煩痛。其脈沉緩。內中濕也。主一身盡痛。發熱身黃。小便不利。又云以寒濕在表不解。爲不可下。也可以尤附湯主之。

守真云。發黃者。陽明裏熱極甚。煩渴熱鬱。留飲不散。以濕熱相搏而體發黃也。或言寒濕搏而發黃者。色及苔膏也。本傷寒失下。或誤汗之。溫之。灸之。熨之。或服銀粉巴豆大毒熱藥下之。反以亡液損其陰氣邪熱轉甚。或下太早。熱入以成結胸。但發黃者。或失下。寒涼調治。或熱極本惡。雖按法治之。而不能退其熱勢之甚者。或下後熱不退。皆能爲發黃也。大抵本因熱鬱極甚者。留飲不散。濕熱相搏。而以尤附湯主之。誤矣。

素問平人氣象論云。食已如饑者。胃疽。則是胃熱也。熱則消穀。食已如饑。目黃者。疽。陽怫於上。熱積胸中。陽氣燔上。故目黃也。

素問通評虛實論云。足之三陽。從頭走至足。然久厥逆而不下。以致怫積於上焦。故爲黃疽。

論不得眠

活人書云。下後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔。不渴。無表證。脈沉微。身無大汗者。乾薑附子湯。

主之

守真云夫傷寒病懊憹煩心反復顛倒不得眠者燥熱怫鬱於內而氣液不得宣通也以梔子豉湯主之素問刺熱篇云肝熱甚小便先黃腹痛多臥身熱熱靜則狂言及驚脇滿痛手足躁不得眠也

論嘔吐

活人書云無陽則厥無陰則嘔却言少陰下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔者白通加豬膽汁湯主之又云膈上有寒痰乾嘔者不可吐各溫之宜四逆湯主之
守真云嘔者火氣炎上之象也故胃熱甚則嘔也又云吐酸肝木之味也由火實制金不能平木肝木日甚故爲酸也則如飲食則喜酸也或言酸爲寒者則如酒苦性熱養於心火故飲之則令人色赤氣粗脈洪大而數語澁譖妄歌唱悲笑喜怒如狂冒昧健忘煩渴嘔吐皆熱證也其吐必酸宿熱可明矣
素問至真要大論云諸吐酸暴注下迫皆屬於熱註云內隔嘔逆是火也不得入是火也

論濕熱不利

活人書云傷寒下利多種須辨陰陽勿令差互大抵傷寒下利多種須看脈與外證下利脉大者虛也脈微弱者爲自止寒毒入胃腑下必寒腹脹滿大便黃白或青或黑或下利清穀濕毒氣甚則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁也得之寒毒入胃四逆理中湯白通湯加附子四逆湯等若濕毒下膿血者桃花湯地榆散主之

守真云下利膿血者如世之穀肉果菜濕氣甚則自然腐爛潰發化爲水故食於腹中感人濕熱邪氣則自然化爲膿血水其熱爲赤熱屬心火故也其濕爲黃濕屬脾土故也燥鬱爲白屬於肺金故也濕熱甚於腸胃怫鬱結也濕主於痞以氣逆不能宣通因而以成腸胃之燥也濕熱相兼蓋水火陰陽寒熱猶權衡也一高則一下一興則一衰豈能寒熱俱盛於腸中而同爲利者乎若此之繆世傳多矣則如熱生瘡瘍素問大奇病論云腸澼下血少爲陰氣不足搏爲陽氣乘之熱在下焦故下面血也素問陰陽別論云陰結者便血一升陰主血故也再結二升三結三升註云三盛謂之再結三盛謂之三結素問至真要論釋云大熱內結注泄不止熱宜寒療結腹須除以寒下之結散利止則通因通用也

論霍亂

活人書云霍亂嘔吐而利熱多而渴寒多而不饑理中丸主之吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯主之吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆湯猪膽汁湯主之

錢氏吐瀉問難廣親七太尉七歲病吐瀉是時七月其證全不食而昏睡睡覺而悶亂吸氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫以驚治之疑睡故也

錢氏曰先補脾後退熱石膏湯次日又以水銀硫黃末生薑水調一字八月十五日後吐瀉身冷無陽也不能乳乾嘔瀉清褐色水當補脾益黃散主之不可下守真云吐下霍亂三焦爲水穀傳化道路熱甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性燥動故也或云熱無吐瀉

只是寒此說誤也

素問至真要大論云諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大如鼓有聲如鼓癰疽瘡瘍氣結核吐下霍亂皆屬於火

論好用寒藥

活人書云傷寒論家方論不一獨伊尹仲景之書猶六經也其餘諸子百家時有一得之要不可爲法況有好涼藥者附子硫黃笑而不喜用雖隆冬使人服三黃丸之類又有好熱藥者如大黃芒硝則畏而不敢用雖盛暑勸人灸病服金液之類非不知罪福蓋緣偏見所趨然也又云近時用小柴胡湯不問陰陽表裏凡傷寒之家皆令服此藥蓋不可輕用雖不若大柴胡湯小承氣之緊要之藥病不相當其爲害也同往往服小柴胡湯而成陰證者甚多矣又云陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷返陰丹主之此方甚驗喘促嘔逆者入口便住若加小腸不通反陰囊縮入小腹絞痛欲死臍下二寸灸仍與返陰丹當歸四逆加吳茱萸生薑湯慎勿與尋常利小便之藥尋常利小便之藥者多是冷滑藥此陰毒氣在小腹所致也

守真云大凡治病必先明此寒暑燥濕風火六氣最爲要也故曰其治病之法以寒治熱以熱治寒以清治溫以濕治燥乃正治之法也又云逆治所謂藥氣逆病之氣也其病輕微則當如此治其病重當從反治之法其反治者亦名從治所謂從順於病之氣也是故經曰以熱治熱以寒治寒然以熱治熱非謂病

氣熱甚更以熱性之藥治之本是寒性之藥反熱佐而服之所謂病氣熱甚藥氣反寒病熱極甚而拒其藥寒寒攻不入寒熱交爭則其病轉加也故用寒藥反熱佐而服之令藥氣與病不相違忤其藥性寒熱服下咽之後熱體既消寒性乃發由是病氣隨愈其餘皆倣此然正治之法猶君刑臣過逆其臣性而刑之矣故熱病不甚治之以寒逆其病氣而病自除矣反治之法猶臣諫君非順其君性而以說之其始則從其終則逆可以諫君去其邪而歸於正也

素問至真要大論云寒者熱之熱者寒之從者逆之順者從之王冰註云病微猶救人火得龍而燔得木而燔可以水滅之故逆其性氣而坏之病之氣微而攻之以寒病濕猶救龍火得濕而燔遇水而燔不知性以水折之以濕攻之適足以光焰詣天物窮方止矣識其性者反常之理以人火逐之則焰灼自消炎光撲滅然逆之謂以寒攻熱以熱攻寒從之謂熱難入從其性用不必皆同是以又曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也此之謂乎

論小兒瘡疹

活人書云小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間只與升麻解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可下瘡疹發熱在表尤不可轉瀉世人不學乃云初覺以藥利之宣其毒也誤矣又云疹豆已出不可踈轉出得已定或膿血大甚却用踈利亦非也大抵瘡疹首尾不可下小兒身熱耳尻冷咳嗽而用利藥即毒氣入內殺人

錢氏曰瘡疹始出之時五臟證見惟腎無候但見平證耳。骯冷耳涼是也。論瘡疹骯耳俱屬腎其居北方主冷也。若瘡黑陷耳骯反熱者爲逆是也。若用牛李膏百祥丸各三服不愈者死。病此瘡疹當乳母慎口不可令饑受風冷必歸於腎變黑難治也。有大熱利小便有小熱宜解毒。若黑紫乾陷者百祥丸下之不可黑者慎勿下。更時月輕重故春夏爲順秋冬爲逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑者無問何時十難救一。又曰瘡疹始出未有他證不可下也。但當用平和之藥頻與乳食不受風冷耳。如瘡疹三日不出不快者卽微發之。微發不出卽加藥發之。加藥不出卽大發之後不多。若及脈平無證者卽瘡疹稀少不可更發也。腎旺盛脾土不克水故脾虛寒戰則難治矣。所以百祥丸者瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也。何以不瀉腎曰腎主虛不受瀉故二服不効反加寒而死矣。

守真云小兒斑疹未出誤以熱藥汗致陽氣轉甚則重密出不快多致黑陷而死恐是斑疹未敢服藥以誤小兒諸病多矣亦不知古人留涼瀉之藥通治驚風積熱設是斑疹使熱少退而稀少出快得痊除愈也。若用涼膈散爲妙耳。閻孝忠集小兒論未達錢氏本意不明造化之理及妄言黑陷爲寒及云斑瘡終始不可服涼瀉之藥後人因之反致熱甚黑陷而死者閻公豈不詳錢氏本方治斑瘡黑陷者牛李膏百祥丸寒藥利之而多獲痊可不救必死爲熱豈不明哉夫斑瘡黑陷者無不腹滿喘急而小便赤而不通豈非熱極者也豈能反爲寒邪。

素問云諸痛痒瘡瘍皆屬於火。



要心寒傷

鑄洪編

本館據古今醫統正脈全書本排印初編各叢書僅有此本

傷寒心要

元 都梁鑑 洪編

傷寒心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗。可用雙解散連進數服必愈。若不解者病已傳變後三日在裏法當下。殊不知下之太早則表乘虛入裏遂成結胸虛痞懊憊斑疹發黃之證輕者必危危者必死但當以和平之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗而未愈或無汗而愈當用二小柴胡涼膈天水三藥合而服之。

病若半在表半在裏法亦當和解三小柴胡涼膈主之。

若裏熱微者則當微下四大柴胡合解毒湯主之熱勢未退又以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏之熱病至七八日裏證已甚表熱漸微脈雖浮數則以三一承氣合解毒下之。

其病胸膈滿悶或喘或嘔陽脈緊甚者七可用瓜蒂散涌之。

汗吐下三法之後別無異證者涼膈散調之。

病熱已去微熱者以益元散服之無令再病此傷寒治法之大要也。

或傷風自汗脈浮緩者十雙解去麻黃以汗之。

其病半表半裏十一白虎湯和解之。

病在裏脈沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿讌語煩躁畜熱內盛但是脈沉者並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗解以白虎湯直格云夏至前爲濕夏至後爲暑是以至後不用白虎宜乎局方云立秋後不用白虎子和云若有白虎證亦不用乎却用詳審之耳

白虎解後以五苓合天水調之多進數服無妨或腹脹滿脈沉者亦當承氣合解毒微下之或發汗之後熱不解脈尚浮者十六白虎加蒼朮再解之。

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此證以致身冷脈微昏懵將死切不得以寒藥下之誤下卽死又一輩庸醫妄言是陰厥便欲易換用玄武四逆溫熱之劑投之下咽立死殊不知此證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極深謂之竭畜熱怫鬱將欲絕者當此之證寒劑熱劑俱不可投但進涼膈解毒十七以養陰退陽宣散畜熱脈氣漸生得大汗而愈有無汗氣和而愈者。

未愈却解毒合承氣十八下之次以解毒涼膈天水合而爲一十九調和陰陽洗滌臟腑則其他別證自不生矣。

有大下之後熱不退再三下之熱愈盛若下之不愈脈微氣虛力弱不加以法則無可生之理若輒而不下則邪熱極盛陰氣極衰脈息斷絕必不可救似此之證是下之亦死不下亦死醫者到此活人殺人一彈指間其不至手足失措者幾希矣直格云傷寒汗後汗出不解或反不汗脈尚浮白虎加蒼朮湯再解之又按餘論云傷寒下後自汗虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如神汗止身涼此通仙之法也如此則汗下之後熱不退不問有汗均宜白虎加蒼朮解之又加入參亦妙仍服涼膈解毒調之

經云三下而熱不退者卽死後人有四五次下以十數行而生者此乃誤中耳活者未一二死者千百後學切不可以爲法但當依前用解毒合涼膈調之使陽熱徐退陰脈漸生庶不失人命若傷飲不解散成結胸之證臨時擇用二十大小陷胸湯丸累下之脈浮者不可下是表證未出小柴胡合小陷胸湯二十一投之脈雖浮而熱大極者二十二承氣徐徐疎利之或有留飲過度濕熱內生自利不止其熱未退二十三解毒湯治之

陽毒生斑二十四涼膈加當歸

怫鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裏不能發於外相搏遂成發黃二十五茵陳湯調五苓散甚者二十六茵陳合承氣下之

煩心不得臥二十七梔子湯

悞下太早遂成結胸虛痞二十八涼膈加枳殼桔梗剛柔二症譖語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛者二十九承氣合解毒下之

汗下之後煩渴飲水則三十涼膈減桂五苓甘露益元選而用之小便不通五苓泄之大便閉結承氣下之更有外證加減通聖散方內隨證用藥

婦人證治皆然惟孕婦三四月并七八月不用硝其餘月分用之無妨

小兒減劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙。後之學者其慎實之。

〔第一〕雙解散

防風通聖散

防風去蘆川芎

當歸

焙

赤芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

半兩

石膏

黃芩去腐

桔梗

一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

荆芥

白朮

梔子

二錢

半兩

右爲散。每服三錢。水一盞。薑三片。煎六分。溫服。

大黃芒硝麻黃三味對證。旋入自利。去大黃芒硝。自汗

去麻黃。

天水散 益元 六一

滑石六兩 甘草一兩

右爲末。每服三錢。溫蜜水調。暑月冷水亦可和解。傷寒傷風發汗。葱白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。調四五錢。并三服。解利爲度。加薄荷尤妙。

通聖合益元

右七兩和勻。每服三錢。水一盞半。葱白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。溫服。

〔第二〕小柴胡涼膈天水合服

小柴胡湯

北柴胡三兩

黃芩

人參

半夏

生薑

甘草

大棗一兩

右爲散。每服五錢。

涼膈散

連翹二兩

梔子

大黃

薄荷

黃芩一兩

甘草

右爲散。每服三錢。水一盞。煎七分。入蜜少許。竹葉五片。

〔第三〕涼膈合小柴胡。

〔第四〕大柴胡合黃連解毒湯。

大柴胡湯

柴胡去苗。大黃牛兩。黃芩

白芍藥分半。夏池七次。二錢

枳實生三錢

右爲散。分三服。水一盞。半生薑三片。大棗一枚。煎半盞。溫服。

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃芩

梔子等分

右爲散。每服半兩。水一盞。煎五分。溫服。

〔第五〕大柴胡合三一承氣湯。

三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實各半

甘草一兩

右剉每服二錢半水一大盞薑三片煎六分入硝再煎一二沸。

〔第六〕承氣合解毒湯。

〔第七〕瓜蒂散。

瓜蒂

赤小豆等分

右爲末豆豉湯調下一錢未吐再服。

〔第八〕涼膈散。

〔第九〕益元散。

風

〔第十〕雙解散。

〔第十一〕白虎湯。

知母兩半甘草一兩粳米一合石膏四兩

右剉每服五錢水一盞煎六分溫服。

〔第十二〕承氣合解毒湯。

〔第十三〕白虎湯。

〔第十四〕五苓散合天水散。

五苓散

豬苓

茯苓

三錢去皮

官桂一分

澤瀉一兩

白朮一錢

活人書三分宣明論半錢

右細末

〔第十五〕承氣合解毒湯。

〔第十六〕白虎湯加蒼朮。

〔第十七〕涼膈合解毒湯。

〔第十八〕解毒合承氣湯。

〔第十九〕解毒涼膈天水合。

結胸

〔第二十〕大小陷胸湯丸。

大陷胸湯

大黃

芒硝三錢

甘遂三字七

右剉四錢水一盞煎。大黃六分內消再煎。一二沸內甘遂溫服。未利再與。

小陷胸湯

半夏四錢生薑切 黃連二錢 桔梗一錢
桔梗全副 半夏一錢

右剉水三盞煎桔梗至盞半內藥煎至一盞分作兩服。

大陷胸丸

大黃半兩 薑蘿蔔根二錢 炒芒硝一錢

杏仁十二枚 去皮尖 炒變色

右大黃爲末研。薑蘿蔔杏仁爲膏。圓如彈子大。甘之末三字。蜜半匙。水一錢煎半錢。溫服一丸。一宿乃下。未利再與。

〔第二十一〕小柴胡合小陷胸湯。
〔第二十二〕承氣湯。

大黃 錦紋芒硝朴頭者厚朴去殼枳實各半

右剉如麻豆大分一半用水一碗半生薑三片煎至六分納硝煎一二沸絞去滓熱服。

〔第二十三〕解毒湯。

發斑

〔第二十四〕涼膈散加當歸。

發黃

〔第二十五〕茵陳湯調五苓散。

茵陳湯

茵陳一兩 大黃半兩 桔子十箇
右剉水二盞煎一盞溫服利爲度。

〔第二十六〕茵陳合承氣。

煩心不睡

〔第二十七〕梔子豉湯。

梔子七箇 剁豆豉二合

右水二盞先煮梔子蓋半內豉煮半盞。

〔第二十八〕五苓空腸煎涼膈加桔梗枳殼。

剛柔二症

〔第二十九〕承氣合解毒湯。

汗後煩渴

〔第三十〕涼膈減桂 五苓 甘露 益口

傷寒心要

甘露飲

茯苓

澤瀉

甘草

石膏

寒水石

二兩

白朮

桂枝

豬苓

半兩

滑石

四兩

右爲末每服三錢湯調或新汲水薑湯尤妙。

右其十八方如無大承氣係第五三一承氣代之亦妙通三十九件藥味調理傷寒曲盡其妙百發百中後之學者詳辨脈證審而用之起沉疴於指掌策奇功以活人方知其妙也。

新增病後四方

小半夏湯治汗下後嘔吐不已。

半夏五兩赤茯苓三兩

右剉每服半兩水二盞煎至一盞投薑汁更煎一二沸。

五味子湯治汗下後氣閉咳嗽。

五味子半兩麥門冬人參杏仁

陳皮生薑一錢棗子二枚

右剉每服二錢水二盞煎一盞作二服。

大橘皮湯治汗後胃虛。

陳皮甘草一兩人參二兩

右剉每五錢水盞半薑二片煎至一盞溫服。
赤茯苓湯治胸膈滿悶頭痛已得汗者。

陳皮 千草 人參 半夏 川芎 白朮等分
右剉每服五錢水盞半薑三片煎一盞溫服。

傷寒心要餘論

五臟六腑應五運六氣。凡病微則當其本化。甚則兼其鬼賊之化。亢則害。承乃制。微則是其本經本臟之本化。造化之化也。病甚則如金衰不能制木。木則生火。木火者皆陽也。故風火多兼化。則風熱相搏。賊其金也。

臟腑之氣應乎三陰三陽。實則行乎本化之氣瀉之。衰則行其勝已之氣瀉之。是爲殺其鬼賊也。
如諸陽畜熱。以涼膈合解毒服之。解散極熱。
如瀉火熱解毒調胃承氣是也。

如吐法用二仙散。
如調理傷寒白虎涼膈合服解之。

傷寒三日以裏連進雙解。如無汗必是傳變。待三四日之間。以小柴胡解表裏之熱。仍間服白虎涼膈。繼熱七八日之間。欲下而表證猶在。以大承氣湯、大柴胡湯雙行并煎。攻裏發表。最爲穩當。若是溫熱內甚。

自利者止涼膈卻進解毒。間白虎服之。或惡心乾嘔吐者。白虎大作一劑。調解毒末五錢服之即止。大小便不通併有腹痛不能忍者。以無灰酒煎朴硝三兩熱服即愈。亦按從治之法也。熱中伏寒下之已。或大承氣湯加木香瀉之尤妙。

傷寒久下始病時。又誤服麻黃熱劑。大甚必致熱極。或有陽厥極深。身冷脈微。陽極似陰之證。庸醫以爲陰證是也。須當急救其陰。以白虎涼膈日進三服。脈氣漸生。身體漸溫。然後以大承氣下之。夫大承氣救急之妙劑。如咽喉吐逆不利。當令熱服。開其鬱結。利而即愈也。

如傷寒汗下之後。自汗虛熱不止。於白虎湯加人參蒼朮一服如神。汗止身涼。此法至妙。不容詳盡。
如赤白痢。先服黃連阿膠丸。次服解毒湯。

傷寒瘡瘍。破傷風與傷寒治法一同。但以雙解涼膈白虎承氣臨時斟酌用之。雙解涼膈白虎瀉心。此理傷寒之妙劑。

孕婦臨月可服。益元涼胎。產後仍服。如血不盡。則以涼膈與四物合煎調理。經血甚者。大承氣合四物。乃瀉中有補也。

涼膈同四物。名玉燭散。婦人產後之妙劑。


涼膈四物合大承氣湯。名三和湯。

大承氣合四物。治婦人一切血積血聚等疾。加紅花尤妙。初生小兒。五七日有熱證。不得已。只以益元散。

時時灌之。如小兒夜啼。用涼膈調之。肚饑臨睡服。
凡瘡瘍癰癤。涼膈加當歸治之。



網江截藥脉證寒傷



述 華 陶

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

傷寒證脈藥截江網

明 餘杭節菴陶 華述

傷寒

傷寒之病非比雜科乃大方脈之首務也其間脈理精深良震無常死生反掌甚所難明苟或有稱治傷寒者未免羊質虎皮然則名譽虛隆而實德則病矣余早年盲學昏昏如蠅觸牖後得漢長沙張仲景先師治法所得石函遺著名曰遺芳嘉祕玩而誦之以開茅塞手足舞蹈不自知也數試數驗豈不珍重哉第恐吾老悖亦猶前之昏學臨病無措故將遺旨應手得心訣法纂以成集名曰傷寒證脈藥截江網存與朝夕備覽以看省己之愚原夫傷寒之脈浮大動數滑爲陽沉澁弱弦微爲陰其弦緊浮滑沉澁六者爲殘賊之脈故諸脈作病春弦夏洪秋毛冬石土緩爲四季之正脈浮沉遲數爲客主左爲人迎右爲氣口呼出心肺爲陽吸入腎肝爲陰一呼一吸爲一息寸口爲陽尺澤爲陰中爲關界陽主氣陰主血血爲榮氣爲衛寒則傷榮風則傷衛理自然也所謂傷寒之病從淺入深先以皮膚肌肉次入筋骨腸胃專以浮中沉遲數辨其陰陽寒熱及表裏虛實而斷之矣諸浮爲在表輕手于皮膚之上便得之曰浮略重指于皮膚之下肌肉之上陰陽各半得之曰中證屬半表半裏諸沉爲在裏重手于肌肉之下筋骨之間方得之曰沉屬陰諸遲爲在臟屬寒諸數爲在腑屬熱陰陽寒熱虛實用在有力無力中分有力者爲陽爲熱爲實無力者爲陰爲寒爲虛雜病以弦爲陽傷寒以弦爲陰雜病以緩爲弱傷寒以緩爲和傷寒以大

爲病進以緩爲邪退緩爲胃脈有胃氣曰生無胃氣曰死傷寒病中有神脈如脈中有力卽爲有神神者氣血之先也兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏必有正汗也寸口陽脈中或見沉細者但無力者爲陽中伏陰尺部脈陰中或見沉數者爲陰中伏陽寸口數大有力爲重陽尺部微而無力爲重陰寸口細微如絲爲脫陽尺部細微無力爲脫陰寸脈浮而有力主寒邪表實宜汗浮而無力主風邪表虛宜實尺脈沉而有力主陽邪在裏爲實宜下無力主陰邪在裏爲虛宜溫寸脈弱而無力切忌發吐尺脈弱而無力切忌汗下初按來疾去遲名曰內虛外實去疾來遲名曰內實外虛尺寸俱同名曰緩緩者和而生也汗下後脈靜者生躁亂身熱者死乃邪氣勝也溫之後脈來歇止者正氣脫而不復生也純弦之脈名曰負負者死按之解索名曰陰陽離離者死陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死

傷寒標本論治

病之有標本猶草之有根苗拔茅須連其茹治病必求其本標本不明處方何據所謂暝目夜行無途路而可見矣原夫六氣爲本三陰三陽經爲標病氣爲本臟腑經絡受病爲標先受病爲本次受病爲標且如尺寸俱浮者太陽受病也其經標本膀胱小腸也膀胱寒水爲本其脈循脊上連風府故頭疼脊強小腸爲標主發熱其正冬月時在本者麻黃湯在標者桂枝湯餘月改用冲和湯也尺寸俱長者陽明受病也其經標本大腸與胃也大腸爲標燥金爲本大腸與肺爲表裏但發熱解肌湯本脈絡鼻循目故目痛鼻乾不眠虛則汗解實則大柴胡承氣選用尺寸俱弦者少陽受病也其經標本三焦與膽也三焦相火

本也。遊行乎一身。故微熱足膽標也。其脈循脇絡耳。故耳聾。脇痛。寒熱嘔而口苦。緣膽無出入之路。故從中治。證用小柴胡和解散而愈。其經有三禁。汗、下、吐是也。尺寸俱沉者。太陰受病也。其經標本。肺與脾也。肺標脈循咽。脾本濕土。故腹滿咽乾。當得本治。宜泄大柴胡承氣也。尺寸俱微沉者。少陰受病也。其經標本心與腎。君火爲本。心苗舌。故舌燥。標腎脈循肺。主口乾。故口乾舌燥。故在標者因身冷治。主姜附也。在本者宜下三乙承氣。看微甚而用之。尺寸俱微緩厥陰受病也。其經標本肝與心包絡也。風木爲本。下循陰器。故囊縮。標心包絡繫舌。故舌卷。大抵溫之四逆輩。其四經并前三經中。若有陽分傳來者。下之庶不誤也。

論傷寒正治逆治反攻寒熱辨

寒熱真假。不可不知。正治逆治。豈可不辨。假如熱病服寒藥。熱不退。後用熱藥。而熱方退。假如寒病服熱藥。而寒不退。後用寒藥。而寒方退者。此爲從治也。從治者反攻也。治熱病以寒藥而愈。治寒病以熱藥而愈者。逆治也。逆治者正治也。且反攻之法。人亦難曉者多。如寒病服寒藥而愈者。此陽極變陰。熱極反得水化也。熱病服熱藥而愈者。此陰極變陽。寒極反得火化也。蓋物極則反也。

論傷寒用藥法則

標本逆從之既明。五劑之藥須用識。且如表汗用麻黃。無葱白不發。吐痰用瓜蒂。無豆豉不湧。去實熱用大黃。無枳實不通。溫經用附子。無乾姜不熱。甚則以泥清水加葱白煎之。竹瀝無姜汁。不能行經絡。蜜導

無皂角不能通祕結。非半夏姜汁不能止嘔吐。非人參竹葉不能止虛煩。非小柴胡不能和解表裏。非五苓散不能通利小便。非天花粉乾葛不能消渴解肌。非人參麥門冬五味不能生脈補元。非犀角地黃不能止上焦之吐衄。非桃仁承氣不能破下焦之瘀血。非黃芪桂枝不能實表間虛汗。非茯苓白朮不能去濕助脾。非茵陳不能除黃疸。非承氣不能制定發狂。非枳桔不能除痞滿。非陷胸不能開結胸。非羌活冲和不能治四時之感冒。身疼非人參敗毒不能治。春癰非四逆不能救。陰厥非人參白虎不能化斑。非理中烏梅不能治蠕厥。非桂枝麻黃不能除冬月之惡寒。熱隨汗解。非姜附湯不能止陰寒之泄利。非大柴胡不能去實熱之妄言。陰陽咳嗽上氣喘急用加減小青龍分表裏而可汗下。此傷寒用藥之大法也。

傷寒統論受病之由

夫傷寒者。冬時天氣嚴寒。水冰地凍而成殺厲之氣。正乃腎與膀胱坎水用事體虛觸冒之人中而即病。曰傷寒不卽病者。乃寒毒藏于肌膚。此因腎水涸竭。春木無以發生。熱不能發泄。藏鬱于內。遇感而發。至春變爲溫病。至夏變爲熱病。熱病重於溫病也。雖曰傷寒。實爲熱病。非時行之氣。春應緩而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。此非其時而有其氣。是一歲之中長幼病皆相似者也。是時行不正之氣。非暴厲之氣。暴厲者疫病也。疫病者乃春分至秋分前。天有暴寒。皆爲時行之寒疫也。又有四時之正氣者。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣凜冽。此四時之正氣也。然正氣亦能爲病。春傷于風。夏必飧泄。夏傷于暑。秋必瀉痢。秋傷于濕。冬必咳嗽。冬傷于寒。春必溫病。總曰傷寒病自外而入。或入于陽。或

入于陰非但始于太陽終于厥陰或有太陽傷者或有傳至一二經而亡者或有始終只在一經者或有赴經而傳者或有入太陽不作鬱熱便入少陰而成陰證者或有直中陰經而成寒證者緣經無明文故多妄治若三陽傳至三陰之陰證外雖有厥冷內有熱邪耳若不發熱四肢便厥惡寒者此是直中陰經之陰證也蓋先起三陽氣分傳入三陰血分則熱深厥亦深矣此亢則害承迺制者歟熱極反兼寒化也先熱後厥者傳經陰證也故宜四逆散大承氣看微甚而下之如初病無熱便厥者此直中陰經之寒證也宜四逆湯溫之

傷寒無陰證辨

傷寒無陰證人傷于寒則爲病熱熱病乃汗病也造化汗液皆陽氣也冬時腎水用事爲傷寒者其風傷于榮衛使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱初入太陽膀胱受證頭疼惡寒發熱腰脊強直按至皮膚之上下手便得脈來浮緊有力無汗爲傷寒表證寒則傷榮血冬用麻黃湯開發腠理表汗除邪脈來浮緩無力有汗怕風爲傷風風則傷衛氣冬用桂枝湯充塞腠理止汗散邪其餘月時雖無惡寒爲重也治三時感寒無汗以羌活沖和去地黃加紫蘇藿香以發散之有汗用加減羌活湯如用桔梗湯止汗退邪必加涼藥于中免班出黃生之患此謂無伐天和也若將冬時正傷寒之藥通治非時暴感寒熱定爲害矣

論傷寒難拘日數辨

假如一日至十三日若有一毫頭痛惡寒者每日如此不論日數多少尙有表證未解還用微汗不可攻

裏若攻下之則爲結胸等證也。

一二日惡寒皆除便覺胸中滿悶疼痛大便閉渴而不惡寒反怕熱熱入裏也。大柴胡承氣下之切不可拘于日數并始太陽終厥陰之論也。

二三日邪傳陽明胃身熱目痛鼻乾不眠按至皮膚之下肌肉之間脈來微洪而長者屬半表半裏渴而無汗葛根湯渴而有汗人參白虎湯微微惡寒者桂枝湯若無頭疼惡寒而反怕熱便閉燥渴狂言譫語揭去衣被揚手擲足者此爲熱邪傳入陽明之本脈來沉數有力正宜承氣湯下之泄去胃中實熱燥屎而愈也。

三四日邪傳少陽膽胸脇痛而耳聾寒熱嘔而口苦按至半陰半陽及脈來弦數者是半表半裏也緣膽無出入之路用小柴胡其經有三禁汗下吐也蓋陽明與少陽三經不從乎中治也中者半表半裏兩陽交中名曰少陽也。

四五日邪傳太陰脾腹滿咽乾口燥而渴按至筋骨之間脈來沉而有力者桂枝大黃湯若不渴自利身無熱脈來沉緩無力者四逆湯溫之也。

五六日邪傳少陰腎口乾口燥重指按至筋骨之間脈來沉而有力者正用大柴胡承氣下之若發渴自利清水不多腹脹者亦當下之俱是陽邪傳入陰經之陰證也若有一時初起不入太陽竟入太陰無非疼身熱便見四肢厥冷怕寒或腹痛自利小便清白脈沉無力或脈全無者此是直中陰經之陰證也非

是三陽傳來急用附子理中湯溫之脈沉有二陰陽寒熱虛實用在有力無力中分有力爲熱無力爲寒又有少陰太陽二證相併脈沉無力當無熱今反有熱如不頭痛者陰證反陽也麻黃細辛湯身發熱脉當浮大今反沉細若有頭痛者陽證反陰也四逆湯主之

六七日邪傳厥陰肝煩渴囊縮舌卷耳聾身不熱大便閉按至筋骨之間脈實絃而有力正用承氣下之此邪從三陽傳入三陰外有厥冷內有邪熱耳如脈微而無力腹痛自利不渴四肢厥冷怕寒者真陰寒證也附子理中湯溫之口中出沫流涎者亦寒也茱萸理中湯主之

傷寒陽厥陰厥辨

陽厥脈沉而有力腹痛後重大便稠粘小便赤澁或大便不通必是先熱後發厥也其四肢雖冷上不過肘下不過膝此熱深陽厥也承氣湯下之陰厥脈沉而無力口不渴四肢痛甚及大便泄利小便清白而身怕寒面如刀刮四肢厥冷上過乎肘下過乎膝此陰厥也四逆湯治之兩陽交盡名曰厥陰也大抵三陰無傳經胃實熱可下也又有傷寒兩感者病爲巨陽老陰也

看傷寒識證內外須知

大抵傷寒先須識證察得陰陽表裏虛實寒熱親切復審汗吐下溫和解之法治之庶無差誤先看兩目次看口舌後以手按其心胸至小腹有無痛滿用藥如目皆黃必爲欲愈之病也眼胞忽陷目睛直視必難治也開目欲見人屬陽閉目不欲見人屬陰目睛不明神水已竭不能照物者亦難治也

次看口舌上有白胎者爲熱。見黃胎者爲熱甚。見黑胎及生芒刺者必死。

後按其心胸有痛而滿悶者亦未經下之。爲表邪尙在少陽部分。只用小柴胡湯加枳殼桔梗爲的。如按其心下滿痛甚者已經下矣。爲結胸。正用陷胸湯看微甚而用之。陷胸宜從緩治。結胸證煩躁悉具者死也。

如小腹覺有硬痛。當按其痛。更問其小便通利若何。如通。則知畜血下焦。宜破瘀血。用桃仁承氣湯。盡黑物爲好。如小便不通。則知津液留結。宜五苓散。如木通山梔治之。

但覺發熱惡寒。頭痛。腰脊強。脈浮不拘日數。即是太陽表證。浮緊有力。無汗。爲傷寒。宜發汗。浮緩無力。有汗。爲傷風。宜實表。

但見肢痛。咽乾而渴。身無熱。手足溫。脈沉有力。明是熱邪傳來太陰裏證。宜當下之。如肢痛。自利不渴。惡寒。手足厥冷。脈沉無力。此是太陰自受陰也。宜當溫之。

但見口燥咽乾而渴。妄語。怕熱。大便閉。或微利。清水而大渴。脈沉有力。明是熱邪傳來少陰裏證。不拘日數。即宜下之。如肢痛。泄利。嘔吐。怕寒。手足厥冷。不渴。脈沉無力。此是少陰直中。自受內寒。陰證急用溫之。但見舌卷。苔縮而渴。身不熱。外雖四肢微冷。內有實熱。脈來沉緩有力。或大便閉。實明是熱邪傳來厥陰之證。即宜下之。如肢痛。泄利。嘔吐。不渴。怕寒。四肢厥冷。小便清利。脈微無力。此是厥陰自中其寒證也。急宜溫之。俱照前六經中用藥。其一切躁渴。大便閉。發狂。譖語。腹滿。微厥。斑血證。脈來有力者。俱是從三陽。

邪熱傳入三陰裏證。宜當下之。輕重用藥無疑。如寒當急溫之。不可緩也。有傷寒一日傳二經爲兩感。三日傳盡必死。再傳止于六日。夫兩感發于表者。麻黃葛根湯也。攻裏者。調胃承氣湯也。如未盡善。須問病者有無痛處。大小便通利。若胸痛者爲結胸。不痛者爲痞氣。乃因下早而成也。未經下者。非結胸也。乃表邪傳至胸中。症雖滿悶。尙有表邪未及平腑。正屬少陽部分。用小柴胡湯加枳殼以治之。如未效。以本方加小陷胸湯服之而愈。痛甚者。大陷胸湯下之。

論傷寒傳足不傳手之誤

傷寒傳足不傳手。此謬言也。人之一身無非血氣。且風行水動。氣行血流。晝夜循還而運行不息。豈有不傳手經哉。何所據也。冬月腎水用事。天氣嚴寒。則足少陰太陰正司受傷。三經最多。其次は少陽厥陰。肝膽繼冬而施春令。蓋風木起于大寒之次。卽正當十二月中。至春分。方行溫令。故風寒傷之。足陽明太陰脾胃中土。中土無定位。無成名。寄旺于四時。寒熱之氣皆能傳也。其邪亦歸于胃。其手之經主于足。故不傷也。若言傷足不傷手。正理也。若言傳足不傳手。非理也。

論傷寒六經變正法

夫六經傳變所由必須緊記。誦不釋手可也。且如鄭聲者。手足鄭重。冷而爲虛也。譖語有虛有實。虛則失血亡陽。實則內熱便閉。脾約者。大便硬而小便利。水穀不化。臟寒也。久利不止曰腸澼。傷寒十三日不好。曰過經。吐長衄曰衄厥。陰厥發燥曰陰燥。手足冷者爲之厥。指頭微寒情之縱。汗吐下溫不好曰壞證。又

若何爲逆。逆而有四。或變爲溫瘡。或變爲風濕。或變爲溫毒。或變爲瘟疫。此四者是也。發汗出不止曰漏風。亦爲亡陽。大下損血爲亡陽。陽證汗出不止曰亡陽。大衄取汗發證者曰亡陽。大抵皆無汗。其有汗者曰亡陽。三月至夏方發爲晚發。冬感寒而春發者曰溫病。非時暴寒伏于少陰之經。咽痛下利。名曰腎傷寒。發汗後身灼熱者曰風溫。名中暯。感四時不正之氣。老幼相似者爲疫癘。病瘥後必發者曰勞復。病瘥後多食而發者曰食復。病瘥後發熱者曰遺熱。吐利交作曰霍亂。鼻中出血曰衄。逆咳者曰嗽。乾嘔者曰噦。大便挾寒下利曰腸垢。大便堅硬曰鞭。心振寒而動曰悸。渴渴飲水而吐曰水逆。心中惱亂不安而悶者曰樞悶。皮膚不知痒痛者曰不仁。振搊而動曰肉瞤。筋惕。脣下有動氣曰奔豚。上有吐者曰湧之。下利者曰洩之。手足攣搐者曰瘓瘓。四肢風病曰未疾厥而下利。當不食及能食者曰除中。三陰無合病。三陽俱病者曰合病。二陽先病。後一陽自病曰併病。湧泄之所曰湧。曰理。婦人之中二曰理也。

論傷寒見證識病法

傷寒之病。從表入裏。必達外見。證之由所屬。必相審治。庶無誤也。且如頭病項強者。太陽證也。頭搖者。裏病也。頭汗者。裏有瘀血。必發黃也。面戴陽者。下虛也。面慘不光。傷寒也。面光不慘。傷風也。面上乍黑乍白。唇口生瘡。狐惑也。面如錦紋者。陽毒也。口難言。血少也。舌上有白胎。黃胎。內熱也。或黑者。熱極也。鼻燥。漱水不下。或目瞑。溺血也。目睛黃。小腸熱也。懷悶者。胃虛也。喜惡如狂。畜血也。肉瞤筋惕。汗下虛也。身如被杖。陰毒也。一身盡痛。多眠。或微腫難轉者。風濕也。身目俱黃。濕熱疸病也。身如蟲行。表虛也。背惡寒陰。

勝寒也不眠。因汗下多而神虛也。坐而伏者。短氣也。下利清穀。內寒也。咽中生瘡。上實下虛也。舌上生刺。熱盛也。利者熱盛也。又手冒心。因汗多而血虛也。腹滿手足溫者。邪入太陰也。舌卷囊縮。邪入厥陰也。

論傷寒有證見之必死法

夫傷寒死證。一一須明。生死不明。將何措手。非惟有干名節。亦且投藥無用。且赤斑者五死五生。黑斑者十死一生。陽證見陰脈者死。發少陽汗。連厥陰血者。厥竭而死。發左右逆氣汗者死。發風濕者死。發陰陽毒過六七日死。太發濕家汗。成瘡熱而溼者死。發熱。發少陽汗。譖語者死。發溫家汗。爲重渴者死。兩感傷寒者死。有汗不爲汗衰。爲陰陽交者死。結胸證悉具。煩躁者死。狂言不食者死。發厥肌冷而發躁。無時得安者。口臟厥而死。結胸舌上生胎。爲臟結者死。咳逆不止者死。舌卷囊縮者死。少陰吐利。煩躁四逆者死。結胸證煩躁悉具者死。少陽與陽明合病。下利脈長大。名曰負負者死。目亂無神氣。目無精者死。男子病新瘥。婦人與之交。曰陽易。婦人病新瘥。男子與之交。曰陰易。男子陰腫。小腹痛。婦人裏急。連腰股。眼昏四肢拘急。爲女勞復者死。厥利本不能食。反能食。爲除中者死。傷寒七八日。大發熱。汗出不止。如貫珠。此本氣衰者死。爪甲青爲陽衰者死。循衣模床。喘而不休。衛氣絕者死。柔汗爲冷。汗出發黃者。乃脾絕也。死。唇吻反青。乃肝絕也。死。環口黎黑。脈絕也。死。直視搖頭。心絕也。死。面黑遺尿。腎絕也。死。聲如鼻鼾。肺絕也。死。身體如疆。正氣脫也。死。喘而不休。邪氣勝也。死。水漿不下。胃氣絕也。死。形體不仁。榮衛不行也。死。乍靜乍亂者死也。

論婦人傷寒與男子不同治法

且夫天地陰陽各有分位。傷寒雜病豈無各科。男婦何可同治也。男子調氣爲主。女子養血爲先。女子血畜。則血室不畜。二氣和平。一有凝結。水火相刑。凡氣口緊盛者。卽宜下。人迎緊盛者。卽宜汗。但婦人左關浮緊者不可下。當發汗以救血室。榮衛得和。津液得行。浹然汗出而解。凡婦人經水適斷。晝則明了。暮則譖語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上中二焦言。無犯胃氣者。謂不可下也。以小柴胡湯主之。若行陽遲。則熱入胃。令津液燥。中焦上焦不榮。成血結胸。須針期門可也。但婦人傷寒發熱惡寒。四肢拘急。口燥舌乾。經脈凝滯。不得往來。以桂枝紅花湯。

若傷寒。口燥咽乾。不思飲食。以黃芩芍藥湯。

若傷寒喘急。煩燥戰而作寒。陰陽俱虛。不可下也。以小柴胡湯。

若傷寒經水適來。邪乘虛而入。晝則明了。暮則譖語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯上中二焦胃氣者。宜小柴胡湯。

若傷寒瘥後。猶有餘熱不去。謂之遺熱。宜地黃湯主之。

論妊娠傷寒又與前證有易法

黃帝內經曰。有故無殞也。大積大聚不可犯也。損其太半而止。過則殺也。且妊娠傷寒。保胎宜阿膠散。大抵妊娠傷寒。仲景無治法。最宜避忌諸藥。不可以尋常例視之。凡妊娠用安胎飲。散寒邪。以白朮湯。大

妊娠增寒壯熱。宜發其汗。以芍藥湯。

妊娠或中時行洒淅。寒熱作寒。振慄而悸。如噦者。宜蘇木湯。

妊娠傷熱。嘿嘿欲眠。不欲食。脇下痛。嘔逆痰氣。及產後病傷風。熱入胞宮。寒熱如瘡。并經水適來適斷。病後勞復。餘熱不解。以黃龍湯。

妊娠頭目眩疼。壯熱心躁。以旋覆花湯。

妊娠發斑。以梔子大青湯。

產後傷寒與胎前有別法

且產婦始生。氣血俱虛。外失衛護。內無主持。最宜調養。設受風寒。豈能救治。故與胎前不同。且產後十數日不解。頭痛惡寒。時時有熱。心下堅。乾嘔汗出。以陽旦湯。

產婦忘津液。大便多祕。或譖語煩燥。宜服神功丸。

產婦頭疼身熱。兼腹內拘急痛疼。以桂心牡蠣湯。

產婦傷風發熱。面赤而喘。頭痛。以竹葉防風湯。



傷寒一提金

陶華述

本館據古今醫統正脈全書本排印初編各叢書僅有此本

傷寒一提金

明 餘杭節菴陶 華述

一 提金啓蒙

余謂初學醫者先熟藥性次明經絡再識病名然後講解脈理以證其所生病證脈相同藥無不應病家云發熱惡寒頭項痛腰脊強則知病在太陽經也身熱目痛鼻乾不得眠則知病在陽明經也胸脅痛耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛則知病在太陰經也引衣跨臥惡寒或舌乾口燥則知病在少陰經也煩滿囊縮則知病在厥陰經也潮熱自汗譖語發渴不惡寒反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂五六日不大便則知病在正陽明胃腑病也設若脈證不明誤用麻黃令人汗多亡陽誤用承氣令人大便不禁誤用姜附令人失血發狂正爲寒涼耗其胃氣辛熱損其汗液燥熱助其邪熱庸醫殺人莫此爲甚傷寒之邪實無定體或入陽經氣分則太陽爲首其脈必浮輕手便得或入陰經血分則少陰爲先其脈必沉重手方得浮而有力無力是知表之虛實沉而有力無力是知裏之寒熱中而有力無力是知表裏緩急脈有浮沉虛實證乃傳變不常治之之法先分表裏寒熱陰陽虛實標本先病爲標先以治其急者此爲上工問證以知其外察脈以知其內全在活法二字不可拘於日數但見太陽證在直攻太陽但見少陰證在直攻少陰但見真寒直救真寒但見三證具便作主張不必悉具當如何處治此爲活法若同而異者明之似是而非者辯

之在表者汗之散之。在裏者利之下之。在上者因而越之下陷者升而舉之。從乎中者和解之。直中陰經者溫補之。若解表不開不可攻裏。日數雖多但有表證而脈浮者尚宜發散。此事不明攻之爲逆。經云一逆尚引日再逆促命期。若表證解而裏證具者不可攻表。日數雖多但有裏熱證而脈沉實者急當下之。此事不明禍如反掌。經云邪熱未除復加燥熱抱薪積火矣。如直中陰經真寒證然無熱惡寒不渴急宜溫補切禁寒涼。此事不明殺人甚速。經云非徒無益而反害之。陰證似陽者溫之。陽證似陰者下之。陽毒者分輕重下之。陰毒者分緩急溫之。陽狂者下之。陰厥者溫之。濕熱發黃者利之下之。血證發黃者清之下之。發班者清之下之。譖語者下之溫之。痞滿者消之瀉之。結胸者解之下之。太陽證似少陰者溫之。少陰證似太陽者汗之。衄血者解之止之。發喘者汗之下之。咳嗽者利之解之。正傷寒者大汗之大下之。感冒暴寒者微汗之微下之。勞力感寒者溫散之。溫極病者微解之大下之。此經常之大法也。有病一經已用熱藥而又用寒藥如少陰證用白虎湯四逆散寒藥者少陰證用四逆湯真武湯熱藥者庸俗狐疑詎能措手哉。嗚呼能皆傷寒之證名而得傷寒之方脈如此親切乃爲良醫。是知寒藥治少陰乃傳經熱證也是知熱藥治少陰乃直中陰經之寒證也。辨名定經明脈識證驗證用藥真知在表而汗真知在裏而下真知直中陰經而溫如此而汗如彼而下又如彼而溫辛熱之劑投之不差寒涼之藥用之必當病奚逃乎。須分輕重緩急老少虛實久病新發婦人胎產室女經水大凡有胎產而傷寒者不與男子傷寒同治法無胎產者治相同。婦女經水適斷適來寒熱似瘡者即是熱入血室但當和解表裏久病者過經不

解壞證也。新發者始病也。老者血氣衰少者血氣壯緩者病之輕。急者病之重。寒藥熱服。熱藥涼服。其中和之劑。溫而服之。戰汗分爲四證。要知邪正盛衰。類傷寒四證。照常法則治之。雖云發蒙實登仲景之梯階也。余雖專傷寒科。必出乎庸俗誇誕之醫萬萬。且余一生所蓄肺腑家祕語句方法。俱已備載發揮。窺我門牆者雖有多人。然片言不繁之要。不得再四經目講明。故述啓蒙捷法。脈要貫珠數。一一開註明白。所示自宜謹慎深密。勿授受於非人。毋輕泄於淺薄。莫負我之用心耳。

一提金六經證治捷法

太陽經見證法

頭項痛。腰脊強。發熱惡寒。恶心。是足太陽膀胱經受證。假如先起惡寒者。本病已後發熱者標病。若有一毫頭痛惡寒。身熱不拘日數多少。便宜發散。自然熱退身涼。有何變證。

辨證法

表虛自汗者。爲風傷衛氣。宜實表。

表實無汗者。爲寒傷榮血。宜發表。

診脈法

脈浮緊有力。爲傷寒。

脈浮緩無力。爲傷風。

用藥法

冬月正傷寒。用升陽發表湯。卽加減麻黃湯。

冬月傷風。用疎邪實表湯。卽加減桂枝湯。

春秋無汗。用羌活沖和湯發表。有汗用加減沖和湯實表。

夏月無汗。用神尤湯。有汗用前加減沖和湯。

陽明經見證法

目痛。鼻乾。不眠。微惡寒。是足陽明胃經受證。假如先起目痛。惡寒。身熱者。陽明經本病。已後潮熱。自汗。譫語。發渴。大便實者。正陽明胃腑標病。本宜解肌。寒宜急下。只看消息用之。

辨證法

目痛。鼻乾。微惡寒。身熱。病在經。

潮熱。自汗。譫語。發渴。便實。不惡寒。病在腑。

診脈法

脈見微洪。爲經病。

脈見沉數。爲腑病。

用藥法

微惡寒。自然目眶痛。鼻乾不眠者。用柴葛解肌湯。卽加減葛根解肌湯。渴而有汗不解者。如神白虎湯。卽加減白虎湯。

潮熱自汗。譫語發渴。揭去衣被。揚手擲足。斑黃狂亂。不惡寒。反怕熱。大便實者。輕則大柴胡湯。重則三承氣選用。俱在祕方六一順氣湯內。加減治之。

少陽經見證法

耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。是足少陽膽經受證。假如先起惡寒。身熱。耳聾。脅痛者。本病已後。嘔而舌乾。口苦者。標病。緣膽無出入。傷在半表半裏之間。止宜小柴胡一湯加減。和解表裏。治之再無別湯。本方自有加減法。此經有三禁。不可汗、下、吐也。若治之得法。有何壞證。常須識此。宜當審焉。

辯證法

耳聾、脇痛、寒熱、嘔而口苦舌乾。便屬半表半裏證。不從標本。從乎中治。

診脈法

脈見弦數。本經證。

用藥法

耳聾、脇痛、寒熱、嘔而口苦舌乾者。用柴胡雙解飲。卽加減小柴胡湯。

太陰經見證法

腹滿自利津不到咽手足溫者是足太陰脾經受證假如先起腹滿咽乾者本病已後身目黃標病內有寒熱所分不可混治臨病之際用在得宜

辨證法

腹滿咽乾發黃者屬腑熱

自利不渴或嘔吐者屬臟寒

診脈法

脈見沉而有力宜當下

脈見沉而無力宜當溫

用藥法

腹滿咽乾手足溫腹痛者桂枝大黃湯卽加減桂枝湯身目黃者茵陳大黃湯卽加減茵陳湯
自利不渴或嘔吐者加味理中飲卽加減理中湯重則回陽救急湯卽加減四逆湯

少陰經見證法

舌乾口燥是足少陰腎經受證假如先起舌乾口燥者本病已後譖語大便實者標病至陰經則難拘定
法或可溫而或可下因分直中者寒證傳經者熱證是其發前人之所未發也

辯證法

大要口燥舌乾渴而譖語大便實者知其熱須詳嘔吐瀉利不渴或惡寒腹痛者別其寒

診脈法

脈見沉實有力宜當下

脈見沉遲無力宜當溫

用藥法

口燥咽乾渴而譖語大便實或遶臍硬痛或下利純清水心下硬痛者俱是邪熱燥屎使然急用六乙順氣湯分輕重下之即承氣湯有加減法無熱惡寒厥冷踰臥不渴或腹痛嘔吐瀉利沉重或陰毒手指甲唇青嘔逆絞痛身如被杖面如刀刮戰慄者俱是寒邪中裏使然急用回陽救急湯溫之即四逆湯有加減法

厥陰經見證法

煩滿囊拳者是足厥陰肝經受證假如先起消渴煩滿者本病已後舌卷囊縮者標病亦有寒熱兩端不可概作熱治

辯證法

煩滿囊拳消渴者屬熱

口吐涎沫不渴厥冷者屬寒

但瘧不嘔清便必自愈。

診脈法

脈沉實者宜當下。

脈沉遲者宜當溫。

脈浮緩者病自愈。

用藥法

消渴煩滿舌卷囊縮大便實手足乍冷乍溫者急用六乙順氣湯下之即承氣湯有加減法口吐涎沫或四肢厥冷不溫過乎肘膝不渴小腹絞痛嘔逆者急用茱萸四逆湯溫之即回陽救急湯自有加減法

一提金脈要

或人問曰治傷寒先明脈證脈證不明取方無法脈證既明工中之甲夫脈之一字實先天後天之造化何爲先天何爲後天何爲脈也答曰人之陰陽卽爲先天人之氣血卽爲後天脈者非血非氣乃血氣之先卽營行之道路又問曰旣知先後天之脈理須明持脈之要曰舉曰按曰尋三字若此不明則陰陽表裏虛實何以別之持脈者輕手循之曰舉重手取之曰按不輕不重委曲求之曰尋初持輕手候之脈見皮膚之間便得曰浮是太陽經脈也有力者主寒邪在表無汗爲寒傷榮血表實者宜汗之無力者主風邪在表有汗爲風傷衛氣表虛者宜實之脈附於肌肉之下筋骨之間而得曰沉是三陰經脈也其三陰

俱是沉脈妙在指下有力無力中分有力者主熱邪在裏爲裏實宜下之無力者主寒邪中裏爲裏虛宜溫之不輕不重中而取之乃得其脈應於血肉之間陰陽相半若見微洪是陽明經脈也主邪在表多裏少宜解肌若見弦數是少陽經脈也主邪在半表半裏宜和解前之所云陰陽表裏虛實寒熱俱在浮中沉三脈有力無力中分有力者爲陽爲實爲熱無力者爲陰爲虛爲寒若浮沉中之不見則委曲而求之若隱若見則陰陽伏匿之脈也三部皆然或曰君之了然非庸俗所能識也其三脈中有進退焉有伏脈焉有可解不可解焉有歇至焉有燥亂焉請備言其所由答曰脈大者爲病進大則邪氣勝而正氣無權脈緩者爲邪退緩則胃氣和而邪氣無權何謂伏脈一手無脈曰單伏兩手無脈曰雙伏若病初起頭痛發熱惡寒而脈伏者緣陰邪陷於陽中不得發越此欲汗而當攻之使邪氣退而正氣復脈自至而病自除如欲雨則天鬱熱晴霽天乃反涼之可見也若七八日以來別無刑尅證候或昏冒不知人事或脈全無者此欲汗而勿攻之如六合陰晦雨後庶物皆甦換陽之吉兆也何謂可解不可解脈浮緩在表者以汗解之脈沉實在裏者以下解之脈沉遲在裏者以溫解之且夫浮汗沉下而溫固其宜也然浮宜下沉宜汗其故又何耶答曰浮而下者因大便難也設使大便不難豈敢下乎沉而汗者因表有熱也設使身不發熱豈敢汗乎何謂歇至如寒邪直中陰經溫之而斷續者爲歇至何謂燥亂因汗下後脈當靜今反盛者曰燥亂大凶之兆也然則君之言有所據乎吁難言也此出經常大法之格語也客欣然起而謝曰予雖白首無窮生平仰慕不意邂逅幸獲聞予茅塞正謂鼷鼠而發千鈞之弩甚所不當可謂切而確琢

而磨者也。較今庸俗實醯雞坎蛙。不知甞外之有天井外之有海耳。感君發明于後。豈非再來人乎。遂筆錄以示之。

提金貫珠數

交霜降至春分。冬月發者爲正傷寒。表證見者用辛熱之藥。大發汗裏證見者用寒涼之藥。急攻下此與非時傷寒不同。治方論開的本槌法中不再錄。

交春分至夏至前。有頭疼發熱不惡寒而渴者爲溫病。用辛涼之藥微解肌不可大發汗裏證見者用寒涼之藥急攻下。若誤下之未必爲害。誤汗之變不可言。當須識此。三月後得此證者爲晚發治法同表證不與冬時正傷寒同治法裏證治相同。方論開在的本槌法中不再錄。

交夏至後。有頭疼發熱不惡寒而渴此名溫病。愈加熱者名熱病。止用辛涼之藥微解肌不宜大發汗裏證見者止用大寒之藥急攻下表證不與正傷寒同治法裏證治相同。方論開在的本槌法中不再錄及秋至霜降前。有頭疼發熱不惡寒身體痛小便短者名溫病亦用辛涼之藥加燥劑以解肌亦不宜大發汗裏證見者用寒涼藥急攻下表證不與正傷寒同治法裏證治相同。方論開在的本槌法中不再錄其春夏秋三時有患頭疼身熱亦有惡寒者即是感冒非時暴寒之輕非比冬時正傷寒之重俱用辛涼之劑小發汗若裏證見者用寒涼之藥急攻下表證不與正傷寒同治法裏證治相同。方論開在的本槌法中不再錄。

其四時有患頭疼發熱惡寒身體倦痛骨腿酸疼自汗出口微渴脈空浮大而無力名勞力感寒證當用溫涼之劑溫經散寒切禁大發汗裏證見者中和之劑加轉藥微下之不可急攻利方論開在的本槌法中不再錄

其四時有患頭疼身熱惡寒老幼相傳者名時疫證用辛涼之藥微解表裏證見者急攻下從病制宜不與正傷寒同治法方論開在的本槌法中不再錄

若先起頭疼發熱惡寒已後傳裏頭疼惡寒皆除而反怕熱發渴譫語或潮熱自汗大便不通或揭去衣被揚手擲足或發班黃狂亂此爲陽經自表傳入陰經之熱證俱當攻裏下之設或當下失下而變出手足乍冷乍溫者因陽極發厥卽陽證似陰名陽厥急當下之又有失於汗下或本陽證誤投熱藥使熱毒入深陽氣獨盛陰氣暴絕登高而歌棄衣而走罵詈叫喊燥渴欲死面赤眼紅身發班黃或下利赤黃六脈大名陽毒發斑證用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣如大便實者又當大寒之藥下之此與發狂不同治方論開在的本槌法中不再錄

若初病起無頭疼無身熱就便怕寒厥冷腹痛嘔吐瀉利不渴踳臥沉重戰慄脈沉細此爲直中陰經真寒證不從陽經傳來當用熱藥溫之如寒極而手足厥冷過乎肘膝者因寒極發厥名陰厥急當救裏溫之此與陽厥不同治又有初病起外感寒邪內傷生冷內既伏陰內外皆寒或本真陰誤投涼藥使陰氣獨盛陽氣暴絕以致病起手足厥冷腰背強重頭眼眶痛嘔吐煩悶下利腹痛身如被杖六脈沉細湯飲

不下已後毒氣漸深入腹攻心咽喉不利腹痛轉甚心下脹滿結硬如石燥渴欲死冷汗不止或時鄭聲指甲面色青黑速灸關元氣海須服大熱之劑溫之此名陰毒令陽氣復而大汗解矣若夏月大發熱頭疼燥渴背惡寒微汗脈虛無力口齒燥者名中暑用寒涼之劑清之方論開在雜證中不再錄

若病人身微熱煩躁面赤戴陽欲坐臥於泥水井中脈來沉細無力此陰發燥名陰燥當用辛熱之藥溫之不宜涼劑誤用之其燥急渴甚必死矣若病人身冷脈沉細而疾雖煩燥不欲傾水入口者此名陰盛格陽亦用大熱之劑溫之方論開在的本槌法中不再錄

一傷寒失於汗下使熱邪傳裏燥渴譖語小水自利大便黑小腹硬痛或身黃是下焦畜血如狂證此與陽狂不同治宜下盡黑物則愈方論開在的本槌法中不再錄

一傷寒初得病與表熱但狂言煩躁不安精采不與人相當此因熱結膀胱其人如太陽經之裏證也自有太陽經之裏藥治不與陽狂同治法方論開在的本槌法中不再錄

一傷寒小水不利大便實小腹滿燥渴譖語怕熱身目黃此名濕熱發黃輕則疎利重則大下此與血證發黃不同治方論開在的本槌法中不再錄

一傷寒失於汗下血熱不散故成發斑大抵不宜發汗輕則化之重則下之起於胸腹先紅後赤者曰發斑起於手足先紅後黃者曰蚊迹臨病之際宜詳審焉方論開在的本槌法中不再錄

一傷寒少陰證。惡寒發熱無頭疼。誤以大發汗使血從耳目口鼻中出者。名陰血多不治。此與鼻衄陽血不同治方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒太陽證。發熱惡寒頭痛或微喘鼻中出血者。爲衄血。名陽血須分點滴成流。此與陰血不同治方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒失於汗下邪熱傳裏使水涸糞燥大便不通必發譫語或心下硬痛下利純清水燥渴口出無倫語亦譫語凡此皆實當寒涼之劑下之又有汗多亡陽或下後利不止身疼痛或自利清穀譫語者凡此皆虛當辛熱之劑溫之此與狂言相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒餘熱不除蘊在心胞使精神短少冒昧昏沉睡中言語一二句者名獨語宜涼劑清之此與譫語不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒因汗下後正氣虛而本音失則鄭重語散不知高下大小便自利手足冷名鄭聲宜中和之劑治之此與獨語不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒差後交接淫慾無病人反得病者名陰陽易宜清涼解毒之劑治之此與女勞復不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒差後交接淫樂不因易自病復發者名女勞復與前陰陽易同治法方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒失於汗下。或因汗下後虛。令人氣逆。不相接續者。名短氣。分虛實治之。此與喘證不相類。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒失於汗下。或因飲水過多。令人擡肩擗肚。氣逆上者。名發喘。分表裏水氣治之。此與短氣不相類。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒麻黃湯證誤下之心下滿悶不痛者。名痞氣。分虛實治之。此與結胸不相類。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒桂枝湯證誤下之心下滿硬而痛。名結胸。分緩急治之。此與痞滿不相類。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒證病。一陽經或三陽經同病不傳者。名合病。分在經過經治之。此與合病不相類。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒證。一陽經先病未盡。又過一經之傳者。名併病。分在經在腑治之。此與併病不相類。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒或汗下大過。或恣飲冷水。水寒相搏。虛逆聲濁惡而長。名噦。此與乾嘔不相類。輕則和解疎利。重則溫散。方論開在的本槌法中。不再錄。

一傷寒熱在胃口。與谷氣併。熱氣上薰無物。名乾嘔。分實熱水氣治之。此與噦證不相類。方論開在的本

槌法中不再錄。

一傷寒有頭疼發熱惡寒脈沉此名太陽脈似少陰當辛溫之劑散之與少陰證不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒無頭疼止則發熱惡寒脈沉此名少陰證似太陽當辛溫之劑散之與太陽證不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒頭疼惡寒身熱者名表熱以辛散之與裏熱不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒與頭疼無惡寒反怕熱燥渴口苦舌乾譫語大便實名裏熱此與表熱不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒頭疼身熱惡寒者名表惡寒當辛甘散之此與裏惡寒不相類方論開在的本槌法中不再錄。

一傷寒無頭疼無身熱而惡寒厥冷踳臥不渴或吐瀉腹痛戰慄者名裏惡寒當辛熱之劑溫之此與表惡寒不相類方論開在的本槌法中不再錄。

