

書

外科精要十九卷

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫學教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提舉余

賜山

校正

瘡腫科

總說

人之一身血氣周流則平若冷熱不調喜怒不常飲食不節稍有壅聚則隨所發見癰疽疔毒屬表易治疽疔癰疽屬臟腑發於腦背頰上最為難治徑一寸二寸為癰三寸五寸腫圓赤為癰八寸為疽癰疽癩各各不同其色亦異有

圖見之凡初覺響聚結熱疾痛腫赤痕癩闊連或見或不見浴之如極弱按之不可緩也若按而后痛者其膿深小按即痛其膿淺按之軟而復者有膿按之強而不復者無膿炊赤腫高者為實軟慢冷腫者為虛初作宜宣熱按毒外以洗滌角傳以斂其痕癩是大要法也已潰則排膿止痛朝夕亦洗滌以舒其毒氣膿盡則生肌傳加次等施治不可陰惶失序亦不可拘一酌量輕重形證通順寒則溫之熱則清之虛則補之實則泄之導以針石灼以艾炷破毒攻堅以平為期其有五善證者飲食如常一善實熱而小便澀二善肌肉好惡分明二善用藥如所科四善外無雜證五善七惡證者渴而喘大小便滑二惡內未潰內

黑而陷二惡已潰青肉筋骨黑三惡發背透膜四惡未潰肉先潰面青五惡發痰六惡發吐七惡所謂五善見三必死四必危外證形候不治者亦五訣益平滿背脊滿脚心平滿臍頭凸出逆證者有五大渴痛不止一逆聲細色脫二逆服藥嘔吐三逆睛細白大四逆肩脾全身轉不得五逆難治者亦有六證兩臉紅似坏菜心病深得之久全不腫起亦不覺痛乃臟腑受病深病處硬如牛領之皮又如石榴之狀用藥三五日不軟者病深病人無時喜笑迺神氣脫病深口小內關常出青白膿此不瘰癧內壞病深病處貼膏藥後出鮮血黑血間雜血痞深又云初發疽時一粒如麻豆大身軀便發熱生疔處肉

亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此為疔發雖大
若益梳如用藥有理則全活必矣初發疔時不拘大小身
軀無熱自覺倦怠生疔處亦不熱數日之間漸漸開大不
腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後肉色紫色黑此為疔發
未作之先臟腑已潰爛則不治矣復有心腎痛腫腸胃附
骨疽證心癰者乃心經有熱或好飲酒或嗜熱物積聚成
熱久而不散蒸發於皮膚之外氣血不流凝滯而生蠱疔
原道頗險而治宜用托裏活血之劑攻出外來腫高
不陷可保無虞若陷入裏亦不可恃如不飲食急須扶脾
能食下色破穿見肉膜亦未為害但要洗滌淨潔以生肉
藥搽四畔自然而愈腎癰乃與內腎相對自由腎虛衰敗

而成突起皮赤者易安陷入骨者難瘥如精神清爽
色紅潤飲食不減多起少臥此為疔發也黑者飲食
全減斯為可憂唯須詳審速療肺癰乃將疔尖自心口氣
血風寒之氣乘間而入內舍於肺又挾邪執其氣結聚或
作寒執脈數而實是也喉癰乃榮衛相年氣為敗濁小腹
如腫大小便或澁或復汗出或復寒執是也若腹皮急按
之需身無執乃陰冷所成小腹堅痞按之痛身有執乃結
熱所成脈數膿已成不可下脈遲緊膿未成或下瘀血而
愈附骨疽痛深按之無益著骨而生膿水腐潰碎骨出盡
方愈治之宜執去毒又當溫腎未可專用涼劑更在針烙
其病務詳淺深刺按其根則易愈不爾則順脈流走徧身

洪腫卒致不救。惟哉。至於所患之時。猶或多於外證未潰。已前發。渴乃臟腑焦燥。刺下乃引飲無度。已潰而渴。則膿血去多。津液中乾。或復腸胃暴虛。遂成下痢。身虛受寒。則嗽聲不息。氣逆挾執。則痰盛於胸。熱毒不泄。為二便秘。滋毒氣迫心。為嘔。驚悸陰陽交爭。血氣不和。寒熱併作。臟腑傷敗。便血。迸出毒氣。攻外煩燥。異常。惟須大方利藥。同治可也。至於諸瘡。猶當舉其大畧。丁瘡。含毒。毒氣。頭黑。硬如釘。四畔帶赤。如火。癰根。突起。痛癢。異常。隨交。焦黑。未幾。腫大而光。轉為。濕爛。深孔。透肌。如大穿針之狀。外證。心驚。頭疼。拘急。惡寒。四肢痛強。或寒熱交作。頰舌間赤黑點點。如珠。若毒入腹心。則煩悶。嘔逆。恍惚。癡眠。其斃可立而。


待治之。當清心行血。破毒拔丁。則或愈矣。夫瘡之生於項腋之間。凡人少小以來。動輒蓄怒。或憂思。驚恐。不伸。致結核。日積月累。風熱毒氣。聚於。於是腫濕。開瘡。起伏。無已。其則牽連。腋下。延蔓。心胃。外證。寒熱。往來。或痛。或不痛。治之。須用。斑狗。地膽。使其根。從小便中出。或如粉片。或如塊血。或如爛肉。皆其驗也。治療不早。則無及矣。漏瘡。由多。發於項腋。陰僻。肛門之間。治之。失時。即生。寒熱。凡。癰。諸發。隨所在。處。若有宿膿。敗肉。朽骨。博蓄。其間。皆為之。源。治法。溫散。風冷。收水。生肌。用。塞塞之藥。必得。瘡平。惟須戒。房事。耳。癩。疹。為病。風熱。在表。夫時。炎。暄。而燥。氣。乘之。則為。赤疹。天時。寒涼。冷氣。折之。則為。白疹。治之。須。疎。風。行。氣。氣。

行則消矣其有疥癬等瘡各自不同浸淫不已自由脾肺風熱或心腎火虛所致熱則平血解毒冷則清心溫腎又何患其不瘳矣

五發形圖

腫赤高起或長或大


癰發



此疾或在婦人乳傍上為血宮積滯氣壅血澁而成也內有膿血其病易治內有白膿其瀉難治

疽發

腫赤堅硬



此疾初發之時毒氣在皮作熱膿血節疼痛虛渴不已昏沉不省人事破後疽出血如蚕多口出膿汁七日之後不用藥有鮮血難治

癌發


內闊大色不變



此疾初發之時不寒不熱腫處疼痛紫黑色不破裏面壞爛二十以前者積熱所生四十以後者皆血氣衰也須早為治十可全一二也


四畔生牛唇黑硬

癩發



此疾初發之時疼痛二十已后四十以前者皆積傷之毒入胃壅聚而成四五十以后六十以前者乃血閉不能行壅積積血得之如出清水汁難治

痼發



此疾發時渾身壯熱手足不遂增寒頭痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重五臟煩悶是其候若出米泔滓者難治

秘傳十方

治一切癰疽不問發肩發背作響疼痛並宜服此如神散其效如神是名前鋒正將

荆芥

薄荷

山蜈蚣

老公鬚

天花粉

菇美

菇片

敗荷心

川白芷

猪牙皂角

赤芍藥

已上各等分

淮烏

大者壹个

紅肉消

倍具

甘草

每拾伍文入壹文喜甜如用

右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調效若服經日未見效恐是涼藥澁血可加當歸羌活如熱重雄黃酒調乳離加管章根研汁調其餘候只用酒下不飲麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

凡用內消先用此藥退潮止渴解熱是名引兵先鋒以升
麻葛根湯表散後服此

木通

瞿麥

荊芥

薄荷

白芷

天花粉

甘草

赤芍藥

麥門冬去心

生乾地黄

山梔子

車前子

連翹各等分

右劉散每服二錢燈心生地黄煎熱潮加淡竹葉煎湯
服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌活
敷藥諸般疽癰亦痛不可忍未成角散已成角破用茶
瘡口入三而止是名四面楚歌

京芥和根

赤芍藥

大柏皮

土當歸

山大黃

土白芷

天南星

赤小豆

商陸乾即中搭根

白及

白及

赤斂

白斂

草烏

寒水石煨或炒

右為末生地黄自然汁調角四畔或苦蕒根汁腫用商
陸根研汁未潰則滿貼塗上或有尖起處則留出瘡口

洗方諸般發已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去肉

生新肉洗后淨乾再用角貼搽藥一日一次名水師日明

大柏皮

澤蘭

菴草

荊芥

赤芍藥

山大黃

土白芷

土當歸

獨活各等分

右劉麓散用水一斗入葱白大椒橘葉同煎重洗如已

爛入猪蹄下脰瓜骨肉煎可免乾痛淨洗為度

積白銀

草烏尖

硃砂

白丁香堅者

右為末酸醋調點將破者令速潰但有急則無妨刀為快蟻針一法亦效見后

內護治癰發已成未成服內消三五日不效或年四十年上氣血衰弱成者速散服至瘡口合而止能因濟去舊生新

當歸酒浸

桂心不見火

土荳

香白芷

防風去蘆

桔梗

厚朴去蘆

甘草五文

乳香別研

沒藥另研

右前八味各等分同為末每服二錢酒調日三服

而止不飲者麥門冬天心煎湯或木香湯

治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此潰後服

至愈而止是名護壁都尉

防風去蘆

厚朴製同上

白芷

黃耆各半兩

川芎

甘草

柳桂

當歸各錢人參

右為末每服二錢空心温鹽酒調服至瘡口合後更服

為佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙方見前

生肉

雄黃 五斤 滑石 倍用

右為末洗后搽瘡上外用綿子覆蓋蓋相護凡洗後破爛者用此貼之

止痛拔毒膏 治一切瘡發臭爛不可近末破則貼破已破

則生肉紋瘡丁瘡皆用之

班猫辨治

柳根辨治

木鱉子此藥筒乳香

沒藥

麝香少許

松脂三錢

右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯瀝去渣入黃丹五

兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪及勻入瓷器中

了片用神妙

黃丹散

黃丹炒

白礬各

龍骨

寒水石

乳香

木香不見火黃連

黃芩

攢柳

膩粉各錢腦子少許

右為末隨瘡乾濕用之乾則用溫盥湯洗濕淨乾却搽其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則反舉骨作

通治

車釐散 治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒

利下熱退為度大人小兒四季皆可服之

此藥背車釐壹隻及血泥因濟火眼

輕粉

甘草各錢

大黃五錢

黃芩

漏蘆去須

瓜根各半兩

右為末每瓶一錢薄荷湯下速利酒亦可

治同上氣血衰者不可用

大黃 甘草

右劉散每服三錢水一盞半煎空心服利下熱毒

之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沉香 乳香

檀香 各等分

右劉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

青木香 沉香 藁陳香

丁香 麝香 升麻 桑寄生

獨活 連翹 射干 木通 各貳兩

大黃 蒸炙兩

右劉散每服肆大錢水二盞煎一盞空心熱服半日以
上末利再服利下惡物為度末生肉前服不妨以折去
熱毒之氣本方有首深芒硝恐泥者不能斟酌故缺之
知者自當量入

平補散 利後不止手足冷此藥補之溫脾正氣

白朮 甘草 白薑 陳皮 各貳錢

茯苓 木香 肉豆蔻 各壹錢 貳箇煨

石為末服前藥後則可服此湯調二錢日三四服利止

手足温食進却住服

加味十全湯

治老人虛極瘡疾臨愈宜服

黃耆

生乾地黄

當歸

並用酒浸

川芎

人參

白茯苓

粉草

白芍藥

桂心不見火

烏藥

白木

米泔浸

陳皮

北五味子

微炒已上各五錢

衣劉散每用一兩水一椀薑五片北棗一枚同煎分作

二服滓可曬乾再為末服

真方

治疰瘡未安之間偏身寒熱或先寒

后熱先熱後寒或連日作或間日作必先洗嘔疹而後寒熱

大汗出然後止服此祛寒邪正脾氣疼飲自消寒熱不作

蒼朮

米泔浸半日炒令黃

大厚

米泔浸

粉草

炙一兩

粉草

炙一兩

真粉

紅水

洗淨去白

入鍋內炒去火毒

木香

去毒

半夏

湯洗

藿香葉

人參

去毒

木香

去毒

白茯苓

去皮

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎入

分入盞少許温服不拘時候

四神

治一切癰疽發背挾真癰瘰癧毒並治之

明阿膠

剉碎粉炒如珠

真搗皮

半兩

粉草

一兩

右劉散分作三服水一盞煎候温病在上食后服病在

下空心服累效

又發酒治癰疽發背初發時便常服此不問疽發何處

入乳癰若鄉村或貧乏無得藥材者屢服之大有神效
忍冬藤任兩錢不非銀 大甘草節一兩

右各生用水二椀慢火煎一椀入酒一大椀再煎
十數沸去滓分三次溫服如無生者用乾者炒為末
生取桑一把搗爛入餅子酒少許生餅酒亦佳
搗得所傳瘡四面中心大留一口吐毒

瘡癰 治癰疽發背癰癧漏瘡惡瘡衛護內膜
自然內消

通明白礬各用二兩

右為末以黃蠟一兩二錢溶汁就爐上入礬拌如飛手
圓如梧桐子大每服十五圓熱水或冷酒下常服之

瘡用油髮灰和雞內金末外塞

粉 托裏散 癰疽初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吃嘔
喘嗽以至泄瀉急用頻服托裏散毒氣自內發起疔外
又能消已發未發皆可服之神效

真桑豆粉心二兩

明乳香半兩以酒打碎或重湯煎

右為末每服二錢新熟水調下或生甘草煎湯調下後
少時細呷常要藥味在胃膈間則毒氣不能攻心或瘡
已沉晦用當歸一錢辣桂二錢煎湯調下仍以加味不
換金正氣散為佐小兒豆瘡陷入亦能救之癰癧攻心
嘔悶亦用

五味子湯 治腎水枯竭運用不上致令口中乾燥舌上堅

硬或如鷄內金

北五味子

綿黃耆

去蘆

條參

去蘆

麥門冬

去心

各兩半

粉草

半兩

右劉散每服半兩水盞半煎不以時溫服日夜五七次

神效膏 貼五發未破

南星

大黃

草烏

白欬

蚌粉

大柏皮

小赤豆

一合

右為末取芭蕉頭研取油調角四畔加乳香沒藥元妙

乳香膏 止痛

木鱉子

去殼

當歸

柳枝

二八寸于剉之

同以清油四兩慢火煎令黑色次用后

乳香

沒藥

各半兩

白膠香

明爭者非必同研細入由煎化用綿子懸之

右并事治之煉藥銑銚令極淨再傾前藥油蠟在內候

溫入黃丹壹兩半以兩柳枝攪抄得所再上火煎不住

手攪候油沸起住攪住在水中成珠不散為度秋冬欲

軟春夏欲堅傾在水中出火毒搜成劑收之

白膠香 治瘡疽黑陷者用針刀開瘡內追毒丹使之潰然

後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆

去油

研末

不

白丁香

輕粉

雄黃

各二末

右件研和加白麩三錢滴水為圓如麥狀針破瘡內之

覆以乳香膏造出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可

治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之

太乙膏 治五發癰疽一切惡疾較癰年深日遠已成膿者成膿貼之即效蛇虎蝎大刀斧所傷並可內服外貼貼後先以溫葱湯水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼仍用水下如不通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽喉閉纏喉風並都令化一切風赤眼貼太陽穴後用山梔子湯下打撲傷損貼藥仍以酒洗湯下腰膝痛貼之鹽湯下唾血桑白皮湯下諸漏先以酒洗若諸瘡癰疽重大小以紙攤藥貼之每服一粒旋圍如櫻桃大以蛤粉為衣其藥可收十年不壞愈愈烈神效

玄參

川白芷

川當歸

去戶官桂去

赤芍藥

大黃

生乾地黃

各乙四

右剉如大豆大用清油二斤浸春五百冬二秋七冬十日

漚去滓油熬得所次下黃丹一斤滴油入水中不散為度

善應膏

治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癰子牙腫打撲接骨

閃肺刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火漆瘡疥癬貼之即愈

天治婦人吹乳以藥圍如梧桐子大新汲水下二十圓

肺癰賜癰亦可為圓吞服溫酒米飲或北硬其草煎湯皆

不可犯重手及火焙

上等黃丹 搗為研極細

白膠香

明波藥

滴乳香

並別

大當歸

川白芷

木口仁 去皮尖

大黃

草烏

川烏

赤芍藥

檳榔

生乾地黄

土芎

滴青 別研入

亂髮

淨洗已上各一刃

右除乳香沒藥外將磁石銚盛香油一斤浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色再入葱白亂髮魚鱗少時用生絹帛濾去滓留下一兩藥油復將所濾油於慢火上熬却將藥丹入油內用長柳條槐條不住手擠俟有微煙起提把藥銚將柳條點滴在水而上凝結成珠不散方成膏如不成珠再熬直待成膏提把藥銚攪無煙出却入乳香沒藥白膠末攪勻傾出磁器內將元留下浸藥銚一併收拾器內用新汲水一日一換將藥器坐放水內三日

出火毒方可用之如膏藥硬約量加黃蠟清油入膏內

此膏得所熬膏極難於火候須耐煎看火取至慢火盛則

治癰疽發背疔腫內外腫毒癰疽疔下諸惡瘡及頭

項癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止疼生肌

累有神驗若丁腫先用銀篦或鹿角針於丁瘡中間

畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大擦入孔中却以此

膏貼之如瘡壞爛至甚難以藥貼則將皂角二三片煎油

調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾癒

大巴豆

去殼

木鱉子

去殼各

黃丹

別研

真清油

拾兩

槐柳嫩枝

各藥寸長

右依前法煎熬成膏貼用

金

治傷筋動骨損痛閃肺風毒瘰癧風濕筋痛

當歸尾

川白芷

杏仁

去皮尖大玄參

猪牙皂角

去皮弦

草烏

各半兩

白膠香

明者

連翹葉葱

肺者拾根

滴青

明者

乳香

沒藥

別研為末

黃蠟

明者

男子亂髮

洗髮如

石用清油半斤將七味依前法熬濾却入膠香滴青攪

勻下黃蠟又攪無煙方下乳香沒藥

貼膏法如瘡有膿血不淨如癰閉礙須用藥水洗淨拭乾

候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出流用紙拭

側畔出一日一換黃水膿血止兩日二日一換貼至愈

蟬針正法治癰瘡不問老少初發腫作黃臭稍大便以紙

一片冷水浸搭瘡上視其上一點先乾者即是正頂先

以大毒第一箇安於正頂却用大馬蟬一以

本草名水毒

安其中頻以冷水灌之馬蟬當吮其正穴膿血出毒散

是效如毒大蟬小須用三四條方見功效若吮著正穴

蟬必死用水救活其瘡即愈累試奇效乃去毒之一端

也血不止以藕節止泥止之白茅花亦效

疔毒諸般惡瘡因針開口後又閉合生膿脹痛不

可忍用此捻成小麥子大入放瘡中永不閉膿水自出瘡

自乾好

極好信石牒雄黃

雌黃

大朱砂

輕粉少許

右研為細末糯米糊圓如麥子大若瘡口閉合生膿藥入內仍以膏藥貼之

內追毒丹 清心解毒散潮

大朱砂

雄黃 各五分

生麝香 乙分

生犀角

琥珀 研細

黑角 沉香 各五分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓燈心薄可湯下

雜證 治發背作渴

黃芩

朴消 各五分

乾葛 乙兩

右劉散每服三錢用枇杷葉去背上白毛淨洗同煎水拍時服

雜證 治發背作渴

冬見大方 科諸氣類

以上諸藥 升降散毒理脾和氣凡諸發臨愈皆可數

服癰疽緣氣凝血滯氣聞香則行初發亦宜縮砂香湯

六 諸發愈後宜服

黃耆 鹿角 甘草 壹兩

右劉散每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎空心服

八 治疽後氣弱不食

方見大方 科脾胃類

乳 發背及一切瘡癤潰爛痛不可忍者

當歸

川芎

交趾桂

川香芷

真桑葉 各五錢

羌活

獨活

五靈脂

乳香 別研

沒藥 別研

白膠香 伍錢

右爲末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓用薄荷湯嚼下
手足諸般損痛不能起者如大草烏一味用木瓜鹽湯
細嚼下

黑附子 治氣虛血弱老人瘧發後四肢倦怠無力或癱瘓
好飲水不止者

黑附子

壹箇以錢
煨去血水浸

白茯苓

伍錢

川練子

壹兩

茴香

壹兩

破故紙

壹兩

熟地黃

淨洗切酒炒壹兩

交趾桂

伍錢去麩皮

太當歸

壹兩去犀

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心鹽湯或
鹽酒下如覺脾虛食減亦用參苓白朮散兼服

禁腫法

凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲止乃止
後七日勿洗手此后有一切腫及蠱毒惡注腫瘡等之
隨手即消

乳癰

瓜蒌散

如不愈者並依前方治之

瓜蒌

明乳香

石爲末每服二錢溫酒調下熱者加石膏末少許

又方

草烏 柴箇

小赤豆 柴粒

拒霜葉

壹兩陰乾

右爲末并花水調塗角四畔黃頂用前敷藥亦妙

又方

仙人掌草一握小酒糟一塊生薑一大塊搗爛入桂

末少許炒酒服留滓卷腫處即止更不成瘡

乳癰

火炊草

皂角刺

川山甲

黃蜂窠

右各燒存性為末入輕粉生清油調勻傳瘡上

又方

赤小豆一升酒研爛去滓溫酒服留滓傳患處

又方

蔓京子搗爛炒酒服滓貼患處

又方

乳癰癰爛見心者猪兒腹下毛甘鍋內煨存性為末

乾摻或清油調入輕粉少許

吹乳結實疼痛

陳皮一兩甘草一錢水二椀煎一椀分二

次服次用荆芥羌活獨活煎湯熏之溫則洗之安

又方

加連翹三錢黃瓜萎仁三十粒搗碎每

錢水一盞半煎食後溫服方見小方科

又方

皂角刺燒灰蛤粉明乳香少許為末熱酒下搽散可

妳頭裂取秋后冷露茄子花裂開者陰乾燒存性灰水調

傳末秋時但裂開者亦可用

灸法

癰疽 腫堅硬不破名曰石癰當上灸百壯

諸癰疽毒開闕不止疼楚殊甚以灸炷四枚圍著所作

處同時下火各灸七壯多至十一壯佳

大蒜頭橫切如錢貼其中心頸小艾炷灸之五壯而上

若形狀稍大以黃捍紙蘸酒敷貼認先乾處為筋脚於

先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止

又法屈指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自覺輕快即此灸之

凡癰疽展大如龜形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長須盡處灸之須留頭并右兩脚勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻入裏也或辨認不明以白芷三分漢椒桑白皮各一分葱白十莖水一椀煎入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現可以辨認

心癰

即引其先鋒方治心肺有熱或作寒熱口乾好飲水身熱腹內作熱頭面赤色

吹用四散即前鋒正將方治同上兼用敷角洗法

已潰多服加味十奇散以上二方並見前

腎癰

治腎虛喘急過度外披寒邪發為癰腫不可施以

涼劑宜服方見前方

治同上兼用葱白橘葉椒葉猪蹄湯淋洗仍

貼金絲膏方並見前

肺癰

治男子婦人欬而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭名肺癰小便赤黃大便多澀實者先投參蘇飲四服虛者先投小青龙湯四服並用生薑

棗子前却服此二方見大方科傷寒

桔梗去蘆 貝母去心 大當歸酒浸 瓜蒌仁

枳殼去穢炒 薏苡仁微炒 桑白皮炒 甘草節

防己去麁皮 百合蒸半日 黃耆一兩半 正地骨皮去

知母 杏仁 北五味子 甜葶藶各半

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不以時溫服

咳不活加百藥煎熱加之大便不利加煨大黃少許

小便溢甚加木通車前子煎煩燥加白茅根咳而痰甚

加入參白芷

蘇子 治肺癰咳嗽氣急睡卧不安心胸脹滿

甜葶藶子二兩半開 百合炒 白附子

北五味子炒 甘草節 羅參 欵冬花

百藥煎各一 大朱砂五次 紫苑去木

右為末每服二錢燈心湯調下

牡丹散 治肺癰胸乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭

川升麻 苦梗 薏苡仁 地榆

黃芩 赤芍藥 牡丹皮 生甘草各半

右劉散每一兩水一升半煎五合溫溫日三服

肺癰 治肺癰已吐出膿血以此潤護

真鍾乳粉一兩 白滑石二兩

右為末每服三錢米飲調下

理肺膏 治肺癰正作咳唾不利胸膈迫塞

呵子 去核

百藥煎

五味子 微炒 條參 去蘆

欵冬花 藥

杏仁

知母

貝母

甜葶藶子

紫苑

百合

甘草 許各五

右為末用白茅根淨洗秤三斤研取自然汁入磁石器中熬成膏更添入好蜜二兩再熬勻候以調和煎藥為圓如梧桐子大溫水吞下

如欲散... 治上膈壅熱而成肺羅兼感風寒重者加入

黃芩 山藥 仁 薄荷 當歸 川白芷 半夏 烏梅 桑白皮 每... 各五... 生... 黃燈心 白茅根 煎熱甚加大黃

內護... 肺癆... 後宜服排膿補肺

嫩黃耆 二兩

川白芷

北五味子 炒 人參 各一兩

右為末煉蜜圓如小指頭大偃仰入口嚙化旋旋嚥下食后服臨臥服

苦杏仁

瓜瓣仁

桃仁 去皮尖各一兩

右剉散每服四大杯水二盞先以葶藶一握煎取一盞去滓入藥煎六分食後服或吐膿血勿怪

五香... 寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香

木香

明乳香

丁香

藿香葉 略半

白朮

羅參

白茯苓

薏苡仁

山藥

扁豆

桔梗

縮砂

白豆蔻

粉草

蓮肉 各一兩

右為未蘇益湯調空心服事湯亦可有汗如浮麥煎
國醫治一切內外癰瘡依和劑方修合煎此極宜草湯
吞服服畢便就枕有熱者善應膏亦可圓服湯引同上
加治肺癰已散不咳不疼服此去舊生新內能
固濟方見前

肺癰證始萌易治膿成難治診其脉數而實已成微而滑
漸愈面色白嘔膿而止者自愈有膿而嘔面色赤
膿如糯米粥者不治男子以氣為主得之十救一二婦
女以血為主得之十全七八歷試屢驗

灸法治肺癰正作吐膿血不已肺膈灸二七壯在二椎下
三椎上各去脊一寸半及灸謔謔二穴二七壯其穴在

有膊內蕪第六椎兩傍三寸抱肘取之

腸癰

脈數治脉數身無熱腹無積聚按之濡此為腸癰又精
陰冷所成宜服

薏苡仁式兩 附子半兩 敗醬乙兩乙分

右劉散每服四錢水一盞半煎空心服小便利為效

黃芩湯治腸癰小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時
發熱有汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血
洪數者膿已成不可下

大黃蒸 桃仁去皮尖 牡丹皮乙 芍藥各半兩 瓜子三分

芒消式分

右劉散作一服水三盞煎八分去滓入芒消丹煎流頭
服不拘時候未效用敗毒散方見大方科傷寒類

治腸癰腹中疝痛煩毒不安或脹滿不食小便澀
婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服就有
差互亦無害

薏苡仁 伍兩 牡丹皮 桃仁 各叁兩 瓜瓣仁 四兩

右劉散每服四錢水一盞半煎不拘時服

附骨疽 方見前

附骨疽

治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡孔出

大蝦蟇乙枚 亂髮乙握如猪脂油 四兩

右用猪脂油煎前項藥瀝去滓凝成膏貼之凡貼處以
桑白皮烏豆煎湯淋洗拭乾煨乾骨為粉按瘡口四畔
令易收斂却用貼之

治附骨疽未破已破或膿出不盡者

右用黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令腹滿用線縛定用
水一盞銅石器中煮水盡乾焦為末用猪油調傅已破
者乾捺少痛勿植

赤木 治附骨疽膿汁淋漓久而不瘥已破未破皆可用

赤木 蘇白 蘇黑 蘇色 蘇乾 蘇油 蘇川 蘇

破紙 蘇子 蘇冬 蘇回香

川白芷 桃仁 各兩

右為末老人加黑附子煉蜜圓梧桐子大每服五十圓
溫酒或鹽湯吞下

便毒

雙解散 治便毒內蘊熱氣外極寒邪精血交滯腫結疼痛

辣桂

川大黃

白芍藥

澤瀉

牽牛 炒取末

桃仁 去皮炒

甘草 半分

右劉散每服三錢水一盞半生姜五片煎食前日二服
先小便快熱從小便出后大便利皆是搗毒

五寶散 治便毒腫結因敗精搏血留聚而成立效前

能便毒初發用此

穿山甲 酒浸炙

天花粉 酒浸

白芷

當歸

甘草

舶上茴香

白牽牛 炒

延胡索 炒

南木香 酒

青木香 半兩

左為末每服二錢溫酒調食前服不效再服本香煎湯服

利小便以泄敗精葱二根煎湯調下 方見大方
科傷暑類

便毒初發內消神效 方見前

治便毒熱證大便不通 方見大方
科積熱類

治便毒身虛氣閉大便不通加大黃少許煎

食前服方見大方 科諸血類

治便毒已消內托可常服 方見前

治毒清時用白及沒藥乳香血竭為末核效

治便腫痛

雄黃

乳香各半

黃柏九分

右為末分作兩服以新水調傳自平
豕復毒法

用細草或軟篾隨所患左右手量中指自手掌盡處橫
丈量起通三節至指盡則住不量指爪拗斷却將此草
於手腕橫紋量起引草向臂當中草盡處即是穴艾
如發天灸二三壯腫散痛止即安

瘡癰

治一切瘡癰疔毒

猪牙皂角七片炙火煨黃色去皮切地上出火毒研如
末用酒調服

又方 一服即散

芎藭子

破故紙

黑牽牛

大黃切

右為末酒調下

又方 治便毒初發

以生薑一大塊米醋一合薑薑醋磨取半匙
作處即效此上步等即人家行步

癰疹

治風寒暑濕外搏肌膚發為癰疹遍身搔痒或赤

或白口苦咽乾或作寒熱敗毒散一两半加天麻薄荷各

三錢煎退二七箇去足薑分作六服每服水一盞半生薑

三片煎溫服取效方見大方科

治風寒暑濕外搏肌膚發為癩疹通身壯熱
遍身搔痒隨膿氣虛實或赤或白心神悶亂口苦咽乾

羌活 前胡各二兩 人參 桔梗
甘草炙 枳殼煨炒 川芎 天麻

茯苓各半兩 蟬蛻去頭足 薄荷各五分
右四散每服二大錢水一盞半生薑三片煎不以時服

治癩疹上攻頭面赤腫搔痒之皮便脫
作癩作痒而痛流液走注有如虫行

川烏湯洗浸三五次 荆芥穗各半 薄荷可五刃
杜當歸洗浸三日焙乾 川芎

右為末好醋煮米粉糊圓梧桐子大每五十九溫酒下

治因浴出腠風冷補身癩疹搔之隨手落及脫

暈嘔噦

白米乙兩 神麩式兩 甘草乙分

右為末每服二分米飲調下一方以土朱研炒冷酒調
下二分不飲以茶調下

治癩疹痒神效方見風科

治風熱癩疹方見大方

治風氣挾熱癩疹科類

胡麻子 五兩 苦參 荆芥穗 何首烏各三

葳靈仙 防風 石菖蒲 牛蒡子炒

菊花 蔓京子 疾多炒去刺 甘草各

右為末每服一匙食后薄許湯或好茶清下

治遍身癩疹疼痛成瘡

白殭蚕一兩炒黃色為末分四抄酒調服

傳藥

明礬朴消為末井水調雞羽掃傳

又方

赤小豆京芥穗驪為末雞子清調薄傳

洗方

蚕沙以新水煎密室溫洗

諸瘡

熱論

治遍身生瘡膿血與腫極痛且癢

乾葛

赤芍藥

升麻各乙兩 粉草五分

知天麻

蟬蛻

右剉散與人參敗毒散合和生薑薄許生地黃麥明

夫心二煎不拘時候大效

此毒發見傷寒陽證類

治心肺積熱皆臟風毒攻於皮膚時生疥癩

疥癩及疔出黃水及大風手足壞爛眉毛脫落一切風疾

方卷

荆芥穗

各四兩

苦參 半斤

宣連 各乙兩

真牛黃

式分

右為末水糊圓梧桐子大每服三十圓熟水或茶清下

一方加黃陽風皂角末為膏入煉熟蜜為圓妙

牛黃

方見風科通治類

治風毒入胃及心腎經絡攻注百節疼痛頭目虛

腫痰涎不利下注腰脚弱緩生瘡婦人血風男子癩風乃

風濕脚氣攻注皮膚瘙痒癩疹偏正頭風

川烏頭淨洗去皮

草烏頭水浸三日洗去皮各兩

荆芥穗四兩 乾薄荷或兩

杜當歸水浸三日曬乾八兩切

右為末醋糊圓如梧桐子大茶清下三十圓

酒煮黃連圓 治同上方見大方科諸氣類

刺黃湯 治惡瘡生背脇頭腦四肢要害處連進一二服得

利即效未利再服方見大方科積熱類

富歸散 治心血凝滯內蘊風熱發於皮膚徧身瘡疥或腫

或痒或膿水浸洗或發赤疹痞癩

當歸去芦

白芍藥

川芎

生地黄洗

白蒺藜炒去

防風去芦

荆芥穗各兩

何首烏

黃耆去芦

甘草炙各半兩 加蟬蛻

薄荷

右列散每服四錢水一盞半生薑五片煎不以時溫服

紅班圓點 治諸惡瘡紅赤痛痒不定心煩口乾及婦人血風

紅班圓點開爛成瘡痒痛流黃水

連翹

赤芍藥

當歸

京芥

防風

牛蒡子炒

川芎

梔子

黃芩

瞿麥

木通

生乾地黄

瓜根

麥門冬

粉草各等分

右列散每服四錢水一盞半燈心二十莖煎不以時服

赤小豆湯 治少年氣血俱熱遂生瘡疥亦為腫滿或煩或

渴小便不利

赤小豆炒

當歸去芦

商陸

連翹仁

赤芍藥

漢防已

木猪苓

桑白皮

澤瀉各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時候溫服熱甚者加犀角二錢半

治飲酒後徧身痒如風癢抓至血出其痒止後痛

蟬蛻去頭足翳

薄荷葉一兩

右為末每服二錢小酒調服不拘時候立效

虛證治上...下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡

下注陰濕四肢癢痒徧身及婦人血風癢

治一切惡瘡

川芎

當歸

地黃

甘草

芍藥各等分防風

荆芥

鳳尾草

右剉散每服三大錢水一盞半煎服經驗

五香散治風氣風癢癩除升麻大黃獨活木通乳香

五味忌食冷物服後小水必通方見前

五苓散加瞿麥大退治同上此方得之艱用之取效

敷藥合掌散治徧身生瘡百藥不效

檳榔伍个

硫黃五牙生者

膩粉半斤

右和勻每服一錢安於手心內油調夜卧時塗外腎不

得洗手但擦手令乾可也一二日瘡即愈

通治多年惡瘡不瘥爛搗馬齒莧傳之亦治夏花瘡其形

如花開之狀燒灰以猪脂塗傳 又方雞腸草研細取汁拂其瘡以溼蓋之或為末猪脂調傳極效

赤小豆方

治善惡瘡疥或赤腫無不愈者

右用赤小豆七七粒為末傳之愈或以水調傳瘡及四傍赤腫處落則再傳又方劉散每服二錢水一盞煎服仍用新汲水調藥傳緣赤豆粉粘物既乾難揭則用苦根為末和之便不粘此法尤佳

殺虫方

鷄心檳榔兩 黃連

川山甲十個 麩存性 射香半分

右為末用膈茶末調塗二五日后用葱湯洗

惡瘡方

白膠用赤色者

明白礬三分 黃色黃蠟一分

右為末先煖過酸漿水洗拭乾用清油調傳

又方

貝母為末入雄黃少許謄上

葛蒲末治遍身熱毒瘡痛而不痒手足尤甚粘著衣被夜不得睡多取葛蒲為末布於席上使病者恣卧其間仍以衣被覆之五七日瘡愈瘡爛用艾豨亦可

藥方

治一切瘡

壽金

黃連

黃柏

梔子仁

葵花各等分

右為末冷水調成膏貼瘡痛處神效

脫脂散

治一切惡瘡醫所不識者

水銀

甘草

黃蘗

黃連

松脂黃明者膩粉

蜂巢以泥故書壁上者

在取水銀放在掌心以唾擦為泥入瓦器中用清油和勻生絹濾如稀錫先以溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無名瘡或痛或痒并有黃水者塗之愈治疥尤妙

一掃散

治一切瘡疥但相對而生者便是不問乾濕

日近年深用之立效

藜蘗皮二月真輕粉十貼好蚌粉壹刀通明雄黃併

水粉壹兩

右為末用大鯽魚一个入香油煎候熟去魚俾冷

搽瘡未效可加信石末少許研杏仁十粒近陰處勿用

水銀膏

水銀滓研細臘猪脂膏蘇福身擦上立效

益壽膏

治腫滿後作瘡或發水疱成瘡是脾土崩壞

一切瘡

用清油調傳濕則用糝立愈方見大方

黃蠟

治一切瘡疔

清油三兩煎巴豆二十粒微黑去巴入黃蠟一兩化訖

研雄黃硫黃各一錢溫入成膏淨洗抹傳二三次神效

疥瘡後瘡亦用

神異膏

治一切瘡疥

全蠟柒筒

皂角壹兩

巴豆柒粒

蛇牀子參錢

清油壹兩

黃蠟半兩

輕粉半字

雄黃叁錢

右先用皂角全蠟巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化

開取出冷處入雄黃蛇床末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗后以藥擦瘡亦上神效

爭肌散 治一切惡瘡

雄黃 海螵蛸 大柏皮 宣連

水粉 輕粉 蚌粉 杏仁

右為末用真清油調傳

又方 治大風癩木子曉存性為末加真輕粉香油調傳

烏梅膏 治諸瘡疔肉如蛇出數寸用硫黃細研於肉上薄

傳即便縮諸瘡中新弩出肉以為梅肉蜜和捻作餅子如錢厚以貼瘡上

苦快 治大人小兒瘡疥及惡瘡

苦練皮燒灰以猪脂調傳

青黛散 治中部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澀食亦

身面微腫多食魚蝦發風熱物得之

馬齒莧四兩研爛入青黛一二兩再研勻塗上立有神效仍服八正散日三服方見大方科積熱類

洗方 苦參湯

苦參 蛇床子 白藜 荆芥穗

右等分用水煎放溫洗

驅風散

紅椒開口者 連根葱頭菜園

右同煮水淨洗用縮衣浥乾即愈

指縫搔痒成瘡有竅出血不止多年糞桶箍斃乾燒灰傳之即安

火氣入瘡黃柏皮為末搽之立愈薄苛前塗亦可方見類

漆毒成瘡磨鉄漕中泥塗之即愈又方蟹黃金之效

癩瘡神降散治走皮癩用桑寄生一小把本根桑根取皮

一握白芷黃連煎湯溫和以帛蘸洗候露出盡拭乾傳之

滿大皂角去效後燒存性

麻竹大擇燒存性

厚黃柏

鷹爪黃連

瓜稗葉乾

白芷

右等分為末清油調傳神效慎勿喫醋

凍瘡以茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

又方治足上凍爛生瘡黃丹為末用猪鬃調傳

入面瘡用貝母為末小葉筒灌其瘡口數日成痂而愈

白癩瘡每旦瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒絲

圓三四服即安方見風科執證類

申疽瘡

綠礬石半兩

煨熟

蘆薈壹錢半

麝香壹字

右研如粉以絹代衣盛藥納指於袋中線孔定瘡為度

月蝕瘡

胡粉炒微黃

白礬石煨

黃丹煨

黃連淨

輕粉各貳錢

胭脂壹錢

麝香少許

右為末先以溫漿水入盥洗拭后搽藥乾則用清油調

癩頭瘡先用本人小便燒和錘令紅投於小便中方與洗

瘡皮皆去然後以帛拭乾用滴青五文細研用油魚三箇以盞燒成油調滴青塗之三日效

頭上風屑極痒用藜蘆根不拘多少為末先洗頭須避風候稍乾時用藥終定須安藥入髮至皮方可緊縛兩夜

腎臟風癢瘡方

活血驅風散 治肝腎虛為風毒所入濕痒生瘡

當歸 去尾

川芎

白芷

華陰細辛

白茯苓 炒

桃仁 浸去皮

白芍藥

半夏 洗

五靈脂

甘草 各參錢

蒼朮 炒

杜仲 去粗

辣桂

天麻

薏苡仁

橘紅

檳榔

厚朴 去籠皮

枳殼 去穢切炒

各四錢

左劉散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚入乳香末少許以佐心氣使心腎相交挾熱去桂如黑豆煎服

青木香圓 疎導腎經風水腎虛挾邪浮腫多用安腎圓少

用青木香圓夾和鹽湯下屢效 方見大方科諸

牛黃圓 治腎虛挾熱陰囊痒痛多瘡 方見前

烏雞圓 治肝腎風癢 方見風科通治類

神效圓 治外腎濕痒 方見風科麻止節風類

不效圓 治脾氣 方見大方科時疫類

至物腫爛淫汁大腹皮一升苦參荆芥各二兩煎湯溫洗拭乾以津液塗潤以用油髮燒存性入白及末少許俾

逐日煎湯密室洗換或加乳香末仍服蠟燭燻圓以髮灰末
米飲調吞下方見前

腎臟風發瘡疥

雞心檳榔

式箇破開以黃丹參錢
合在內用濕布裹煨

全蝎陸月硫黃

錢

右為末入輕粉半錢麝香少許青黛末半錢於磁器內
收每用少許清油調抹兩掌換外腎女以兩掌揜兩乳
各睡至醒次日又用經驗

又方天紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏入研膏擦手如

上法亦效

外腎疔瘡用抱雞如殼雁鳥爪黃連輕粉各等分為末煎過
清油調塗香附子白芷五倍子煎水洗

陰囊瘡

豆粉壹分

蚯蚓貳分

右用水研塗上乾又傳之

陰囊上瘡

甘草煎湯溫洗却用鴈茶末就傳貼

陰頭生瘡

右用溪螺殼溪港中螺舊者為妙甘鍋中煨過為末先
以鹽水洗五七次后以將藥傳之

茹精瘡

右用大田螺兩箇和殼煨過存性為末入輕粉搽所患
處即可安

文方 治羊少陽道興起當泄不泄不泄強泄脹斷嫩皮初
如針眼大畏疼不敢洗刮日久攻入皮肉連至潰爛一
二寸許用荆芥黃柏皮馬鞭草甘草生葱煎湯洗去膿
屬以心子燒灰入麝香少許輒搽患處初斷房事數月
時睡寒冷水兩三口勿令院道興起脹斷瘡屬屬堅后
即安矣

澤潤散 治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連 欵冬花 各等分

右為末以地骨皮蛇床子煎湯用軟帛浥乾津調藥塗
之最忌不得用生湯洗諸瘡皆然

椰子滑石粉

綠豆粉貳兩 軟滑石壹兩 研

右為末和勻以綿撲子蘸撲仍以膩粉佐之
蛇纏瘡用雄黃為末醋調塗仍用酒服凡為蛇傷及蜂
蟻蛇毒虫類犬所傷皆可用又方用鏡面草入籃
提瀾數磨頭土立效

椰子痒痛方

新汲井水椰青蒿汁調蛤粉傳之雪水尤妙

洗方 治諸般惡瘡

黃相茵陳荆芥葱白藿香煎水溫溫淋洗

癬瘡

胡粉散 治一切癬神效

胡粉壹分 砒霜半分 大章烏壹箇 硫黃壹分

蝎梢柴枚

雄黃壹分

班猫壹箇

麝香少許

右為末先以羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

烏頭圓治宿患風癩遍身黑色肌軀麻木痺痛不常

立烏頭一斤刮洗去皮令極淨攤乾用清油四兩鹽四

兩同藥入鉢內炒令深黃色慎出刺油只留鹽并藥再

炒令黑色煙出為度取一校劈破心內如米一點白者

恰好白多再炒趁熱羅為末醋糊圓如梧桐子大每服

三十圓空心溫酒下然草烏性差熱難製衣五七日間以

烏且煮粥解毒

通身牛皮癬方

川烏

草烏去皮尖

何音烏

白芷

蘇木各等分

右截小片臘月猪脂油煮焦候冷入塩少許磁器中

常挑一匙空心酒調下

又方雌黃末入輕粉猪脂調抹

又方

班猫燈上燒米醋內淬再燒再淬凡三兩次就燒為灰存性

右用紅棗一枚湯泡剥去皮核與藥同研爛先以手抓

破癩然後拚藥不可犯好肉恐有毒

昨葉荷草散治一切癩無問風濕氣血與夫相染而生者

昨葉荷草

壹兩瓦上日乾

枯礬壹錢

雄黃半錢

右為末以羊蹄菜根先蘸醋指癩上令痒破即以藥末

乘濕塗傳不過三兩次而愈更服局方何首烏散虛者散台和服方見風科

灸法 八月八日日出時令病人正當東向后長跪平舉兩
手時戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱
下各三壯若七壯十日愈

賺瘡

半黃金馬丹 治足面生瘡下連大指上延外踝膝骨每發
兼旬昏暮痒甚爬搔出血如泉痛楚不可忍夜分漸已明
日復然每服一圓新汲水下臍臍有所下即愈

天雄炮去皮臍壹兩

白礬枯退

天南星湯洗

天竺黃研

膩粉研各壹錢

牛黃研壹錢

雄黃研飛掃

生龍腦肆錢

金泊陸怡伍片為箔

右為末煉蜜搜和每一兩半作十圓金箔為衣

得效三聖散

花蕊石散方產科

保產類

復元通氣散方見前

追風獨活散方見同科

通治類

右各一貼合和酒調空心服

又方 治瘡生於脚脰名下疔瘡俗謂之袴口瘡或因物打
撲而成者其瘡口狹皮內極闊皮薄如竹膜極痒痛終日
黃水流延蔓而生甚者數年不愈又易於染過他人患此
者須忌房室則易愈內外腫瘡皆治之

韭菜地上地龍糞乾為末入輕粉清油調傅白大血亦可

又方 治脚肚上生瘡初則如粟漸大爪搔不已成片包脚
相交黃水出痒不可忍久成痼疾最難愈

右為末同入清油中調傳瘡上立效

單方治膝瘡成田累月不乾

上等好砂糖先用鹽湯淋洗后綿帛拭乾以津唾塗却以此傳上三日愈神效

粉膏散治外膝瘡臭爛數十年不愈者

生圭壹箇鳥者打死去肉取殼酸醋一盞炙醋盡為度仍煨令白烟尽存性用一盞地上出火毒

右為末入輕粉麝香拌勻臨用先以葱水洗乾方用藥

牡礪散收斂瘡口令乾

牡礪壹塊用破草生包薄入火內煨去小灰令取出研

右隨用時旋入枯飛過白礬少許拌和傳瘡口上

秘方治脚胫骨上作瘡久爛黑或發孔或臭穢不可近用

蜈蚣十數條小竹簽穿定瓦上焙乾為末真清油調膏

割時取效

秘方隔壁膏用多年老杉木節燒灰真清油調膏成膏

貼在瘡上以絹帛繫定不數貼而愈

藥用海桐皮石榴皮等分煎湯淋洗令淨然後用重藥

藥用牛蒡子半兩研為末入帛熬子內燒熏之然後

手足裂腫

白及膏治斷跟靴用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內熬

候油沸頭髮溶爛入川白芷白及松脂末出火攤冷以

瓦器收貯不容灰入每用百沸湯泡洗較裂令軟拭乾

傳其上即安或加少水粉

方 五倍子為末用牛骨髓填縫內即愈

又方 手足皸裂春夏不愈者

生薑汁

紅糟

鹽

猪膏臘月者佳

右同研爛炒熱擦入縫內一時雖痛少頃皮軟縫合仍再用之即安

治久行脚心腫痛 蚯蚓糞塗腫處高閣起脚一夕即愈

又方行路脚跟腫痛 草烏并窠各等分為末新汲水調

傅露出脚爪甲

黃蠟膏 治冬月手足拆裂

清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候溶入北粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火上

烘乾即用藥傅薄紙貼之

傅藥 治遠行脚腫用之可行千里輕便甚妙

防風

北細辛

草烏各等分

右為末摻鞋底內如著草鞋即以水微濕過然後摻藥

漏瘡

蟾蜍膏 治癰疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛內膜驅解諸毒自

然內消神妙方見前

溫解散 溫散漏瘡風冷

藿香葉

厚朴去麁皮半夏麴

橘皮

蒼朮炒

細辛

川芎

白芷各一分

辣桂

川白薑主

甘草各半分

右劉散每服三升水 薑棗子煎服

猪腎酒 通行漏瘡惡水自大腸出

黑牽牛碾細去皮取末一分入猪腎中以綫扎青日葉包慢火煨熟細嚼温鹽酒下

食治方 治漏瘡肛門周匝有孔十數諸藥不效用熟犬肉

離濃藍汁空心食之不食犬肉驢肉代之七日自安

桂附圓 治氣漏冷漏諸瘡

桂心

附子

袍裂米醋中浸再炮 碎三五次去皮尖

厚朴

去麩皮 姜汁炒

甘草

白木

各一刃 木香

乳香

二心 別研

右為末煉蜜圓梧桐子大空腹米飲下三五十圓

厚香墨每膏 治漏瘡效

穿山甲

浸壹宿去肉 用壹伯片

真蚌粉

同法候香挑起泡 去粉以甲為末四

右炙乳香末一錢鹿射香半錢夾和雲母膏十五貼為圓

梧桐子大每服三十圓温酒下仍以鹿角膠調鹽酒服

神授散見大方科噴察類

安腎圓

山藥圓

二藥多服調養

方並見大方 科虛損

代赭石圓

治痔变为瘦膿血不止

代赭石

煨醋 碎研

磁石

者煨米醋數沸 離茶文研

白礬

煨

牡礬灰

龍骨研

蛻皮

炙焦

皂莢刺

燒

猪後蹄垂甲

燒

赤石脂

川椒焙

木賊焙

蜂房

各等分

在為末神麴糊圓如小豆大每服五十圓食前文并生

姜煎湯下漏血處以熟艾揉和血竭塞日三換

雄黃膏 治積年冷漏黃水不止

雄黃

硫黃

研細各一分

頭髮

黃蠟

各五分

右用清油二兩煎熟頭髮洗盡去滓次入雄黃硫黃碎片黃蠟慢火上用枝頻攪為膏攤生絹貼用藥先以赤甘草頭煎湯洗或露蜂灰白芷煎湯常洗常貼

漏瘡通用

露蜂房

剉二分

牡礪粉

黃丹

硫黃

各一分

右同炒令煙盡為末入髮灰一分鹿射少許拌和傳患處鹿射能引藥透達亦殺虫

又捷效方

用信石新瓦上火煨過為末以津液潤紙擦于

瘡心許推入瘡孔內如瘡孔多不可齊上藥免使藥入

血竭散 治痔漏痛不可忍

血竭

牡礪灰

髮灰

各等分

右為末入麝香少許自以津唾調傳如更痛研杏仁膏調藥傳之

洗漏方

漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨每用白芷

及露蜂房煎湯洗或大腹皮苦參湯洗洗畢候水出拭乾用向東石榴皮晒為末乾摻

又今漏瘡

用活鱧魚五六條擲地以竹針貫之覆瘡良久

當有虫出如線復之使盡用檳榔黃連末傳明日以乾艾作湯投白礬三二錢洗不一月全愈

瘰癧

白花蛇散 治九涌瘰癧發於項腋之間增寒發熱或痛或不痛

白花蛇 酒浸軟去皮骨 生犀角 鎊半 青皮 半兩

黑牽牛 半兩半生半炒

右為末每服一錢入膩粉半錢研勻五更糯米飲調下已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌發風壅熱物如已成瘡一月可效用之神靈

四聖散 治瘰癧用花蛇散取轉後用此補之亦去根本

海藻洗 石決明 煨 羌活 瞿麥穗 各等

右為末每服二錢米湯調下日三服下清水盡為妙

牽牛圓 立效

荆芥穗 僵蚕 各五分 班猫 二十入个去

黑牽牛 五分

為末皂角末熬膏為圓菜豆大臨睡時先用米飲調活石末一分服半夜時再服五更初却用溫酒吞二七丸服訖如小便无惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末一分服之以小便內利去惡毒是其應也

連翹圓 治瘰癧結核或破未破者

薄荷 新者一斤裂取汁 皂角 一挺水浸去皮裂取汁

已上十一味於銀下口
器內熬成膏次入

連翹 半兩

黑牽牛 半兩

皂角子 煨火炮去皮取仁

搗羅為末各兩半

右為末用前膏為丸梧桐子大煎連翹湯食則下二十九

三聖圓 治瘰癧

丁香 五十个

班猫 十个

麝射香 一八分

另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛如泥和藥令勻丸如棗
豆大每服五七丸食前溫酒送下日三服至五七日外
瘰癧小便淋瀝是效即加服或便下如青筋膜之狀最病
之根忌濕熱毒食

必勝圓

治瘰癧不以年深日近及腦後兩邊有小結核
復數固兼勞瘵腹內有塊

鯽魚

个去腸肚并子入雄黃一拉鷄子大頭

鯽魚一條連木半兩梔子五个皂角一拈去皮

右為末別用皂角二拈去皮搥碎以水三搥揉汁去滓

煮精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研

成膏和藥末丸如棗豆大朱砂為衣溫酒侵晨十九日

一服至晚下肉疔疔子若項有五箇則以五服藥取之

視其所生多少以為服數既可更進數服如熱毒瘡節

未有頭頂者亦用消散一方加巴豆三七粒燒存性入

皇極子圓

治少長臟氣不平憂怒驚恐諸氣抑鬱結聚瘰

癧滿留項腋及外傷風寒燥濕飲食百毒結成諸漏發作

寒熱遍于項腋無問久近悉驗

旱蓮子

連翹子

威靈仙

何首烏

蔓荊子

三棱醋温帛

赤芍藥

已上各

南木香

二兩 不見火

大皂角

三棱刮去皮酥 炙无則用羊脂

右為末米糊圓梧桐子大茶清下三十九至五十九日

二服小兒量与之食後服

破書

治瘰癧

久作不愈寒熱往來項筋挛急已破

未破皆可服之立見逐下惡物自小便中來

通明雄黃

顆塊大朱砂

各三分

水銀

班猫

二十八个去足并用糯米炒黃

右先以班猫為末續以雄黃朱砂另研為末再入水銀

細研合和用鷄子清和糯米稠糊為丸蒸豆大每服

七丸米飲或温酒下如惡物未見半朝再一服

已驗方

治瘰癧已作者

烏雞子

菜按班猫四十九个去頭翅足

右每鷄子一个去頂用筋撓勻入班猫七粒以帛糊益

於飯上蒸熟取開去班猫食雞子每食一个煎生料五

積散嚙下服不過四五已破者生肌未破者消散

海菜園

治癰生於頭項上交接名蛇盤癰宜早治之

海藻菜

蒸同麥炒 去殼

白殭蚕

炒斷絲

右為末取白梅肉泡湯為圓梧桐子大每服六七十丸

臨卧米飲送下其毒當自大便泄去忌且心雞羊酒麪

日五六服

經效方 治療癩久年不愈者

不蛀皂角子一百枚用米醋一升研砂二分同煮醋尽
炒令酥看數癩子多少如生一个服一枚生十个服十
枚細嚼米湯下酒浸煮服亦可

立應散 治療癩神效已破未破皆可服

連翹 赤芍藥 川芎 當歸

甘草 灸 滑石 研各 黃芩 三分 白牽牛 生取

土蜂房 蜜水洗飯上蒸 地膽 去頭通足研米炒

川烏尖 柴箇

右為末每服一大錢濃煎木通湯調下臨卧服毒氣從
小便中出澁痛不妨如粉片塊血爛肉是也如未効

再服繼以薄苛湯解其凡熱且地腫性帶毒濟以
或衝上麻悶不能強制嚼葱白一寸茶清下以解之如
小便澁燈心煎湯調五苓散服瘡處用好膏藥貼若
癰疽用此宣導惡毒本方去黃芩不用

皂角散

不蛀皂角不以多少每三十條作一束以棕櫚裹之縛
定於溷缸內浸一月取出却於長流水內再浸一月死
水不能浣洗不可用去棕櫚曬乾不得焙楊羅為末每
一兩入射香半錢全蝎七箇研細拌勻每服一二錢温
酒或湯飲調下一兩服愈

粉乳托裏散 治療癩攻心嘔吐發出其毒方見前

蠟燭

治瘰癧神效

方見前

蝸牛散

治瘰癧已潰未潰皆可貼

蝸牛

不拘多少以竹索串尾上晒乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用帛花量病大小貼之
一法以帶殼蝸牛七箇生取肉入丁香七粒於七殼內
燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

燒灰散

大田螺并殼肉燒存性灰破者乾貼未破者清油調傳

洗傳方

白芷煎湯泡荆芥候溫軟帛蘸洗拭乾好膏藥
貼膿汁惡肉出盡用後藥傳

半夏

南星

血竭壹分

輕粉少許

右為末以津唾調傳一方用五倍子海螵蛸檳榔
五靈脂麝香為末乾用清油調搽濕則乾粉

天傳

治瘰癧初作未破作寒熱

木鱉子二箇草烏半兩以米醋磨入搗爛葱白連根並
蚓糞少許調勻傳瘰癧上以紙條貼令通氣孔尤妙

敷法

血竭壹分

棗子

燒灰

戶香

少許

右灰研津唾調傳

灸法

以手仰置脊上微舉肘取之肘骨尖上是穴隨患處左
即灸左右即灸右艾炷如小筋頭大

再灸之前不過三次亦無恙如患四五年者如或用藥
壓不運夜時著灸申時即落所感稍深若三作即三灸
平安又法只以蒜片貼有癰上七壯一易蒜多灸取效

癰癰

南星膏治皮膚腫面上瘡癰大者如拳小者如粟或軟或
硬不疼不痛宜服以可輒用

右用大南星一枚細研稠粧用米醋五七滴為膏如無
生者用乾者為末醋調如膏先將小針刺痛處令氣
却以藥膏攤紙上象癰大小貼之

治癰方先用甘草煎膏筆蘸粧癰傍四圍乾后復粧
三次後以藥

大戟

芫花

甘遂

石為末米醋調別筆粧傳其中不得近著甘草處次日
縮少又以甘草膏粧小暈三次中間仍用大戟芫花甘
遂如前法自然焦縮凡骨癰肉癰脹癰血癰石癰皆不
可決惟肌癰決去其脂粉則愈生齒六種癰瘡肉癰尤不
可治治則殺人

治同上

方見前

繫

兼去鼠竅痔真奇藥也

芫花拆淨洗帶湯不得犯鐵器於木石器中搗取汁用
線一條浸半日或一宿以線繫癰經宿即落如未落不
換線不過兩次自落后以龍骨訶子末傅瘡口即合繫
鼠竅痔依上法累用文效如無根只用花炮濃水浸線

黃丹 治鼻瘡癩子及面上雀兒

黃丹

硃砂

巴豆去油

餘藥各等分

石為末入生礬石灰末一已雞子清調勻酒渣用鴉翎
刷上雀兒脏竹針刺破挑藥點之纔覺痛及微腫可法
丁瘡

秘方 治丁瘡

防風

細辛

甘草節

白殭

青皮

黃連

羌活

獨活

蟬退

赤芍藥

各平兩分

右劉微之服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑一兩同
搗爛熱酒利服后用酒水各半盞生薑三片煎服

退減後再入大黃少許煎服下一兩洗蕩去餘毒更
白梅蒼丹子研爛貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀
甚若不疾然有效檢速累試之

秘方 治魚臍丁瘡

絲瓜葉即震刺葉

連鬚葱

韭菜

右同入石鉢內搗爛如泥以酒和服查貼腋下如病在
左手貼左腋下右手貼右腋在左足貼左膝右足貼右
膝如在中則貼心臍並用布帛包住候肉下紅絲處皆
白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛
倒則難救矣

酒煎散 治丁瘡

赤烏相根 水柳根 水楊梅根 芴頭根

紅內消 香白芷 各等分

右多為剉散酒煎旋入通明雄黃研爛同服如瀉時瘡
勢甚退時只喫此藥若不瀉再服通利藥

通利藥

果牽牛 乙 巴豆 拾伍箇 大黃 五分生用

右為末米糊圓如棗豆大初服七丸次伍圓第三服三
圓如瀉不止與白米粥及冷水洗五心如一服即瀉住
服量人虛實與服如人盛服前二藥通再服此藥人十
分實者

通藥

羌花 巴豆 大黃 荆芥 各等分

右對散白水煎一沸便瀉過空心服可
若要瀉住再服一服便住

連翹散 瀉後用此

連翹 當歸尾 羌活 獨活

防風 赤芍藥 小赤豆 各伍 大黃 式分

木香 菇萸 茨菇 薄荷

紅內消 杜白芷 升麻 甘草

忍冬草 各參 若潮不退加黃芩芍藥子仁 各參 朴消 肆

右為末酒調服不拘時候薄荷湯亦可喘加入參大病
三四服愈如煩嘔其草半兩豆粉一兩為末酸鹽水下

如割瘡去了疔子止血用毛鉄甲為末傳

霜梅拾箇 大黃 伍分

右為塊子用石灰炒過去石灰入黃丹三錢為末乾糝

瘡口七 瘡口七

畔留瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡

蟬蛻散 治丁瘡最有功效用蟬蛻僵蚕為末酸醋調塗四

用指甲此動瘡上插入重者針破患者以一粒內之仍

以水沉膏貼之取蟾酥法用癩蛇坡於眉稜上以手按

出酥於油紙上或桑葉上用新瓦盛下然後插在背

敷經宿則自乾白於鴉翎筒內盛之

水沉膏 白及末半錢水盞內沉下澄去水却於皮紙上

開貼瘡上

灸法掌後橫文後五指男左女右灸七壯即瘡變效

簽刺瘡

單方 治竹草簽刺瘡以象牙屑傳之立出

又方 附白梅傳之立出

敷藥治竹草刺瘡發腫作疼緣傷時不曾出血及被惡毒

氣注痛不止夜卧不安初破時其瘡紫赤黑色較時起三

五重皮是也

綠丸 半丸 小瓶 取出 日乾

丹參 二分半

麝香 一字 馬兜鈴根 一斗半

右為末漿水洗淨瘡口上敷即立效

湯火瘡

傳方劉寄奴不以多少為末先以糯米漿雞羽掃傷處然後搽藥並不痛亦無痕大凡湯者急以醋調茶鹽末塗之護肉不壞然後用別藥傳之至妙

又方

黃連

黃柏

輕粉各等分朴消少許

右為末入清油用合子合住飯上蒸調涂立愈

湯潑火燒細研山梔子濃調雞子清鵝毛輕拂上立愈
又方側柏葉燒灰有性為末雞子清調傳如乾丹上

黃和散 治湯火傷

雞子殼

黃柏樹皮 朴消

大黃

寒水石

右等分為末白水調塗極效

聖聖膏

右用雞子黃於銀石器內熬自蒸油調好粉傳之

此方

山枇杷柴取皮焙乾為末生蜜鷄子清調傳

四黃散

治湯發火燒熱瘡疼痛

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

白皮各等分

右為末水調成膏以雞翎時刷

按藥治白火多生火斑瘡有汁
黃柏皮薄可葉為末搗之即

項瘦

破結散治五癭堅便不可移名石癭皮色不變名肉癭筋絡露結名筋癭赤脉交絡名血癭隨憂愁漬長名氣癭五癭皆不可妄决破也則膿血崩潰多致美和服此十日知二十日愈

海藻洗

龍腦草

海螵

通草

昆布洗

礬石枯

松蘿各三分
麥麩四分

半夏

海帶 各二分

右為末每服方寸匕酒調日三服忌鷄魚猪肉日卒生

乘及諸毒物

灸法治諸癭灸大空穴三七壯又灸肩髃左右相當

外男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯穴在

肩端兩骨間陷者宛上中卒臂取之

又灸兩耳后髮際共百壯

外科精要十九卷終

西

書