

第十三卷 第一冊

13



木部中品

總九十二種今疏其要者二十六種

桑根白皮

葉耳椹灰  
枝黃附

竹葉

茹瀝  
附

吳茱萸

檳榔

梔子

騏驎竭

龍腦香

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

茗苦榛

山茱萸

紫葳

胡桐淚

猪苓

烏藥

沒藥

安息香

仙人杖

海桐皮

大腹

合歡

五倍子

天竺黃

蜜蒙花

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦

崩中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水

腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡出土

上者殺人

疏○桑根白皮得土金之氣故味甘氣寒而

雷公擇十年以上向東嫩根銅刀刮去青黃薄皮取肉白皮切焙乾其皮中涎勿去之藥力

無毒東垣海藏俱云兼辛然甘厚辛薄降多

俱在上也忌鐵錫器。用蜜水拌炒用

升少陽中陰也入手太陰經甘以固元氣而

補不足。辛以瀉肺邪之有餘。故能止嗽也凡

肺中有水氣及肺火有餘者宜之傷中者中

氣傷也五勞者五臟勞傷也六極者六腑之

中氣極也羸瘦者肌肉脫也崩中者血脫也

脉絕者氣血兩虛之至故脉不來也之數者

皆由陰不足則陽有餘陽有餘則火盛而內  
熱火與元氣不兩立火能消物造化自然也  
惟甘也可以補元氣惟寒也可以除內熱熱  
除矣元氣生矣則上來諸證自瘳故本經終  
之以補虛益氣焉別錄去肺中水氣者卽十  
劑中云燥可去溼桑白皮之屬是已吐血熱  
渴者熱傷肺火炎迫血妄行溢出上竅而兼  
發熱作渴也其主水腫腹滿臙脹者卽利水

道除溼補虛之功也溼熱盛則寸白生消除  
溼熱則蟲自不能留也縫金瘡者甘寒補益  
宜於傷損也

主治參互

得天麥二冬款冬花百部薄荷甘草沙參貝  
母枇杷葉五味子爲治嗽要藥 得芍藥薏  
苡仁木瓜茯苓橘皮赤小豆爲治水腫之神  
劑 經驗方治咳嗽吐血甚者鮮桑根白皮

一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾爲末每服一錢米飲下 肘後方治

消渴尿多入地三尺桑根剉取白皮炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之亦可少入米勿用

鹽 肘後方治產後下血炙桑白皮煮水飲

之 經驗方治墜馬拘損桑根白皮五斤爲末以水五升煎膏敷之便止已後亦無宿血

終不發動 子母秘方治小兒重舌桑根白

皮煮汁塗乳上飲之

聖惠方治小兒流涎

脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然汁飲

之甚效煎飲亦良

聖惠方治小兒天吊驚

癩取家桑東行根研汁服

千金方治石癰

堅硬不作膿者桑白皮陰乾爲末煨膠和酒

調傅以軟爲度

蘇頌取皮中白汁主治小

兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刀所傷

疼痛須臾血止仍以白皮裹之甚良

時珍

取汁塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗 取枝燒瀝治

大風瘡疥生眉髮 子母秘錄治小兒鵝口

桑皮汁和胡粉塗之 聖惠方治小兒唇腫

桑木汁塗之卽愈 摘玄方治破傷中風桑

瀝好酒對和溫服以醉爲度醒服消風散

簡誤

肺虛無火因寒襲之而發咳嗽者勿服

○桑葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

疏○葉本經無氣味詳其主治應是味甘氣  
寒性無毒甘所以益血寒所以涼血甘寒相  
合故下氣而益陰是以能主陰虛寒熱及因  
內熱出汗其性兼燥故又能除腳氣水腫利  
大小腸原稟金氣故又能除風經霜則兼得  
天地之清肅故又能明目而止渴髮者血之  
餘也益血故又能長髮涼血故又止吐血合  
癰口罨穿掌療湯火皆清涼補血之功也

主治參互

四月採桑葉酒拌九蒸九曝爲末胡麻或黑  
芝麻去殼九蒸九曝另磨如泥各等分煉蜜  
和爲丸每五六錢空心饑時白湯下能益氣  
血祛風仙家餌之爲引年止饑之要藥 普

濟方治青盲洗法昔武勝軍宋仲孚患此二  
十年用此法二年目明如故摘青桑葉曬乾  
逐月按日就地上燒存性每以一合於甕器

內煎減二分傾出澄清溫熱洗日至百度屢  
試有驗正月初八二月初八三月初六四月  
初四五月初六六月初二七月初七八月二  
十九九月十二十月十三十一月初二十二  
月三十 集簡方治風眼下淚臘月不落桑  
葉煎湯日日溫洗或入芒硝 千金方治頭  
髮不長用桑葉麻葉煮泔水沐之七日可長  
數尺 聖濟總錄治吐血不止晚桑葉焙乾

研涼茶服三錢只一服止後用補肝肺藥

直指方治癰口不斂經霜黃桑葉爲末傅之

通玄論治穿掌腫毒新桑葉研爛罨之卽

愈 醫學正傳治湯火傷瘡經霜桑葉燒存

性爲末油和敷之三日愈

○桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白沃血  
病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不  
調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色

者治癖飲積聚腹痛金瘡 桑耳燉存性研

細香附童便炒黑研細每用桑耳灰二分香

附末三分淡醋湯空心調服治血崩奇效過

於他木耳

○桑椹味甘寒無毒單食止消渴陳藏器利五

藏關節通血氣久服不饑安魂鎮神令人聰

明變白不老多收暴乾為末蜜丸日服時珍

搗汁飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫

一名文武

疏○桑椹者桑之精華所結也其味甘其氣寒其色初丹後紫味厚於氣合而論之甘寒益血而除熱其爲涼血補血益陰之藥無疑矣消渴由於內熱津液不足生津故止渴五臟皆屬陰益陰故利五臟陰不足則關節之血氣不通血生津滿陰氣長盛則不饑而血氣自通矣熱退陰生則肝心無火故魂安而

神自清寧神清則聰明內發陰復見變白不  
老甘寒除熱故解中酒毒性寒而下行利水  
故利水氣而消腫皆自然之道也

主治參互

寇宗奭曰本經言桑甚詳獨遺烏椹然桑之  
精英盡在於此採摘微研以布濾汁石器熬  
成稀膏量入多少蜜熬稠貯瓷器中每抄一  
二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石藥發

熱口渴生精神及小腸熱甚 僊方日乾為

末蜜和丸酒服亦良 四時月令云四月宜

飲桑椹酒能理百種風熱其法用桑椹汁三

斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩

生薑汁一合煮令得所瓶收每服一合和酒

飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味愈佳

普濟方治水腫脹滿水不下則滿溢水下則

虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒治之桑白

皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取五升以糯米飯五升釀酒飲 保命集治瘰癧

結核文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟

者以布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一

匙日三服 千金方治小兒赤禿桑椹子取

汁頻服 聖濟錄治小兒白禿黑椹入罌中

曝三七日化為水洗之三七日神效 集簡

方治陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天為細

末每服三錢熱酒下取汗

簡誤

甘寒帶滑故潤而下行脾胃虛寒作泄者勿服

○桑柴灰味辛寒有小毒淋取汁與冬灰等分同滅痔疵黑子蝕惡肉煑赤小豆食大下水  
張傅金瘡止血生肌 桑霜卽灰汁以桑皮  
綿紙襯淘籬底用滾水淋下篋器盛之重湯

煑乾別名木礪能鑽筋透骨爲傳癰疽拔疔  
引諸散毒藥攻毒之要品 得丹砂雄黃乳  
香沒藥牛黃龍腦香紅白藥子白及白歛傅  
一切腫毒止痛追毒有奇效 得鐵鏽蟾酥  
可拔疔

○枝味苦平性不冷不熱主遍體風癢乾燥火水  
氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣欬嗽  
消食利小便療癰疽後渴嫩條細搗一升熬

香煎飲亦無禁忌久服終身不患偏風 聖  
惠方治紫白癩風桑枝十斤益母草三斤水  
五斗慢煮至五升去滓再煎成膏每臥時溫  
酒調服半合以愈爲度

○桑黃氣味與白皮同其除肺熱之功殆又過  
之山家老桑樹多生湖桑少見 同天門冬  
百部山梔枇杷葉治赤鼻有神

竹葉味辛平大寒無毒主胸中痰熱欬逆上氣

疏○竹葉稟陰氣以生本經味辛平氣大寒  
無毒甄權言甘寒氣薄味厚陰中微陽降也  
入足陽明手少陰經陽明客熱則胸中生痰  
痰熱壅滯則欬逆上氣辛寒能解陽明之熱  
結則痰自消氣自下而欬逆止矣仲景治傷  
寒發熱大渴有竹葉石膏湯無非假其辛寒  
散陽明之邪熱也

食芻忘砂糖鱈魚羊肉羊臍

主治叅互

煎湯調酸棗仁炒熟末五錢臨臥服治心虛  
 不得眠 同麥門冬酸棗仁遠志丹參茯神  
 丹砂犀角治心經蘊熱虛煩不眠 入白虎  
 湯治傷寒煩熱大渴引飲 肘後方治時行  
 發黃竹葉五升小麥七升石膏三兩水一斗  
 半煮取七升細服盡劑愈

○淡竹茹味甘微寒無毒主嘔哕溫氣寒熱吐

血崩中



疏○竹茹雖與竹葉同本然竹茹得土氣多  
故味帶甘氣微寒無毒入足陽明經經曰諸  
嘔吐酸水皆屬於熱陽明有熱則爲嘔哕溫  
氣寒熱亦邪客陽明所致甘寒解陽明之熱  
則邪氣退而嘔哕止矣甘寒又能涼血清熱  
故主吐血崩中及女勞復也

主治參互

同木瓜橘皮麥門冬枇杷葉人參蘆根汁石

斛治胃虛有熱嘔啞不止 活人書治傷寒

愈後交接女勞復頭痛身熱耳鳴口渴腰骨  
痛男子卵腫股痛竹皮一升水三升煮五沸  
服汁 又方治婦人大病初愈有所動勞致  
熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀淡竹青  
茹半斤恬樓二兩水二升煎一升分二服

簡誤

胃寒嘔吐及感寒挾食作吐忌用

○淡竹瀝味甘大寒無毒療暴中風痺胸中大

熱止煩悶消渴勞復

薑汁為之使

汪穉取竹瀝法將竹截二尺長劈開以磚兩塊架竹於上以火炙磚縫中竹其瀝自出用

疏○竹瀝竹之津液也經云大寒亦言其本

器承取○能食者用刺瀝○不能食者用竹瀝

性耳得火之後寒氣應減性滑流利走竅逐

痰故為中風家要藥凡中風之證莫不由於

陰虛火旺煎熬津液結而為痰壅塞氣道不

得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不

仁此藥能遍走經絡撥剔一切痰結兼之甘

寒能益陰而除熱痰熱既祛則氣道通利經  
脉流轉外證自除矣其主胸中大熱止煩悶  
者取其甘寒清熱益陰之功耳觀古人以竹  
瀝治中風則知中風未有不因陰虛痰熱所  
致不然如果外來風邪安得復用此甘寒滑  
利之藥治之哉

主治參互

同貝母栝樓仁霞天膏白芥子蘇子橘紅鬱

金童便麥門冬治似中風口眼喎斜語言蹇澀或半身不遂等證 千金方治中風口噤

竹瀝加薑汁日日飲之 梅師方治產後中

風口噤身直面青手足反張以竹瀝飲一二

升卽甦 外臺秘要治破傷中風凡閃脫折

骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發瘳口噤

項急殺人亟飲竹瀝二三升忌飲食及酒

千金方小兒傷寒淡竹瀝葛根汁各六合細

細與服 至寶方小兒狂語夜後便發竹瀝

夜服二合 產寶方婦人胎動妊娠因夫所

動困絕以竹瀝飲一升立愈 梅師方孕婦

子煩茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分

三服 千金方時氣煩躁五六日不解青竹

瀝半盞煎熱數數飲之覆取微汗 李絳兵

部手集欬嗽肺痿大人小兒欬逆短氣胸中

吸吸欬出涕唾嗽出臭膿用淡竹瀝一合服

之日三五次以愈為度

簡誤

寒痰溼痰及飲食生痰不宜用

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛

辛熱走氣動火昏目發瘧令人咽咳不利

欬逆寒熱除溼血痺逐風邪開腠理去痰冷腹

內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏

惡丹麥硝石紫石英

疏○吳茱萸稟火氣以生故其味辛氣溫有

源思也曰陳久者良閉口者有毒每十兩以鹽二兩東流水四斗浸去苦烈汁厚曬乾用

小毒甄權辛苦大熱氣味俱厚陽也入足陽

明太陰兼入足少陰厥陰經凡脾胃之氣喜  
溫而惡寒寒則中氣不能運化或爲冷實不  
消或爲腹內絞痛或寒痰停積以致氣逆發  
欬五臟不利辛溫煖脾胃而散寒邪則中自  
溫氣自下而諸證悉除其主除溼血痺逐風  
邪者蓋以風寒溼之邪多從脾胃而入脾胃  
主肌肉爲邪所侵則腠理閉密而寒熱諸痺  
所從來矣辛溫走散開發故能使風寒溼之

邪從腠理而出中惡腹痛亦邪惡之氣干犯脾胃所致入脾散邪則腹痛自止矣

主治參互

仲景吳茱萸湯治少陰病吐利手足逆冷煩

躁欲死者吳茱萸一斤人參二兩壹生薑六兩壹

大棗十二枚二十劈四味以水七升煮二升去滓

溫服七合日三服厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者

同此方 又當歸四逆加吳茱萸湯治厥陰

證手足厥冷脉細欲絕其人內有久寒者當  
歸三兩芍藥三兩炙甘草二兩通草二兩桂  
枝三兩細辛三兩生薑半斤吳茱萸二升大  
棗二十五枚以水六升清酒六升同煮取五  
升去滓分五服 食療治冬月感寒吳茱萸  
五錢煎湯服之取汗 聖惠方治陰毒傷寒  
四肢逆冷用吳茱萸一升酒拌溼絹袋二箇  
包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累

有效 用後方治寒疝往來吳茱萸一兩生薑半兩清酒一升煎分溫服 聖惠方治食已吞酸胃虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑等分爲末湯服一錢 孫氏存仁方治多年脾泄老人多此謂之水上同化吳茱萸三錢泡入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱萸能煖膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分解清濁也 和劑局方戊巳丸治脾胃受溼

下痢赤白腹痛米穀不化用吳茱萸黃連白芍藥各一兩同炒爲末蒸餅丸梧子大每服二三十丸米飲下

簡誤

陽厥似陰手足雖逆冷而口多渴喜飲水大小便秘結小便或通亦赤澀短少此火極似水守真所謂禁慄如喪神守皆屬於火之謂耳此與桂附乾薑之類同忌嘔吐吞酸屬胃

火者不宜用欬逆上氣非風寒外邪及冷痰  
宿水所致不宜用腹痛屬血虛有火者不宜  
用赤白下痢病名滯下因暑邪入於腸胃而  
非酒食生冷停滯積垢者不宜用小腸疝氣  
非驟感寒邪及初發一二次者不宜用霍亂  
轉筋由於脾胃虛弱冒暑所致而非寒溼生  
冷于犯腸胃者不宜用一切陰虛之證及五  
臟六腑有熱無寒之人法所咸忌

檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲  
伏尸療寸白

不見大生用

疏○檳榔得天之陽氣地之金味故味辛氣

溫無毒大明言澀元素言苦以其感盛夏之

火氣耳氣薄味厚陽中微陰降也入手足陽

明經夫足陽明為水穀之海手陽明為傳道

之官二經相為貫輸以運化精微者也二經

病則水穀不能以時消化羈留而成痰癖或

溼熱停久則變生諸蟲此藥辛能散結破滯  
苦能下泄殺蟲故主如上諸證也甄權宣利  
五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積  
聚日華子下一切氣通關節利九竅健脾調  
中破癥結李珣主賁豚氣五膈氣風冷氣腳  
氣宿食不消皆取其辛溫走散破氣墜積能  
下腸胃有形之物耳

主治參互

同草果枳實橘皮治食瘧加三稜蓬茂礬紅

紅麴山查麥蘖消一切堅硬肉食及諸米麩

生冷食積成塊作痛 同黃連藟豆蓮肉橘

紅白芍藥紅麴烏梅葛根枳殼治滯下後重

同雷丸使君子白蕪荑蘆薈肉豆蔻胡黃

連治小兒疳疔 同棟根鶴虱錫灰薏苡根

貫衆烏梅治一切寸白蟲 同蒼朮草果青

皮甘草台山嵐葦氣發虛 直指方心脾作

痛雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同  
以水煎服之 廣利方脚氣衝心悶亂不識  
人用白檳榔十二分爲末分二服空心煖小  
便調下日二服 十便良方蟲痔裏急檳榔  
爲末每日空心以白湯調二錢 千金方寸  
白蟲病檳榔二七枚爲末先以水二升半煮  
檳榔片取一升空心調末方寸七服之經日  
蟲盡出未盡再服以盡爲度

簡誤

檳榔性能墜諸氣至於下極病屬氣虛者忌  
之脾胃虛雖有積滯者不宜用下利非後重  
者不宜用心腹痛無畱結及非蟲攻咬者不  
宜用瘧非山嵐瘴氣者不宜用凡病屬陰陽  
兩虛中氣不足而非腸胃壅滯宿食脹滿者  
悉在所忌

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣

面赤酒皸鼓鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛

心大小腸大熱心中煩悶

得酒良

雷云取紫小如雀卵并髮長有九路赤色者為上。震亨曰治上焦中焦。並殼洗。拌炒用治下焦。

疏○梔子感天之清氣得地之苦味故其性

去殼淨洗去黃炒用治血痛妙里用。好者曰去臟腑熱用仁去肌表熱用殼。

無毒氣薄而味厚氣浮而味沉陽中陰也入

手太陰手少陰足陽明經少陰為君主之官

邪熱客之則五臟皆失所主清少陰之熱則

五內邪氣自去胃中熱氣亦除面赤酒皸鼓

鼻者肺熱之候也肺主清肅酒熱客之即見

是證於開竅之所延及於面也肺得苦寒之  
氣則酒熱自除而面鼻赤色皆退矣其主赤  
白癩瘡瘍者卽諸痛痒瘡瘍皆屬心火之謂  
療目赤熱痛及胸心大小腸大熱心中煩悶  
者總除心肺二經之火熱也此藥味苦氣寒  
瀉一切有餘之火故能主如上諸證

主治參互

仲景治傷寒汗吐下後虛煩不得眠及心中

懊懣者有梔子豉湯用梔子十四枚香豉四  
合水煎服 入茵陳大黃湯治傷寒溼熱發  
黃腹脹梔子十四枚茵陳六兩大黃三兩水  
一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升分  
三服小便當利尿如皂角汁狀正赤一宿腹  
減黃從小便出也 同甘草黃檗爲梔子檄  
皮湯亦治發黃身熱 同厚朴枳實爲梔子  
厚朴湯治傷寒下後心煩腹滿臥起不安者

得吐卽愈 同鼠矢作湯治大病後勞復小

便不利者小便利卽愈已上皆仲景法 同

連翹麥門冬竹葉燈心草生甘草黃連能瀉

心經有餘之火加赤茯苓木通滑石澤瀉瀉

小腸火 同桑黃或桑白皮黃芩甘草桔梗

五味子乾葛治酒熱傷肺發出鼻齖 同茵

陳蒿滑石車前子秦艽黃連連錢草苜蓿治

酒熱發黃 梅師方治熱病後勞復及因交

接後發動欲死不能語者梔子三十枚水三升煎一升服令微汗 救急方治湯盪火傷梔子末和雞子清濃塗之 丹溪方治胃脘火痛山梔七枚炒水一盞煎七分入生薑汁飲之立止

簡誤

梔子稟至苦大寒之氣苦寒損胃而傷血凡脾胃虛弱者忌之血虛發熱者忌之性能瀉

有餘之火心肺無邪熱者不宜用小便不通  
由於膀胱虛無氣以化而非熱結小腸者不  
宜用瘡瘍因氣血虛不能收斂則爲久冷敗  
瘡非溫煖補益之劑則不愈此所謂旣潰之  
後一毫寒藥不可用是也世人又以治諸血  
證不知血得熱則行得寒則凝瘀血凝結於  
中則反致寒熱或發熱勞嗽飲食減少爲難

療之病凡治吐血去當以順氣爲先蓋血隨

氣而行氣降則火降火降則血自歸經不求其止而止矣此治療之要法不可違也

騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止

痛破積血金瘡生肉

舊與紫釧同條今分出

一名血竭得善陀仿良

疏○騏驎竭稟土氣而兼水化故味甘鹹氣

平無毒丹房鑑源云稟於熒惑之氣生於湯

石之陰其色赤象火而味鹹則得陰氣也氣

薄味厚陰也降也入足厥陰手少陰經甘主

補鹹主消散瘀血生新血之要藥故主破積  
血金瘡止痛生肉主五臟邪氣者即邪熱氣  
也帶下者溼熱傷血分所致也甘鹹能涼血  
除熱故悉主之蘇恭主心腹卒痛李珣以之  
治傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血聚

者誠為此耳 此藥產外國極難得真者理傷折有奪命之功

主治參互

同乳香沒藥自然銅麻皮灰狗  
燬存性

麝蟲黃荊子骨碎補治一切打撲損傷 同

髮灰乳香沒藥片腦輕粉象牙末紅粉霜爲

細末摻一切金瘡及腫毒生肌止痛 廣利

方金瘡出血騏驎竭末傅之立愈 醫林集

要產後血衝心胸喘滿命在須臾用血竭沒

藥各一錢研童便和酒調服 究原方收斂

瘡口血竭末一字龍腦少許大棗燒灰半錢

同研津調塗之 摘玄方胸中血塊血竭沒

藥各一兩滑石牡丹皮各一兩同煮過爲末  
醋糊丸梧子大空心服之  
醫林集要嵌甲  
疼痛血竭末傅之

簡誤

凡使勿用海母血真相似只是味鹹并腥氣  
騏驎竭味微鹹甘似梔子氣也又云嚼之不  
爛如蠟者爲上凡血病無瘀積者不必用日

雷公曰先研篩過入藥石也

華子云此藥性急不可多使却引膿用時勿

與衆藥同研化作飛塵也

龍腦香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪

氣風溼積聚耳聾明目去日赤膚翳

李時珍曰其收白莹如冰及作梅花片者故俗曰冰片又曰梅花片腦今肆中多假宜辨之

疏○龍腦香稟火金之氣以生本經味辛苦

入藥不可多用二三分即止

氣微寒無毒其香為百藥之冠凡香氣之甚

者其性必溫熱李珣言溫元素言熱是矣氣

芳烈味大辛陽中之陽升也散也性善走竄

開竅無往不達芳香之氣能辟一切邪惡辛

熱之性能散一切風溼故主心腹邪氣及風溼積聚也耳聾者竅閉也開竅則耳自聰目赤膚翳者火熱甚也辛溫主散能引火熱之氣自外而出則目自明赤痛膚翳自去此從治之法也別錄又主婦人難產者取其善走開通關竅之力耳

主治參互

同乳香沒藥雄黃紅藥子烏雞骨白及白燐

桑鹵城牛黃傳一切疔腫癰疽神效 聖濟

總錄目生膚翳龍腦爲末日點三五度 御

醫院方頭目風熱上攻用龍腦末半兩南蓬

砂末一兩頻啗兩鼻 瀕湖集簡方風熱喉

痺燈心一錢黃檗五分竝燒存性白礬七分

煨過片腦三分爲末每以一二分吹患處此

陸一峰家傳絕妙方也 又方鼻中息肉垂

下者用片腦點之自入 夷堅志傷寒舌出

過寸者梅花片腦半分爲末摻之隨手而愈

又方中風牙噤無門下藥者開關散措之

五月五日午時用龍腦天南星等分爲末每

以一字措齒二三十遍其口自開 經驗方

痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤

未透者用龍腦一錢細研旋以豬心血丸芡

子大每服一丸紫草湯下少時心神便定得

睡發瘡 總微論用獷猪第二番血清半杯

紫草汁半杯和勻入龍腦一分溫服良久下  
瘀血一二行瘡卽紅活此治痘瘡黑靨惡候  
醫所不治者百發百中

簡誤

宗奭云此物大通利關膈熱塞大人小兒風  
涎閉塞及暴得驚熱甚爲濟用然非常服之  
藥震亨云龍腦屬火世知其寒而通利未達  
其熱而輕浮飛越喜其香而貴重動輒與麝

同爲桂附之助。然人之陽易動，陰易虧，不可不思。杲曰：龍腦入骨，風病在骨髓者，宜用之。爲引經。若風在血脉肌肉，輒用腦麝，反引風入骨髓。如油入麩，莫之能出也。觀三公之言，則龍腦之爲害可知。凡中風非外來之風邪，乃因氣血虛而病者，忌之。小兒吐瀉後成驚者，爲慢脾風，切不可服急驚屬實熱，可用慢驚屬虛寒，不可用眼目昏暗屬肝腎虛者不

宜入點藥設誤點之必致昏聩難療

蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中  
淫淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中噉噉  
喘息

疏○蕪荑稟金氣而生於春陽之令本經味  
辛氣平無毒甄權加苦李珣加溫詳其功用  
應是苦辛溫平之藥非辛溫則不能散五臟  
皮膚骨節中邪毒氣非苦平則不能去三蟲

化食逐寸白療腸中噉噉喘息然察其所主  
雖能除風淫邪氣之爲害而其功則長於走  
腸胃殺諸蟲消食積也故小兒疳瀉冷痢爲  
必資之藥

主治參五

同肉豆蔻胡黃連盧會使君子青黛五穀蟲  
雷丸檳榔橘皮治小兒疳熱瀉痢及腹大羸

腹面青子忍已  
大毒方劑殺者虛生蕪

莢生檳榔各四兩爲末蒸餅丸如梧子每服  
二十九白湯下 錢氏小兒直訣疳熱有蟲  
瘦悴久服充肌用蕪荑一兩黃連一兩爲末  
豬膽汁七枚和入器內飯上蒸之一日蒸一  
次丸蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸菜豆  
大每服五七丸至二十九米飲下 危氏得  
效方蟲牙作痛以蕪荑仁安蛀孔中及縫中  
甚效 入藥用大者小者卽榆莢不堪入藥

除疴證殺蟲外他用甚稀故不著簡訣

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節  
勞氣欬嗽背膊悶倦散雷結胸膈痰滯逐水消

脹滿大腸風安胃止風痛

得麩炒良

雷曰枳殼枳實性效不同並以陳年者為佳今小麥麩炒至麩節止麩用  
疏○枳殼氣味所主與枳實大畧相同但枳

實形小其氣全其性烈故善下達如少年猛

悍之將勇往直前而一無回顧者也枳殼形

大其氣散其性緩故其行稍遲是以能入胸

肺胃之分及入大腸也其主風痺麻痺通  
利關節止風痛者蓋肺主皮毛胃主肌肉風  
寒溼入於二經則皮膚瘙癢或作痛或麻木  
此藥有苦泄辛散之功兼能引諸風藥入於  
二臟故爲治風所需風邪旣散則關節自然  
通利矣其療勞氣咳嗽背膊悶倦者蓋亦指  
風寒鬱於上焦則肺氣滯而爲悶倦咳嗽經  
曰肺苦氣上逆急食苦以泄之枳殼味苦能

泄至高之氣故主之也又肺與大腸爲表裏  
風邪入肺則并入大腸風熱相搏而爲腸風  
下血苦寒下泄之氣則血熱清而風自除矣  
其主散留結胸膈痰滯逐水消脹滿安胃諸  
證悉與枳實相同第其氣稍緩耳

主治參互

同蘇子橘皮桔梗木香白豆蔻香附治上焦

荆芥芍藥黃芩當歸生地黃地榆側柏葉治  
腸風下血初起者神效 同荆芥苦參防風  
蒼耳草敗蒲煎湯沐浴治風疹作痒 同檳  
榔芍藥黃連升麻葛根甘草紅麴滑石治滯  
下裏急後重 得人參麥冬治氣虛大便不  
快 同肉桂治右脇痛

簡誤

枳殼泄肺能損至高之氣肺氣虛弱者忌之

脾胃虛中氣不運而痰壅喘急者忌之咳嗽  
不因於風寒入肺氣壅者服之反能作劇咳  
嗽陰虛火炎者服之立致危殆一槩胎前產  
後咸不宜服今世多用以治婦人胎氣不安  
或至八九月爲易產之劑動輒資用殊不知  
婦人懷孕全賴氣血以養胎氣血充足則胎  
自易產且娠婦至八九月精神困倦四肢軟  
弱飲食減少動息喘促何莫非虛弱之證而