

活法機要 全



模範活

要法

活法機要目錄

泄瀉門

黃芩芍藥湯

大黃湯

芍藥湯

白朮黃耆湯

防風芍藥湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

荊子散

漿水散

黃連湯

芍藥黃連湯

導氣湯

加減平胃散

地榆芍藥湯

厲風證

樟皮散

二聖散

破傷風證

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

大芎黃湯

蜈蚣散

防風湯

左龍湯

羌活湯

養血當歸地黃湯

頭風證

消風散

泄青丸

雷頭風證

甘草散

黑白散

升麻湯

胎產證

黃龍湯

二黃散

半夏湯

增損柴胡湯

秦艽湯

荆芥散

防風湯

三分散

血風湯

血運血結四物湯

沒藥散

加減四物湯

四物湯

紅花散

崩

當歸散

惡物  
不下

生地黃散

吐血

麥門冬飲子

血

頭風證

苦練丸

衛生湯

大頭風證

黃芩黃連甘草湯

黑白散

瘧證

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

熱證

地黃丸

防風當歸飲子

金花丸

涼膈散

當歸承氣湯

牛黃膏熱入  
血室

白虎湯

眼證

散熱飲子

地黃湯

四物龍膽湯

點眼藥

洗眼藥

噙藥

消渴證

黃連膏

八味丸

腫脹證

水腫方

瘡瘍證

大疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃耆湯

內消升麻湯

復元通氣散

五香湯

赤芍藥散

桃紅散

冰霜散

火燒

乳香散

杖瘡

五黃散

火燒

花藥石散

截疳散

生肌散

平肌散

碧霞挺子

用藥加減例

迴瘡金銀花散

雄黃散

瘰癧證

桑椹膏

連翹湯

瞿麥飲子

咳嗽證

利膈丸

欬氣丸

虛損證

四君子湯

和血八物湯

十全散

牛膝丸

黑地黃丸

八味丸

地黃丸

吐證

桔梗湯

木香散

厚樸丸

心痛證

金鈴子散

煮黃丸

厚樸丸

藁本湯

尤附湯

疝證

酒煮當歸丸

苦練丸

白道機要

清獻式

誠鑑

誠鑑

赤浦經

金龜子婿

齊賢氏

小南鑑

牛九

木香婿

風雲錄

活法機要目錄終

活法機要

江陰朱氏校刊本

元 丹溪朱震亨著

泄痢證

臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱多  
故曰暴泄非陰久泄非陽洩而便膿血知氣行而血  
止也宜大黃湯下之是爲重劑黃芩芍藥是爲輕劑  
治法宜補宜泄宜止宜和和則芍藥湯止則訶子湯  
有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難喘  
息脈微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也後重則宜

下腹痛則宜和身重者除濕脈弦者去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之鴉塘爲痢當溫之在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之盛者和之去者送之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂破血則黃連當歸宣通其氣則檳榔木香如泄痢而嘔上焦則生薑橘皮中焦則芍藥當歸桂茯苓下焦則治以輕熱甚以重熱藥若四肢懶倦小便少或不利大便走沉因飲食減宜調胃去

濕白朮茯苓芍藥三味水煎服如發熱惡寒腹不痛  
加黃芩爲主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也  
加黃連爲主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥  
如見血加黃連爲主桂當歸佐之如煩燥或先便白  
膿後血或發熱或惡寒非黃連不能止上部血也如  
惡寒脈沉或白腰痛或血躋下痛非黃芩不能止此  
中部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不能止下  
部血也唯脈浮大者不可下

黃芩芍藥湯

方在寶鑑泄痢條下

大黃湯 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者

大黃一兩

右剉細好酒二大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用將酒分二服頓服之如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯和之以徹其毒也

芍藥湯 方在寶鑑內  
痢疾條下

白朮黃耆湯服前藥痢疾雖除更宜此和之

白朮一兩

黃耆七錢

甘草三錢

一方無黃

耆用黃芩半兩

右咬咀均作三服水煎服清

防風芍藥湯 治泄痢殞泄身熱脈弦腹痛而渴及頭

痛微汗

防風

芍藥

黃芩

各一兩

右咬咀每服半兩或一兩水煎

白朮芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿

困弱無力不欲飲食暴洩無數水穀不化宜此和之

白朮

芍藥

各一兩

甘草

半兩

右剉每服一兩水煎

蒼朮芍藥湯 治痢疾痛甚者

蒼朮

二兩

芍藥

一兩

黃芩

肉桂

各半兩

右剉每服一兩水煎

訶子散如腹痛漸已泄下微少宜止之

訶子皮

一兩生熟各半

木香

半兩

黃連

炙甘草

各三錢

右爲細末每服二錢以白朮藥 湯調下如止之不

已宜歸而送之也 訶子散內加厚樸一兩竭其邪氣也

漿水散 治暴泄如水周身汗出身上盡冷脈微而弱氣少不能語甚者加吐此謂急病

半夏

二兩  
湯洗

附子

炮

乾生薑

炙甘草

肉桂

各半  
兩

良薑

二錢  
半

右爲細末每服三五錢漿水二盞煎至半和滓熱服黃連湯 治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連

當歸

各半  
兩

炙甘草

二錢  
半

右咬咀每服五錢水煎

芍藥黃連湯 治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下

血

芍藥

黃連

當歸

各半兩

大黃

一錢

淡味桂

五分

炙甘草

二錢

右咬咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一  
錢服之

導氣湯 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥 一兩

當歸 半兩

大黃 半二錢

黃連 一錢

黃芩

二錢半

木香

檳榔

各一錢

右爲末每服半兩水煎

加減平胃散

方在寶鑑內泄痢條下

地榆芍藥湯 治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮

八兩

地榆

二兩

卷柏

三兩

芍藥

三兩

右咬咀每服一兩水煎病退止

五泄之病胃小腸大瘕三證皆以清涼飲子主之其泄自止厥陰證加甘草以緩之少陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明二證當進退大承氣湯主之太

陰證不能食也當先補而後泄之乃進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已未有宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進食尙有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未止爲腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利過泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃與枳實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退

泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

癘風證

癘風者榮氣熱附其氣不清鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰  
風寒客於脈而不去故名癘風又曰脈風俗曰癩治  
法刺肌肉百日汗出百日凡二百日鬚眉生而止先  
樟皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈  
再灸再愈三灸之後服二聖散泄熱祛血之風邪戒  
房室三年病愈

樟皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癰疹瘙痒成瘡面

上風刺粉刺

樺皮

四兩燒灰

荆芥穗

二兩

杏仁

二兩

去皮尖用水  
於銀器內煮

去水一半已來放令乾用

炙甘草

半兩

枳殼

四兩

去穰用炭火燒欲灰於濕紙上

乾

右件除杏仁外餘藥爲末將杏仁另研與諸藥和勻  
磁合內放之每服三錢食後溫水調下

二聖散

治大風癘疾將皂角刺一二斤燒灰研細煎

大黃半兩調下二錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉

青丸晚服二聖散此數等之藥皆爲緩疎泄血中之

風熱也

七聖丸七宣丸

皆治風壅邪熱潤利大腸中風風癟

癟風大便秘澁皆可服之

破傷風諦

夫風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有九之苛毒  
弗能爲害故破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒  
證治人知有發表不知有攻裏和解此汗下和三法  
也諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦  
能外入於瘡爲破傷風之候諸瘡上灸及瘡着白痴

瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易爲鬱結熱甚則生風也故表脈浮而無力太陽也在表宜汗脈長而有力陽明也在裏宜下脈浮而弦小者少陽也半在表半在裏宜和解若明此三法而治不中病者未之有也羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

各四兩

地榆

細辛

各二兩

右㕮咀每服五錢水煎量緊慢加減用之熱則加大

黃三兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過熱甚更加

黃芩二兩

白朮防風湯若服前藥過有自汗者

白朮

黃耆

各一兩

防風

二兩

右㕮咀每服五七錢水煎

破傷風藏府秘小便赤用熱也百汗不休故知無寒  
也宜速下之先用芩黃湯三二服後用大芩黃湯下  
之

芩黃湯

川芎一兩

黃芩六錢

甘草二錢

右咬咀水煎

大芎黃湯

川芎半兩

羌活

黃芩

大黃

各二兩

右咬咀水煎

羌活湯 治半在表半在裏

羌活

菊花

麻黃

川芎

白茯苓

防風

石膏

前胡

黃芩

蔓荆子

細辛

甘草

枳殼各一兩

薄荷

白芷各半兩

右咬咀生薑同煎日三服

防風湯 治破傷風同傷寒表證未傳入裏宜急服此

藥

防風

羌活

獨活

川芎各等分

右咬咀水煎服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣散

蜈蚣

一對

魚鱠

半兩

左盤龍

半兩炒

盡用

右爲細末用防風湯調下如前藥解表不已覺直轉

入裏當服左龍丸服之漸漸看大便硬軟加巴荳霜  
左龍丸 治直視在裏者

左盤龍

白殭蠶 炒

魚鱠 各半

雄黃 一錢

研

右同爲細末燒鈎爲丸桐子大每服十五丸溫酒下  
如裏證不已當於左龍丸內一半末加入巴荳霜半  
錢燒鈎爲丸桐子大同左龍丸一處每服加一丸漸  
加服至利爲度若利後更服後藥若搐痙不已亦宜  
服後藥羌活湯也

羌活湯

羌活

獨活

地榆

防風

各  
兩

右咬咀水煎如有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血爲度

養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各一

細辛

半兩

右爲末水煎服

頭風證

肝經風盛木自搖動梳頭有雪皮乃肺之證也謂肺主

皮毛實則泄青丸主之虛則消風散主之

雷頭風證

夫雷頭風者震卦主之諸藥不效爲與證不相對也

升麻

蒼朮

各一兩

荷葉

全一箇

右爲細末每服半兩水煎或燒荷葉一箇研細用前藥調服亦可

胎產證

婦人童幼至天癸未行之間皆屬少陰天癸旣行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從

厥陰經無犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴則白虎氣弱則黃耆血刺痛而和以當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從增損柴胡雜證從增損四物宜詳察脈證而用之

產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯

二黃散 治婦人有孕胎漏

生地黃

熟地黃

各等分

右爲細末煎白朮枳殼湯調下

半夏湯 治胎衣不下或子死腹中或子衝上而昏悶  
或血暴下及胎乾不能產者

半夏麴

一兩半

肉桂

七錢半

桃仁

三十箇微

炒去皮尖

大黃

半兩

於三葉頭染黃酒白味而寒然止矣

煎

增損柴胡湯 治產後經水適斷感於異證手足搘搘

咬牙昏冒繫屬上焦

柴胡

八錢

黃芩

四錢半

人參

三錢

甘草

炒

石膏

各四錢

知母

二錢

黃耆

半兩

半夏

三錢

秦艽湯

右爲龜末每服半兩生薑棗同煎  
前證已去次服此以去其風邪

秦艽

八錢

芍藥

半兩

柴胡

八錢

防風

黃芩

各四錢半

人參

半兩

半夏

各三錢

炙甘草

四錢

右爲龜末水煎

荆芥散二三日後經水復行前證俱退宜此

半兩

小柴胡湯一料加荆芥穗五錢枳殼

炒去穰半兩

右爲麩末同小柴胡煎法

防風湯三二日後宜正脾胃之氣兼除風邪

蒼朮

四兩

防風

三兩

當歸

一兩

羌活

一兩半

右爲麩末水煎

三分散治產後日久虛勞鍼灸小藥俱不效者

川芎

熟地黃

當歸

芍藥

白朮

茯苓

黃耆

各一兩

柴胡

人參

各一兩六錢

黃芩

半夏

甘草

各一錢六錢

右爲麩末水煎服清

血風湯 治產諸風癟攣無力

秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

當歸

地黃

白朮

茯苓

各等分

加半夏

黃耆

右爲細末一半爲丸煉蜜如桐子大一半爲散溫酒  
調下丸藥五七十丸

治血運血結或聚於胷中或偏於少腹或運於脇肋四  
物湯四兩倍當歸川芎鬼箭紅花玄胡各一兩同爲

龜末如四物煎服清調

沒藥散服之

禹虫

去羽足一錢微炒

水蛭

二錢炒

麝香

少許

沒藥

一錢

右爲細末煎前藥調服血下痛止只服前藥  
加減四物湯 治產後頭痛血虛氣弱痰癥寒厥皆令

頭痛

羌活

川芎

防風

香附子

炒各一兩

細辛

一兩半

炙甘草

無大當歸各半

石膏

二兩半

熟地黃

一兩半

香白芷

一兩半

蒼朮

一兩六錢去皮

右爲龜末每服一兩水煎。如有汗者是氣弱頭痛也。前方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎。如頭痛癩癬者加半夏三兩茯苓一兩半生薑煎。如熱厥頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩半。如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎。

四物湯 治諸變證

方已載元戎方中

紅花散 治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣皆治之。

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃

炒各等分

右爲細末每服半兩酒煎和滓溫服。如胎衣不下  
別末榆白皮煎湯調下半兩立效。  
當歸散 治婦人惡物不下

當歸

茺花

炒

右爲細末酒調下三錢。又一方好墨醋淬末之小

便酒調下

治胎衣不下蛇退皮炒焦細末酒調下如胎衣在腹乃  
碾榆白皮末同煎服立下

生地黃散諸見血無寒衄血下血吐血潤血皆屬於熱

生地黃

熟地黃

枸杞子

桑葉地骨皮

天門冬

黃耆

芍藥

甘草

黃芩

各等分

右爲麌末每服一兩水煎脈微身涼惡風每一兩加

桂半錢

麥門冬飲子 治衄血不止

麥門冬

生地黃

各等分

右剉每服一兩水煎 又衄血先朱砂蛤粉 次木

香黃連 大便結下之大黃芒硝甘草生地黃塘軟  
梔子黃芩黃連可選而用之

帶下證

赤者熱入小腸白者熱入大腸其本濕熱冤結于脈不  
散故爲赤白帶下也冤屈也結也屈滯而病熱不散  
先以十棗湯下之後服苦練丸大玄胡散調下之熱  
去濕除病自愈也月事不來先服降心火之劑後  
服局方中五補丸後以衛生湯治脾養血氣可也  
苦練丸治赤白帶下

苦練

碎酒浸

茴香

炒

當歸

各等分

衛生湯

白芍藥

當歸

各二兩

黃耆

三兩

甘草

一兩

右爲龜末水煎空心服

如虛者加人參一兩

大頭風證

夫大頭風證者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而爲之也多在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分隨經取之濕熱爲腫木盛爲痛此邪見於頭多

在耳前後先出治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病是自外而之內者是血病况頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上著無形之部分既著無形無所不至若用重劑速下過其病難已雖無緩藥若急服之或食前或頓服皆失緩體則藥不能得除病當徐徐浸漬無形之邪也或藥性味形體據象皆要不離緩體是也且後急者謂緩劑已瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去則損陰

也此終治却爲客邪當急去之是治客以急也且  
治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急治之不能  
解紛而益亂也 治客以急者謂陽分受陰邪陰分  
受陽邪此客氣急除去之也

假令少陽陽明爲病少陽爲邪出於耳前後也陽明  
爲邪者首大腫也先以黃芩黃連甘草湯通炒過剉  
煎少少不住服或剉畢再用煨黍粘子新瓦上炒香  
同大黃煎成去滓內芒硝俱各等分亦時時呷之無  
令飲食在前得微利及邪氣已只服前藥如不已再

同前次第服之取大便利邪氣則止。如陽明渴者

加石膏。如少陽渴者加瓜蔞根。陽明行經升麻芍

藥葛根甘草。太陽行經羌活防風之類。

黑白散

治大頭風如神。方在後

家珍內

消毒丸

在寶鑑內附

瘡證

夏傷於暑秋必病瘡。蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而疾。疚瘡者久疚也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄于外邪氣內行至秋而發爲瘡也。何經受之

隨其動而取之有中三陽者有中三陰者經中邪氣  
其證各殊同傷寒治之也五藏皆有瘧其治各異在  
太陽經謂之風瘧治多汗之在陽明經謂之熱瘧治  
多下之在少陽經謂之風熱瘧治多和之在陰經則  
不分三經總謂之濕瘧當從太陰經論之

桂枝羌活湯 治瘧疾處暑前發頭痛項強脈浮惡寒

有汗

桂枝

羌活

防風

甘草

各半兩

右爲蜜末水煎 如吐者加半夏麴等分

活法幾要

大

麻黃羌活湯 治癰病頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃去節

羌活

防風

甘草

各半兩

右爲籠末水煎 如吐者加半夏麴等分

麻黃桂枝湯

治發癰如前證而夜發者

麻黃一兩

去節

炙甘草三錢

黃芩半兩

桂枝二錢

桃仁三十箇

去皮尖

右爲末水煎桃仁散血緩肝夜發乃陰經有邪此湯

散血中風寒也

桂枝黃芩湯

治癰服藥寒熱轉甚者知太陽陽明少

陽三陽合病也宜此和之

甘草

黃芩

人參

各四  
錢半

半夏

四  
錢

柴胡

一兩  
二錢

石膏

各半  
兩

桂枝

二錢

知母

右爲龕末水煎。從卯至午時發者宜大柴胡湯下之。從午至酉發者知其邪氣在內也。宜大承氣湯下之。從酉至子時發者或至寅時者知其邪氣在血也。宜桃仁承氣湯下之。微利後更以小柴胡湯制其邪氣可也。

熱證

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴發而爲熱者乃久不宣通而致也有服溫藥而爲熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬心火之象也治法小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣則汗發之發之不盡則逆制之制之不盡求其屬以衰之苦者以治五藏五藏屬陰而居於內辛者以治六府六府屬陽而在於外故內者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈

地黃丸

方在前發  
明內附

如煩渴發熱虛煩蒸病空心服地黃丸食後服防風當

歸飲子

不寐羸弱半身不遂一兩

柴胡

人參

黃芩

甘草

各一兩

滑石

三兩

大黃

當歸

芍藥

防風

各半兩

右爲龜末生薑同煎如痰實欬嗽加半夏  
金花丸 治大便黃米穀完出驚悸溺血淋閉欬血衄  
血自汗頭痛積熱肺痿

黃連

黃蘖

黃芩

山梔子仁

各一兩

右爲細末滴水爲丸桐子大溫水下。如大便結實  
加大黃自利不用大黃。如中外有熱者作散剉服  
名解毒湯。如腹滿嘔吐欲作利者解毒湯內加半  
夏茯苓厚朴各三錢生薑同煎。如白膿下痢後重  
者加大黃三錢。

涼膈散

方在難知內附

加減于後

若咽嗌不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荆芥穗半  
兩。若欬而嘔者加半夏半兩生薑煎。若鼻衄嘔

血者加當歸芍藥生地黃各半兩 若淋悶者加滑石四兩茯苓一兩

當歸承氣湯 治熱攻於上不利於下陽狂奔走罵詈不避親疎

大黃

當歸各一兩

甘草

半兩

芒硝

九錢

右咬咀生薑棗同煎

大黃膏 治熱入血室發狂不認人者

牛黃

二錢半

硃砂

鬱金

丹皮

各三錢

腦子

甘草

各一錢

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大新水化下  
治表惡熱寒而渴陽明證白虎湯也 若膚如火燎而  
熱以手取之不甚熱爲肺熱也目睛赤煩燥或引飲  
獨黃芩一味主之 若兩脇下肌熱脈浮弦者柴胡  
飲子主之 若脇肋熱或一身盡熱者或日晡肌熱  
者皆爲血熱也四順飲子主之 若夜發熱主行陰  
乃血熱也四順飲子桃仁承氣選而用之 若晝則  
明了夜則譫語四順飲子證 若發熱雖無脇熱亦  
爲柴胡證 晝則行陽二十五度氣藥也大抵宜柴

胡飲子 夜則行陰二十五度血藥也大抵宜四順

飲子

眼證

眼之爲病在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏宜養  
血安神暴發者爲表而易治久病者在裏而難愈除  
風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸婦人則  
熟乾地黃丸主之

治良暴赤暴腫散熱飲子

黃芩

黃連

各一兩

防風

羌活

黃芩

黃連

各一兩

舌去幾更

三

右咬咀水煎食後溫服 如大便秘滯加大黃一兩  
如痛甚者加當歸地黃各一兩 如煩燥不得眠  
睡加梔子一兩

地黃湯 治眼久病昏澁因發而久不愈者

血防風

暴癰瘍瘍羌活

黃芩

黃連

地黃

目翳明當歸

風人參

黃芩

各等分

右爲籠末水煎

四物龍膽湯 治目暴發

方在元戎四物湯條下附

點眼藥則有蟾光膏

方在後册雜方內附

洗眼藥則有夜光膏

方在寶鑑內附

噙藥

在後雜方內附

### 消渴證

消渴之疾三焦受病也有上消有消中有消腎上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜流濕以潤其燥

消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中焦也宜下之

黃消腎者初發爲膏淋謂淋下如膏油之狀至病成而面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養

血以肅清分其清濁而自愈也

黃連膏

黃連末一觔生地黃自然汁白蓮花藕汁牛乳汁

各一觔

右將汁熬成膏子剝黃連末爲丸桐子大每服三十丸少呷溫水送下日進十服渴病立止

八味丸

治消腎

方在發明內附

腫脹證

五臟六腑皆有脹經云平治權衡去菀陳判開鬼門潔

淨府平治權衡者察脈之浮沉也去菀陳剉者疎滌  
腸胃也開鬼門者發汗也潔淨府者利小便也蠱脹  
之病治以雞屎醴酒調服水脹之病當開鬼門決潔  
淨府也

治水腫蠆蛇去頭尾與葡萄心同研露七日曝乾爲末  
淡酒調下暑月用佳

又方棗一斗鍋內入水上有四指深用大戟并根苗蓋  
之遍盆合之煮熟爲度去大戟不用旋旋喫無時盡

棗決愈神效

瘡瘍證

瘡瘍者火之屬須分內外以治其本若其脈沉實當先疎其內以絕其源也其脈浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至盛遏絕經絡故發癰腫此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛之三法內之外者其脈沉實發熱煩燥外無焮赤痛深於內其邪氣深矣故先疎通臟腑以絕其源外之內者其脈浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏也內外之中者

外無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛  
也用此三法之後雖未差必無變證亦可使邪氣峻  
減而易痊愈

內疎黃連湯 治嘔嘔心逆發熱而煩脈沉而實腫硬  
木悶而皮肉不變色根繫深大病遠在內臟腑秘澁  
當急疎利之

黃連

山梔子

芍藥

當歸

檳榔

木香

薄荷

連翹

黃芩

桔梗

甘草

各一兩

舌去幾要

三

右爲末水煎先喫一二服次後加大黃一錢再服加二錢以利爲度如有熱證止服黃連湯大便秘澁則加大黃如覺無熱證及後藥復煎散時時服之如無熱證及大便不秘止服復煎散稍有熱證却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通榮衛和調則經絡自不遏絕矣

內托復煎散 治腫癰於外根槃不深形證在表其脈多浮痛在皮肉邪氣盛而必侵於內須急內托以救其裏也

地骨皮

黃耆

防風

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

大小人參

甘草

當歸

防已

各一兩

柳桂

淡味加半兩

取其根去皮黃芩

取其根不拘多少

右咬咀先煎蒼朮一觔用水五升煎至三升去蒼朮  
滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四  
服終日服之又煎蒼朮滓爲湯去滓再依前煎十二  
味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已  
再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微

利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能自侵也

當歸黃耆湯 治瘡瘍臟腑已行如痛不可忍者

當歸

黃耆

地黃

川芎

地骨皮

芍藥

各等分

右咬咀水煎 如發熱加黃芩 如煩躁不能睡卧者加梔子 如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

內消升麻湯 治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻

大黃

各二兩

黃芩

一兩半

枳實

炒

當歸

四兩  
芍藥各一兩半

炙甘草一兩

右咬咀水煎食前服

復元通氣散 治諸氣澀耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止

痛消腫

青皮

陳皮各四

兩各一

甘草三兩生

熟各半兩

川山甲炮

栝蔞根各二

加金銀花一兩

連翹各一

兩各一

右爲細末熱酒調下

五香湯 治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

丁香

木香

沉香

乳香

麝香三錢

右爲細末水煎空心服。嘔者去麝加藿香葉一兩渴者加入參一兩

赤芍藥散 治一切疔瘡癰疽初覺增寒疼痛

金銀花

赤芍藥各半兩

大黃七錢半

瓜蔞大者一枚

當歸

甘草

枳實各三錢

右爲籠末水酒各半煎

桃紅散斂瘡生肌定血辟風邪

滑石

四兩

乳香

輕粉各二錢

小荳粉一錢

寒水石三兩燒一方改小荳粉爲定粉一兩

右爲極細末乾貼

冰霜散 治火燒皮爛大痛

寒水石生

牡蠣燒

朴硝

青黛各一兩

輕粉

一錢

右爲細末新水或油調塗立止

乳香散 治杖瘡神效

乳香

沒藥

各三錢

自然銅

半兩火燒醋熬十遍

茴香

四錢

當歸

半兩

右爲細末每服半兩溫酒調下

五黃散 治杖瘡定痛

黃丹

黃連

黃芩

黃蘖

大黃

乳香

各等分

右爲細末新水調成膏用紺絹帛上攤貼

花藥石散 治一切金瘡貓狗咬傷婦人敗血惡血奔  
心血通胎死胎衣不下至死者以童便調下一錢取

下惡物神效

硫黃

明淨者  
四兩

花藥石 一觔

右二味拌勻用紙筋和膠泥固濟丸觀子一箇入藥  
內蜜泥封口了焙乾安在四方磚上磚上書八卦五  
行字用炭一秤圍燒自己午時從下生火直至經宿  
火盡又經宿觀冷取研極細磁盒內盛用

截疳散 治年深疳瘻瘡

黃連

半兩

白斂

白芨

黃丹

各一兩

輕粉

一錢

龍腦

麝香

各五分另研

蜜陀僧

一兩

右爲細末和勻乾糝或紙上以膏貼之

生肌散

寒水石

剉

滑石

各一兩

烏魚骨

龍骨

定粉

蜜佗僧

白礬灰

乾胭脂

各半兩

右爲極細末乾繆用之

平肌散 治諸瘡久不歟

白芨

黃丹

蜜佗僧

花藥石

二物同研

白龍骨

各一兩

乳香

另研

輕粉

各一錢

黃丹

黃連

各一錢半

右爲極細末和匀乾摻

碧霞挺子 治惡瘡透了不覺疼痛者

土人佳方

銅碌

一兩

碉砂

二錢

蟾酥

一錢

右爲細末燒飯和作麥樣挺子每用刺不覺痛者須  
刺血出方紙藥在內以膏貼之

用藥加減

如發背疔腫膿潰前後虛而頭痛於托裏藥內加五味  
子 恍惚不寧加人參茯神 虛而發熱者加地黃  
桔梗根 潮熱者加柴胡地骨皮 渴不止者加知  
母赤小荳 虛煩者加枸杞天門冬 自利者加厚  
樣 腫多者加當歸川芎 痛甚者加芍藥乳香  
肌肉遲生者加白斂官桂 有風邪者加獨活防風

心驚悸者加丹砂 口自瞶動者加羌活細辛  
嘔逆者加丁香藿香葉 痰多者加半夏陳皮

迴瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚則色變紫黑者

金銀花

連枝葉剉二兩

黃芪

四兩

甘草

一兩

右咬咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯內煮三兩時辰取出去滓頓服之

雄黃散 治瘡有惡肉不能去者

雄黃

一錢研

巴豆

不去皮研一箇去皮五分

右二味再同研如泥入乳香沒藥各少許再研匀細

少上惡肉自去矣

瘰癧證

夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤領或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在脣及脣之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之

治結核前後耳有之或耳下領下有之皆瘰癧也桑椹二斗極熟黑色者以布製取自然汁不犯銅鐵以文武火慢熬作薄膏子每日白沸湯點一匙食後日三服

連翹湯 治馬刀

連翹

瞿麥花各一斤

大黃三兩

甘草二兩

右咬咀水煎服後十餘日可於臨泣穴灸二七壯服  
五六十日方效在他經者又一方服大黃木通五兩  
知母一作貝母五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用同  
前藥爲細末熟水調下三五錢服之

瞿麥飲子

連翹

一斤

瞿麥穗

半斤

右爲麩末水煎臨卧服此藥經效多不能速驗宜待

歲月之久除也

欬嗽證

欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰  
脾濕動而爲痰也欬嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺  
氣而欬動於脾濕因欬而爲嗽也治欬嗽者治痰爲  
先治痰者下氣爲上是以南星半夏勝其痰而能食  
者大承氣湯微下之痰而不能食者厚朴湯治之夏  
月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡湯四兩加石膏  
一兩知母半兩用之冬月嗽而寒熱者謂之寒嗽小

青龍加杏仁服之蜜煎生薑湯蜜煎橘皮湯燒生薑  
胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加  
減之

利膈丸

方在寶鑑內附

欬氣丸 治久嗽痰喘肺氣浮腫

郁李仁

青皮

去白

陳皮

去白

檳榔

木香

杏仁

去皮尖

馬兜荳

炒

人參

廣茂

當歸

澤瀉

茯苓

苦夢蔥

炒各二錢

防已

半兩

牽牛

取頭末一兩半

右爲細末生薑汁麵糊爲丸桐子大生薑湯下  
治欬嗽諸方在家珍內并寶鑑內者更宜選而用之

### 虛損證

虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛  
故損則自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可  
治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損則自下而上治  
之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一  
損損於肺故皮聚而毛落二損損於心故血脈虛弱  
不能榮於臟腑婦人則月水不通三損損於胃故飲

食不爲肌膚也自下而損者一損損於腎故骨痿不能起於牀二損損於肝故筋緩不能自收持三損損於脾故飲食不能消尅也故心肺損則色弊肝腎損則形痿脾胃損則穀不化也

治肺損皮聚而毛落宜益氣四君子湯

方在前難知內附

治心肺虛損皮聚而毛落血脈虛損婦人月水愆期宜

益氣和血八物湯

方在前元  
戎內附

治心肺損及胃損飲食不爲肌膚宜益氣和血調飲食

十全散

方在前元  
戎內附

治腎肝損骨痿不能起於牀宜益精筋緩不能自收持

宜緩中

牛膝丸

牛膝 酒浸

草鮮

杜仲

剉炒

蕤蓉

酒浸

兔絲子

防風

葫蘆巴

炒

肉桂

減半

破故紙

沙苑白蒺藜

右等分爲細末酒煮猪腰子爲丸每服五七十丸空心溫酒下如腰痛不起者服之甚效

治陽盛陰虛肝腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃

而無常色宜榮血養腎

地黃丸

蒼朮

一斤  
泔浸

熟地黃

一斤

乾薑

春七錢  
秋七錢

夏半兩  
冬一兩

右爲細末蒸棗肉爲丸桐子大每服五七十丸至百丸諸飲下若加五味子爲腎氣丸述類象形神品藥也如陽盛陰虛心肺不足及男子婦人面無血色

食少嗜卧肢體困倦宜八味丸

方在元戎內附

如形體瘦

弱無力多困未知陰陽先損夏月宜地黃丸春秋宜

腎氣丸冬月宜八味丸

治病久虛弱厭厭不能食和中丸

前在前脾胃論中

### 吐證

吐證有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便結燥氣上衝而脣發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假爲積而痛其脈浮而弦其證或先痛

而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積濱  
榔木香和其氣下焦吐者從於寒地道也其脈沉而  
遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不  
通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復  
以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和中

桔梗湯

桔梗

白朮

各一兩半

半夏

二兩

陳皮

去白

白茯苓

枳實

炒

厚樸

薑製炒香

各一兩

右咬咀水煎取清調木香散二錢隔夜空腹服之後  
氣漸下吐漸止然後去木香散加芍藥二兩黃耆一  
兩半每一料中扣算加之如大便燥結食不盡下  
以大承氣湯去硝微下之少利再服前藥補之如  
大便復結依前再微下之

木香散

木香

檳榔各等分

右爲細末前藥調服

厚樸丸主翻胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其

藥味卽與萬病紫苑丸同

方在元戎  
方內附

其加減于後

春夏再加黃連

二兩

秋冬再加厚樸

二兩

如治風

於春秋所加黃連厚樸外更加菖蒲茯苓各一兩半

如治風癇不愈者依春秋加減外更加人參菖蒲  
茯苓各一兩半 如失精者加菖蒲白茯苓爲輔

如肝之積加柴胡蜀椒爲輔 如心之積加黃連人

參爲輔 如脾之積加吳茱萸乾薑爲輔 如腎之

積加菖蒲茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓

心痛證

諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱  
足寒痛甚則煩燥而吐額自汗出知其熱也其脈浮  
大而洪當灸太谿及崑崙謂表裏俱瀉之是謂熱病  
汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也灸畢服金  
鈴子散則愈痛止服枳朮丸去其餘邪也有大實心  
中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘久而注悶心  
胷高起按之愈痛不能飲食急以煮黃朮利之利後  
以藁本湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身  
冷汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以

尤附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救  
之是知久病無寒暴病非熱也

金鈴子散 治熱厥心痛或發或止久不愈者

金鈴子 玄胡索各一兩

右爲細末每服二三錢酒調下溫湯亦得

治大實心痛二藥

厚樸丸同紫苑丸

在元戎方內

煮黃丸

方在陰證畧例內

治大實心痛大便已利宜藁本湯止其痛也

藁本

半兩

蒼朮

一兩

右爲龜末水煎服清

治寒厥暴痛脈微氣弱宜尤附湯溫之

方在雲岐脈論內附

疝氣

男子七疝婦人瘕聚帶下皆任脈所主陰經也腎肝受

病治法同歸於一

酒煮當歸丸

當歸

剉

附子

炮

苦練子

剉

茴香

各二兩

右剉以酒三升同煮酒盡爲度焙乾作細末入

丁香

木香

各二錢

全蝎

二十

玄胡索

各二兩

右同爲細末與前藥一處拌勻酒糊爲丸每服三五十丸至百丸空心溫酒下凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥茴香苦練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導爲用也

治奔豚及小腹痛不可忍者苦練丸

苦練 茴香 黑附子

右用酒二升煮酒盡爲度曝乾或陰乾搗爲極細末每一兩藥末入

全蝎十八 玄胡索半兩 丁香十五

右共爲細末酒糊爲丸桐子大每服百丸空心酒下  
如痛甚煎當歸入酒下大效

活法機要

三