

肺大腸部



杭州圖書館藏

久嗽

孕嗽

咳喉中作聲

暴嗽

大法

咳無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽無聲而有痰脾濕動而為痰也若咳嗽有痰而有聲者因傷肺氣動於脾濕故咳而兼嗽也脾濕者秋傷於濕積於脾也故內經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾濕而為痰也是知脾無雷濕雖傷肺氣亦不為痰若有痰而寒少熱多故咳嗽非專主乎肺病以肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之也內經曰五臟六腑皆能使人咳非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時傳而與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳惟濕病痰飲入胃留之而不行上入於肺則為

醫學綱目卷之二十六

嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同各宜隨症而治之若咳而無痰者以辛甘溫其肺故咳嗽者治痰為先治痰者下氣為上是半夏南星勝其痰而咳嗽自安枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微利之痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩入石膏一兩知母五錢用之冬時嗽而發寒者謂之寒嗽小青龍湯加杏仁用之然此為大例更宜隨症隨時加減量其虛實此治法之大體也

咳分時

上半日嗽多屬胃中有火用具母石膏降胃火午後嗽

多屬陰虛必用四物湯加知母炒黃柏先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子斂而降之春嗽是春升之氣夏是火炎上最重

秋是濕熱傷肺

冬是風寒外束

用藥先後

治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也 咳逆非蛤粉青黛瓜蒌貝母不除 大槩有痰者加痰藥 用藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來 治嗽痰多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也

吐痰多

凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針灸得除者宜深體悟之

表裏

仲咳而脉浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴兩五

麻黃兩四

石膏如鷄子大

杏仁半升

半夏半升

乾姜兩二

細辛兩二

小麥升一

五味子半升

右以水一斗三升先煮小麥熟去查納諸藥煮取三升

温服一升日三服

一醫學綱目卷下

二

脉沉者澤漆湯主之

半夏半升

紫參五錢一作紫苑 澤漆三斤以東流水五升半煮取一斗五升

生姜

白前各五兩各三

甘草

黃芩

人參

桂枝各三兩

右咬咀內澤漆汁中煮取五升温服五合至夜盡

丹感冒風寒咳嗽者行痰開腠理二陳湯加麻黃杏仁桔梗

梗

局三拗湯治咳嗽感胃風寒鼻塞聲重

甘草不炙

麻黃不去

杏仁不去皮尖

右咬咀每服五錢水一盞半姜五片煎服

煎 巡檢舍人夜嗽多脉大而浮三拗湯加知母黃芩生薑

一男子五十餘歲患咳嗽惡風寒口燥乾心微痛兩

手脉浮鬚脅痞滿而數左手大於右手大槩表盛裏虛

問其人平日好嗜酒肉素有食積後因汗房勞又往來涉寒水且冒微雨又忍飢歸後繼以飽食酒肉而病先用人參每貼四錢麻黃根節一錢半與二三服咳嗽止惡風寒除後改用厚朴枳實陳皮青皮瓜蒌仁半夏為丸與二十餘貼用人參湯送下痞滿亦散而愈

廿三蟾感冷嗽上有痰

麻黃錢一

蒼木錢二

瓜蒌

陳皮

半夏錢三

枳殼錢三

黃芩錢一

桔梗錢二

木通錢一

甘草錢

右分二貼加姜三片煎服

一婦人患嗽頭痛身膈痛

陳皮錢二

人參

川芎

麻黃

枳殼錢一

分二貼水煎服

醫學綱目卷三十

三

婦人患身疼嗽而食少

白木

黃芩

芍藥各三錢

川芎錢二

木通

紫蘇各半錢

甘草五分

右四貼熱服

脾肺

夫咳之為病有一咳即出痰者脾勝濕而痰滑也有連欬十數不能出痰者肺燥勝痰濕也滑者宜南星半夏阜角灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也

燥脾濕方

治風痰嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺閉澁必多燥怒宜以水煮金花丸主之

南星

半夏各一兩 天麻五錢

雄黃一錢

白麩三兩

寒水石煨兩

右為末水丸如桐子大每服五十七丸至百丸煎漿水

沸下藥竟今浮為度淡漿水浸之以姜湯下

羅化痰玉壺丸治風痰吐逆頭痛目眩嗽嘔吐

天南星 半夏生各一兩 天麻 半兩 白麩 三兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三十九水煮令藥浮麩出放溫姜湯下

天麻丸治風痰

天麻 半夏 天南星 各一兩 雄黃 少許

白麩 三兩

右以水丸每服五七十九至百丸先煎水沸下丸煮十餘沸後用姜湯下食前

小黃丸治熱痰咳嗽脉洪面赤煩燥心痛唇口乾燥多喜笑

天南星 洗 半夏 各一兩 黃芩 半兩

醫學綱目卷三

四

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九至七十九

白朮丸治濕痰咳嗽脉緩面赤肢體沉重嗜臥不收腹脹而食不消

天南星 半夏各一兩 白朮 半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九姜湯下食後局方防已丸亦可用

玉粉丸治氣痰咳嗽脉急面白氣上喘促淋瀝洒寒熱悲愁不樂

天南星 半夏各一兩 陳皮 去白二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九人參生薑湯下食後服

姜桂丸治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆

心多恐怖

天南星

半夏各一兩

官桂

去皮

右為細末蒸餅為丸如桐子大每服五七十丸生薑湯

下食後

治嗽加減法

如心下痞悶加枳實五錢

如身熱甚加

黃連五錢

如體重加茯苓白朮各一兩

如氣逆上者

加苦葶藶五錢

如氣促者加人參桔梗各五錢

如氣

浮腫者加郁李仁杏仁各五錢

如大便秘者加大黃五

錢

羅太白丹治三焦氣澁破除餘痰止咳開胃

半夏洗

天南星炮

寒水石炮

白礬枯

白附子炮

乾姜炮各等分

右為細末麩糊丸如桐子大每服三十九丸溫生薑湯下

人醫學綱目卷三

五

食後

法製半夏用大半夏不拘多少湯洗七次去臍焙乾再

洗七遍用米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬

一兩半研溫水化浸上雷水兩指許頻攪冬月宜煖處頓

放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸二日

夜通七日盡取出再用漿水於慢火內煮勿令濇候漿水

極熟取出焙乾每服一二粒食後細嚼生薑湯下

石九方治濕痰滑而易出潔古所謂南星半夏勝其痰

而咳嗽自安者是也

利肺氣方

人參款花散治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰

涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年近

日一切嗽病諸藥不效並皆治之

款冬花

人參

五味子

紫菀

桑白皮各一兩 杏仁八錢 木香 煨榔

紫蘇葉 半夏湯泡各五錢

右為細末煉蜜為丸如鷄頭仁大每服一丸食後細嚼

淡姜湯送下

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇 半夏 紫菀茸 陳皮

五味子各五錢 桑白皮一兩 杏仁去皮尖黃

右為麤末每服三錢生薑三片水煎日三服

紫蘇飲子治脾肺虛實寒涎痰咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮 五味子

麻黃 杏仁 陳皮 人參

半夏 甘草各五錢

右咳咀每服五錢水二盞姜三片煎至七分溫服

大醫學綱目卷五十一 六

本治肺感風寒作嗽紫蘇散

紫蘇 桑白皮 五味子 杏仁

麻黃 甘草 青皮各等分

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

治嗽杏參飲

杏仁 款冬花 前胡 半夏制

五味子 麻黃 柴胡 桑白皮

人參 桔梗各等分

右為細末每服三錢水一盞半生薑五片同煎七分通

口服

右利肺氣藥紫蘇麻黃表多者宜之

欬而肥 胃滯 利脇丸主胃中不利痰涎咳嗽喘促利脾胃壅滯調秘

黃 泄藏推陳致新化食治利膈氣之妙品也

木香

檳榔

藿香錢各一

甘草錢各五

人參

當歸

厚朴錢各三

大黃錢

枳實錢各一

右為細末水丸桐子大每服三五丸

衍有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款花紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終一劑而愈

右利肺氣藥加大黃脾胃壅滯者宜之

潤燥之劑

世杏仁煎治哮喘寒熱喜少噴多面色不潤食少脉強緊杏仁一兩去皮尖用童便浸一日一換夏月一日三換浸半月取出洗淨焙乾研令極細每服一匙大用薄荷一葉白蜜少許水一盞煎食後服甚不過兩劑永瘥

入醫學綱目卷三十一

七

干用童便浸杏仁七日漉出洗淨研成泥別入瓮瓶中換小便煎成膏熱水下二錢瘥

圖用童便一升浸杏仁三升春夏七日期冬二七日并皮尖研細濾取汁煮令魚目沸候軟如麪糊即成用柝篋攪勿令着底即以罍布攤乾為丸每服三五丸茶酒任下

肺鬱痰嗽睡不安者 貝母 杏仁

右為細末砂糖入姜汁蒸餅丸含化

右童便浸杏仁利肺氣潤劑也津液枯少者宜之

潤下丸治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯痰嗽

陳皮法白 甘草 食鹽各五

右以水拌令鹽水乾焙燥為末蒸餅為桐子大或為末

白湯點服立效

衍有人患氣嗽將期或教以橘皮生姜焙乾神麪等分末

為丸如桐子大食後夜以米飲服三五十丸兼舊患膀胱氣綠服此皆愈

氣克形實脈澁者宜利

玉粉丸治氣痰脈澁方見

桔梗湯除痰下氣胃脇脹滿痰逆惡心飲食不進

陳皮去白

半夏姜制

桔梗炒各兩

枳實去穢黃三

兩

右末每服二錢水一盞生姜五片同煎七分去查服

右用陳皮枳實氣克形實者宜之寒者加姜桂些少後

二方有星半痰澁甚者忌服夫形肥或有汗或脈緩體

重嗜臥之人咳者脾濕勝也形瘦或夏月無汗或脈澁

之人咳者肺燥勝也濕者宜白木蒼木茯苓之屬燥之

是也燥者宜杏仁瓜蒌之屬潤之是也

形肥脈緩痰澁者宜燥

白木湯治咳嗽體重嗜臥脈緩前濕條白木丸亦治此病

形肥脈緩痰澁者宜燥

白木

茯苓

半夏各等分

八 醫學綱目卷之三

右為籠末作五分或半兩甚者加水二盞姜七片煎至一半取清水調神麴末二錢服之病甚者玉壺丸大妙永除根

白木散治夏暑大熱或醉飲冷酒痰濕不止膈不利

白木

茯苓

黃芩

半夏各等分

右為籬末每服五錢水二盞姜三片同煎去查調陳皮

神麴末各一錢食後服

保酒性大熱不宜大飲蓋酒味熱而引飲冷與熱凝於胃

中不散而成濕故痰作矣甚者吐之後與五苓甘露勝濕

去痰之劑

右三方白木燥濕半星勝痰形肥痰滑者宜之

形肥痰澁者宜

防風丸治痰嗽胃中氣不清利者枳實丸亦治此症

防風

枳殼炒各半兩

白朮一兩

右為末煨飯丸每服六七十丸姜湯下

丹仁十二孺人虛而有濕痰膈上有熱

白朮

滑石各一兩

陳皮

木通五錢

黃芩三錢

甘草三錢

分六貼水煎服

七九嬌嗽有痰

蒼朮一兩

半夏一錢半

陳皮半錢

甘草二分

茯苓五分

桔梗二分

姜三片煎服

治濕痰

蒼朮三錢

白朮六錢

香附一錢

芍藥

酒二錢

右蒸餅丸

治肥人濕痰

苦參

半夏各一錢半

白朮二錢半

陳皮一錢

右作一服姜三片竹瀝與水共一盞煎食遠吞三補丸

八聖學綱目卷三十一

九

十五丸

羅卓角化痰丸治癆風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕

唾稠粘咽塞吐逆不思飲食或時昏瞶

枳殼炒二兩

天南星炮

白附子炮

半夏湯洗七次

白礬枯

人參去芦

赤茯苓去皮各一兩

阜角木白皮酥炙一兩

右為細末生姜汁麩糊為丸如桐子大每服三十丸温

水下食後

羅白龍丸治酒積有痰

半夏

滑石

茯苓

白礬枯各等分

右為末神麩糊為丸

右七方白朮蒼朮白附子半夏燥濕枳殼陳皮利氣形

肥痰澁者宜之

寒熱痰

宋徽宗妃苦痰面浮如盤李醫用蚌粉新瓦上炒令通紅放地上出火毒每半兩加青黛少許同淡豨水滴水入麻油數點調服而愈

寒痰

本草治喘嗽汗多者忌用

草烏五錢

麻黃二錢

形瘦肺者宜潤

杏仁煎潤肺丸已上三方見燥痰條

潤肺散

貝母一兩

瓜萎仁兩

青黛五錢

右為末姜蜜調成膏噲

抑痰丸

瓜萎仁兩

半夏二錢

貝母三錢

右為末炊餅丸如麻子大

咳逆上氣痰飲心痛

海蛤燒為粉研極細過數日火毒散用之

瓜萎仁帶穰同研

醫學綱目卷三十

十

右為丸如麻子大白湯下

楊文治痰嗽利胸膈方瓜萎肥大者割開去子洗淨槌破刮皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍槌破焙乾為末用洗瓜蒌實熱水并穰同煮成膏為丸如桐子大生姜湯下二十九

飽食傷脾嗽

溫脾湯治食飽則咳

甘草四兩

大棗二十枚

右二味咬咀水五升煮水貳升溫分三服若咽中痛而

聲鳴者加乾姜一兩

吃醋捨喉嗽

甘膽丸治吃醋捨喉因成咳嗽不止諸藥無效用甘草

二兩去赤皮作二寸段中半擘開用猪膽汁五枚浸三月取出火上炙乾為細末煉蜜丸每服四十九茶清吞下臥

服神效曾有人患此諸藥不效用此方一服愈

飲酒傷肺嗽

丹飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入菲汁就吞瓜蒌仁杏仁黃連丸

治酒嗽

青黛

瓜蒌仁

用蜜姜丸含化散肺毒也

食積嗽

食停積嗽非青黛瓜蒌實不除有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路一黃一白者是也

清金丸治食積嗽

方見虛實條

瓜蒌丸治食痰壅滯喘咳

瓜蒌實

半夏

山查

神麴

各等分

為末瓜蒌穰水為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁

蘿蔔子

各二兩為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者

醫學綱目卷三十一

十一

半夏

南星

瓜蒌實

蘿蔔子

為佐

青黛

石碱

隨症加減丸服之

肺痿

肺痿專在養肺養氣養血清金

仰生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生薑

兩五

人參

兩二

甘草

兩四

大棗

十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味

以水三升煮半升分三溫服

桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

桂枝

生薑

各三兩

甘草

兩一

大棗

十枚

皂莢

十枚去皮炙焦

右五味以水七升微微火煮取三升分三溫服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然

者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎吐甘草
乾姜湯以溫之若服湯口渴者屬消渴

甘草灸四兩 乾姜二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去渣分溫再服

右治肺痿症或咳沫或咳血今編咳沫者入此門咳血
者入咳吐血門

診

熱在上焦者因咳為肺痿肺痿之病從何得之師曰或從
汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥
下利重亡津液故得之

脈咳而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也

肺脹

咳而上氣煩燥者為肺脹仲景云咳而上氣此為肺脹脈
浮大者越婢加半夏湯主之又云肺脹咳而上氣煩躁而
喘脈浮者心下有水小青龍湯加石膏主之二方並見喘門

醫學綱目卷三十

主

丹肺脹而咳者用訶子青黛杏仁 訶子能治肺氣因火
傷極遂成鬱逼脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂除
火之功佐以海石香附瓜蒌仁青黛半夏麴姜蜜調噙之
香附用童便浸三日 脈鬱痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁為末

沙糖入姜汁蒸餅為丸噙化清化丸方見火熱條 肺脹而嗽或左

或右不得眠此痰夾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣
降火疎肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝之類

如血礙氣作嗽者桃仁大黃姜汁丸服

針灸

一法灸但可一邊眠者可左側者灸右足三陰交可右側
者灸左足三陰交立安

經治氣嗽嗽久者亦主之生訶子一枚含之嚥津蹉蹉後

不知食味煎栝榔湯服之便有味

補肺藥

丹定喘切方

訶子

百藥箭

荆芥各等分

為末姜蜜丸含化

治嗽切方

五味子兩

甘草二錢半

五倍子一錢

風化硝

為末蜜丸乾含化

世治痰嗽并喘白礬飛五倍子等分為末每二錢猪肝蘸藥臨臥服

本化痰涎方

明礬二兩

白殭蚕半兩炒去絲

右為細末生研薄荷令爛和丸如菖荳大每服二十九薄荷湯下日三服

治遠年近日喘嗽用皂角不蛀者三大莖剉去黑皮切開去子每子倉內入巴荳肉一粒合就麻皮縛定用生姜自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃為度劈開去巴荳以好明礬一兩枯過草麻七箇姜汁和蜜塗炙前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏與前藥和勻每服一錢用柿餅灸過候冷蘸藥細嚼臨臥服忌魚鮓鮓蕪油麵酒米醋煎燂熱毒等物

醫學綱目卷三十

三

右訶子五味五倍白礬例丹溪云黃昏嗽者火浮於肺酸味斂而降之是也

肺欲收
急食酸
以收之

羅九仙散治一切咳嗽

桑白皮

人參

桔梗

阿膠

五味子

烏梅

款冬花各一兩

貝母半兩

粟殼八兩去蒂蜜炒黃

右為細末每服三錢白湯點服嗽住止後服

款花清肺散治咳嗽喘促胸膈不利不得安臥

人參去土

甘草炒

白礬枯

烏梅和核碎

款冬花各一兩

甜葶藶生用一錢

栗殼四兩

右為細末每服二錢溫米飲湯調服食後忌油膩物多

言語損氣

人參清肺湯治男子婦人肺胃虛寒咳嗽氣急胸膈咽塞
腹脇脹滿迫塞短氣喜飲飲冷咽噎隱痛及癆肺痿勞嗽
吐血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

烏梅

地骨皮

人參

甘草炙

阿膠炮

杏仁去皮炒

桑白皮

知母

粟殼去頂蒂炒各一兩

右哎咀每服三錢水一盞半入烏梅一箇同煎至一盞
去查溫服食後臨臥

人參款花散治咳嗽久不愈者

人參

款冬花各五錢

知母

貝母

半夏各三錢 栗殼一兩炒黃色

右為簾末每服五錢烏梅同煎臨臥服

醫學綱目卷三十六

十四

安肺散治痰嗽不問新舊

麻黃二兩去節炒 甘草二兩炒

御米殼四兩去蒂炒黃色

右為末每三錢水一盞入烏梅一箇煎七分去查溫服

臨臥下

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃去節炒黃色 當歸

木香各一兩

御米殼三兩炒

人參二兩 杏仁二兩麩炒

右哎咀每服四錢水煎

右御米殼烏梅例收後藥也

以辛溫

世治嗽貝母去心畧炒知母去毛各一兩巴豆霜十四粒

為末和勻老生姜切如錢厚兩面蘸藥末臥嚼嚼時開口

勿咽

壬治咳嗽胸膈滿多喘上氣

生姜升半 砂糖五兩

右二味煎姜汁減半納糖更煎服

咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰全文見治虛實法

肺先受邪傳與五藏六府

海肺咳喘息而有音甚則吐血麻黃湯 太陽咳而遺矢

赤石脂禹餘糧湯桃仁湯不止用猪苓分水散 心咳心

痛喉中介介鯁狀甚則咽喉痺用桔梗湯 小腸咳咳而

失氣氣與咳俱失芍藥甘草湯與夏脈不及病同蓋肝小腸為心之府故也

咳兩脇下痛甚不可以轉轉則兩脇下滿小柴胡湯仲景云咳引脇痛為懸飲宜十棗湯丹溪云咳引脇痛宜疎肝氣用青皮枳殼香附子等實者白芥子之屬 膽咳

咳嘔膽汁黃芩加半夏生薑湯 脾咳右脇下痛陰陰痛

引肩背甚則不可以動動則咳劇升麻湯 胃咳嘔嘔甚

則長虫出烏梅丸 腎咳腰背相引而痛甚則咳涎麻黃

附子細辛湯 膀胱咳遺溺茯苓甘草湯 三焦咳腹滿

入醫學綱目卷五

五

不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣

逆錢氏異攻散

素咳嗽煩寃者是腎氣之逆也示從容篇 一陽發病少氣善

咳善泄 夏脈不及則令人上見咳唾下為氣泄全文見治虛實法

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足下有涼時其脈洪者熱

痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而不

已者宜吐下其痰熱也面白悲噎或脇急脹痛或脈沉弦

細遲而咳者寒飲在胸腹也宜辛熱去之

世小陷胸湯治咳嗽膈有熱痰胸脇腹常熱者神效方見傷寒

丹黃連化痰丸

黃連

吳茱萸一錢半 陳皮五錢 半夏一兩

右為末麵糊丸如葦葦大每服百丸生薑湯下

寒熱面赤脈洪大者熱痰

右黃連半夏治痰嗽例

青礞石丸去痰或痞痛經絡中有痰皆能治之

青礞石硝煨五錢半夏二兩風化硝二錢陳皮七錢半

白朮一兩茯苓七錢半黃芩半兩

右炒神麴姜糊丸

又方礞石丸治痰

礞石半兩煨半夏七錢半南星茯苓各五錢

風化硝二錢

右為末神麴糊丸

痰嗽化痰方

黃芩一兩半滑石半兩貝母南星各一兩

風化硝半錢白芥子五錢去殼

右為末湯浸蒸餅丸丹溪云腸下痰非白芥子不能除

醫學綱目卷五

去

右風化硝佐礞石茯苓半夏治痰嗽例丹溪云礞石丸

重在風化硝

瀉小黃丸治咳嗽面赤煩燥脉洪方見前濕痰條

羅人參半夏丸化痰墜涎止嗽定喘或風痰茶痰食痰一

切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏正頭風疼或壅頭目昏眩

耳聾鼻塞咽乾胸膈不利

人參茯苓天南星各半兩半夏

乾姜白礬寒水石各一兩蛤粉二兩

薄荷五錢藿香二錢半

右為細末水糊丸如桐子大每服三十丸生薑湯下食

後日三服

金珠化痰丸治痰熱安神定志除頭痛眩暈心忪恍惚

胸膈煩悶涕唾稠粘痰實咳嗽咽膈不利

生龍腦研細 皂莢仁炒黃 天竺黃一兩 金箔廿片

白礬二兩 半夏姜汁制

右阜角仁半為末與諸藥同拌勻生姜自然汁為丸如

桐子大每服三十九生姜湯下食後臨臥

人參清金丸治熱止嗽消痰定喘

柴胡 人參各一兩 黃芩 甘草炙

半夏錢各七 麥門冬 青黛 陳皮錢各二

五味子二粒

右為細末水麩糊為丸如桐子大每服三十九溫白湯

下食後

面白脈
弦微者
雲痰

垣脾肺受寒痰嗽用藥法 難經云肺太過則外症面白

善嚏悲愁不樂欲哭其內症喘咳上鳴逆氣煩心胸滿煩

熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾

八醫學綱目卷三

七

肺皆受寒邪涎出口甘水反侮土寡於畏也腹中大寒病

名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於

肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口甘涎沫者胃中寒而

不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化

半夏溫肺湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜常多

唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致

其脈沉弦細遲

旋覆花 人參 細辛 桂心

甘草 陳皮 桔梗 芍藥

半夏制略 赤茯苓

右吹咀每服四錢姜三片煎食後服

丁香半夏丸治心下停飲為痰頭目眩暈睡臥口中多涎

檳榔三錢 丁香 半夏各一兩 細辛

乾姜

人參各五錢

右為細末生薑汁糊為丸如桐子大每服二十九姜湯下日三服食後

羅溫胃化痰丸治膈間有寒脾胃停飲胸膈不快痰涎不

半夏泡三兩

陳皮去白

乾姜炮

白朮焙各二兩

右為細末生薑麩糊為丸如桐子大每服二十九生薑湯下不拘時

潔姜桂丸治咳嗽面黧黑足寒脈沉方見前濕痰條

局胡椒理中丸治脾胃虛寒咳嗽氣急逆氣虛痞不能食

嘔吐痰水

欬冬花去枝梗 葶撥

陳皮

乾姜炮

良姜炒

甘草炙

細辛去苗

胡椒各四兩

醫學綱目卷三

八

白朮兩五

右末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫湯下

仲吳茱萸湯方見傷寒

潔夏月嗽發寒熱者謂之熱嗽用小柴胡湯三兩加石膏

七錢知母三錢治之柴胡湯方見傷寒 冬月嗽而發寒熱者謂

之寒嗽用小青龍湯加杏仁治之方見傷寒

丹火嗽宜清金化痰丸 清化丸與清金丸同用專治熱

嗽及咽痛蓋苦能燥濕熱輕能治上取燈籠草葉為細末

蒸餅為丸每服三五十九燈籠草即苦軌草其結房如燈籠狀故以名之 清金

丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰鹽清化丸同用黃芩

一味炒為末水丸服 痰因火動逆上作嗽者先治火次

治痰用知母止嗽清肺金滋陰降火 火鬱嗽用訶子海

火熱嗽

石瓜萎仁青黛半夏香附以開之 喘嗽不拘老幼久近

上壅等疾槐花爲末滴水丸如桐子大熟水或姜湯下不拘時

羅柴胡飲治虛勞羸瘦面黃無力減食盜汗咳嗽不止

柴胡兩一 五味子錢五 地骨皮兩一 鱉甲兩一 酥炙

知母兩一

右爲細末每服二錢入烏梅二枚青蒿五葉水煎去渣服

本又方治勞嗽虛症及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛症丈夫婦人皆可服少年亦不妨

五味子兩二 鱉甲兩三 地骨皮兩三

右爲末煉蜜丸如桐子大空心食前溫酒或鹽湯任意服三五丸婦人醋湯下此方乃曲江人家秘方余服之大有功效處方有理甚妙

不醫學綱目卷三十一 五

傷冷嗽

海易簡杏子湯治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療

人參 半夏 茯苓 細辛減半

乾姜減半 甘草 桂枝減半 芍藥

五味子各等分

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉二皮姜三片煎至六分去渣溫服 若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用粟殼去筋膜剉碎以醋滌炒等分加之每貼加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此 若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃

芍藥乾姜五味子各增一半一名小青龍湯

風痰

潔古水煮金花丸治咳嗽多怒 天麻丸 羅氏化痰玉

壺丸已上三方並見濕痰條

丹搜風化痰丸

人參

僵蚕

槐角

白礬

天麻

陳皮白去

荊芥各一兩

半夏四兩
汁浸

辰砂兩半

右為末姜汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每四十九姜湯

下

羅延壽丹治風壅痰嗽或寒痰咽膈不利

天麻兩半

枸杞一兩

明礬一兩半
生半枯乾姜一兩半

右為細末酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去麩

搓為丸如桐子大每服三十九溫水下食後臨臥

局防風丸治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暈痰涎壅

滯昏憤

天麻酒浸一宿

甘草炙

川芎洗

防風各一兩

八醫學綱目卷三十六

三

朱砂五錢為末

右為末每兩作十九朱砂為衣每服一九荊芥湯化服

茶亦得不拘時

川芎丸消風壅化痰涎利咽膈清目頭痛旋暈

川芎

薄荷去土各七錢半
桔梗兩半

防風去芎一兩半

甘草三兩半

右為末煉蜜為丸每兩半作五十九每服一九細嚼臘

茶清下食後臨臥

河間防風通聖散加半夏治風痰咳嗽方見

喘方見 潔古治痰嗽不能飲食者厚朴湯治之方見

山喘嗽白殭蚕為末姜汁清茶調服臨臥下方見

虛實方見 潔治痰嗽能飲食者大承氣湯微下之方見

四物者陰 丹陰虛咳嗽四物湯加竹瀝姜汁主之陰 陰分嗽者多屬

陰虛治之用知毋止嗽勿用生姜以其辛散故也 肺虛嗽甚此好色腎虛者有之人參膏以陳皮生薑佐之

羅團參散治脉氣不利治咳喘止嗽

紫團參 款冬花 紫苑茸各等

右為細末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎七分去渣 温服食後

陽虛者參畏

人參款花膏治脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背傷痛或虛勞冷嗽及遠年近日一切咳嗽諸藥不效者

款冬花去枝 人參去青 五味子去枝 紫苑去青

桑白皮去粗枝各一兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭大每服一丸食後細嚼淡姜湯送下或一丸分作四服含化亦得

八醫學綱目卷三

主

食治咳嗽不瘥者黃明膠炙令半焦為末每服一錢七人參末二錢七用豆豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入蜜遇咳嗽時呷三五口 本治十六般哮喘

黃明膠炙一兩 馬兜零 甘草炙 半夏姜汁浸三日

人參半兩 杏仁去皮尖已

右為細末每服一大錢水一盞煎至七分臨臥食後服 隨病有湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎早飯後服 肝嗽眼泪出加烏梅一枚大米十四粒煎 脾嗽不思飲食或一兩時惡心入生薑二片煎 胃嗽吐逆酸水入蛤粉煎 膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下 肺嗽上喘氣急入桑白皮煎 膈咳嗽出痰如真塊生薑汁調藥嚥

下勞嗽入秦艽末同煎 冷嗽天曉嗽甚葱白三寸同煎 血嗽連頓不住當歸末棗子同煎 暴嗽涕唾稠粘入烏梅生薑同煎 在嗽皆脚疼痛甘草三寸黃蠟少許同煎 氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎 熱嗽夜甚蜜一七葱白同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三枚同煎 腎嗽入黃芪白飴糖同煎 上件十六件般嗽痰依法煎服無不效驗此方乃京都一家專治此疾因中官厚賂方始得傳屢試有效 右人參治嗽例

丹有一子三十餘久瘡虛甚盜汗得嗽嗽來便熱夜甚

甘草些 白木半錢 防風錢一 黃連分五

人參分八 乾姜分三 黃芪分五 白水煎服

里成人多嗽忘惰脉不數兩手脉大而長此勞症無熱

醫學綱目卷五

三

白木半錢 陳皮 蒼木 茯苓各五

神麴七分 川芎分三 黃芩炒三分 五味子粒七

芍藥分五 黃芪 甘草各三分

用生薑二片同煎

陳孺人九十餘歲嗽或發或止發時有清痰寒熱作食少

面虛浮淡黃色

陳皮 青皮 白木 芍藥各五錢

麻黃錢二 木通 乾姜 黃芩各二錢半

甘草炒 防風各一錢

分七貼五味子七粒煎三之一

雲補肺湯治勞嗽

桑白皮 熟地各三兩 人參 紫菀

黃芪 五味子各一兩

右為末每服三錢水煎入蜜少許食後

圓欵花補肺湯治年高氣弱肌體瘦困短氣遇秋冬咳嗽大作夜間尤甚三五百聲不絕春夏稍緩

黃芪兩半 甘草錢 當歸七分 佛耳草錢

欵冬花二分 陳皮七分 丹皮三分 黃栢酒浸三分

蒼朮錢 麩末七分

右咬咀每三錢水煎去查稍熱食後服

清肺湯除濕熱治金火嗽

黃芪錢四 蒼朮 防風 歸身

茯苓各一 五味子三十粒 陳皮二錢 青皮五分

澤瀉二錢 黃栢六分

右剉如麻豆每服五錢水煎去查稍熱臨臥服

瀉火補肺湯治金火嗽五六月間嗽

八醫學綱目卷五 三

五味子錢五 黃芪錢二 人參錢 甘草錢

陳皮去白一錢 麥門冬 青皮五分 升麻錢

蒼朮錢 歸身一錢

右剉如麻豆大每服五錢水煎去查稍熱服

右參芪朮治嗽例後三方黃芪為君氣虛甚者宜之膈

滿食少者忌服

丹蛤蚧丸治肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸瘦

蛤蚧一兩炙 訶子煨取 細辛 甘草炙

阿膠炒粉 熟地 麥門冬去心各五錢

為末蜜丸每兩作十五丸每一丸食後含化

右蛤蚧丸久嗽不愈者宜之

羅大利膈丸治風痰實喘咳嗽風氣上攻

痰在腸胃脈沉下實者宜 牽牛四兩 半夏洗 木香錢五 青皮去白二兩

槐角 兩三 檳榔 大黃 各三錢 皂角 去皮炒

右為細末生姜麩為丸每服五十九生薑湯下
丹墜痰丸治痰飲

枳實 一兩 明礬 三錢 枯 朴硝 三錢 風化
猪牙皂角 二錢 酒炒 黑牽牛 半斤 取頭末

右為末蘿蔔子汁為丸每服四十九鷄鳴時服初有糞
次有痰

右下痰用大黃牽牛有熱者宜之

世治久嗽痰積半夏二兩用江子五錢敲損同煮至半夏
無白心去江子不用杏仁一兩用烏梅半兩同煮去烏梅
不用止將半夏杏仁焙乾為末煉蜜丸如棗豆大量虛實
服服後下痰積

醫學綱目卷五

五

羅透羅丹治痰實咳嗽胸膈不利

皂角 酥炙去皮 黑牽牛 微炒 半夏 湯洗各二兩 巴豆 去油另研一錢
大黃 一兩 水浸焙用 杏仁 炒去尖

右為細末生薑自然汁丸如桐子大食後生薑湯送下
二十九咳嗽甚者三四服必效

丹治痰嗽喘

南星 二錢 半夏 二錢 滑石 各三錢 江子 五粒 去油

輕粉 少許

右用皂角仁浸濃汁丸梧子大每服七十九

本治諸般痰嗽

半夏 姜汁浸一宿 天南星 各兩 白礬 各半兩 煅硝 二錢

杏仁 去皮尖炒黃 青黛 各半兩 猪牙皂角 去黑皮并子各半兩

巴豆 廿一粒 去殼生用

右一處為不姜糊丸如棗葶大每服七丸臨臥姜湯下
小兒五丸

丹青金丸治食積火鬱嗽

貝母 知母各半 巴豆霜五

右為末姜汁丸青黛為衣

右下痰用巴豆有寒者宜之前一方但借巴豆之氣虛人亦可服

潔款氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮 陳皮 枳榔 木香

杏仁 茯苓 郁李仁法 川歸

廣茂 馬兜零炮 葶藶絡三 人參

防已錢各四 牽牛頭末二兩半

右為細末姜汁麩糊丸如桐子大每服二十九加至七

十九食後姜湯送下

八醫學綱目卷五 五

羅紫參散治肺氣虛咳嗽喘急胸膈痞痛脚膝微腫

人參二錢 蛤蚧一對 白牽牛炒 甜葶藶炒

木香 苦葶藶炒 枳榔各五錢

右為末用熟棗肉丸每服四十九煎人參湯下食後

右下痰用檳榔木香佐牽牛葶藶郁李仁久嗽面浮足

腫者宜之

孫兆視雷道矩病吐痰頃間已及一升喘咳不已面色黧

黯精神不快兆與服仲景葶藶大棗湯一服訖已覺胸中

快利畧無痰唾矣

本治氣喘咳嗽

大黃 葶藶一兩淨瓦上炒

右為末煉蜜丸如桐子大每服五七十九桑白皮湯下

右下痰用葶藶為效極速虛人忌用

仙咳家其脉弦為有水十棗湯主之 有支飲家欬煩胸中痛不卒死至二百日或一歲宜十棗湯

丹伯温年近四十滋味厚素患咳嗽有痰與通神九神朮丸和勻食前生姜湯下五六十九後以津嚥小胃丹十五

九日服六服

右十棗湯下痰仲景法也虛人審之丹溪變十棗為小胃丹而少服徐徐法也

痰在胸膈脈浮弦者宜吐

脉欬而時發熱脉卒弦者非虛也此為胸中寒實所致也當吐之咳家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐之其脈沉者不可發汗

子和稀涎散 三聖散 仲景瓜蒂散已上三方並見治法門

右吐熱痰法輕者但用芫茶桅仁蘿蔔子姜汁入酸齏

汁探吐之

入醫學綱目卷三

三

局碧霞丹方見治法門

本治遠年近日哮喘妙方

砒 麩 海螵蛸各一錢

右三味為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字用井花水調一大呷空心服良久吐出為度小兒加減與之忌食毒物

右吐寒痰法丸用藜蘆瓜蒂吐不透者用附尖神效

吐下兼施

子和常仲明病寒熱往來時咳一二聲面黃無力懶思飲食夜多寢汗日漸瘦削諸醫作虛損治之用二十四味燒

肝散麻茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛戴入斷之

曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴胡飲子降火益

水不月餘復舊此症何名乃經中云二陽病也二陽之病

發心脾不得隱曲心受之則血不流故女子不月脾受之

劫痰

本治勞嗽

則味不化故男子少精此二症名異而實同仲明之病味不化也 馳口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出不出戴人間曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥可治先以苦劑涌之次服舟車瀉丸大下之又服重劑果瘥 一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨臥更服檳榔丸以進食

右吐下兼施以攻其痰也

青黛三錢

辰砂

雄黃

白礬

信各一錢
生用

右並為末淡豆豉一百粒湯浸去殼研如膏入前五味丸如桐子大每服一丸臨臥冷茶清下
治遠年近日喘嗽

入醫字網暴王

圭

蟬蛻一兩去頭足

五靈脂生

砒生

雄黃生

杏仁

去皮尖輕粉各五錢

淡豆豉

四十粒馬兜零

生一兩

右研除出輕粉另研餘為末用生薑亭藎自然汁合輕粉諸藥為丸如小彈大每服一丸臨臥細嚼生薑湯送下

右用信劫痰例蓋為寒濕痰設也

運氣

運氣咳有二

一日火經云少陽司天之政初之氣候乃大溫其病氣拂於上欬逆二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上欬逆三之氣炎暑至民病咳終之氣風乃至其病陽氣不藏而咳是也
二曰燥熱經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交民病咳喘三之氣大火行寒氣時至民病咳喘此上熱下燥為

咳喘也終之氣燥令行餘火內格咳喘此外燥包熱在內咳喘也

雜方

本治諸嗽久不瘥貝母湯

貝母一兩去心姜制黃芩兩半乾姜生一兩五味子

陳皮各一兩桑白皮兩半半夏兩柴胡

桂心各一兩木香兩甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半加杏仁七箇去皮尖生姜七片煎去查熱服有姓蔣者其妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉愈

右方有寒有熱有收有散諸嗽通用也

蘇肺

素黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也此邪從外受之王註云邪謂寒氣其寒

入醫學綱目卷五

三

飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒寒邪從外受也肺寒則外內

合邪因而客之則為肺欬所謂肺先受邪也五臟各以其時受病

王註云時非其時各傳以與之人與天地相參故五臟各

以治時肝治春心治夏脾治長夏治秋腎治冬也感於寒則受病微則為欬

甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏

則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰

何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血取

也淵穴心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉

痺取太陵肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胛下滿取太衝脾欬之狀欬則右脇下痛陰引肩背

甚則不可以動動則欬劇取大白腎欬之狀欬則腰背相

引而痛甚則欬涎取太溪帝曰六腑之欬奈何安所受

病岐伯曰五臟之久欬乃移於六腑脾欬不已則胃受之

胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出取三里穴也肝欬不已則膽

受之膽欬之狀欬嘔膽汁取陽陵泉穴也肺欬不已則大腸受之

大腸欬狀咳而遺矢取巨虛上廉也心欬不已則小腸受之小腸

欬狀欬而失氣氣與欬俱失取巨虛下廉也腎欬不已則膀胱

受之膀胱欬狀欬而遺溺取委中穴也久欬不已則三焦受之

三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人

多涕唾而面浮腫氣逆也取支溝穴也帝曰治之柰何岐伯曰

治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經見欬論

針灸
治嗽灸天突肺俞二穴泄火熱瀉肺氣一

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥又以蒲當乳頭周匝

圍身令前後正平當脊骨下解中灸十壯又以繩橫量口

中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者

是合度

玉治咳嗽

身柱三分瀉 至陽三分補三呼不肺膈寸一分沿皮

俱是虛補實瀉 又法 風門外一寸半

咳嗽喘滿氣急不食容顏黧黑鼻流清涕 風門沿皮

補之 巨闕分瀉之 太淵瀉之 期門平 下脘

五分 中脘分瀉之 絕骨三十半退 支

溝透間使兩脇 脹滿妙穴也

婦人咳嗽寒熱往來風寒嘔逆勞疸中滿喘急

風門沿皮一寸半 太淵五分治 中脘三寸治嘔逆

效 絕骨 曲池 各一寸半治寒 間使透支溝滿中

欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘

尺澤主之 咳乾嘔煩滿俠白主之 欬上氣喘不息得

暴痺內逆肝肺相搏鼻口出血身脹逆息不得臥天府主

診

之 欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿不得飲食輸府主之

欬逆上氣涎出多吐呼吸喘悸不得安或中主之 胸

滿咳嗽不得息嘔吐煩滿不得飲食神藏王之 欬逆上

氣魄戶及氣舍主之 欬逆上氣譫譫主之 胸脇痞滿

不得俛仰飲食不下咳唾沫膿周榮主之 欬而泄不欲

食者商丘主之 凄凄寒咳吐血逆氣入心痛手陰鄰主

之 欬而胸滿前谷主之 欬逆上氣吐沫天容及行間

主之 欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之 欬面

赤熱支溝主之 欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不

通水突主之 一作天突 欬上氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫

青脈頸有大氣喉痺咽中乾急不得息喉中鳴翁翁寒熱

項痛肩痛胸痛腹皮熱衄氣短鯁心痛隱疹頭痛面皮赤

熱身肉盡不仁天突主之 欬逆上氣喘不能言華蓋主

之

成無已云欬者聲欬之欬俗謂之嗽者是也肺主氣形寒

飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中

淫淫如痒習習如梗是冷嗽甚者續續不已連連不息坐

臥不安言語不竟動引百脈咳聲聞四近矣 警枯開切 咳聲也

肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也

咳嗽肺脹壅遏不得眠者難治

仲人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦

冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 上氣面浮腫

肩息其脉浮大不治又加利尤甚 脈浮短者其人肺傷

諸氣微少不過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脈形堅大

者死

欬而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不過十五日死 全

診見

上氣脉數者死謂其形損故也 欬嗽脉沉緊者死浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死

欬嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母飲水者不用瓜蒌恐泥膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰有聲是也此症本於氣瀆瀆微者連咳十數聲方有痰出瀆甚者雖咳十數聲亦無痰出是為乾咳也

開鬱補陰

乾咳嗽極難治此係火鬱之症乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以開之下用補陰降火之劑不已即成勞倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒栢之類

不醫學綱目卷三十一

三十一

氣滯

甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條甘桔湯方用桔梗三兩甘草一兩白朮煎服

欬逆氣者加陳皮 欬嗽者加貝母知母 欬發渴者

加五味 吐膿血者加紫菀 肺痰者加阿膠 面目

腫者加茯苓 嘔者加生姜半夏 少氣者加人參麥

冬 膚痛者加黃芪 目赤者加梔子黃連 咽痛者

加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝 疫毒頭腫

者加鼠粘子大黃芒硝 胸痛膈不利者加枳殼 心

胸痞者加枳實 不得眠者加梔子 發狂者加防風

荊芥 酒毒者加葛根陳皮

實熱不降

一中年婦人乾欬寸脉滑動似葶狀餘皆散大不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥不效遂以石膏香附為君芩連青黛門冬瓜蒺實陳皮炒

雜方

栝歸梗為臣五味砂仁川芎紫菀佐之凡二十餘貼而安
潔古蜜煎生姜湯蜜煎陳皮湯與燒生姜胡桃方皆治無
痰而嗽者以辛甘潤其肺也如但使青皮藥皆宜去白本
草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦治下氣二
味俱用散三焦氣也故聖惠法治云陳皮去穰穰不除即
生痰麻黃發汗節不去則止汗

本補肺法

地黃二斤生淨洗

杏仁二兩

生姜

蜜各四兩

右搗如泥入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑三匙
嚥下

千治久嗽方

白蜜一斤

生姜二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖納蜜復秤如數次納姜汁

入醫學綱目卷三十一

三十一

以微火煮令姜汁盡惟有蜜斤兩在則止旦服如棗大
含一九日三服忌一切雜食

咳嗽喉中作聲

喉如響聲為虛

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽喉中聲如鼬與獨參湯一
服而鼬聲徐至二三貼欬嗽亦漸退凡服二三斤病始全
愈

治久患嘔呷咳嗽喉中作聲不得眠取白前搗為末溫

酒調二錢七

衍義云白前保定肺氣

喉如水鷄聲為實

效而上氣喉中水鷄聲射干麻黃湯主之

射干三兩

麻黃

生姜各四兩

細辛

紫菀

欬久花各三兩

大棗七枚

五味子

半夏各半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煮取三升分溫三服

白前湯欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿且夕倚壁不得臥喉中水鷄鳴

白前

紫菀

半夏

大戟各三兩

右咬咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升分三服

肺逆

陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴別論起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也

脉絡不得隨經上下故雷經而不行絡脉之病人也微故起居如故而息有音也逆調論

督脉生病其上氣有音治其喉中央在缺盆中者天突穴也其

病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也王註謂天迎穴

針灸

咳逆上氣喉咽喝喝有聲太溪主之 咳逆上氣咽喉喝

喝喘息挾突主之

暴嗽

六醫學綱目卷三十一

三十一

治暴熱嗽方

杏仁

紫蘇子升

陳皮兩

柴胡兩

右咬咀以水一斗煮三升分三服

山暴嗽白蜺殼洗淨研細粥飲下

本治暴嗽

砒霜錢

白礬一兩 兩飛 過細研

右先將砒霜安放茶盞內却將白礬末鋪蓋火煨為末

烏梅肉丸如菉荳大朱砂為衣每服二丸紫蘇湯下

十治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏嚥之

久嗽

雜方

風寒 宜薰

丹肺受風寒久嗽非此不能除南星欬花鷲管石佛耳草雄黃為末拌艾以姜一厚片雷舌上次用艾上燒之須令

煙入喉中一方無佛耳草有鬱金 又方蠶管石雄黃各

一分半另為末欵花佛耳草各一分半另為末却用紙一幅方方闊四五寸以鷄子清塗其中央四旁各懸一寸許不塗然後以鷲管石雄黃摻於鷄子清上又以欵花佛耳草末摻其上覆之又以一箭筈從不塗紙旁捲起為一紙筒用糊粘牢其旁抽箭筈出焙乾用時將一紙筒含在口一頭火燒以口及煙令滿嚙之嚙至燒筒盡為度却喫茶二三口壓之

罹療久嗽薰法每旦取欵花好鷄子少許蜜拌花使潤納一升鐵鑊中又用一瓦碗鑽一孔孔內安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗鑊相合及插筒處皆麪糊塗之勿令泄氣鑊下着炭火少時欵冬煙自竹管出以口含筒吸取嚙之如胸中稍悶須舉頭即將指頭捻竹筒頭勿令漏煙

醫學綱目卷五

五五

痰

氣出及煙盡止凡如是五日一為之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥一法不用鑊碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋住瓶口却以口於瓶嘴吸煙咽之尤捷

枳殼炒三兩

桔梗二兩

黃芩一兩

右為細末每早取二兩半水三盞煎至一盞日作三服午時一服中時一服臥時一服三日七兩半服盡又服半夏湯

生半夏湯用半夏姜制切片每三錢半水盞半姜五片煎至一盞食後服一日二三服二三日服了再服枳殼丸盡其痰為度論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳木丸謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也

丹久嗽丸子

海蛤粉研細

膽星臣

杏仁臣

訶子佐

青黛佐 皂角莢 便

右為末姜汁丸如桐子大姜湯下

久嗽乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不能升降或挾濕與

酒而作

香附童便 姜蚕炒 海蛤粉 瓜蒌仁

紫古蜂房 杏仁 姜汁 竹瀝

朱神麩各等

右為末蜜調噲化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏制

紫蘇葉各一

右二味入莎末蜆殼末神麩末以瓜蒌穰桃仁半兩和

丸先服三拗湯三貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘰後得痰嗽次

入醫學綱目卷三十六

三五

年夏末得弦脉而左手虚叩之必汗少而有痰身時時發

熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大推風門肺俞五處

半夏兩

白朮七錢

茯苓六錢

黃芩半兩

陳皮

桔梗

枳殼

石膏煨各半兩

殭蚕炒半錢

五味子半錢

右用神麩糊丸姜湯下三十九丸先與三拗湯加黃芩白

朮二貼夜與小胃丹十丸以攪其痰

潔古欬氣丸治久嗽浮腫 羅氏紫參散用蛤蚧衍義云

蛤蚧治久嗽有功

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神功

馬兜鈴法

半夏湯洗七次焙乾

杏仁去尖麩

巴荳

去皮由研

已上除巴荳杏仁另研外餘為細末用皂角膏子為丸

實者下之吐之

如桐子大雄黃為衣每十九臨臥煎烏梅湯下以利為度

〔治三十年咳嗽或飲或咳寒氣嗽雖不同悉治之〕

細辛

款冬花

防風

紫菀各三兩

藜蘆二兩

川椒五兩

右六味咬咀取藜蘆先着銅器中次紫菀次細辛次款冬花次椒以大棗百枚間在諸藥中以水一斗二升微火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服一枚以胸中溫溫為度若強人欲嗽吐者可少增服之便吐膿裹結痰吐後勿冷飲食咳愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已

治久嗽不瘥方

兔屎四十九粒

礪砂一分

胡桐淚一分

〔醫學綱目卷三〕

三

右三味為末蜜和丸如桐子大每服三丸以粥飲下日

三吐冷物盡即瘥

雜方

兩蛤蚧丸治久嗽

方見陽虛效條

又方衍義治久款膿血胸膈

噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各二兩除膠外皆

為屑次入膠河水三升煮半升臨臥細呷愈詳見效血療三

十年嗽以百部根二十斤搗絞取汁煎之如鉛服方寸七

日三服驗

〔百一治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥方以蝙蝠除翅足

燒令焦為末飲服之

妊娠嗽

雲馬兜鈴散治妊娠胎氣壅塞欬喘息

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母各五錢

陳皮法

大腹皮

桑白皮

紫蘇各一兩 五味子錢五

右咬咀每服四錢姜三片水煎

麻黃散治姪娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃節去 陳皮白去 前胡各一兩 半夏洗炒

人參 白朮 枳殼 貝母

甘草各半兩

右咬咀每服四錢葱白五寸姜三片棗一枚水同煎

紫菀湯治姪娠咳嗽不止胎不安

紫菀 天門冬各一兩 桔梗半兩 甘草

杏仁 桑白皮各二錢半

右咬咀每服三錢竹茹一塊水煎去渣入蜜半匙再煎

二沸溫服

天門冬去心一兩 貝母 人參 甘草

醫學綱目卷三十六

桑白皮 桔梗 紫蘇各半兩 赤茯苓二錢

麻黃去節七錢半

右咬咀每服四錢姜三片水煎

杭州圖書館