

角子大以緋絹裹一丸男左女右臂上繫之發時於淨室內焚
香恭誠解下男左女右手把之時時就鼻嗅之五度効
鬼瘡神効丸

砒霜

硃砂

乳香各半兩

麝香

阿魏

安息香

菜豆粉

獼猴頭骨

右各為末和研勻蒸餅丸梧桐子大發前男左女右手把一丸
便卧一伏時便差

萬安丸 治鬼瘡

虎頭骨

酒炙三兩

藜蘆二兩

雄黃

鬼目

天雄製

燕羨炒

皂角

酥炙去皮綠各一兩

右為細末入別研雄黃末勻煉蜜和丸彈子大今患人頭上戴
一丸立止或於房內燒之避邪

截瘡諸劑

宣明瘡神丹

治諸般瘡疾

白砒一兩

雄黃一錢

右以五月五日用粽子尖左右研三千下日未出不令雞犬見
婦人知丸如梧桐子大發前一日面東冷水下一丸

發明斬鬼丹

人信

五錢用明礬五錢蓋碓內火煨微有黑烟出取起放土地上冷

雄黃

三錢明亮者

右共研勻極細五月五日五家粽角為丸如小豆大未發前面

角子大以緋絹裹一九男左女右臂上繫之發時於淨室燭焚
香恭誠解下男左女右手把之時時就鼻嗅之五度効
鬼瘡神効丸

砒霜

硃砂

乳香各半

麝香

阿魏

安息香

菜豆粉

獼猴頭骨

右各為末和研勻蒸餅丸梧桐子大發前男左女右手把一九
便卧一伏時便差

萬安丸 治鬼瘡

虎頭骨

酒炙

藜蘆

雄黃

鬼臼

天雄製

益美炒

皂角

酥炙去皮

右為細末入別研雄黃末勻煉蜜和丸彈子大今患人頭上戴
一九立止或於房內燒之避邪

截瘡諸劑

宣明瘡神丹 治諸般瘡疾

白砒

一兩

雄黃

一錢

右以五月五日用粽子尖左右研三千下日未出不令雞犬見
婦人知丸如梧桐子大發前一日面東冷水下一丸

發明斬鬼丹

人信

五錢用明礬五錢蓋確內火煨
微有黑烟出取起放土地上冷

雄黃

三錢明
亮者

右共研勻極細五月五日五家粽角為丸如小豆大未發前面

東涼水下三丸嚼破吞之妙小兒一丸以吐為效

秘方 鬼哭丹 治諸瘡疾

菘豆一兩 信石明者三錢

右碾極細以菘餅為丸如菘豆大每服三丸發日早五更以新汲水朝東吞下忌濕麪生冷葷腥

王機 一剪金 治瘡聖藥

信石 黑豆 雄黃各等分

右以石臼搗為末用細絹子捻藥一捻於中裹如豆大用絲扎定剪下每服一九星宿全時用汲水吞下勿令人知

明辟邪丹 治瘡瘻鬼瘡食瘡

菘豆四十九粒 雄黑豆四十九粒 朱砂二錢另研 白砒二錢另研

右為末同研勻滴水丸黃丹為衣每服一粒取桃枝研汁調井花水向日吞下

禁成 常山飲 截諸瘡

常山 檳榔 烏梅 草果 知母 甘草炙 川山甲炮

每服五錢水盞半煎一盞露一宿臨發日前二時溫服

秘方 四神飲

常山二錢 檳榔 柴胡 貝母各一錢 右咀水二盞煎加黑豆二七粒臨發前一時空腹服之

東涼水下三丸嚼破吞之妙小兒一丸以吐為效

秘方 鬼哭丹 治諸瘡疾

藟豆 兩

信石

明者三錢

右碾極細以桑餅為丸如藟豆大每服三丸發自早五更以新汲水朝東吞下忌濕熱生冷軍腥

王機 一剪金 治瘡聖藥

信石

黑豆

雄黃

各等分

右以石臼搗為末用細絹子拾藥一捻於中裹智豆大用絲扎定剪下每服一九星宿全時用汲水吞下勿令人知

寶明辟邪丹 治瘡癰鬼瘡食瘡

藟豆 四十九粒

雄黑豆 四十九粒

朱砂 二錢 另研

白砒 二錢 另研

右為末同研勻滴水丸黃丹為衣每服一粒取桃枝研汁調井花水向日吞下

常山飲 截諸瘡

常山

檳榔

烏梅

草果

知母

甘草 炙

川山甲 炮

每服五錢水盞半煎一盞露一宿臨發目前二時溫服

秘方 四神飲

常山 二錢

檳榔

柴胡

貝母 各一錢

右咀水二盞煎加黑豆二七粒臨發前一時空腹服之



驅癩丹 治久癩諸癩如神

常山末

草果末

菖蒲末

菜豆粉各一兩

信石

醋煮二錢半

右用稀麩糊搜和分作一百二十餅每以一餅用茶清浸露一宿臨發日五更冷服痰飲在上即吐痰飲在下即瀉小兒用一角依前法服忌猪羊魚雞麪

和劑

剋餅子

治一切癩疾發作有時先覺有時乃作寒慄鼓振頤

頤中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲吐或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱而不寒或但寒而不熱或

一日一發或間日一發或發後五六再發皆治

甘草

菜豆末

荷葉

炮各五錢

定粉

龍腦

麝香

研各半錢

金箔

二十五片為衣

信石

醋煮兩半

硃砂飛一兩

右為細末煉蜜搜和每兩作二十捻扁以金箔為衣每服一餅新汲水磨化日發者未發前服之間日發者不發夜服隔數日發者前一日夜服連日發者侵晨服

百選 碧霞丹 治久癩不愈

東方甲乙木巴豆

取肉去油

南方丙丁火官桂

去粗皮

中央戊己土硫黃

去土

西方庚辛金白礬

另研

驅瘡丹 治久瘡諸瘡如神

常山末

草果末

萹蒿末

菘豆粉各一兩

信石醋煮二錢半

右用稀麩糊搜和分作一百二十餅每以一餅用茶清浸露一宿臨發日五更冷服瘡飲在上即吐痰飲在下即瀉小兒用一角依前法服忌猪羊魚雞麪

附 效餅子 治一切瘡疾發作有時先覺有時乃作寒慄鼓振頤

頤中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲吐或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱而不寒或但寒而不熱或

一日一發或間日一發或發後五六再發皆治

甘草炙

藜豆末

荷葉炮各五錢

定粉研

龍腦研

麝香研各半錢

金箔二十五片為衣

信石醋煮兩半

硃砂飛一兩

右為細末煉蜜搜和每兩作二十捻扁以金箔為衣每服一餅新汲水磨化日發者未發前服之間日發者不發夜服隔數日發者前一日夜服連日發者侵晨服

百 碧霞丹 治久瘡不愈

東方甲乙木巴豆取肉去油

南方丙丁火官桂去粗皮

中央戊己土硫黃去土

西方庚辛金白礬另研



北方壬癸水青黛

另研各等分

右於五月初一日修治了用紙各包以盤盛依前方位排定勿令猶大婦人見之安頓神前至端日午時用五家粽角大和前藥令勻凡如梧桐子大令患人以綿裹一丸塞在鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋常發遇少許方除

明發

煮藥豆法

治久瘡瘡母痞塊者不宜用消痞丸散等破氣并熱藥只宜製豆法食盡二升自然消愈

大黑豆

二升

常山

半斤

枳實

四兩

血竭

五錢 另研

右用水一斗先剉常山枳實煮十餘沸入豆候熟去二味再入血竭末用文武火熬盡汁取出晒乾每日食之一二合後可炙

章門二穴其痞自消

易簡諸方

一方 用獨蒜十二箇煨熟桃仁一百箇去皮尖爛搗入黃丹丸如豆大每服三丸當發日清晨溫酒一盞面東吞下

一方 用桃仁一味不犯水入黃丹研丸五月五日合服

一方 截瘡神効常山末二錢烏梅肉四箇研爛酒調臨發日服

一方 治五般瘡疾用夜明砂一錢冷茶調下

一方 用何首烏為末酒調下三錢臨發日先服

一方 治老瘡痰瘡用雄黃瓜蒂赤小豆等分為末每服半錢調

用溫水下以吐為度

北方壬癸水青黛

另研各等分

右於五月初一日修治了用紙各包以盤盛依前方位排定勿令猶大婦人見之安頓神前至端日午時用五家粽角大和前藥令勻凡如梧桐子大令患人以綿裹一丸塞在鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除

明煮藥豆法 治久癰瘡母瘡塊者不宜用消痞丸散等破氣并熱

藥只宜製豆法食盡二升自然消愈

大黑豆

升二

常山

斤半

枳實

兩四

血竭

五錢另研

右用水一斗先剉常山枳實煮十餘沸入豆候熟去二味再入血竭末用文武火熬盡汁取出晒乾每日食之一二合後可炙

章門二穴其痞自消

易簡諸方

一方 用獨蒜十二箇煨熟桃仁一百箇去皮尖爛搗入黃丹丸如豆大每服三丸當發日清晨溫酒一盞面東吞下

一方 用樗仁一味不犯水入黃丹研丸五月五日合服

一方 截瘡神效常山末二錢烏梅肉四箇研爛酒調臨發日服

一方 治五般瘡疾用夜明砂一錢冷茶調下

一方 用何首烏為末酒調下三錢臨發日先服

一方 治老瘡痰瘡用雄黃瓜蒂赤小豆等分為末每服半錢調用溫水下以吐為度

一方 不問新久瘡用常山一兩判碎以好酒浸一宿瓦器煮乾
為末每服二錢水一盞煎半盞去滓停冷五更服之不吐不瀉
効

一方 用鬲年全曆日端午日午時燒灰糊丸如豆大發日早以
無根水送下一丸

一方 治瘡神効用蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度
丸如芡實大候乾每服一丸新汲水面東吞下

子母秘錄 用百草霜黃丹等分細研每服二錢於發日空心米
飲調服不過兩服愈

一方 治鬼瘡進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰為末空心酒調
一錢臨發溫服

一方 治久患癩瘡瘰癧用鱉甲三兩酥炙令黃去裙為末
臨發時酒調下三錢

一方 用駝脂和烏梅為丸未發先服三九即止

醫方大成用狗蠅一介去頭翹以蠟圓一九當發日冷酒吞下
灸法

大推 第一骨節盡處 三推 骨節灸亦可愈 間使 二穴在手少掌後二指兩筋中間是穴可灸

一方 不問新久瘡用常山一兩剉碎以好酒浸一宿瓦器煮乾
為末每服二錢水一盞煎半盞去滓停冷五更服之不吐不瀉

効

一方 用葛年全曆日端午日午時燒灰糊丸如豆大發日早以
無根水送下一丸

一方 治癰神効用蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度
丸如芡實大候乾每服一丸新汲水面東吞下

子母秘錄 用百草霜黃丹等分細研每服二錢於發日空心米
飲調服不過兩服愈

一方 治鬼瘡進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰為末空心酒調

一錢臨發溫服

一方 治久患癆瘵瘰癧用鱉甲三兩酥炙令黃去裙為末
臨發時酒調下三錢

一方 用駝脂和烏梅^切為丸未發先服三十九即止

醫方大成用狗蠅一匁去頭翹以蠟圓一九當發日冷酒吞下

灸法

大推 第一骨節盡處

三推 骨節灸

間使 二穴在手背手後二指兩筋中間是穴可灸






國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.




UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

四井



古今醫統大全卷之三十八目錄

書集

霍亂門

病機

內經敘論

霍亂吐下皆屬於熱

霍亂吐下有屬於濕

霍亂吐瀉邪在中焦

霍亂病源傷暑致多

霍亂分三因

傷寒霍亂者少


霍亂轉筋候

乾霍亂候

霍亂煩渴候

脈候

治法



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古今醫統大全卷之三十八目錄

霍亂門

病機

內經敘論

霍亂吐下有屬於濕

霍亂病源傷暑致多

傷寒霍亂者少

乾霍亂候

脈候

治法

霍亂吐下皆屬於熱


霍亂吐瀉邪在中焦

霍亂分三因

霍亂轉筋候

霍亂煩渴候

毒法



147282 v.34

治霍亂須分理陰陽

治乾霍亂須用吐法

霍亂治例

鍼灸法

藥方

治霍亂和解通用諸齊

半夏湯

六和半夏湯

木瓜湯

薑鹽湯

麥門冬湯

藿苓湯

七氣湯

回生散

枳殼湯

白朮散

四君子湯

五苓散

胃苓散

不換金正氣散

二陳湯

建中湯

傷暑霍亂諸方

二香散

玉露散

桂苓甘露飲

冷香飲子

黃連香薷飲

益元散

霍亂溫中散寒諸方

加減理中湯

冷香湯

通脈四逆湯

正胃散

訶藜勒散

人參散

治霍亂須分理陰陽

治乾霍亂須用吐法

藥方

治霍亂和解通用諸劑

鍼灸法

半夏湯

六和半夏湯

木瓜湯

薑鹽湯

麥門冬湯

藿苓湯

七氣湯

回生散

枳殼湯

白朮散

四君子湯

五苓散

胃苓散

不換金正氣散

二陳湯

建中湯

傷暑霍亂諸方

二香散

玉露散

桂苓甘露飲

冷香飲子

黃連香薷飲

益元散

霍亂溫中散寒諸方

加減理中湯

冷香湯

通脈四逆湯

雷胃散

訶藜勒散

人參散



活命散

漿水飲

薑附湯

附子粳米湯

糯米薑水

既濟湯

丁香散

四順附子湯

月桂湯

治命散

雞白湯

橘皮湯

桃枝湯

急簡方

洗漬法

易簡方二十道

卷之三十九

痧證門

病機

痧證敘論

痧病屬濕

痧證有剛柔之分

痧病因汗多而得

痧由內虛而得

風搐反張有風火之證

脈候

治法

治痧當分剛柔有汗無汗見證治之

痧證宜詳虛實審治

藥方

通治痧劑

痧證門

卷之三十九

洗滌法

易簡方二十道

椎枝湯

急簡方

雞白湯

橘皮湯

月桂湯

治命散

丁香散

四順附子湯

糯米薑水

既濟湯

薑附湯

附子粳米湯

活命散

漿水飲

病機

痧證敘論

痧病屬濕

痧證有剛柔之分

痧病因汗多而得

痧由內虛而得

風搖反張有風火之證

脈候

治法

治痧當分剛柔有汗無汗見證治之

痧證宜詳虛實審治

藥方

通治痧劑



括萸桂枝湯

桂枝加葛根湯

小續命湯

葛根湯

剛症

加味神木湯

柔症

桂心白朮湯

養血疎風劑

防風當歸散

攻下劑

大承氣湯

厥證門

病機

內經敘論

厥證寒熱二因

厥證要分陰陽

厥證有因氣血痰所致

厥為外邪內忤即為飛屍卒厥

脈候

治法

辨寒熱陰陽補瀉分治為至要

丹溪分氣血痰虵虛治

藥方

古今圖書集成醫部全錄卷之二十九目錄

括萸桂枝湯

桂枝加葛根湯

小續命湯

葛根湯

剛痊

加味神木湯

柔痊

桂心白朮湯

養血疎風劑

防風當歸散

攻下劑

大承氣湯

厥證門

病機

內經敘論

厥證寒熱二因

厥證要分陰陽

厥證有因氣血痰所致

厥為外邪內忤即為飛屍卒厥

脈候

治法

辨寒熱陰陽補瀉分治為至要

丹溪分氣血痰疔虛治

藥方

古今圖書集成醫部全錄卷之二十九目錄



通關諸劑

蘇合丸

瓜蒂散

陽厥

大承氣湯

小承氣湯

白虎湯

陰厥

理中湯

四逆湯

姜附湯

屍厥

一調氣散

平胃

二平胃散

三換合香丸

三追魂湯

氣死

四君子湯

八味順氣散

調氣散

真痰湯

四七湯

血厥

四物湯

白薇湯

倉公散

返魂湯

痰厥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

通關諸劑

蘇合丸

瓜蒂散

陽厥

大承氣湯

小承氣湯

白虎湯

陰厥

理中湯

四逆湯

姜附湯

厥厥

一調氣散

二平胃散

三藿香散

三追魂湯

氣死

四君子湯

八味順氣散

調氣散

真痰湯

四七湯

血厥

四物湯

白薇湯

倉公散

返魂湯

痰厥



二陳湯

藁痰湯

星香散

順元散

酒厥

生薑自然汁

解醒湯

蛇厥

理中湯

烏梅丸

易簡方

灸法

心癰瘕候

病機

運氣癰瘕有四

肝虛癰瘕與瀰瘕不同

脈候

治法

治虛人癰瘕急補其陰

治汗多亡陽變證癰瘕

藥方

加減建中湯

人參益氣湯

獨活湯

續命者散

增損柴胡湯

心顛振候

病機

運氣躡曳有三

二陳湯

蓮痰湯

星香散

順元散

酒厥

生薑自然汁

解醒湯

蛇麻

理中湯

烏梅丸

易簡方

灸法

癰瘰候

病機

運氣癰瘰有四

肝虛癰瘰與癰瘰不同

脈候

治法

治虛人癰瘰急補其陰

治汗多亡陽變證癰瘰

藥方

加減建中湯

人參益氣湯

獨活湯

續命者散

增損柴胡湯

頭振候

病機

運氣躡曳有三



治法

藥方

星附散

獨活散

鍼灸法

青蘘花

愈風湯

卷之四十

痿證門

病機

內經敘論

五臟受熱各為痿證

痿因肺熱相傳

痿為內臟不足所致

痿病於肺臟有二因

痿為血少

脈候

治法

治痿當補脾清肺為要

治痿與治風治痺不同

痿證養血補氣則脾實而肺清

藥方

通治痿劑

清燥湯

八珍湯

加味四斤丸

藿香養胃湯

健步丸

加味四物湯

治法

藥方

星附散

獨活散

鍼灸法

青蘘花

愈風湯

卷之四十

痿證門

病機

內經敘論

五臟受熱各為痿證

痿因肺熱相傳

痿為內臟不足所致

痿病於肺臟有二因

痿為血少

脈候

治法

治痿當補脾清肺為要 治痿與治風治痺不同

痿證養血補氣則脾實而肺清

藥方

暹治痿劑

清燥湯

八珍湯

加味四斤丸

藿香養胃湯

健步丸

加味四物湯



易簡方

金剛丸

補肝湯

溫腎丸

麻木門

病機

麻木敘論

脈候

治麻木以疎導鬱滯為先

藥方

桂枝五物湯

薏苡仁湯

麻黃桂枝升麻湯

人參益氣湯

天麻黃芪湯

中和補氣湯

神效黃芪湯

補氣湯

導氣湯

三妙丸

易簡方

卷之四十一

諸氣門

病機

諸氣敘論

九氣動為諸病

氣屬陽動為火

脈候

麻木門

病機

麻木敘論

脈候

治麻木以疎導滯滯為先

藥方

桂枝五物湯

薏苡仁湯

麻黃桂枝升麻湯

人參益氣湯

天麻黃芪湯

沖和補氣湯

神効黃芪湯

補氣湯

導氣湯

三妙丸

易簡方

卷之四十一

諸氣門

病機

諸氣敘論

氣屬陽動為火

脈候

九氣動為諸病



治法

凡七情九氣當以五行五志相勝治之

治氣藥毋用辛熱太過 辨氣無補法之誤

氣病當審何經分治

藥方

通治氣劑

和劑七氣湯

三因七氣湯

指迷七氣湯

分心氣飲

分氣紫蘓飲

蘓子降氣湯

木香流氣飲

正氣天香散

流氣飲子

五膈寬中散

小降氣湯

治氣湯

發散諸方

蘓合香丸

參蘓飲

紫沉通氣湯

補氣諸方

補中益氣湯

調中益氣湯

大藿香湯

升陽順氣湯

消導破氣劑

分消導氣湯

異香散

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

治法

凡七情九氣當以五行五志相勝治之

治氣藥必用辛熱太過 辨氣無補法之誤

氣病當審何經分治

藥方

通治氣劑

和劑七氣湯

三因七氣湯

指迷七氣湯

分心氣飲

分氣紫蘓飲

蘓子降氣湯

木香流氣飲

正氣天香散

流氣飲子

五膈寬中散

小降氣湯

治氣湯

發散諸方

蘓合香丸

參蘓飲

紫沉通氣湯

補氣諸方

補中益氣湯

調中益氣湯

大藿香湯

升陽順氣湯

消導破氣劑

分消道氣湯

異香散



沉香升降散

三香正氣散

溫氣調中劑

鹽煎散

勝金散

白豆蔻散

溫中分氣丸

半夏湯

壓氣散

木香順氣湯

破氣攻下劑

復元通氣散

木香檳榔丸

消脹丸

分氣丸

三和丸

搜風順氣丸

濕齋推氣丸

涌劑

稀涎散

瓜蒂散

易簡諸方

鍼灸法

卷之四十二

血證門

病機

血證敘論

吐血候

吐血後胃中否口燥候

嘔血候

唾血候

舌上出血候

大便下血候

小便血候

沉香升降散

三香正氣散

溫氣調中劑

藜蘆散

勝金散

白豆蔻散

溫中分氣丸

半夏湯

壓氣散

木香順氣湯

破氣攻下劑

復元通氣散

木香檳榔丸

分氣丸

三和丸

搜風順氣丸

濕齋推氣丸

涌劑

稀涎散

瓜蒂散

易簡諸方

鍼灸法

卷之四十二

血證門

病機

血證敘論

吐血候

吐血後胃高舌中舌口燥候

嘔血候

唾血候

舌上出血候

大便下血候

小便血候



九竅四肢出血候

汗血候

論吐衄血泄皆因火熱所乘

血證有三因

吐嘔衄血為內傷氣滯所致者多

脉候

治法

血證當分上下各經理治

藥方

通治血劑

吐血諸劑

十灰散

花蕊散

犀角地黄湯

生地飲子

必勝散

四生丸

麥門冬湯

茯苓補心湯

龍腦雞蘓丸

大薊散

藕汁飲

雞蘓散

救脉散

麥門冬飲子

黃芩芍藥湯

伏龍肝膏

五神湯

是齋白朮散

黃連解毒湯

側柏葉散

團參丸

瓜婁犀角湯

天門冬丸

綠雲散

九竅四肢出血候

汗血候

論吐衄血泄皆因火熱所乘

血證有三因

吐衄唾血為內傷氣滯所致者多

脉候

治法

血證當分上下各經理治

藥方

通治血劑

吐血諸劑

十灰散

花蕊散

犀角地黄湯

生地飲子

必勝散

四生丸

麥門冬湯

茯苓補心湯

龍腦雞蘓丸

大薊散

藕汁飲

雞蘓散

救脉散

麥門冬飲子

黃芩芍藥湯

伏龍肝膏

五神湯

是齋白朮散

黃連解毒湯

側柏葉散

團參丸

瓜蔓犀角湯

天門冬丸

綠雲散



雲雪散

雙荷散

枇杷葉散

二茸丸

地黃煎

掌中金

人參湯

松花散

百花煎

石膏散

杏仁散

白朮散

雞子白丸

三黃補血湯

歸脾湯

小救胡湯

桃仁承氣湯

涼膈散

薄荷煎

四順清涼飲子

黑神散

二神散

易簡方

醫案

衄血諸劑

麻黃湯

桂枝湯

五苓散

犀角地黃湯

益陰散

刺薊散

吹鼻止血方

三奇散

麥門冬散

白芨散

茜根散

川芎三黃散

五黃丸

麝香散

古今圖書集成醫部全錄卷之四十五

雲雪散

雙荷散

枇杷葉散

二茸丸

地黃煎

掌中金

人參湯

松花散

百花煎

石膏散

杏仁散

白朮散

雞子白丸

三黃補血湯

歸脾湯

小救胡湯

桃仁承氣湯

涼馬散

薄荷煎

四順清涼飲子

黑神散

二神散

易簡方

醫藥

衄血諸劑

麻黃湯

桂枝湯

五苓散

犀角地黃湯

金陰散

刺薊散

吹鼻止血方

三奇散

麥門冬散

白皮散

茜根散

川芎三黃散

五黃丸

麝香散

古今圖書集成醫部全錄卷之四十五



止衄散

易簡方

止血散

灸法

蒸法

咳血諸劑

二門冬飲

當歸芍藥湯

薏苡散

咯血唾血劑

七珍湯

腎餅子

汗血劑

黃芪建中湯

妙香散

小便血劑

髮灰散

辰砂五苓散

鹿茸丸

六味地黃丸

玉屑膏

四物玄明飲

醫案

易簡方

下血劑

附楊風
穢毒

結陰丹

胃風湯

當歸和血散

平胃地榆湯

升陽和血湯

越桃散

椿皮散

烏梅丸

三才圖會卷之四十一 醫方類聚

止衄散

易簡方

止衄歌

灸法

蒸法

咳血諸劑

二門冬飲

當歸芍藥湯

薏苡散

咯血唾血劑

七珍湯

腎餅子

汗血劑

黃芪建中湯

妙香散

小便血劑

髮灰散

辰砂五苓散

鹿茸丸

六味地黃丸

玉屑膏

四物玄明飲

醫案

易簡方

下血劑 附楊風
散毒

結陰丹

胃風湯

當歸和血散

平胃地榆湯

升陽和血湯

越桃散

椿皮散

烏梅丸

三才圖會卷之四十一 醫方類聚



槐花散

陰結便血生地膏

黃連湯

聚金丸

易簡方

醫案

牙宣血劑

消風散

安腎丸

嗣中血劑

四神丸

十全大補湯

古今醫統大全卷之三十八

編一衣衛指揮同知 雲津史 俸梓

新安徐春甫編集

霍亂門

病機

霍亂敘論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繃痠巢氏病源云霍亂吐瀉皆因濕涼不調陰陽混淆二氣相干致脾胃之間交而為霍亂寒氣客於脾則瀉客於胃則吐亦由飲酒食肉腥膾生冷過度或因坐卧濕地當風取涼使風冷之氣歸於三



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

槐花散

陰結便血生地膏

黃連湯

聚金丸

易簡方

醫案

牙宣血劑

消風散

安腎丸

嗣中血劑

四神托

十全大補湯

古今醫統大全卷之三十八

一衣衛指揮同知 雲津史 俸梓

新安徐春甫編集

霍亂門

病機

霍亂發論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨絀傷
巢氏病源云霍亂吐瀉皆因濕涼不調陰陽混淆二氣相干致脾
胃之間交而為霍亂寒氣客於脾則瀉客於胃則吐亦由飲酒食
肉腥膾生冷過度或因坐卧濕也當風取涼使風冷之氣歸於三



焦傳於脾胃。脾胃得冷。水穀不消。皆成霍亂。

霍亂吐下皆屬於熱。

原病式云。三焦為水穀傳化之道路。熱氣甚則傳化失常。而霍亂吐下之證作。火性燥動故也。

霍亂吐下有屬於濕。

原病式云。霍亂吐下濕為

留飲痞滿而傳化失常。故其則霍亂吐

瀉也。

霍亂吐瀉邪在中焦。

保命集曰。霍亂吐瀉不

止者。邪在中焦。或因渴而大飲。或因飲而

過量。或飢飽過甚。或濕

熱內其故。陰陽不和。是為吐瀉。仲景曰。邪

在上焦則吐。邪在下焦則瀉。邪在中焦則既吐且瀉。此為急病也。

然吐利為急。十死其二。如揮霍撩亂。而不得吐瀉者。此名乾霍

亂必死。法曰。既有其入。必有所出。今有其入。而不得其出者。否也。

塞也。故轉筋吐瀉者。其氣有三。曰風。曰火。曰濕。吐為暘熱也。王氏

曰。炎熱暴燥。心之氣也。火能炎上。故吐也。瀉為濕也。叔和云。濕多

成五瀉。經曰。濕勝則濡瀉。又曰。風勝則動。筋屬肝。而應于風木。故

脚轉筋燥急也。內經諸轉及戾。水液渾濁。皆屬於熱。張仲景治法

曰。熱多欲飲水。五苓散。寒多不飲水者。理中湯。凡覺此證。或先五

苓。益元。桂苓。甘露。飲。乃吐瀉之聖藥也。慎無與粟米粥湯。入於

胃。則必死矣。霍亂者。脾胃極損。不能傳化。加以粟米。如人欲斃。更

焦傳於脾胃。脾胃得冷水。穀不消。皆成霍亂。

霍亂吐下皆屬於熱。

原病式云。三焦為水穀傳化之道路。熱氣甚則傳化失常。而霍亂吐下之證作。火性燥動故也。

霍亂吐下有屬於濕。

原病式云。霍亂吐下濕為留飲。痞滿而傳化失常。故其則霍亂吐

瀉也。

霍亂吐瀉邪在中焦。

保命集曰。霍亂吐瀉不止者。邪在中焦。或因渴而大飲。或因飲而過量。或飢飽過甚。或濕熱內其。故陰陽不和。是為吐瀉。仲景曰。邪

在上焦則吐。邪在下焦則瀉。邪在中焦則既吐且瀉。此為急病也。

然吐利為急。十九其一二。如揮霍撥亂。而不得吐瀉者。此名乾霍

亂。必死。法曰。既有其入。必有所出。今有其入。而不得其出者。否也。

塞也。故轉筋吐瀉者。其氣有三。曰風。曰火。曰濕。吐為暍熱也。王氏

曰。炎熱暴燥。心之氣也。火能炎上。故吐也。瀉為濕也。叔和云。濕多

成五瀉。經曰。濕勝則濡瀉。又曰。風勝則動。筋屬肝。而應于風木。故

脚轉筋燥急也。內經諸轉及矣。水液渾濁。皆屬於熱。張仲景治法

曰。熱多欲飲水。五苓散。寒多不飲水者。理中湯。凡覺此證。或先五

苓。益元。桂苓。甘露。飲。乃吐瀉之聖藥也。慎無與粟米粥湯。入於

胃。則必死矣。霍亂者。脾胃極損。不能傳化。加以粟米。如人欲覺更



加利刀鋸其首。豈有能生者耶。如吐瀉多時。欲住之後。宜微以稀粥。漸漸養之。以遲為妙。

霍亂病源傷暑致多

霍亂證雖有風寒濕熱之異。大抵傷暑居多。蓋由夏暑傷內元氣。脾胃俱虛。必因飲冷停寒。酒色所傷。外因受涼。邪氣所鬱。不得發越。而霍亂之證作矣。故此證作。多在秋涼之時。從可知矣。若邪淺而能上下分散。得吐瀉為可治。深重者。上不得吐。下不得泄。邪恣中焦。攪腹顛倒。揮霍撩亂。立見死亡。知醫者。惟用鹽湯溫灌探吐。及以益元散五苓湯之類救之。庶可衛生。若無知者。謬以滾湯熱粥與之。禍不旋踵。

霍亂分三因

陳無擇云。霍亂者。心腹卒痛。嘔吐下利。增寒壯熱。頭痛眩運。先心痛則先吐。先腹痛則先瀉。心腹俱痛。吐利並作。甚則轉筋入腹。則斃。霍亂惡證。無越於斯。蓋陰陽反戾。清濁相干。陽氣暴升。陰氣頓墜。陰陽否隔。上下奔逸。治之惟宜溫煖。更詳別三因以調之。外因諸風則惡風有汗。傷寒則惡寒無汗。胃濕則重著傷暑則熱煩。內因元氣所致。鬱聚痰涎。否隔不通。遂致滿悶。隨其勝復。必作吐利。不內外因。或諸飽食膾炙。恣填亂酪。冰脯寒漿。旨酒。胃既臌脹。脾臟停凝。必內鬱發。遂成吐利。當從不內外因也。

傷寒霍亂者少

加利刀鋸其首。豈有能生者耶。如吐瀉多時。欲住之後。宜微以稀粥。漸漸養之。以遲為妙。

霍亂病源傷暑致多

霍亂證雖有風寒濕熱之異。大抵傷暑居多。蓋由夏暑傷內元氣。脾胃俱虛。必因飲冷停寒。酒色所傷。外因受涼。邪氣所鬱。不得發越。而霍亂之證作矣。故此證作。多在秋涼之時。從可知矣。若邪淺而能上下分散。得吐瀉為可治。深重者。上不得吐。下不得泄。邪恣中焦。撓腹顛倒。揮霍撩亂。立見死亡。知醫者。惟用鹽湯溫灌探吐。及以益元散五苓湯之類救之。庶可尚生。若無知者。謬以滾湯熱粥與之。禍不旋踵。

霍亂分三因

陳無擇云。霍亂者。心腹卒痛。嘔吐下利。增寒壯熱。頭痛眩暈。先心痛則先吐。先腹痛則先瀉。心腹俱痛。吐利並作。甚則轉筋入腹。則斃。霍亂惡證。無越於斯。蓋陰陽反戾。清濁相干。陽氣暴升。陰氣頓墜。陰陽否隔。上下奔逸。治之惟宜溫煖。更詳別三因以調之。外因諸風則惡風有汗。傷寒則惡寒無汗。胃濕則重著傷暑則熱煩。內因九氣所致。鬱聚痰涎。否高不通。遂致滿悶。隨其勝復。必作吐利。不內外因。或諸飽食膾炙。恣填亂酪。冰脯寒漿。旨酒。胃既脹脾臑。停凝必內鬱發。遂成吐利。當從不內外因也。

傷寒霍亂者少

傷寒論曰。病嘔吐而利。名曰霍亂。或發熱頭痛。身疼惡寒吐利。或自吐下。又利止復更發熱也。皆是霍亂證。傷寒其脈微澀者。本是霍亂。今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利。本嘔下利者不可治也。

保命集云。傷寒霍亂轉筋。身熱脈長。陽明本病也。脾胃受濕。執中焦氣滯。或因冷飲。或傷冷水。或感濕氣。冷熱不調。水火相干。陰陽相搏。上下相離。榮衛不能相維。故轉筋。卒痛。經絡亂行。暴亂吐瀉。中焦胃氣所主也。

大抵霍亂。內多暑熱之邪。外因寒氣束鬱而作。或內因涼物而致。若謂真寒而為病源者絕少。獨惟夏秋時病者。豈得為傷寒者。

霍亂轉筋候

原病式曰。轉筋經云。反戾也。執氣燥燥於筋。則挛瘳而痛。火主燔灼燥動故也。或以為寒客於筋者誤也。蓋寒雖主於收引。然止為厥逆。禁因屈伸不便。安得為轉筋也。所謂轉者動也。陽動陰靜。熱證明矣。夫轉筋者多因熱甚。霍亂吐瀉。所以致脾胃土衰。則肝木自甚。而熱燥於筋。故轉筋也。大發渴則為熱。凡霍亂轉筋而不渴者。未之有也。或有不因吐瀉。但外冒於寒。而腠理閉塞。陽氣鬱結。怫熱內作。內燥於筋。則轉筋也。故諸轉筋。以湯漬之。而使腠理開泄。陽氣疎通則愈也。因湯漬而愈。故俗反疑為寒也。

陳氏曰。轉筋者。以陽明養宗筋。屬胃與大腸。今暴吐下。津液頓亡。

傷寒論曰。病嘔吐而利。名曰霍亂。或發熱頭痛。身疼。惡寒吐利。或自吐下。又利止復更發熱也。皆是霍亂證。傷寒其脈微澀者。本是霍亂。今是傷寒。却四五日至陰經。上轉入陰。必利。本嘔下利者。不可治也。

保命集云。傷寒霍亂轉筋。身熱。脈長。陽明本病也。脾胃受濕。執中焦氣滯。或因冷飲。或傷冷水。或感濕氣。冷熱不調。水火相干。陰陽相搏。上下相離。榮衛不能相維。故轉筋。卒痛。經絡亂行。暴亂吐瀉。中焦胃氣所主也。

大抵霍亂。內多暑熱之邪。外因寒氣束鬱。而作。或內因涼物而致。若謂真寒而為病源者。絕少。獨惟夏秋時病者。豈得為傷寒者乎。

霍亂轉筋候

原病式曰。轉筋經云。反戾也。執氣燥燥於筋。則挛瘳而痛。火主燔灼燥動故也。或以為寒客於筋者。誤也。蓋寒雖主於收引。然止為厥逆。禁因屈伸不便。安得為轉筋也。所謂轉者。動也。陽動陰靜。熱證明矣。夫轉筋者。多因執甚。霍亂吐瀉。所以致脾胃土衰。則肝木自甚。而熱燥於筋。故轉筋也。大發渴則為熱。凡霍亂轉筋。而不渴者。未之有也。或有不因吐瀉。但外冒於寒。而腠理閉塞。陽氣鬱結。怫執內作。內燥於筋。則轉筋也。故諸轉筋。以湯漬之。而使腠理開泄。陽氣疎通。則愈也。因湯漬而愈。故俗反疑為寒也。

陳氏曰。轉筋者。以陽明養宗筋。屬胃與大腸。今暴吐下。津液頓亡。



外感四氣內積七情。攻閉諸脉。枯削於筋。宗筋失養。必致羸縮。甚則卵縮。舌卷為難治。

乾霍亂候

陳氏曰。乾霍亂者。忽然心腹脹滿。絞刺疼痛。蠱毒煩冤。欲吐不吐。欲利不利。狀若神靈所附。頃刻之間。便致悶絕。亦涉三因。或藏虛腸胃或厚。故吐利不行。

霍亂煩渴候

陳氏曰。煩渴者。以陰陽反戾。清濁相干。水與穀併。小便秘澀。既走津液。腎必枯燥。引水自救。煩渴必矣。

脉候

內經曰。脉伏者霍亂。

脉微而澁。或伏而散。或隱而伏。或大而虛。

右關脉滑為霍亂吐瀉。

霍亂脉多結。促皆不可斷。以死。

脉洪者為熱。

脉弦者為飲。

氣口絃滑。高間有宿食。留飲宜順其性。以鹽湯探吐之。

脉洪大者生。

脉微弱。漸遲。氣少不言者死。

治法

治霍亂須分理陰陽

霍亂證乃陰陽交錯。水火相干。邪正不分。如寇入境。不別良善。亂相混擾。然也。初須用五苓散分利。若乾霍亂者。須以姜鹽湯或吳

外感四氣內積七情。攻閉諸脈。枯削於筋。宗筋失養。必致羸縮。甚則卵縮舌卷為難治。

乾霍亂候

陳氏曰。乾霍亂者。忽然心腹脹滿。絞刺疼痛。蠱毒煩冤。欲吐不吐。欲利不利。狀若神靈所附。頃刻之間。便致悶絕。亦涉三因。或藏虛腸胃。或厚。故吐利不行。

霍亂煩渴候

陳氏曰。煩渴者。以陰陽反戾。清濁相干。水與穀併。小便秘澀。既走津液。腎必枯燥。引水自救。煩渴必矣。

脈候

內經曰。脈伏者霍亂。

脈微而澁。或伏而散。或隱而伏。或大而虛。

右關脈滑為霍亂吐瀉。

霍亂脈多結促。皆不可斷。以死。

脈洪者為熱。

脈弦者為飲。

氣口絃滑。兩間有宿食。留飲宜順其性。以鹽湯探吐之。

脈洪大者生。

脈微弱。漸進氣少。不言者死。

治法

治霍亂須分理陰陽

霍亂證乃陰陽交錯。水火相干。邪正不分。如寇入境。不別良善。亂相混擾。然也。初須用五苓散分利。若乾霍亂者。須以姜鹽湯或吳



菜萸湯溫服探吐吐中就有發散之意俟其稍安隨後調理若斯證治一時急迫稍失其治立見傾危此等證候不知治者死於非命何可勝紀每見夏秋之間患此證者忽然吐瀉大作家人不識治法只云吐瀉既虛即以熱粥滾湯與之接濟湯粥入腹其證尤甚而即死者多矣

治乾霍亂須用吐法

乾霍亂證最難治升降不通死在須臾當以吐法提其氣極是良法急則用鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥解散則二陳加川芎蒼朮防風白芷生姜煎服

霍亂治例

霍亂陽明證宜和中平胃建中輩或四君子湯脈浮自汗四君子加桂主之脈浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋脇下痛脈絃者木尅土也故痛甚平胃加木瓜五錢或建中加散胡木瓜
吐利轉筋腹中痛體重脈沉而細者四君子加白芍良薑
吐利四肢拘急脈沉而遲此少陰霍亂四君子加姜附厚朴
吐利四肢厥冷脈微緩屬厥陰建中加歸附
吐利頭痛而身熱熱多欲飲水者五苓散寒多不用水者理中丸主之

元戎云太陰證霍亂者理中湯加橘紅名治中湯

若吐下必腹作痛手足厥冷理中去白朮加熟附名四順湯若吐利後轉筋者理中加火煨石膏一兩

大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散欲吐者以二陳湯探吐亦有可下者

轉筋者皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服

人於夏月加食瓜果多飲冷乘風以致食留不化因成痞滿上下不通遂成霍亂以六和湯倍加藿香煎服

霍亂切不可與米粥湯飲之立死

轉筋法男子以手挽其陰女子以手掣兩乳此千金法也

鍼灸法

刺委中穴出血或刺十指頭出血皆是良法今北方人凡病悉刺兩手腕中出血謂之打寒此則傷寒熱入血室而用此法也霍亂證亦以此法所謂血去惕出非此二證悉皆用之誤也

轉筋十指拘攣不能屈伸灸脚外踝骨尖上七壯

霍亂將死者用鹽填臍中灸七壯立愈

霍亂吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立愈

天樞二穴在臍心兩傍各開二寸氣海在

臍下二寸半中脘穴在臍上四寸

藥方

王
半夏湯 治霍亂轉筋吐瀉不止

三五八卷之三十一

若吐下必腹作痛手足厥冷理中去白朮加熟附名四順湯若吐利後轉筋者理中加火煨石膏一兩

大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散欲吐者以二陳湯探吐亦有可下者

轉筋者皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服

人於夏月加食瓜果多飲冷乘風以致食留不化因成痞滿上下不通遂成霍亂以六和湯倍加藿香煎服

霍亂切不可與米粥湯飲之立死

轉筋法男子以手挽其陰女子以手裨兩乳此千金法也

鍼灸法

刺委中穴出血或刺十指頭出血皆是良法今北方人凡病悉刺

兩手臑中出血謂之打寒此則傷寒熱入血室而用此法也霍亂證亦以此法所謂血去陽出非此二證悉皆用之誤也

轉筋十指拘牽不能屈伸灸脚外踝骨尖上七壯

霍亂將死者用鹽填臍中灸七壯立愈

霍亂吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立愈天樞二穴在臍心兩傍各開二寸氣海在

臍下二寸半中脘穴在臍上四寸

藥方

王
半夏湯 治霍亂轉筋吐瀉不止

半夏麴 白茯苓 白朮 淡桂
炙甘草 二錢 錢 各五 半 二錢

右為細末每服二錢渴者以涼水調下不渴者以溫水調下
間六和半夏湯 治霍亂吐瀉

白朮 甘草 砂仁 杏仁
人參 半夏 製各 赤茯苓 藿香
五分

白扁豆 姜汁 木瓜 香薷 厚朴 姜製各
炒 錢 各一 二錢

右咀作一服姜三片棗一枚水二盞煎一盞溫服
三木瓜湯 治霍亂吐瀉舉筋轉筋入腹則悶絕
紫蘊葉 十片 乾木瓜 一兩 吳茱萸 半兩 小茴香 炒

甘草 炙各 右咀作一服加姜棗水煎服
一錢

直指姜鹽湯 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉
鹽 一兩 生姜 搗 半兩

右同炒令色變以水一碗煎熱溫服
濟生麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬 橘皮 半夏 製 白茯苓
白朮 各一 人參 甘草 炙 小麥 各五
錢 分

右咀作一服水盞半姜三片烏梅一箇煎八分溫服
選藿苓湯 治外感風寒內傷飲食霍亂轉筋嘔吐瀉泄

藿香 厚朴 白朮 茯苓 各一
錢



半夏麴

白茯苓

白朮各五錢

淡桂二錢半

炙甘草二錢

右為細末每服三錢湯者以涼水調下不渴者以溫水調下

河六和半夏湯 治霍亂吐瀉

白朮

甘草

砂仁

杏仁

人參

半夏製各五分

赤茯苓

藿香

白扁豆姜汁炒

木瓜各一錢

香薷

厚朴姜製各二錢

右咀作一服姜三片棗一枚水二盞煎一盞溫服

三木瓜湯 治霍亂吐瀉舉筋轉筋入腹則悶絕

紫蘊葉十片

乾木瓜一兩

吳茱萸半兩

小茴香炒

甘草炙各一錢

右咀作二服加姜棗水煎服

直指姜鹽湯 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩

生姜半兩

右同炒令色變以水一碗煎熱溫服

濟麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬

橘皮

半夏製

白茯苓

白朮各一錢

人參

甘草炙

小麥各五分

右咀作一服水盞半姜三片烏梅一箇煎八分溫服

選藿苓湯 治外感風寒內傷飲食霍亂轉筋嘔吐瀉泄

藿香

厚朴

白朮

茯苓各一錢

甘草 各五分

紫蘇

大腹皮

白芷

桔梗

半夏

陳皮 各八分

肉桂 三分

猪苓

澤瀉 各一錢

右咀作一服水二盞姜五片煎八分食遠服

治七情鬱結互相刑剋揮霍癆亂吐利交作

半夏 藥

厚朴 姜炒

芍藥

茯苓 各一錢

肉桂

熟蘓

橘紅

人參 各五分

右咀作一服水二盞姜七片棗一枚煎一盞不拘時服

回生散 治霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之回生

陳皮 去白

茴香 去土各半兩

右作一服水二盞煎八分不拘時服

止渴湯 治霍亂煩渴

人參

麥門冬

茯苓

桔梗

括蕒根

葛根

澤瀉

甘草 各五錢

右為細末每服二錢不拘時蜜湯調下

要白木散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老

及治酒積嘔噦

白木

茯苓

人參

藿香 各半兩

葛根 一兩

木香 二錢半

甘草 各一兩半

右為細末每服二錢用白湯下如煩渴加滑石二兩甚者加姜



甘草 炙各五分

紫蘇

大腹皮

白芷

桔梗

半夏

陳皮 各八分

肉桂 三分

猪苓

澤瀉 各一錢

右咀作一服水二盞姜五片煎八分食遠服

獨七氣湯 治七情鬱結互相刑剋揮霍癩亂吐利交作

半夏 炙

厚朴 姜煨

芍藥

茯苓 各一錢

肉桂

蒸蘗

橘紅

人參 各五分

右咀作一服水二盞姜七片棗一枚煎一盞不拘時服

回生散 治霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之回生

陳皮 去白

藿香 去土各半兩

右作一服水二盞煎八分不拘時服

止渴湯 治霍亂煩渴

人參

麥門冬

茯苓

桔梗

括蕒根

葛根

澤瀉

甘草 炙各五錢

右為細末每服二錢不拘時蜜湯調下

要選白木散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老

及治酒積嘔噦

白木

茯苓

人參

藿香 各半兩

葛根 一兩

木香 二錢半

甘草 炙一兩半

右為細末每服二錢用白湯下如煩渴加滑石二兩甚者加姜

汁續續飲之不拘時服

局方四君子湯 五苓散 胃苓湯 二陳湯 不換金正氣散

建中湯 並治霍亂吐利方見傷寒門

選要二香散 治暑濕相搏霍亂轉煩渴悶亂

藿香

白朮

厚朴

陳皮

茯苓

半夏製

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃連

白扁豆各錢

大腹皮

甘草各五分

右咀作一服水三鍾姜五片葱白三寸煎一鍾服

集玉露散 治夏月傷暑霍亂吐瀉

石膏

寒水石

生甘草各等分

右為末每服二錢白湯調下

局方桂苓甘露飲 冷香飲子 黃連香薷飲 益元散

並治傷暑霍亂方見暑門

霍亂溫中散寒諸劑

仲景加減理中湯 治霍亂吐瀉

人參

白朮

乾姜炮各二錢

甘草各五分

右咀作一服水鍾半煎八分不拘時服

若為風寒濕所中者加附子一名附子理中湯

汁續飲之不拘時服

方局 四君子湯 五苓散 胃苓湯 二陳湯 不換金正氣散

建中湯 並治霍亂吐利

方見傷寒門

要 二香散 治暑濕相搏霍亂轉煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴 陳皮

茯苓 半夏 紫蘇 桔梗

白芷 香薷 黃連 白扁豆

大腹皮 甘草

各五分

右咀作一服水二鍾姜五片葱白三寸煎一鍾服

成 玉露散 治夏月傷暑霍亂吐瀉

石膏 寒水石 生甘草

各等分

右為末每服二錢白湯調下

局 桂苓甘露飲 冷香飲子 黃連香薷飲 益元散

並治傷暑霍亂

方見傷寒門

仲 加減理中湯 治霍亂吐瀉

人參 白朮 乾姜 甘草

各三錢

各五分

右咀作一服水鍾半煎八分不拘時服

若為風寒濕瀉中者加附子一名附子理中湯



若霍亂吐利者加陳皮青皮各一錢名治中湯

乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透然後即進此藥

嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各一錢生姜十片煎服

泄瀉者加橘紅茯苓各一錢名補中湯

澹泄不已者於補中湯內加附子一錢不喜飲食水穀不化者再

加砂仁一錢

霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子二錢名四順湯

霍亂後轉筋者理中湯內加煨石膏一錢

臍上築者腎氣動也去朮加官桂腎惡燥去朮恐作奔豚故加

官桂

傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉用本方可也

集成冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷脾胃不和遂成霍亂之證

良姜

附子製

甘草炙

檀香各一錢

乾姜炮一錢

丁香三分

草果一錢

右作二服水鍾半煎八分去渣貯瓶中沉井內待惡服之効

濟生通脉四逆湯 治霍亂多寒肉冷脉絕

吳茱萸三錢

附子製一錢

桂心

當歸

甘草炙各一錢

白芍藥

木通

細辛各五分

若霍亂吐利者加陳皮青皮各一錢名治中湯

乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透然後即進此藥

嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各一錢生姜十片煎服

泄瀉者加橘紅茯苓各一錢名補中湯

溏泄不已者於補中湯內加附子一錢不喜飲食水穀不化者再

加砂仁一錢

霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子二

錢名四順湯

霍亂後轉筋者理中湯內加煨石膏一錢

臍上築者腎氣動也去朮加官桂腎惡燥去朮恐作奔豚故加官桂

傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉用本方可也

其成冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷脾胃不和遂成霍亂之證

良姜

附子製

甘草又

檀香各一錢

乾姜炮一錢

丁香三分

草果一錢

右作二服水鍾半煎八分去渣貯瓶中沉井內待惡服之効

清生通脉四逆湯 治霍亂多寒肉冷脉絕

吳茱萸三錢

附子製一錢

桂心

當歸

甘草各一錢

白芍藥

木通

細辛各五分

右咀作一服水二鍾姜七片棗一枚煎八分無時服

暄正胃散 治霍亂吐瀉不止

枇杷葉 拭去毛炙

厚朴 製

陳皮 去白各一錢

桂 五分

右咀作一服水鍾半姜三片煎八分無時服

選訶藜勒散

治霍亂嘔吐脾胃虛寒氣隔不思飲食

訶子 炮

肉桂

澤瀉

赤芍藥

乾姜 炮

人參 各五分

白朮

陳皮 去白

厚朴 炒各一錢

甘草 炙二分

右咀作一服水鍾半姜三片棗一枚煎六分不拘時服

人參散 治霍亂身體疼痛四肢逆冷服理中四順不効者

人參

白芍藥

當歸

高良姜 各四分

附子 製

陳皮 去白

桂心

白朮 各一錢

右咀作一服水鍾半棗三枚煎七分不拘時服

活命散 治男子婦人小兒霍亂吐瀉不止面色青黑命在須臾

宜服此藥

防風

羌活

獨活

乾姜

細辛 各一錢

官桂 五分

草豆蔻

肉豆蔻

川芎 各五錢

吳茱萸

木瓜 各一兩

右為細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調服

機漿水散 治暴瀉如水周身汗出盡冷脉弱不能言語甚者吐逆

右咀作一服水二鍾姜七片棗一枚煎八分無時服

明正胃散 治霍亂吐瀉不止

枇杷葉拭去毛炙 厚朴製 陳皮去白各一錢 桂五分

右咀作一服水鍾半姜三片煎八分無時服

選訶藜勒散 治霍亂嘔吐脾胃虛寒氣高不思飲食

訶子炒 肉桂 澤瀉 赤芍藥

乾姜炮 人參各五分 白朮 陳皮去白

厚朴炒各一錢 甘草炙二分半

右咀作一服水鍾半姜三片棗一枚煎六分不拘時服

人參散 治霍亂身體疼痛四肢逆冷服理中四順不効者

人參 白芍藥 當歸 高良姜各四分

附子製 陳皮去白 桂心 白朮各一分

右咀作一服水鍾半棗三枚煎七分不拘時服

活命散 治男子婦人小兒霍亂吐瀉不止面色青黑命在須臾

宜服此藥

防風 羌活 獨活 乾姜

細辛各一錢 官桂五分 草豆蔻 肉豆蔻

川芎各五錢 吳茱萸 木瓜各一兩

右為細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調服

要漿水散 治暴瀉如水周身汗出盡冷脉弱不能言語甚者吐逆



不止

半夏 二錢

附子

乾生姜

炙甘草

桂心 各半錢

良姜 二分半

右咀作一服漿水煎服

活人姜附湯 治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗

乾姜 炮

附子 製各二錢

右咀作一服水鍾半煎七分熟服

醫林附子粳米湯 治霍亂四逆吐少嘔多

中附子 一枚製

半夏 兩半

大棗 十枚

粳米 五合

乾姜

甘草 各兩

右為粗末每服八錢水鍾半煎米熟去渣服

糯米姜水 治上吐下瀉心腹疔痛水食不下

糯米 一百二十粒

生姜 一塊

右共一處搗細新汲水解服

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠

人參

炙甘草

淡竹葉 炙各錢

麥門冬 一錢

附子

半夏 製五分

右咀作一服水鍾半姜五片粳米百餘粒煎空心服

良丁香散 治霍亂嘔吐不止

丁香 五分

藿香

枇杷葉 拭去毛各一錢

右咀水一鍾半姜一片煎六分執服

四順附子湯 治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脉沉絕氣少不語

不止

半夏二錢

附子

乾生姜

炙甘草

桂心各半錢

良姜二分

右咀作一服漿水煎服之

活姜附湯

治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗

乾姜燒

附子各二錢

右咀作一服水鍾半煎七分熱服

醫附子粳米湯

治霍亂四逆吐少嘔多

中附子一枚

半夏兩半

大棗十枚

粳米五合

乾姜

甘草各一兩

右為粗末每服八錢水鍾半煎米熟去渣服

糯米姜水

治上吐下瀉心腹疔痛水食不下

糯米一百二十粒

生姜一塊

右共一處搗細新汲水解服

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠

人參

炙甘草

淡竹葉炙各錢

麥門冬錢

附子

半夏製五分

右咀作一服水鍾半姜五片粳米百餘粒煎空心服

良丁香散

治霍亂嘔吐不止

丁香五分

藿香

杜杷葉枚去毛各一錢

右咀水一鍾半姜一片煎六分熱服

四順附子湯

治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脉沉絕氣少不語



身冷汗出

附子生用

白姜炮

人參

甘草炙各等分

右咀每服四錢水鍾半煎七分空心服

胡椒湯 治霍亂煩悶欲死

胡椒粒三十

陳皮

高良姜

桂心各七分

麥門冬去心

乾木瓜各錢半

右咀作一服水鍾半煎六分溫服

狼治命散 脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹禹壅

丁香七枚

葛根

甘草炙

生薑各半兩

鹽一合

右作一服童便鍾半煎一鍾分二次服

雞白湯 治霍亂乾嘔不止

雞白切一握

生薑切半兩

陳皮絲三錢

右水二大鍾煎七分溫服

橘皮湯 治霍亂嘔噦不止

橘皮去白

甘草炙各一兩

枇杷葉拭去毛炙黃二兩

右咀每服三錢水鍾半煎七分溫服

方枳枝湯 治中惡霍亂客邪內干正氣使胃中食物不化氣不宣

通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神冒昧靡所知識此之謂

鬼氣所作也

桃東行嫩枝切一握

梔子仁十四粒

豆豉一兩

身冷汗出

附子主用

白姜炮

人參

甘草炙各等分

右咀每服四錢水鍾半煎七分空心服

胡椒湯 治霍亂煩悶欲死

胡椒三十粒

陳皮

高良姜

桂心各十分

麥門冬去心

乾木瓜各錢半

右咀作一服水鍾半煎六分溫服

良治命散 脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹馬壅

丁香七枚

葛根

甘草炙

生姜各半兩

鹽一合

右作一服童便鍾半煎一鍾分三次服

雞白湯 治霍亂乾嘔不止

雞白切一握

生姜切半兩

陳皮絲三錢

右水二大鍾煎七分溫服

橘皮湯 治霍亂嘔噦不止

橘皮去白

甘草炙各一兩

枇杷葉拭去毛炙黃二兩

右咀每服三錢水鍾半煎七分溫服

狼桃枝湯 治中惡霍亂客邪內干正氣使胃中食物不化氣不宜

通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神冒昧靡所知識此之謂

鬼氣所作也

桃東行嫩枝切握

梔子仁十四粒

豆豉一兩



吳茱萸一兩 桃仁十四粒 麝香二分 當歸二兩
官桂五錢

右咀每服四錢水鍾半姜三片煎七分溫服日三次夜一次

急救方 治心腹絞痛煩悶欲絕此乃陰陽不通名乾霍亂俗謂絞腸痧證急用吐法得免橫枉而死

食鹽半盞用熱湯三四碗泡化令患者吃盡後却以雞翎探吐所吃鹽湯出盡及腹中宿物痰飲俱出其病即愈効如神也

洗漬法 治霍亂轉筋入腹

蘇蓼一束去兩頭煎湯三洗足及腿即止

食鹽煎湯漬之片時愈

易頭方

一方 治霍亂吐瀉用高良姜三斤炒焦剉細酒一升煎三五沸服

一方 治霍亂不吐不下用丁香十四枚為末以熱湯一盞調服

一方 治霍亂腹痛吐下用桑葉搗汁一盞服冬月乾者煎汁服

一方 治霍亂瀉利不止轉筋入腹欲死者用生薑三兩搗爛酒

一升煮三四沸頓服

一方 治霍亂大瀉不止用附子炮製為末每服四錢鹽半盞水

二盞煎一盞溫服立止

一方 治霍亂用厚朴姜汁浸炙為末新水調二錢服

一方 治霍亂吐利不止用扁豆末和醋服之下氣

吳茱萸二兩 桃仁十四粒 麝香二分 當歸二兩
官桂五錢

右咀每服四錢水鍾半姜三片煎七分溫服日三次夜一次

急救方 治心腹絞痛煩悶欲絕此乃陰陽不通名乾霍亂俗謂絞腸痧證急用吐法得免橫枉而死

食鹽半盞用熱湯三四碗化令患人吃盡後却以雞翎探吐所吃鹽湯出盡及腹中宿物痰飲俱出其病即愈効如神也

洗漬法 治霍亂轉筋入腹

蘇蓼一束去兩頭煎湯一斗洗之及腿即止

食鹽煎湯漬之片時愈

治霍亂

一方 治霍亂吐瀉用高良姜三斤炒焦剉細酒一升煎三五沸服

一方 治霍亂不吐不下用丁香十四枚為末以熱湯一盞調服

一方 治霍亂腹痛吐下用桑葉搗汁一盞服冬月乾者煎汁服

一方 治霍亂瀉利不止轉筋入腹欲死者用生姜三兩搗爛酒

一升煮三四沸頓服

一方 治霍亂大瀉不止用附子炮製為末每服四錢塩半盞水

二盞煎一盞溫服立止

一方 治霍亂用厚朴姜汁浸火炙為末新水調二錢服

一方 治霍亂吐利不止用扁豆末和醋服之下氣

一方 治痢後轉筋用扁豆葉一握生搗以醋煎汁服之

一方 治轉筋用赤藜切三合水三合酒一盞煎八分溫服二次

一方 治霍亂吐逆不止用糯米以清水研一碗飲之即止

一方 治霍亂轉筋用香薷濃煮汁服半升立効

一方 治筋脉卒急不得屈伸者用薏苡仁生為末每服二錢米飲調下無時日進三服勿令間斷為妙

一方 治足筋急痛用生姜半斤搗如膏貼裏痛處

一方 治霍亂心痛無汗吐不止用梨枝葉一握水二升煎一升服之神効

一方 用枯白礬為末每服一錢沸湯泡服

一方 治霍亂吐瀉不能服藥用菘豆胡樹各四十九粒研碎水

煎服如渴甚者新汲水調服 一方用胡楸四十粒以飲吞之

一方 治霍亂吐瀉服藥即吐無法可治此方立効井泉水半碗

百沸湯半碗相合服之

外臺秘要 治霍亂心腹脹滿煩痛短氣未得吐下飲好苦酒三

盞少老弱者可飲一二盞

一方 治心腹脹滿霍亂不吐下小蒜一升水三升煮一升半分服

一方 治霍亂轉筋用皂角為末吹一豆入鼻中得嚏瘥

本草方 治霍亂煩躁卧不得安葱白二十莖大棗二十枚以水

二升煎一升以綿漚過去查頓服



一方 治痢後轉筋用扁豆葉一握生搗以醋煎汁服之

一方 治轉筋用赤藜芍三合水三合酒一盞煎八分溫服二次

一方 治霍亂吐逆不止用糯米以清水研一碗飲之即止

一方 治霍亂轉筋用香薷濃煮汁服半升立効

一方 治筋脉卒急不得屈伸者用薏苡仁生為末每服二錢米飲調下無時日進三服勿令間斷為妙

一方 治足筋急痛用生姜半斤搗如膏貼裏痛處

一方 治霍亂心膈無汗吐不止用梨枝葉一握水二升煎一升

服之神効

一方 用枯白參為末每服一錢沸湯泡服

一方 治霍亂吐瀉不能服藥用豇豆胡樹各四十九粒研碎水

煎服如渴甚者新汲水調服 一方用胡樹四十粒以飲吞之

一方 治霍亂吐瀉服藥即吐無法可治此方立効并泉水半碗

百沸湯半碗相合服之

外臺秘要 治霍亂心腹脹滿煩痛短氣未得吐下飲好苦酒三

盞少老弱者可飲一二盞

一方 治心腹脹滿霍亂不吐下小蒜一升水三升煮一升半分服

一方 治霍亂轉筋用皂角為末吹一豆入鼻中得嚏瘥

本草方 治霍亂煩躁卧不得安葱白二十莖大棗二十枚以水

二升煎一升以綿漚過去查頓服

一方治霍亂卒熱心煩渴粟米研泔汁數升飲之瘥

一方治霍亂不吐不下者丁香十四枚為末沸湯調一盞服

一方治沙病發用水紅花根去苗洗淨剉水一碗新磁瓶內煎

至半碗服用新苧麻做頭繩縛髮每年換一次不須藥永不發

一方治霍亂吐下不止艾一把水三升煮一升頓服

肘後方治霍亂吐下後大渴多飲則殺人黃梁米五升水一斗

煮至一升澄清稍稍飲之

千金方治霍亂乾嘔不息以薤葉煎一升服三次立止

一方治霍亂卒熱心煩渴粟米研泔汁數升飲之瘥

一方治霍亂不吐不下者丁香十四枚為末沸湯調一盞服


一方治沙病發用水紅花根去苗洗淨剉水一碗新磁瓶內煎至半碗服用新苧麻做頭繩縛髮每年換一次不須藥永不發

一方治霍亂吐下不止艾一把水三升煮一升頓服


肘後方 治霍亂吐下後大渴多飲則殺人黃梁米五升水一斗煮至一升澄清稍飲之


千金方 治霍亂乾嘔不息以雞葉煎一升服三次立止






© 2007 The Tiffen Company. All rights reserved.





中央研究院民族學研究所圖書館藏書

卅五





古今醫統大全卷之三十九

○瘧證門

病機

內經敘論

經曰諸瘧項強皆屬於濕

王註太陽傷濕

又曰諸暴強直皆屬於風

王註陽內

鬱而陰行於外

劉河間云諸瘧強直筋勁強直而不柔和也土主安靜故也陰瘧

曰柔瘧陽瘧曰剛瘧亢則害承迺制故濕過極則反兼風化制之

然兼化者虛象而實非風也

又云諸暴強直皆屬於風謂筋勁強有力不柔和也然燥金為病

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



三
八
卷之三十九

一

三



古今醫統大全卷之三十九

○瘧證門

病機

內經敘論

經曰諸瘧強皆屬於濕

王註太陽傷濕

又曰諸暴強直皆屬於風

王註陽內

鬱而陰行於外

劉河間云諸瘧強直筋勁強直而不柔和也土主安靜故也陰瘧


曰柔瘧陽瘧曰剛瘧亢則害承迺制故濕過極則反兼風化制之

然兼化者虛象而實非風也

又云諸暴強直皆屬於風謂筋勁強有力不柔和也然燥金為病



BY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



13789 135

