

濟世方治熱滑側栢葉一錢甘草三錢御米殼蜜炒二錢久者倍之水煎服

仲景治寒滑不禁菀花湯止之

王好古曰大凡痢疾乃心腹之患老年入尤非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必致危篤雖欲服此則已晚矣其秦苑地榆黃栢木通之類其性苦寒却難輕服 白痢當服理中湯 血痢當服胃風湯 若五色雜下泄瀉無常用 熟烏頭一兩厚朴乾姜甘草各等分生姜煎服

今之治痢多用駝車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已則服取効若病稍重則非此可療予嘗用斷下湯加減調治百發百中

易簡斷下湯 治下痢無問新久赤白老幼

白朮錢一 茯苓錢一 甘草分五 草薺一枚連皮用

御米殼十四枚去筋膜醋炒 生姜七片 東子烏梅各七

箇水煎服 赤痢加黑豆二粒 白痢加乾姜

五分 又云御米殼治痢如神但性緊瀋多令

人嘔逆既以醋製加以烏梅不致為害然嘔吐
則不可服 又云大率痢疾古方謂滯下多因
腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止
先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便微
劑仍以煎藥服之無不應手作効若脾素弱用
橘紅豆寇粟殼各等分煮麵糊為丸桐子大每
服五十九烏梅湯下煎治泄瀉暴下不止一服
即愈更令藥力相信為佳如覺惡心却以理中
湯四物湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以止瀉

湯水煮木香膏等定其嘔逆

又方治冷痢腸滑頻併 泄瀉服之神効

白朮

炒三兩

乾姜

炒

甘草

炙各一兩半

木香

粟殼

蜜炙

訶子

去核各一兩

肉菓

生十枚

右為末糊丸梧子大每服五十九米湯下

錢氏白朮散 治氣血俱虛神氣衰弱或瀉或痢

脾虛口渴惡心等症

方在泄瀉

一方 治白痢久不効乃寒滑症也治當溫澁

酸石榴皮

半斤

草菓

一斤

陳皮

三斤

烏梅

一斤

甘草十一

乾姜錢一

水煎食前服

遇仙立効散

治諸惡痢或赤或白或膿淡相雜

裏急後重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜

無度或禁不食不問大人小兒虛弱老人產婦

並宜服之

御米殼

去蒂 鹽水炒

當歸各二兩

甘草

地榆

赤芍

酸石榴皮

各一兩

右每服一兩水煎食前服忌生冷油膩

神効參香散

治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調

積而成痢或鮮血或豆汁或如魚腦或下紫黑

瘀血或赤白相雜裏急後重日夜無度不問新

久並治

白扁豆

人參

木香

各一兩茯苓

肉菓

煨各四兩

橘紅

御米殼

去蒂各十二兩

右為末每服三錢米飲下

水煮木香丸

治一切下痢赤白膿血相雜裏急

後重

御米殼

去穢二兩一錢

青皮

去白二兩四錢

甘草

各三兩

當歸

訶子肉

木香

不見火各六兩

右為

末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一鍾煎

化至六七分空心食前服

真人養臟湯 治大人小兒冷熱不調下痢赤白

膿血或如魚腦髓裏急後重臍腹疼痛或脫肛

墜下酒毒便血並治 御米殼去蒂蜜炒 人參

當歸各六錢 肉桂八錢 訶子去核一兩二錢 木香不見火二兩四錢

錢五錢 肉菓麵煨 白朮炒十錢 白芍一兩六錢 甘草一兩

八錢 右每服六七錢水煎食前服臟寒者加大附子

固腸湯 三因方 治冷熱不調下痢赤白

御米殼去蒂醋炙三兩 白芍一兩 當歸 甘草各一兩

陳皮 訶子 白姜炮各五錢 人參 木香各三錢

右每服五六錢水煎七分食前服

益敷固腸丸 治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

木香 赤石脂 乾姜 砂仁 厚朴製 肉菓

煨 各三兩為末麵糊為丸梧桐子大每服五十

丸米飲食前服

白朮安胃散 東垣 治一切瀉痢膿血相襍裏急後

重日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍虛冷

并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止

白茯苓 白朮 車前子各一兩 五味子 烏梅

各五錢 御米殼 蜜炙 二兩

右每服一兩水煎服

仲景飛花湯 治下便膿血不止 赤石脂

乾姜 粳米 水煎服

異功散 治久痢脾胃虛弱 四君子湯各一錢

加陳皮二錢 水二鍾煎八分加姜枣食前服

休息痢

休息痢者愈後數日又復痢下時作時止積年累月不肯斷根者是也此因始得之時不曾推下就以調理之劑因循而致也又或用兜澁藥太

早以致邪不盡去綿延於腸胃之間而作者或

痢愈之後而腸胃虛弱復為飲食所傷而作者

當看輕重調理或熱或寒或消導或再推下然

後以異攻散等補劑加收澁之藥

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息痢取虎

骨炙焦為末日服三次每服二錢

縮砂散 止休息痢 砂仁 炒 為末空心米 一飲下 錢

木香飲 治隔年痢不止並治血痢尤佳

木香 黃連 各五錢 二味同炒 右為末入射香少許

每服二錢米飲下

芎藭散 治禁口紅白久不愈者 川芎 嬰粟

殼去蒂膜 各一兩 為末空心蜜湯調下八分

虫痢

濟世方治似痢非痢挾熱者苦棟根皮去粗皮 晒乾 為

末糯米飲為丸米飲下

瘡痢

瘡未已因食生冷痢作 人參 白朮 茯苓

陳皮 半夏 甘草 生姜 草薹 烏梅川鹽

少許淹少時以厚 帛裹水濕煨熱 水煎未發前服

痢未愈繼之以瘡十味六和湯 藿香 厚朴

赤茯苓 人參 木瓜 香菇 扁莖 杏仁

甘草 砂仁

丹溪治痢活套

丹溪曰下痢初得之時元氣未虛必推蕩之此通
因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜
下虛弱衰老久病宜升之 其或下積腹痛後
重小水短此為裏症宜和中踈氣用炒枳殼製

厚朴為藥陳皮滑石甘草 其或在下則纏住
在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平寒則溫
之熱則清之虛則用參朮補之毒解積下飲食
自進 其或身倦自覺氣少惡食此為扶虛証
宜加白朮當歸身尾甚者加人參又十分重者
止用此一條加陳皮補之虛回而痢自止 其
或氣行積少但虛坐努責此為無血症信用當
歸身尾却以生芍藥生地菴仁佐之陳皮和之
血生自安 其或纏墜減退十之七八穢積已

盡糟粕未實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮菴
苓煎湯下固腸丸二十粒然固腸丸性燥恐尚
有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未可
遽用蓋固腸丸有去濕實腸之功 其或痢後
糟粕未實或粥食積多或飢甚方食腹中作痛
切不可驚恐當以陳皮白朮各半煎服和之而
安 其或久痢後躰虛氣弱滑下不止又當以
藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白礬半夏甚者牡
礪可擇用之然須用陳皮為佐恐太澁亦能作

痛又甚者灸天樞氣海 右前方用厚朴專瀉
凝滯之氣然厚朴性太溫而散氣久服大能虛
人滯氣稍行則去之餘滯未盡則用炒枳殼陳
皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍
重滯氣稍退亦當去之只用陳皮以和衆藥然
陳皮去白有補瀉之功若為參朮之佐亦純作
補藥用 凡痢疾腹痛必以白芍甘草為君當
歸白朮為臣惡寒者加桂惡熱者加黃柏達者
更能參以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈在乎

執方而已哉

禁方

乳香止痛散 治下痢赤白疼痛不已 御米殼

去穰蜜 炒五錢 橘紅 五錢 炙甘草 五錢 乳香 二錢 另為末

浸藥 二錢 另為末 水煎去渣入乳浸食前服如白

痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮四錢

治男婦老幼赤白痢 紅花 胡椒 等分為末

紅棗煮肉搗為丸如梧桐子大白麵為衣

赤痢甘草湯下三十一丸 白痢姜湯下先

通為度次早空心再服三十九不拘紅白俱
以滾水下即愈
不治症及危症

下如魚腦者半生半死下如塵腐色死下如屋漏
水者死下如竹筒注者不治下痢純血身熱而
脉洪數者死

王節齋治例

痢乃是濕熱食積三者別赤白青黃黑五色以
屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分

白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕
熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是
下之下症未愈隨症調理稍久者不可下胃虛
故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者
宜溫年老及虛弱人不宜下

主方 黃芩炒三錢五分 黃連炒一分 白芍炒二錢 已

三味痢疾必用之藥 木香一分 枳殼炒一分 檳榔三分

甘草炙三分 若腹痛加當歸一分 石仁錢一 再加

木香為藥各五分 若後重加活石炒一分 再加

枳殼檳榔各五分

芍藥生用再加五分

條芩亦加五分

若白痢加白朮茯苓炒滑石陳皮各一錢

初欲下之加大黃五錢 兼食積加山查枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎各一分 薤仁各一分

初欲下之再加大黃五錢

若紅白相襍加當歸薤仁川芎各一分 以理血活

石陳皮蒼朮各一錢五分 以理氣有山查枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減連芩芍藥各七分

加白朮一錢五分 黃芪茯苓陳皮各一錢 砂仁五分

去檳榔枳殼再加乾姜炮五分

若紅痢人虛弱血虛或下後未愈減芩連各五分 加

當歸川芎熟地黃阿膠陳皮各一錢 白朮一錢五分

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澁少加木通澤

瀉茯苓各一錢 山梔炒五分 以分利之

若血痢加當歸生地薤仁炒 槐花各一錢 久不愈減

芩連各七分 去檳榔枳殼再加阿膠炒 側柏葉各一分

五分 乾姜炒黑一錢 白朮一錢五分 陳皮二錢

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼

用條芩加升麻一錢以升提之

若嘔吐食不得下加軟石膏一錢五分陳皮一錢

山梔仁炒五分入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者四物湯加入參白朮陳皮

黃連黃芩阿膠之類補之而痢自止

有一樣寒痢用黃連木香為藥當歸乾姜砂仁厚

朴肉桂之類

若得痢而悞服溫熱止澁之藥則雖稍久亦宜用
前法以下之後方補之

若得痢便用前正法下之而未愈又用前調理法

治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補

寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂御米殼烏毒

肉等收澁之藥

胎前痢疾

本事方 治婦人胎前產後不拘赤白生姜二觔

搗取自然汁以鴨子一枚打碎入姜汁內攪勻

煎之至八分入蒲黃三錢再煎五七沸空心溫

服立効

大全良方

治妊娠素弱下痢頻併腹痛瘦甚面

色痿黃不進飲食

厚朴半一兩

白朮 川芎

白芍

熟地黃

當歸

干乾

人參

各二兩

訶子錢三

甘草錢一

右服五六錢姜三片水煎服

黃芪當歸湯

治妊娠下痢腹痛小便澀

當歸

黃芪

各一兩

糯米

右和勻水煎分四服

羅大無大寧散

治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼

痛垂死者

黑荳

三十粒

粟殼

二兩一兩半生

甘草

二兩半生半炒

右加姜三片水煎食前服神效

大全良方

治妊娠挾熱下痢亦治男子常痢

黃連

黃栢

各二兩

梔子

二十枚

右每服六七錢水

煎濃服

若嘔者

加陳皮

一兩半

生姜

三兩

黃連湯

治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連

分八

厚朴

製

阿膠

炒

當歸

乾姜

各六分

艾葉

黃栢

各四分

右為末

空心米飲調下

方

十七日三服

厚朴散

治妊娠下痢黃水不絕

厚朴

姜製三兩

黃連

三兩

肉苳菹

一枚連皮用

右為粗末水煮頓服

內藥飲 治妊娠臟氣本虛脾胃衰弱臟腑虛滑

厚朴姜製二兩肉苳一枚麩一枚

麻腹疼痛日夜無度 右吹咀每服五錢姜三片水煎服

阿膠湯 治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後

血暈崩中久痢 阿膠二兩酒二升半煎取一升頓服

宣明白朮湯 白朮 黃芩 當歸

各等分水煎食前服

產後痢

救急散 治產後赤白痢腹中絞痛

白芍炒好酒 阿膠 艾葉 熟地各一兩 甘草

當歸各三兩 每服二兩水煎濃空心服

當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及療

產後血暈崩中久痢 方見妊娠腹痛

經驗方 治產後胎前痢疾

龜甲一枚 米醋炙為末醋湯調下

丹溪治婦人患墮胎後膈滿食少痢不止脉虛左

手尤甚 滑石 白芍 蒼朮各五錢 白朮二錢

乾姜四錢 茯苓一錢 訶子二錢 為末水煎下保

和丸四五十粒

雲箕子治產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃
連御米殼等藥

仲景白頭翁甘草阿膠湯熱經謂新產重下虛極

白頭翁 阿膠各三兩 黃連 黃柏 秦皮各二兩

甘草二兩 分三服水煎食遠服

產後血痢小便不通臍腹疼痛

主馬齒莧搗汁二合煎一二沸下蜜一合調頓

服 八卷終



赤水玄珠氣門第九卷目錄

氣

九氣見症

血

嘔吐血

咳血

咯血唾血痰涎血

鼻血舌衄

齒衄

肌衄


小便血

下血

九竅出血

中蠱下血

金瘡出血



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



目錄終

赤水玄珠第九卷

新安生生子孫一奎著輯

氣明

內經曰百病皆生于氣：一也因所觸而為九怒
喜悲恐寒熱驚思勞也故怒則氣上喜則氣緩悲
則氣消恐則氣下寒則氣收足則氣泄驚則氣亂
思則氣結勞則氣耗

九氣見症

怒氣所至為嘔血為殮泄為煎厥為薄厥為陽厥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

為胃滿脇痛食則氣逆而不下為喘渴煩心為消
瘵為肥氣為目暴盲耳暴閉筋縱發于外為腫
喜氣所至為笑不休為毛革焦為肉病為陽氣所
收甚則為狂

悲氣所至為陰縮為筋攣為肌痺為脉痿男為數
洩血女為血崩為酸鼻辛頰為目昏為少氣不能
報息為泣則臂麻

恐氣所至為破胭脫肉為骨痠痿厥為暴下綠水
為面熱膚急為陰痿為懼而脫頤

驚氣所至為潮涎為目覈為口喏為痴癇為不省
人事為僵仆久則為瘖痺瘖音裙痺也

勞氣所至為噎病為喘促為嗽血為腰痛骨痠為
肺鳴為高骨壞為陰痿為唾血為冥視為耳閉男
為少精女為不月

思氣所至為不眠為嗜卧為昏目為中痞三焦閉
塞為咽嗑不利為痺疸嘔苦為筋痿為白淫為不
嗜食

寒氣所至為上下所出水液澄徹清冷

炁氣所至為喘嘔吐酸暴注下迫

凡此九氣內經以五行相勝之理治之故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以譁浪褻狎之言娛之恐可以治喜以遽迫死亡之言怖之怒可以治思以污辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼忘此之言奪之五者之外炁可以治寒：可以治炁逸可以治勞習可以治驚要在審証察脉而施治之不可執一也脉沉實者宜下絃急者宜溫虛細微弱者宜補痛

在上者宜散痛在下者宜利氣虛者宜鎮墜氣結者宜踈順

夫治氣之法惟在適中氣積于中固宜踈順踈導過劑則又反耗元氣元氣走泄則下虛中滿之証生焉故曰踈啓于中峻補于下中滿既除下虛斯實此之謂也

治有餘之症脉沉實而中滿大便秘按之疼則宜下法當用大黃然亦須入桂皮以辛溫和其氣以苦寒泄其實氣得泄越痛亦隨愈

凡用利藥其法有三駛利則用大黃芒硝溫利則用硫黃乳粉瀉積則用巴豆礪砂他如磨積化結聚則以三稜蓬朮為先導引閉塞則以木香檳榔先使溫散凝滯則以姜桂為主踈順暴戾則以蘇橘為宜補虛益氣則以人參白朮為君墜下輔陽者以黑錫養正為鎮

生生子曰治氣之劑東垣有法可準如枳壳利肺氣多服損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣木香行中下焦氣香附快滯氣陳皮泄逆

氣紫蘇散表氣厚朴瀉胃氣檳榔瀉至高之氣藿香馨香上行胃氣沉香升降真氣腦麝散真氣若此之類氣實所宜設認冷生氣而槩以燥熱投之是以火濟火病日益甚丹溪曰氣有餘即是火乃戒好用溫熱治氣者之悞也

原病式曰氣為陽而主輕微諸所動亂勞傷乃為陽火之化子和河間治喜怒悲恐思之証皆以平心火為主至于勞者傷于動、便屬陽驚者駭于心、便屬火故治皆以平心火為主深中

病情又曰五志過極皆為火也若用香辛散氣燥熱傷氣真氣耗散濁氣上騰猶曰腎虛弗能攝氣歸原遂用降氣鎮墜之劑不悟肺受火炎子氣亦弱降令不行火無所制丹溪有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱為甚自覺其冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此証認假作真似是之禍可勝言哉又曰氣無補法俗論也痞悶壅塞似難于補不思正氣虛者由七情勞傷所致脾土受傷轉輸失職胃雖

脈法

受穀不能運化故陽升陰降而成天地不交之否清濁相混若不補養邪何由行

下手脈沉便知是氣極沉則伏瀦弱難愈其或沉滑氣兼痰飲滑者血多少氣瀦者少血多氣大者氣血俱多脈來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少

七氣湯 治七情之氣鬱結心腹絞痛

人參 炙甘草 肉桂 各一錢五分 半夏 一錢

姜三片水煎服

指迷七氣湯 治同上

香附 二錢 青皮 陳皮 桔梗 蓬朮 官桂

益智仁 藿香 半夏 甘草 炙

各等分姜三片棗二枚水煎服

縮砂香附湯 調中快氣治心腹刺痛

香附 炒 十 烏藥 五兩 炙甘草 二兩 砂仁 二兩

右為末每服一錢紫蘇葉三片鹽少許沸湯

調下 大便秘陳皮湯下

一方去烏藥加沉香五錢

大七氣湯 治喜怒不節致臟氣不平心腹脹滿

半夏 茯苓 各四錢 厚朴 三錢 柴蘇 二錢

加姜水煎服

木香流氣飲 諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛

浮四肢腫滿

半夏 厚朴 青皮 紫蘇 香附 甘草 各一錢

錢陳皮二錢桂 莪木 丁皮 大腹皮

麥門冬 檳榔 木香 草果各六分木通八分

藿香 白芷四分茯苓 白木 木瓜 人參

石菖蒲 加姜棗水煎服

秘傳降氣湯 上盛下衰氣不升降頭目昏眩痰

實嘔逆胸膈不快怒則氣上驚則氣亂尤宜

骨碎補 訶子 草果 五加皮 半夏各五分

桔梗五分桑白皮 地骨皮 枳壳 陳皮

甘草各一錢水煎服

升陽順氣湯 七情所傷及勞役飲食不節滿悶

短氣恐則氣下者尤宜

升麻 柴胡 陳皮各一錢五分半夏 人參各三錢

黃芪四錢甘草 黃栢各五分川歸一錢神曲炒一分

草荳仁二錢每服五六錢姜三片水煎服

蘇子降氣湯 治中脘不快心腹脹滿噎塞喘促

咳嗽痰涎宿食留飲脇下支結及脚氣冲心

方在痰飲門

分心氣飲 憂思留滯致使心胸痞悶脇肋脹滿

噫氣吞酸頭目昏眩日漸瘦弱或大腸虛秘

紫蘇莖葉四兩羌活 半夏 肉桂 青皮 陳皮

桑白皮 大腹皮 木通 芍藥 炙甘草

赤茯苓各一兩

每服五六錢姜三片枣二枚灯心十根水煎

四磨湯 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

方在喘門

推氣丸 治三焦痞塞大便澀小便赤黃

方在脹滿門

神保丸 治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥不

効者 方在脹滿門

檳榔木香丸 疎導三焦破痰飲快氣消食

木香 檳榔 枳壳 杏仁去皮 青皮各一兩

半夏曲 皂角去白 郁李仁去皮各

各為末另以皂角四兩用漿水一碗搓揉成

膏更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五

十丸姜湯下

九氣丸 治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣

驚氣怒氣瘴氣積聚堅牢如杯心腹疼痛時作時止

姜黃 甘草 香附

為末每服一錢入鹽少許百沸湯點空心服立効

賺氣散 治胸膈痞悶腹脇虛脹氣不宣通及傷

寒而脇刺痛攻心

三稜 蓬朮煨各五錢 白朮三錢 枳壳一錢 木香五分

每服二錢加姜三片水一鍾半煎八分食前

服用砂糖少許壓下

分氣紫蘇飲 治心下脹滿脇疼氣塞嘔逆不止

方在喘門

勻氣散 胸膈脹滿宿冷不消心腹刺嘔吐

丁香 檀香 木香 白豆仁各一兩 藿香

甘草炙各八兩 砂仁四兩

為末每服二錢入鹽一字沸湯調服

復元通氣散 氣不宣通流利并閃挫腰脇氣痛

茴香炒 川山甲蛤粉炒 延胡索炒 白丑炒

陳皮 甘草各一兩 木香一兩

為末每服二錢熱酒調服 一方加乳香沒藥

清膈丸 因濕熱氣滯

黃芩 黃連炒各五錢 香附半一兩 蒼朮二兩

為末取黃熟瓜萋去皮搗爛和丸菴豆大每服三五十九

桔梗枳壳湯 諸氣痞結滿悶

桔梗 枳壳各四錢 甘草炙一分 生薑五片水煎

升降六一湯

香附六兩炒 藿香一兩 為末每服二錢白湯下

二聖散 諸氣痛

芫花醋煮乾五錢 延胡索炒一兩五錢 二味為細末每服

一錢 男子元臟氣痛葱酒調下

婦人血氣痛川歸酒下 諸氣痛薄荷湯下

小腸氣痛茴香湯下

勝金散 治男婦一切冷氣

烏藥酒浸微炒 茴香炒 青皮去白 良姜等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

婦人用姜煎童便調服

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食

半夏三錢 陳皮 白朮 甘草炙 桂心各五錢 人參

一兩厚朴二兩 每服五錢姜五片棗三枚水煎服

手拈散 一切氣痛

草果 延胡索 乳香 沒藥 五靈脂酒拌炒

等分為末每服二錢好酒調下 一方加良姜

一人病氣上冲口中出如烟霧耳內常鳴此衝脉

逆上與八物湯加炒黃連二分 黃栢三分 數劑而愈

蘇合香丸和劑方 專能順氣化痰并治傳尸骨蒸癆

療卒暴心痛鬼魅瘴瘧赤白下痢小兒驚搐等症

沉香 射香研 丁香 青木香 訶梨勒煨用皮

安息香另為末用無灰酒一升熬膏 香附子炒去毛 葶撥

白朮 白檀香 硃砂研飛 烏犀角各二兩 薰陸香

另研 龍腦研 蘇合油入安息香膏內 右末研勻用安息

膏并蜜九梧子大空心溫水化下四九酒亦

可

諸見血症摠論

內經曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰夫
 怒則形氣絕而血菀于上又曰脾移熱于肝則
 為驚衄胞移熱于膀胱則癃而尿血又曰結陰
 者便血一升再結二升三結三升夫血者生化
 于脾總統于心藏受于肝宣布于肺施泄于腎
 灌溉一身陰氣一傷變生多病妄行于上則吐
 衄衰涸于中則虛勞忘反于下則便紅移熱膀
 胱則癃閉溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏



則為崩中濕蒸熱淤則為滯下熱極腐化則為
臟血火極似水血多紫黑熱勝于陰則為瘡瘍
濕滯于血則為痛痒隱疹皮膚則為冷痺畜之
在上則為喜忘畜之在下則人喜狂墮恐跌仆
則淤血內凝又細分之則咳血衄血出于肺嘔
吐出于胃痰涎血出于脾咯血唾血出于腎便
血清者屬營虛有熱濁者屬熱與濕色鮮者屬
火黑者火極血與泄物並下者屬有積或絡脉
傷也尿血因房勞過度陰虛火動以致營血妄

行而或者又以此為得之虛寒當以脉別有嘔
吐紫凝血者原病式云此非冷凝由熱甚銷燦
以為稠濁而熱甚則水化制之故赤兼黑而紫
也又有汗血者由夫大喜傷心喜則氣散血隨
氣行故也又下血先見血後見便為近血自大
腸來先有便後見血此遠血自小腸來腸胃中
本無血良由氣虛腸薄故血滲入而從下出也
東垣曰除傷寒家衄血外雜病見血多責其熱
旨哉言乎大凡血上行為逆其治難下行為順

其治易若血上行或唾或嘔或吐忽變而下行為惡痢者吉兆也丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰衰有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經矣

素問曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何、以得之岐伯曰病名血枯以得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之柰何復以何術岐

伯曰以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小菝以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也

王海藏云胸中聚集之殘火腹裏積久之太陰上下隔絕脉絡部分陰陽不通用苦熱以定于中使辛熱以行于分升以甘溫降以辛潤化嚴肅為春溫變凜冽為和氣汗而愈也然餘毒土苴猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁而思涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰再作脉

退而小絃細而遲激而為衄血唾血者有之心
肺受邪也下而為便血溺血者有之腎肝受邪
也三焦出血色紫不鮮此重沓寒濕化毒凝泣
水穀道路浸積而成若見血証不詳本源便用
涼折變乃生矣陽証溢出鮮血
陰証下如豚肝

上而血者黃芪桂枝湯 白芍當歸湯

中而血者當歸建中湯 增損胃中湯

下而血者芎歸朮附湯 桂附六合湯

若三血証在行陽二十五度見黃芪四君

子主之

若三血証在行陰二十五度見當歸四逆
加吳茱萸主之

生生子曰按海藏以論雖為傷寒而發實戒用藥
者要認血來本原不可妄治以致變亂夫治血
當明血出何經時師多宗丹溪有曰吐血衄血
多是火載血上錯經妄行越出上竅以論固是
猶有未盡乃所以啓後人過用寒涼之惑也夫
火者無形之氣也非水可比安能稱載蓋血隨

氣行氣和則血循經氣逆則血亂氣有餘即是火也實由氣逆而血妄行兼于火化因以為甚經曰怒則氣逆甚則嘔血暴痺內逆肝肺相搏血溢鼻口是也又東垣曰血妄行上出于鼻口者皆氣逆也况血得寒則凝得熱則行見黑則止迹以觀之治血若不兼之調氣而純以寒涼是施則血不歸經而且為寒涼所凝滯雖暫止而復來也且脾統諸血寒涼傷脾虛尤不能約束諸血其變証可勝言哉

素問示從容論曰夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不為使真臟壞決經脉傍絕五臟漏泄不衄則嘔

綱目云傷肺即傷氣也當于氣虛不能攝血條
參治

戴元禮云吐血者榮氣溢入濁道留聚膈間滿則吐血名曰內衄宜蘇子降氣湯加人參阿膠飲酒太過傷胃吐血用理中湯加青皮梔子乾葛川芎勞太過吐血不止蘇子降氣湯加人