

4
6
178

東 京 國 書 館

一 七 八 六 冊	号	五 架	四 函	類
-----------------------	---	--------	--------	---


外科拾要

六

東宋府
醫學司
圖書印

外科
拾要

科拾要卷六目次



第三十五編項

○眼症 ○黑球內障 ○結膜、角膜、斜視、眼

○耳疾 ○耳聾 ○耳漏 ○耳癢 ○耳

○鼻疾 ○鼻淵 ○鼻瘻 ○鼻竇 ○鼻

○口瘡 ○口燥 ○口乾 ○口裂 ○口

○喉症 ○喉痛 ○喉癢 ○喉癰 ○喉

○咽症 ○咽痛 ○咽癢 ○咽癰 ○咽

○食道狹窄 ○咽頭異物硬塞 ○胃

○咽頭、氣管及氣管支內異物硬塞 ○

咽喉外傷 ○甲狀腺肥大

第三十六編 胸部兼乳房病及損傷

- 穿胸術
- 乳房變大
- 乳房急性燉術
- 慢性乳房瘤
- 乳房肉瘤及纖維成形瘤
- 乳房毒瘤
- 乳房截除術

第三十七編 腹部病及損傷兼腸墜

- 穿腹術
- 卵巢病
- 穿腹創
- 人工肛門
- 腸墜
- 慢性不復
- 急性不復
- 鎖肛
- 肛門
- 痔疾
- 直腸潰瘡

外科拾要卷六目次終

外科拾要卷六

英國 拘刺兒屈氏編集

日本 奧山虎炳 閱 半井成賢 譯

○ 黑内障

スアウロシハ網膜、視神經及腦ノ病ヨリ

○ 結膜、角膜ニ異物侵入

ホレイン、ボリス、オフ、ゼ、コル

ア子睫毛、砂塵ノ動モスレハ結膜ニ牢着シテ眼球

近我醫術大ニ進歩シ照眼鏡ニテ其深組織ヲ洞

察スルニ至リ益々其名稱ノ無稽ナルヲ發見セリ

生シ眼容ヲ變ヒス視力減少、昏朦スル症ニノ晚

生シ眼容ヲ變ヒス視力減少、昏朦スル症ニノ晚

ニ大不安ヲ生スルアリ若速ニ之ヲ去サレハ甚
 夕炊衝ス是物大抵上瞼縁ノ直上ニアリ故ニ之
 ヲ去ニ先上瞼ヲ翻轉シ其法醫士ノ甲手ニ消息
 半印埋ニノ熾ニ上瞼ニ貼シ乙手ノ示指ト抑指
 ヲ以テ其中央ノ睫毛ヲ外方ニ挈攀シ消息子ニ
 テ輕々眼瞼ヲ壓シ其眼球ヲ下轉セシムレハ
 眼瞼軟骨隨テ上翻シ結膜而ヲ露出スヘシハ
 馱毛刷子、鷲翼、スボード（按）中央端ニ少ク彎曲シ
 子ノ如ク用ヒ其異物ヲ去リ若異物ノ結膜中ニ
 キ者ノ如ク用ヒ其異物ヲ去リ若異物ノ結膜中ニ
 嵌入スル片ハ廣キ針尖ニテ之ヲ挑出シ或ハ細
 キ鑷子ヲ以テ其膜ヲ鉤攀シ剪刀ニテ之ヲ截去
 スヘシ（但之ニ由テ得ル微細ノ創痕ハ角膜中ニ
 不日癒合シ決メ癒痕ヲ殘サス）

嵌入セル異物（金屬、砂粒、石炭ノ尖端等）ハ其膜ノ彈力ニ由リ
 殆ント去リ難シ之ヲ去ニハ先患者ノ眼球ヲ旋
 轉ノ便宜ノ位置ニ定位セシメ「スボード」及内障
 眼ノ刀尖ニテ撥去スヘシ尚異物更ニ深在シ或
 ハ患者自ラ眼球ヲ運動スル能ハサル片ハ迷蒙
 水ヲ吸入セシメント要ス

○ 眼球外傷

ズ、アイボール、オ、ノ單純ナル片最モ稱ス

ヘキ療法ハ先眼瞼ヲ閉テ絆創膏條ヲ以テ之ヲ
 定位シ布墊ヲ置キ細帶ヲ施シ其炊衝ヲ發スル
 ヤ蟻針蒸劑ノ如キ尋常消炊法ヲ行フヘキモ外

傷ニ兼テ異物ノ侵入スル者ハ勉テ之ヲ一頓ニ
除去セシ但之ヲ除去スル能ハサレハ他ノ
單純創ノ如ク之ヲ療スヘシ

○ 眼球瘤

ゼ、アイ、ボル、ル、オ、フ、幼兒ニ在ヤ軟瘤ノ者多

ク先網膜、脈絡膜ニ發ノ急ニ增長シ眼球内ニ充
實シ終ニ其諸膜ヲ破リ芝菌狀ヲ帶ビ眼瞼間ニ
凸出ス但高老ノ輩ハ大抵脈絡膜ニ黒瘡ヲ生シ
其發消緩慢ナレバ初期ニ在テ照眼鏡ヲ用ヒ之
ヲ辨スヘシ又嬰兒ノ眼底ニ腺病性產物ヲ生ス
ルハ多ク見ル所ニシテ此症終ニ眼球ヲ崩潰スル

ト示他ノ眼症ニ異ナラス

○ 治法

此症ハ眼球ヲ截除スルヲ最良法トス即球

圍ノ結膜ヲ剥キ之ヲ翻轉メ其諸膜ヲ斷テ輕々
眼球ヲ前ニ牽キ曲剪刀ヲ以テ視神經ヲ切リ冷
水ヲ濯キ其出血ヲ止メ次ニ眼窩ニ英布水ニ漬
ヲ充填スヘシ

○ 斜視眼

スキインテンダ又ハ眼球視軸間ノ平線

ヲ失スル者ニメ其名ヲ斜視眼トスハ外斜視ト
云一兩眼ニアル者ハ單斜視ト稱ス稟賦、生活ノ或ル時限、眼
球各對筋ノ平均ナラサルニ關ス但其原因ニ數

種アリ即生齒、蟲症ノ刺衝、熱病、發疹ノ續發症、片
 眼衰弱ノ旋轉ヲ缺キ、近視眼、遠視眼等ノ如キ眼
 力不足スルニ起リ或ハ角膜雲翳ノ為ニ斜ニ其
 眼ヲ使用スルニ由リ又腦水、拘攣及腦髓ノ壓迫
 ニ併發スル者モ少カラス

治法 原因ニ從ヒ同カラス故ニ腦ノ器械病ニ由
 ル者ハ治法ナキモ其壓迫性ナル片ハ勉テ其源
 因ヲ去リ刺戟性ハ適宜ノ藥劑ヲ處スヘシ但其
 遺傳性ニノ長ク治セズ視力健全ニノ腦及網膜
 病ナキ者ハ施術シ緊張セル筋腱ヲ離斷其腱ノ
 眼球端ノ

ニ密接セシメテ要ス詳ニ云ヘハ内斜眼ハ内直筋
 ヲ切り外斜眼ハ外直筋ヲ截ヘシ但先迷蒙水ヲ
 吸入セシメ鑷子ヲ以テ其腱ノ下縁ニアル結膜
 ヲ舉テ剪刀ニテ之ヲ斷テ鈍鈎ヲ腱下ニ輸シ次
 ニ結膜底ヲ剪斷スヘシ或ハ其腱ノ上縁ニアル
 結膜ニ第一ノ一孔ヲ穿
 テ以テ漏出セル血液
 ノ通路トナスヲアリ

○耳症

臍蠟齧積

多キニミレシヨ、オフ、臍蠟ノ毛髮表皮

ト混和ノ暗褐色ノ硬塊トナリ外耳道ニ塞住シ
 終ニ耳聾、耳鳴ノ症ヲ發スルニ至ル

治法

少量ノ橄欖油、グリセリン、ヲ混和シ、毎夜耳中ニ適シ、毎朝水節ヲ以テ輕々之ヲ濯キ湯、石鹼水等ヲ連用ノ賦蠟ノ去ニ至ル

耳漏

膿汁、粘液膿汁ノ耳道ヨリ漏出スル症ニノ或ハ外耳道ノ焮衝ニ源ク、腺病小兒ノ如ク或ハ内耳道ノ疾病ニ基ク、猩紅熱ノ繼症ノ如シ、甲種ハ微温湯、收斂劑ヲ注入水節ニテシ兼テ全身ノ健康ヲ保全スヘシ、乙種ニソ、鼓膜穿貫スル片ハ其病勢甚ク劇烈ニノ腦膜焮衝、腦髓膿瘡、靜脈焮衝及爾他ノ合併症アリテ危嶮ニ陷ル

ノ勢アル故ニ其急性諸症未ク去サル時間ハ先ツ耳后ノ蟻針、蒸劑、下劑、諸鹽類ノ如キ有力ノ治法ヲ要シ、次ニ強壯劑ヲ處スルヲ最良トス

耳道瘰肉

ポラスライ耳道ノ底面ヨリ海綿様ノ瘰肉ヲ生シ、其質纖維成形組織ヨリナリテ赤光ヲ放

チ、其附着面或ハ廣底ヲ多ハ粘液膿汁ヲ漏泄ス、有シ或ハ狹莖ヲ形ル、多ハ粘液膿汁ヲ漏泄ス

治法 鑷子又ハ剪刀ニテ之ヲ截リ、后其發生点ニ

腐蝕藥ヲ貼スヘシ

耳道異物

ボイレーン、ボ豆、珠ノ如キ異物ノ耳道ニ

硬塞スル片ハ太ク苦惱、驚愕スルナリ、是症ヤ先

耳鏡又ハ圓錐形ノ白紙ヲ以テ光線ヲ耳道ニ射入スレハ其術容易ナリ細キ鑷子又ハ匙子ヲ輕々耳道ニ進入メ其異物ヲ鈎出シ或ハ微温湯ヲ注入メ之ヲ流出セシム然レハ以上諸法効ナキ片ハ之ヲ閱キ其自然ニ逃出スルヲ待ヘシ即強テ之ヲ鈎出セシム

○鼻症

衄血

タエビス、ハ手術后或ハ損傷ニ續發シ或ハ充

血、血積、血鬱ニ心、肺ノ疾病ヲ兼ル者、鼻道ノ髓腫、貧血症矢昔兎陪苦熱等ニ生ス但中年充血家ニ殊

眩暈シ易ク或ハ其逆部ニ起ル片ハ倉黄トノ其ノ疾患及全身諸病ニ關スル者ニ在テハ止血療法ヲ行ハサルヲ得ス即患者ノ頭部ヲ高擧シ冷水ヲ鼻窩ニ注キ或ハ家猪ノ膀胱ニ冰片ヲ盛リ前額ニ貼シ或ハ麻質枯末、沒食子末ヲ鼻竅ニ吹入シ收斂劑明礬水、過格魯ヲ鼻道ニ注入シ前鼻竅ヲ塞クニ英布其宜ニ從ヒ收斂劑ヲ浸漬スヲ以テス以上ノ諸法効ナキヲ見ハ兼テ后鼻竅ヲ塞クヘシ後鼻竅ノ栓塞法ハ導尿管、彈性消息子或ハ過衄

器ニ細キ糸條ヲ貫キ鼻窩ノ牀底ヲ傳リ前進ノ其末端ヲ軟口蓋下ニ露出シ別ニ鑷子ヲ咽頭ニ輪シ糸條ノ一端ヲ口窩外ニ牽出シ次ニ鼻窩ノ器械ヲ徹シテ糸條ヲ殘シ即之ニ由リ其糸條ハ後鼻窩ヨリ軟口蓋ヲ迎リ一端ハ鼻道ヨリ外出或ハ海綿ノ一塊ヲ繫キ其糸端ヲ距ル十二印ヲ在上ノ糸條即鼻窩ニヲ輕々抽去スレバ己ニ繫著セシ栓子英布、口窩ヨリ軟口蓋后ヲ經、后鼻竅ニ達ス是ニ於テ其糸條ノ兩端ヲ結束シ栓塞ヲ恰貼ノ兩三日ニ至ルヘシ但其自然ニ寬鬆トナルニ及フヘシ尚

是法ニ由リ前後ノ鼻竅ニ栓塞ヲ要スル間々アリ

鼻瘤マリボハ鼻梁ノ外面ニ生メ圓頂ヲ有シ逐次ニ増大メ一二個ノ圓塊ヲ瓠繫ス是物皮膚、皮下蜂巢織及脂肪ノ滋養過度ニ源シ其皮膚粗糙ニメ皮脂腺較著トナリ脈管隆起メ其瘤紫色或ハ鉛色ヲ帯ヒ終ニ甚シキ畸形ニ變シ大ニ不便ヲ生スルニ至ル

治法 初期ニハ刺戟、收斂ノ諸液ヲ洗劑トナスヘキモ其鼻、口ノ使用ニ不便ヲ生スルニ抵レハ之ヲ截除スヘシ

○鼻蛇

鼻蛇 ボライ ニ二種アリ甲ハ膠質ニメ粘膜、粘膜下

組織源ノ延張ヨリナリ通常數個ヲ簇生シ梨子

状ニメ急ニ發育シ常ニ鼻窩ノ外壁ニアリテ上

甲介骨ト連接ス乙ハ纖維質ニメ骨膜ヨリ生シ

多クハ蚊蝶骨ニ附キ或ハ後頭骨ノ基礎突起ニ

連ル但其數ハ通常一個ニメ廣底ヲ以テ緩ニ發

育シ纖維織、纖維蜂巢織ヨリナリ輒スレハ變質

メ惡性ニ轉シ易シ

徵候鼻ノ分泌物多ク其粘膜變厚メ血齶ヲナシ

曇天ニ在テ呼吸困難ニメ嗅機缺損、聲音變更、耳

聾ノ或ハ腦症ヲ合併スルニ至ル之ヲ檢スルニ

ハ光線ヲ鼻竅ニ放チ或ハ照喉鏡ヲ將テ後鼻竅

ヲ照スヘシ然レニ甚キ者ハ鼻ノ外面ニ畸形ヲ

露スニ至ル

治法鼻蛇鑷子或ハ結紮法ヲ以テ之ヲ去ニアリ

其法先患者ヲ低キ椅子ニ仰居セシメ鑷子ヲ鼻

竅ニ輸シ瘰肉ノ根脚ヲ拮住シ之ヲ旋轉摘去ス

ル下數回ニメ瘰肉ノ全ク盡クルヲ度トス此法

種ニ尤モ結紮法ハ複孔ヲ有セル小管息子消ヲ

以テ糸條ノ係蹄ヲ鼻竅ニ輸シ瘰肉ヲ繫キ次ニ

之ヲ緊束ス可シ 此法最モ乙種ニ適ス

○鼻窩癌腫 カンセル、カガイチ 前章已ニ示セシ纖維

維瘰肉ノ變性シ惡候ヲ呈スル外此窩ハ尚軟癌

ナル惡症ヲ發シ易クメ 大抵小兒 或ハ鼻窩ニ源

發シ或ハ上顎竇ヨリ將來シ急ニ發育メ遂ニ鼻

骨ヲ擴張シ大ニ畸形トナル 此物多ク惡息

○治法 只截除ノ一法ニメ之ニ由リ數年ノ命期ヲ

延長スルヲ大幸トナスヘシ

○腦漏 ハ特異ノ惡息ヲ帶タル液汁ヲ鼻道ヨ

リ排泄スル一症ニメ大抵腺病家ニ特發シ又微

毒、瀕劑誤用ヨリ生ス但甲ニ在テハ單ニ粘膜變

厚スルノミニモ其健康ヲ失ハサルモ乙ハ潰瘍

トナリ終ニ骨質ヲ侵ス者アリ

○治法 第一光線ヲ以テ鼻道ヲ檢シ可及的粘膜ノ

景況、排泄物ノ源性ヲ確定シ或ハ瘰肉ト異物ノ

有無ヲ探リ若其裏膜ノ變厚潰瘍ニ因スル片ハ

屢蒸氣吸入法ヲ行ヒ收斂刺戟、淨氣洗劑等ヲ注

入ス可シ就中最良ノ洗劑ハ微温湯ニ少量ノ格

魯兒石灰、格魯兒曹達ヲ加エ頻用スヘシ尚其摸

樣ニ從ヒ全身ノ健康ヲ扶助スルハ必要ニソ

腺病家ノ如キハ殊ニ然リトス

○ 上顎骨竇膿瘡

ゼアブセス、オフ、是竇ノ裏膜ハ外傷

齧齒ノ刺戟等ヨリ炊衝ヲ生シ易ク且其炊衝ノ

化膿スル者多シ

徵候

其深部劇シク疼痛ノ禁動スル如ク軟組織

腫起シ知覺銳敏ニノ全身異和ヲ覺フ此時ニ方

リ醫治達セサレバ終ニ其竇壁擴張シ鼻窩障碍

セラレテ顔面畸形トナル

治法

全身局部ノ二法ニ由リ勉テ炊衝ヲ緩解シ

化膿ヲ防クニ在リ其己ニ化膿スルヤ或ハ鼻道

ヨリ排泄スルヲアルモ大抵其竇壁ニ一孔ヲ穿
子膿液ノ道路ヲ與フルヲ良トス即齒牙ヲ拔去
シ齒槽ヨリ套管針ヲ竇内ニ押送シ或ハ貳牙涅
ノ部ヨリ此竇ノ外壁ヲ穿貫スヘシ

○ 口窩症

○ 上顎骨瘤

ゼーモル、ス、オフ、此骨動モフレバ諸種

ノ瘤ヲ發シ易ク就中肉瘤、纖維形素瘤、軟癌ヲ其
最トシ通常上顎竇ニ根基スル故ニ其發育スル
ニ從ヒ骨質ヲ擴張シ其腫起スルヤ或ハ顔面ニ
外出シ或ハ咽喉ニ後走シ或ハ鼻窩ニ内向シ或

ハ眼窩ニ上朝ノ嚙下困難嗅機頑鈍視神昏朦等ノ症ヲ發ス此物ノ初期ハ其性ヲ鑒定スルニ甚ク難クレニ发育緩慢ノ者ハ良性ニノ迅疾ノ者ハ悪性ナルヲ以テ其發生ノ緩急ニ因テ善惡ヲトスヘシ

治法 只上顎骨截除ノ一法ニメ即甚ク大手術ニ屬スト云云 効ハ大抵其皮膚ヲ翻轉シ瘤面ヲ暴露スルニ在リ其法諸種アリト云云最モ畸形ヲ免ル可キ者ハ歌爾忽尊氏ノ一法トス即上唇ノ中線ヲ刀割ノ鼻窩ニ至リ此ノ如ク剥離セシ境界ニ於テ十分之ヲ截除シ得ル者アリ 或

ハ前進ノ鼻翼ヲ周匝シ鼻側ヲ上リ或ハ更ニ眼窩ノ下縁ヲ傳リ直角ニ刀割シ次ニ獅牙骨鑷子按獅牙ノ如キ強固ノ大齒ヲ鑑フ故ニ名クニテ其瘤ヲ拮住シ骨鉗子平依氏鋸及ヒ爾他恰當ノ器械ニテ其根脚ヨリ切除スヘシ

○ 下顎骨瘤

口モルノ形ハ前者ニ匹似シ

肉瘤ト纖維袋瘤多ニ居リ軟瘤ナリ 其發スルヤ大抵口角ト合縫間ヲ占レニ又爾他ノ部位ニモ生シ下顎ノ全長ニ蔓ルヲアリ

治法 其瘤ノ全部ト之ヲ生スル骨ノ一部ヲ除ク

ヲ無二ノ良法トス即下顎骨ノ下縁ニ沿ヒ皮膚
 ヲ剥離シ其軟部ヲ翻轉メ瘤面ヲ暴露シ平依氏
 鋸ヲ以テ瘤ノ各側ニメ其骨面ニ溝渠ヲ劃シ骨
 鉗子ヲ以テ十分ニ之ヲ割去シ或ハ鋸ヲ以テ
 其骨ヲ鋸次ニ其瘤ヲ軟部ノ内面ト底面ヨリ仔
 細ニ剥離センヲ要ス但此手術ハ獅牙骨鉗
 子ヲ最モ撰用スヘシ
齒齶瘻肉 リエプエハ齒槽突起及其骨膜ヨリ生スル
 贅肉ニメ上顎ヨリハ下顎ニ多ク其形ヲ圓ク聚
 垂セル滑瘤ヨリナリ齒齶ノ粘膜ニ掩ハレ之ニ
 觸ルニ固ク半ハ弾力ヲ有シ其發スルヤ齒牙ヲ

寬鬆逼壓シ其景况肉瘤或ハ纖維形素瘤ノ如ク
 始メ良性ナレバ久シク之ヲ去サレハ終ニ潰瘡
 トナリ惡候ヲ顯スニ至ル

治法之ヲ截除シ且其瘤根ニ方ル齒槽突起ノ一
 部ヲ斷去スヘシ然ラサレハ大抵再發ヲ免レ難
 シ

蝦蟇腫 ララニハ唾腺管ノ障碍ヨリ生スレバ殊ニ

粘液小囊ノ膨張ヨリ生スル者多ク其蓄液ハ清
 淨粘滑ニメ蛋白ノ如シ

治法其大小ト景况ニ從ヒ或ハ之ヲ針刺シ或ハ

其一小部ヲ割去シ或ハ貫線法ヲ行ヒ或ハ之ヲ開キ英布ヲ充填スヘシ

舌潰瘡

オハルセラシキニ、ニ單性、微毒性等ノ諸種

アリ甲ハ齧齒、齒莖鬱積ノ刺戟ヨリ生シ圓起ノ

劇痛シ周縁赤色トナリテ其面黄ミ以上ノ諸候

ノ存在スル部ニ對スル舌苔呼吸臭氣アリ乙ハ通常舌側破

裂シ或ハ扁長ノ潰瘡トナリ其面白色ニメ鶯口

瘡ヲ併發シ終ニ片々剝離ス

治法

勉テ刺戟ノ原因ヲ去リ舌体ヲ靜定シ液類

ヲ啜ラシメ談話ヲ禁シ硝酸銀ヲ以テ其瘡面ヲ

燒鏝シ衝動、救飲、淨氣液ヲ含嗽セシメ變質、強壯

劑ヲ與ヘ全身ノ健康ヲ助ケ就中微毒性ノ如キ

ハ汰陳、謨、剝、篤、亞、私ニ鍊製劑、薩兒沙根ヲ伍シ連

用スヘシ

舌皮膚

ラ、エ、ピ、セ、リ、オ、マ、オ、ハ、始、メ、舌、体、破、裂、シ、或、ハ

結節ヲ生スレバ頓ニ潰瘡トナリ表面剝離シ汚

垢トナリ其周縁齧齒ノ如ク基底硬固ニ呼吸

惡臭ヲ帶ヒ唾液過多ニノ顎下腺、舌下腺共ニ延

展シ全身逐次ニ苦悶シ其刺戟ト衰憊ニ由リ患

者終ニ鬼籙ニ上ル

治法 只早ク十分ニ之ヲ除去スレハ稍其生命ヲ保ツヘク詳ニ云ヘハ舌体ノ前部ニ其遊離面ノミヲ侵ス片ハ單ニ之ヲ刀割スヘキモ后部ニアル者或ハ實質中ニ深入スル者ノ如キハ緊紮ヲ要ス即精細ノ紐條ヲ以テ舌体ヲ縱横ニ經過シ其瘤ノ全面ヲ纏絡メ緊束スル片ハ兩三日ヲ經テ其潰瘡分離スヘシ但「エ」ク「ラ」シ「ウ」ル「ヲ」用「ユ」ル「モ」同「法」タリ

口蓋破裂 パカレフトトハ生来口蓋骨ノ分裂スル者ニ因ル發育障礙ニメ之ニ數種アリ即懸壺垂ノ巔ヲ限リ或ハ口蓋骨ノ全弓ヲ亘リ兎唇ト併發シ或ハ

其幅極テ狹クノ些少ナル者アリ廣サ半印埵乃至一印埵ノ者アリ但之ヲ患ル病者ノ聲音濁濁清明ナラフノ鼻聲ヲ帶ビ聽下困難ナルヲ常トス

治法 其軟組織多クノ患者ノ体質健全ナル片ハ直ニ其縫合術ヲ策スヘク但軟口蓋ノ之破裂スル者ハ其治術容易ニシテ硬口蓋ノ分裂モ極テ些少ナル片ハ其上ニ組織ヲ掩フテ亦難カラサルヘシ然レバ大孔ヲ穿ツニ至テハ人工口蓋ヲ用ガルヲ得ス尚其已ニ軟口蓋ノ癒合シ硬口蓋ニ

殘ル一孔ノ如キハ之ヲ塞クニ只一枚ノ平板ニ云人エロ蓋ト共ニ金或ハシヲ貼スハシ上

口蓋縫合術ラヒロハ先其折裂縁ヲ截チ軟組

織ヲ集合縫結精細ノ絹糸、銀線ヲ用ヒ刺戟セサ

ノ癒着スルニ至ル但其縫合ニ由リ懸壺垂ノ延

長ヲ防ク為ニ歌爾忽尊氏ハ兩側ノ舉口蓋筋ト

口蓋咽頭筋ヲ斷チ施行ニ他氏ハ縫合線各側ノ軟

口蓋ヲ割ツ縫合スル線ヲ要ス允テ此術ヲ施ス

可キ患者ハ能其痛楚ニ勝ヘ春秋ニ富マ我一身

ヲ制スルニ足ル者ニ行フヘク故ニ懷春期前

ニ行フ者少シノ

迷蒙水ヲ用ユヘカラス

急性扁桃腺炎トシハ諸種ノ劇症ト壯熱ヲ

發シ俄ニ腫起ノ其疼痛、顔面ト項窩ニ及フ但其

患各側ニ在ル片ハ嚥下困難ニシテ語言變換スレ

凡呼吸妨ノ所ナシ

治法有力ノ品タルヘク即下劑、安質母紐劑、鹽類

等ニシテ局所法ハ咽喉ヲ薰蒸シ、蟬針、芥子泥、蒸劑

ヲ外用シ其部ニ輕刺法ヲ行ヒ已ニ化膿スルヲ

見ハ其腺ヲ針刺但針尖ノ其体ノ中スヘシ

慢性扁桃腺延長コト、オ、フ、ゼ、ト、シ、ル、ハ、數、回

ト半合要 卷之六 十五 養子齋氣反

前症ニ罹リ或ハ其慢性腋衝ニ續發スル病ニメ
就中乙種ハ常ニ腺病家ノ小兒ニ發シ易ク其腺
延長硬結メ嚥下少シク困難シ耳聾ヲ兼子恒ニ
咽痛ニ苦ム

治法 全身ノ健康ヲ保全シ 殊ニ腺病
家ニ在テ明礬ヲ含嗽
劑トシ硝酸銀水過格魯兒鏡液及グリスリシヲ
塗擦シ以上ノ諸法効ナキヲ見ハ此腺ヲ割去ス
ルニ若カズ

扁挑腺割去法

子、鈍端小刀ニメ 其小刀ヲ豫メ鮮創膏又ハ英布
ヲ以テ纏絡シ只其鋒端

一印 錘子ニテ扁挑腺ヲ拮住シ中線ニ向テ前
ニ牽キ次ニ小刀ヲ其下面ニ輪シ下ヨリ上ニ向
ヒ其小片ヲ截リ去ヘン 右側ノ者ヲ截ル片ハ醫
トシ尚共小片ヲ割去スルヤ右來ノ瘰癧 其出血
ト收縮ニ由リ大抵適宜ノ長サニ復ス
ノ如キハ冷水ヲ含嗽セシメテ容易ニ止ヘク尚
其各腺ニ施術ヲ要スル片ハ同時ニ行ノベシ

第三十五編項窩病及損傷

食道狭窄

性ノ二種アリ 甲ハ通常神經性及歇私的里性
少女ニ多シ故ニ其最要ハ全身治法ニノ局療法

ハ緩性種ニ宜シク只患者ノ精神ヲ安慰スルヲ要ス^乙ハ再ヒ單性ト惡性トニ分チ其單性ハ特發燄衝又ハ強烈ノ酸類、亞爾加里及熱液ヲ燄下ニ燄衝ヲ誘發スルノ續症ニノ兼テ潰瘍、微毒ノ繼病タリ惡性ノ者ハ食道ノ實質中或ハ其近隣諸部ニ癌樣瘤ノ發生スルニ坐ス

徵候 凝質ヲ嚥下シ難ク但是急性性ニ速次ニ増盛ス頭及肩

肥疼痛シ食物ヲ嘔吐ス但其狹窄シ易キ部ハ咽頭ト食道ノ交際ニノ即環狀軟骨ニ對ス所ナリ

治法 乙種ヲ治スルハ食道消息子ヲ用ヒテ之ヲ

擴張シ得ヘキモ其効ナクノ諸症次第ニ進惡シ終ニ至小ノ護謨製消息子モ通過スル能ハサルニ至ル是時ニ方テハ數日ノ生命ヲ延サノ為ニ滋養流腸法ヲ行フニ在リ

咽頭異物硬塞 ズレイン、ボデイス、イニ、ゼ、ハリニキス其死ニ赴クハ

大抵會厭ノ擷急ト窒息ニ由リ或ハ潰瘍ヲ生シテ咽頭壁ノ穿貫スルニ由ル

治法 先醫士ノ手指ヲ以テ口峽ト咽頭ヲ探リ若

異物ヲ觸知スルヤ直ニ之ヲ爪撥シ或ハ鑷子ヲ以テ之ヲ拵出スヘキモ觸知セサル片ハ長ク擷

屈セル剪刀鑷子ヲ用ヒ咽頭下部ノ異物ヲ探リ
 或ハ吐劑ヲ與ヘテ吐出セシメ或ハ消息子ヲ以
 テ之ヲ胃中ニ送下スヘシ但胃中ニ送下スルハ骨ノ如キ稜角ヲ有セル硬体ニハ可及的能カサルヲ要ス

胃唧筒子用法

ユース、オマゼ、ス、トマチ、ボム、パ、先患者ヲ倚子

ニ依リ開口仰首セシメ唧筒子ノ末端ヲ少屈シ
 其管ニ油己ニ之ヲ口窩ヨリ咽頭ニ輸スヤ直ニ
 患者ノ頭ヲ輕々前屈シ以テ項背ニ椎ニ同等ノ
 彎屈ヲ得セシメ次ニ正シク其管ヲ胃中ニ送下
 但管端ヲ喉頭ニ輸シ或ハ胃膜ヲ損傷スル等
 最モ恐ルヘキ事件タルヲ以テ注意ニシテ

要尚其知覺ヲ失スル者或ハノ如キハ木墊ヲ齒
 間ニ嵌入シ其管ヲ咬ムヲ防クヘシ但之ヲ胃ノ
 毒物亞爾菌、尼、諸麻醉藥毒ノヲ去ンガ為ニ用ル
 片ハ微温湯ヲ注入シ毎回及出スヘク其汲出ノ
 入ノ量多カ或ハ食道狭窄、咽喉外傷等ニ於テ食
 物ヲ胃中ニ送ンガ為ニ須要スベキアリ

喉頭、氣管及氣管支内異物硬塞

フレイニ、ボ、

キマ、ト、レ、チ、エ、フ、ル、バ、ロ、ン、チ、エ、フ、カ、イ、フ、小、球、帽、針、貨、幣、食、塊、等、ヲ、口、内、ニ、含、ミ、俄、ニ、吸、氣、ヲ、促、ス、ニ、由、リ、誤、テ、喉、頭、一、闕、入、シ、其、物、大、抵、喉、頭、室、聲、門、氣、管、氣、管、支、殊ニ等ヲ占ム但

外科 卷之六 胃腸病

其聲門ニアル片ハ呼吸困難、顔面鉛色ニハ腫脹
 シ瞬時ニ失氣ノ死ニ喉頭瘰、氣管、氣管支ニアレ
 ハ烈シキ窒息性痙攣咳ヲ發シ但異物ノ氣管支
 嗽間歇スレバ喉頭瘰、氣
 管ノ者ハ是症持久ス且其異物ノ長ク塞住セ
 シ後ハ第二ノ諸症ヲ發ノ孰レモ嗽瘰狀ヲ帶ル
 者多シ但喉頭鏡、聴胸、打胸法ハ異物ノ所在
 ヲ探ルニ意外ノ効ヲ得ルアリ
治法異物ノ聲門ニアル片ハ早ク之ヲ去ヘク即
 直ニ氣管ニ一孔ヲ作り消息子ヲ入レ上ニ向ヒ
 異物ヲ撥出シ喉頭室ノ者ハ喉頭鏡ニテ之ヲ照
 シ鑷子ヲ以テ之ヲ拊出スヘキモ氣管、氣管支ニ

入片ハ氣管截開術ヲ行ヒ鑷子ヲ用ヒ或ハ患者
 ヲ倒置スル等ニ由リ之ヲ去ヘシ然レバ個般ノ
 患者ニ於ル畢竟其異物ヲ去能ハスノ刺戟ト嗽
 術ノ為ニ衰弊ノ死スル者多カルヘシ

咽喉外傷

カ、ス、ロ、ン、ツ、オ、フ、ハ他傷ト自傷ノ別アリ

其乙種ニ屬スル者ハ患者ノ精神已ニ錯亂スル
 故ニ預后甚ク不良ナリ但其損傷ノ部位一定セ
 ス又之ニ深淺ノ別アルレバ大脈管ヲ損傷スル片
 ハ死期近クノ逃ル可カラス

治法第一其出血ヲ止ンガ為ニ創處ヲ淨清シ瘰

血ヲ去リ脈管ヲ繫紮シ次ニ氣管ヲ本位ニ復シ
 患者ヲ褥ニ就ケ其頭ヲ前テ呼吸シ易カラシメ
 屈ノ割縁ヲ對向セシムテ呼吸シ易カラシメ
 但其損傷ハ全部ナルヤ或ハ其宜キニ隨ヒ細帶
 局部ナルヤ顔面ノ各側ヲ施シ其頭ヲ維持シ
 頭部ヲ纏ヒ顔面ノ各側ヲ施シ其頭ヲ維持シ
 下リ之ヲ胸帶ニ固結ス
 移動スルヲ勿ルヘシ但絆創膏縫合術等ハ宜シ
 カラスノ寒暑法ハ闕如ス可ラス狂人ノ自ラ傷
 ロヲ破開セント欲スル者ハ袂短衣ヲ以テ之ヲ
 掣肘シ其喉頭、氣管ニ大孔ヲ穿テ或ハ食道ヲ傷
 クキハ胃腸筒子ヲ以テ患者ヲ供養シ但氣管ヲ
 シ日ニ二三回百方力ヲ盡メ喉衝ノ氣管及氣管
 之ヲ施スヘシ

文ニ蔓延スルヲ防キ其傷口ニ輕クフヲ子ルヲ
 掩ヒ温濕ノ空氣ヲ呼吸セシメ其肺部ニ血鬱ヲ
 顯ス者ハ芥子泥、的列並油蒸劑ヲ施シ興奮祛痰
 ノ劑ヲ内服セシム但咽喉ヲ切斷スル輩ニ臨テ
 醫士ノ其創傷ノ方向、位置、廣狹ヲ確定スルヲ尚
 司法吏ノ罪科ヲ糾斷スルカ如クナルヘシ

○ 甲狀腺肥大

地サイル等ニ行ル、風土病ニシテ始メ單性ナル
 モ終ニ袋瘤或ハ有毒瘤トナル就中阿留邊山ノ
 給間ニ住スル者ハ其發育最モ巨大ニシテ精神ノ

抑壓症 即グレチニスマニノ我英ヲ合併ス其源
 因敷種ナレト畢竟水玉ノ模様ニ關シ又谷間
 ノ卑濕ニノ空氣壅塞日光不足シ其居人ノ心氣
 通暢ヒサルヨリ是症ヲ倍加スルヲ多カルベシ
 尚本病ハ婦人ニ多ク殊ニ蓋是症タル其腺逐次ニ
 腫大ノ疼痛ナキヲ以テ初期ノ如キハ單ニ畸形
 トナルノミ然レト其増大スルヤ眩暈頭痛呼吸
 難下共ニ困難トナル但其腫張ノ局部ヲ限ル片
 ハ頸動脈瘤ト誤認シ易キ故ニ其識列ニ至要ノ
 一訣アリ即本症ハ如キハ熱下時ニ方リ氣管ト

共ニ昇降スルヲ銘肝スヘシ尚此症ノ發生モ亦發育ノ瘤状ヲ帶ヒ著シク巨大トナリ或ハ變ノ癌状トナル

治法 單症ニノ著大ニ至ラサル者ハ患者ヲ新鮮

空氣中ニ居キ海濱ニ其健康ヲ節養シ沃度剥篤亞斯
 斯貂魯密度剥篤亞斯ニ鍊製劑薩爾沙根ヲ合メ
 内服セシメ沃陳丁幾ヲ塗敷スヘシ以上ノ諸法
 効ナク其腫張倍加メ終ニ生命ヲ害セントスル
 片ハ縱横ニ貫線法ヲ行ヒ或ハ其分布セル動脈
 ヲ結紮シ或ハ其皮膚ヲ剥キ腺ノ一部ヲ截除シ
 又ハ線割法ヲ行フヘシ然レト此諸術ノ如キハ

外科拾要 卷之六 外科拾要

出血ノ續症アルヲ以テ全ク危害ヲ免レ難ク而
 テ其良効アルハ僥幸ノミ但良効ヲ確定ノ危害
 ナキ者ハ胸鎖乳頭筋ヲ斷ツニ法ニノ己ニ袋状
 ヲナス片ハ針刺即穿シ沃陳謨液ヲ注キ或ハ貫
 線法ヲ行フベシ但其治法ニ要スル外科術
 未タ十全ノ發明ヲ得ス

第三十六編胸部兼乳房病及損傷

穿胸術

スバラセシテシハ肋膜焮衝胸腺等ニ施ス
 ヘキ術ニノ之ヲ行フニ要アル者ハ稍同一ノ症
 候ヲ呈ス即打胸法ヲ施スニ其部鈍音アリテ擴
 張シ各肋間非常ニ隔離ノ逼壓シ其間隙ノ腫脹
 スルニ由ル

呼吸困難横卧スルニ必ス患部ヲ下ニス其施術
 ノ凡則ハ第五肋ト第六肋間及第六肋ト第七肋
 間ニノ其角ノ少前ヲ撰用スヘシ即其部上ニ示
 セシ部
 肋ノ上其下ノ皮膚ヲ刀割スル一印埒長ニノ皮
 膚ヲ上牽シ次ニ套管針ヲ胸内ニ穿貫間隙ノ下
 部ヨリ
 ス可シ蓋シ必ス此ノ如ク手術ヲ要スルハ各肋
 間隙ノ上部ニアル尿管ニ觸ザル為ナリ即尿管
 ハ在上
 肋骨ノ下内又其蓄液漏泄ノ際ニ方リ大氣ノ竄
 入ヲ防ク諸法アリテ己ニ套管ヲ抽去スルヤ速
 ニ皮膚ヲ其原位ニ返シテ深孔ヲ鎖閉シ絆創膏

ヲ用ヒ在表ノ創孔ヲ掩フヘシ

乳房變大

ハイペルトロヒ、ハ殊ニ妊婦ニ多ク

女子ニ在テハ間々懐春時ニ顯ル即其全腺緩ク

腫大スレ氏焮衝疼痛ナク神經痛クノ一始ノ其瘤

硬固ニメ知覺銳敏ナラス終ニ甚夕巨大トナリ

重大メ殆ンド一個ノ重ヲ荷フガ如キ此種ハ通

併發スニ至ル

治法 其健康ヲ保全シ鹽類下劑ヲ與ヘ乳房ヲ扶

持ノ輕キ刺戟軟膏ト擦劑ヲ用ヒ設シ効ナキ片

ハ之ヲ截除スシ

急性乳房焮衝

レアキエトイムフハ殊ニ授乳時ニ

發シ易ク其焮衝或ハ皮下蜂巢織ニ發シ或ハ乳

腺ノ實質中ニ生シ或ハ蜂巢織面其腺トニ起リ

是諸部同時或ハ逐次ニ本症ヲ發見ス

徵候甚夕較著ナリ即發熱盛ニメ乳房赤腫疼痛

硬結シ知覺極テ銳敏ニメ乳汁ノ分泌閉止ス但

是閉止ノ荏苒治セサルヤ吸乳管ニテ之ヲ吸出

スヘキモ只健乳ノミヲ哺乳セシメテ要ス

治法 輕キ消焮劑ヲ内服セシメ細帶或ハヲ以テ

乳房ヲ扶持シ或ハ蟻針ヲ貼シ蒸劑ヲ連施シ已

ニ消散ヲ始ムルヤ單膏ヲ擦入スヘシ但化膿ノ
 波動スルヤ直ニ之ヲ漏泄シ其針孔ハ最モ四腫
 シ其膿液ノ深ク潜伏スル者ハ更ニ對孔ヲ作り
 或ハ小管ヲ以テ其針孔ヲ靜定シ且其側面ヲ同等
 ニ重按ノ針孔ノ轉移ヲ防クヘシ
乳瘡 瘡ルカクアブセスニ膿潰スル者ハ通常全身羸
 瘦、疲憊ヲ兼又レバ其化膿ヲ始ムルヤ直ニ諸減
 殺法ヲ閑キ滋養品ニ適宜ノ興奮藥ヲ伍用シ兼
 テ鑛酸、幾那皮、爾他ノ強壯劑ヲ服セシム
慢性乳房瘤 コロニク、マムマリト、チエ
 ①モル ②腺樣瘤 ③腺瘤 ハ三十歳以

下ノ婦人其他強壯者ニ發生スレモ動モスレバ
 有毒種ト誤認シ易クメ大抵刺戟物_{打撲ニ起リ}
 始メ腺ノ一部_{周圍}膨脹、硬結ノ變大シ象垂ノ動
 搖スヘキ瘤トナリ疼痛ナク知覺銳敏ナラヌハ
 結節ヲ帶ル_{葡萄}ノ腺質ノ_ノ延展ト共ニ其纖維
 ノ_{細房ニ肖ク}中隔變大三且其瘤内ニ_{或ハ蜂窠間隙ニ生}或ハ
 起_ルヲナス者ヲ_{或ハ}液感_{或ハ}瘤_{ト名}都テ此
 瘤ハ腋窩腺ト皮膚ヲ侵サズ又全身ノ健康ヲ妨
 ケスノ荏苒歲ヲ經シ后漸次ニ消散ス_{或ハ某月}
 后卒然增長_{スル}アリ但其微細ノ造構ハ著_{シク}變大セシ

腺組織ニ纖維織ト蜂巢織ヲ混ス

治法 其健康ヲ改良シ沃度剥篤亞斯、豹魯密度剥篤亞斯、升瀕ヲ肉服シ壓定、沃陳ペイントヲ外用ノ吸收ヲ促シ、神經痛ニハ鎮痛擦劑ヲ用ヒ又吹衝スル片ハ蟻針數ヲ貼スヘン但其急ニ增大シ將ニ潰瘡ニ陥ントスル者ハ之ヲ截除スヘキモ全腺ヲ去スノ只疾患ノ一部ヲ除カントヲ要ス

乳房肉瘤及纖維形素瘤

ハイブロブラス、アन्द、此種ノ瘤モ亦乳房ニ發シ易クノ半毒瘤ニ算入ス

乳房毒瘤

マリツグ子ントハ頻發ノ一症ニノ大抵硬軟ノ

二癌ニ外ナラス其病ハ常ニ原發性ニノ一側ノ乳房ヲ限リ稀ニ全塊緻密ニノ氣孔ヲ有セサル者アルモ其緻密部ハ只周圍ノミヲ常トス **硬癌**ハ通常四十歳ヨリ五十歳ノ婦人 即全軀一ニ生變ノ期シ先硬キ小瘤ヲ乳腺ノ中央ニ發シ始メ移動スヘキモ頓テ皮膚 前胸筋 右ニ牢着シ乳頭卷縮ノ刺痛シ腋窩腺膨張ノ皮膚潰爛シ虚性ニノ惡臭膿ヲ泄シ兼テ癌毒惡液質ノ確徵ヲ呈シ全軀甚シク侵略サレ其發育緩慢ニノ疼痛甚シク大抵三歳后ニノ泉下ニ飯ルモ或ハ數月ニノ經過ヲ

全シ或ハ廿歳ノ久キヲ經テ尚依然タル者アリ
 但凡則ハ其患者少キト一年ナレハ其預後ニ從
 テ一年ノ不良ヲ増スナリ **軟癌**ノ原發スルハ硬
 癌ヨリ少ク 硬癌ノ截除後 其發生ノ時期ハ硬癌
 種ヨリ早ク俄ニ發メ急ニ増大 其増大ニ從ヒ腺
 シ平滑ニシテ彈力アリ靜脈膨脹ノ其上ヲ纏ヒ近
 隣ノ諸筋ニ附着シ皮膚紫赤ニシテ潰瘡トナリ其
 癌芝菌状ニ凸出ス然レモ硬癌ノ如ク深ク全軀
 ヲ侵略セス且衰弱ヲ將來スルトモ亦少シ故ニ
 全身ノ諸症ハ局部ノ者ヨリ准ニ輕シ

治法甚ク十分ナラズ彼ノ全身治法ノ如キハ全
 愈ヲ期スヘキニアラサレモ之ヲ以テ總ニ患者
 ノ健康ヲ保全シ病機抗抵ノ力ヲ助成スルノミ
 局處治法モ全治ヲ必スヘキニ非ス而テ最良ノ
 目的ヲ達ス可キ截除法モ極劇ノ症候ヲ緩解ス
 ルニ過サルト多キガ故ニ此法ニ頼テ其生命ヲ
 延フ可ヤ否未タ疑團ヲ免ル、ノミナラズ全ク
 之ヲ行フ可サルモノ多シ即其截除法ヲ禁スヘ
 キ諸症ハ皮肉多ク蚕蝕セラレテ惡液質トナリ
 第二ノ癌毒ヲ内臟諸器ニ發シ其根脚廣ク潰爛

甚ク、兩乳已ニ侵サル者又其鎖骨上下ノ腺延展
セル等ノ如キ是ナリ然レモ其瘰過大ナラズノ
移動ニ發育緩徐ニノ腋窩腺障碍ナク全身猶健
康ヲ保ツ片ハ其施術後ノ成効ヲ庶幾スヘキモ
良工ハ尚緩解法ヲ用ヒ決メ截除法ヲ要セス術
後返テ病毒ノ誘發故ニ此ノ如キ發育緩徐トル
者ハ其截除ノ利不利ヲ確定スルト甚ク難シト
ス此法或ハ同等ノ壓定法ニ由リ其鎮痛ノ効ヲ
奏スルノミナラズ却テ増大ヲ抑壓スルトアリ
或ハ鎮痛洗劑ト軟膏ヲ要スルアリ但其己ニ潰

瘰トナルヤ毳布單純ノ者或ハ貼シ截除ヲ禁
スル者ハ腐蝕劑銀ヲ作り其全面ニ布キ或ハ箭
ヲ要スヘシ瘰癧ノ乳房モ亦稀ニ此

○乳房截除術

ナシ皮膚層ニ卵形ヲ劃シ但其割除スヘキ皮膚層ハ
論ナレモ其患部ヲ盡ク載除スルハ勿其皮膚層ヲ剥
キ以テ全瘰ノ前面ヲ暴露シテ其蜂巢狀ヨリ抗
萃シ其底面ヲ刀割ノ上部ヨリ下部ニ及フヘシ
尚其瘰圍諸腺ノ膨張スル者ハ同時ニ除去シ脉
管ノ断口ハ之ヲ結紮シ其創縁ヲ縫合シ扁大ノ

布墊ヲ置キ細帶ヲ施サンヲ要ス

第三十七編腹部病及損傷兼腸墜

○穿腹術

アブラセニテニス、ハ腹水、卵巣水腫等ニ施

スヘク其症ハ腹部大ニ膨張シ波動著シク呼吸

不利ニノ全身健康障碍セラル尚妊娠中羊膜水

ヲ藏ヒル膜ヲ云 過多ナル者ト卵巣絨瘤、腹水

ヲ仔細ニ鑿別センヲ要ス但其施術スルヤ廣帯

綴綴ヲ有セルヲ患者ノ背后ヨリ腹前ニ交叉シ

臍下三四印埵ノ中線ニ方其皮層ヲ刀割スル

ト一印埵長ニノ管針ヲ穿テ液窩ニ達シ其流出

スルニ乘シ介者左右ヨリ廣帯ヲ緊メ腹部ヲ同

等ニ壓迫シ流出セシ液体ノ空處ヲ充填若患者

キ強心劑ヲ與フ斯己ニ術ヲ終ルヤ套管ヲ去

リ絆創膏ヲ創口ニ貼シ尚廣帯ヲ留メテ腹部ヲ

纏繞シ帽針ヲ以テ之ヲ維持ス可シ

○卵巣病

ジラリス、卵巣ノ病的産物ハ大抵毒瘤

肉瘤等ニノ絨狀卵巣絨瘤ヲ帶ビ且其絨ハ虞

刺比安氏胞体卵巣底ニニ源シ單胞ノ者ア

リ複胞ノ者アリ故ニ其瘤モ單複ノ別アリ又其

内蓄物ニ凝体流体流体ハ濃厚粘稠ニノ蛋白ノ

如ク褐色或ハ綠色ナリ

不同アリ尚是癩歲月ヲ累子依然タルアレハ
通常増大ノ身軀終ニ虚憊シ或ハ内臓ノ機能ヲ
障碍ノ死ニ至ル者多シ

治法

都テ内服劑ハ益ナク只其亘キニ從ヒ或ハ
單ニ針刺シ或ハ兼テ沃陳液ヲ注入スヘク若効
ナク且其症猛烈ナル片ハ卵巢截開術ヲ施スヘ
シ就中之ヲ要スル諸症ハ即其凝体ノ少キ者莖
蒂ノ長キ者周圍ニ附着セル者及患者ノ健康ヲ
妨ケサル者等ナレハ其瘤ノ景況ト附着スルヤ
否ヲ鑿別スルハ甚夕困難ニ之ヲ手術前ニ確

定シ得ヘカラサルハ實ニ患者ノ不幸ナリ

卵巢截開術

臍ト耻骨間ノ白條ヲ傳リ剖割スル

二三印埵ニノ終ニ瘤ニ抵リ手指或ハ彈力ヲ

創口ニ入レ瘤面ヲ検査シ以テ癒着ノ多少ヲ探

リ其遊離ノ草囊ヨリ作ル片ハ先之ヲ針刺シ創

口ヨリ囊ヲ抽去スヘキモ或ハ癒着シ或ハ凝体

ヲ有スル片ハ再ヒ創口ヲ廣メ其附着部ヲ斷テ

瘤ヲ截除シ莖蒂ヲ前引シ「グラムプ」規鋼鏡ノ半

甲端ノ一孔ヲ通スル鏡杆ハ螺旋裝置ニ上ノ下

スヘリ其鏡杆ノ下端ハ實墊ヲ附ケ半規環ノ上
端ハ軟墊ヲ以テ創内ニ固定シ或ハ糸條ヲ繫ギ

九

其莖蒂ヲ腹腔内ニ殘シ糸端ヲ腹外ニ止ムヘシ

穿腹創

キ易シ故ニ注意センヲ要ス但其内臓ヲ損傷ス

ル者ハ震盪甚クノ生力沈衰シ之ニ由リ幸ニ其止血ノ機能ヲ自然ニ早ク將來スルヲアリ故ニ其抗抵ヲ發セシムルヤ甚ク早ニ失スヘカラサルモ動脈大管ノ斷裂シ肝脾ノ損傷ヲ受ルキハ又其出血ニ由リ終ニ命ヲ損スル者アリ蓋胆汁尿管ノ滲出スルヤ腹膜炊衝ヲ遁ルベカラズ又腸管ノ損傷ハ吐血、黒物吐下症ヲ發シ腎臟ノ損傷

ハ血尿ヲ顯ス

治法 十分ニ安靜シ多量ノ阿片ヲ處シ嚴ニ食料

ヲ限リテ胃ニ吸收シ易キ滋養品ノミヲ與ヘ已

ニ炊衝ヲ發セントスルヤ甘瀕ヲ阿片ニ伍用シ

針刺或ハ蟻針ニ由リ瀉血シ琵琶布、冷濕法ヲ行フ

ヘシ但下劑ハ宜シカラズ若便通腸管ノ脱出ハ要セハ灌腸法ヲ行フヘシ

緩ニ之ヲ收入スヘキモ其刺傷ヨリナル損傷ハ

之ヲ療スヘカラス即其粘膜腫起メ創口ヲ密閉

スレハナリ但其裂傷ノ如キハ創縁ヲ密接シ細

糸ヲ以テ螺旋縫ヲ行ヒ其創口大ニメ癒合ヲ期

シ難キ者ハ之ヲ皮膚ノ創縁ニ縫合シテ人工肛門ヲ作ルヘシ凡テ腹壁ノ損傷後ハ其創處ヨリ脱腸スル者多ク尚癒合スルハ腹内諸臟其壓力ヲ平均メ液質ノ滲出ヲ防キ且腹膜ヨリ多量ノ列印已液ヲ漏出メ創口ヲ補綴スルニ由ル

腹膜焮衝 オベリトハ 腹壁ノ損傷ニ多ク繼發ス

徵候 患者仰卧ノ膝關ヲ抗舉シ以テ腹筋ヲ緩メ特ニ胸腔呼吸ヲナシ横隔膜及腹筋ヲ運動シ難ク身軀枯瘦顔色惨淡脉細數ニメ緊口舌乾燥ノ頻ニ嘔吐シ腹部ノ知覺極テ鋭敏ニメ便秘ス

治法 十分ニ靜養シ多量ノ阿片ヲ處シ蝟針蒸劑浣腸法鹽性沸騰水ヲ投スヘク氷片ハ疾患ヲ緩解シ口窩ヲ滋潤スヘシ

人工肛門

ルアチヒ ハ糞尿ヲ排泄セシガ為メ

權ニ一孔ヲ腸管ニ作ル者ニメ或ハ醫士之ヲ作為シ或ハ是部ノ損傷膿瘡潰瘡掛頓腸墜ノ死肉脱離ニ成ル 其腸管トノ交通僅ニメ内蓄物ノ此 孔小腸ノ上部ニアル片ハ只暫時ノ生命ヲ延長スルノミニメ大抵其乳糜ヲ損亡スルヨリ逐次ニ餓死スル者多ク其大腸ニアルヤ通常險症ヲ

將來スルモ又患者ノ強弱ニ准シ差等ナキヲ得
 ス蓋醫士ノ鎖肛ヲ施術スルハ之ヲ下行結腸ノ
 下部左腰ニメ腹膜ノ后ニ行フ即西密薩篤氏手術ハク尚
 其腸管ノ創孔ヲ皮膚ノ創縁ニ縫合セシメ要ス
 治法都テ此症ニハ患者ノ健康ヲ扶持シ創口ヲ
 清潔ニシ創縁ニ單膏ヲ擦入メ其剝脱ヲ防クベ
 シ但糞瘻ハ自然ニ癒合スル者多キモ其人工肛
 門ニソ腸管ニ一孔ヲ存スル片ハ創縁ヲ癒合ス
 ル策ヲ施サ、ルヲ得ス詳ニ云ヘハ一四人工肛
 門ヲ製スルヤ其在下ノ不用部漸次ニ收縮シ且

其腸壁脱出ニ對スル部ノ中隔糞尿ノ通スル部ヲ
 ナシ本道ヲ回復スルニ一大難事ヲ將來ス獨科
 篤連氏ノ説ニ云宜シク鑷子ヲ以テ之ヲ通壓シ
 其中隔ノ脱離スルニ至リテ其表面ニアル創口
 ノ癒合ヲ策スヘシト

腸墜

腸墜ルハルニ故ニハ腔窩中ニアル含蓄物ノ脱出ス
 之ヲ單称スル片ハ腹壁ヨリスル脱出物ニ云ハ
 名クハ含蓄物ノ脱出ヲ破裂病ト称ス即前章列舉セ
 シ爾他含蓄物ノ脱出ヨリハ數種アリ即巖蹊股臍
 リ極テ頻發ノ一症ナリハ位置ニノ復性、久性不復
 横隔及鎖孔腸墜等ヲ以テ云ニノ復性、久性不復
 暫性不復、掛頓以上等是ナリ又先天、后天以上景學ノ

摸ノ別ト腸墜、網膜墜以上内蓄物、原名ヲ舉ルヲ勝レリトスレバ今然ラサルハ、テ覧者ニ便セシメナリ者官辞ヲ以テ意ヲ害、勿レノ異ナルアリ其素因ハ筋腱造構ノ生来不、足、穿孔創常習壓迫ノ如キ腹壁ヲ衰耗スル等ニ、**誘因**ハ咳嗽、二便排泄時ノ努力、運動甚劇、騎馬、飛動等ニ由リ腹壁ノ軟弱部ヲ逼壓スル如キ是、ナリ但脱出物ノ被膜ハ位置ノ景況ニ從テ同シ、カラスト云氏通常囊有リテ腹膜ノ壁層其脱出、面ヲヨリナリ其囊ヲ有セサル者甚稀ニノ穿、覆フヨリナリ孔創後ニ發スル腸墜ハ只腹膜ノ穿、一、半ヲ掩ヘ氏其他ハ每腸墜必、ス腹膜ヨリナリタル囊ヲ有ス、**頸**ハ其脱出セル

一點 掛頓腸墜ニ在テハニノ **體** ハ其殘餘ヲ稱ス
鑑別 急發ノ者恐ラクハ非常ノ運動後ニ起リ通
常内ヨリ外ニ向ヒ發メ暫性ノ者多ク患者横卧
スレハ收納スレ氏起立スレバ脱出ス是物腹壁
ニアル生来ノ口ヨリ出テ、外圍齊整、圓クノ梨子
ノ如ク疼痛ナク知覺銳敏ナラスノ皮膚ヲ蚕蝕
セス 其網膜ヨリナル者ハ之ニ觸ルニ柔軟ナレ
氏腸管及液質ヲ含ム片ハ緊張ノ彈力ヲ帶
アリ波動且之ニ咳嗽セシムレハ増大シ患者ヲ仰
卧セシメ手指ニテ逼壓スレハ收納スルハ **復性**
腸墜 シレテ本相タリ

外科 雜症 雜症 雜症

治法 力及的速ニ其脱出物ヲ本位ニ復スヘク姑
息法ハ墊ヲ其口上ニ置キ綳帶ヲ施シ常ニ輕キ
恰當ノ糞條帶ヲ用ヒ臨卧ニ之ヲ貼ス若其脱出物拵領
性トナルハ其甚キ瘰癧ヲ將来スレハ常ニ之ヲ以テ患者ヲ戒ムヘシンヲ要ス蓋
小兒ニ是發條帶ヲ常用スレバ全治スル一アレ
凡成人ニ在テハ此ノ如キ成効ヲ望ミ難シ故ニ
右件ハ僅ニ一時ノ姑息法ニ之ヲ根治スルニ
ハ手術ニアラスンバ能ハス但之ニ二種アリ甲
ハ論萬施爾氏ノ法ニ其皮膚表筋鞘及囊ヲ併
セテ之ヲ復入イニチンダ子シ以テ其脱出セシ道

路ヲ栓塞シ乙ハ宇鳥度氏ノ法ニ從ヒ已ニ復入
セシ後其凹口ノ側縁ヲ縫合シ之ヲ本位ニ維持
シ以テ聯合性瘰癧ノ十分發生スルニ至ル
久性不復腸墜イニシレハ腸墜久シク復セサ
ル者ニノ或ハ其囊ヲ掩フ組織ノ癒着スルニ由
リ或ハ其内ニ含有セル内臟ニ聯合スルニ基キ
或ハ其脱出セル網膜中ニ脂肪ノ蓄積スルニ源
シ未夕瘰癧ヲ發セサレ凡通常身體不和大便不
齊ニノ消化器其常ヲ紊リ動モスレハ瘰癧性ニ
轉シ易シ

外科 雜症 三十四

治法 脱出物ニ恰當セル凹墊ノ發條帶ヲ貼シ以テ其増大ヲ防クヘシ

暫性不復腸墜

レインカドルセハ通常其脱出部ニ瓦

斯或ハ腸管内蓄物ノ鬱積ヨリナリタル暫性種

ニソ峻症ヲ發セサルモ又箝頓性ノ楷梯タルカ

故ニ若急性焮衝ヲ發スルヤ箝頓腸墜ニ陥ル者

多シ

治法

患者ヲ横卧セシメ蒸劑灌腸法ヲ施シ氷片

納勝

貼シ手指ヲ以テ之ヲ復スヘシ

箝頓腸墜

レストラド

ハ腸墜ノ為ニ糞尿ノ道路

障碍セラレ終ニ急性焮衝ヲ發スルヨリ生ス

徵候

睡眠安カラスノ身体異和ヲ覺ヘ顔色鬱陶

容貞抑壓サレ臍部絞痛ノ大便不通、乾嘔、嘔吐シ

暫時ニメ溷濁物即糞ヲ吐キ脉緊細數ニメ弱ト

ナリ震戦シ其脱出物始メ疼痛ナク知覺銳敏ナ

ラサルモ逐次ニ緊張メ知覺ニ富ミ其症漸次ニ

猖獗トナリ終ニ衰弊ヲ極ム但其局部疼痛知覺

銳敏共ニ卒然消滅シ或ハ其物柔軟ニメ氣腫ヲ

生シ紫色トナリ或ハ患者自ラ輕快ヲ覺ユ或ハ

ノ諸症同時等ノ如キハ即脱疽ヲ始ルノ徵ニメ

大抵死期近ニアリ然レ疝稀ニ其脱出物衣膜ト共ニ剥離スルモ命ヲ殞セサルヲアリ即腸管ニ一孔ヲ遺シ是孔ヨリ自在ニ糞屎ヲ泄シ其陰症退テ漸々衰弊ノ復スナリ此ノ如キハ其腸管ト交通スル一孔ヲ人工肛門ト作スヘシ

治法 患者ヲ平卧セシメ其膝關ヲ抗舉シ以テ腹

筋ヲ弛メ次ニ施術スヘシ詳ニ云ヘハ醫士甲手

ヲ以テ其脱出物ヲ握リ十分ニ之ヲ狹窄シテ其

本位脱出セシニ復シ乙手ハ緩々其頸脱腸ヲ逼

壓メ復常シ易カラシム但其手術ハ最モ注意シテ

ハ之ヲ長用スルト粗暴ナルニ由リヘク若効ナ
六ニ危篤ノ症ヲ離スニ至レハナリ
キ片ハ迷蒙水吸入法、温浴法、多量ノ阿片、冰片、脱腸
ニ盛ヲ貼スル一二時或ハ患者ヲ倒置其体ヲ
ル者ヲ貼スル一ニ時或ハ患者ヲ倒置其体ヲ
枕上ニ駕シ以テ其囊内ノスル等ノ後再ニ手術
液質ヲ空竭セシムルノ法スル等ノ後再ニ手術
ヲ試△ヘシ是症下劑ヲ與フヘカラス故ニ之ヲ
疎滌脱出セル下スルニ要アル片ハ單純煙草ノ
浣腸法ヲ行ヒ爾他刺絡、安質母尼用等ヲ處スヘ
キモ是諸法ヲ十分ニ試用ノ尚佳候ヲ見サル片
ハ速ニ截開術ヲ施サンヲ要ス以上ノ諸法執モ
フ最要トス即是截開術ノ如キモ之
ヲ遲疑スレハ愈陰症ヲ極ルナリ

截開術其頸ヲ覆フ皮膚ノ皺襞ヲ舉ケ外方ニ向
 テ之ヲ刀割シ注意メ其被膜ヲ層々剝離メ囊銀
 ノ光輝アリニ其表面ニニ至ルヘシ今是囊ヲ開
 敷條ノ尿管ヲ分布スニ至ルヘシ今是囊ヲ開
 クノ利害ヲ論セシニ其囊ノ全クメ尿管ノ暴露
 セサル間ハ腹膜嫩衝ヲ裁スルト少ク然ルニ若
 之ヲ開カサレハ其尿管ニ什麼ノ景況ヲ存スル
 ヤ其囊中更ニ第二ノ狭窄ヲ有セサルヤヲ決ス
 ル能ハス故ニ醫士患者ニ對シ之ヲ考究セシト
 ヲ緊要トス蓋其脫出物小ク新鮮ニノ尿管ノ健
 全ナルト狭窄部纔ニ一点ナルトヲ前知セシク

ハ囊ヲ割割セスメ之ヲ本位ニ復スヘク又久性
 不復症ノ時日ヲ經過メ已ニ符頓性ニ傾クヲ以
 テ尿管ヲ本位ニ復スルヲ要セスノ單ニ其狭窄
 ヲ寛解スルノミヲ望ム片モ亦之ヲ割ク可カラ
 ス以上二症ノ外假令些少ノ疑議スヘキアルモ
 皆之ヲ開クヘク但其創口ハ廣大ナルヘカラス
 ノ大抵示指ヲ通過シ囊窩ヲ探索シ得ヲ以テ足
 リトハ狭窄ノ點ハ通常其囊頸ノ厚部ト外ニア
 ル臍膜ノ帶條ヨリナル若其尿管ノ單ニ蓄積シ
 赤色葡萄酒ニメ其面平滑組織強固ナル者ハ直ニ

之ヲ復スヘキモ其面粗糙ニノ破碎シ易ク黒色、
 灰白色或ハ綠色ナル片ハ輕々之ヲ牽出シ其死
 壞部ヲ截割シ創縁ヲ皮膚ニ縫結シ人工肛門ノ
 如クスヘシ網膜ノ死壞ハ其部ヲ截去シ出血セ
 ル尿管ヲ捻止ニ或ハ細糸シ之ヲ創口ニ嵌住シ遂
 ニ癒合ノ其口ヲ塞クニ至ルヘシ凡テ施術後ハ
 其創縁ヲ集合メ之ヲ縫結シ輕ク冷漏法ヲ行ヒ
 墊ヲ置キ細帶ヲ施シ柔軟ノ滋養品ヲ食セシメ
 其宜ニ隨ヒ單純ノ浣腸法ヲ行フ可キモ下劑ヲ
 處ス可カラス數日間靜養シ以テ其回復ヲ待ヘ

シ尚脱出物ノ性未タ決セサルモ諸症己ニ箱頓
 ノ徴ヲ呈スルヤ即截開術ニ要アリ

針性鼠蹊腸墜

ニオブリキル、イハ上腹深尿管ノ外

側ニアル内腹輪ニ根基シ斜ニ鼠蹊管ノ全長ヲ

傳リ外腹輪ヨリ脱出ス即精系ノ通路ヲ經過シ

ハ上尿管ノル者ニノ通常男子ニ發ス但其腸

直外ニ位ス

管ノ鼠蹊管中ニアリテ未タ外腹輪ヨリ脱出セ

サル者ヲ鼠蹊瘤ビボノセルト區別スルニ乙ハ

其罩丸ノ陰囊中ニ關如スルト其ト名ク其己ニ
 瘤ヲ逼壓ノ鈍痛スルトニアリト名ク其己ニ
 外腹輪ヲ出ルヤ逐次ニ陰囊陰唇中ニ挺出ス是

症ノ被膜ヲ外ヨリ内ニ向ヒ數レハ第一皮膚第

二表筋鞘第三柱間筋鞘第四提鞅筋鞘第五固有

筋鞘即漏斗状筋鞘ニメ第六囊是ナリ

先天腸墜ニコタルゼハ陰囊莢膜ヲ作ル腹膜ノ延長

未夕密閉セサル胎児發育ノニ乘シ腸管其孔ヲ

傳リ莢膜中ニ脱出シ鞅丸ト直接スル者ニメ固

有ノ囊ナシ故ニ莢膜ノ壁層其地位ヲ占ム

后天腸墜ニイタルハハ陰囊莢膜トナル所ノ腹膜ノ

一袋己ニ一般ノ腹膜窩中ヲ謝出スルモ尚尋常

ノ位置ヨリ其口ヲ高位ニ開キ此時ニ腸管ハ通

則ノ如ク脱出此ノ如キ様様ヲ存スル者スル者

リ此種ノ脱出物ハ延長セル莢膜ノ后面ニ位シ

重複ノ囊ヲ有セリ即一ハ固有囊他ノ如ク腹

ト二ハ陰囊莢膜ノ一層ヨリナリ固有囊ノ前部

ニ逼壓セラレ故ニ是種ニ在テハ其莢膜軟衝ニ

易ク且液質ノ為ニ膨張セラレ多クハ陰囊水腫

トナル

直性鼠蹊腸墜ニダイイレタルハハ外腹輪ノ直后ニ

メ上腹深脈管ノ内側ニ起リ或ハ其近傍ノ腱ヲ

破裂シ或ハ之ヲ其前ニ逼壓ノ終ニ外腹輪ヲ出

テ逐次ニ陰囊陰或ハ中ニ突出ス但其衣膜ノ斜性種ト異ナルモノハ是物提昇筋鞘ヲ有セサレ氏稀ニ近傍諸腱ヨリナル衣膜ヲ被ルナリ

鑒別直性種ト斜性種ヲ識別スルハ甚夕難シト云凡新生ノ者ハ其位置ト方向ニ注意シ或ハ内臓ヲ復シ次ニ指頭ヲ入レ内景學ノ助ヲ借リ其通路ヲ檢スルニアリ本症ト陰囊水腫ヲ識別スル法ハ左ノ如シ即腸壁ハ始メ上ヨリ起リ曇暗一ノ波動ナク昇丸トノ分界明ニシ咳嗽スレハ増大シ平卧スレハ減少ス陰囊水腫ハ初メ下ヨ

リ起リ透明ニシ咳嗽スルモ増大セズ波動アリテ昇丸トノ分界著シカラズ横卧スルニ減少セズ然レバ以上ニ在同時又夕陰囊尿管ノ怒張ト識別セシニハ先ツ患者ヲ横卧セシノ是時ニ方ノ怒張モ本症醫ノ指ヲ以テ外腹輪ヲ重案シ次ニ患者ヲ起立セシムルニ腸壁ナル片ハ其物下行スル能ハス尿管怒張ナレハ速ニ再發スハ

凡テ鼠蹊腸壁ノ治法ハ己ニ示セシ如ク即總論者ケシ之ヲ復スルニ在リ就中斜行箱頓性鼠蹊腸

墜ノ狭窄部ハ稀ニ外腹輪ニア
 ノ者多シ故ニ手指或ハ引刀ト共ニ腸墜刀ヲ進
 メ上ニ向ヒ之ヲ直割ヒニヲ要ス即上腹深尿管
 割ヘク決メ横
 断スヘカラス

股腸墜

テハモルハ鵬巴兒多氏鞞帶ノ下ニアル股輪

ヨリ出テ患者直立スル片ハ其囊頸前ハ鵬氏鞞
 帶ノ有シ后ハ耻骨筋ト耻骨ニ界シ内側ニ陳鼈
 兒那篤氏鞞帶ヲ構ヘ外側ニノ其鞘中ニ股尿管
 アリテ股管中即股鞘ノニ脱出シ廣筋鞘ノ沙邊
 納私孔ニ達スルヤ是物前行ノ皮下ニ進ミ此ヨ

リ下行セス却テ上走ノ自ラ襪形ヲ呈シ其囊頸
 鵬氏鞞帶ノ下ニ向ヒ囊底ハ其直上ニ載ル但是
 經過ハ學者ニ緊要タリ如何トナレハ之ヲ復ス
 ル術ハ孰レモ其方向ヲ反對スヘケレバナリ始即
 メ下送シ次ニ内本症ノ衣膜ヲ外ヨリ内ニ向ヒ
 向シ終ニ上走ス
 數レハ **甲**皮膚 **乙**表筋鞘 **丙**篩状筋鞘 **丁**股鞘 **戊**股
 中隔 **己**囊ニノ此種ノ婦人ニ多キ所以ハ其膈間
 ノ男子ヨリ廣キニ坐ス但本症ヲ鼠蹊種ト區別
 スルハ其鵬氏鞞帶ニ關涉スル位置ヲ案スヘク
 尚股ノ表靜脈ニ發ル怒張ト本症ノ識別ハ患者

ヲ横臥セシメ其腫起ノ消滅スルニ乘シ拇指ヲ
 股輪ニ壓貼スルニ若乙症ナルハ更ニ脱出セ
 サルモ甲症ノ如キハ速ニ再發スヘシ又之ヲ腰
 筋膿瘡ト判ツハ其履疊ト波動ノ闊如スルヲ以
 テシ列印巴腺ノ膨脹ト區別スルハ一難事ナレ
 氏其病案及炊衝ノ蔓延スル原因ノ有無ヲ探リ
 以テ之ヲ決スヘシ又箱頓種ニ於テ其狭窄部ハ
 鎌状突起癆端ノ内部ト陳氏靱帶トニアリ各症
 共ニ刀ヲ上ト内ニ向ケ之ヲ割ヘシ但之ヲ單割
 スレハ通常其狭窄ヲ治スルニ足ル藝醫氏云瘤



頸ノ内側ヲ割キ示指ヲ入レ其狭窄点ヲ探リ次
 ニ其指ヲ傳リ腸墜カヲ進メ之ヲ截開スヘク通
 常囊ヲ開クニ要ナシト尚鎖孔動脈ノ稀ニ上腹
 動脈ヨリ發シ陳氏靱帶ノ鎌状縁ニ密接メ股腸
 墜ノ頸ヲ圍擁スルヲヤルヲ銘肝スヘシ
 鎖肛トムバニスハ生米會陰ニ肛門ヲ闕如ス
 ル者ニノ或ハ直腸ヲ膀胱ニ了ヘ或ハ自然ノ經
 過ヲナセ氏肛門ニ達セサルト一印垤或ハ一ニ
 ノ止リ或ハ直腸十分ニ開通ノ只肛門ニ一膜ヲ
 鎖ス者アリ是乃不具ノ大略ナリ

治法 肛門ニ只皮膚ヲ鎖シ胎兒便ノ鬱積ニ由リ擴張セル片ハ一頭ニ之ヲ割割スヘシ然レ其門ノ固ク鎖閉スル者ハ尖端ノ彎刀ヲ用ヒ注意ノ上後ニ向ヒ穿貫スル一印埤ニテ手指ヲ以テ其創内ヲ検査シ腸管ヲ探リ已ニ之ヲ得ルヤ直ニ牽出シ其表創ノ周縁ニ縫結スヘシ若効ナキ片ハ亞没薩葛氏ノ手術ニ由リ左腰部ニ人工肛門（按）季肋ト腸骨櫛間ノ中央ニ於テ薦腰筋トノ印埤ヲ始メ前ニ向ヒ平行作ルヘキノミ

肛門併肛瘻 ヒスシ肛圍ノ粘膜坼裂刺痛シ鎖肛

筋收縮痙攣シ脣部凝壓ノ其病状ヲ精檢シ難ク便時ニハ疼痛増劇スル故ニ患者常ニ上圍ヲ恐ル蓋是病ハ通常胃痛ニ兼發シ或ハ微毒ニ源シ大抵外痔ノ基底ニ見レ又ハ皮膚變厚ノ末端ニ坐ス

治法 常ニ瀉便ヲ得セシメ胆礬硝酸銀ヲ以テ燒鏝シ効ナキ片ハ盡ク之ヲ刺開ノ遂ニ粘膜ト鎖肛筋ノ一部ニ及フヘシ但其創縁齊整ナレハ速ニ底面ヨリ癒合スルノ尚他ノ者ニ異ナニス

直腸潰瘡

オハセル、オフ、通常併肛瘻ノ増劇ニ源

ノ或ハ肛圍ヲ占メ或ハ鎖肛筋内ニ位シ其症大ニ前者ニ同ク治法モ亦異ナルトナシ故ニ其肛圍ニ在キハ刀割ノ鎖肛筋ヲ貫キ筋肉ニ嵌入スレハ硝酸銀ニテ之ヲ燒燬シ便通ニ注意シ疼痛刺戟アレハ少量ノ鎮痛沈腸又ハ藥ヲ施スヘシ痔疾ロイモルハ肛門又ハ逆傍ノ小瘤ニノ多ハ直腸ノ下部ニアル靜脈ノ膨脹、怒張及其變大ヨリ生シ故ニ腸管下部ノ血鬱ハ凡テ本症ノ素因トナル即便秘、肝臟病、蓋本症ノ貪者ヨリ富家ニ多キ所以ハ其常ニ放煖ナルト坐業ノ多ニ由リ且凡テ

直腸ヲ刺戟シ之ヲ燬衝ヒシムル諸件ハ此病ヲ發シ易シ即下利、寒濕等今之ヲ外痔、内痔頭肛筋ニ對シニ別ツ

外痔ハ肛圍ニアル紫藍或ハ色ノ小瘤ニノ半ハ變厚ノ粘膜ト半ハ變大ノ皮膚ヲ掩ヒ但出血ナキ刺戟シ或ハ血鬱スル片ハ甚シク痒痛通常シ急性燬衝ニ罹ル片ハ硬ク緊張ノ刺痛セル紫藍色ノ瘤トナル

治法之ヲ剪斷ノ癒合セシムレバ終ニ根治ニ得ヘキモ或ハ其食物ト便通ニ注意スレハ之ヲ緩

解シ又ハ其發育ヲ止ムヘシ故ニ毎夜緩下劑量
 ノ梅那昆ヲ與ヘテ軟便ヲ得セシメ兼テ收斂藥
 設凡弗等子ヲ外敷シ毎朝及便后冷水ヲ滌ク部等
 軟膏ノ類ヲ外敷シ毎朝及便后冷水ヲ滌ク部等
 ヲ以テ最秀ノ療法トス尚是症ノ急性焮衝ヲ發
 スルヤ盡ク之ヲ刺割スレハ即其症直ニ寛解ス
 ルノミナラス終ニ全治ヲ得ルニ至ルヘシ

内痔

ハ莖蒂様ノ瘤ヨリナルト廣底ヲ有スルノ
 別アリ此物或ハ肛門ニ突在シ或ハ只便時ニ下
 垂シ出血多量ニノ遂ニ全身ノ貧血症ヲ將來ス
 又是病常ニ焮衝ニ傾キ易クメ其焮衝スルヤ許

症頻ル抗盛シ刺痛ト刺戟ヲ直腸ニ生シ刺へ尿
 生殖器械ニ波及ス

治法 全身法ハ外痔ニ異ナラスノ飲食ヲ嚴戒シ

便通ト肝臟ノ景況ニ注意シ出血スル者ハ止血

藥 沒食子酸、枯魯兒鏡、丁幾、内用シ明礬、單寧ヲ

射注劑トシ又冷水浴ニ宜シ但シ多血家ニ發

スル出血ヲ遏止スレハ及テテ處スヘク尚其焮

損害ヲ招クテ止スレハ及テテ處スヘク尚其焮

衝スルヤ蒸劑、鹽類下劑大効アリ此症ヲ根治ヤ

ニニハ結紮法ヲ行ニ在リ即温湯ヲ大盆ニ盛リ

患者ヲ其内ニ坐シ十分ニ努張セシメテ其瘤ヲ

露出シ強キ單糸ノ係蹄ヲ作り其瘤底ヲ絞窄シ

外科拾要 卷之六 養竹齋

或ハ複糸ヲ貫キ其各條ヲ左右ニ結紮シ或ハ的
當ノグラムプヲ以テ之ヲ鉗鑷截割セシ后硝酸
ヲ以テ其創縁ヲ燒鏝スヘシ

外科拾要卷六終

官許

芝三島町

東京書林

和泉屋市兵衛

