




脈  
經





脉經十卷

四部叢刊初編子部

上海商務印書館  
縮印元刊本

脈經序

晉太醫令王叔和撰

脈理精微其體難辨絃索浮沉候轉相類在心易了  
指下難明謂流為伏則方冷求非以緩為遲則危殆  
立至況有數候俱見異病同脈者乎夫醫藥為用性  
命所繫和鹵至妙猶或加思仲景明醫亦脈形證一  
率有疑則者校以求驗故傷寒有承氣之戒傷寒發  
下焦之間而遺文遠旨代客能用稽經秘述與而不  
售遂令末學昧於原本氏茲備見各疑已能致微病  
成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐  
伯以來逮于華陀經論聖法合為十卷百病根源各  
以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳載其意  
呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微顯  
則可以比蹤古賢代無天橫矣

天地以生物為心如古之聖賢若士三倫教人  
以善而濟人之生也得其善而自教若夫天地  
聖賢之心乎夫治病莫先於明脈注云出於  
王氏脈經王為精審矣蓋此在不自教先以  
針灸與古法持行夫今度則脈經聖賢之庶  
以信當世濟人之道且考其方今若善之志云  
晉天曆庚午仲夏夏堂家日博誌于廣勤堂

脈經序目錄

新刊王氏脈經目錄

劉敬全序 花柳聖藥開列聖固拾遺 華言林德等類次

卷第一

脈形脈指下診候

平脈學要論

分節三關脈候候所主

辨六寸陰陽脈候脈數

平脈視人大小長短男女各總脈法

持脈輕重法

辨手足六脈候主五臟六腑陰陽逆順

辨肺經病候陰陽之象

辨咳嗽喘促諸脈

平虛實

從後前順伏脈脈

辨痰喘惡胸雜脈

從後前長短病法

平人得病所起脈

診病時差難已脈

卷第二

平人迎神神氣口前後脈

平三關病候升治宜

平青總八脈病候以候脈之上下

平三關陰陽二十四氣脈

平三關陰陽二十四氣脈

卷第三

肝膽部

心小腸部

脾胃部

肺大腸部

腎膀胱部

卷第四

辨三部九候脈證

平雜病脈



藏書圖記

新刊王氏脈經卷第一

朝製李士英書其孫劉榮蘭抄錄 薄筆巨林 鹿 筆類次

脈經脈指一秘決第一 二十四章

浮脈象之有餘按之不足

乳脈浮大而軟按之中空

洪脈極大在指下而沉

清脈任來前却流利長轉甚然數相似

數脈去來促急

促脈來去數時一止復來

弦脈舉之無有按之如琴弦狀

緊脈數如切繩狀

沈脈舉之不足按之有餘

伏脈極重指按之者實乃得之無有

革脈有似沈伏實大而長微絃

實脈大而長微絃按之隱指微然

微脈極細而軟或欲絕若有者無

澹脈細而澹往來難且散或一止復來

細脈小大於微常有但細耳

軟脈極軟而浮細

弱脈極軟而沈細按之欲絕

虛脈浮大而軟按之不足

絳脈去來亦遙小數於邊

浮脈呼吸三至主氣極盛

代脈來數中止不能自還因而傷動脈結者生代者死

浮與乳相類

滑與數相類

沈與伏相類

數與弱相類

平脈早晨至

黃帝問曰天診脈常以平旦何也

乃可診過此非也

觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰

分別三關辨見脈修所至

從魚際至高骨自腕却行一寸

尺澤故曰尺寸寸後尺則名曰關

分陰入三分故曰三陰

寸主腑上焦出頭及皮毛

辨六寸陰陽學術要第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口

者何謂也然寸口者脈之大會

林經卷一

三



生寒者陽為熱諸陰寒故別知藏腑之病也

脈來浮大者此為肺脈也脈來沈滑如石腎脈也脈來如弓弦者肝脈也脈來疾去遲心脈也脈來實見而不見者病病有深意但當知如何受邪

辨脈陰陽大法第九

脈有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脈在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽心脾俱浮何以別之然浮而大散者心也浮小而短澁者脾也肝俱沈何以別之然浮而長者肝也按之與舉指來實者腎也脾者中州故其脈在中而長者脾也是陰陽之脈也脈有陽虛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰虛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽虛陰虛是陰陽虛多之意也陽見寸曰寸弱寸弱則心弱寸弱則肺弱寸弱則脾弱寸弱則肝弱寸弱則腎弱寸弱則六腑皆弱寸弱則百病皆生也

脈經卷一

死陰病見陽脈者順也主生關前為陽關後為陰陽數則吐血陰微則下利腸結則頭暈陰微則眩暈陽微則發汗陰微則自下陽數則生癆陰數如微必死矣而煩澁不得眠也陰微則弱強陽附陰則難得陽為附陰陰為附陽則脈無附則死陽微則不能呼陰微則不能吸呼吸不足者中短氣故此陰陽以察病也

寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽病舌煩滿身熱諸痛腹中結寸口脈沈細者名曰陽中之陰病支節悉不舉身重人聲少氣特汗出陰氣不通者不能舉

尺脈沈細者名曰陰中之陰病舌酸酸寒不能久立陰氣衰以便餘寒陰下濕寒

尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病舌小腹滿滿不能滿滿即陰中滿大便亦然

尺脈數而長關上無有此為陰一陽其人苦兩腋重赤脈身腫痛寸口脈壯大尺中無有此為陽一陰其人舌黃身燥陰中傷足惡寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在經脈之間難矣病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脈之虛實有病之虛實有診之虛實脈之虛實者脈來弱者為虛脈者為實病之虛實者有診者為虛入者為實言者為虛不言者為實診者為虛言者為實診之虛實者有者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也問曰何謂虛實答曰氣血盈則實精氣奪則虛何謂重實所謂









左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善動刺足發陰陰陰  
 左手關後尺中陽絕者無陽脈也苦逆冷婦人月事不調王  
 月則閉男子失精家有餘瀝則足少陰經治陰在足內踝下動  
 脈也  
 左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷骨下有邪氣相引痛  
 刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中脈也  
 左手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足下熱兩股裏寒精氣竭  
 少勞傷所致刺足太陽經治陽  
 左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眩眩耳聾張  
 脈者關則足少陰經治陰  
 右手關前寸口陽絕者無太陽脈也苦少氣心下有水氣立欬  
 節即欬刺手太陽經治陰在魚際間脈也  
 右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐刀所刺無  
 休息時刺手陽明經治陽在手腕中脈也  
 右手關前寸口陰絕者無脾脈也苦短氣欬逆喉中塞噎逆刺  
 手陽明經治陽  
 右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣骨中滿彭彭與骨相引  
 刺手太陽經治陰  
 右手關上陽絕者無胃脈也苦吞酸頭痛胃中有冷刺足太陽  
 經治陰在足大指本節後一寸脈也  
 右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏一甜不食食物得食不  
 能消刺足陽明經治陽在足上動脈也  
 右手關上陰絕者無脾脈也苦少氣下利腹滿身重四肢不飲  
 動者關則足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難刺足太  
 陰經治陰  
 右手關後尺中陽絕者無寸口脈也苦足逆寒逆者下無子  
 陰者關則足少陰經治陰  
 右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛刺足太陽  
 經治陽  
 右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上膺骨痛夢入尿  
 見黑者厥厥寒也物來移人上刺足太陽經治陽  
 右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒熱刺足少  
 陰經治陰  
 右厥二十四氣事  
 平人迎門氣口前後脈第一  
 心實  
 左寸寸口人迎以前脈陰實者手厥陰經也瘧音關大便不利  
 腰滿四肢重身熱者胃脹刺三厘  
 心虛  
 左寸寸口人迎以前脈陰虛者手厥陰經也瘧音悸恐不樂心  
 腰痛難言心如寒狀恍惚  
 小腸實  
 左寸寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也瘧音身熱熱來去  
 汗出不止而煩心中滿身重口中生瘡  
 小腸虛  
 左寸寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經也瘧音顛倒偏頭痛  
 耳煩痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手足陰虛太陽經俱實也病苦頭暈身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不降水食實也

肝實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手足陰虛太陽經俱實也病苦澀澀苦寒少氣四肢寒厥

肝虛

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自念怒如怒狀

脾實

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦泄下堅熱頭暈不欲飲食腹脹心下不樂婦人月經不利腰腹痛

脾虛

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛酒濁寒熱

肝肺俱實

左手關上脈陰虛者足少陽經也病苦眩厥逆食指不能握芤坐不能起偏小目黃赤精隨脫

肝肺俱虛

左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃腹脹食不消

肝肺俱虛

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦肺癆口燥不知人舌乾少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閉而腰痠膝痛引痛

腎虛

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦骨燥咽腫心煩盜汗骨蒸時喘欬汗出小便頻數滿腹骨痛寒熱骨蒸熱小便赤黃怒怒好忘足下熱四肢重耳聾

膀胱實

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地

膀胱虛

左手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦逆滿腹中痛不可挽仰卷也

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦胸中氣急腹中滿引腰背不可屈伸動氣風痺和腰痛外發後痛

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦善噎反流淚眼翳上搶心奪痛不能自反則

肺實

左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛寒時時少腹滿

肺虛

右手寸口氣口以前脈陰實者手足陰經也病苦肺脹汗出若露上潮喘逆胸中塞如欬喘狀

肺虛

右手寸口氣口以前脈陰虛者手足陰經也病苦少氣不足以息聲乾不朝津液

大腸虛

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦腹滿善噦飲而赤身熱喉咽澀結中如投狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脈陰虛者手陽明經也病苦口中喘腸鳴腹鳴唇口乾目昏善流淚

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手足陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂痰痺痛手背脊骨動不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手足陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴喘喘時見光明情中不寧或如恐怖

脾實

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒膝熱腹脹滿煩發不得卧

脾虛

右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

胃實

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而熱汗出頭汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腹下腫痛

胃虛

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦腹寒不得卧惡寒酒渣目昏聲中痛屋鳴嘔噦時或唇口乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脈陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾腹脹堅痞脇下痛胃氣不轉大便難時或泄利腹中痛上善肺肝動五藏立滿渴多飲身熱汗不出痰涎積少

脾胃俱虛

右手關上脈陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空惡少氣不足以息四逆寒泄注不已

腎實

右手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦瘦身熱心滿脊脇相引痛足逆熱煩

腎虛

右手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦足歷小弱惡風寒厥代絕時不至足寒上重下輕行不可以忍地少腹脹滿上發骨脇痛引肋下

膀胱實

右手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦轉胞不得小便便頭眩痛煩渴骨痛

膀胱虛

右手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忍忍不聞惡風塵作脊

腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦

右手足中神門以後厥陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱實也  
痛至羸弱頭重與目相引瀉厥陰起走反取大風多汗

腎勝肺俱虛

右手足中神門以後厥陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也  
病苦心痛者重不自收甚反出時時苦澀泄寒中泄腎心俱  
痛口一微石脈有左右而膝腕無二合用當以左腎合腕腕石  
腎合三焦

平三關病候并治宜第三

寸口脈浮中風發熱頭暈宜服桂枝湯為提湯針風池風府向  
火灸少陰治風宜捷令汗出

寸口脈寒者頭痛宜因寒是極寒宜服麻黃湯發汗針看傷顯  
翻摩治湯寒膏

寸口脈數者為逆宜服五味子湯麻茶者令汗出  
寸口脈數即為吐以有熱皆胃管其管中宜服藥吐之及針胃  
管服除熱湯者是傷寒七八日至十日熱在中煩滿者宜服  
知母湯

寸口脈緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以寒薄寒之摩  
以風膏灸諸治風穴

寸口脈滑滿者胃中壅滿吐逆宜服胡蘆湯太陽巨關瀉之  
寸口脈弦心下痛滿腹頭痛心下有水氣宜服甘遂圓針期門  
瀉之

寸口脈弱湯氣虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補散遺飲食  
消風勿殺氣及胃管補之

寸口脈遲者胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針三里

補之  
寸口脈乳壯血微乳者逆血虛去血故也宜服竹皮湯黃土  
湯灸厥中

寸口脈伏者中逆氣壅塞不通是胃中冷氣心衝心宜服前  
胡湯大三建圓針巨關下脘灸厥中

寸口脈沉者中引者痛管中有水氣宜服澤漆湯針巨關瀉之  
寸口脈濡弱氣弱自汗出是虛損弱宜服乾地黃湯者預圓內  
補散在經散并粉針太衝補之

寸口脈浮上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯調  
和飲食以發之

寸口脈實即生熱在肺喘逆氣塞即生寒在脾胃食不消  
化有熱即宜服竹葉湯為提湯有寒宜服茶葉圓生薑湯

寸口脈細發熱吸吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服積皮枯乾  
湯多中府

寸口脈法大胃腸滿宜服生薑湯白薇圓亦可寒經疏下之針  
上脘期門章門

右上部寸口十七條

關厥浮腫滿不欲食浮為腫滿宜服平胃圓茯苓湯生薑前胡  
湯針胃管先瀉後補之

關厥緊心下苦滿急痛厥寒者宜服茶葉圓生薑湯又太黃  
湯兩治之良針巨關下脘湯之針金匱大黃湯生薑湯

關厥微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子圓針巨關  
補之

關厥微胃中有寒熱宜服知母圓除熱湯針巨關下脘瀉之

開飲後其人不能飲食此胃氣不調胃弱不足宜服平胃圓補脾湯針膏補之

開飲後胃中有熱滑為熱實必氣滿故不能飲食即吐逆宜服紫苑湯下之太平胃圓針胃管滿之

開飲後胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故宜服姜黃湯溫調飲食針胃管補之

開飲後胃氣虛胃中有寒熱飲弱為虛熱作病其訖五有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之

開飲後胃氣逆冷脈滿為虛虛以中焦有微熱宜服乾地黃湯內補飲針足金衛上補之

開飲後大便去血數斗者以脾動傷故也宜服生地黃芽生疔皮湯灸臍腹聖手車下去血有針關石者宜服龍骨圓以愈

開飲後伏中焦有水氣薄泄宜服水銀圓針關元刺便薄泄便止開飲後心下有冷氣苦滿宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

開飲後胃中寒宜服桂枝圓桑葉湯針胃管補之

開飲後胃中痛宜服梔子湯桑葉湯針胃管補之

開飲後脾氣虛宜服藜蘆湯即腹滿聖手車服紫羅圓瀉脾圓針胃管補之

開飲後虛虛宜服生薑桑葉湯即腹滿白薇圓針胃管補之

開飲後胃中熱心煩宜服平胃圓針胃管先瀉後補之

右中部開脈十八條

脉經卷一

尺脈注下熱風小便難宜服桂枝湯湯石散針橫骨關元瀉之

尺脈欲腫下痛宜服當歸湯次天福針關元瀉之

尺脈微厥逆小腹中拘急有寒宜服小建中湯一服腹有針氣海

尺脈數寒寒厥下熱痛小便赤黃宜服隗子湯白魚散針橫骨瀉之

尺脈數胸弱下腫小便難有餘管宜服附石湯隗家散針橫骨瀉之

尺脈滑血氣實婦人經脈不利男子承血宜服升瀉煎太黃湯下去極血鐵關元瀉之

尺脈絀小腹寒小腹及胸中拘急宜服建中湯當歸湯針血海瀉之

尺脈弱氣少欬噎宜服前胡湯乾地黃湯茯苓湯針關元補之

尺脈滿足經逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足大衛補之

尺脈北下焦虛小便去血宜服何皮生地黃湯桑耳田關元亦針補之

尺脈伏小腹痛腹瀉水穀不化宜服大平胃圓桂枝圓針關元補之

尺脈沈腰骨痛宜服骨氣圓針胃管補之

尺脈瀉苦小便難行宜服桂枝湯桑葉湯白魚散針關元瀉之

尺脈達下焦有寒宜服桂枝湯桑葉湯白魚散針關元補之

三三





新刊王氏脈經卷第三

朝聖李女醫長明劉聖蘭張德運曹桂林倪等類次

肝膽部第一

心小腸部第二

脾胃部第三

肺大腸部第四

腎膀胱部第五

肝膽部第一

肝氣不和則肝氣急為肝痛其聲足厥陰經屬肝少

陽氣衰則肝氣急其脈弦也其相火三月

細不至春二月癸亥三月癸卯四月壬辰五月丁未六月丙申死於秋三

月相火旺其王日甲乙壬時平日日出也其困日戊己困時

會時日映也其死日庚辛死時隨時日入也其神現則

諸其王也其養助則其脈目而難也其聲呼其色青

其夏脈則其液泣也其味酸其苦也其辛辛其

肝俞在背第九椎旁在期門一動也肝俞在背第十椎旁在

日月穴在期門

右新撰加詳其病諸症如左

冬至之後得甲子少陽起於夜半肝家王

其脈弦也其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

其脈弦而大者肝氣也其脈弦而小者肝氣也

此不可下不可下之脈也春氣為本不可犯也

右四時經

黃帝問曰春脈如絃何如而絃也伯曰春脈肝也東方木也

物之所始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰

反此者病黃帝曰何如而反也伯曰其氣來實而強此謂大

病在外其氣來不實而微此謂不及病在中黃帝曰春脈太過

與不及其病皆何如也伯曰太過則令人善忘怔忡忽眩昏

而癩疾不及則令人骨節痠痛引脊下則兩脇脹滿黃帝曰春

肝脈來濡弱滑如指年未指曰平也微而滑曰平也

以胃氣為本肝脈來盛實而滑如指年未指曰肝病肝脈來急而

真肝脈至中外急如循刀刃實者為逆也如按琴瑟絃色青

白不澤毛折乃死

春實微絃曰平絃多實少曰肝病但絃無實曰死有實而毛曰

肝病毛甚曰今病

肝藏血含魂惡寒動中則傷魂魂傷則狂妄不精不敢正當

人其脈不微而大者陰虛而筋急兩脇骨不舉毛折也天

死于秋

春肝木其脈絃細而長名曰平脈也及得澀濁而短者肝

病是肺之乘肝金之刻木為臟邪大逆十死不治月平微在

脈反得洪大而散者肝火也肝是心之乘肝子之扶母為邪

邪雖病自愈反得沈澀而滑者是胃之乘肝土之扶母邪

難病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為臟邪難病

難病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為臟邪難病

難病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為臟邪難病

難病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為臟邪難病





右四時經

黃帝曰四時之序逆順之脈真也然脾脈獨何王岐伯曰脾者土也孤藏以灌四傍者也曰然則脾善惡可得見乎曰善者不可見惡者可見曰惡者何知曰其來如水之流者此謂太過病在脾如鳥之啄此謂不及病在中太過則令人四肢沉重不舉其不及則令人九竅壅塞不通名曰重強

脾脈來而和柔相離如雞足踐地曰平其夏以胃氣為本脾脈來實而微數如雞舉足曰脾病脾脈來堅兌如鳥之啄如鳥之距如雀之滿如水之溜曰脾死其脾脈至而前下者死故脈色青黃不澤者折乃死

長夏胃微瀼弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死瀼弱者石曰死瀼石者曰今病

脾脈來急者急者不解則傷寒傷則腸亂四脈不舉毛悴色夭死于春

六月壬寅建未坤未之間土之位脾主之時其候大何向而緩名曰平脾脈得絀細而長者是肝之乘脾水之劫土為敗脾大坤土死不治反得浮而大滑而弱者見脾之乘脾之狀母為實邪雖病自愈反得洪大而數者大論脾是心之乘脾母之勝子為虛邪雖病易治反得沈澁而滑者有貴之乘脾水之陵

土為微邪雖病即至

脾脈至其而弱以長夏主脾土數者至曰平三至曰離經四至脈積五至死六至命危不足於脈也脾脈至其為旋短者為脾中滿食飲入而還吐後天衣後其為微澁者為胃虛四脈不用心懸察若無病大其為緊小微大為氣衰大脈血在腸胃之外小其為寒熱微小為泄滑其為瀉微小為寒垂球腸鳴熱滑其為腸積微滑為積多下膿血也尺大陰氣絕則脈不營其口唇口青者脫肉之本也脈不營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則髮及唇皆肉肉先死胃為乙死木勝土也

脾死者浮之脈大緩曰非按之如覆杯芤散或如掃者死云

右新撰

肺者西方金鳥物之所終故肺朝百脈注百脈而通於心也值葉落柯

右長夏微瀼弱仲景

肺大腸第四

肺象金黃大腸合為府之類其經手太陰脾經也脾與手陽明為表裏腸也其脈浮大瀼瀼之其相季夏六月壬寅建其于秋二月廢冬三月囚春三月死夏三月瀼瀼五月其于日庚辛壬時彌時日入其困日甲乙困時平旦日出其死日丙丁死時為甲日中其神滅共主聲其衰皮毛其候其其聲其色白其真聲其液滑其味辛其宜穢其養辛肺俞在背第三椎棘下也其在中府下腋間上大腸俞在背第十六椎葉在天樞

肺者西方金鳥物之所終故肺朝百脈注百脈而通於心也值葉落柯











也又發熱者脈浮者病溫也其脈盛而滑者寸且脈尺膚寒  
 其脈小者作有泄少氣尺膚熱者病熱也尺恒熱者人迎大者  
 熱也尺膚先寒久持之而脈滑者亦寒熱也尺恒熱者人迎大者  
 寒者血又脈人迎脈小其前少氣色白有加之立死肝所獨熱  
 者勝以上熱肝獨熱者青前熱肝後獨熱者有汗熱肝後寒  
 以下二四寸關中有脈手脈獨熱者勝以上熱管中獨熱者勝  
 脈熱管中寒者腹中熱管中寒者腹中寒息上白肉有青脈  
 者管中有寒

諸淫諸熱諸冷諸濕諸燥諸寒者在寸口關以下病者在關

上管以下病者在尺中管以下病

寸口脈滑而遲不沉不浮不長不短為無病左右同法

寸口太過與不及寸口之脈中手短者曰頭暈中手長者曰

足脛痛中手促上擊者曰有昔痛

寸口脈浮而擊者病在外

寸口脈沉而擊者病在中

寸口脈洪而弱者曰寒熱一微一微及至微散少腹痛

寸口脈沈而弱曰微苦心下有寒時殖有積聚

寸口脈沈而短氣

寸口脈沈而澀者寒熱

寸口脈恒弱為心勞

寸口脈盛或膈上有寒腫下有水氣

脈來而長過寸口者注病

脈來寸口者中風風頭痛亦知之

脈來寸口者中風風頭痛亦知之

脈弦寸口者宿食積在頭痛

脈來過寸入魚際者強梁

脈出魚際逆者喘息

寸口脈微欲知榮上肥腸微微連連如蜘蛛絲微微氣衰

寸口脈偏絕則偏偏不遂其人兩手俱絕者不可治兩手前

部陽絕者苦心中寒垂腹中熱

關上脈浮而大風在胃中張口者息心下澹澹欲嘔

關上脈微浮積熱在胃中幅吐就贏心健忘

關上脈滑而大小不勻好嘔吐是為病久欲進不出一二

復欲動其人欲多飲飲即吐利利即止者生不止者死

關上脈沉而滑者執動

關上脈澀而堅寸而實發之不澀有力為中瘻具有伏結在

脛起氣塞胃氣空胃中

關上脈浮大而不細者其人必心腹冷積癥瘕結聚

復欲動其人欲多飲飲即吐利知利止者生不止

關上脈時來時去乍大乍小乍躁乍數者胃中寒欲嘔勞

欲飲食知瘥狀

尺脈冷者寒陽在下焦

尺脈細微滑泄下冷利

尺脈弱寸強者絡脈傷

尺脈虛小者足腿寒痿痺脚衰

尺脈澀下血不利多汗

尺脈滑而疾為血虛

尺脈沈而澀者寸白蟲

尺脉細而急者筋急不能行

尺脉急者謂之熱中腸痿小使赤熱

尺脉偏沉者面赤如餅外熱則病

平雜病脉第一

滑急實為下膿 數急為熱 浮為風 為虛動為瘧 為

沈為水 為負 數弱為虛 為悸

遲則為寒 滑則少血 數則為虛 洪則為溫 作緊則為寒

數為瘧

瘧疾自發熱數多熱淫多瘧微則為瘧疾散則死

弦為痛 辨之代則偏強為飲 辨弦則骨下拘急而痛 其人

清惡寒

清厥大寒熱在中

伏者當死

空則脈為謂之脫血

九亡汗胸中寒飲冷水飲下利胃中虛冷吐衄其脈並緊

浮而不者風

浮大者中風頭重喜案

浮而緩者骨不仁風寒入肌肉

滑而浮散者癰瘰風

濡者見生

澀而眩者病

浮洪大長者風眩痲疾

大脈表者瀉病

弦而鈞腸下如刀刺狀如蠶母至困不死

緊而急者逆尸

洪大者傷寒熱病

浮洪大者傷寒秋喜春成病

浮而弱者宿食

浮滑而疾者食不消脾不磨

短疾而滑酒病

浮而細滑傷飲

浮而滑中寒有瘧瘧

數而緊者聚有數痛

弦急而短小腹痛又為癰疽

遲而滑者脹

盛而緊白脈

弦小者寒疝

沈而弦者懸飲因痛

弦數者寒飲冬寒難治

緊而滑者吐逆

小弱而滑胃反

澀而緩者有寒

沈而澀者有冷病

微弱者有寒少氣

實脈常中者有寒至早能食時利者難治

滑數心下結熱盛

滑法胃中有熱

從而昏白熱中

沈作伸而卷病傷寒是數虛熱

浮而絕者氣

辟大肉消者有須臾

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當救也

流而數中水冬不冷自愈

短而數中痛心煩

弦而脈絕者傷血脈血脈

弦而脈絕者傷血脈血脈

微浮微言及成病

微數雖去小成病不可勞

浮滑痰脈者以台自病久勿愈

陽邪來見浮洪

陰邪來見沉細

水殺來見脈者

脈來乍大乍小乍長乍短者為祟

脈來洪大痛二者皆祟

脈來沉三澤二四支不仁而重者祟

脈與肌肉相得又持之至者可下之

脈小緊者可下之

脈至而數寒熱俱發必下乃愈

陰脈者宜溫藥

脈數者可發其汗

診五藏六腑絕脈候第三

病人肝絕八日死何以知之面青目視不見人

汗泣出如木不止一日死

病人膽絕七日死何以知之鼻赤之頰

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青時為不休一日死

病人心絕一日死何以知之有息而回視立死一日死

病人肺絕六日死何以知之鼻青如鼯鼠不得紙俾白汗不止

病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱腫脹汗利不

數出無時度一日死

病人胃絕五日死何以知之吞酸噯氣重不可反齎

病人肉絕六日死何以知之耳乾舌骨腫清血大便赤白

明

病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還

病人大腸絕不洽何以知之油利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之頭昏目眩目黃目赤黃也

晉中欲折白汗出如流水一日死

病人骨絕齒落十日死

諸浮脈無根者皆死已上五藏六腑絕候也

診四時相及脈證第四

春二月木王肝脈治當先至心脈次之肺脈次之厥脈次之此

為四時王相順脈也到六月土旺脾脈當先至而不至反得

腎脈此為腎反脾也七月死何謂腎反脾夏火王心脈當先

至肺脈次之而反得腎脈是謂腎反脾期五月六月心丙丁

脾反壯二十日沙河為脾反肝春肝厥當先至而反不至脾脈先  
 先至夏當脾反肝期正月二月也  
 腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝厥當先至而反不至脾脈先  
 至其期當反肝也期七月八月也庚辛  
 至其期當反心也期六月也戊己  
 至其期當反心也期六月也戊己  
 至其期當反心也期六月也戊己

診損至脈第五

脈有損至何謂也然至之脈一呼垂至曰平三至曰離經四至  
 曰離經五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一  
 損損於脈也至脈從下損脈從上下也損脈之為病奈何然一  
 損損於及毛皮察而毛落一損損於血脈血脈虛少不能榮於  
 五藏六府也三損損於肌肉肌肉消瘦食飲不為肌膚四損三  
 於筋筋緩不能自收持五損三於腎三痿不能起於脈反此者  
 至於收病也從上下者骨萎不能起於膝者死從下者皮毀  
 肉毛落者死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者益  
 其榮衛損其脾者益其飲食過其熱濕損其肝者緩其中損其  
 腎者益其精氣此治損之法也

脈有一呼垂至一吸垂至一呼二至一吸二至一呼四至一吸  
 四至一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至一呼一至一吸  
 一至再呼一呼再吸一呼再吸垂至脈來如此何以別知其病  
 也然脈來一呼垂至一吸垂至不大不小曰平一呼二至一吸  
 三至者謂得病前大後小即頭痛目眩前小後大即昏濁短氣

一呼四至一吸四至病過欲甚脈洪者苦煩滿沈細者腹中  
 痛澀者陽熱澀者中寒澀一呼五至一吸五至其氣當用沈細  
 即夜加浮大即寒加不大小鉅而沉其有大小者為難治一  
 呼六至一吸六至者十死脈也沈細者死浮大者死一呼至  
 一吸一至者名曰損人雖能行損當細辨者死所以然者血氣不  
 足故也再呼一呼再吸一呼再吸一呼再吸一呼再吸一呼再吸  
 能行名曰行尸

為鶴曰脈

一出入曰平再出一入少陰三出入入太陽四出  
 一入厥陰再入一出入少陽三出入一出入太陽四出  
 者為陽入者為陰故人一呼而脈再動氣行二寸一吸而脈再  
 動氣行三寸呼吸定息脈五動一呼一吸為一息氣行六寸  
 十息脈五十動氣行六尺二十息脈百動為一備之氣以應四  
 時天有三百六十五日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻  
 一備之氣散行丈一尺一日一夜行於十二辰氣行及則周遍  
 於身與天相應矣故曰五五者五病也一陰一陽是也脈再動  
 為一息再至而脈即散氣一刻百下五息十刻三百五十  
 息百刻萬三千五百息一刻為一度一度氣行一周身晝夜五  
 十度脈三至者離經一呼而脈三動氣行四寸半人息脈七  
 動氣行九寸十息脈下動氣行九尺一備之氣脈百四寸動  
 氣行一丈八天一周於身氣過百八十度故曰離經經者病  
 一陰一陽是也三至而脈則至血脈四至則至精一呼而脈四  
 動氣行六寸人息脈九動氣行一丈一寸人息脈九寸動氣  
 行一丈二尺一備之氣散行八十動氣行一丈四尺一周於身  
 氣過三百六十度再過於身不及五節一時之氣而重至離經

脈有損至何謂也然至之脈一呼垂至曰平三至曰離經四至  
 曰離經五至曰死六至曰命絕此至之脈也何謂損一呼一  
 損損於脈也至脈從下損脈從上下也損脈之為病奈何然一  
 損損於及毛皮察而毛落一損損於血脈血脈虛少不能榮於  
 五藏六府也三損損於肌肉肌肉消瘦食飲不為肌膚四損三  
 於筋筋緩不能自收持五損三於腎三痿不能起於脈反此者  
 至於收病也從上下者骨萎不能起於膝者死從下者皮毀  
 肉毛落者死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者益  
 其榮衛損其脾者益其飲食過其熱濕損其肝者緩其中損其  
 腎者益其精氣此治損之法也



四十動一止而歲死五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死

脉來五十投而不止者五藏無氣即為病也

脉來四十投而一止者一藏無氣却後四歲奪而生而死

脉來三十投而一止者二藏無氣却後三歲奪熱而死

脉來二十投而一止者三藏無氣却後一歲奪熱亦而死

脉來十投而一止者四藏無氣中死得節不動出清明日死還不出數兩死矣

脉來五動而一止者五藏無氣却後五日而死

脉一來而又住者病在心上中治

脉二來而又住者病在肝枝中治

脉三來而又住者病在脾下中治

脉四來而又住者病在腎中治

脉五來而又住者病在肺枝中治

五脉病虛處人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診百病死生次第第七

診傷寒熱盛脈浮大者生沈小者死

傷寒者已得汗脈沈小者生浮大者死

溫病二三日以下不得汗脈大者生脈細小難得者死不治

溫病脈緩大熱其脈細小者死行陰陽

溫病下利腹中痛者死不治

溫病汗不出出不至足者死感逆汗出脈亂瀕急者主虛緩

者死

濕病二三日身體熱腫滿頭痛食飲却故腹直而疾者八日

死四五日頭痛腹痛而吐沫米細繩十二日死八九日頭不

疼身不痛目不赤色不變而反利脈來濇濇按之不彈主時

大心下堅十七日死

熱病七八日脈不數者一作不散一作者當是瘧後二日濕汗

不出者死

熱病七八日其脈微細小便不利加暴口燥賦代古集乾黑

者死

熱病未得汗脈盛躁發得汗者生不得汗者難差

熱病已得汗脈靜安者生脈躁者難治

熱病已得汗常大熱不至者亦死

熱病已得汗熱未去脈微躁虛俱不得利治

熱病發熱其甚者其脈伏微喘喘勿刺不汗出必下利

診人按風不仁痿廢其脈虛者生脈急者死

診癰病感則可治實則死

癰疾脈實堅者生脈沈細小者死

癰疾脈搏大滑者久自已其脈沈小急實不可治小醫急

亦不可療

診頭痛目痛久視無所見者死微視

診人心腹積聚其脈堅強者生虛弱者死又會強者生沈

者死其脈大腹四肢逆冷其人脈形長者死腹脹滿便

血脈大時絕絕下血脈小痿者死

心腹痛瀉不得息脈細小逆者生脈大疾者死

腸澀便血身熱則死寒則生

腸澀下白沫脈流則生澀則死

腸澀下膿血脈絕則死滑大則生

腸澀之傷身熱脈不轉綿滑大者生腥滿者死以齋期之

腸澀下膿血脈澀小溼連者生數疾且大有熱者死

腸澀動擊其脈小細安靜者生浮大緊者死

洞澀食不化不得留下膿血脈微小連者生脈急者死

澀注脈澀時小結者生浮大數者死

脈澀陰左其脈虛小者生脈急者死

秋本虛瘦脈形堅大者死

秋脈形鬆熱脈小堅急者死脫腹下云秋脈形熱不去者死

秋而嘔腹脹且澀其脈弦急絕者死

吐血衄血脈滑小弱者生大者死

汗出著胸其脈小滑者生大者死

唾血脈澀者死滑者生

吐血而秋上氣其脈數有熱不得則者死

上氣脈數者死謂其形損故也

上氣喘息低昂其脈滑手足溫者生脈澀四肢寒者死

上氣面浮腫有息其脈大不可治加利必死又肺

上氣注液其脈虛室伏匿者生堅強者死

寒氣上攻脈實而順滑者生實而逆澀者死上氣痛腹內

者痛腹內大便不通而不利死其脈澀者何如上氣痛腹內

者痛腹內大便不通而不利死其脈澀者何如上氣痛腹內

者痛腹內大便不通而不利死其脈澀者何如上氣痛腹內

瘡腫脈實久病久可治瘡腫小脈虛弱久不可治

消渴脈數大者生細小浮短者死

消渴脈澀小者生實大者死

水病脈洪大者可治微細者不可治

水病脈閉其脈浮大數者生澀細虛小者死

水病脈大如鼓脈實者生虛者死

卒中惡吐血數并脈流數細者死冷大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脈大而緩者生寒大而浮者死緊細而

微者亦生

病者脾胃強急與緩者皆不可治

寒熱度深其脈代絕者死

金瘡出血太多其脈虛細者生數實大者死

金瘡出血脈澀小者生浮大者死

新瘡出血一二石脈來六七日死

新創俱有痛多流血不止自止斷者其脈止脈來大者七日

死滑細者生

從高傾仆內有血腫腫痛其脈澀強者生小弱者死

人為百藥所中傷脈浮澀而疾者生微細者死洪大而澀者

生行逆

人病甚而脈不調者難差

人病其脈澀者最危

人肉外俱虛身體冷而汗出微喘而煩按手足厥逆體不得

安靜者死

脈實滿手足寒頭發者欲生衣重死



老人脉微陽氣隨者生厥然大加息數者死陰陽陽強  
厥至而代奇一作月而死

尺脉滿而脈為實實盛也其發病脈滿而氣亂行此為  
婦人胞中絕傷有胎血久成結積得病久之時赤白帶亦而死  
尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者有氣氣不充病  
得節動動蓋至而死此病終時得之

左手寸口脉滿動乍太乍小不寒後寸口至關關至尺三部  
之在是處動搖交異不同其人病伴其得之此脉旋花落而  
死也

右手寸口脉滿伏乍小乍大朝來浮大暮夜沈伏浮大即  
太過上出魚際沈伏即下不至關中往來無常時時復來者  
榆葉搖澤而死也

右手尺部脉三十動一止有增更還二十動一止乍動乍疎  
連連相因不與食數相類其人雖食穀猶不愈者生而死  
左手尺部脉四十動而一止而後來來逆如循直木如循  
張骨弦短然如兩人共引一產至立冬死也

診三部脉虛實決死生第八

三部脉調而和者生

三部脉聲者死

三部脉虛其入長病得之死虛而滿長病亦死虛而滑亦死  
虛而澀亦死虛而弦急瀉瀉亦死

三部脉實而大長病得之死實而滑長病得之生實而澀  
死實而澀亦生實而弦急亦生實而弦急瀉瀉可治  
三部脉澀非難其人病便死

三部脉亂非其人論得之死

三部脉虛長病得之死卒病得之生

三部脉細而數長病得之生細而數亦生微而繁亦生

三部脉大而數長病得之生卒病得之死

三部脉微而伏長病得之死

三部脉狀論一作長病得之不治自愈治之死卒病得之生

三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死浮而數長病  
風得之生卒病得之死

三部脉死長病得之生卒病得之死

三部脉弦而數長病得之生卒病得之死

三部脉重長病得之死卒病得之生

三部脉堅而數如銀紋脈盛者必死數而數盛者病得之生

三部脉澀澀如桑上肥長病得之生卒病得之生

三部脉連連如蛇跡絲長病得之死卒病得之生

三部脉如舞臺長病得之死二十日死

三部脉如弓弦長病得之死

三部脉累累如貫珠長病得之死

三部脉如水澆然流長病不治自愈治之及死二十日死

三部脉如雀啄長病十日死廿五日死

三部脉如雀啄長病七日死

三部脉如釜中湯沸朝得暮死夜得日中死日中得夜半死

三部脉急切腹間病又短轉腰痛針上下差

新刊王氏脉經卷第四





病人面青目黃者五日死病人余然心滿短氣脾滿內傷五日  
日復愈能起後復困坐於地其病能治此有可謂神良

病人面赤精光若上赤不覺飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目鼻口有黑色起入子口者必死

病人耳目及顛頰赤者死在五日中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩頰者亦死在五日中

病人及痿人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑目直視怒風者死

病人面黑脣青者死

病人面青脣黑者死

病人面黑兩膝下滿不能自轉反者死

病人面回回直視者一日死

病人頭目久痛卒視物不見者死

病人陰結陽絕目睛厥恍惚者死

病人陰陽絕目睛隨者死

病人脣腫滿候者死

病人陰陽絕其齒如熱小豆其臥狀者死

病人齒牙如卵餅者必死

病人汗出不流舌卷黑者死

病入髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

病人髮如乾草者死

腎病而腫黃脾之日成已死

青欲如蒼蒼澤不欲如澤

赤欲如朱赤不欲如朱

白欲如銀白不欲如銀

黑欲如漆不欲如漆

若欲如羅維黃不欲如黃土

目色赤者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃也不可

名者病在中

診胃脘赤脈從上下者太陽病也從下上者陽明病也從外

入白者少陽病也

診髮熱澤髮目中有一赤脈從上下至腫子見一脈一歲死見

一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈半一歲半死見三

脈三歲死

診胸膈痛按其陽明之脈突有過者獨熱在右右熱在左左

熱在上上熱在下下熱

診血者脈多主亦多熱多者多痛多黑為久冷多亦多黑多青

皆胃者寒熱身清面色微黃高黃黃爪甲上黃黃瘡也安胃

少黃亦輕小亦清者不嗜食

婦人經閉及胎死脈急者孕五

為陽曰夫相火脈之病如馬之聚一馬之聚系水火交馳之

狀如燈之燈出出助之上燈助之下燈助之裏不在禁術何

候亦不可知也

脈病人不病脈來如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死

如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死

如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死如盛滿者死

死如紫者死

脈來如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

脈如石者死如石者死如石者死如石者死如石者死

病者其脈必浮大而滑者死由陰虛也

病者自脫腕脈及大而逆者死

去至兩而右痛右有痛而在臍下右有痛而左痛此為逆逆者死不可治脈來逆之逆者浮之不止推手者

半月死一則脈來微細而死者人病當死

人病脈不病者生脈病人不病者死

人病尸厥時之不脈脈絕者死脈當大反小者死

肥人脈細小如絲欲絕者死

人身瘦而脈來往遲者死

人身小而脈來往大者死

人身短而脈來往長者死

人身長而脈來往短者死

人身大而脈來往小者死

尺脈不應寸時和馳卒日死十日必死

肝脾俱至則難言九竅不通四肢不安者多即死

腎心俱至則難言九竅不通四肢不安者多即死

脾腎俱至則五藏敗壞多即死

肝心俱至則熱甚而脈汗不出者見邪

實則為腫肺之推滿而兩脇滿肝推滿肺滿則驚不得

便賢難脚下至小腹滿腹有大結肝大為傷傷心肺滿

大病刺筋肝脈小急刺筋肺脈弱急者死刺筋脈不至者不治自己肝脈小急肝脈小急心脈小急不數言為

瘧疾并流為石火并汗為風火并處為死并小發為瘧疾

脈大急流肝脈大急流為急急心脈搏滑滑為心死肺脈滑

搏為肺死肝脈外鼓流為腸死心肝脈外鼓下血

治腎脈小搏流為腸下血血濕身熱者死心肝脈外鼓下血

二兼俱病者可治其脈小流滿者為腸滿身熱者死熱見

七日死胃脈沈數胃外鼓心脈小緊急陰陽偏男子

發在女子發右不增舌轉可治三十日發其脈者三日發

年不滿二十者二股死脈空而搏血細身有熱者死脈來如

懸鉤者為熱脈至如蠶名曰脈脈無脈者不為與人言

附脈至如數使人食食三四日已脈至如合合如數

一息十至至以上是為絕氣才不足也微九十九日死脈

至如火筋筋是心精之子者也重乾而死脈至如蠶者其肝

氣子虛也木葉落而死也

脈至如雀者雀有聲而鼓是散氣才不足也雀至雀至

而死脈至如泥丸者質弱子不足也極矣而而死也

脈至如棉棉是肺氣才不足也木熱而死脈至如絲絲是胞

精于不足也清登言下筋而死不可治脈至如交交者左

右陽至也微見四十日死

脈至如蠶長長者肢節是

太陽氣才不足也氣來非寒而死脈至如委委者上

狀按之不得是肌氣才不足也也也也也也也也也也也

脈至如懸懸難者得掃之益大是十二俞之子不足也

水凌而死脈至如偃刀偃刀者浮之小急也按堅大急五  
數動然寒熱獨去於臂也如此其人不得坐立春而死脈至  
如瓦渾不真字不真字者按之不可得也是大腸氣子不足  
也重者至而死脈至如膏有令人善怒不欲坐則行立常腫  
是小腸氣子不足也李然而死

問曰胃以春二月中脈一病人其脈反沈師記言到秋當死  
其病反愈到七月復病因往脈之其脈沈復記言至冬死  
問曰月中得沈脈何以故愈之王叔死也師曰一月之時  
其脈自當鴻弱而弦得沈脈到秋自沈脈見浮即死故知到  
秋當死也七月之脈脈得沈何以愈之至冬當死師曰沈  
脈為胃其脈脈也非特去見

經言王相因死冬脈本王脈不再見故知至冬當死也然從  
至冬獲病王以冬至日死故知為證也此

新刊王氏脈經卷第五

新刊王氏脈經卷第六

魏安李森堂醫藥學博士林德等類次

肝病證第一

臍病證第二

心病證第三

小腸病證第四

脾病證第五

胃病證第六

肺病證第七

大腸病證第八

腎病證第九

膀胱病證第十

三焦病證第十一

肝足厥陰經病證第一

肝氣虛則怒實則怒肝氣虛則憂見困憊坐立不得其時則憂  
伏齒下不敢起肝氣盛則身怒怒氣客於肝則夢山林樹不  
病在肝平旦羸下胸脇夜半靜  
病先發於肝者目眩胸膈支滿一日之脾則萎不通身痛  
體重一日之胃而腹脹三日之腎少腹脹者痛歷十日不  
已死冬日入夏草食肝脈薄而長色不青當病墜者擇  
因血在膈下令人喘逆者安而散其血澤者當病淫飲淫飲  
者濕多飲而溢易入肌皮腸胃之外也  
肝脈沈之而急滑之亦然言膈下痛有氣支滿引少腹而痛

時小便難者自眩頭痛腰背滿足為瀉寒時溼女人月使不  
來時上時有得之少時有無墮

青脈之至也長而左名浮脈曰有積氣在心下支脈名曰肝  
痺傳之寒濕與同法腰滿足清頭痛

肝中風者頭目眩兩脇痛行常憊令人嗜甘如蛆蟻狀

肝中寒者其人洗洗寒寒須有發熱面有熱赤數動有汗有  
中煩熱肝中寒者其人兩臂不舉舌本大燥喜大息言中

痛不得轉側時盜汗飲食已吐其肝肝主骨中痛怒罵其脈  
流骨中又室欲令人推按之有熱壅塞

九有所墜瘰癧魚留內者有所大慾氣上而不能下積於左  
脇下則傷肝肝傷者其人脫肉又臥口欲得按時時手足青

目眩體人痛此為肝癰傷所致也

肝脹者脇下滿而痛引少腹

肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微  
生小便澀通

肺支肝即為癰腫心兼肝必吐利

肝者者其病人當欲論其背上先大舌時但欲飲熱肝之積  
名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜殼狀久久不愈發

欬逆連連歲月不已以季夏戊巳日得之何也肺病傳肝  
肝當得脾脾通以季夏壬壬者不受肝肝復欲還脾脾不肯

受因留結為積故知肥氣以季夏得之

肝病其色青身足拘急脇下苦渴或時眩冒其脈弦長此為  
可治宜服瓜風竹瀝湯參九散者當刺大較夏刺行間冬刺

曲泉宜補之季夏刺大衝秋刺中膈首鴻之又當灸期門百

壯氣學九推五十壯

肝病者必兩脇下痛引少腹令人喜怒虛則目眩無所見  
耳無所聞善恐知人持捕之若欲治之當取其經

足厥陰少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰類脈取者邪在  
肝則兩脇中痛寒中惡血在內所善寒時腫取之行間以

引脇下補三里以溫胃中取血脈以發熱血取耳間青脈已  
去其根足厥陰之脈起於大指聚毛之際上補足跌上廉去

內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股入陰毛  
中環陰系按少腹伏胃屬肝絡膈上貫膈布脇肋循喉嚨之

後上入頰顛連目系上出頰與胃脈會於顴其支者從目系  
下頰垂髮際內系支者從後肝別貫膈上注肺中是動則病

肝痛不可以食仰丈夫類為婦人少腹腫其則硬而履脫  
色是主肝所生病者有滑膿逆滑油狐狗遺濁淋瀝者則

寸口大一倍於人迎脈者則寸口反小於人迎

足厥陰之別名曰蠱澤去內踝上五寸別走少陰其別者循  
經上至結於莖其病氣逆則羸腫卒疝突則挺長熱盛則暴

癢取之所別肝痛滑腫脹者急寒呼身腫有熱而復惡  
寒四肢不支面目青白身腫滑其脈當弦長而亮今反短滑其

色當黃而反白者此是金之剋木故大逆十死不治

膈反少陽經病者

膈病者喜大息口苦嘔宿汁心澀澀恐知人持捕之噤中不  
介然發聲依在是少陽之本末亦見其脈之隨下者灸之其

寒熱刺膈陰泉喜噫有音耳長太息中澀澀善惡知人  
將捕之邪在膈逆在胃膈逆則寸口青氣逆則喉舌汗故曰



脈刺三里以下胃氣逆刺足少陽經絡以開腠理却調其虛實以去其邪也

膈脹者脇下痛脹口苦太息

脈氣客於膈則鬱悶

足少陽之脈起於目兌骨上抵頭角下耳後循頰行

手少陽之脈起於肩髃上却交手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至空竅後其支者別從骨下大迎合

手少陽於頰逆少陽於頰

骨者骨屬經肝名膈循膈葉出氣街連毛際橫入膈膈中其直者從缺盆下腋循臂中過季脇下合膈脈中以下循臂膊出脇外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前

循足趺上出小指次指之端其支者趺上入大指之間循大指歧內出其端還貫入爪甲出三毛長動則病口苦善太息

心脇痛不能久側其則面微塵昏善汗足外反熱是為陽

厥是主者所生病者頭痛魚頰痛目兌骨痛膝寒中膈痛股

下腫馬刀挾囊旁出振寒寒骨中脇肋解感外至肘絕骨外

踝前及踵即背清小指次指不用壓者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

心手少陰經病證第三

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則善殺火陽物得其時則善煩灼心氣盛則善喜笑及善長脈氣客於心則夢在

山煙火

病在心目中善寢卒其平曰靜病先發於心者心痛一日之肺喘三日之肝腦痛支滿五

日之脈閉塞不通身痛腫重三日不已死夜夜至五日中

心脈積聚而長或短或急不能言其氣逆而動者為痛湯而巳

心脈流之小而聚於心下如苦心下聚熱而痛食不下其咽

噎時手足熱因閉閉時志不樂善太息腹之五臟急赤脈之至也

喘而眩者曰有積氣在中膈食於食多曰心痺得之疾息

脈而心虛故則發之

心脈急者曰心病少腹當有形其以心為牡雞小腸為之使

致少腹

和榮使魂魄不安者血氣少也血氣少者為於心氣虛者

其人即覺其情自目眩眼花打而精神能散魂魄若行陸

氣者即為癲病氣者即為狂五藏者魂魄之安舍精神

之所依也魂魄飛揚者其五藏空虛也即邪淫多之神靈

所使鬼而下之脈短而微其氣不足則魂魄不安魂魄於肝

脾為於肺肺主泣淚即為涕泣肺氣衰者即為淚出肝氣衰

者則則不安肝主喜怒其聲呼

心中風者其氣發熱不能起心中飢而飲食食則嘔

心中寒者其人病心如敗絮狀者心宿宿寒者其病微心如



若從發後循頭上額至目花背却入耳中其者名曰頰上頰  
按至目內眥則結於鬢髮動則病瘳頰腫不可以觸者  
以按頰以折其主液而生病者耳聾目黃頰腫頭有腫肘  
臂外後脈痛者則人迎大脈倍於寸口虛者則人迎反小  
於寸口也

脾足太陰經病發第五

脾氣虛則四肢不用五藏不安胃則脾脈虛不利  
脾氣實則飲食不足得其脾則寒熱煩去蓋脾虛則寒  
歌聲者手足不主寒氣於脾則喜食陵大淫壞冬風雨  
病在脾日陰暮平旦甚日中持下滿肺  
病先統於脾寒不通身痛重一日之胃而腹脹一日之  
腎少腹脹者脾脈痿三日之膝脫者脾脫痛小便閉十日不  
已死者入定夏發矣

脾脈得堅而長其色黃當病少氣其面黃而不澤者當病  
足腫脾若水狀  
脾脈流之而滿注之而盛者脾熱煩滿胃中有熱不時食  
而不化大飽難四肢多痺時不搏之身肉月使不來來而  
頻併

黃腹之至也大而虛有積氣在腹中有感氣名曰厥病女子  
同法得之痔便四肢汗出風風  
寸口脈弦而滑按則為積積在左寸痛即為心積右寸為肺積  
肺積搏則膈脹善噎

跌陽脈浮而澀浮即胃氣微澀即脾氣衰衰相搏即呼吸  
不得此為脾家未復

寸口脈微欲即為入其氣不出無表有裏心下痞堅  
跌陽脈微而澀微即無胃氣澀則傷脾寒在胃膈上虛下  
寒積不消胃傷脾傷數氣不行食已自噤寒在胃膈上虛下  
實發氣不通為閉塞之病

寸口脈弦而澀澀則為傷其氣長澀則為陰寒氣促鬱傷  
和剛者相得二脈相承其氣必強

跌陽脈滑而緊滑則胃氣實緊則脾氣傷得食而不消有此  
脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有餘腹滿而不能食心  
下如飢此為胃熱不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不  
冷

脾中風者有二三發熱形如醉人腹中煩重及肉瞶瞶而短氣  
也

凡有所聚小者歸入舍寸出當腹則傷脾脾傷則中氣虛  
陽難別陽不從陰故以三二便後死生

脾氣弱病利下白腸澀大便堅不能更交汗出不止名曰脾  
筋弱或五液注下黃赤亦白為病人身下平者胃病也微赤  
者病發癰微黑者有熱實者有寒白者不治胃虛者胃氣痛  
微燥而渴者可治不渴者不可治脾反出者此為脾先虛云

脾水者其人腹大四肢急澀重不能衣一作  
澀○脾脹者善噦四肢急澀重不能衣一作

跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便澀澀澀相搏大便則  
堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

凡人病脈以澀而反寒微煩者人見病者至至而微與發脾  
胃氣尚弱不能消穀故云微煩損穀則愈



足陽明之脉起於鼻交頰中旁約太陽之脉上循鼻外入上  
 齒齠還出俠口環唇下交頰頰頰頰頰下廉出大迎循頰  
 車上耳前過客主人命循頰際至頰頰其支者從大迎前下入  
 迎隨頰龍入徒盤下脈循胃脘膈其支者從頰際下乳內廉  
 下俠膈入氣街其支者起胃下口循膈裏下至氣街中而  
 合以下解開抵伏兔下入臍膈中循肝外廉下足跗入中  
 指內關其支者下膝三寸而別以下入中指外關其支者別  
 跗入大指間出其端是動則病悽然振寒善伸數大顛  
 黑癆至證人與父關木青則悽然而驚心動欲獨閉之膈而  
 癆其則欲上高而致羞衣而垂衣驚腹脹是為筋脈之血  
 微胃所生病者狂墮氣非溫湯不出動口喝胃緊頸腫喉  
 痺大腹水腫臍膈痛傷胃乳街脫位死解外廉足跗上七指痛  
 中指不用無聲則身以前管熱其有餘於胃則消瘴多飢渴  
 色黃氣不足則身以弱胃寒情胃中寒則腹滿者則人迎  
 大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

肺主大陰經病論第七

肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喘者遠仰息肺氣虛則鼻息  
 白物見人斬鼻藉三得其時則鼻見丘戰肺氣盛則鼻見懼  
 哭泣厥厥者于肺則家振振則金鐘之器可物  
 病在肺下喘急口中甚夜平靜  
 病先發於肺喘三日之肝腦滿支滿一日之脾閉塞不通  
 身痛腫重五日之胃脹脹十日不已來日入夏日出  
 肺肺壅塞而長當病也與其滿而散者當滿汗流置至全  
 不復發

肺脉流之而致浮之而喘者流三寒熱脈滿腸中熱小便赤  
 有者痛從腰已上汗出得之勞內汗出當風白脈之至也喘  
 而汗大上虛下實者有積氣在管中喘而虛者曰肺痿寒熱  
 得之因醉而使內也

肺中風者口燥而喘身重而實胃而腫脹

肺中寒者其人吐濁涕

形寒者飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而右行  
 肺傷者其人勞倦則咳唾血其脉細急者數言吐血此為肺  
 極其危得之肺傷氣擁所致

肺脈者虛而濡常欲逆倚息自如脫狀其脈浮

肺水者其人身體重而小便難時大便膿瀉肝受肺以有  
 虛

肢寒而弱臂冬在圍要冬在顛浮夏在上弱反在下汗則為  
 陽弱則血不足必弱為羸子弱自則淡前自出弱則為入浮  
 則為出不入此為有表無裏弱則為入不出此為無表有裏  
 陽出極汗齊腰而還此為無表有裏發名曰厥陽在汗出  
 不汗出

肢脈浮緩少陽微微為血虛緊為微寒此為乳其病  
 屬肺

肺之積名曰息實者在右脇下覆大如杯又三不愈為肺三寒  
 熱氣逆喘欬發肺癰以春甲之日得之何也心病傳肺肺為  
 傳肝肝通以春王者不受邪肺癰欬還心不肯受因留  
 結為積故知息實以春得之肺病其色白身熱俱寒不汗時  
 時狀其脈微遲為可治宜服五味子大補肺湯湯散毒當

刺少商以刺魚際半湯之季夏刺太滿秋刺經渠冬刺尺澤  
皆稱之又實大腹中百壯骨第三種二十五壯

○肺病者必喘欬逆胸有聲汗出多眩暈腹脹身熱肺脹足  
皆腫虛則少氣不能舉息鼻乾取其經于上陰足太陽  
之外表陰內少陰取者

○邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣喘汗出欬動骨節取之燔  
中外輪等第三種之傍以手痛按之然乃刺之取之候  
中以逆之

○手太陽之脈起於中膈下絡大腸還循胃口上膈傷肺傷  
系橫出腋腋下循膈內行少陰心主之正前下肘中後循臂內  
上臂下廉入寸口上魚際魚際出大指之端其支者從臑後

直次指內廉出貫掌中動則病肺脹滿而喘欬欬益中  
痛甚則交兩手屈臂其掌背處起主肺病者取上氣喘  
喘煩心背痛腫臂內則腫痛掌中熱氣喘者腫則有背腫風  
汗出小便數而欠氣虛則有背腫寒少氣不足以息溺色赤

卒遺失絕度虛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小  
於人迎也

○手太陽之別名曰列缺起於腋下腕上分間別走陽明其別  
者並太陽之經直入掌中散入於魚際其實則手少陰經虛  
則欠欬小便遺數取之去腕一寸半肺病身熱欬欬短

氣喘出膿血其脈當短澀今反浮大其色當白而反赤者此  
是火之刺金傷大逆十死不治

大腸手陽明經循證第八

○大腸病者腸中切痛而嘔灌三日重感于寒則泄瀉而

痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷鳴取之衝胃端  
不能久立邪在天腸刺胃之原巨虛上廉二里

○大腸有寒發熱有熱便腸結  
○大腸有宿食發熱發熱有時如積狀  
○大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化  
○厥氣客於大腸則夢田疇

○手陽明之脈起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩  
骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘後廉循臑外前廉

上有出臑骨之前廉上出臂骨之會上入肘後廉循臑外前廉  
循大腸其支者從缺盆直入上頸貫頰入下齒縫中環出挾  
口交人中左之右右之左左之右右之左左之右右之左

主津所生病者口黃口乾乾咽乾喉痛胃脘痛大指次指痛  
不用氣登有餘則當脈沉過者熱腫虛則寒慄不棲感者則  
人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰經循證第九

○腎氣虛則厥逆逆則腹滿四肢正黑腎氣虛則髮見舟船溺  
人得暴發於水中若有暴發腎氣虛則髮見舟船溺

厥氣客於腎則寒臨淵沒者水中  
○病在腎發熱暴目赤四逆者腎虛  
○病先發於腎少腹脹者痛歷三日之勝腸胃腸痛小便  
閉二日之上之心心痛三日之小腸脹四日不已已死大大食更

足瀉

○腎脈搏擊而長其色黃而赤或黃病折腰其氣而散者當病少  
血

腎脉沈之大而脈浮之大而緊者手足骨腫厥而陰不具腰脊痛少腹腫心下有水氣時感時澀得之浴水中身未乾而合券及於膝痿也

黑厥之至也上堅而大者積氣在少腹察青名曰腎痺得之沐浴清水而射

凡有所用力者重者入房過度汗出如冷水則傷腎腎脹者腹滿引背力一然腰骨痛

腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭其骨足逆寒大便反堅

腎者之為病從腰以下冷腰重如帶五十錢

腎者之病其人身體重腰中冷如水狀如坐於中溺如狀反不溺小便自利食飲知故是其證也病傷下臍從身脊脊出坐寒冷濕故又得之

腎之積名曰石氣發於小腹上至心下如股拳老之狀上下無時又三不食痛滿逆骨寒少氣以夏丙丁日得之何也脾病傷腎腎當傷心太過以夏王苦不交邪腎復欲還脾脾不肯受因留結為積故知奔豚以夏得之水流在夫何以故師曰去休故流疾而有聲人亦應之入夜則則脾不動搖脈空多致疾也

腎病其色黑其氣虛弱吸二少氣胸耳若聾腰痛時二失精飲食減少膝以下清其脈沈滑而遲此為可治宜服內補散

建中湯腎氣圓逆置腹者當刺涌泉秋刺伏留夏刺陰谷皆補之夏補之夏刺然谷季夏刺大陰皆瀉之又當灸京門五

十壯者第十四推自壯

腎病者必腰大臍腫痛喘於身重膝汗出骨風血即胃中痛大腹小腹痛滿欬意不熱取其經足少陰太陽血者

邪在腎則骨腫陰腫陰腫者按之而不痛腫脹腰痛大便難有背頸項強痛時眩取之涌泉者皆視有血者又取之

足少陰之脈起於小指之下斜趨足心出然骨之下指內踝之後別入跟中以上膈內出膈中膈上膈內後廉實於腎絡膀胱其直者從膈上貫肝膈入膈中循喉嚨俠舌本其支者從肺出移心注腎中是動則病衄而不欲食面黑如炭

色然色數唾則有血喉鳴而喘生而欲起自眩厥無所見心懸若飢狀氣不足則善恐心滿二若人將捕之是為骨厥欲

養是主腎所生病者口乾舌乾消腫上氣逆乾及痛煩心心痛黃疸腸鳴脊肢肉後廉痛寒厥者跗足下熱而痛灸則強食而止李青一錢帶被舉大陰重覆而皆舉者則寸口大痛

倍於人逆瀉者則寸口反小於人逆也

足少陰之別名曰太鍾當後腰別走太陽其別者起經上走於心包下貫脊脊者病逆則煩悶失則閉癱虛則腰痛取之所別腎病手足逆冷面赤自黃小便不養腎龍蟻

少腹結痛氣衝於心其脈當沉澀而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土之刺水為大逆十死不治

膀胱足太陽經絡第廿一

膀胱病者少腹滿腫而痛以手按之則欲小便而不得有上熱若脈閉此小指外側及腳踵後骨熱若脈閉者取委中

膀胱病者少腹滿而氣瘕

病先發於膀胱者背能筋痛小便閉五日之腎少腫腰脊痛

病先發於膀胱者背能筋痛小便閉五日之腎少腫腰脊痛

經脈一日之小腸脈一日之驛開塞不通身痛體重三日不  
已死矣陰陽夏下膈曰死  
○脈無氣於膝則寒流行

○足太陽之脈起於目內眦上額交頤上其支者從頤至耳上  
角耳者是也頤入額頤出則下直循脊內俠脊抵腰中  
入髓者骨節痛腰尻支者從腰中下會於膝下貫骨入  
腠中其支者從腠內左右別下貫髓中一過膝而解外後  
廉過下腠中以下貫腠內出外廉之後循胫直至小指以  
屈足動則筋急頭痛目似欲閉以按之痛解似折解不可以  
曲屈如痛解如別是為經氣是主筋所生病者痔瘡在頭發  
頭暈頂痛目黃赤出脫動項骨痛尻腫脚管痛小指不用  
盛者則人迎大倍倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

二脈少陽經病證第十  
○三陽病者脈脈兼濡小脈太堅不得小便寢覺陰則為水瀉  
則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間赤見於膝  
取少陽

○少陽病連不得小便邪在三陽約取太陽大絡視其往來脈與  
厥陰小絡結而血著膝上及骨管取三里

○二脈脈者氣滿於皮膚故三然如堅不寒熱在脈因於為  
肺痿然在中脈因堅熱在下脈因滿血

○手少陽之脈起於小指次指之端一出兩指之間循手表腕  
出臂外兩骨之間上貫肘循膈外上肩而出出少陽之後  
入腋窩交膈中散結心包下膈循膻三膈其支者從膈中上  
出缺盆上項候耳後直上出耳上角以系下額至頤其支者

從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頤至目分皆若動  
則為耳聾痺三燭三燭應候理是主氣亦止生病者寸出目兌  
皆病頤耳後有腫解外解解小指次指不用為著者則人  
迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

新刊王氏脈經卷第六



新刊王氏脉經卷第七

魏靈樞先生撰晉高麗醫家王叔和撰臣林億等類次

關

病不可發汗證第一

病可發汗證第一

病發汗以後證第一

病不可吐證第一

病可吐證第一

病不可下證第一

病可下證第一

病發汗吐下以後證第一

病可溫證第一

病不可灸證第一

病可灸證第一

病不可刺證第一

病可刺證第一

病不可水證第一

病可水證第一

病不可火證第一

病可火證第一

熱病陰陽交少陰厥逆陰陽竭生死證第一

熱病陰陽相和生死證第一

熱病生死期日證第一

熱病十逆死日證第一

熱病五藏氣絕死日證第二十二  
熱病至厥死日證第二十三  
熱病損厥死日證第二十四

病不可發汗證第一

少陰病細沈沈數病為在裏不可發其汗

脈浮而緊法當身腫其痛當以汗解假令尺中脈遲者不可發其汗何以知然此為氣不足血微少故也

少陰病脈微而細不可發其汗無陽故也

脈濡而弱弱反在關濡反在尺脈反在下微則陽氣不足溼則無血陽氣反微中風汗出而反發煩澀則無血脈而且寒傷微發汗藥不得眠

動氣在右不可發汗發汗則動而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

動氣在下不可發汗發汗則參汗心中大煩骨節苦疼目運

惡寒食即反吐發不得則不眠

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足逆冷欲得睡卧不能自溫

諸脈數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾

動胃燥而煩其狀相與誤本寒濕

脈濡而弱弱反在關濡反在尺脈反在下微反在下弦為陽

運微為陰寒上實下虛惡欲得汗發故為虛不可發汗發汗

則寒慄不能自運發者則動數吐涎沫咽中必乾小便不利

心中飢煩碎時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒燥發而發

心中飢煩碎時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒燥發而發

汗發而身滿滿一汗腰中復堅

厥不可發汗發汗則寒胸膈中寒氣不得前

諸逆發汗微者難愈劇者宜亂刺者死命將難全太陽病

得之八九日如瘧疾發熱而甚寒熱多寒少其人不可嘔逆復

續自身一日無三發其厥微而瘧寒此為陰陽俱虛不可復

發汗也

太陽病發熱惡寒熱多寒少厥微弱則無陽也

不可復發其汗咽乾者不可發汗

亡血家不可攻其表汗出則寒後而振

衄家不可攻其表汗出必額頭暈上夜急而昏直視而不能

胸不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰痿可與高餘瘕圍

淋家不可發汗發其汗必便血

痿家身重痛不可攻其表汗出則差一作重

冬時發其汗必吐利口中爛生毒

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

秋而小便利若夫小便不可攻其表汗出則厥逆冷汗出多

極發其汗亦堅

傷寒二日至四五日厥者必發熱則厥者後必熱厥深者

熱亦深厥微者熱亦微厥盛下之而反發其汗必口傷爛亦

病人脈微發熱有熱黃消穀引食反吐者醫發其汗陽微腫

脈產脈則發熱發熱各陽不能消穀胃中虛冷故令吐也

傷寒四五日其脈沈煩而渴滿脈沈者病為在裏及發其汗

津液越出大便為難表虛裏實又則難語

傷寒頭痛全發熱形寒中風常微汗出又自嘔者下之至

煩心懊憹如飢發汗則致瘧身強難治為停裏之則發黃不

得小便又則發欬逆

太陽病發其汗因致暈

傷寒脈弦細頭痛而反發熱此為少陽少陽不可發其汗

太陽與少陽併病頭項痛或眩暈時知惡有心下痞堅者

不可發其汗

少陰病發而下利清瀉者宜救火氣劫故也小便必難以強

責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從

口鼻或從目出一州者其為下厥上竭危難治

傷寒有五腎熱病之類也同病異名同厥異經病雖俱傷於

風其人自有瘧疾則不得同治其人至傷於風因復傷於熱

風熱相濟則發風溫四肢不收頭痛身熱汗出不鮮治在

少陰厥陰不可發汗汗出雖言獨語內煩譫妄不得臥其驚

目亂無精治之復發其汗如此者皆發之也

傷寒濕濕其人常傷於濕因而中胸濕熱相薄則發濕溫病

若兩脛逆冷腫滿又背頭自痛舌萎言治在足太陰不可發

汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身重面色萎黃曰重膈

如此者死醫發之也此皆重

病可發汗發汗第一

大法春夏宜發汗

九發汗飲手足足皆周至數熱時開發佳但不飲如水瀉

難若病不解當量發汗汗多則傷陽虛不得重發汗也

九服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云可發汗而無湯者圍散亦可用要以汗出為解然不知湯證發良

太陽病外證未解其脈浮動而汗解宜桂枝湯

太陽病脈浮而數者可發其汗屬桂枝湯證

陽明病脈浮汗出多微惡寒者未解可發其汗屬桂枝湯

太陽病脈浮大問病者言但堅其說利者為虛大便堅者實汗出而解何以欲發汗當以汗解

傷寒其脈不弦緊而弱弱者為湯被火必謬語弱宜發熱脈浮解之當汗出也

病者煩熱汗出即解微而身燥狀日晡所發熱此傷陽明脈浮脈常自汗出此為榮氣和素氣和而外不解此衛不和也索行脈中為陰主內衛行脈外為陽主外從發其汗衛和則愈屬桂枝湯證

病人食藥他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其脈浮而緊空則為風脈則為寒風則傷衛寒則傷榮陰衛俱病發汗即愈屬桂枝湯證

病者節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱縮筋脈其人知強血必自下下者即愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯證

傷寒脈浮發汗發其汗因閉屬麻黃湯證

陽明病脈浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯證

太陽病脈浮者可發其汗屬桂枝湯證

太陽病脈浮脈無汗而發熱其身疼痛八九日不解表裏俱在此當發其汗服湯微發汗自解劇有必切勿乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證

脈浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反全有一寸濡此為不在裏故在表也當發其汗頭痛有必切勿桂枝湯證

下利後身熱脈浮者宜自調養表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜桂枝湯

太陽中風陽浮而陰濡動汗者熱自發濇者宜汗自出當發惡寒者宜桂枝湯

太陽病發熱汗出此為榮氣鬱故使汗出欲救邪風屬桂枝湯證

太陽病下之氣上衝可與桂枝湯不可與之

太陽病初服桂枝湯而反煩不解有法當先刺風池風府却發桂枝湯則愈

燒針令其汗針處微寒按起而赤者必發背感氣從少腹上衝心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病頭痛強九九汗出惡風屬桂枝加葛根湯

太陽病項背強九九無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不嘔者為葛根湯證

太陽與陽明合病不下利但嘔者為葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫下之遂利不止其脈促者表未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯

太陽病頭痛發熱身腫腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘屬  
麻黃湯證

太陽發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

脈經卷七

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

太陽病發熱惡寒身痛無汗不出而喘頭項痛  
屬大青龍湯證

去者屬柴胡桂枝湯  
少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無  
證故微發汗也

發汗小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗

病發汗以後證發汗

一陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復發其汗因轉屬陽  
明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之害逆如  
此者可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣盛鬱在表當解  
之裏少若發汗下不大微不足言傷氣津液不得發當汗而不  
汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人  
短氣但坐汗出而不散故也更發其汗即愈何以知其汗  
不脈脈證故以知之

未得脈弱病人又手自冒之師因欲試令發而不即發者此  
必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆者更發其汗必吐下不止

陽明病本自汗出較復重發其汗病已至其人微煩不了了  
此大便堅也以亡津液胃中乾燥故令其重發其汗大便日幾  
行若本日三四行今日再行者必知大便不又出今為小便  
數少津液當還入胃中故知必當大便也

發汗多又復發其汗此為亡陽者證脈短者死脈自和者  
不死

傷寒發其汗身自為黃所以然者寒濕相搏在裏不辭故也  
病人有寒復發其汗胃中冷必吐

因九

太陽病發其汗遂瀉而不止其人惡風小便利四肢微急難

以屈伸者桂枝加附子湯

三發汗出後解者桂枝二麻黃一湯

傷寒脈浮自汗出小便數煩燥不得眠者麻黃湯

反與桂枝欲攻其表得之便微喘乾煩躁吐逆常作甘草乾

薑湯以復其陽飲愈足溫溫更作為藥甘草湯與之其脚即伸

而面黃黃不和諸語可與麻黃湯重發其汗後加燒針有傷四

逆湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脈浮數可復發其汗為桂枝

湯證

發汗後身腫疼痛其脈沉遲者桂枝加芍藥生薑人參湯

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以麻黃杏仁

甘草石芩湯

發汗過多已後其人叉手自冒心下悸而欲得按之屬桂

枝甘草湯

發汗後其人臍下悸欲飲飲者為茯苓桂枝甘草大棗湯

發汗後腰膝痠痛厚朴生薑半夏甘草人參湯

發其汗不詳而反惡寒者虛故也傷寒多藥甘草附子湯不惡

寒但熱發實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水當稍

飲之令胃中和則愈

發汗已脈浮而數後煩渴者為女散

傷寒汗出而渴傷五安散證不渴為茯苓甘草湯

太陽病發其汗汗出不解其人發熱心下悸頭眩身動

振振欲擗地者其湯

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅乾嘔食其胸下有水

氣腹中雷鳴而利為生薑瀉心湯

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅而不利為木香胡湯

太陽病三日發其汗不解發熱者為於胃也屬氣滿

大汗出熱不去內拘急四肢重不利脈逆而發寒為四逆湯

發汗多亡陽瀉滑者不可下與麻胡桂枝湯和其藥街以通

津液後自愈

病不可吐證第四

太陽病當發熱而發熱今身出及不惡寒發熱關上脈細

而數此腎吐之過也若得病一日日吐之腹中飢口不能

食三四日吐之不甚糜粥飲之食則食者吐此胃吐之

所致也此為小逆

太陽病吐之者但太陽病當發熱今反不惡寒不欲近衣此

為吐之內煩也

少陰病欲食入則吐心中溫欲吐後不能吐始得之手足

寒厥欲吐此胃中實不可下者屬上有寒欲飲嘔者不可吐

當溫之

諸四逆厥者不可吐之虛寒未熱

病可吐證第五

大法者宜吐

九服湯吐中病便止不盡則也

病如桂枝其頭不痛項不強寸口微細胃中痰涎氣上  
撞咽喉不得息此為皆有痰常吐之

病者立瀉胃中積熱而痛不能食欲使人按之而反有渴  
陰下利日十餘行其脈反遲寸口微滑此可吐之吐之利即止

少陰病飲食入則吐心中溫濕欲吐復不能吐當速吐之宿  
食在上膈當吐之

病者手足厥冷脈乍緊邪結在胃中心下滿而煩亂不能食  
病在胸中當吐之

病不可下證象六  
脈滿而弱弱反在關滿反在兩微反在上澀反在下微則陽

氣不足瀉則無血陽氣及微帶風汗出而又躁煩亂則無血  
脈而且寒陽微不可下下之則心下痞堅

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥是乾頭眩心悸  
動氣在左不可下下之則腹裏物急食不下動氣反劇身難

有熱則反欲飲  
動氣在上不可下下之則身熱煩身汗出熱汗自出欲水  
自灌

動氣在下不可下下之則腹脹起頭眩食則下清穀心下  
痞堅

咽中閉塞不可下下之則上懸下重水懸不下則則欲絕身  
熱

瀉心瀉後下利日十數行  
諸外實不可下下之則發微熱上厥則厥當麻痺熱

諸虛不可下下之則瀉引水者勿憂惡水者劇  
疎德而弱弱反在關滿反在兩微反在上微反在下微為陽

瀉微為陰寒上實下虛意欲得瀉微為陰虛者不可下微  
則為欲飲則吐涎沫下之利止而利不休胃中如蠶齧腸  
入則出小便不利兩脇拘急噫息為難辨者相逐者則不仁  
除寒反下出膿今若吐膿不盡雖言不伏數數入則為  
除中口雖欲言不可得前

脈澀而弱弱反在關滿反在兩微反在上澀反在下微則為  
陽虛數則為無血浮則為虛數則為虛汗則為虛自汗而惡

寒數則為瀉振而寒極虛弱在關寸下為常滿汗不得呼吸  
呼吸之中痛在於胸振寒相搏其形如癡賢反下之令厥也

數發熱狂走見鬼心下急痞小便澀澀少腫其脈小便血也  
脈澀而澀澀則陽氣微寒中寒陽微衝中風發熱而惡

寒寒發熱氣冷微瀉心內煩驚以爲大熱鮮肌而發汗工陽  
重煩躁心下苦痞堅至食寒積虛起而頭眩客熱在皮膚

振快不得眠不知胃氣冷寒在關寸技巧無所施以水灌  
其身身發熱渴能操操而振寒重散而罷之汗出而胃體

暢而又振小便為微難寒氣因水灌清散不空開腸變反腸  
出顛倒不得手足為微逆身冷而內煩逆欲從後救法可  
接逆送

脈汗而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤陽獨下陰部  
小便難腹中虛全及小便利而大下此法術家宜慮及反更

實津液四射榮諸血至下煩不眠血薄肉消而成虛陰實後  
以毒藥攻其胃此為重虛者服五苓期下如汚泥而死

跌陽脈盛而發實則如蟬狀陽脈浮則傷胃數則動  
脈此非本病皆持下之所為也藥作內隔其效先微厥反但

汗其人必眩氣逆而除何以言之脾脈太緩全救厥動脾其  
數先微故知脾氣不治大便堅氣逆而除全脈反汗其數故  
微邪獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數厥當逆緣  
厥因前後度數知邪結於脾者則飢數脈不時則主惡瘧  
脈數者久數不止則邪結正氣不能復正氣和結於臟故  
邪熾汗之與皮毛相得脈數者不可下下之必煩利不止  
少陰病脈微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱溼者復  
不可下之

脈浮大應發其汗醫反下之此為大逆

脈浮而大心下反堅有熱為藏攻之不全微汗屬府漫數則  
脈浮多即愈汗少便難脈遲尚不可攻

一陽併病太陽初得病時發汗汗先出復不微自發為陽  
明欲自汗出不惡寒若太陽證不能不可下下之為逆

結胸證其脈浮大不可下下之即死

太陽與陽明合病喘而胃滿不可下之

太陽與少陽併病心下痞堅頭項強而眩勿下之

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

病欲吐者不可下之

太陽病有外證未解不可下下之為逆

病發於陽而反下之熱入因作瘧發於陰而反下之因作  
瘧瘧發於陰而下之緊反入重因作痞

太陽病多者熱下之則堅

本虛及其熱必

無陽陰強而堅下之必清穀而腹滿

太陽之為病腰痠而吐食不下下之益甚腰膝自痛宜下結  
堅

脈浮之為陽病陽氣上撞心中發熱飢而不欲食者則欲  
吐下之不肯止

少陰病其人飲食入則吐心中溫欲吐復不能吐始得之  
手足寒脈弦遲此皆中實不可下也

傷寒五六日不結胸脘腹脹滿者不可下下之亡血死

傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人重之則喘不得  
小便心腹滿下之則短氣而腹滿小便難頭痛背強加溫針  
則必劫

傷寒其脈浮傷陰發熱發熱則厥欲飲飲飲飲飲初茶大漸  
漸小便不利大其脈也惡寒其若食全汗出喉中痛發  
者目赤睛不慧發後發之咽中則傷者復下之則兩目閉寒  
多者發熱多便腹血重少則發黃寒之則咽燥小便利者可  
救難者必危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃身熱不可制食水者必  
嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手足溫者下重便膿血頭  
痛目黃者下之目閉食水者下之其脈必厥其聲啞咽喉塞  
發其汗則膿血除倘俱虛惡水者下之裏冷不著食大便完  
穀欲發其汗口中勃勃上脫滑頰欲發實不大便六七日  
後必便血發發其汗小便即自利

得病一二者脈弱無太陽證胡強而煩躁心下堅至四日雖  
能食以承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯一升  
不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後海未定成其

堅攻之必瀉當須小便利矣堅乃可攻之  
幾結無陽虛寒而不熱也種種不一其人反靜舌上胎滑者  
不可攻也

傷寒多難有陽明證不可攻之

陽明病潮熱微堅可與承氣湯小堅不可與若不大便六七  
日恐有燥屎欲知之法可少與小承氣湯腹中轉矢氣者此  
爲有燥屎乃可攻之若不轉矢氣者此但頭堅後墮不可攻  
之攻之必脹滿不能食飲飲水者即裁其後發熱者必復堅  
以小承氣湯和之若不轉矢氣者俱不可攻之

陽明病身合色赤者不可攻也必發熱也黃者小便不利也  
陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者死止者愈  
陽明病自汗出若發其汗小便自利此爲內結雖堅不可攻  
之當須自欲大便宜蜜膏導而通之若土瓜根及猪膽汁皆  
可以導

下利其脈浮大此爲虛以強下之故也設脈浮重因爾腸鳴  
屬當歸四逆湯

病可下證第七

太法秋宜下

九可下者以瀉勝固散中病便止不必盡三服

陽明病發熱汗多者急下之爲大柴胡湯

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之爲承氣湯

少陰病六七日腹滿不大便者急下之爲承氣湯證

少陰病六七日腹滿不大便者急下之爲承氣湯證  
少陰病六七日腹滿不大便者急下之爲承氣湯證  
少陰病六七日腹滿不大便者急下之爲承氣湯證

柴胡湯承氣湯證

下利三部脈皆平按其心下堅者不可下之爲承氣湯證  
陽明證少陽合病而利者不可下者爲瀉利者久也互相刻賊  
爲負

瀉而數者有宿食當下之爲大柴胡承氣湯證

傷寒後脈沈沈爲內實證陰陽俱下之證爲大柴胡湯證  
傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者  
此爲實急下之爲大柴胡承氣湯證

太陽病未解其脈陰陽俱沈必先散下之解但陽微者有汗  
之而解但陰微者先下之而解陽大柴胡湯證陰微者  
肢節弦遲心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之爲承氣湯證  
結者項亦強如柔痙狀下之即和

病者無表裏證發熱七八日雖脈浮數可下之爲大柴胡湯證  
太陽病六七日表證續在其脈微沈反不結者其人發狂此  
熱在下雖少腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者  
以太陽隨經發熱在裏故也爲抵當湯

太陽病身黃其脈沈結少腹堅小便不利爲無血小便自利  
其人如狂者血證譫語抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿硬小便不利今反利者此爲血當下之  
爲抵當圓證

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃但頭汗出其身無  
有黃頸而還小便不利渴引水飲此爲瘀熱在裏身必發黃  
屬胃覆黃湯

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜  
忘證堅大便必黑爲抵當湯證汗出而證輕者有燥屎在胃



中此風也過經乃可下之左章語言亂以裏虛裏實故也下之則愈大柴胡湯水瀉瀉

病者熱汗出即起復如瘧狀日脯所發者陽明脈實者當下之德大柴胡湯水氣湯證

陽明病發時有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳屬水氣湯證

太陽中風下利漉漉裏解乃可攻之其人熱發汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引腹下痛唯則知急汗出不惡寒此為表解裏不和屬下寒湯

太陽病不解數結胸臑其人如狂血自下下之即愈其外未解尚不可攻當先解外外解小瘕急結者乃可攻之屬桃人承氣湯

傷寒七八日身黃如瘧小便不利少腹便滿屬宿食滯滿證傷寒十餘日熱結在裏發狂妄熱傷大柴胡湯證但結胸無大熱此為水結在胃脇頭微汗出與大陷胸湯

傷寒六七日結胸證其脈沉緊心下硬按之如石堅與大陷胸湯

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅重者則難治屬承氣湯證

陽明病不吐下而心煩者可與承氣湯

陽明病其脈浮濇汗出而不可發宜桂枝湯以重短氣腹滿而喘有熱無知者其外為解可攻其裏手足濇然汗出者此大便秘屬承氣湯其熱不潮不可與承氣湯有腹脹滿大而不大便者為小承氣湯微和胃湯勿令至六下

陽明病語欲煩熱其脈洪大知此者屬承氣湯而與承氣湯一升腹中轉大氣者復與一升知不轉大氣者勿更與之明日又不大便腹脹滿者此為裏虛宜難治不可更與承氣湯

陽明病語欲煩熱其脈洪大知此者屬承氣湯而與承氣湯一升腹中轉大氣者復與一升知不轉大氣者勿更與之明日又不大便腹脹滿者此為裏虛宜難治不可更與承氣湯

二陽併病太陽當罷但發潮熱手足熱汗出大便難而譫語者下之愈屬承氣湯證

病入小便不利大便乍難乍易時有微熱胃不能臥者有燥屎也當承氣湯證

病發汗吐下以後發熱八師曰病人脈微而澀者此為腎中病也大寒其汗又數大下之其人亡血病當惡寒而發熱無休止時夏月盛熱而與精澀者後夜月盛寒而與精澀其體所以然者陽微即惡寒陰弱即發熱故辨證發其汗使陽氣微又下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故與桂枝湯後夜十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故發其汗使陰氣微後夜下血

大陽病三日已發汗吐下瀉利而不解此為難病桂枝後不中與也觀其脈證知何逆隨證而治之

脈浮數法當汗出而愈而下之則身重心悸不可發其汗當自汗出而解所以然者反中厥浮此裏虛頭暈萎黃津液和即自汗出愈

九病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者自愈大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利自愈下以後發其汗必接裏又其脈微細所以然者內外俱虛

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅重者則難治屬承氣湯證

故也

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因胃弱家  
當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和然後下之

得病六七日脈遲浮弱惡寒手足溫醫再三下之不能多  
食其人過下滿而目及食黃頸項強小便難與胡滿後

必下重太陽病三日下利止者必結胃未止者四五日復重下  
此本寒也而反下之利止者必結胃未止者四五日復重下

之此挾熱利也  
太陽病下之其脈促不結胸者此為欲解其脈浮者必結胸

其脈緊者必咽痛其脈弦者必兩脇拘急其脈細而數者頭  
痛未止其脈沈而緊者必欲嘔其脈沈而滑者挾熱利其脈

浮而滑者必下血  
太陽少陽併病而下之成結胸心下堅下利不復止來漿

不直其人必心煩  
厥逆緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下痞堅臍下痛氣上  
衝咽喉眩冒經脈動搖者及而成瘵

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必瀉所以然  
者胃中虛冷故也

陽明病脈遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作  
熱疸下之其腹脹如故耳所以然者脈遲故也  
太陽病寸證脈浮入弱其人發熱而汗出後惡寒不嘔但心  
下痞者此為膈下之也

傷寒大吐大下之極虛復起汗者其人外氣憊當復與之水  
以養其汗因得液所以然者胃中寒冷故也

吐下發汗後其人脈平而小煩者以前虛不勝穀氣故也  
太陽病發汗汗遂發熱而惡寒下之則心下痞此表裏

俱虛陰陽氣皆竭無陽則陰陽後加火針因而煩面色青黃  
膚腦如此者為難治令色微黃手足溫者易愈

脈桂枝湯下之頭項痛食不盡熱無汗心下滿微痛小便  
不利屬桂枝去桂加茯苓白朮湯

太陽病先發其汗不解而下之其脈浮者不愈浮為在表而  
反下之故令不愈今脈浮發汗外當解其表則愈屬桂枝湯

下以後復發其汗者則宜日煩躁不眠夜而妄靜不嘔不渴  
而無表證其脈沈微身無大熱為乾姜附子湯

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩其脈微緊  
發汗即動經身為振搖身不安桂枝木甘草湯

發汗吐下以後不詳煩躁渴飲水四逆湯  
傷寒發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆胸中懊憹為

梔子湯若少氣梔子甘草湯若嘔梔子生薑湯若腹脹者梔  
子厚朴湯

發汗若下之煩熱胃中寒者梔子湯  
太陽病過經十餘日心下溫腹吐而胃中痛大便反溼其

脈微澀者瀉心散先時自極下者與承氣湯不亦可  
與發汗胃中痛微溼此非邪熱也下之嘔故知極下也  
太陽病重發其汗而後下之不大五六日舌上燥而渴日  
晡所小有潮熱從心下至少腹硬滿而瀉不可近食大瀉湯

傷寒五六日其人已發汗而燥之膏腸滿微結小便不利  
渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解傷寒胡桂枝  
乾姜湯

傷寒下後汗出下利後心下痞堅惡氣不除者傷寒代諸湯  
。大下已後不可更行桂枝湯汗出而喘无大熱可以麻黃杏  
仁甘草石膏湯

傷寒下後七八日不解熱結在裏及裏俱熱時三惡風大  
渴舌上苔燥而煩欲飲水救升芩白芍湯

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發  
潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發則不識人循衣  
妄語狂物不安微喘視脈弦者主瀉者死微有但發熱證  
語傷寒氣湯若下者勿復服

三陽合病脈滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺溺發汗  
則眩暈下之則額上生汗手足厥冷自汗發白湯證

陽明病其脈浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒  
反偏惡寒身熱重發其汗即除心煩三而反喘語加溫針  
必休傷又煩躁不得眠下之即胃中窒屋委氣動胸心中懊  
懣舌上胎者傷椰子湯證

陽明病下之其外有熱手足溫不結實心中懊懣若飢不能  
食但頭汗出傷椰子湯證

陽明病下之心下懊懣而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微

滿頭堅後溲者不可下之有燥屎者傷承氣湯證  
太陽病吐下發汗後微煩小便數大便固堅可與小承氣湯  
和之則愈

大下若大下而厥冷者傷四逆湯證  
太陽病下之其脈促者傷桂枝去芍藥湯若微寒傷桂  
枝去芍藥加附子湯

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者未欲解也當耗  
子湯證  
傷寒下後煩而腹滿即起不安傷椰子廬科湯

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩為椰子廬藥湯  
傷寒醫下之續得下利清穀不止身熱痛急當救裏身熱  
疼痛清便自調急當救裏救裏宜四逆湯救裏宜桂枝湯  
太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證續在元  
與小柴胡湯嘔止小安醫則下下急其人醫三微煩者為  
未解與大柴胡湯下者止

傷寒十三日不解胃腸滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本  
當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其  
治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後當柴胡加  
去瀉湯

傷寒十三日過經而瘧語內有熱也當以湯下之小便利者  
大便當硬而反利其脈調和者當醫以丸藥下之非其治也  
自利者其脈當微厥今反和者此為內實當承氣湯證

傷寒八九日下之實滿煩燥小便不利證語身不可轉側  
傷柴胡加龍骨牡蠣湯

傷寒八九日下之實滿煩燥小便不利證語身不可轉側  
傷柴胡加龍骨牡蠣湯

火逆下之因燒針煩躁為桂枝甘龍軍吐瀉湯  
 太陽病浮而動數者則為風數則為熱動則為痛數則為  
 虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解醫反下之動數  
 則逆頭痛即動數在胸中空虛者氣弱胸膈煩心中  
 懊懣陽氣內陷下因堅則為結實大陷胃湯若左不結實  
 但頭汗出其餘元有汗頭而不小便不利身發黃  
 傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以作藥下之柴胡證  
 仍在後與柴胡湯此雖以下不為逆也必熱三而振却發熱  
 汗出而解者心下滿而堅痛者此為結實大陷胃湯若但  
 滿而不痛者此為痞滿後不中與也傷寒五瀉心湯  
 本以下之故心下痞之滿心其痞不鮮其人渴而口燥小  
 便不利者為五瀉散一方言急之一日乃愈  
 傷寒中風暨及下之其人下利日數行發不化腹中雷鳴  
 心下痞堅而滿乾嘔而煩不能復安驚見心下痞為瀉不  
 復重下之其痞益甚此非結熱但胃中虛寒氣上逆故使之  
 堅重甘草瀉心湯  
 傷寒脈滿而下利不止心下痞堅脈滿心下已後以作藥  
 下之利不止豈以理中與之利甚理中理中下利此利在下  
 腹胃氣亦名脈滿餘瀉湯若不中者當利其小便  
 太陽病外證未除而數下之遂然然而利不止心下痞堅表  
 裏不解陽枝人參湯  
 傷寒吐後腹脹者與承氣湯  
 病者下表裏證發熱七八日脈雖浮數者同下之假令下已  
 厥數不解今熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血為

抵傷陽者脈數不鮮而不利必夾血便膿血  
 太陽病醫反下之因腹脹痛煩渴為太陽病桂枝加芍藥湯  
 大黃瀉瀉桂枝加大黃湯  
 傷寒六七日其人人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咳  
 喘不利膿血油利不止為難治傷寒黃升麻湯  
 傷寒本自寒下醫復吐下之寒熱更速吐下止而食入即  
 出高乾者黃連黃連人參湯  
 病可溫證第九  
 大法冬宜服溫熱藥及灸  
 師曰病發熱頭痛脈反沈若不差身體重者瀉當救其裏宜  
 溫藥四逆湯  
 下利腹痛身重發熱先溫其裏宜四逆湯  
 自利不渴者屬太陰其裏有寒也當溫之宜四逆輩  
 少陰病其人欲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之  
 手足厥脈微遲者瀉上宜集飲乾嘔者不可吐當溫之宜四  
 逆湯  
 少陰病欲吐者當溫之宜四逆湯  
 下利飲食者當溫之  
 下利脈遲者當溫之  
 下利脈浮者當溫之  
 下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈絳者因爾腸鳴  
 當溫之宜當四逆湯  
 少陰病下利脈微者即泄汗出必數更衣反少當溫之  
 傷寒醫下之續得下利清穀不止身重者瀉者當溫之宜溫  
 之以四逆湯



少陰病下利便膿血者可刺

婦人傷寒懷身腫滿不得小便加從腰以下重頭有汗熱

懷身七月太陰寒裏不養此心氣衰當刺當勞及關元小

便利則愈

傷寒衄刺刺手少陰少陰在臍當小指後動脈是也針入三

分補之

問曰病有汗出而身熱煩煩燥不為汗解者何對曰汗出

而身熱者風也汗出而煩燥不解者飲也病名曰風脈也太

陽至而故先受邪少陰與陽寒裏也得熱則上從之從之則

脈治少陰寒刺之欬之湯

熱病一日寒口靜人迎強者取之請陽五十九刺以寫其熱

而出其汗其氣陰以補其不足所謂五十九刺者兩手外內

側各三九十二痛五指間各一九八痛足亦如是頭入髮一

寸旁二分各三九六痛入髮于邊各五九十痛耳前後

口下項中各一九六痛額上一

熱病先膚痛空裏充面取之皮以第一針五十九可直為刺

一針真寒皮於肺不得寒之火火心也

熱病先乾多欲著鼻臥不能取之膚肉以第六針五十九

目昏赤肉於脾不得赤之木木肝也

熱病而骨脇痛手足躁取之筋間以第四針針於四達一

筋碎目昏赤筋於肝不得赤之金金肺也

熱病數驚髮脫而狂取之脈以第四針針於骨有餘者翹疾毛

髮去赤血脈於心不得赤之水水腎也

熱病而身重骨痛耳聾而好眠取之骨以第四針五十九骨

病食醫牙齒耳清索骨發無汗不得索之士土脾也

熱病先身而後發熱者刺項太陽而汗出止

九膚脹口乾寒汗

熱病頭痛煩燥者目脈脈者而脈也取之以第三針初

有餘不足寒熱病

熱病體重胸中熱取之以第四針於其輸及下諸指間索氣

於胃絡得氣也

熱病俠臍痛急常臨去清取之清氣與太陽陽明一也

第四針針於臍

熱病而汗且出反脈順可汗者取之魚際太陽大都太白

之則熱去補之則汗出止大者取踝上橫文以止之

熱病七日八日脈口動喘而脈者急刺之汗且自出淺刺于

大指間

熱病先骨脇痛手足躁刺足少陽指手太陽痛甚為五十九刺

熱病先手重痛刺手陽明太陽而汗出止

熱病先身重痛耳聾目昏刺足少陰痛甚為五十九刺云

熱病先腹胃而熱常脇痛刺足少陰少陽

熱病始足腫者先取足陽明而汗出

病不可水瀉第十四

發汗後飲水多者必喘以水瀉之亦得

瀉表大吐下之極虛後復汗者其人外氣微難獲裏之水

以發其汗因得發汗以發者胃中寒冷故也

陽明病潮熱脈弦者可以承氣湯下堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯者腹中不轉矢氣者此為但頭眩發汗不可攻之攻之必腹滿不能食飲水者即瀉

陽明病者胃中虛冷其人不能食飲水即瀉

下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮革因胃腸陽虛強之與水即瀉

病在陽明以汗解而反以水瀉之者瀉之其熱却不得去至煩皮上粟起者欲飲水反不渴宜文蛤散苦不差與五苓散若寒者結胃無熱者與三物小陷胃湯日散亦可身熱反粟不詳欲引衣自覆者以水漿之洗之甚令熱却不得出當汗而不汗即煩假令汗出腹中痛與芍藥三兩如上述

寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮即無血大即為寒氣相搏即為腸鳴醫乃不知而反飲水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即瀉

寸口脈濡而弱濡即理寒弱即發熱弱相搏微乳寒微胃中苦煩此非結熱而反薄告水漬布冷熱貼之陽氣微微胃府無所依陰液凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便數通後不能多飲則可致聚寒心下當奈何也

病可水證第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈太陽病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此為

醫小也若不下其人復不惡寒而渴者為陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也欲飲水者但與之當以法將湯宜五苓散

寸口脈洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣實榮長則陽盛備營不得出身胃實則堅難大便則乾燥三難閉塞津液不通醫疑其汗渴醫不問便重下之胃燥熱愈大便燥澀小便不利禁術相搏心煩發熱而脈如父金乾面赤舌燥

虛實為故大海湯變成燥病也藥所不能制與水灌柱掃陽氣微散身寒溫衣厚汗出表裏道然其病即除形脈多不同此愈非法治但醫所慎慎幸犯傷寒禁術

霍亂而頭痛發熱身重發熱多飲飲水傷五苓散嘔吐而病在膈上後必惡水者宜與指空散飲飲之水亦得也病不可火證第十六

太陽中風以火劫發其汗邪風散火熱血氣流決失其常度兩陽相煎灼其身發者傷胃則欲飲陰虛小便難陰陽俱虛身軀則枯燥但頭汗出亦頭而暈後滿而微喘口乾咽燥或不大便又則譫語狂者至欲羊足躁擾循衣摸床小便利者其人可治

太陽病發汗于重發熱而惡寒下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰復後加火針因而煩面色青黃肩膊如此者為難治公色微黃手足溫者愈

傷寒加溫針灸證  
陽脈浮陰脈弱則血虛血虛則筋傷其脈流者榮氣微也其脈浮而汗出如流球者衛氣衰也垂垂微加熨針血留不行

身發熱而脾熱也

傷寒脈浮而盛以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安身狂投去

考藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

問曰得病十五六日身熱黃下利狂欲走師脈之言當下

清血如脈則為風陰瀉瀉弱少血浮虛受風少血發熱惡寒

瀉瀉項強頭眩發加火重醫令汗出惡寒遂甚發熱因火而

發條帶蒸熱身目為黃小便便難短氣從鼻出血而後下

之胃元津液油利逆不止熱痞在膀胱者結成積聚狀如豚

肝當下未下心動迷憤狂走犯水不能自刺當血元云自明

心于此宜醫所為元他補藥微醫得愈極者不治

傷寒其脈不弦緊而弱者必渴被火必謬言駁者發熱脈浮

解之當汗出愈

太陽病以火熨之不得汗其人必躁到經全解必有清血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病其脈浮發熱咽乾口燥渴而喘發熱汗出而不惡寒反

倍惡熱其身發重發其汗則躁心憤二而反語語加溫針必

休傷又煩躁不得眠

少陰病數而下利語謬是為絞火劫劫故也小便必難為強

者少陰汗出

太陽病一日而燒瓦發熱者有大汗出火氣入胃胃中錫燥必

發諸語十餘日振而反汗出者此為欲解其汗從腰以下不

得汗其人欲小便反不得喘欲失度足下惡風大便堅者小

便當數而反不數及多便已其頭卓然而痛其人足心必熱

發熱下流故也

病可火證第十七

下利發重下利當溫之以為有熱木虛氣乏一方豕枳實散

之。熱病陰陽交并少陰脈浮陰陽躁及生死證年十八

問曰濕病汗出較復然而脈躁者不得汗狂言不能食病

名為何對曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者生於發證

生於種今邪氣交爭於骨肉而傳汗者是邪却而精勝精勝

則當能食而不後發熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而動

復熱者邪勝也不能食者精元停也汗而熱望其愈可立而

傾也

夫汗出而脈尚躁盛者死此今脈不与汗相應此不勝其病

也狂言者是朱志失志者死有三死不見一生雖愈必死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陽脈之極也死者得汗而脈靜

者生也

熱病尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈躁盛得汗

者生也

熱病已得汗而脈尚躁喘目復熱勿實刺喘者者死

熱病陰陽交者死

熱病煩已而汗脈當靜

太陽病脈反躁盛者未陰陽交死獲得汗脈靜者生

熱病陰陽交者熱煩身躁太陽寸口脈而當尚躁盛是陰陽

交死得汗脈靜者生

熱病陽陰退頭揚汗出死陰陽退膝以下至足汗出亦

死死傷俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱進汗出已寒探不



止車口氣冷亦死如發熱

熱病所謂汗者熱病已得汗因得泄是謂汗陰故合

熱病所謂汗陽者熱病已得汗脈尚盛大熱汗出雖不汗

山出者謂其陽故治之如發熱

少陰病惡寒踰而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自胃者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踰其脈不至其人煩而躁者死

少陰病六七日其人息高者死

少陰病微細沈但欲臥汗出不煩自欲吐五六日自利微

少陰病下利者利止惡寒而手足溫者可治

少陰病惡寒而躁時時自煩欲去其衣者可治

少陰病下利止惡逆無脈手足厥者服湯藥其厥暴出者

死微細者生如發熱

傷寒六七日其脈微手足厥煩躁其脈陰感不遠者死

傷寒下利惡逆躁不能卧者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒發熱六七日不利便發熱而利者生其人汗出利不止

者死但有陰陽故也

傷寒五六日不結胃脘滿腹虛微者不可下下亡血死

傷寒發熱而臥七日下利者為難治也

熱病不知汗瀆不能自收口乾陽發其陰煩有寒者熱在膈

死不治

熱病在膈令人渴口乾舌焦黃亦重欲飲不止腹大而脈

尚不厥飲目昏精光死不治

脾胃即中風陰陽氣別離陰不得陽故以三分候其死生

傷寒惡逆上氣其脈數者死謂其人形損故也

傷寒下利十日餘行其人脈反實者死

病者腸下青有瘡而下在臍傍引少腹入陰使陰弱此為

藏病死

夫實則諸諸虛則創聲創聲者重言也重言謂諸喘滿者

死若下利者亦死

若身熱而手足逆者死

吐舌者死室如鼓者難治古頭四邊徐有津液此為欲

解病者至經上厥有也厥自起為欲解色青者未解也

重言重慶陸陽相府先生說卷十九

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣衰則虛重言者肉大

熱病氣脈滿是謂重實

問曰經絡俱實何如對曰經絡實是寸脈盛而人為也皆

當俱治故曰清則順濁則逆去虛實者皆從其物類始五臟

骨肉清利可以長久寒氣暴上脈滿實而清順則生實而

濁逆則死形虛滿脈大盛及滿而不應順則生逆則死所

謂順者手足溫所謂逆者手足寒也

問曰何謂重虛對曰脈虛氣虛是謂重虛此所謂氣虛

者言無常也尺虛者行步丘然也脈虛者不象陰也如此者

清則生濁則死氣虛者脈虛也氣虛者足寒也此其時則生

當其時則死發微言如此也

肺宜商手足突頭熱者春秋則生冬夏則死厥陰而滑而  
身有熱者足踏氣不足經氣有餘熱而尺寒秋冬為逆春  
夏為順經虛者逆者尺熱而尺寒者夏死秋冬生諸病經  
虛大陰則陽經經虛則陰經陽  
問曰秋冬無極陰者夏必盛陽何謂也對曰無極陽者春夏  
無數虛陽則陽虛則在無極陰者秋冬無數虛大陰大陰  
虛則死

熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下身虛  
心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陽氣  
上爭陽得行者生

熱病生定期日證第一十  
太陽之脈色赤黃熱病也素天曰今日得汗待時自己  
食飲陰脈爭見者死期不遠三日其熱病氣內傳腎少陽之  
脈色深煩則熱病也素天曰今日得汗待時自己便少陰  
脈爭見者死期不遠三日

熱病七八日脈微小病者便血口中乾一日半而死者脈代者  
一日死

熱病七八日脈不躁喘不為後三日中有汗三日不汗四日  
死未嘗汗勿庸別論

熱病三四日脈不常其動均有身雖煩熱今自得汗生痺曰  
始解入藏陰陰陽故得汗  
熱病七八日脈不常其動均有身雖煩熱不食今自行也  
熱病七八日脈不常其動均有身雖煩熱二言不得汗四日死  
熱病身面黃而腫心熱口乾舌卷焦黃身熱身熱身熱身熱

肺中脾者死  
熱病與寒狂言不得汗要發不止伏辜傷肝中膈者死  
熱病汗不出出不至足噤腫吐血者要不得臥伏辜在肝膈  
足少陽者死

熱病十逆日證第一十  
熱病脈滿腫脹身熱者不得大小便脈滿小疾 逆見死  
熱病肺鳴腫滿四肢清泄注脈停大而洪不已 逆見死  
熱病大翻不止腹中痛脈浮大絕喘而短氣三逆見死  
熱病嘔且便血奪形肉身熱其脈絕動疾四逆見死  
熱病軟弱悸眩身熱脈小疾奪形肉五逆見死

熱病脹大而脹四肢清泄奪形肉短氣六逆見一旬內死  
熱病腫脹便血脈大時時小絕汗出而喘口乾舌焦視不見  
人七逆見一旬死

熱病身熱甚脈躁小劫而便血且脈隨妄言手循衣健口乾  
躁投不得臥八逆見一時死  
熱病寒發狂走不能食腹滿胃痛引腹腰背嘔血九逆見一  
時死

熱病五逆氣絕死日證第二十一  
熱病肺氣絕喘逆吹啞鼻手足腹腫面黃振慄不能言語死  
衄與皮毛俱去故師先死兩日也一日死  
熱病脾氣絕頭痛嘔宿汗不得食噤逆吐血水漿不得入狂  
言語謬腹大滿四肢不收意不樂死脈與肉俱盡去故脾先

死甲日爲乙日死

熱病心主氣絕煩渴骨痛作嘔腫不可呻吟欬不能飲

哭而笑死神與榮俱去故心先死去日爲癸日死

熱病汗流絕傷小足不安地喘血熱擗酒漸寒血妄出遺

屎溺死絕筋血俱去發汗先死庚日爲辛日死

熱病脈絕喘汗逆腫頭眩目眩不明骨痛短氣喘滿

汗出如珠死精與骨髓俱去發腎先死己日死

故外見腫舌青小入甲筋髮身逆齒拔而脫人皮面厚

黑軟而唾血渴飲飲大滿此五藏絕表病也

熱病至厥死日證等二十三

熱病脈四至三日死脈四至者五人一至病人脈四至也

熱病脈五至一日死時一大至平日死忽忽亂者死

熱病脈六至平日死忽忽寒大至者頃死

熱病脈積日死證等二十四

熱病脈四損三日死所謂四損者平人四至病人脈一至名

曰四損

熱病脈五損一日死所謂五損者平人五至病人脈一至名

曰五損

熱病脈六損一時死所謂六損者平人六至病人脈一至名

曰六損

治傷寒形證亦宜連退 王叔和撰傷寒經脈論

新刊王氏脈經卷第七

新刊王氏脈經卷第八

朝野志云此後第五開列於國醫秘傳漢書音林德 字類火

平平戶厥脈證第一

平疝瘕腸脈證第一

平陽萎陰毒百合狐脈證第三

平瘧亂轉筋脈證第四

平中風癱瘓筋脈證第五

平血痺虛勞脈證第六

平消渴小便利淋脈證第七

平水氣黃汗氣分脈證第八

平黃疸寒熱瘧脈證第九

平消渴心瘧短氣黃脈證第十

平五藏積聚脈證第十一

平疝瘕下痢脈證第十二

平肺痿肺癰熱迫上氣喘脈證第十三

平癰腫腸癰金瘡瘰癧瘰癧第十四

平卒尸厥脈證第十五

寸口沈大而滑沈則之者滑則爲痰氣相搏息氣入於藏即死入於腑即愈此當至厥不知人履身身冷爲入藏即死

如身溫和汗自出爲入腑而復自愈

平瘧濕熱脈證第二十一

太陽病發熱惡汗出而不惡寒者名剛症

太陽病發熱其脈洪而微者為瘧

太陽病發其汗因致發熱多汗其汗

病者身熱足寒頸項強身重時頭熱面赤自汗或獨頭動

搖者為瘧瘧前及後皆瘧病也

太陽病無汗而小便反少氣上衝胃口禁不得語欲作剛症

者微瀉之

剛症為病骨滿口噤臥不着席脚掣急其人必齟齬可與大

承氣湯

瘧病發其汗已其脈冷者知其瘧且大者欲解脈和故

反伏按者必瘧也

瘧疾來按之脈弦而弦直上下行

瘧疾去其脈伏弦直上下

去風病下之則瘧復發其汗必拘急

太陽病其證備身重發九几發脈沈遲此為瘧若瘧症甚

主之

瘧病有尖瘡難瘳

瘧疾雖身發痛不可發其汗汗出則瘳

濕寒之為病其人但頭汗出而背脊發得被覆向火者下之

早則愈或背滿小便不利不脈舌上如胎此為丹印而有熱背

有寒渴飲飲而不能飲則口燥也

濕寒下之額上汗出微喘小便不利者死若下利不止者

亦死

問曰風濕相搏身體疼痛煩滿汗出而解值天陰雨不止歸

云此可發汗而其病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但

風去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其汗微微似欲

出汗首則風濕俱去也

濕寒身煩疼可與麻黃湯加木四兩發其汗為宜慎不可以

火攻之

風濕脈浮身重汗出惡風者防己湯主之

病人喘頭痛重塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在

頭中寒濕故鼻塞內難塞中即念難塞而難塞則難塞則難

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不喘不渴脈

浮盛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便難小便不利者

木附子湯主之

風濕相搏骨節疼痛劇痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣

小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

太陽中熱胸臑是也其人汗出暈裏身熱而渴也白虎湯主之

太陽中暈身熱發痛而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮膚

中邪致也瓜蒂湯主之

太陽中暈發熱惡寒身重而發痛其脈弦細邪逆小便已酒

洒然毛聳手足逆冷小有身熱口前開板齒者發其汗



盛人脈薄小短氣自汗出歷節寒不可屈伸此皆欲消汗出  
營衛所致也

寸口脈流而弱流則主骨弱則主筋流則骨弱則筋汗  
出入水中如火傷心歷節黃汗出故曰歷節也 味酸則傷筋

筋傷則發名曰泄瀉則傷骨傷則發名曰枯在泄瀉相搏名  
曰泄泄禁禁不頭衝不獨行寒傷俱微 應無所拘四屬筋

絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出冷假令發熱便為歷節也  
痛歷節疼痛不可屈伸為筋湯主之

諸肢節疼痛身體羸弱流注腫如筋脈短氣溫溫欲吐桂枝  
芍藥和酒湯主之

平血痺歷節厥證第六  
問曰血痺從何得之師曰夫血主奉人骨筋脈膚皆資百因發勞  
汗出取不時動搖加被微風遂得之形如風狀 雖云其狀

大但以脈自微澀在寸口關上小陰宜針引陽氣令脈和緊  
去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微寒中小脈外證身體不仁如風  
狀黃耆桂五物湯主之

夫欲治病當先知其證何處乃當攻之耳  
男子平人脈大為痿痿虛亦為勞

男子夢之為病其脈浮大手足酸軟夏刺秋冬差陰痿稍自  
出穀則不能行少陰虛痛

人年五十一六其脈浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀快惡者  
皆為痿得之  
男子平人脈虛弱細微者其寒汗出也

男子面色薄者主渴及亡血卒常悸其脈浮者裏虛也  
男子脈虛沈微寒熱短氣裏急小便不利而色白時時目

眩此人喜嘔少腹滿此為勞傷之然  
男子脈微弱而澀為勞為虛為精氣清冷

未去積聚少腹弦急陰頭暈目眩腹裏結積虛汗通  
為清散亡血矣精

脈得諸乳動微陰男子失精女子夢交通桂枝加龍骨牡蠣  
湯主人

脈沈小遲名脫氣其人疾行則喘喘手足逆寒脈沉其則瀉  
泄食不消化也

脈弦而大強則為病大則為乳結則為聚乳則為虛寒虛相  
搏此名為毒婦人則半產漏下男子則亡血失精

平消渴小便利淋脈證第七  
師曰脈陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢而不飲食食  
即吐下之不肯止

寸口脈浮而遲浮則為虛遲則為寒虛則傷氣不足遲則寒  
氣弱跌陽脈浮而數浮則為氣數則消穀而四肢不仁脈數

則澀澀澀數則乾乾乾數相搏則為消渴  
男子消渴小便反多必飲一斗小便一斗腎氣圓主之

師曰熱在腎一作下腰則湧血亦令人淋閉不通淋之為病小  
便如粟狀少腹弦急痛引脐中寸口脈細而數數則為熱熱細

則為寒數為瀉吐跌陽脈數胃中有熱則消穀引食大便必  
堅小便則數少陰脈數婦人則陰中生瘰男子則氣淋  
淋家不可發汗發汗則必便血

平水氣黃汗氣分脈證第八

師曰痛有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證皆節疼痛其人惡風皮水其脈亦浮外證皆腫按之沒指不惡風其脈如散脈風濕不離不渴常其汗下水其脈沈浮外證皆喘石水其脈自浮外證皆滿不渴黃汗其脈沈浮身重發熱背滿四肢頭面腫久不愈發發癢

脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風勝則為燥燥身熱為瘧瘧為泄風久愈為癰癰則為水難以後仰風氣相擊身體發熱汗出乃愈惡風則為風水不惡風者小便通利上脈有突其口者死此為黃汗

寸口脈沈者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目黃上微腫如新臥起狀其脈動時發其手足上陷而不起者風水太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛極汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而四肢如扇浮皆中空不能食反與腫者膝不眠此為黃汗積在骨節或而喘不渴者此為脾脹其形如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脈浮滑為在表其人能食頭痛汗出表無他病病者言但不重故從脈以上為初脈以下為重又難雜以依仲防凡黃汗病主之脈風濕脈浮而黃汗主之

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出而無大熱者越婢湯主之  
師曰黃水者一身面目洪腫其脈沈小便利不利故令病水假

如小便自利亡津液故令渴也越婢加朮湯主之其二云云

酒病脈自利不射故令渴也  
皮水之為病四肢腫水氣在皮膚中四肢重難動者防已茯苓湯主之  
跌陽脈當伏今反緊本自有寒而腹脹中痛醫反下之下之則胃滿短氣

跌陽脈當伏今反數本自有熱消穀難消小便數全反不利此飲水  
寸口脈浮而遲浮脈熱盛脈滑熱溼相搏名曰沈跌陽脈浮而數浮脈熱數脈止熱止相搏名曰伏沈伏相搏名曰水沈則發厥厥伏則小便難產難相持水走皮膚則為水矣  
寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則其寒水不流流走在腸胃

火淫脈盛而沈緊則為瀉沈則為水小便即難師曰脈後諸沈者當實有水身腫重水病脈故若死  
夫水病人目下有卧蓋面目難澤脈伏其人消渴善水腹大  
小便不利其脈沈絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腰痛因腫者何也  
答曰此法當病水若小便自利汗出者自當愈  
水之為病其脈沈小為少陰為風為水虛脹者為風水  
發汗即已沈者與附子麻黃湯主之與杏子湯  
心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其色大青  
肝水者其腹大不能自轉側起下腹中痛時時津液微生小便澀道

便澀道

肺水者其身體小便難時時渴

脈次者其脈大四散者重津液不生但苦少氣小便難

腎水者其脈大勝腫腰痛不得滿膝下濕知者鼻上汗甚足

逆冷面又腹脹

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈

師曰寸口脈沈而遲沈則為水遲則為痰痰水相搏鼓陽脈

狀水鼓不化脾氣弱則發黃脾氣弱則身腫

少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經

為血虛不利則為水名曰血分

問曰病者若水面目身體四肢皆腫小便不利師脈之不言

水反言者若水面目身體四肢皆腫小便不利師脈之不言

脈何類師曰寸口脈沈而緊沈為水緊為痰沈緊相搏發在

關元結胸當微坐極不常湯投之後牽掣相干陽損陰凝結

寒後動發氣上衝喉咽塞噎噎下發痛醫以為留飲而大下

之氣擊不去其病不除後重下之胃家虛弱嗜飲飲水

便不利水鼓不化面目手足浮腫又發黃虛九下水當時如

小差食飲適度腫便短前背膈苦痛鼻去奔豚其水揚揚則

浮狀喘滿先以散擊衝氣去乃治飲教止自喘自差先治

新病病當在後

黃疸之病身腫滿腫一作發熱汗出而渴偏滿狀如風水

汗淡黃色正黃如藥汗其脈自沈

問曰黃汗之病從何得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔

入得之黃者乃藥桂枝湯酒湯主之

黃汗之病兩腳自冷假令發熱此屬濕腳食已汗出又身常

暮則盜汗出者此蒸氣也若汗出已及發熱者久久其身必

甲錯發熱不止者以生薑瀉其身重汗出已輒輕者又久必

身腫則皆中痛又從腰以下汗出下無汗腫則滿如

有物在皮中狀刺者不能食身重煩躁小便不利此為黃

汗桂枝加黃芩湯主之

寸口脈遲而滑遲則寒滑則氣不足跌陽脈微而遲微則

為氣遲則為寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則寒而不

利寒而不利則腹滿腸鳴相逐氣轉勝脾寒備俱勞陽氣不

通則身冷陰氣不通則骨疼陽氣通則寒除陰通則理不

仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散黃則失氣黃則

遺濁名曰氣分氣分心下堅大如盤邊如板板水飲所作桂

枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主之

心下堅大如盤邊如板板水飲所作桂枝去芍藥湯主之

平黃疸藥散發熱藥丸

凡黃疸其寸口脈近掌脈沉口鼻冷並不可治厥流渴飲飲

水小便不利有背脊黃

腫滿舌痿黃燥不得吐為黃疸

師曰病黃腹微數煩渴口燥者以發病時火劫其汗兩

熱所得於發熱者所得於濕得之一身盡發熱而黃肝熱熱在

裏當下之

師曰黃疸之病當以十八日為期至二十日以下當差反劇

為難治

又曰瘧而渴者其難治瘧而不渴者其瘧可治發於陰部

其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也



師曰諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝加黃耆湯又男子黃小便自利當與小建中湯黃疸腹滿小便不利而亦自汗出此為未和裏實當下之宜大黃黃連枳子主消滿

黃疸病小便不利不熱欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噎噎者小半夏湯主之

夫病酒黃疸必小便不利其腹心中熱足下熱是其證也心中懊憹而熱不能食時飲吐名曰酒疸

酒黃疸者或無熱清言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之流涎者先下之

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈酒疸黃色心下結熱而煩

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜齏狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知也

寸口脈微而弱則腹裏弱則發熱當發不發骨節疼痛當煩不煩而極行出狀滿脈絛而遲胃氣反強

少陰脈微則傷類陰氣寒冷少陰不足發氣反強則則煩滿則發熱安熱消發骨節痠熱則腹滿微則傷精殺強則瘦名曰殺發熱

陽明病脈遲者食難用飽飽則發熱頭眩者必小便難此欲作飲酒下之證論如故所以然者厥逆故也

師曰寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺者中風四肢舌煩脾色必黃發熱以行

跌陽脈浮而數則為熱熱則消穀索則為寒食即瀉也又

脈浮為陽脈跌陽脈緊為傷脾風寒相搏食積則眩發寒不消胃中苦渴渴下流小便不通陰候其熱熱流膀胱身熱甚黃名曰殺疸

額上黑微汗出手足中熱薄寒則發熱脫急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不冷

黃家日脯所發熱而反惡寒此為女勞得之勝脫急少腹痛身重黃額上黑足下熱因作患疸其腹脹如水狀大便必黑時溲此女勞之病非水也腹滿者難治消石藥石散主之

夫瘧脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦緩者可溫藥者瘧脈數者可發汗小緊者之浮大有吐之瘧病緩為瘧數名曰瘧母蓋甲煎圓主之

瘧但熱者溫藥也其脈平身寒者但熱骨節煩時暈朝發暮解其發朝解名曰溫瘧白虎加桂枝湯主之

瘧寒者壯瘧也蜀漆散主之

平胃理心痛短氣黃脈脈證第十

師曰夫脈當取太過與不及陽微陰發則皆寒而痛所以然者黃其極虛也今陽虛知在上腹所以宜理心痛者以其脈陰發故也

胃厚之病喘息欲噎甘痛短氣寸口脈沈而遂關上小除數者花柳瘡白白酒湯主之

平人無寒熱短氣不足以息者皆也

背脊痛者從少腹起上衝咽嗝發作時欲死復止皆從寒得其氣上衝背脊痛及在寒寒熱黃脈湯主之

師曰寤有黃脈有汗脈有驚悸有火邪此四部皆汗液滲發得之

平五藏寒宿食脈證第十一

跌陽脈微弦法當腹滿不滿者下部閉塞大便難兩法

脈為滿此脈從上下也當以冷瀉服之

病者腹滿按之不滿為虛滿為實可下之宜黃耆下者下

之黃自去腹滿時減後知此為寒當與溫藥

跌陽脈浮而濡滑則為濕浮則為虛盛則腸鳴腹中堅滿

雙脈弦而遲者必心下堅脈大而緊者傷乎有津也可下之

病腹中滿痛為實當下之

腹滿不泄減不足宜當下之

病腹滿者數日大便溏而飲食如故腹中三物湯主之

寸口脈遲而緩遲則為寒數則為熱氣寒相搏轉絞而痛

寸口脈遲而澀澀為痰濕為無血

夫中美寒食大其人清涕出發熱也利者善噎

中寒其人下利以逆寒也欲噎不能此人肚中寒一作

夫腹中寒則痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不

衝者以下則痞

寸口脈弦者則膈下俱急而腹中其人當音惡寒也

寸口脈浮而滑頭中痛發熱脈盛而遲緩則為寒遲則為虛

虛寒相搏則欲食溫飯食冷則咽痛

寸口脈微大中堅而澀澀則為寒澀則為虛澀則血不足故

衄衄汗下而後下之也際在中央衄衄間在此不衄衄何為衄

汗衄下之耶

夫厥冷而脈浮欲飲如胃欲按之不發脈微澀者當下其寒

腸下痛積聚欲飲此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯

寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒發熱則不欲

食惡寒相搏則為寒病

跌陽脈浮而澀浮則為風澀則為寒而寒則發熱脈澀發

則自汗出手足惡寒主脈沈弦者大為頭滿主之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮大按之反澀天

中亦澀而澀故知有宿食

寸口脈微而轉索左右盛者有宿食

寸口脈緊即頭痛風寒或腹中有宿食不化

脈滑而數者實也有宿食當下之

下利不欲食者有宿食當下之

大下後六七日不大便煩不得眠澀澀此有積聚也所以然

者本有宿食故也

宿食在上腹當吐之

平五藏積聚脈證第十二

問曰病有積有聚有穀氣何謂也師曰積者積病也

終不移聚者隨病也故有積聚積者移可治聚氣者隨

下痛按之則愈急按之則愈無去病已愈不得復發矣病復

發即為穀氣也

諸積大矣厥來細而附者有積也性遲寸口滑者在胃中微

出寸口積在脾中積在腸胃上關上積在心下微下關

積在少腹大積在氣衝脈出在左腹在左脈出在右積在右

脈兩出積在中央必以其部也



厥陰弱手按之絕者下血煩數者必吐血  
寸口脈微而弱氣溫但虛男子則吐血女子則下血嘔吐汗  
出者奇

跌陽脈微而弱者以胃氣為本吐利者為不可有此為有水  
氣其脈必滿小便則難

病人身熱脈小絕者吐血若下血婦人亡經此為寒脈逆者  
滑上者寒陰氣甚難

脈有陰陽跌陽少陰脈皆微其人不吐下必亡血  
厥逆為在胃寒滑內結胃滿必吐血

男子盛大其脈陰陽微跌陽亦微楊少陰浮大必便血而失  
精設言欲者當小便不利

跌陽脈必腸辟下血  
病人胃弱腹脹舌青口燥其人但欲飲水不飲雖欲飲飲則

微大寒逆腹不滿其人言欲滿為有瘀血當汗出不出內結  
亦為瘀血病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反急熱此為

陰伏其脈也當下之  
下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠血也

子嘔吐瀉下利脈證第十四  
脈而脈弱小便便利身有微熱見厥者難治

跌陽脈浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並浮但出而不  
入其人即嘔而不得食恐怖而死寬緩即差

夫脈家有離脈者不可治嘔瀉盡自愈  
先嘔却瀉者此為欲解先瀉却嘔者為水停心下此為飲家  
脈本渴今不渴者以心下有支飲也

問曰病人脈數發熱惡寒消飲引食而不吐者何也  
師曰以發汗汗冷陽微屬虛脈脈乃數數為寒熱不能消飲  
胃中虛冷故吐也

陽陰陰發其人食已即吐瀉浮而數亦為吐  
寸脈尺微其人胃滿不能食而吐上者為下之故不能食

設言未止者此為胃反及故尺為之微澀也  
寸口脈盛而乳寒則為寒乳則為虛虛寒相搏脈為陰結而

遲其人則噤閉上脈數其人則吐  
脈微者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐寒在於上醫反

下之今脈反弦故名曰虛  
跌陽脈微而澀微則下利澀則吐澀數不得入也

寸口脈微而數微則無氣無氣則至虛至虛則血不足血不  
足則胃中冷跌陽脈浮而澀浮則為虛澀則傷脾胃傷脾則不

磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反厥陰脈而澀其病  
難治

夫吐家脈來形狀如新起  
病人欲吐者不可下之

嘔吐而病在膈上痰涎水者難愈寒之濕水者難愈散主之  
或而腹滿視其前後知何部不利刺之即愈

夫六腑氣絕於外手足寒上氣胸縮五臟氣絕於內者下  
利不禁不甚者手足不仁

下利脈澀強者下重其脈大者為未止脈微滑者為欲自  
止澀強者不死  
脈滑按之虛經者其人必下利

下利有微熱其人渴脈弱者今自愈

下利脈數者微發熱汗自出者自愈設脈復發者未解

下利寸脈反弦數尺中自濡其人必清膿血

下利手足厥無脈灸之不溫者脈不遠反微喘者死

少陰者厥陽者為順也

下利脈數而滑者一作者今自愈設不差其人必清膿血以有熱故也

下利後脈絕手足厥冷脈時脈還手足溫者生脈不還者死

下利脈反弦發熱身汗者自愈

下利脈者當利其小便

下利清穀不可攻其表汗出必眩暈其表微寒者當下之

下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱

下利清穀必飢胃身出而解其人微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表

下利脈遲而滑者實也利未欲止當下之

下利差至其年月日時復發此為病不盡當復下之

下利而語者為有燥屎也當下之

下利而腹瀉瀉後當實當下之

下利腹中堅者當下之

下利後更煩按其心下濡者為虛煩也

下利後脈三部皆革按其心下堅者可下之

下利脈浮大者虛也以下之故也設脈浮革因胃腸鳴當

溫之

病者善黃躁而不渴胃中寒實而下利不止者死

夫鼠蹙下者不可下之下之後心下堅滿腹脹者為寒但當

溫之脈沈緊下之亦然故大浮弦下之當已

平肺萎肺經熱逆上氣逆欲飲脈數第十五

問曰熱在上腫者因熱為肺萎肺痿之病故何得之

師曰或從汗出或從嘔吐或從消小便利數或從便難數

被賊擊下利重亡津液故得之

寸口脈不出而反發汗傷氣血素陰脈不溫三焦絕入而

不出陰脈不溫身體及冷其內反煩多唾吞燥小便反難此

為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如脈絕但坐發汗故也

肺痿其人欲飲不得飲飲則吐酸沫久久小便不利其則脈

澀弱

肺痿吐涎沫而不飲者其人不渴必遺溺小便數飲以然者

以上虛不能割下也此為肺中冷必飲多涎唾其舌乾者當

以溫其氣

師曰肺痿狀唾膿飲飲者自愈自張口者短氣也

欬而口中自有津液舌上脂滑此為浮寒非肺痿也

問曰寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者何也

師曰此為肺痿之病若口中銜辟燥飲則當中焦虛濕燥反

滑數此為肺熱

欬唾膿血脈數者皆為肺痿脈數者皆為肺癰

問曰病欲飲脈之何如知此為肺癰者有膿血吐之則死後

竟吐膿死其故何類

師曰寸口微而數則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於肺吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿渴燥不渴多唾濁沫時時寒熱之加過血虛為癯薄黃清瘦吐如米肺弱則可殺濃則死

欬而宜滿振寒脈數喘乾不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如糞米粥者為肺痿惟得湯主之

肺癰者滿肺一身面目浮腫虛寒清涕出不聞者宜寒辛欬逆下氣喘滿迫塞羸瘦大黃瀉肺湯主之

寸口脈數欬陽脈弦寒熱相搏世振寒而欬發陽脈浮發胃氣和經此為肺癰

問曰振寒欬熱寸口脈滑而數其人飲食起居若知故此為癰腫病醫者不知而以傷寒治之屬人愈也何以知有腫脹之所在何以別知其處

師曰假令腫在背中者為肺腫其人脈數欬喘有膿血設膿未成其脈自緊數發至六但數脈為已成也

夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得卧者死上氣面浮腫者息其脈浮大不冷又加利尤甚上氣盛而喘者為肺脹欬作風水欬汗則愈有欬而汗下者則其脈沉而汗

夫酒客飲者必致吐血此坐飲過度所致也

欬家脈弦為有水可與干薑瀉之欬而脈浮其人不可不食如是四十日乃已十日然而時發熱欬至欬者未盡也

此為膏中寒實寸口也當吐之欬家其脈弦又行吐藥當相人論病而無幾乃可吐之其狀沈者不可發汗又欬數感其

脈弱者可治貴大數者不可治其脈虛者以空言其人全有支飲在背中故此治為欬家

問曰天飲有四何謂也師曰有痰飲有支飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲何以得異師曰其人素盛今瘦水走腸間漑漑有聲謂之溢飲飲後水流在腸下欬逆引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢營汗出而不汗出身體振重謂之痰飲飲逆循息短氣不得卧其形如腫謂之支飲

留飲者胸下痛引缺盆形如蠶蠶謂之留飲

背中有留飲其人短氣而滿四肢痠痛即痛其飲流者有留飲夫心下有留飲其人飲食寒冷大如手

病者飲飲其人飲自利者反快疑利心下微滿此為留飲飲去故也甘遂半夏湯主之

病後飲者當以溫藥和之

心下有痰飲背胸支滿目眩耳鳴此為痰飲湯主之

病後飲者當發其汗小青龙湯主之

支飲亦當而不能計加短氣耳聾也

胸膈支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黃身體微重得之數十日醫吐之不食水防己湯主之

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

嘔家全滿渴者為飲解今反不渴心下有水飲飲也小半夏湯主之

夫有飲家然煩胃中痛者不至死至一二日或一歲可與十棗湯

膈上之病滿而欬吐痰則寒熱皆痛腫脹目盈自出此由留

肺其人振振身劇劇必有伏飲

夫病人飲水多必暴喘滿九食少飲多心下水停者則悸

微者短氣

飲飲者寒也皆天下陰虛厥脈強者飲也肺飲不強也

有宜短氣

病人一臂不隨臂骨接在臂其脈沈細其風也必有飲

在上腫其脈虛者為微脈寒不周故也又久自差

腫滿口苦身燥此腸胃有水氣也防已散自差麻夫黃芩芝

假令瘦人膝下悸吐涎沫而頭眩者水也五苓散主之

先渴却濕瀉水停心下此為飲家平更加茯苓湯主之

水在心心下堅柔短氣熱水不飲飲水在肺吐涎沫飲水

水在脾少氣身重水在肝脇下支滿寒而痛水在腎心下悸

平瀉腫腸痛金瘡傳毒散第十六

脈數身大熱內有寒也發此為陽虛發此為陰虛

諸浮數脈應當發熱而反洒洒惡寒左右有痛處當發其痛

脈數而遲必發熱弱而數為痰飲當發腫

脈浮而數身重無熱其形喘急中微喘中微喘不知痛之

所在此人當發瘧

脈滑而數則為熱滑則為實滑則主痰數則主衛宗衛相

逢則結者凝熱之所過則為膿也

師曰諸難症欲知有膿無膿以手搖腫上熱者為有膿不

熱者為無膿

問曰官羽林婦積瘕之何以知婦人腸中有膿瘕下之則

愈師曰寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為瘕數則

為衝數下降榮滑且其衝相下為瀉則少腹瀉堅小

便或澀或時汗出或便惡寒膿色已成設脈遲數最為熱血

血下則愈

腸澀之為病其身謂之錯腹皮之作急按之濡和腫狀腸澀

者少腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自汗出便惡寒

其脈澀者膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成不可

下也大黃牡丹湯主之

問曰寸口脈微而澀澀者亡血若汗出設不汗者云何

答曰若身有發微乃謂死傷亡血故也

便澀從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可

治之

### 新刊王氏脉經卷第八

新刊王氏脈經卷第九

朝發夜昏花絲帶閉別當驚 譚軍臣林德 等類次

平姪娠分別男女將產諸證第一

平姪娠胎動血分水吐下 腹痛證第二

平姪娠胎動血分水吐下 腹痛證第三

平帶下絕產益于亡血居經證第四

平帶下絕產益于亡血居經證第五

平帶下絕產益于亡血居經證第六

平帶下絕產益于亡血居經證第七

平婦人病生有證第八

平小兒雜病證第九

平姪娠分別男女將產諸證第一

脈平而憂乳子法也經云淫搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其寸少陰脈動其喜姪子也少陰心脈也心主血脈又解名胞門寸口尺中陰脈也尺中之脈按之不絕法姪娠也三部脈沈浮正者按之無紀者有娠也姪娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也疎滑虛重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也婦人姪娠四月欲知男女法在脈為男右疾為女俱疾為生一子  
又法得大沈脈為男得大陽脈為女大陰脈沈大陽脈浮又法左手大陰脈為男右手浮大為女左手重俱沈實根生一男又法左手浮大為女根生一子  
又法尺脈在偏大為男右偏大為女左右俱大產一子左右如

質狀  
又法左右尺俱浮為產二男不爾則女產男左左右尺俱沈為產二女不爾則男作女也

又法連姪娠人面南行擇清陰之左側具有其男右側具有其女也

又法看上面時夫從後為呼之左側是男右側是女也

又法婦人姪娠其夫左肩乳旁有核是男右肩乳旁有核是女也

婦人懷娠經其脈浮腫引腰脊為合欲生也但離經者不病也

又法婦人欲生其脈離經半節日中則生也

平姪娠胎動血分水吐下 腹痛證第一

婦人懷胎一月之時足脈陰脈卷一月足少陽脈卷三月手心主脈卷四月手少陽脈卷五月足太陽脈卷六月足陽明脈卷七月手太陽脈卷八月手陽明脈卷九月足少陰脈卷十月足太陽脈卷諸陰陽各卷三十日治兒手太陽少陰不卷者下主月水上高乳汗治兒養母懷娠者不可來刺其胎必墮胎

婦人懷娠三月而渴其脈反遲者欲為水分解腹瀉者有陰胎

。脈浮汗出者必開其胎數者必發難服五月六月胎數者必向壞胎數者必胞滿胎逆者必腹脹而渴脈浮者必水壞為腫

。問曰有一婦人年二十所其胎陰數發難服時下利不欲食脈復冷經水絕何也師曰胎當有核何以故此虛家法當微弱而反強數此當胎陽陽和合法當胎強則立欲胎曾自去

何以知然數則為熱二者是火是火是女子子死於未未為六月位土水火休廢陰氣生致節氣至天氣當能離胎自生去其魂愈





師曰有一婦人來診自道經斷即去師曰一月血爲閉二月若  
有血無三月爲血積變如雞伏于中矣即濁中熱即積飲令胎  
香香治其母使獲子命則不善也書如雞伏于中熱飲一毛  
按之腹上不通寒者渴之天人有難少腹寒手掌及海寒何  
得有難婦人因言當奈何師曰當與溫經湯散與夫家俱來者  
有難與父母家俱來者當言寒多又小作也

師曰有一婦人來診因言陰陽俱和調陽氣長陰氣短但出不  
入去近來遠故曰又以為有能傷及經斷斷來幾日假令當矣  
者因言當治思經復下設令宮中令老寒婦無孕會夜夢寐  
交通邪氣積久作癥瘕當治下服二湯設復不愈因言交  
通當中下胎而反不下此何等邪可使且將現赤烏一胎  
師曰若言與張氏不若復來相問理理可將現赤烏一胎

師曰一婦人得宜厥陰厥小弱其人清不能食憂鬱名爲癯  
桂枝湯之法六十日當有經設有膏治逆者却一月加吐下者  
則絕之方在傳案卷  
婦人厥平而虛者乳子法也平而微者憂鬱積法也而反微瀉  
其人不下血下利而反甚其厥虛俱坐乳大兒及乳小兒此自  
其常不能令其虛爲病與之血虛身必厥而短氣也

師曰有一婦人起寒衣來診而得微瀉因問常乳子下利乃當  
得此微瀉耳常生下瀉下者可設不者微瀉二月之  
下可設常瀉小兒勿乳須利止復來相問三月之  
師曰寸口脈微遲又微於寸寸遲爲寒在上腹但當吐耳今又  
反腹脹爲強之如此設宜瀉而瀉者必吐血少腹瀉腹痛

者必下血師曰寸口脈微而弱氣血俱虛者血旺汗出者  
不可者跌陽微而弱者冷宜氣爲本吐利者不可者此爲水  
乳其腹必痛小便則難  
婦人常嘔吐而宜若常滿一經其經又斷設來者必少  
師曰有一婦人年六十所經水常自下設又得病利少腹堅滿  
者爲難治

師曰有一婦人來診言經水少不知前者何也師曰當更下利  
若汗出小便利者可何以故師曰其津液故令經水少設經  
下及多於前者當如苦困當言恐大便難身無復汗也  
師曰寸口脈微而遲澀則爲水遲則爲寒寒水相搏跌陽臥伏  
水穀不化脾氣衰則驚悸胃寒者則身腫少陽厥畢少陰厥  
細男子則小便不利婦人則經水不調經爲血身不利則爲水  
名曰血分

師曰寸口脈澀而數則爲出澀則爲入出則爲陽實入則爲  
陰結跌陽微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰厥澀而滑  
沈則爲在裏滑則爲實澀滑相搏血結胸門其意不澀經絡不  
通名曰血分  
問曰病有血分何謂也師曰經水前斷後病水名曰血分此病  
爲難治

問曰病有水分何謂也師曰先病水後經水斷名曰水分此病  
易治何以故去水其經自當下  
脈澀而弱及在關澀及在顛澀在上澀在下澀則爲寒名曰  
澀澀而弱名曰弱弱則陰氣衰及弱弱則中  
寒寒澀相搏名曰痺痺寒者節支煩肌爲不仁此當爲痺而反

腰膝疼痛經重以下厥為崩漏按之沒指腰冷不仁此為水  
腫則則信息小便不通緊欲為腫鼻無絲此為水於外衛辛  
亡此為非難

平產後諸病醫中風發熱煩下利證第二

問曰新產婦人有三病一者汗流身熱一者病醫醫三者大便  
難何謂也師曰新產亡血虛多汗出者中風故令病難得故醫  
胃師曰亡血復汗寒多故令病胃何故大便難師曰亡血復汗  
燥故大便難產婦胃其氣微弱不能食大便反堅但願汗  
出所以然者血虛而厥厥而必胃家欲解必大汗出以血虛  
下厥故陽上出故但願汗出所以生燥者汗出者上陰虛陽  
氣竭故當汗出陰陽乃復所以便堅者唯不能食也小柴胡  
湯主之病解能食七八日而更發熱者此為胃熱熱生承氣湯  
主之方在傷寒中

婦人產後風破之致十日不解頭微痛惡寒時有熱心下堅  
乾嘔汗出雖久陽且譫譫在可與陽日方在傷寒中桂枝是也  
○婦人產後中風發熱面赤亦喘而頭痛竹葉湯主之

婦人產後腹中風痛可與承氣湯主之

師曰產婦腹中風痛不得臥法當枳實芍藥散主之假令不愈

者此為腹中有乾血者臍下與下寒血湯

婦人產後七八日無大便少腹脹痛此惡露不盡不大便四

五日味欲飲微黃無倍其人發熱日哺所煩煩者不能食諸語

利之則愈產承氣湯以熱在裏結在膀胱也方在傷寒中

婦人產中虛煩亂逆不安者益氣竹皮大圓主之

婦人熱利重下新產虛極白頭翁加甘菘湯主之附附方又

平帶下絕產無子亡血者經證第四

師曰婦人帶下六種之病厥脈則客腸胃腫滿則為腹中痛  
數則為陰中痛痛則生痰後則陰寒血痛

師曰帶下有三門一曰胞門二曰龍門三曰玉門已產者胞門

未產者龍門未嫁者玉門

問曰未出門女有三病何謂也師曰一病者經水初下陰中熱

或有當風或有弱者一病者或有以寒水洗之三病者見丹

下寒得病發帶下

師曰婦人帶下九實中事假令得真氣之病則易當劇有期當

寒辛為期餘皆彼此

問曰有一婦人年五十所病但苦背痛時之腹中痛少食多眠

善眠脹其狀微微又小紫形脈不相應願知所說師曰當問

病者飲食何如假令病者言我不欲飲食聞氣臭者病為在

上應假令病者言我少多為飲食不食亦可病為在中應假令

病者言我自飲食如故病為在下應為病帶下當以帶下治

之

婦人帶下經水不利少腹痛經一月者見土瓜根散主之

婦人帶下感時惡寒瀉下者不治

師曰有一婦人年十五所來問於言女年十四時經

水自下今經及斷其母言恐師師曰言此女為其夫人親女非

耶若親者當相親說之婦人固答言自是女問師曰所以問者

無他夫人年十四時亦以經水不下所以斷此為遲年勿怪後當

自下

婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子宮大者得之絕產

師曰厥微弱而遲年少得此為無子中年得此為絕產  
師曰少陰脈浮而緊則疝瘕腹中痛半產而溻傷津則亡血  
絕產蓋矣

師曰婦人脈細胞有寒故令少子其色黃者骨上有寒  
婦人小腹硬結者物難產而復自解發者無常經反斷胎脫  
中絕氣急瀉下引陰中氣衝者必兩股攣急

問曰婦人年五十所病下利數十日不止者則發熱少腹其急  
煩腹滿手熱唇口乾燥何也師曰此病傷寒下利以故曾經  
半產瘀血在少腹中不去何以知之其發唇口乾燥故知之當  
與溫經湯

問曰婦人病下利而經水反斷者何也師曰但當上利經自當  
下勿怪所以利不止而血斷者但下利上津液故經斷利上津  
液復經當自下

婦人血下咽乾而不渴其經必斷此經不足本自有徵寒故不  
引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經以後復下

師曰寸口脈微而滿按則銜氣不足滑則血氣無餘銜不足其  
息短其形燥血不足其形逆榮衛俱虛言諸誤談陽脈浮而  
溢滿則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣滿則失液少陰脈  
微而遂微則無精遠則陰中寒滿則血不來此為經三月  
未

師曰脈微身氣俱虛年少者下血也乳子下利為不可者此為  
名經三月未

問曰婦人妊娠三月師脈之言此婦人非經今月經當下其脈  
何類何以別之師曰寸口脈衛注而大榮反而弱浮大則氣強

反弱則少血孤陽獨呼陰不能以一氣不傳衛陰榮陰陰積  
寒陽為聚熱陽陰不潤經結于足陰虛陽任寒故令少血時  
發酒洩明燥汗出或溻稠數多淫深沫此令重虛津液滑泄故  
知非胎首項滿滑月第一經三月一未陸盛則滿名曰名經  
問曰婦人年五十所病下利數十日不止何以治之師曰  
此婦人前產生經水不下今反清血此為名經不須治當自止  
經水下常五日止者五日愈  
婦人月經一月垂來者經來其脈欲自如常而反微不利不汗  
出者其經二月必來

平營胃五崩滿下經閉不利腹中諸病證第五  
問曰婦人病經水道下而發其汗則營胃不知人何也師曰經  
水下故營氣虛而發其汗為表復虛此為表裏俱虛故令營胃  
也

問曰婦人病如癩疾營胃日下餘發師脈之反言帶下皆  
如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈滿而緊滿則陽氣微  
緊則榮中寒陽微氣虛血竭凝寒陰陽不和和氣會於榮衛  
疾積起年少時經水來以公房室發時過度積成命門開經  
下血虛百脉皆強中極感陽動微風發成寒因虛舍榮衛冷積  
於丹田發動上衝奔在背隨津液從口入涎唾涌溢出眩冒狀  
如厥氣衝經甚難辨名為癩疾之因大劇

問曰婦人病苦氣上衝胃脹胃吐涎沫胃氣衝熱師脈之不  
名帶下其脈何類何以別之師曰寸口脈沈而微沈則衛氣沈  
微則榮氣絕陽沈則為發陰經則上血病當小便不利津液閉  
塞今反小便通微汗出流黃為寒欲吐唾沫其脈發蓬蓬流注

少亡血損經因寒為厥手足青滑濕從丹田起上至膏腸  
沈寒燥燥於上背中空寒氣虛陽部面青如鮮形瘕也此乃  
浮虛發背及下之長針復重虛榮術又發腹胃故知為虛也  
問曰五崩何等類師曰白崩者形如赤亦崩者形如絲津黃崩  
者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如鮮血也  
師曰有一婦人來脈反得微瀆法當吐若下利而言不困言夫  
年幾何夫人年上七七四十九經水當斷反至今不止以故致  
此虛也

寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛  
相搏脈則為重婦人則半產漏下旋復花湯主之

婦人陷經漏下黑小腥膠重湯主之

婦人經水不利抵當湯主之在傷寒中

婦人經水閉不利抵當餅不在中亦有乾血下白物麥石圓注

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

婦人腹中痛小建中湯主之在傷寒中附子湯主之

婦人咽中如有交荷欲半夏厚朴湯主之

婦人癡燥甚傷欲飲象如神當所以數欠甘世小麥湯注

婦人中風發熱甚笑絕水道來得之七八日熱除脈遲身涼省  
腫下滿如結實狀其人譫語此為熱入血室當刺期門隨其虛  
實而取之

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水不通者此為熱入  
血室其血必結發候短瘕狀發作有時小柴胡湯主之方在傷  
寒中

婦人傷寒發熱經水不通來晝日了者則請語如見鬼狀此為  
熱入血室無犯胃氣者上一臆必當自愈

陽明病下血而語者此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨  
其實而瀉之瀉然汗出者則愈

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後疑黃者  
此當水與血并結在血室主大黃甘遂湯主之

婦人陰寒溫中藥蛇床子散主之

婦人者寒強下其經目脈為痛足跟難以踐地心中狀如懸  
。問曰有一婦人病飲食如故煩熱不得臥而反信息者何也

師曰得病轉胞不得溺也何以故師曰此人故肌羸頭重身痛  
今反羸頭重中空感安惟胞系了矣故致此病但利小便則  
愈宜服竹葉圓以中有茯苓故也方在傷寒中

師曰脈得浮緊法當身發疼痛設不痛者當射之何因當射言  
若腸中痛腹中鳴故者因失便故也方在傷寒中

師曰寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血浮則氣弱則有熱  
而自汗出狀陽浮汗而清淨則氣清濁則有寒者嘔去酸其氣  
而下少腹則寒少陰厥弱而微厥則少血弱則生風微弱相搏

陰中惡寒胃氣下泄吹而正者此散氣之實也者養之

師曰胃氣下泄吹而正者此散氣之實也者養之

少陰厥冷而數者陰中則生瘰

少陰厥冷則氣淋陰中生瘰

婦人陰中餘痛膿牙湯流之

婦人癡腫如瓜陰中引引痛者苦人湯主之

少陰脈強者白腸必挺核  
少陰脈浮而動浮則為虛動則為痛婦人則臌下

平婦人病生死證第九

論婦人瀉血下赤白日下血數外脈虛疾者死遲者生  
論婦人瀉下赤白不止脈小虛滑者生大緊數者死  
論婦人新生乳子脈流小滑者生大緊數者死  
論婦人酒瘰積聚脈弦急者生虛弱小者死  
論婦人新生乳子因得熱病其脈微小四肢溫者生寒滑者死  
論婦人生產因中風癱瘓寒熱病喘而自息脈實大浮緩者生  
小者死

論婦人生產之後寸口脈炎疾不調者死微附骨不起者生  
。金瘡在陰動出血不絕陰脈不能至陽者死按陽而復出者  
生

平小兒經病證第九

小兒脈呼吸八至者平九至者傷十至者困  
論小兒脈法多參關要以三部脈為主若緊為風瀉者乳不  
消強者客忤氣  
小兒足其目發腫熾熱之時身熱而脈亂汗不出不飲食食輒  
吐明者脈乳無害也  
小兒脈流而數者骨間有熱欲以腹按冷清也  
小兒大便赤青澀發濇脈小手足寒難已脈小手足溫易已  
小兒病因汗出死珠者身不流者死  
小兒病其頭毛皆上逆者必死耳間青脈起者癰痛  
小兒病而陷入其口唇乾目皮反口中氣出冷是為頭相拔

臥不舉身手足四肢垂其臥正且如得轉其聲中冷皆死至  
日不可復治之

新刊王氏脈經卷第九

新刊王氏脉經卷第十

手抄圖三十一部

胡敬恭李光祐等撰別本前卷能書早林德等類次經言脚有人之五藏蓋蓋也上以應天解理靈物王行機氣法五行四時知五味子口之中陰陽交會中有五節前後左右各有所主上下中央分爲九道浮沈結散知邪所在其謂

奈何

岐伯曰脉大而弱者熱其血虛也脉大而長者病在下候浮直上下交通者陽脉也脈在腎志在肝實左肺前知外者是太陽也中央知外者是陽明也後知外者是少陽也中央直前者手少陰也中央直中者手心主也中央直後者手太陽也前知內者是厥陰也中央知內者是太陰也後知內者是少陰也前部左右強者陽脉也中部左右強者帶脉也後部左右強者陰脉也從少陽之脈陰者陰難也從少陰之太陽者陽難也來大時小者陰絡也來小時大者陽絡也前知外者是太陽也動苦頭項腫浮爲風瀰爲寒熱鬱爲

瘡食

前知外者是太陽也動苦目眩頭項腫浮強痛也胃子陸下濕女子月水不利少腹痛引命眩陰中痛子藏閉浮爲風瀰爲寒血清瀉鬱熱爲宿食鍼入九分却至十分中央知外者是陽明也動苦頭痛面赤微煩苦大便不利腸鳴不能食足脛痺中央知外者是陽明也動苦頭強面赤熱淫微煩苦大便不

利甚氣瀰滑者爲飲積爲嘔吐腸鳴不能食足脛澀鍼入九分却至六分

後知外者是少陽也動苦腰背四肢壯節痛

後知外者是少陽也浮爲氣瀰瀰爲風血急爲轉筋絃爲勞

鍼入九分却至六分

右足三陽脈

前知內者是厥陰也動苦少腹痛月經不利子藏閉

前知內者是厥陰也動苦少腹痛與腰相連大便不利小便

難禁中痛女子月水不利陰中寒子兩難絕內少腹急男子

疝氣兩丸上入淋也鍼入六分却至三分

中央知內者是太陰也動苦胃中痛食不下欬唾有血足脛

寒少短身重從腰上厥知居水中

中央知內者是太陰也動苦臍滿上脘有寒食不下病以飲

食得之流瀉者苦身重四肢不動食不化煩滿不能臥足脛

痛者寒時飲血也利黃鍼入六分却至三分

後知內者是少陰也動苦少腹痛與心相引背痛淋從面墮

下傷於內小便血

後知內者是少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從面墮

下傷於內小便血

下傷於內小便血

右足三陰脈

前部左右強者陽脉也動苦腰背四肢壯節痛

前部左右強者陽脉也動苦腰背四肢壯節痛惡風拘攣仆主鳴

瘳痺皮膚身體強直痺直取陽瀉在外踝上三寸五總骨

是也

中氣左右強者肱也動若少腹痛引命門女子月水不來  
絕續復下止陰寒令人無子男子若少腹物急或失精也

後部左右強者陰陽也動若頭痛寒熱皮膚強  
後部左右強者陰陽也動若少腹痛寒熱及腰弱下相連  
陰子痛男子陰道女子下不止

右陽弱陰強痛厥

中氣其前者子少陰也動若心痛微眩陰虛者腎虛者為厥  
汗絕虛者為下利腸鳴者為有積女子陰中寒痛出玉

門上一分前

中氣其後者子少陰也動若心疾面赤金舌咽多言怒微汗  
若者悲傷既微不禁也瀉為心下寒沈為恐補頭人捕之狀  
也隨寒熱有血氣

中氣其後者子少陰也動若氣逆氣不得息浮為內風驚瀆  
若者胃中有積熱脾飲血也有沈飲

右手三陰脈

從少陰斜至太陽是陽維也動若肌肉痺癢

從少陰斜至太陽是陽維也動若顛倒牛鳴手足相引甚  
若者音不能言顛倒直取客主人兩陽維脈在外蹠絕骨下

一十

從少陽斜至厥陰是陰維也動若顛倒牛鳴

從少陽斜至厥陰是陰維也動若顛倒牛鳴手足相引甚  
若者音不能言顛倒直取客主人兩陽維脈在外蹠絕骨下

出惡風  
脈來暫大暫小是陰絡也若一乍動若肉痺應時自發身洗洗

也

脈來暫小暫大者是陽絡也若一乍動若皮膚痛下部不仁汗  
出而寒也

右陽維陰維陽絡陰絡

前部橫於寸口九丸者任脈也動若少腹痛連氣搶心胸拘  
急不得俯仰

三部俱平直上直下者衝脈也動若胸中有寒病

三部俱浮直上直下者督脈也動若腰脊痠痛不得俯仰大  
人頰小兒滿

右任衝帶三脈

肺脈之來也如循榆葉曰平如風吹毛曰病如狀連珠者死  
期丙丁日易中日中

心脈之來也如反芡芡大曰平如連珠曰病前而後居扣帶  
鉤者死期壬癸日人定夜半

肝脈之來也搏而若曰平如張新弓弦曰病如難踐地者死  
期庚辛日曠時日入

脾脈之來也阿阿如蠶曰平如雞舉足曰病如鳥之啄如水  
之滿者死期甲乙日平旦日出

腎脈之來也微細以長曰平來如彈石曰病去如解索者死  
期及己日食時日昃黃昏雞鳴

右平五藏脈

寸口中脈躁寬尺關中無脈應陽干陰也動若腰背痠痛陰  
中若傷足寒刺足太陽少陰互絕骨入九分冬太陽五壯

尺中脈堅實寬八寸口無脈應陰干陽也動若兩股膝重少



腹痛脈刺足太陰踝上三寸入五分又夫太陽陽蹻在足外踝上三寸直透骨是也

寸口脈紫直至魚際下小按之如持雄竿狀其病腸鳴足背痛腹腹滿不能食得之寒溫刺陽蹻在外踝上三寸間也入五分此脈出魚際

寸口脈沈著骨及仰其手乃得之此腎脈也動苦少腹痛腰體酸頭疾刺腎俞入七分又刺陰樞入五分

初持寸口中脈如細堅狀久按之大而深動者心下有寒胸脅苦痛陰中痛不硬近丈夫也此陰逆刺期門入六分又刺腎俞入五分可灸胃管七壯

初持寸口中脈如繆狀洪大久按之細而堅牢動苦腰腹相引痛以下至足脣重也不能食刺腎俞入四分至五分亦可灸胃管七壯

八寸俱沈但有關上脈者寒心下痛

八寸俱沈關上無有者苦心下喘

八寸俱數有熱俱逆有寒

八寸俱微脈血氣不足其人少氣

八寸俱微弱從熱惡寒出汗足冷汗出

寸口沈胸中痛引背

關上沈引背痛

寸口伏胸中有逆氣

關上疾有水氣滯滯

寸口弦胃中拘急下拘急

關上弦胃中有寒心下拘急

寸口弦頭痛逆氣

關上緊心下痛

寸口澹無陽少氣

關上澹無五原冷

寸口微無陽外寒

關上微中實有能食故寒惡胃

寸口微無陰虛冷腹中拘急

關上滑胸滿逆

寸口數即吐

關上數胃中有熱

八寸數惡寒小便赤黃

寸口實即止熱虛即生寒

關上實即痛虛即脹滿

寸口浮其人中風發無頭痛

關上浮腹痛心下滿

尺中浮小便秘

寸口遲上焦有寒

關上遲弱無胃氣有熱

尺中遲下焦有寒背痛

寸口滿陽弱自汗出

關上澀下重

尺中澀少血發熱惡寒

寸弱陽氣少

關弱無胃氣

尺弱少血

右雜言三部二十四種脈

新刊王氏脈經卷第十

