

四科女胎前門

臟躁悲傷 妊病可下胎斷胎 胎自墮
 胎不長 日月未足欲產過期不產 鬼胎
 臨產坐草法 催生法 下死胎法



內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (97)
函號	301 60

九十七

拾函



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak 2007 TM Kodak



裏面記載のない箇所は省略

臟躁悲傷

長甫記管先生治一妊娠四五箇月臟躁悲傷遇

書則慘慼淚數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆

無益與仲景大棗湯一投而愈薛前證或因寒水

攻心或肺有風邪者治當審察一妊婦無故自悲

用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四君子

加山梔而安一妊婦悲哀煩躁其夫詢之云我無

故但自欲悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

仲景婦人臟躁悲傷欲哭象如神靈所作數欠仲甘

麥大棗湯主之

合前臟躁悲傷

女科日

百三

甘麥大棗湯方

甘艸 卷兩

小麥 壹升

大棗 拾枚

右以水陸升煮取叁升温分三服亦補脾氣

許學士云鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人臟躁悲傷欲哭象如神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

淡竹茹湯 治妊婦心虛驚悸臟躁悲傷不止又治

虛煩甚效

麥門冬 去心

小麥

半夏 湯泡各

人參

白茯苓 各壹兩半

甘草 壹兩

右剉散每服肆錢薑五片棗壹枚淡竹茹壹團如指大同煎温服

又方 治胎臟躁自悲自哭自笑

右以紅棗燒存性米飲調下

謀於余余第令服佛手散以為可安即安不可安即
下順其自然而已既數服公憂疑不決女科醫者檢
方以進乃用牛膝壹兩酒煎服謂牛膝固補下部藥
耳用之何害公遂信而服之而胎果下余時有從母
之戚未及知比知而馳至則聞盈庭皆桂麝氣蓋因
胞衣未下許醫又進香桂散矣血遂暴下如大河決
不可復止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而過
余謝且諭余曰牛膝補藥而能墮胎何也余對曰生
則宣而熟則補故破血之與填精如箭鋒相拄豈獨
牛膝哉鹿角亦墮胎破血而煎為白膠則安胎止血

因其熟而信其生此之謂粗工公歎恨無已余故特
著之以為世戒

大全治妊娠母因疾病胎不能安可下之取七月七

日法麪作麵肆兩水貳大盞煎取壹盞參分綿濾去

滓分溫三服立下又方大麪伍升清酒壹斗煮三

沸去香分五服隔宿勿食但再服其子如糜母無疾

苦千金不傳妙又方麥蘖壹升為末和米煮貳升服之

即下神効又方附子貳枚為末以淳苦酒和塗右足去

之大良又方取雞子壹枚以三指撮鹽放雞子中

服之立出ツ

按陳良甫所列有牛膝湯桂心散諸方婁全善皆不之取而獨取此數方其見卓矣

丹斷子法 用白麵麩壹升無灰酒伍升打作糊煮貳升半用絹帛濾去渣作叁服候前月經將來日晩下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子

大斷產驗方故蠶紙方圓壹尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕 又方用油煎水銀一日方息空心服棗核大壹丸永斷孕不損久

四物湯每服伍錢加芸臺子貳錢於經行後空心溫

服

薛前云用蠶故紙尺許燒灰為末產後酒服之血虛者終不復孕大抵斷產之劑多用峻厲往往有不起者是則產之害未若斷產之害也吾聞閣老張羅峰太常李恒齋俱因服斷產之劑自謂形體俱怯遇勞必病有由然矣

按夾堅志載東京女子白牡丹以售墮胎藥生得惡報今難列如上方以備萬一之用用者尚其慎之

胎自墮
胎自墮者或因血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診其脉左手大而無方重取則滑知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白朮湯下黃芩末壹錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月止屬相火所以易墮不然胎自墮

胎自墮

丹陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診其脉左手大而無方重取則滑知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白朮湯下黃芩末壹錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月止屬相火所以易墮不然

胎自墮

何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸
無輕視一婦年三十餘或經住或成形未具其胎
必墮察其性急多怒色黑氣實此相火太盛不能生
氣化胎反食氣傷精故也因令住經第二月用黃芩
白朮當歸甘州服至三月盡止藥後生一子一婦
經住三月後尺脉或濇或微弱其婦却無病知是子
宮真氣不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形
至產血塊或產血胞一婦腹漸大如懷子至十月
求易產藥察其神色甚困難與之藥不數日生白蟲
半桶蓋由婦之元氣太虛精血雖凝不能成胎而為

穢腐蘊積之久濕化為熱濕熱生蟲理之所有亦須
周十月之氣發動而產終非佳兆其婦不及月死濕
熱生蟲譬之溝渠污濁積久不流則諸蟲生于其間
矣汪石山治一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘
常患墮胎已七八見矣診其脉皆柔軟無力兩尺雖
浮而弱不任尋按曰此因胎墮太多氣血耗甚胎無
滋養故頻墮譬之水涸而禾枯土削而木倒也况三
月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故
墮多在三五七月也宜大補陰湯去桂加黃蘗黃芩
煎服仍用研末蜜丸服之庶可保生服半年胎固而

生二子 錢仲陽治一孕婦病醫言胎且墮錢曰妊者五臟傳養率六旬乃更候其月偏補之何必墮已而母子皆全 陳斗崑治一婦有胎四月墮下逾旬腹腫發熱氣喘脉洪盛面赤口鼻舌青黑陳診之曰脉洪盛者胎未墮也而赤心火盛而血乾也舌青口鼻黑肝既絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脉如前以蛇蛻煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹腫痛復一死胎隨下病亦愈 程仁甫治一婦年近四十稟氣素弱自去其胎五日内漸漸腹脹如鼓至心前上吐不能食用補藥不

效診六脉微弱但只叫脹死此乃損傷脾氣而作脹然急則治其標若泥丹溪法以心緩不及事矣用桃仁承氣加枳實厚朴倍硝黃煎服四分吐去其一次早仍不通事急又服琥珀丸三錢至申時大通脹減但體倦四肢無力口不知味發熱再用參芪歸芍查木陳皮八劑而安 江應宿治汪鎬妻三十五歲厭產誤服打胎藥下血如崩旬餘腹痛一陣即行或時鼻衄諸藥不效診得六脉數而微弦乃厥陽之火泛逆投四物換生地黃加阿膠炒黑山梔蒲黃一劑愈 薛氏云大抵治法須審其月屬其經育養而藥之

濟生芎藭補中湯 治懷孕血氣虛弱不能衛養以

致數月而墮名曰半產每見婦人孕不能滿十月而墮得服此遂安全

芎藭 五味子 阿膠蛤粉炒

乾薑炮各壹錢 黃芪去蘆蜜炙 當歸酒浸

白芍藥 白朮各壹錢半 杜仲去粗皮炒去絲

人參 木香不見火 甘艸各伍分炙

右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

阿膠湯 治妊娠數墮胎小腹疔痛不可忍

阿膠炙燥 熟乾地黄焙 艾葉微炒

芎藭 當歸切焙 杜仲去粗皮炙剉

白朮各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半棗參枚擘破同煎至

捌分去滓食前溫服

杜仲丸 治妊娠三兩箇月胎動不安防其欲墮宜

預服之

杜仲薑製炒去絲 續斷酒浸各壹兩

為末煮棗肉杵丸梧子大每服柒拾丸米飲下

四製艾附丸 治婦人數墮胎由氣不升降所以胎

氣不固尤宜服此

香附杵去毛淨壹斤分四分一分酒浸一分 附子一分童便一分鹽水各長七日取出焙乾

淨字一本本係

胎前 產後 卷之四 胎前

為細末醋煮糊和九梧子大每服柒拾丸空心温
酒下肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各貳
一方用香附子壹斤艾葉肆兩當歸貳兩俱用醋煮
刪繁方 治妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百
病之源經心錄同

甘草

黃芪

人參

川芎

白朮

地黃

吳茱萸

各等分○一方有當歸乾薑

右為末空心温酒調貳錢忌松菜桃李雀肉醋物
婁按丹溪論俱是虛熱而無寒者今姑存此一方

以俟施之千千百而一者也

醋附丸

治數墮胎

方見血崩

針灸

千金療妊娠三箇月胎欲墮方

灸膝下壹寸柒壯

妊子不成時時

墮胎

後漏下五色疼痛灸胞門關門左邊

二寸名胞門右邊二寸名子宮

胎前 產後 天妊娠日月未足胎氣未全而產者

謂之半產蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣

不固或擲撲閃墜致氣血損動或因熱病温瘧之類

皆令半產仲景謂寒虛相搏此名為草婦人則半產

漏下是也 又云半產俗呼小產或三四月或五六

胎前 產後 卷之四 胎前

月皆為半產以男女成形故也或因憂恐悲哀暴怒
或因勞力打撲損動或觸冒暑熱忌黑神散恐犯熱
藥轉生他疾宜玉燭散和經湯之類便產須知云小
產不可輕視將養十倍於正產可也又云半產即肌
肉腐爛補其虛損生其肌肉益其氣血去其風邪養
其臟氣將養過於正產十倍無不平復宜審之薛
小產重於大產蓋大產如粟熟自脫小產如生採破
其皮殼斷其根蒂也但人輕忽致死者多治法宜補
形氣生新血去瘀血若未足月痛而欲產芎歸補中
湯倍加知母止之若產而血不止人參黃芪湯補之

若產而心腹痛當歸川芎湯主之胎氣弱而小產者
八珍湯固之若出血過多而發熱聖愈湯汗不止急
用獨參湯發熱煩躁肉瞶筋惕八珍湯大渴面赤肌
洪而虛當歸補血湯身熱面赤肌沉而微四君葛附
東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝
安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發
熱者是重陽無陰也當峻補其陰王太僕云如大寒
而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發
晝止時節而動是無火也如大熱而甚寒之不寒是
無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也若

胎前 半產

婦科 四

百八

四〇七

陽氣自旺者補中益氣湯陽氣陷於陰者四物二連
湯重陽無陰者四物湯無火者八味丸無水者六味
丸一妊婦五月服剪紅丸墮胎腹中脹痛服破血
藥益甚手按之愈痛余曰此峻藥重傷脾胃受患用
八珍倍參芪半夏乳沒二劑痛止數劑全愈 史仲
子室年甫二十瘦胎墮時咳服清肺解表喘急不寐
請視余曰脾土虛不能生肺金藥重損之與補中益
氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈再往視又與八
珍加五味及十全大補湯而全愈 陳氏婦張素怯
弱生女自乳因病疥年餘遂致羸困復因執喪禮勞

頓數欲眩什一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可
按嘔吐不止六脉微細之極陳翁自以脉雖虛而病
形則實誤憶諸痛不可補氣乃用青皮香附吳萸等
藥而愈繼復患瘧且墮胎又自投理氣行血之藥病
去元氣轉脫再投參芪補劑不應矣六脉如絲欲絕
思非附子不能起因亟請薛診之云此由理氣損真
之誤也連投參芪歸朮附子薑桂六劑間用八味丸
五日眠食漸甘六脉全復薛諭之云向使心脾疼時
卽服此藥瘧亦不作矣 一妊婦墮胎昏憤不省自
汗發搖時吐痰自用養血化痰之劑昏憤不省痰涎
恰前 產

湧出彼以為中風欲用祛風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補加炮薑二十餘劑尋愈

生地黄湯 治妊娠胎氣損動氣血不調或顛撲閃

墜以致胎墮墮後惡滯不盡腹中疔痛

生乾地黄焙壹 大黃暴燥 芍藥

白茯苓去黑皮 當歸切炒 細辛去苗

甘草炙 黃芩去黑皮 桂去粗皮

右咬咀每服伍錢匕水壹盞半入生薑大棗拍碎

同煎至壹盞去滓不拘時溫服

人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉

或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參 麥門冬去心 生乾地黄焙

當歸洗焙 芍藥 黃芪

白茯苓去皮 甘艸炙各壹兩

咬咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食前溫服

大墮胎後復損經脉而下血不止甚則煩悶至死皆

以調補胃氣為主 薛前證若肝經血熱用四物參

朮山梔肝經風熱用防風黃芩丸肝經怒火用加味

逍遙散脾經氣虛用四君歸地脾經鬱滯用加味歸

脾湯氣滯不和用紫蘇飲胃氣下陷用補中益氣湯

無下

人參黃芪湯

治小產氣虛血下不止

人參

黃芪炒

當歸

白朮炒

白芍藥炒

艾葉各壹錢

阿膠炒貳錢

右作一劑水煎服

治妊娠損動下血不止腹痛宜服此

阿膠壹兩

艾葉半兩

水壹大盞煎六分去滓空心服

治妊娠損動下血不止方

甘草壹兩

阿膠貳兩

雞子壹個

右以水貳大盞煮甘草

壹盞參分去滓下雞子膠候膠烊攪勻分三服

龍骨散 療因損娠下惡血不止

龍骨

當歸

地黃

艾葉壹兩

地榆

阿膠

芍藥

乾薑各壹兩

蒲黃壹兩貳錢半

牛角鯁

炙隻貳兩半

右食前用米飲調下貳錢

千金療落胎下血不止方

右以生地黃汁壹小盞調代赭石末壹錢日三服

治妊娠下血不止疼痛方亦治小便不禁

家雞翎燒灰

細研以溫酒調下貳錢如人行五

里再服以効為度

千金療妊娠胎墮下血不止方

用前
以丹參拾貳兩細切酒五升煮取參升分三服

補遺催生如神散妙

又方 香附子為末米飲調下

當歸酒 治妊娠墮胎後血不出

~~下~~
當歸炙令香芍藥炒各貳兩

咬咀每服參錢匕無灰酒壹盞入生地黃汁壹合

銀器內慢火煎至柴分去滓溫服以惡血下為度

烏金散 治妊娠墮胎後惡血不下兼治諸疾血病

好墨貳兩批貳寸挺子燒通赤用好醋壹升

沒藥研麒麟竭各貳錢半麝香壹錢

右為細末每服溫酒調下壹錢匕如血迷心用童

便加酒調下貳錢匕

治妊娠墮胎後血不出少腹滿痛

用羚羊角燒灰細研如麵每服參錢不拘時以豆

淋酒調下

治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時發寒熱狂悶

鹿角屑壹兩熬 右用水壹大盞煎豉壹合取

汁陸分分三服調鹿角屑貳錢服日三須臾血下

紅藍花散 治墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍微熬男子髮燒存性京墨燒紅

台前 半產 文 牛 斤 頁 右

血竭研

蒲黃隔紙炒 各等分

右為細末以童便小半盞調貳錢服之立效

白蜜湯 治墮胎後惡血不出

白蜜貳兩

生地黄取汁 壹盞

酒半盞

右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩

服服三劑百病可愈

豬膏飲 治墮胎血不出上搶心疼痛煩憤

豬膏朱合

白蜜叁合

生地黄切貳兩

右先將豬膏地黄相和煎令赤色去地黄內蜜攪勻分溫二服相次再服

胸衣不出

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出

當歸切炒

牛膝酒浸切焙 各壹兩半

木通切

滑石研各 貳兩

冬葵子炒貳 合

瞿麥穗壹兩

右咬咀每服參錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服未下再服以下為度

地黄湯

蒲黃炒

生薑切炒各 貳錢半

生地黄半兩以銅 刀切炒

右以無灰酒參盞於銀器內同煎至貳盞去滓分三服未下再作服

澤蘭湯

台前半產

女科四

百五

澤蘭葉

切研

滑石末

各半

生麻油

少許

右以水參盞先煎澤蘭至壹盞半去滓入滑石末并油更煎參沸頓服之未下更服

蒲黃酒

作丸名

蒲黃

炒壹合

槐子

拾肆枚

右以酒參盞煎至貳盞去滓分温二服未下更作

服又治妊娠不足月欲產腹痛為未登丸酒下

治墮胎胞衣不出腹中疔痛牽引腰脊下並

用蟻窟土參升炒熟帛裹搗心下胞自出也

又方好墨細研末温酒調下貳錢頻服効

治妊娠胎死腹中衣不出反產後卒有別病欲至後

狼方刺熱羊血飲一小盞極効

又方以水噴其面神驗加醋少許

又方洗兒水半盞令母服其衣即出勿令產婦知

又方治胞衣未下腹滿則殺入

用水壹盞煮豬脂壹兩煎十數沸和脂服之當下

又方出如以雞子壹枚取清吞之

又方出如用鐵斧燒令通赤投酒中沸定則出飲之

當歸川芎湯治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸

川芎

熟地黃

自製

腹痛

治前半產

六十四

更集

白芍藥炒

玄胡索炒

紅花

香附

青皮炒

澤蘭

牡丹皮

莢仁各等分

右水煎入童便酒各小半盞服不

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜此藥或失笑散

消之若按之不痛此是血虛宜四物參苓白朮若

痛而作嘔此是胃虛宜六君子若痛而作瀉此是

脾虛宜六君子送二神丸

芎藭湯 治墮胎心腹疼痛

芎藭

芍藥

白朮

阿膠炒令燥

甘州各六錢

右咬咀每服參錢水壹盞入艾葉糯米生薑同煎

至陸分食前服 一方無白朮有人參

當歸散 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當歸

白芍藥炒

川芎

黃芩炒各壹兩

白朮伍錢

右為細末溫童便調下貳錢

聖愈湯 治血虛心煩睡卧不寧或五心煩熱

熟地黃酒拌蒸

生地黃酒拌

川芎

人參各柒錢伍分

當歸酒拌

黃芪炒各伍錢

右水煎服

當歸補血湯

治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝

夜不息脉洪大而虛重按全無此脉虛血虛也若

誤服白虎湯必死

當歸

參錢

黃芪

壹兩

右水煎服

四物二連湯治血虛發熱或口舌生瘡或晝安夜熱

當歸

川芎

熟地黄

芍藥

胡黃連

宣黃連

各壹錢

右作一劑水煎服

東垣云婦人分免及半產漏下昏冒不省瞑目無所

知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與

絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令

久昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能

鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛

甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉

陽使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上

焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行

豈不知止焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈全

反下之幸而不死暴虧氣血必天天年又不知內經

有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰

宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒

涼藥也分免半產本氣不病是暴去其血亡血補血
又何疑焉補其血則神昌常時血下降亡今當補而
升舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之
令太旺今舉而升之助其陽則目張神不昏矣今立
一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足也
全生活血湯

紅花分參蔓荊子各伍細辛各伍生地黄夏月熟地

黃各壹藁本各壹川芎各壹防風諸陽既陷何以知羌

活錢獨活錢甘艸錢柴胡去苗當歸身酒洗葛根各

錢白芍錢升麻各參咬咀每服伍錢水貳盞煎
至豆盞去滓食前稍熱服

胎不長

大凡妊娠不長者因有宿疾或因失調以致臟腑衰
損氣血虛弱而胎不長也當治其疾疾益其氣血則
胎自長矣薛前證更當察其經絡審其所因而治
之一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長
因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓
三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣一妊婦因怒寒
熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此因
肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗
病愈而胎亦長矣

胎不長

頁七

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎痿不長或失於將

理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣

白朮

川芎 各壹兩

吳茱萸 湯泡 半兩

甘草 炙壹兩 兩半

為細末每服貳錢食前溫酒調下忌生冷果實

白朮散

見前胎動不安

黃芪散 主妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃芪

白朮

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參

各柒錢半 川芎

甘草 各半兩

右咬咀每服參錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒

分去滓溫服

人參丸 主妊娠胎不長宜服養胎

人參

白茯苓

當歸

柴胡

刺薊

厚朴

桑寄生

各壹兩

枳殼

柒錢半

甘草

半兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服貳拾丸食前

溫水吞下

集驗治婦人懷胎不長方

鯉魚

長壹尺者去腸肚鱗

以水漬沒內鹽及棗煮熟取汁稍

胎前胎不長

女科

百七

稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安附枳實檳榔丸安養胎氣調和經候癥瘕癖塊有似孕婦可以久服血氣通和

枳實生用

檳榔

黃連

黃檗

黃芩

當歸

木香

阿膠灰炒研各半兩

右為細末水和丸如小豆大每服參拾丸不拘時用溫米飲送下

日月未足欲產過期不產

全婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後法治
先期欲產者涼血安胎過期不產者補血行滯
薛一妊婦八箇月胎欲墜似產卧久少安日哺益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯調理而安
集驗知母丸治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不以多少為細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚙下

行不足月產過期不產

六十四

百九

日三服 一方丸如梧子大粥飲下貳拾丸
槐子丸 治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃各等分

右為細末蜜丸如梧子大温酒下貳拾丸以痛止為度

又方 取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服

又方 梁上塵竈突煤同為末空心温酒服方寸匕

千治日月未足欲產搗菖蒲根汁壹貳升灌喉中

羅治過期不產方 四物湯加香附棗仁枳殼縮砂

紫蘇米煎服即生

鬼胎

大全夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也 薛前證因七情脾肺虧損氣

血虛弱行失常道衝任乖違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補庶免此證治法以補元氣為主而佐以雄黃丸之類行散之若脾

經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不足者用六君芎歸培養之肝火血耗者用加味道遙散滋抑之肝脾鬱怒者用加味歸脾逍遙二藥兼服

胎前 婦人經閉八月肚

腎肝虛弱者用六味地黄丸 一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎證之藥不應余診視之曰面青脉澹寒熱往來肝經血病也面黃腹大少食體倦脾經血病也此鬱怒傷脾肝之證非胎也不信仍用治胎散之類不驗余用加味歸脾逍遙二藥各二十餘劑諸證稍愈彼欲速効別服通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮薑二劑漸愈又用十全大補五十餘劑而安
雄黃丸 治妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛
雄黃 細研
鬼臼 去毛
莽草

丹砂 細研

巴豆 去皮 心油

獺肝 各半兩

蜥蜴 壹枚 炙黃

蜈蚣 壹條 炙黃

右為細末蜜丸如梧子大空心溫酒下貳丸日兩服後當利如不利加至叁丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦蟆卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除
治婦人鬼胎及血氣不可忍方

蟹螯 去頭足 翅炒

延胡索 炒各 叁錢

右為細末再研如麵溫酒調服半錢胎下為度
治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通以芫花根兩叁對

治前鬼胎 女科四 觀

炒令黃色為細末桃仁煎湯調下壹錢當下惡物

補遺治婦人鬼胎如狍一甕

吳茱萸

川芎

秦艽

柴胡

蠶蠶

巴戟

巴豆

芫花

醋煮貳兩

右為末煉蜜丸梧子大每服柒丸蜜酒下即出惡物而愈

宮旁俱犯毒藥不可輕用姑以古方存之取

神效

神效

降產坐草法

脈訣欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛

分誕來日日午定知生引脈經曰離經夜半覺痛為欲生也但離經

者不產也又云其脈離經夜半覺痛為欲生也但離經

常也謂離其常處為離經假如孕婦昨日則生也沉實

為男之脈今日或脈浮是離其尋常之脈而異於昨

日又且腹痛短是將誕也通真子引難經一呼一至

曰離經沉細而滑皆非也難經言損至二至雖同名離經

其脈與經理則不同且脈訣因其言脈浮又添沉細而滑

引按難經之文合脈訣因其言脈浮又添沉細而滑

同名離經蓋以前所診男女或云浮大為女之脈安辨離經故

又增沉細而滑以見離為浮大之常經為常滑也聖

惠方云夜半子時覺腹痛來日午時必定生產謂子

午相衝正半日時數也通真子曰夜半痛日午生此

言恐未為的又曰腹痛而腰不痛未產也若腹痛連

腰痛甚者即產所以然者腎繫於腰胸繫於腎故也
診其尺脈轉急如切繩轉珠者即產也生產有難易
痛來有緊慢安可定
以半日當以活法

身重體熱寒又頻舌下之脈黑復青反舌上冷子當
死腹中須遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定
應難唇口俱青沫又出母子俱死總教拚面青舌赤
沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢
哲不虛陳脈指南作面青舌赤蓋面以候母舌以候
子今云子活合以舌赤為是若云舌青則
與前而赤舌青母活子死之候相反若胎先下其子
得活如木下子母俱亡○白身重體熱寒又頻臣
並不不用脈只以外候參訣子母生死蓋
以臨產脈不可定但當以察色而知之

楊子建十產論

一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛
相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀道
挺進繼之漿破血出兒子遂生名曰正產

二曰傷產者蓋一人之生陰注陽定各有時日不可
改移今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產
仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有正
產之候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋
欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却教產母
虛亂用力兒身纔方轉動却被產母用力一逼使兒
錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力未當之所

用前
致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用
力一迭令兒下生此方是產母之用力當也若未有
正產之候而用力傷早并安服藥餌令兒下生譬如
掘苗而助長無益而有害矣此名傷產

要右傷產一法最為切要慎勿輕忽也凡十月未
足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非
正產之候或腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候
胎高未陷下者非正產之候穀道未挺逆者非正
產之候水漿未破血未出者非正產之候漿血雖
出而腹不痛者非正產之候凡未有正產候且令

扶行恐恐如行不得或凭物坐之或安卧之或服
安胎藥一二服得安即止慎勿妄服催生藥餌恰
惶致令產母憂恐而挫其志務要產母寬心存養
調停亦令坐婆先說解諭之如覺心中煩悶可取
白蜜壹匙新汲水調下切勿妄亂用力先困其母
直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺逆時
是正產候方可用力并服催生藥也子男婦於未
產一月已前腰腹俱痛全似將產其痛至甚但遇
已脾稍止如此者將十餘日計無所出因閱此條
遂與安胎藥加參朮數服間與肉味養之由是平

胎前
臨產坐草法
女科四

頁七

復不痛又二十餘日始產一男是時若妄動亂用
刀并服催生等藥立見危亡矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛
極甚腰重穀道挺進已見是正產之候但兒却未生
即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明

見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母
之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒
子不能生下此等最深若冬月產者下部不可脫去

綿衣并不可坐卧寒處當滿房著火常有煖氣令產

母背身向火令臍下腿間常煖血得熱則流散使
兒易生此名凍產

薛荆婦孟冬分娩艱難勞傷元氣產子已死用油
紙撚燒斷臍帶藉其氣以暖之俄頃忽作聲此兒

後無傷食作瀉之證可見前法之功不誣

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意
取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母

血沸而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事
此名熱產若夏月風涼陰雨亦不
可任意取涼恐生大病

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用

力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能
生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手
令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或
以指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上
徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力
令兒下生此名橫產
七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致
令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥
令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦
不得驚恐使兒自順云

蛇蛻散 治妊婦欲產時不肯伸舒行動多 腰眠

卧忍痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生
須臾不救母子俱亡

用烏蛇蛻壹條蟬蛻拾肆枚血餘壹握用並燒灰存性

研分二服溫酒調連進之仰卧少頃或用小絹針

於兒脚心刺三五刺用鹽少許塗刺處即時順生

母子俱活 又法以鹽塗兒足底又可瓜甲搔之

并以鹽摩於腹上 又以手中指取鍋底墨交畫

兒足下即順生 又方取其父名書兒足下即順

生 若及婦橫生不可出者以車前子為末酒服

貳錢七 又方鬼絲子為末酒調服壹錢七米飲
調亦得 又以百草霜香白芷不見火用童便與
好醋各壹合調成膏湯浸服甚者二服即生
若婦人橫逆難產子死腹中先用黑豆壹大合炒
熟水與童便合煎服神效 又方用艾葉半斤酒
肆升煮取壹升服之 又以當歸為末酒服方寸
匕紫蘇湯調服亦可

八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏
挂左腿或偏挂右腿故頭雖露偏挂一畔不能生下
當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手

正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便
生下若是小兒頭後骨偏柱穀道只露其額當令看
生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外左輕輕推兒頭
令正便令產母用力送兒生也此名偏產
九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒
身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產
母仰臥令看生之人輕推兒近上徐徐引手以中指
按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用
力一送使兒生下此名礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非精良

妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命也按倒
產者今世往往隨其倒是生下並無後患子母雙
全不必依推足上之法亦可又礙產者往往肚帶
有纏在兒頂上而兒頭自出在產門外看生之人
以手撥其肚帶從兒頭頂過而下之者又有肚帶
纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨
不必以此礙產法入產門撥下也

十日坐產者兒將欲生其母疲倦久坐椅褥抵其生
路急於高處繫一手中令產母以手攀之輕輕屈足
坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

十一曰盤腸產者臨產母腸先出然後兒生趙都運
恭人每產則大腸先出然後產子產後其腸不收甚
以為苦醫不能療偶在建昌得坐婆一法而收之其
法以醋半盞新汲水柒分調停喫產母面每喫一縮
三喫收盡此良法也

按前證古方以蓖麻子仁四十九粒研塗產母頭
頂腸收上急洗去其腸若乾以磨刀水少許濕潤
之內用磁石煎湯飲之即收上磁石須陰陽家用
有驗者若以水喫母面恐驚則氣散

丹產後腸不收香油五斤煎熟盛盆中候溫坐油盆

中約一食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙門
大半夏為末搐鼻中則腸上矣 又方以大紙撚蘸
香油點燈吹滅以烟薰產母鼻中腸即上矣
又方 腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即

薛欲產之時覺腹內轉動即當正身仰臥待兒轉身
向下時作痛試握產母手中指中節或本節跳動方
與臨盆即產矣若初覺不仰臥以待轉胞或未產而
水頻下此胞衣已破血水先乾必有逆生難產之患
若胎衣破而不得分娩者保生無憂散以固其血自

然生息如血已耗損用八瓊湯料壹斤益母艸半斤
水數碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只腹脹
未產也若連腰痛甚者將產也蓋腎候於腰胞繫於
腎故也凡孕家宜預請有仁心知事穩婆常以恩結
其心先與說知倘有生息不順只說未產或遇雙胎
只說胎衣未下恐驚則氣散愈難生息余家親驗之
大抵難產多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎
前清氣產後補血不可專執若脾胃不實氣血不充
宜預調補不然臨產必有患難 如因難產或大寒
時急以大油紙撚徐徐燒斷其臍帶雖兒已死令煖

氣入腹多得復生切勿用刀斷之

大凡產後多患此病... 只須示未不恐驚... 其必去與... 習姑也... 未至也... 木效... 然坐息... 胎前催生

催生法

大

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生

滑胎等藥或勢不得已則服之又云切不可坐早及

令坐凌亂動手凡催生藥必候腰痛甚胎陷下紫血破方可服大法滑以

流通滯滯苦以驅逐閉塞香以開竅逐血氣

滯者行氣胞漿先破疲困者固血丹溪云催生

只用佛手散最穩當又効捷方見胎產大法

眉 催生如聖散 黃蜀葵子小半合一研爛以酒

濾去滓温服神妙或漏血胎乾難產痛極者并進

三服良久腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可

胎前催生 女才四 三番

服之歌曰黃葵子炒七十粒 細研酒調濟君急

若遇臨危產難時 免得全家俱哭泣

又方以香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末服

一方止用油蜜小便能下難產

又方 治橫倒生者

明阿膠炒 滑石末各壹兩 葵子貳兩

右水壹盞半煎至壹盞去滓分二服

治難產五六日不得分娩者疲困虛乏光明水膠貳

兩微火焙好酒壹升半煎滾入膠候烱再入新鷄子

壹枚鹽壹錢匕攪勻放溫令產母坐椅上伸腰大口

作二次服覺小便重即生緣坐草早驚動故也

催生柞木飲子 治產難或橫或倒死胎爛脹

腹中此方屢用神效

大柞木枝一大握長壹尺洗淨寸剉生用 甘艸大者伍寸剉作伍段

右用新汲水參升半同入新磁瓶內以紙三重封

緊文武火煎至壹升半令香候產婦腰重痛欲坐

草時溫飲壹小盞響未重痛勿服便覺心下開豁如覺渴

再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

梅治難產碍胎在腹中如已見兒胎衣不出或胎死

者蒺藜子貝母各四兩為末米飲下壹匙如人行

二神散 治諸淋急痛

海金沙 柒錢

滑石 伍錢

右為細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬新汲水煎入蜜少許食前調服

海金沙散 治諸淋澀痛

海金沙

肉桂

炙甘草 各貳錢

赤茯苓

猪苓

白朮

芍藥 各叁錢 澤瀉 伍錢

滑石 柒錢

石葦 壹錢 去毛

類方六

一百四

右為細末每服叁錢水壹盞燈心叁拾莖同煎至柒分去滓空心溫服

治淋痛方

滑石 肆兩

茯苓

白朮

貝母

通草

芍藥 各貳兩

右為末酒調服方寸七日貳服拾日瘥

瞑眩膏

治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治

右用大蘿蔔切壹指厚肆伍片以好白蜜貳兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再

四五里許不下再服

按苦能下氣柞木蒺藜貝母則又不專於苦要之亦有利竅行血之功茲特因婁氏所編而列之耳

乳珠丹

用通明乳香研細以豬心血為丸梧子大朱砂為衣日乾每服壹粒催生冷酒化下良久未下再服壹粒若大段難產以蓮葉心蒂米水貳盞煎至壹盞放溫化下壹粒良久未下再服其驗如神如胎下胞衣不下者服此便下若胎橫逆不順即先服神應黑散再服此藥催之合藥時要五月五日

午時極妙或七月七日三月三日及初上辰日亦可

又方 通明乳香如皂魚子大為末腰痛時用新汲水一

小盞入醋少許同煎令產母兩手提兩石燕坐婆

調藥飲水須臾坐草便生無痛楚神良

開骨膏五月五日午時作

乳香研細滴水丸如芡實大每服壹粒無灰酒吞

下

又方 乳香 朱砂等分為細末麝香酒調下

催生丹 治產婦生理不順產育艱難或橫或逆

十二月兔腦髓去皮膜研如泥

母丁香壹錢細末

乳香貳錢半另研

麝香壹字另研

右三味拌勻以兔腦髓和丸雞頭實大陰乾油香裹每服壹丸溫湯下即產兒握藥出

如意散 臨產腰疼方可服之

人參為末

乳香各壹錢

朱砂貳錢

右同研臨產急用雞子清壹個調藥末再用生薑自然汁調開冷服如橫倒等即時端順子母無恙勝金散 郭稽中云產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產

急服勝金散消散其血使兒自易生陳無擇云多因兒未轉順坐艸太早或努力太過以致胞衣破而血水乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫產當用前法針刺之

麝香壹錢

鹽豉壹兩以青布裹了燒紅急研細

右取秤錘燒赤焯酒中以酒調服壹錢

氣催生湯 治妊娠欲產痛陣尚踈難產經三兩

日不生胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澁纔覺痛密破水後便可服

蒼朮貳兩米泔浸洗剉炒黃

小厚枳殼去穰炒 白桔梗

薄陳皮 去白

楊芍藥

川白芷

大川芎

犬當歸 去尾各壹兩

交趾桂 去麋皮不見火

半夏 湯洗

粉草

麻黃 去節

軍薑 去皮

厚朴 去麋皮剉薑汁炒

南木香 不見火

杏仁 去皮尖另研

白茯苓 各伍錢

右為末每服貳錢順流水溫暖調下若覺熱悶白蜜湯下或剉散入真米醋壹合煎方內用楊芍藥肉桂能開通子宮其餘藥皆助氣之盛開竅自通麻黃內通腸氣陽氣盛則血行血行即產矣外却寒邪去積聚皆得其宜寒月用之甚確隆暑不宜

輕服但以五苓散用葵子燈心煎湯調下卻暑清

魂滑胎易產胞漿先破則胎乾難產用白蜜清油

侵以熱酒令得所頓服胎氣既潤即分挽矣

難產 縮砂 香附 醋炒 枳殼 甘草 滑石 右

為末白湯調服

行血本草主難產搗益母草取汁柴大合煎減半頓

服立產無新者以乾者壹大握水柴合煮服

丹易產天麻丸 天麻 即益母草六月間帶根花葉採晒乾不以多少 為末

煉蜜丸龍眼大臨產熟水嚼壹丸能除產後百病

佛手散 方及加減法見胎產大法

胎前 備生

女科四

二百六

如聖散 專治孕婦難產

紫蘇葉

當歸 各等分

右咬咀每服參伍錢用長流水煎服如無流水以

水順攪動煎服即下 又方取本夫裊帶五十燒

存性酒調服下 又方取槐樹東枝令產婦把之

易產 又方用紫蘇煎湯調益元散服之即產

無憂散 治胎肥氣逆臨產難產

當歸 去蘆酒浸

川芎

木香 不見火

白芍藥

枳殼 去白鹽炒

甘艸 各壹錢半

乳香 另研

血餘 燒存性另研各半錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾入乳香血餘和勻不

拘時服

治胞漿先破惡水來多胎乾不得下時須先

與四物湯補養血氣次更濃煎蔥湯放冷令坐婆洗

產戶須是欵曲洗令氣上下通暢更用酥調滑石末

塗產戶裏次服神妙乳珠丹或葵子如聖散

催生如聖散 治逆產橫生瘦胎

百草霜

香白芷 不見火為末

右二味等分研勻每服貳大錢於臨產時以童便

并少米醋打為膏沸湯調下集驗用酒童便各半

胎前 催生

女科 四

三

蓋同煎纔沸即熟服不過再服即產丹溪用芎歸湯調血血得

黑則止此藥大能固血免得乾生

婦人臨產累日氣盡不能生燕惡露出盡胞乾終不

產者用赤小豆壹斗水玖升煮令熟去荳滓以阿

膠叁兩入豆汁溶化每服止半盞未產再服即出

破血 半夏湯 治胎乾而不能產

半夏 麩壹兩

大黃 伍錢

肉桂 半 米錢

桃仁 叁拾枚 微炒

右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯薑叁

片水煎 又方當歸為末酒調方寸匕服之

七聖散 臨產腰疼方服

延胡索

沒藥

白礬

白芷

薑黃

當歸

桂心 各等分

右為末臨產陣痛時燒鋒刃鐵頭即犁今通赤滓酒

調下叁錢服一兩盃立產

勝金散 治難產逐敗血即自生若橫逆則轉正子

死腹中則胎軟膨寬即產祖宗秘傳千金不授

王不留行

酸漿艸 死胎 倍用

菟蔚子

白蒺藜 去刺

五靈脂 行血宜生 用各等分

右為散每服參錢取利方水壹盞半入白花劉寄奴子壹撮同煎溫服大効

如聖膏 治產難併治胞衣不下兼治死胎

草麻子去殼細研成膏塗脚心胞即下速洗去

不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入一方草麻子百粒雄

黃壹錢細研用如洗

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子拾肆粒去殼 硃砂研

雄黃研各壹錢半 一方草麻子叁粒

右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯

淋瀝臍下次安藥壹丸於臍中用蠟紙數重覆上

闊帛束之頭生下急取去藥一丸可用三次

三麻四豆脫衣裳研碎將來入麝香若有婦人遭產

難貼在臍中兩分張用草麻子叁粒巴豆肆粒去殼入麝研細貼臍中

立聖丹 治產難危急者

寒水石肆兩貳兩生用貳兩煨赤 右同研細入朱砂同研如

深堯花色每用叁分井花水調如薄糊以紙花剪

如杏葉大攤上貼臍心候乾再易不過三上便產

橫逆惡候死胎不下並治神驗寒水石非方解石是也此方異人所傳妙

雜方圖經云令產婦兩手各握石燕壹枚須臾子下

救產難經曰不生雲母粉半兩温酒調服入口即產

萬不失一陸氏云已救三五百人效治橫逆產理不順用伏龍

肝細研每服壹錢酒調服其土從兒頭上戴出妙

世如神散 治催生累效靈妙之理人所難通用實

殊效 臨產時令人路上尋破草鞋壹隻取耳燒

灰温酒調下叁錢七得左足者男右足者女覆者

死側者有驚果是神奇用此送催生丸尤妙

勝金丹 治難產神妙敗兇毫筆頭壹枚燒灰研細

搗生藕汁壹盞下之若產母虛弱及素有冷疾者

恐藕冷動氣即於重湯內煖過服立產

東婦人將產預先胎破惡水長流坐草早無血

可養枯竭 獨陰伍分在足小指第三節間承陰壹寸伍分

玉催生難產及死胎 太衝捌分補合谷補三

陰交五分瀉立足小指節參壯心術產子上衝

逼心 巨闕令正坐用抱頭抱腰微偃針入陸分留

手心有針痕子頂母心人中有痕是其驗也神効 合谷參分留三

三陰交寸五分瀉

張仲文 橫產難產 右脚小指尖頭灸叁壯

集又法 獨陰同上法取灸合谷補三陰交真

台前催產 女科日 三書

桑難產 三陰交

治驗淳于意治菑川王美人懷子而不乳召臣意往
 飲以良薑藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉
 躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血血如豆比五
 六枚滑伯仁治一婦難產七日而不乳且食甚少
 伯仁視之以涼粥一盂搗楓藥煎湯調啖之旋乳或
 詰其理滑曰此婦食甚少未有無穀氣而生者夫楓
 葉先生先落後生後落故以作湯飲也 龐安常治
 一婦產七日而子不下自治不効龐視之令其家人
 以湯温其腰腹自為上下拊摩孕者覺腸胃微痛嗶

吟問生一男其家驚喜而不知所以龐曰兒已出胞
 但一手誤執母腸不能脫非符藥所能為吾聞腹捫
 兒手所在針其虎口痛即縮手所以遽生無他術也
 取兒視之右手虎口針痕存焉 一婦累日產不下
 服催生藥不効龐曰此必坐草太早心下懷懼氣結
 而不行非不順也素問云恐則氣下盖恐則精神怯
 怯則上焦閉閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣以
 紫蘇飲一服便產及治婦人子懸證紫蘇飲見胎上逼心 吳
 菱山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔
 効吳因製一方以車前子為君冬葵子為臣白芷枳

治前催產

女科四

二百一

穀為佐使已服午產眾醫異之吳曰本草謂催生以此為君毛詩採芣苢以防產難是也劉復真遇府判女產不利已斂劉取紅花濃煎扶女于甕上以綿帛蘸湯盪之連以澆帛上以器盛米又煖又淋久而甕醒遂生男子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫即產見亦神矣哉一醫宿客店值店婦產數日不下下體已冷無藥甚窘以椒橙菜莢等煎湯可下手則和臍腹人門處皆淋洗之氣溫血行遂產

交骨不開薛交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然也交骨不開

陰氣虛也用加味芎歸湯補中益氣湯產門不開氣血虛也用十全大補湯地官李孟卿娶三十五歲女為繼室妊娠慮其產難索加味芎歸湯四貼備用至期果產門不開止服一貼頓然分娩上舍費懷德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即時而產上舍傳此方用之者無有不驗一婦人分娩最易至四十妊娠下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而產加味芎歸湯主交骨不開不能生產

川芎

當歸 各壹兩

自死龜板 壹枚 酥炙

胎前 備產

女科 四

二百五

婦人頭髮

生男女多者壹握燒存性

右為散每服伍錢水煎服約人行五里即生如胎死亦下灼過龜板亦可

至四十枚救心血甚多塞門不開與前藥一儼又或以合轉此亦用之昔無食不飽一散入心救是長
藥之字塞門不開兩日未生則前藥一儼即前藥
至四果塞門不開止銀一胡煎然冷散 土合實藥
女為難至我救其我撲索以和芒韃藥四胡煎其
血氣也用十全大補湯 此官李孟嗽變三十五歲
有言也沙用此和芒韃藥中益康遂塞門不開原

下死胎法

產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難胞漿已破無血養胎枯涸而死故也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之 大法寒者熱以行之熱者涼以行之 燥者滑以潤之 危急者毒藥下之

烏金散

治難產熱病胎死腹中或因顛仆或

從高墜下或房室驚搖或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經血先下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產婦面赤舌青是其候也面

青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎
或一死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黄

洗切焙乾酒炒

真蒲黃

大當歸

交趾桂

楊芍藥

軍薑

去皮

粉草

各壹兩

小黑豆

肆兩

百草霜

錢伍

右為末每用貳錢米醋半合許沸湯六七分浸起
溫服疑貳之際且進佛手散酒水合煎二三服探
之若未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其
胎死進此藥後更進香桂散須臾如手推下常用
產生更加好滑石末半兩葵子五十粒槌碎黃柞

葉七八皮葱白二寸順流水煎湯調下蓋滑石能
利小便柞葉行氣逐血葱白內通陽氣氣盛血行
即產矣

大全下死胎方

桂枝

貳錢

麝香當門子

壹個

同研煖酒

服須臾如手推下

各桂香散

此藥比之甲水銀等

不損血氣

謂和叔傳

一方單用桂末壹錢痛時童便

調下名救苦散

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚
穢余意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許
服之隨下穢水而愈 一婦胎死服朴硝而下穢水

肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈

寒劑 治妊娠三五月胎死在腹內不出

大腹子

赤芍藥

榆白皮

各參兩

當歸 壹兩 炒

滑石末 柒錢 半

瞿麥

葵子 炒

茯苓

粉草

子芩 各半 兩

右為粗末每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓不拘

時溫服

鄧知縣傳療死胎不出朴硝半兩研細以溫童便調

報屢效

治死胎不下指甲青舌黑脹悶口中作屎臭先以平

胃散一貼作兩服每服酒水各一盞煎至一盞却

投朴硝末半兩再煎三五沸溫服其胎化血水下

本治子死腹中不出用辰砂一兩水煮四五沸末之

然後取酒調服立出

外療子死腹中真珠二兩為末酒調服盡立出

滑劑 千金治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口

噤不開格口灌之藥下即活療妊娠胎死腹中

或母疾欲下胎榆白皮煮汁服二升

天治子死腹中或半生不下或半着脊骨在草不產
血氣上盪母心而無顏色氣欲絕

豬脂一斤 白蜜一升 淳酒二升

右三味合煎取二升分温二服不能飲隨所能服

毒 一字神散 治子死胎不下胞破不在此方屢

效救入無量

鬼白 黃色者不以多少去毛碾為末極細如粉不用羅以手指燃之

右每服二錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服

立効如神

雜方 世治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急

妙

蛇退 一條全者香油煨上燒研 麝香 少許

右為末童使酒各半盞調一服即生効

楊氏療有孕月數未定子死腹中母欲悶絕取大豆

一左 黑豆 一左 三升醋煮濃汁三升頓服立効

本事治妊娠熱病胎死腹中鹿角屑一兩水一盞葱

五莖豆豉半合同煎至陸分去滓温分二服

又方 取死胎 烏雞一隻去尾細切以水三升煮

取二升去雞通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

治前 胎死胎 二百一十四

女科證治準繩卷之四

氏蒸豆豉米合同煎至稠食去穢盡食二劑

木車合我嫩熟兩部我煎中裏用食一兩水一盞蒸

三枚酒煮熟三枚煎如豆豉

丸煎首單日燒未定下及煎中煎如湯難大豆

本為末帝更西各半蓋隔一煎如豆豉

搜髮中藥上藥新全普香

撥芥水煎

世為守筆不即印及印中紙本不不調藥

