

○硝酸銀〇、六乃至一、二 亞鉛華軟膏一五、〇 百露拔爾

撒謨四、〇 右塗布料

〔乙〕 全身療法〇更ニ之ヲ分テ、自然療法及ヒ藥用療法ト爲ス

〔一〕 自然療法ニ於テハ、醫藥ヲ與ヘス、只攝生ヲ嚴ニシ、淡泊ノ食餌ヲ取ラシム、此法患者ノ耐忍力ニ乏シキカ、或ハ身體衰弱セル者ニハ施シ難シ

〔二〕 藥用療法ニハ、水銀、沃度、沃度仿謨、薩爾沙根ヲ應用ス

○水銀軟膏 右二、〇ヲ取リ一日一回、左ノ順序ニ從テ、之ヲ塗擦ス、即チ第一日兩上膊ノ内面、第二日兩腿部ノ内面、第三日兩前膊ノ内面、第四日兩脛部ノ内面、第五日胸部、第六日下腹部、第七日ニ至リ再ヒ前記ノ次序ニ

從テ、交互塗擦スヘシ、但シ毎回塗擦前ニ、溫浴ヲ取ルヘシ

〔注意〕 室内ノ溫度ハ、攝氏二十度ニ在ルヘシ、而シテ塗擦中ハ、口内ヲ清潔ニシ、格魯兒酸加留謨液(五十倍)ヲ以テ、含嗽ヲ行フ、塗擦ノ數ハ、十八回乃至三十回ヲ常度トスレトモ、中毒症ヲ發スレハ、直ニ之ヲ中止スヘシ

○昇汞一、〇 偏里設林六〇、〇 水一五、〇 右一日

一回半筒、二局處ニ注入ス

○昇汞〇、五 水三〇、〇 右同上

○黃色沃度化汞〇、六 阿片末〇、二 甘草羔 甘草末

各適宜 右三十九ト爲シ、一日三回、一丸

○甘草〇、二四 阿片末〇、〇六 白糖一五、〇 右十

二包ニ分テ、一日三回、一包

○昇汞〇〇六

右適宜ノ依的兒ニ溶解シ、甘草羔及ヒ

甘草末ヲ加ヘ、十六丸ト爲シ朝夕一丸

〔注意〕 水銀ヲ内服スルノ間ハ、菜蔬、果物等ノ如キ不消化性食物ヲ避ケ、室内ノ温度ヲ平等ニ保持シ、鹹味ノ食物ヲ禁スヘシ、口内ヲ清潔ニスルカ爲メ、格魯兒酸加留謨溶液(五十倍)ノ含嗽ヲ行ヒ、若シ中毒症ノ發起スルヲ見レハ、速ニ後服ヲ止ムヘシ

○沃度丁幾二〇

水二〇〇〇

右朝夕、一食匙

○沃度化加留謨四〇

水二〇〇〇

苦味丁幾四〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○沃度化加留謨四〇

龍膽越幾斯

龍膽末各適宜

右六十九ト爲シ、一日三回、五丸

○強室篤滿煎

薩爾沙根百分ヲ、二千六百分ノ常水ニ和シ、二十四時間熱浸シテ後、之ニ白糖及ヒ明礬末各、六分ヲ加ヘ、三時間熱浸シ、終リニ臨ンテ、遏泥子、茴香各四分、旃那葉二十四分、甘艸十二分ヲ加ヘ、其漉液ノ全量ヲ、二千五百分ト爲スヘシ

○弱室篤滿煎

薩爾沙根五十分ヲ、二千六百分ノ常水ニ和シ、三時間温浸シ、終リニ臨ンテ、枸櫞皮、桂皮、益智、及ヒ甘艸、各三分ヲ加ヘ、其漉液ノ全量ヲ、二千五百分ト爲スヘシ
早朝、寢衾中ニ於テ、一乃至二磅ノ強煎ヲ温服シ、二時

擦塗法ヲ施ス、又晚間、先ツ石礮水ヲ以テ、皮膚ヲ摩擦シ、半時
間濕潤ニ保持シ、爾後細砂ヲ以テ摩擦ス

○硫黃乳 偏里設林 強酒精 依的兒各等分

右糊泥ト爲シ、毎夕、面部ニ塗擦ス

○礪砂精二〇 安息香丁幾一〇 薔薇水一〇〇〇

右同上

第二節 皮膚諸炎

(甲) 急性炎症

○丹毒 *Erysipelas.*

局處療法ニハ油ヲ塗り、綿花ヲ以テ之ヲ被包ス、又八倍ノ硝
酸銀水、或ハ沃度丁幾ヲ以テ、患部ノ周圍幅三四センチメー
トルニ塗擦スレハ、屢、其進行ヲ防禦シ得ルコトアリ、ホントレ

氏ニ據ルニ、其初起ニ於テ、石炭酸溶液ヲ皮下ニ注射スレハ
能ク蔓延ヲ防止シ得ヘシト云フ

○石炭酸一〇 水三〇〇 亞爾箇保爾一〇 右

一日數回、一筒、皮下ニ注射ス

内服ハ只、對症療法ニ過キス、即チ消化不良ニハ、鹽酸ヲ與ヘ、
往々催吐藥ヲ投ス、便秘ニハ、緩下藥ヲ施シ、高熱ニハ撒里矢
爾酸那篤留謨及ヒ規尼涅、虛脫ニハ、興奮藥ヲ與フ

○稀鹽酸五〇 苦味丁幾二〇〇 右每食後、十五滴

○吐根浸(五〇)六〇〇 右每十五分時一食匙、但シ吐ヲ

得ルヲ以テ、後服ヲ止ム

○滲出性潮紅斑 *Erythema exudativum.*

多クハ其治療ヲ要セス、唯之カ原因ヲ除去スルヲ以テ、足レ

リトス、但シ甚シク焮痛スル者ハ、氷囊ヲ貼スヘシ
○インテルトリゴニハ、澱粉、亞鉛華、亞鉛華軟膏ヲ貼ス、其頑
固症ニハ百倍ノ硝酸銀水ヲ塗布ス

○蕁麻疹 Urticaria.

〔原因〕種々ノ食物即チ殊ニ蟹、蚌蛤類、菌類、魚類、覆盆子、瓜、醋
蜜等ヲ食シ其佗拔爾撒謨類、畢澄茄、阿片等ヲ服スルヨリ發
シ又腸蟲、子宮病、佗ノ皮膚病モ亦之カ原因ト爲ルコアリ
〔療法〕原因療法ヲ施シ、熱性症ニハ酸性飲料、瀉下藥ヲ投シ
冷水、接骨木花浸、三倍ノ醋酸等ヲ以テ、患部ヲ洗滌ス

○純精酒石二五〇。 枸橼油糖一〇〇。 右一日二

回一茶匙ヲ糖水ニ和シ用ウ

慢性症ニハ、砒石ヲ内用シ水治法ヲ施シ或ハ石礮ヲ以テ洗

淨スルノ後水銀硬膏ヲ貼ス又加兒爾斯泉鹽ヲ與フ、痒癢ア
ル者ハ寒罨法ヲ施シ或ハ哥囉仿謨軟膏、二倍醋酸加亞爾箇
保爾醋酸一分亞爾箇保爾百分ヨリ成ル者等ノ塗布ヲ行フ
○亞砒酸加留謨液一〇。 水一〇〇〇。 右一日三回、二
日ニ分服ス

○匍行疹 寄生性ナラサル者 Herpes.

大抵治療ヲ施サバ、ルモ數週ヲ經過スレハ自カラ治癒スル
者ナリ、陰部ノ匍行疹ハ、清潔ヲ主トシ、五十倍ノ硝酸銀水ヲ
塗布シ、或ハ亞鉛花膏ヲ綑帶藥ト爲ス

疼痛性帶狀匍行疹ニハ、別刺敦那越幾斯ノ硬膏ヲ貼ス(三
十分中五分ヲ含ムモノ)、又鹽酸莫兒比涅ヲ皮下ニ注射シ、或
ハ軟膏(三十倍)ト爲シ用キ其佗無刺戟性軟膏ニ阿片越幾斯

ヲ伍スルモノヲ貼ス

○阿片越幾斯一〇 豚脂一〇〇 右軟膏ト爲ス

神經痛ノ條ヲ參觀ス可シ

○癬瘡及癰疽 Furunkel und Carbunkel.

〔原因〕 局處刺戟、全身病等ナリ

初起ニハ、沃度丁幾、水銀軟膏、氷塊等ヲ外用シ、早ク切開スル
ヲ佳トス、(但シ疼痛ヲ緩快スルノ効アレバ、治療ヲ促スニ足
ラス)若シ其經過ヲ短縮セント欲スレハ、温罨法ヲ施スヲ以
テ最佳トス、殊ニ口唇ノ癬瘡ハ速ニ切開スルヲ要ス
頻發スル者ニハ、温浴ヲ持重シ、内服ニハ、砒石(亞砒酸加留謨
液一日ノ量、十滿)ヲ與フ

〔乙〕慢性炎症

○濕疹 Ekzema.

〔原因〕 皮膚刺戟、化學的及ヒ器械的、貧血、體液不調、腺病質、靜
脈血還流ノ妨礙等ナリ

〔療法〕 急性性症ニハ、痲皮ヲ柔軟ニシ、阿列布油、苦扁桃油、罌粟
油、亞鉛華膏、ヘブラ氏軟膏等ノ塗布ヲ施ス

慢性性症ニハ、白降汞軟膏、昇汞溶液、麥兒水、酒精製硝酸銀溶液
(十倍ノモノ)、苛性加里石礮間塗擦シ、爾後一時間、寒電法ヲ施
スヘブラ氏軟膏等ヲ用ウ

○白降汞一〇乃至三〇 豚脂三〇〇 右軟膏ヲ作り、

塗擦料ト爲ス

○昇汞〇〇三乃至〇〇五 水三〇〇 右塗布料

○二倍ノ苛性加里溶液一〇〇 右毎三日ニ、毛筆ヲ以

テ、患部ニ塗布シ、直ニ冷水ヲ以テ、之ヲ洗滌ス、之カ爲メ
ニ疼痛ヲ發スルキハ、寒罨法ヲ施ス

其他原因療法(貧血、腺病、佝僂病等)ヲ施シ、砒石、薩爾沙根等ヲ
與フ

○亞砒酸加留謨液一〇 水二〇〇〇 苦味丁幾四〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○亞砒酸〇、一二 甘草羔 甘草末各適宜 右六

十九トナシ、一日三回、一丸

○薩爾沙根一五〇 旃那葉五〇 右水適宜ヲ以テ

煎沸漉過シテ、二〇〇〇ノ液ト爲シ、一日數回ニ分服

○慢性泡疹 Pemphigus chronica

強壯藥ヲ與ヘ、冷水纏絡法、冷浴或ハ微温浴之ニ五〇〇ノ苛

性加里或ハ、一〇〇ノ昇汞等ヲ加フ、小兒ニハ、昇汞一、〇ヲ以
テ足レリトス)ヲ施シ、局處ニハ、澱粉、石松實等ヲ撒布シ、或ハ
硝酸銀軟膏、亞鉛華軟膏、鉛軟膏ノ塗布ヲ行フ、發熱アル者ハ
規尼涅ヲ與フ

○汚苔疹 Rubia.

脂肪油類ヲ以テ、痂皮ヲ軟却シ、潰瘍面ニ、硝酸銀ヲ塗布ス、又
驅梅毒藥、強壯藥等ヲ用ウ

○散生面皰 Acne disseminata.

粉刺ノ治法該條ヲ參
考スヘシヲ施シ、偏里設林石鹼、白色加里石鹼ヲ以
テ洗滌シ、或ハ温湯ヲ以テ、時々洗滌ス、其効未タ充分ナラサ
ルキハ、硫黃乳、炭酸加留謨、偏里設林、苦扁桃水、燒酒ブランデー各等分ヲ以
テ、糊泥ト爲シ、毎夕患部ニ貼シ、翌朝之ヲ洗除ス、又クンメル

フェルド氏ノ洗劑ヲ用ヅ

○沈降製硫黃八、〇 樟腦〇、五 亞拉昆亞護謨一、〇

石灰水 薔薇水各六〇、〇 右混和洗劑料(クノメ

フェルド氏洗劑)前夜之ヲ患部ニ貼シ翌朝乾燥シタル儘ニシ

皮膚肥厚ニハ、水銀軟膏ヲ稱用ス

○酒皰鼻銅色面皰 Acne rosacea.

原因療法ニハ、飲酒ヲ限制シ、婦人生殖器、泌尿器、胃、肝、門脈系
等ノ障害ヲ除クヘシ

膿疹ヲ亂切シ、擴張シタル血管ヲ亂刺シ、結節ハ之ヲ切除シ、
或ハ抽出ス、又一週三回、石炭酸一分、酒精三分ノ混液ヲ以テ
腐蝕ス

輕症ニハ、硫黃劑、水銀硬膏、昇汞等ヲ應用ス

○硫黃乳 稀酒精 韶水各一五、〇 右毎夕、患

部ニ塗布ス

○硫黃乳 偏里設林 石礮精各等分 右同上

○昇汞〇、〇〇七 水三〇、〇 右洗浣料、及ヒ綳帶藥

料ト爲ス

○鬚苔疹 Acne mentagra.

油類或ハ琶布ヲ以テ、痂皮ヲ柔軟ニシ、鬚毛ヲ拔取シ、或ハ短
剪スヘシ、爾後、ヘブラ氏軟膏、硫黃酒皰鼻ノ條
ヲ參考セヨ赤降汞軟膏、或
ハ白降汞軟膏等ヲ貼ス

頑固ノ症ニハ、拔毛セル部分ニ注意シテ醋酸、濃厚ノ硝酸銀
溶液等ヲ塗布ス

○膿苔疹及膿胞疹 Impetigo und Ecthyma.

全身療法ヲ施シ、其榮養ヲ改良ス

局處療法ニハ、油ヲ以テ、痂皮ヲ柔軟ニシ、毛髮ヲ剪除シ、白降汞軟膏、白降汞一〇乃至二〇、豚脂一五〇、亞鉛華軟膏、歌貌拉氏軟膏等ヲ貼ス、又硝酸銀溶液(五十倍ノモノ)ヲ塗布スルヲアリ

○鱗苔癬 Psoriasis.

〔療法〕 内服ニハ、砒石劑(亞砒酸加留謨液、一日三回、二滴ヲ與ヘ、爾後漸々ニ其量ヲ增加ス、但シ結膜炎等ノ如キ、中毒症ヲ發スレハ、直チニ後服ヲ止ムヘシ)ヲ與フ

○亞砒酸〇〇五 亞拉昆亞護謨適宜 甘草末二〇〇

右二十九ト爲シ、一日二回、一丸

○亞砒酸〇〇六 阿片〇二五 藥用石鹼適宜 右

同上

局處療法ニ最モ稱用スル者ハ、蒸氣浴(或ハ溫浴)中ニ於テ、軟石鹼及ヒ毛筆ヲ用キ、鱗屑片ヲ掃除ス、鱗屑片己ニ剝去スレハ、綠色石鹼ヲ塗擦(一日二回)スルヲ、三日乃至六日間ナルヘシ、此施療中、患者ヲシテ、絨衾中ニ在ラシメ、爾後三日間、塗擦ヲ止メ、只、猶絨衾中ニ在ルヲ要ス、塗擦ヲ止ムルノ後、第四日ニ至レハ、二三日間溫浴ヲ持重セシム、時トシテハ、以上ノ療法ヲ再三反復スルヲアリ

其發疹ノ散在性ナルキハ、只、軟石鹼ヲ「フヲチル」ニ塗布シ、之ヲ患部ニ貼スルヲ以テ足レリトス
頭蓋及ヒ顔面ノ鱗屑疹ニハ、加里石鹼ヲ用ウ
其他、爹兒軟膏、石炭酸軟膏ヲ貼ス

○杜松木爹兒油 綠石鹼各二五〇 酒精五〇〇

右塗擦料爹兒軟膏

○石炭酸三〇 單軟膏三〇〇 右同上(石炭酸軟膏)

又クリソフアン酸、苦利沙羅並或ハ護亞粉ヲ貼ス、其法ハ、先ツ
鱗屑ヲ除クカ爲メ石鹼精、若クハ六「プロセント」ノ撒里矢爾
酸酒精溶液ヲ以テ、患部ヲ摩擦シ、左ノ軟膏ヲ攤貼スヘシ

○クリソフアン酸或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)一〇〇

單軟膏四〇〇 右混和(但シ滲出過多ナル者ニハ、布

片上ニ攤シテ、貼付スヘシ)

○腺病性苔癬 *Lichen scrofulosorum.*

小兒ニハ、肝油一日ノ量一五〇、大人ニハ、其三〇〇乃至六〇〇
○チ内服セシメ、外用ニハ、一日二回之ヲ塗擦ス(其上ニ綑縛

法ヲ施ス)且ツ腺病療法ヲ併施スヘシ

○赤色滲出性苔癬 極メテ稀有ノ病ニ屬ス *Lichen exsudati-*

vus ruber.

種々ノ藥品ヲ應用スルモ、大抵其効驗ヲ見ス、只、亞砒酸ヲ持
重スレハ、一時ノ効ヲ奏スルコトアリ

○痒疹 *Prurigo*

内服ニハ、亞砒酸一日三回〇〇〇ニ、必魯加兒必涅或ハ耶僕
蘭日葉ヲ與フ

○鹽酸必魯加兒必涅〇〇ニ 白糖〇五 右每日一

回、頓服ス

○(耶僕蘭日)葉浸(三〇)六〇〇 右同上

外用ニハ、冷浴、昇汞浴(一浴ノ量、一五〇乃至三〇〇)ヲ施シ、結

麗阿曹篤水(百倍)、石炭酸(百倍)ノ塗布、爹兒、白降汞軟膏、榆木爹兒油ニ嘔囉仿謨ヲ和セシ者、爹兒油六〇、〇嘔囉仿謨一五、〇) 肝油等ノ塗擦ヲ行フ、又硫酸加留謨、偏里設林、豚脂、各等分ヲ以テ軟膏ト爲シ、塗擦スルノ法アリ

○白降汞五、七五 樟腦三、七五 豚脂三〇、〇 右軟膏ト爲シ、一日一回、塗擦ス

○火傷 Combustio.

此症ヲ分テ三期トス、其第一期(變赤)ニハ、寒罨法ヲ施シ、或ハ古魯胃謨ヲ塗布ス

第二期(水泡生成)ニハ、水泡ヲ刺開シテ、亞麻仁油、或ハ阿列布油ヲ塗布シ、之ヲ被覆スルニ綿花ヲ以テス、而シテ二十四時ノ後ニ至レハ、之ヲ交換ス、之ヲ交換スルニ當リ、膿液ノ浸潤

シテ膠著セル部分ニハ、微温湯ヲ應用ス、後期ニ至レハ、綿花ノ膠著ヲ防クカ爲メ、單軟膏、又ハ亞鉛華膏ニ等分ノ扁桃油ヲ和セシ者等ヲ塗布ス、又五十倍ノ撒里矢爾酸軟膏、五十倍ノ硼酸軟膏ノ貼敷、硝酸銀溶液ノ塗布(五十倍ノモノヲ塗布シ爾後七八層ノ布片ヲ以テ之ヲ被覆ス、而シテ布片ハ其溶液ニテ常ニ濕潤スルヲ要ス等ヲ施ス
第三期(腐痂生成)ハ、防腐綑帶ヲ施シ、又外科的ノ手術ヲ行フ
アリ

○凍瘡 Congelatio.

[療法] 凍結セル部ハ、漸次ニ之ヲ煖ムヘシ、即チ初メ雪或ハ氷水ヲ以テ摩擦シ、次テ冷水ヲ用井、遂ニ微温湯ヲ用ウ、全身ノ凍冷ニ於ケルモ、亦然リ

凍瘡ニハ、沃度丁幾十倍ノ鞣酸溶液、阿列布油、五十倍ノ硝酸銀水、彈力性古魯胃謨^{三十}、硝酸等ノ塗布或ハ古魯胃謨五〇、〇蓖麻子油二〇、的列並底油六〇ノ混和物ヲ塗擦ス

凍瘡潰瘍ニハ、硝酸銀軟膏ヲ貼ス
〇硝酸銀〇三 豚脂二〇〇 右軟膏ト爲シ患部ニ貼ス

脱疽ニ陥リタル部分ニハ、分界線ノ生スルヲ待テ、之ヲ切除スヘシ

〇鱗屑疹 Ichthyosis.

温浴ヲ命シ阿列布油、或ハ肝油ノ塗擦ヲ行ヒ、殊ニ軟石鹼ノ塗擦ニ兼ヌルニ温浴ヲ以テスルノ法ヲ稱用ス

〔丙〕新生物ニ係ル者

〇狼瘡 Lupus.

〔療法〕 内服ニハ、肝油、沃度化加留謨、亞砒酸等ヲ與フ
外用ニハ、尖銳ノ烙鐵、若クハ白金烙、或ハ苛性加里^{腐蝕後直チニ粉末}布^{チニ}散等ヲ以テ、結節ヲ壞滅シ、或ハ銳匙ヲ以テ之ヲ抉出ス、蔓延性ノ硬結部ニハ、點狀ノ亂刺ヲ施シ、爾後、格魯兒化亞鉛ヲ、同量ノ酒精ニ溶解セシ者ヲ以テ腐蝕ス、腐痂剝脫ノ後、八日乃至十日後、再ヒ之ヲ反復シ、都テ五乃至八回、施行スヘシ長ク氷銀硬膏ヲ貼用ス

〇紅斑性狼瘡 ^{酒類鼻ニ類ス} Lupus erythematodes.

水銀硬膏ヲ以テ被包シ、又加里石鹼精ヲ以テ洗滌シ、爾後、白降汞軟膏^{白降汞一分、單軟膏九分、ヨリ成ル}ヲ貼ス、毎三日ニ、苛性加里ニ二倍ノ氷ヲ和スル者、發烟硝酸、石炭酸ニ同量ノ亞爾箇保爾ヲ和ス

ル者、腐蝕性沃度偏里設林等ヲ以テ腐蝕ス
内服ニハ、肝油、亞砒酸、鐵等ヲ與フ

○沃度 沃度化加留謨各五〇 偏里設林一〇〇

右外用 右塗布後、二十四時間ヲ經テ、之ヲ洗滌シ、爾後
冷罨法ヲ施ス(腐蝕性沃度偏里斯林)

第三節 寄生性皮膚病

○疥癬 Scabies.

百露拔爾撒謨、或ハ蘇合香ノ塗擦法ヲ以テ、最佳トス、其他硫
黃劑、揮發油、例之ハ、的列並底油、茴香油、刺賢垓爾油等ヲ用キ
ルヲアルモ、其効確實ナラサルカ或ハ劇シク刺戟スルヲ以
テ現今多クハ之ヲ用キス

○百露拔爾撒謨三〇〇 右全身ニ塗擦ス(此塗擦ヲ

行フタル後、絨衾中ニ在ルト、二十四時間ニシテ入浴シ
石鹼ヲ以テ之ヲ洗除スヘシ)

○蘇合香三〇〇 阿列布油八〇 右同上

○蘇合香三〇〇 再留酒精八〇 阿列布油四〇

右同上

○百露拔爾撒謨 蘇合香各一五〇 右同上

○硫黃二分 生石灰一分 常水十分 右煎沸

十二分ト爲シ、濾過ス、一日二回、塗擦ス(但シ劇シク炎症
ヲ起シタル者ニハ適セス)

○硫黃花 山毛榉蓂兒油各三分 白堊二分 綠石

礆 豚脂各六分 右混和、四十八時間四回ニ分

ナ、塗擦ス(表皮ノ刺戟過敏ナル者ニ適ス)

○乾性頭癬 Favus.

油ヲ以テ、痲皮ヲ柔軟ニシ、毛髮ヲ拔取シ、一日二回、藥用石鹼ヲ塗擦ス、又結麗阿曹篤軟膏、的列並底油、白降汞軟膏等ノ塗擦或ハ石炭酸溶液、昇汞溶液等ノ塗布ヲ行フ

○結麗阿曹篤一〇 豚脂一五〇 右塗擦料

○白降汞一〇 豚脂一五〇 右同上

○石炭酸二〇 偏里設林 亞爾箇保爾各一〇〇

氷八〇〇 右塗布料

○二百倍ノ昇汞氷 右同上

○禿髮匍行疹 Herpes tonsurans.

毛髮ヲ有セサル部ニハ、白降汞軟膏、昇汞溶液(五百倍乃至二百倍)、石炭酸水(五十倍)、石炭酸軟膏(二十五倍)等ヲ用ウ、就中護

亞粉、苦利沙羅並或ハ羊蹄根(和大黃)末ハ、其効驗著大ナリ

○護亞粉 右適量ヲ取り、醋ヲ以テ稀泥ト爲シ患部

ニ塗布ス(和大黃末ノ用法ハ、護亞粉ニ同シ)

毛髮部ニハ、先ツ毛髮ヲ缺切シ、或ハ拔取シ、而シテ、昇汞溶液或ハ石炭酸水ヲ貼ス

○棕色蛇皮癬 Pityriasis versicolor.

軟石鹼、或ハ加里石鹼精ノ塗擦ヲ行フテ、皮膚ヲ柔軟ニシ、白降汞軟膏、昇汞溶液(五百倍)、石炭酸酒精溶液(五十倍)等ノ塗擦ヲ行フ、最モ良効ヲ奏スルハ、グリソファン(酸軟膏(四倍)或ハ護亞粉(醋ヲ以テ稀泥トナス)是レナリ

第十篇

中毒症

第一節 急性中毒症

〔緒論〕 凡ソ毒物ノ急性作用ハ、或ハ只局處性ニシテ、其接觸シタル表面ニ於テノミ、化學的或ハ刺戟的ノ作用ヲ及ホスカ、或ハ汎發性ニシテ、己ニ吸收セラレタル後、種々ノ神經中樞(特ニ多シ)ニ、固有ノ作用ヲ逞ウスルカ、或ハ兩者同時ニ、併發スルニ在リ、是故ニ治法ノ目途ハ他ナシ、只腐蝕性ノ物質ヲ稀釋シ、或ハ中和シ、以テ其作用ヲ減弱セシメ、或ハ胃腸内ニ遺留スル所ノ殘毒ヲ排洩シ(吐法、胃唧筒、下劑)或ハ「アルカロイド」ノ鞣酸ニ逢フテ、沉澱物ヲ生スルカ如ク、不溶性、或ハ難溶性(此際亦瀉下法モ、缺ク可ラサル者トス)或ハ無害性ノ化合物ニ、變化セシムルノ三法ニアリ

毒物既ニ血中ニ吸收セラ、ルキハ(胃、及ヒ肺ヨリシ、或ハ皮

下及ヒ皮下用法ノ後ニ於テ)之ヲ中和シ得ルハ極メテ稀レナリ(但シ氣狀毒物ニ在テハ可ナリ、硫化水素ノ章ヲ參觀スヘシ)然レモ最初ニ、夥多ノ刺戟ヲ施シ、後移血法ヲ試施スルキ、殊ニ氣狀毒ノ中毒症危篤ナル者ニハ、其奏効ヲ見ルヘシ一定ノ神經裝置ニ、其作用ヲ逞ウスル所ノ種々ナル毒物ノ侵襲ハ、反對ノ作用ヲ有スル佗ノ藥物ニ由テ、之ヲ制剋スルヲ得ヘシ(反對毒、殊ニ「アルカロイド」ニ屬スル者、但シ決シテ中毒量ヲ與フル勿レ)、或ハ對症的ノ治法ヲ施ス、即チ虛脱ニハ、興奮藥ヲ與ヘ、強劇ノ腦充血ニハ、刺戟ヲ施シ、又青酸、斯篤里幾尼涅及ヒ毒性瓦斯ノ中毒ニハ、人工呼吸法ヲ行フ

刺戟性及ヒ腐蝕性中毒ノ症候ハ、劇烈ノ炎症、殊ニ第一道ノ炎症、腐痂ノ生成等ニシテ、時トシテ、穿孔、出血ヲ來タス。ア

リ○中毒胃炎ノ部ヲ參考スヘシ
本篇中ニ記スル所ノ藥物ハ、一々用法、及ヒ用量ヲ示サス、蓋シ中毒ノ際ニハ、其毒ノ多少緩急ニ隨ヒ、之ヲ稀釋シ、中和シ、又ハ吐出スルヲ以テ、畢竟ノ目的トシ、尋常ノ諸病ニ於ケルカ如キ、一定ノ用法ヲ、墨守ス可カラサル者、多ケレハナリ

(甲)固形及液狀毒物

(一)無機性毒物

(イ) 腐蝕性無機酸ノ中毒

口内、及ヒ咽頭粘膜ノ腐蝕、困苦ナル咳嗽、痰狀(及ヒ血液狀)物ノ吐出、腹痛、裏急後重、血便、頭痛、頑固ノ便秘、虛脱ヲ以テ其症候トス
〔療法〕 多量ノ粘滑性飲料、牛乳、油等ヲ以テ、其毒液ヲ稀釋シ或ハ包裹ス、之ヲ中和スルニハ、炭酸加爾叟謨、石灰水、炭酸麻偏、涅叟謨、或ハ酸化麻偏、涅叟謨ヲ(數茶匙宛水ニ和シテ)與ヘ、己

ムヲ得サルキハ、佗ノ亞爾加里、石鹼水等ヲ用ヰル丁アリ
多クハ自ラ嘔吐ヲ催ス、但シ其嘔吐過劇ナル者ニハ、氷片、炭酸水、阿片等ヲ與フ

(ロ) 金屬、非金屬及其化合物ノ中毒

○亞爾加里及土類 Alkalien und Erden.

腐蝕作用ナキ加里中毒ニハ、興奮藥ヲ要ス、硝石ニハ、其佗吐劑ヲ與フルノ後、包攝藥(葛湯等)、鶏卵ノ蛋白、阿片等ヲ與フ
濃厚腐蝕亞爾加里液ハ、之ヲ稀薄シ、中和シ、又ハ鹼化セシムヘシ、即チ醋、枸橼汁、脂肪油等ヲ與フ
格羅謨酸加爾謨ニハ、炭酸麻偏、涅叟謨、或ハ重炭酸那篤留謨及ヒ單舍利別ト、鉄粉トヨリ成ル所ノ稀粥等ヲ與フ
腐蝕土類(殊ニ腐蝕石灰)ニハ、炭酸水、冷糖水、醋、炭酸亞爾加里

脂肪油、卵等ヲ與フ

重土、及ヒ重土鹽類其症候ハ胃ノ炎性刺戟、嘔吐、胃部疼痛、頭痛、視力減少、眩暈、痙攣ニハ、蛋白、硫酸亞爾加里及ヒ土類、瀉利鹽ヲ與ヘ、不溶性性ノ硫酸重土ヲ形成スルヲ目的トス、催吐法〔鹽酸亞鉀莫兒比亞〇、〇〇五ヲ皮下ニ注射ス〕ヲ施ス

○安知母尼劑 *Animonialien.*

虎列刺樣ノ吐瀉ヲ發シ、胃腸炎ヲ起ス

稀薄且ツ緩和スルノ諸方〔水、乳汁、脂肪油等〕ヲ與ヘ、又ハ鞣酸ヲ含有スル諸質、規那丁幾、及ヒ鞣酸劑ヲ投シ、以テ不溶性性ノ化合物ヲ形成スルヲ期ス
過多ノ嘔吐ニハ、沸騰散ニ、阿片（一回〇、〇五）ヲ伍用シ、又鞣酸、氷片ヲ與フ、依的兒、葛私篤、僕、謀丁幾モ、亦可ナリ

○硝酸銀 *Argentum nitricum.*

食鹽ヲ多量ノ水ニ和シ與フ

○砒石 *Arsenik.*

其症候ハ、口中收斂ノ感覺、胃部疼痛、嘔吐、及ヒ下利（間、血便ヲ下タス）煩渴、灼熱ノ自覺、皮膚厥冷、非常ノ恐怖、呼吸困難、神識昏憒等ナリ、而シテ其他ノ症狀ハ、猶ホ虎列刺假死期ノ如シ

其中毒ノ原因タル者ハ、亞砒酸、鼠取藥、砒酸、其他ノ砒石化合物、硫化砒石等、及ヒ含砒性色料等ナリ

〔療法〕砒石解毒劑藥局ニ常備スルモノヲ每四分時ニ、二三食匙ヲ温湯ニ和シ與フ、此際舍利鹽ヲ形成スルヲ以テ、同時ニ下利ヲ來タシテ、殘毒ヲ瀉下スルノ効益アリ、又酸化鉄舍利別、或ハ酸化麻偏涅叟、謨ヲ與フルモ、亦可ナリ、若シ緊要ト認ムルハ、嘔吐及ヒ瀉下（芒硝）ヲ催進ス、其他ハ對症療法ヲ施

ス

○酸化鉄舍利別適宜

右初メニハ、每十五分時、半食匙、後ニハ漸ク其服用ノ時間ヲ遷延スヘシ

○酸化麻偏涅叟謨五〇〇

水二五〇〇

右混和時

々一食匙ヲ取ル

○鉛 *Pb*et.**

其症候ハ、咽頭絞窄、腹内痙痛、嘔吐、下利、虚脱等ニシテ、問、下利ニ代ハリテ、頑固ノ便秘ヲ發シ、腹壁陷没シ、痙攣ヲ起ス、其原因タル者ハ、鉛糖、官粉、密陀僧、丹等ナリ

〔療法〕 蛋白、牛乳、硫酸亞鉛ノ吐劑、瀉下藥、蓖麻子油乳劑等ヲ與フ

解毒劑トシテ、硫黃、硫酸亞爾加里或ハ硫酸麻偏涅叟謨硫酸鉛ヲ形成スルヲ目的トス、但シ直チニ體內ヨリ排除セサル

キハ猶ホ毒アリ、宜シク吐法、又ハ下劑ヲ併用スヘシ、己ムヲ得サルキハ、明礬、磷酸鹽類、或ハ稀薄硫酸ヲ與フ、阿片劑ハ、夥多ノ排泄後ニ投ス可シ

○沃度及沃度化加留謨 *Jod und Jodka lium*

(天) 多量ヲ頓服シタルヨリ發スル者

惡心、持久性嘔吐、吐涎、疝痛、脉搏細數、及ヒ所謂沃度沈醉ヲ以テ、其症候トス

澱粉、蛋白等ヲ與ヘ、且ツ對症療法ヲ施ス

(地) 急性重積作用ヨリ起ル者 (*Jodismus acutus*)

其症候ハ、前額洞ノ疼痛性壓迫、噴嚏、咽頭加答兒、結膜炎等ニシテ、問、吐涎(臭氣ナシ)、皮疹ヲ發スルアリ

沃度劑ノ服用ヲ休止スルヲ以テ緊要トシ、其它ハ、對症療法ヲ施ス

○ 貌羅謨化加留謨

Kaliumbromid (Bromismus)

重積作用トシテ、皮膚及ヒ粘膜、加之、角膜ノ知覺鈍麻、咽頭炎、頭痛、
記臆力減少、嗜眠、五官痲鈍、面皰狀ノ發疹、皮膚蒼白、全体衰弱、大小
便失禁等
ヲ發ス

貌羅謨化加留謨ノ服用ヲ休止シ、浴湯、蒸氣浴、下劑、液狀ノ滋
養性食物ヲ與ヘ、冷水灌腸法ヲ施ス

○ 銅鹽類

Kupfersalze.

其症候ハ、胃腸炎ヲ發シ、銅味ヲ帶フル綠色物ヲ
吐シ、痲痛、及ヒ裏急後重、譫語、及ヒ痲攣ヲ起ス

毒力ヲ稀釋スルカ爲メ(油類、及ヒ醋ヲ禁忌ス)、多量ノ蛋白、牛
乳、酸化麻偏溼叟謨、葡萄糖、蜂蜜等ヲ與フ、鐵屑、フェルロ藏化加
留謨(一、〇)ヲ加ヘ、又單舍利別ニ、鐵屑、及ヒ硫黃華ヲ和シ製ス
ル稀粥モ、亦可ナリ

○ 磷

Phosphor.

其症候ハ、劇烈ノ胃腸炎(但シ之ヲ必トセス)煩渴、虛脫、黃疸等
ニシテ、其吐瀉物ハ、蒜臭ヲ放チ、暗處ニ於テハ、燐光ヲ發ス

胃唧筒ヲ用ウ、又吐劑、殊ニ硫酸銅(一回一、〇頓服)ヲ與ヘ、之ニ
次テ初メニハ、每半時ニ、炭酸銅〇、二五乃至〇、五ヲ少量ノ水
ニ和シ服セシメ、其際、每回半食匙ノ醋ヲ水ニ和シテ併用ス
其間ニハ、寒冷ノ飲料、果物、氷等ヲ與ヘ、凡ソ二三時間ノ後、再
ヒ硫酸銅ノ吐劑ヲ與フ

蛋白質、粘滑飲料、酸化麻偏溼叟謨、格魯兒石灰、的列並底油(一
回ノ量五滴ヲ與ヘ、全量一、〇、〇ニ達ス)等ヲ與フルモ、亦可ナ
リ、脂肪、牛乳、亞爾箇保爾性飲料ヲ禁忌ス

○ 水銀

Quecksilber

(天) 腐蝕性水銀製劑ノ中毒

咽頭焮灼、及ヒ絞窄ノ感覺、腹部ノ劇痛、硬塞ノ感覺、間、血液狀
物ノ嘔吐、下利、及ヒ裏急後重、虛脫、痲攣等ヲ以テ、其症候トス

蛋白質、澱粉ヲ水ニ攪和スル者、牛乳、砂糖水、新タニ沈澱シタル含水硫化鉄綠礬溶液ニ、硫化亞爾加里ヲ和スルニ由テ得タル者、下劑等ヲ與フ

(地) 急性水銀中毒症

口内粘膜ノ加答兒及ヒ潰瘍、頸部疼痛、吐涎、齒牙動搖、口臭、發熱、惡心、下顎壞疽等ヲ以テ、其症候トス

水銀軟膏ノ外用ニ由テ發スルハ、其殘留物ハ盡ク石鹼水ヲ以テ洗ヒ去リ、解凝劑殊ニ溫浴、薩爾沙根、沃度化加留謨等ヲ與ヘ、且ツ口内炎及ヒ吐涎ノ治療參考スヘシヲ要ス

○ 硫肝硫化加留謨 Schwefelheber. 硫化水素ノ游離○スルヲ以テ毒アリ

氣狀毒物ノ中毒症ヲ參觀ス可シ

胃炎、嘔吐、眩暈、虛脫、心臟作用及ヒ呼吸ノ閉止ヲ以テ、其症候トス

粘滑飲料、牛乳ヲ與ヘ、格魯兒瓦斯注意シテ吸入セシムヲ用井、又ハ人工呼吸法ヲ施ス

○ 亞鉛及錫鹽類 Zink- und Zinnsalze.

惡心、嘔吐、下利、煩渴、四肢振顫、胃腸炎、腹痛、虛脫等ヲ以テ、其症候トス

蛋白、牛乳、鞣酸、重炭酸那篤留謨等ヲ與フ

(二) 有機性毒物 Organische Gifte.

(イ) 動物性毒ノ中毒症

○ 羯答利斯 Canthariden.

割烈ニシテ、尿、血液ヲ雜ユル嘔吐、強刺ノ腸痛、咽頭痙攣、吐涎、利尿、尿窘迫、血尿、淫慾、熾盛、五神昏憒等ヲ以テ、其症候トス

催吐藥及ヒ緩下藥ヲ與ヘ、爾後粘滑飲料(油類ヲ禁忌ス)、少量ノ樟腦ニ阿片ヲ伍スル者ヲ投ス、琶布及ヒ水蛭ヲ腎臟部ニ

貼ス

○魚肉中毒 Fischgift.

虎列刺様ノ吐瀉、腹痛(但シ亦便秘スル者ナキニアラス)嚥下困難、嘔吐、上眼瞼下垂、及ヒ視覺障害、非常ノ衰憊、精神錯亂、痙攣、血斑等ハ諸症ヲ以テ、死ニ陥リ、或ハ徐々ニ回復スルヲアリ
排瀉法ヲ主トス。メ腸ニ在レハ瀉下セシム。爾後興奮的ノ對症療法ヲ施シ、嘔吐過度ナルキハ、之ヲ鎮靜シ、芥子泥ヲ胃部ニ貼ス

○毒蛇咬傷 Schlangenbiss.

眩暈、惡寒、倦怠、手足厥冷、瞳孔散大、痙攣、呼吸困難、嚥下困難、嘔吐、黃疸、出血ノ狀況、強劇ノ局部腫起、膿瘍形成(動、モスレハ脫疽ニ陥ルヲアリ)ヲ其症候トス

最モ咬傷部ニ接近シタル、適當ノ肢節ヲ緊紮シ、以テ毒血ノ内進ヲ禦キ、創傷ヲ吸引シ、(其口内ニ剝傷等アル者ハ、此吸引

ヲ行フ可カラス)、亂刺シテ後、血角ヲ貼ス、又烙鐵、苛性加里、安母尼亞水等ヲ以テ、其局部ヲ腐蝕シ、硝酸斯篤里幾尼涅ヲ内服シ、又ハ皮下ニ注射ス(内服、及ヒ皮下注射ノ量ハ、一日一回〇、〇〇五)

○昆蟲螫傷 Arthropodenstiche.

創傷ヲ壓搾シ、又ハ吸引シ、安母尼亞ヲ以テ、其毒ノ酸性ナル者ヲ中和ス、石灰水ヲ應用スルモ亦可ナリ、且ツ冷罨法ヲ施ス

〔口〕 毒性有機酸及其化合物ノ中毒症

○蓚酸 Oxalshure.

其濃厚液ハ、局部ヲ腐蝕シ、咽頭絞窄ノ感覺、血液ヲ雜ユル嘔吐、腹痛、又麻酔的ニ膈及ヒ脊髓ヲ侵襲ス(精神迷蒙、知覺鈍麻、關節顫動、強直、狀瘰癧、呼吸困難、心臟麻痺)

解毒劑ニハ、石灰水、又苛性麻偏涅矢亞、白堊、卵殼等ヲ與フ、但シ亞爾加里及ヒ安母尼亞ハ、稀酸ニ逢フテ毒性ノ化合物ヲ構成スルカ故ニ用ウ可カラス
自ツカラ嘔吐ヲ催サ、ルキハ吐劑ヲ與フ、其景況ニ因テ興奮藥ヲ投ス

○石炭酸 Carbolisäure.

參兒、結列屋曹萬、亞尼林、ニトロロムンツォール（即チ人工苦扁桃油）、ニヒクリン酸モ亦同シ
其少量ニ於テハ、一回量〇、八一日量二、〇、倦怠、頭痛、眩暈、冷汗、嘔氣、嘔吐、利尿、尿道、加之、腎炎等ヲ發ス、腐蝕作用ヲ起スヘキ大量ハ、局處ノ腐蝕、嘔吐、昏倒、知覺乏絶、酸酐狀ノ精神變常、眩暈、譫語、絶脈、急劇ノ虚脱ヲ以テ其症候トシ、呼吸氣ニ參兒臭ヲ帶フ
胃、啣筒、刺絡、緩和藥、蛋白質、牛乳、沉降製炭酸加爾叟謨、阿列布油、或ハ甘扁桃油ニ蓖麻子油ヲ配伍スル者、興奮藥（浣腸）、皮膚刺戟法等ヲ用ウ

持久性ノ者ニハ、硫酸那篤留謨、一回量一五、〇乃至三〇、〇等ヲ稱用ス

○青酸 Blausäure.

窒息毒ノ部ニ出ツ、就テ見ルヘシ

〔ハ〕植物性及有機性物質ノ中毒

〔天〕刺戟性物質 Acrida.

一、一般ノ症候ハ、口内及ヒ咽頭ニ於ケル灼熱及ヒ辛辣ノ感覺、胃腸炎、接觸セル粘膜ノ腫起、嘔吐、下利、裏急後重等ナリ
〔第一〕刺戟力ヲ有スル者、即チ海葱、薩昆那、瑞香、歐仿爾繆謨、白屈菜、數多ノ毛茛科、白頭翁屬、強烈ノ胡椒及ヒ芥子屬
〔第二〕刺戟性ニシテ、強キ瀉下作用ヲ有スル者、即チ巴豆、蘇甘沒紐謨、越刺的留謨、藤黃、古魯聖篤、プリオニア等
〔第三〕刺戟性ニシテ、殊ニ麻醉性作用ヲ有スル者神經毒ノ部ヲ參考ノ

シス可即チ古爾矢屈謨魯別利亞、リグストルム、ウルガーレ、水
樹、勿刺篤留謨、歇列僕里、撒拔實爾刺、スタフキス、アグリア、白頭翁、
木本黃精葉鈎吻、デルフィニウム、オレアンデル、チヌチーズス、
ラブルヌム、皮等

療法ハ、吐劑、下劑、緩和藥、水、局處瀉血、阿片、鞣酸ヲ與フ、其他ハ
中毒性胃腸炎ノ章ヲ參考スヘシ

〔地〕筋及ヒ神經ニ對スル毒物(麻醉
性物質) Muskel- und Nervengifte (Narcotica).

(一)腦ニ對スル物質 Cerebralgifte.

○阿片 Opium, Papaver.

頭痛、惡心、嘔吐、非常ノ困倦、恐怖、妄語、狂走狀ノ發作、又ハ沉睡、言語、
體攣等ヲ以テ其症候トシ、時トシテハ痲痺ヲ發シ、瞳孔大ニ收縮、
シ、脉搏及ヒ呼吸ノ遲緩及ヒ不整
チ起シ、汗液甚シク皮膚ニ淋漓ス

強劇ノ催吐藥ヲ與ヘ、胃唧筒ヲ使用ス數時間ヲ經タル後ニ於
テモ仍ホ可ナリ
解毒藥ニハ、鞣酸及ヒ硫酸亞篤魯必涅(〇、〇〇一乃至〇、〇〇
三)ヲ皮下ニ注射ス)ヲ與フ

對症療法ニハ、斷エス患者ヲ拉シテ運動セシメ、冷灌法ヲ施
ス、虛脱ニ陥ル者ニハ、興奮藥、殊ニ濃厚ノ咖啡、樟腦皮下ヲ與
注射フ、又己ニ阿片ヲ排瀉シタル後ニ於テ、植物酸ヲ用ヰレハ大
ニ其症候ヲ輕減セシムルヲアリ

○酒精類 Alcohol.

其症候ハ、即チ酩酊ノ甚シキ者ナリ

寒捲法及ヒ冷水灌漑法ヲ施シ、誘導法ヲ行ヒ、又瀉血法、水蛭
等、加之、刺絡ヲ施スヲアリ(腦充血ノ部ヲ參考スヘシ)
内用ニハ、濃厚ノ咖啡ニ、枸櫞汁ヲ加フル者、安母尼亞水八乃

至十滴ヲ水ニ和スル者、炭酸水等ヲ與フ

(二) 腦脊髓ニ對スル毒物 Cerebrospinalgifte.

○抱水格魯刺爾 Chloralhydrat.

虛脫、冷汗、深ナル肝息狀ノ呼吸、結膜潮紅、瞳孔散大、唇色紫青、下顎墜垂、脉搏初メ強且ツ緩終リニ細數ナル等ヲ以テ、其症候トス
胃唧筒、人工呼吸法、摩擦、及ヒ強烈ノ温煖法等ヲ施シ、心臟麻痺ニハ、斯篤里幾尼涅ノ皮下注射ヲ行ヒ、其用量初メハ〇、〇〇三、後ニハ之ヨリモ少量ヲ反復ス、麝香、樟腦、依的兒射皮又ハ注内等ヲ與フ

○別刺敦那、莨菪、蔓陀羅華及ヒ菲沃斯

Belladonna und Stramonium. Hyoscyamus.

瞳孔散大、視覺昏惰、脉搏及ヒ呼吸ノ促進、咽頭及ヒ皮膚ノ乾燥、沈醉、及ヒ譫語等ヲ發シ、又ハ狂走ニ次クニ嗜眠ヲ以テシ間、嘔吐、腹

痛、下利(殊ニ其子實ヲ誤食スル時)等ヲ起スヲアリ

胃ノ内容物ヲ排出シ、鞣酸、動物炭、沃度、鹽酸莫兒比涅(〇、〇三ヲ皮下ニ注射ス)、或ハ加刺拔兒豆、耶僕蘭日葉等ヲ解毒藥トシテ與ヘ、又ハ多量ノ亞爾箇保爾飲料ヲ投ス、其他更ニ對症療法ヲ施スヘシ

○ニコチン「烟艸」Nicotin.

眩暈、頭痛、嗜眠、及ヒ精神遲鈍、倦怠ノ感覺、疼痛、惡心、嘔吐

○瞳孔縮小、冷汗、虛脫、搐搦性痙攣等ヲ以テ、其症候トス
解毒藥ニハ、鞣酸ヲ與フ、其他ハ對症療法、人工呼吸法等ヲ施ス

(三) 脊髓ニ對スル毒物 Spinalgifte.

○番木髓 Strychnos (Nux vomica.)

勁直、緊張、筋搐、強直、之ニ繼起スル呼吸困難、大煩悶及ヒ不穩、青色、瞳孔散大等ヲ以テ其症候トシ、人事不省ハ後期ニ至テ發ス、最モ僅微ノ外來刺激モ、亦前症ノ發作ヲ誘起ス(反射症)

吐劑ヲ投シテ、毒物ヲ排出シ已ニ時間ヲ經タル者ハ、蓖麻子油又ハ巴豆油ヲ投シテ、瀉下ヲ促シ、鞣酸、沃度丁幾十乃至三十滴ヲ水ニ和シ、反復飲用スヲ與ヘ、鹽酸莫兒比涅ヲ皮下ニ注射シ、抱水格魯刺爾ヲ內服シ、亞硝酸亞密爾二乃至三滴、又哥囉仿謨(頻回)ヲ吸入シ、平流電氣ヲ延髓部ニ施シ人工呼吸法ヲ行フ

○加刺拔兒豆 *Faba Calabarica.*

嘔吐、非常ノ困憊、其甚タシキニ至テハ、全身不遂、遺溺、及ヒ遺尿、瀉機ノ亢進ニ基因ス、吐涎及ヒ發汗ノ過多、瞳孔縮小、呼吸困難、漸次進歩スル脈搏遲慢、及ヒ體溫低降等ヲ以テ、其症候トス
嘔吐ヲ催進シ、解毒藥トシテハ、斯篤里幾尼涅或ハ亞篤魯必

涅等ヲ與ヘ、人工呼吸法、強劇ノ興奮劑、温煖法、其他對症療法ヲ施ス

(四) 主トノ心臟ニ對スル毒物 *Herzgifte.*

○烏頭、附子(雙鸞菊) *Aconit.*

咽頭嫩痛、舌上攪痒、胃痛、頑固ノ便秘、呼吸困難、筋弱、其甚タシキニ至テハ、筋ノ不遂、瞳孔散大、皮膚ノ厥冷、及ヒ知覺減少、心臟作用ノ遲慢、及ヒ休絶等ヲ以テ、其症候トス

吐劑、及ヒ下劑ヲ以テ毒質ヲ排瀉シ、解毒藥ニハ、鞣酸及ヒ沃度ヲ與ヘ、又心臟ヲ興奮スルノ療法ヲ施ス

○實荳答利斯 *Digitalis.*

嘔吐、下利、脈搏非常ノ減少(一分時間四十搏以下)、呼吸困難、虛脫、昏睡等ヲ以テ、其症候トス

吐劑又ハ鞣酸ヲ與ヘ、強力ノ興奮藥、樟腦、依的兒、葡萄酒、咖啡、安母尼亞等ヲ投ス

○ 沕拉篤里涅、白藜蘆 Veratrum. Helleborus albus.

強制ノ嘔吐、間血液ヲ混ス、嘔逆、下利、胃ノ灼痛、虚脱、○ 脉搏及ヒ體温ノ低降、呼吸緩慢、擗狀、痙攣、人事不省、等ヲ以テ、其症候トス。鞣酸、興奮藥、安母尼亞苗香精、緩和藥、阿片等ヲ與ヘ、對症療法ヲ施ス。

○ 古爾矢屈謨 Colecium.

惡心、及ヒ持久性ノ嘔吐、痙攣、下利、及ヒ裏急後重、脉搏沈降、筋弱、顔色憔悴、虚脱、眩暈(但シ神識ヲ失ハス)等ヲ、其症候トシ、稀レニ昏睡及ヒ痙攣ヲ發ス。鞣酸ヲ與ヘ、排泄法(吐藥又ハ瀉下藥)、興奮法、對症法ヲ施ス。

(信) 窒息性毒物

○ 青酸及ヒ藏化加留謨已下ノ青素化合物

Cyanverbindungen.

呼吸困難、筋弱、四肢厥冷、人事不省、瞳孔散大、痙攣(窒息性痙攣)ヲ以テ、其主徴トシ、又窒息ノ者ノ如ク青色ヲ呈シ、甚タシク青酸ノ臭氣ヲ放ツ。

[療法] 胃ノ内容物ヲ排出シ(胃唧筒)、亞篤魯必涅ヲ皮下ニ注射シ(一回〇、〇〇一)、興奮藥ヲ與ヘ、又安母尼亞ヲ靜脈中ニ注入ス(注意スヘシ、温浴ヲ取ラシメ、其際頭部ニ冷水ヲ灌注ス、其它人工呼吸法ヲ施ス)。

(乙) 氣狀毒物

○ 硫化水素 Acidum hydrothionicum.

惡心、全身衰弱、恐怖、及ヒ苦悶、脉搏遲慢、及ヒ中止、呼吸増進、次ニ過止、瞳孔散大、痙攣(窒息的痙攣)ヲ以テ、其症候トス。人工呼吸法ヲ施シ、格魯兒瓦斯ノ稀釋セル者ヲ吸入セシメ

〔硫化水素ヲ分解スルノ目的ヲ有ス〕安母尼水ヲ靜脉中ニ注入シ且ツ對症療法ヲ施ス

○酸化炭素、沼氣及燈用瓦斯酸化炭素、沼氣、水素、炭化水素類ノ

混合物 Carbonem oxylum et. c.

頭痛、倦怠、眩暈、麻酔、言語、知覺、乏絶、痙攣、間歇性ノ呼吸、心臟作用ノ減弱、青色、呼吸閉止ヲ以テ其症候トス

新鮮ノ空氣ヲ呼吸セシメ、人工呼吸法、冷水ノ灌漑、皮膚刺戟劑、麥角越幾斯〔エルゴチーン〕ノ皮下注射等ヲ施シ興奮劑ヲ與フ

○炭酸 Kohlensäure.

其症候ハ、呼吸増進シテ、畢ニ強劇ノ呼吸困難ト爲リ、頭痛、眩暈、麻酔、視覺及ヒ聽覺ノ亡失、瞳孔散大、全身痙攣〔ウアロリ橋〕中ノ痙攣中樞ノ刺戟ヲ發シ、終ニ假死症ニ陥リ、其脉搏ハ少量ニ於テハ、毫モ變化セス、或ハ僅ニ増進スルノミナリト雖モ、通常ハ其緊張ノ度ヲ増加シ、迷走神經中樞ノ興奮ニ依テ、減降スルモノトス

新鮮ノ空氣〔酸素〕ヲ呼吸セシメ、興奮藥ヲ與ヘ、對症療法ヲ施ス

○依的兒及嘔囉仿謨 Aether und Chloroform.

運動神經機ノ痙攣ニ依テ、卒然心臟作用ヲ休止セシムルニ由リ、或ハ延髓中呼吸中樞ノ痙攣ニ由テ、卒死ヲ招ク、而シテ其痙攣ハ、或ハ急卒ニ發シ、或ハ漸次炭酸中毒ノ諸証候ヲ呈シテ、久シク呼吸困難且ツ淺短ト爲ルノ後ニ發ス、又舌ノ弛緩シテ、自カラ後方ニ牽キ、以テ器械的ニ呼吸ヲ妨礙スルヲ壓之アリ

舌ヲ牽出シ〔下顎〕ヲ牽引スルモ、亦同一ノ効ヲ奏ス、胸部及ヒ顔面ニ冷水ヲ撒布シ、鼻及ヒ喉頭粘膜炎、輕易ニ刺戟シ、頭部ヲ低下シテ人工呼吸法ヲ施ス、而シテ之ヲ行フハ〔甲〕種々ノ器械的方法ニ由リ、殊ニ胸膈ヲ壓迫シ、又卒然其壓ヲ除去スルノ術ヲ反復交換スルヲ最佳トシ、或ハ〔乙〕扁平ノ電極ヲ喉頭ノ兩側ニ抵テ、以テ橫膈膜神經ニ、電氣刺戟ヲ受ケシメ、或

ハ(丙)心臟作用ノ停止スル際ニハ、心臟ノ部位ヲ衝突シ、又ハ
心臟部ニ電氣鍼刺法ヲ施スニ在リ

第二節 慢性中毒症

慢性中毒ノ原因タル者ハ、硝酸銀、砒石、鉛、水銀、亞鉛、磷、沃度、亞
爾箇保爾、阿片、抱水格魯刺爾、烟艸、麥角、硫化炭素等ナリ

○慢性硝酸銀中毒 *Argentum nitricum.*

其症候ハ、皮膚ニ黴灰色ヲ呈シ、全身困憊ノ感覺、頭部鬱閉、記憶力
乏少、背筋攣縮、咽頭及ヒ歐氏管ノ加答兒、視力昏常、慢性胃腸加答
兒、蛋白尿(腎
臟炎)等ナリ

其療法ニハ確實ノ者ナク只硝酸銀劑ノ藥用ヲ停止スルヲ
以テ足レリトス

○砒石惡液質 *Arsenikachexie.*

初期ノ症候ハ、胃部壓痛、嘔吐、下利、不眠、眩暈、四肢顫慄、咽喉乾燥、結
膜炎等ニシテ、其他遂ニ精神遲鈍、憂鬱、皮膚乾燥、發疹、夜間發熱、咳
嗽、苦悶、食欲減少、羸瘦、痙攣等ヲ起ス
主トシテ其原因ニ遠サカリ、蒸氣浴ヲ以テ新陳代謝機ヲ充
進シ、強壯藥殊ニ鐵劑ヲ投シ、滋養性ノ食料ヲ取ラシメ、又砒
砂ハソノ氏ノ析出スル中及ヒ器官中ニ與ヘ、其他對症療法ヲ
施ス
○礪砂 精製甘艸羔各五、○ 水二〇〇、○ 右每
時、一食匙
○慢性鉛中毒 *Pbci.*
(イ) 鉛毒痴 痴痛ノ條ヲ見ルハシ
(ロ) 鉛毒關節痛 例之ハ鉛毒股關節痛久スルハ其部枯瘦ス
其他鉛毒顫慄、痙攣、痲痺、急癱及ヒ
鉛毒痙痺(伸筋)等モ亦之ニ屬ス

下劑、温浴、沃度化加留謨、貌羅謨化加留謨、麻醉藥、瓦爾華尼電氣扇處或ハ交感神經ニ施ス、斯篤里幾尼涅、冷漑法、強壯藥等ヲ撰用ス

○蓖麻子油五〇〇 巴豆油二滴 右每一時一食匙

快利ヲ得ルヲ度トス

○沃度化加留謨二〇乃至三〇 貌羅謨化加留謨八〇

水二〇〇〇 苦味丁幾四〇 右每二時一食匙

○阿片〇〇三 白糖〇五 右數包ヲ作り、每一時一

包ヲ服シ、鎮痛ヲ度トシ、止ム

○亞硝酸亞密爾三滴 右綿絮ニ浸シテ吸入ス

○硝酸斯篤里幾尼涅〇〇五 蒸餾水一〇〇 右一

日一筒ヲ、皮下ニ注射ス

(ハ) 鉛毒腦病

姑息的ノ對症療法ヲ施ス、即チ瀉下性ノ浣腸、發泡膏ヲ施シ、胸部ニ乾角ヲ貼ス、強劇ノ消炎法ハ不可ナリ

(ニ) 鉛毒勞

強壯劑(鐵)、硫黃浴等ヲ撰用シ新鮮ノ空氣ヲ呼吸セシム

○慢性水銀中毒 Quecksilber.

水銀、職工ノ汞毒、飢饉、汞毒、惡液質ノ如シ

主トシテ、其原因ヲ遠サケ、口内ヲ清潔ニシ(五十倍ノ格魯兒酸加留謨溶液ヲ以テ含嗽ス)解凝藥(殊ニ沃度化加留謨)發汗藥、蒸氣浴、硫黃浴、強壯藥等ヲ撰用シ、滋養性食料ヲ取ラシム

○沃度化加留謨二〇 單舍利別一五〇 水二〇〇〇

右每二時一食匙

○ 挖物兒氏散 〇.五

右頓服量

○ 慢性亞鉛中毒 Zink.

消化機ノ障害、衰弱、水血ニ基因スル水腫等ヲ以テ、其症候トス

先ツ亞鉛劑ノ藥用ヲ止ムル等其原因ヲ避ケ、爾後強壯藥ヲ投シ、滋養性ノ食料ヲ與フ

○ 慢性磷中毒 Phosphor.

其症候ハ、胃部ノ諸患、磷臭ヲ帶フル噁氣、眩暈、倦怠、顔色不良、氣管支炎、結核、疼痛如裂、顎骨ノ骨膜炎、并ニ該部ノ腫脹等ナリ

外科的ノ對症療法ヲ施シ、強壯藥ヲ與ヘ且ツ滋養性ノ食料ヲ取ラシム

○ 慢性沃度中毒 Iodismus chronicus.

其症候ハ、食欲缺乏、消化機障害、嘔噎等ニシテ、自餘ハ急性沃度中毒ノ症狀ニ同シ、神經系統ヨリ發スル症候ハ、不安、輕易ノ興奮、頭痛、不眠、四肢顫慄、心悸、全身衰弱、羸瘦、腺ノ消耗等ナリ

其療法ハ、沃度劑ノ藥用ヲ停止シ、注意シテ強壯療法ヲ施セハ足レリ

○ 慢性亞爾箇保爾中毒 Alcohol dyscrasie.

精神及ヒ身體ノ衰弱、慢性咽喉胃腸加答兒、震盪、譫忘、其他精神的ノ異常症候、不眠等ヲ以テ其症候トス

主要ナル現症及ヒ器官的ノ疾患ヲ療ス、特ニ之ニ稱用スル藥物ハ、苦味藥(健質亞那、規那、番木鱉、炭酸亞爾加里、次硝酸蒼鉛、阿片)〇.〇五乃至〇.一、抱水格魯刺爾(一.〇乃至二.〇)ノ神經症用等ナリ、其他温浴、冷灌法等ヲ施ス

○ 龍膽浸(一〇.〇)二〇〇.〇 單舍利別一五.〇 右每二時、一食匙

○ 番木鱉丁幾一〇.〇 苦味丁幾二〇.〇 右每食後十五滴ヲ服ス

○規那煎(八、〇)三〇〇〇

單舍利別一五〇

右每二

時一食匙

○重炭酸那篤留謨五〇

苦味丁幾三〇

水二〇〇〇

右每二時一食匙

○次硝酸蒼鉛五〇

重炭酸那篤留謨二〇〇

右一

日三回、一小刀尖ヲ服ス

瀉血ヲ禁忌ス

○慢性阿片中毒 *Opium.*

其服量過多ナラサルハ、久シク之ヲ持重スルモ、著明ノ害ナシ、ト雖モ多量ナルキハ、胃腸加答兒、矢荷兒、陪克性、齒齦、非常ノ羸瘦、四肢顫慄、精神遲鈍及ヒ五神錯誤等ヲ起ス

阿片劑ノ藥用ヲ停止シ、興奮的ノ對症療法ヲ施ス

○慢性莫兒比涅中毒 *Morphinismus.*

顔面蒼白、發汗過多、發疹、重視、瞳孔縮小、或ハ不同、不眠、神經痛、其佗多般ノ神經障害、蛋白尿、間歇熱ヲ以テ其症候トス

徐々ニ莫兒比涅劑ノ服量ヲ減少セシムルヲ、最佳ノ療法トス但シ休藥若シ急遽ニ過キテ困難ヲ來スコトアルトキハ、一時鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射(〇、〇一)ヲ施シ、以テ之ヲ退クベシ

○慢性抱水格魯刺爾中毒 *Chloralhydrat.*

其症候ハ、結膜炎、瞳孔縮小、發疹、殊ニ嫩熱ノ感アル潮紅、疹ニシテ、纒ニ亞爾、箇保爾性飲料、或ハ溫檢ノ食物ヲ取ルモ、亦能ク之ヲ喚起ス、又呼吸困難ノ發作アリ

先ツ該藥ノ服用ヲ停止シ、爾後、強壯劑ヲ與フレハ、足レリ

○烟草中毒 *Tabak.*

呼吸困難、咽頭及ヒ喉頭、加答兒、結膜炎、心悸、四肢顫慄、依ト昆塚兒、精神ノ變換等ヲ以テ其症候トシ、間、視力減弱、黑內障ヲ起ス、ア

烟草ヲ停止シ對症療法ヲ施ス

○麥角中毒 *Secale cornutum.*

壞疽性ノモノハ手足ニ乾潤性壞疽ヲ發シ瘰癧性ノモノハ始メシテ脱落シ其際發熱膿毒症ヲ起スアリ瘰癧性ノモノハ始メ眩暈眼花耳鳴殊ニ手足指ノ蟻行感覺及吐下ヲ起シ其甚タシキニ至テハ筋肉痙攣ヲ發ス
壞疽性ノ者ハ、外科的、對症的、防腐的ノ諸療法ヲ施シ、痙攣性ノ者ハ、麻醉藥及ヒ、迷朦藥ヲ、發作時ニ與フ、又瀉下藥、強壯藥及ヒ滋養性ノ食料ヲ與フ

醫通畢

醫通附錄

第一篇

診查要訣

第一章 コルソン氏診查整體法

- (一) 鎖骨部ヲ露出セシムルニハ兩側ノ手關節ヲ腰部ニ於テ相合シ肩胛ヲ後方ニ牽掣ス
- (二) 肩胛骨部ヲ露出セシムルニハ兩腕ヲ頭上ニ於テ交叉セシム
- (三) 上肩胛骨部ヲ露出セシムルニハ腕ヲ前ニ交叉シ兩手ヲシテ各、反對セル側邊ニ置カシム
- (四) 下肩胛骨部ヲ露出セシムルニハ手ヲ以テ各、反對セル側邊ノ肩胛ヲ把握ス

第二章 心臟部位ノ要點

僧帽瓣(一)(○)心尖鼓動ノ位置ハ第五左肋骨間ニ於テ少シク乳頭ノ内下方ニ在リ「i」ハ「ト」ノ音ナリ
 三尖瓣(一)(○)胸骨右縁及ヒ胸骨上ニ位シ恰モ第五右肋骨ノ附著點ニ適合ス
 大動脈(一)(○)密ニ胸骨右縁ニ接著シ恰モ第二右肋骨間ノ内部ニ適合ス
 肺動脈(一)(○)密ニ胸骨左縁ニ近接シ恰モ第二左肋骨間ノ内部ニ適合ス

胎兒心音十八週乃至二十週ヨリ始マル百二十乃至百六十至以上○胎兒ノ位置正常ナル時ニ於テハ左側膈骨前下棘

ノ方向ニ於テ臍部ニ偏在ス

第三章 心臟ノ濁音部

眞正ナル心臟濁音部ノ形勢ハ一ノ角線ニ符合ス而シテ其尖端ハ第四左肋骨ノ胸骨附着部ニ位シ其一脚ハ之レヨリ外部及ヒ上方ニ凸隆スル孤線ヲ爲シテ心尖鼓動部ニ向テ進ミ佗ノ一脚ハ或ハ胸骨左縁ニ傍テ直下シ成ハ之ヲ超過シテ微ニ孤線狀ヲ爲シ胸骨中縁ニ向テ下行ス
 下方ニ於テハ心臟濁音直チニ肝臟濁音ニ變移ス

第四章 肺臟ノ經界

尖端部前面ノ上方ニ於テハ其清音鎖骨上縁ノ上三五セシメトニ達シ其後面ノ上方ニ於テハ第七頸椎ノ棘狀突起ノ横端ヲ横過シテ存スルト想像スヘキ所ノ平面ニ達

其基[○]底[○]部[○]ハ右ノ方、肝臟ノ經界ニ至リ左ノ方、副胸線ニ於テハ、心臟ノ濁音部ニ、乳線ニ於テハ、第七肋骨ノ上線ニ、腋線ニ於テハ、第八肋骨間ニ、肩胛線ニ於テハ、第八肋骨ニ、脊梁ニ沿フテハ、第十一肋骨ニ達ス

第五章 肝臟ノ濁音部

上方ノ經界ハ殆ント地平線ノ狀ヲ爲シテ右胸半ヲ環走シ右副胸線ヲ第六肋骨ニ於テ、乳線ヲ第一肋骨間ニ於テ、腋線ヲ第七肋骨ノ下線ニ於テ、肩胛線ヲ第九肋骨ニ於テ交截シ第十一肋骨ニ於テ脊柱ト會ス
矮短ノ人ニ在テハ肝臟經界ノ上部、心尖鼓動ノ位置ト共ニ間、一肋間高ク存在スルヲアリ

其下方ノ經界ハ腋線ニ於テハ少シク肋骨弓ノ上方ニ位シ第十或ハ第十一肋骨間乳線ニ於テハ肋骨下線稀レニ一乃至一、五センチメートル下方ニ位シ中線ニ於テハ略ハ劍狀突起ト臍トノ中間ニ位シ之ヨリ斜メニ心尖鼓動ニ向テ上方ニ赴ク

第六章 脾臟ノ打診

此打診ヲ行フニハ或ハ直立ノ位置ニ於テシ或ハ仰臥ト右側臥トノ中間ニ於ケル斜線様ノ位置ニ於テ

其敲打ハ輕々ニ行フ可シ、打診上確定スルヲ得ルニ只、脾ノ前端ノミ、所謂幅員下章ヲ參ノ増大及ヒ前界ノ變換ヲ診定スルヲ以テ其要點トス

其上[○]界(肺脾界)ハ腋線ニ於テハ通常第八肋骨間或ハ第九肋骨ニ在リ

脾ノ下界ト上界トノ距離(即チ脾臟濁音部ノ幅員)第九肋骨ト第十一肋骨トノ間ニ在リ)ハ鉛直ノ方向ニ於テ五乃至六「センチメートル」ニ當ル

脾ノ前界ハ正常ノ景況ニ於テ肋關節線(第十一肋骨ノ尖端ヨリ鎖胸關節ノ方位ニ引ク所ノ線ナリ)チ超過スルコトナク且ツ肋骨弓チ遠サカルコト四乃至五「センチメートル」ノ位置ニ在リ

後方及ヒ下方ニ於テハ脾臟ノ濁音ハ腎臟ノ濁音ニ變移ス結腸及ヒ胃ノ充盈ハ打診チ妨礙スル者トス

第七章 肋骨計數法

肋骨チ計數スルハ左ノ諸件ニ憑依スレハ大ニ便宜チ得ヘシ

第二肋骨以下第七ニ至ル迄ハ肩胛骨下ニ在リ第七ハ肩胛下隅ニ位ス

第四肋骨ハ其前端チ以テ乳頭ノ水平線内ニ在リ

手膊チ牽着シ身體チ直立スル時ニ當リ臂關節尖端ノ觸合スル所ハ即チ第九肋骨全徑ノ中點ニ當ル

第十一及ヒ第十二肋骨ハ共ニ容易ク肋骨弓ノ後角ニ於テ觸知ス可シ故ニ之ヨリ上方ニ肋骨チ數フヘシ

第八章 胸廓ノ周圍

手チ地平形ニ伸舉シ肩胛下隅及ヒ乳頭ニ密接シテ測ルトキハ男子ニ於ケル胸廓周圍ノ平均ハ左ノ如シ(フリヨリヒ

氏ニ從フ

最深ノ吸息ニ於テハ

八十九センチメートル

最深ノ呼息ニ於テハ

八十二センチメートル

胸廓ノ擴大シ得ヘキ

七センチメートル

平均尺度呼吸ト吸息トノ差

而シテ此尺度ト体重及ヒ身長トノ關係ハ左ノ如シ

吸息周圍ノ一センチメートルハ六五八〇瓦ノ體重及ヒ

一、八センチメートルノ身長ニ相當ス

呼息周圍ノ一センチメートルハ七一〇〇瓦ノ體重及ヒ

二センチメートルノ身長ニ相當ス

呼吸ノ差一センチメートルハ八二三九〇瓦ノ體重及ヒ

二三、〇センチメートルノ身重ニ相當ス

歐洲ニ於テハ七十五立方センチメートル呼吸容量以下ノ者ハ通常兵士ニ編入セス澳國ノ兵制ニ隨ヘハ凡ソ兵士タル者ハ其胸廓ノ周圍半身ノ長サニ超ユル一乃至二ツォルナラサル可カラストシ又露國ニ於テハ甲ノ乙ニ超ユル一八センチメートルナラサル可カラストセリ

第九章 一分時間ニ於ケル呼吸ノ平均數

フオーゲル氏ニ從ヘハ就眠ノ嬰兒ニ在テハ一分時ノ呼吸數平均四十六、四ニシテ醒覺時ニハ大抵之ヨリモ多數ナリトス、一年ノ小兒ニ在テハ平均四十乃至四十四、五年ノ小兒ニ在テハ平均二十六、十年ニ至レハ平均二十、十五年ヨリ二十年ニ至ル迄ハ平均十八、二十五年ニ於テハ平均十四乃至十六度ノ呼吸ヲ爲ス

第十章 脉搏平均數

フオーゲル氏ニ從ヘハ就眠ノ嬰兒ニ在テハ一分時平均百九至ト爲ス(最小數九十二、最大數百三十六)而シテケレレハ左ノ脈搏平均數ヲ算出セリ(但シ安靜ノ狀態ニ在テハ其數必ス之ヨリモ減少スヘシ)

| | | | |
|---------|----------|----------|------|
| 一年ニ於テハ | 百三十至、 | 二年ニ於テハ | 百十至 |
| 三年ニ於テハ | 百〇八至、 | 五年ニ於テハ | 百〇三至 |
| 十年ニ於テハ | 九十一至、 | 十五年ニ於テハ | 八十二至 |
| 廿年ニ於テハ | 七十四至、 | 廿五年ニ於テハ | 七十二至 |
| 六十年ニ至レハ | 脈搏再ヒ増加シテ | 七十五至ニ昇リ、 | 更ニ高 |
| 齡ニ至レハ | 殆ント | 七十九至ニ達ス | |

呼吸ト脈搏トノ關係ハ二ト九トノ比例ニ在リ(即チ一呼吸

間ニ四、五ノ脈搏ヲ得ヘシ)

第十一章 分娩期預算法

出生ノ期日ヲ預定スルコトハ最後ノ月經ヲ得タル月日ヨリ三箇月ヲ減(還算)シ之ニ加フルニ七日ヲ以テスヘシ即チ最後ニ月經ヲ得タルノ月日ハ十月二十日ナリトスレハ之ヨリ三箇月(即チ七月二十一日迄)ヲ減算シ之ニ七日ヲ加ヘタル者ニシテ七月二十七日ナリ

第十二章 妊娠ノ鑑識(シュリョーデル氏ノ法)

第二月〇子宮ハ中等ノ橙實大ト爲リ肥厚且ツ硬固ナリ(雙手診)乳房ハ漸ク膨大シ乳量及白線較、暗色ニ變ス
第三月〇子宮底ハ兒頭大ニシテ柔軟、前腔穹窿部ニ於テ之ヲ觸知ス可シ、子宮腔部ハ稍、後方ニ向フ(雙手診)

第四月○子宮底ハ大人頭大ニシテ外部ヨリ之ヲ診スルニ
 既ニ恥骨縫際ノ上部ニ於テ觸知ス可シ
 第五月○子宮底ハ臍ト恥骨縫際トノ中間ニ於テ觸知ス可
 シ此月末ニ至レハ胎動及ヒ心音ヲ認メ得ヘシ屢分婉セル
 婦人ニ在テハ子宮ノ外口開哆シテ指ヲ送入スルヲ得ヘシ
 第六月○子宮底ハ臍ニ達ス
 第七月○子宮底ハ已ニ臍上二三指幅許ノ位置ニ達ス
 第八月○子宮底ハ臍ト心窩トノ中間ニ位ス此際腹ノ周圍
 ナ臍部ニ於テ測ルトキハ平均九十五センチメートルニシ
 テ恥骨縫際ト臍トノ中間ニ於テ測ルトキハ九十七センチ
 メートルニ居ル
 第九月○子宮底ハ心下ニ達シ子宮外口ハ初妊ノ婦人ニ於

テモ亦開哆ス

第十月○子宮下降シテ底部ノ位置ハ猶ホ第八月ニ於ケル
 カ如ク又前方ニ傾斜ス臍部ニ於テ腹ノ周圍ヲ測ルキハ平
 均九十九センチメートルニシテ其下方ニ於テハ百センチ
 メートルニ至ル

第十三章 齒牙

乳齒(二十枚)ノ生スル順序ハ通常左ノ如シ

- 二枚ノ中央下切齒 第四月ヨリ第七月ノ間ニ生ス
- 四枚ノ上切齒 第八月ヨリ第十月ノ間ニ生ス
- 四枚ノ第一臼齒第一臼齒 第十二月ヨリ第十五月ノ間ニ生ス
- 二枚ノ外側下切齒 第十八月ヨリ第二十四月ノ間ニ生ス
- 四枚ノ犬齒

四枚ノ第二臼齒^{第二}第三十月ヨリ第三十六月ノ間ニ生
 ス五年或ハ六年ニ於テ四枚ノ第三臼齒^{第一}第一碎齒ヲ生ス
 ルト同時ニ齒牙ノ交換ヲ始ム第十二年迄ニ四枚ノ第四
 臼齒^{第二}第二碎齒ヲ生シ二十年或ハ仍ホ後年ニ於テ第五臼
 齒^{智齒}智齒ヲ生ス是故ニ顎ノ各半邊ニ存スル者ハ二枚ノ切
 齒一枚ノ犬齒二枚ノ嚙齒^下下ナル者ハ一根上ナル者ハ内
 外二根ヲ有ス三枚ノ碎齒^下下ナル者ハ前後二根上ナル者
 ハ二箇ノ外根一箇ノ内根ヲ有ス智齒ニ於テハ屢一根ニ
 融合スナリ

第二篇

強壯藥、興奮藥、麻醉藥ノ通用處方

強壯、興奮、麻醉ノ三藥ハ各般ノ病患ニ對シテ之ヲ應用ス
 ルト頗ル多般ナルガ故ニ本文各病ノ下ニハ只強壯藥等
 ノ目ヲ掲クルノミニシテ一々其處方ヲ示サズ茲ニ最モ
 汎シ實際ニ行ハル、已上各藥ノ處方ヲ列載シ以テ讀者
 ノ撰擇ニ供ス

第一章 強壯藥ノ處方

強壯藥トシテハ規那、鐵、肝油、苦味藥、百弗聖等ヲ用ユ

○規那煎八〇乃至一五〇(二〇〇) 單舍利別一五〇

右每二時一食匙

○規那酒二〇〇〇

右用法同上

- 硫酸規尼涅一、五 甘草羔 甘草末各適宜 右
- 三十九ト爲シ一日三回一丸
- 還元鏡 硫酸規尼涅各一、五 甘艸羔 甘草末各適宜 右三十九ト爲シ一日三回一丸
- 乳酸鏡 鹽酸聖古尼涅各四、〇 甘草羔 甘草末各適宜 右六十九ト爲シ一日三回一丸或ハ二九
- 硫酸鐵一五、〇 酸化倫偏涅叟謨二、五 偏里設林適宜 右九十九ト爲シ一日三回一丸乃至二九
- 乳酸鐵五、〇 規那越幾斯一〇、〇 右百五十九ト爲シ、桂皮末ヲ以テ衣トシ、一日三回二乃至五丸
- 林檎鐵丁幾適宜 右一日三回、二十滴
- 林檎鐵丁幾二〇、〇 亞砒酸加留謨液五、〇 右一

日三回十五滴(此處方ハ、其病況ニ隨ヒ、砒石劑ヲ要スル時ノミ注意シテ應用スベシ)

- 可溶鐵液適宜 右一日三回五滴 可溶鐵液即チ參別元養氏著、製劑捷覽ニ詳ナリ就テ見ルヘシ
- 鐵酒一〇〇、〇 右一日三回、一食匙
- 還元鐵五、〇 亞砒酸〇、三 龍膽越幾斯適宜 右混和百九トナシ一日二三丸
- 鐵飴煎一〇〇、〇 右用法同上
- 含糖酸化鐵三、〇 重炭酸那篤留謨五、〇 右十包ニ分チ一日三回一包
- 乳酸鐵 枸橼油糖 白糖各三、〇 右十包ニ分チ一日二回一包

- 沃度化鉄舍利別一五〇 單舍利別五〇〇 右一日三回、半乃至一食匙(其病況ニ隨ヒ、沃度劑ヲ要スル時ニ應用スベシ)
- 肝油適宜 右一日三回、乃至四回、一食匙
- 苦味丁幾適宜 右一日三回二十滴
- 番木鱉丁幾一〇〇 苦味丁幾二〇〇 右一日三回、十五滴
- 龍膽浸(一〇〇)一八〇〇 橙皮舍利別一五〇 右每二時、一食匙
- 含糖百弗聖二〇 稀鹽酸一五 水一八〇〇 右每食後、二食匙
- 百弗聖酒適宜 右每食後、一食匙

第二章 興奮藥ノ處方

興奮藥トシテハ麝香、樟腦、依的兒精、亞爾箇保爾劑、安母尼亞劑等ヲ用ユ

- 麝香〇〇五 白糖〇五 右數包ヲ作り、一日數回一包
- 麝香 樟腦各〇〇五 白糖〇五 右同上
- 樟腦〇一乃至〇二 白糖〇五 右同上
- 樟腦二〇 阿列布油一〇〇 右一日數回、一筒、皮下ニ注射ス
- 依的兒精(即チ忽布滿鎮痛液)適宜 右一日數回、二十滴
- 依的兒適宜 右一日數回二十滴、糖水ニ和シ服ス

○依的兒適宜 右一日數回、半筒乃至一筒、皮下ニ注射ス

○甘硝石精適宜 右一日數回、二十滴

○「コンニヤク」(即チ上品ノ燒酒^{ブランデー})適宜 右一日數回、半

乃至一茶匙、糖水ニ和シ服ス

○「ポルト」酒又ハ設^{セリ}利酒六〇、〇 單舍利別一五、〇

右一日數回ニ分服ス

○赤葡萄酒一〇〇、〇 單舍利別一〇、〇 右用法同上

○良好ノ日本酒一〇〇、〇 右用法同上、已上酒類ハ總

テ患者ノ酒量ニ隨ヒ、適宜ノ増減ヲ爲ス、アアルヘシ

○炭酸安母紐謨 白糖各五、〇 右十五包ニ分チ、オ

ブライトニ包ミ、毎二時、一包

○炭酸安母紐謨〇、五 樟腦〇、一二 白糖一、〇

右一包ト爲シ、一日數回、一包

第三章 麻醉藥ノ處方

麻醉藥トシテハ、阿片、鹽酸莫兒比涅、抱水格魯刺爾、別刺敦那、非沃斯、苦扁桃水、老利兒結爾斯水、貌羅謨化加留謨等ヲ用ユ

○阿片〇、〇三乃至〇、一 白糖〇、五 右一包ト爲シ、一

日一回若クハ數回、一包

○挖物兒氏散〇、三 右同上

○阿片越幾斯〇、〇五 甘草羔 甘草末各適宜

右一丸ト爲シ、一日一回若クハ數回、一丸

○阿片丁幾適宜 右二十滴頓服(或ハ毎二時、五滴)

○舍電華謨阿芙蓉液適宜 右用法同上

- 鹽酸莫兒比涅 〇〇五乃至〇〇一 白糖 〇五 右
- 一包ト爲シ、一日一回、若クハ數回、一包
- 鹽酸莫兒比涅 〇一 蒸餾水 五〇 右半乃至一筒
- 宛、皮下ニ注射ス
- 抱水格魯刺爾 一〇乃至三〇 餾水 亞拉昆亞護謨
- 漿各一五〇 右頓服
- 抱水格魯刺爾 二〇乃至四〇 貌羅謨化加留謨 六〇
- 水一八〇〇 右每二時、一食匙
- 別刺敦那越幾斯 〇一二 乳糖 二〇 右四包ニ分
- テ、一日四回、一包
- 非沃斯越幾斯 〇五 苦扁桃水 一〇〇 右一日數
- 回、五乃至十滴

- 鹽酸莫兒比涅 〇一 苦扁桃水 蒸餾水各一五〇
- 右一日數回、二十滴

第三篇

年齡用量比例表

年齡ニ比シテ藥物用量ノ多少ハ、現今尙ホガウピウス氏ノ舊則ニ據ルチ常トス、即チ二十歳ヨリ六十歳ニ至ル年齡ニ對スル用量ヲ本位ト定メテ一ト爲シ、幼若ノ者ニハ左ノ比例ヲ以テ之チ差畧スベシ

| | | | |
|--------|--------|---------|------|
| 一歳已下 | 至十五分ノ一 | 一歳ヨリ二歳 | 八分ノ一 |
| 二歳ヨリ三歳 | 六分ノ一 | 三歳ヨリ四歳 | 四分ノ一 |
| 四歳ヨリ七歳 | 三分ノ一 | 七歳ヨリ十四歳 | 二分ノ一 |

十四歳ヨリ二十歳三分ノ二
 而シテ六十歳已上ノ年齢ニ於テモ漸次ニ本位ヨリ減却シ
 四分ノ三、三分ノ二、二分ノ一、等ノ比例ヲ以テスヘシ

第四篇

劇毒藥極量表

但シ本書ニ収載セ
ル藥物ノミヲ掲ケ

| 藥名 | 一回ノ極量 | | 一日ノ極量 | |
|----------|-------|---------|-------|--------|
| | 瓦蘭謨量 | 凡量 | 瓦蘭謨量 | 凡量 |
| 亞砒酸 | 〇、〇〇五 | 大約十二分凡二 | 〇、〇二 | 大約三分凡一 |
| 石炭酸 | 〇、一 | 同一凡半 | 〇、五 | 同七凡半 |
| 鹽酸亞刺莫兒比涅 | 〇、〇一 | 同六分凡一 | 〇、〇五 | 同四分凡三 |
| 苦扁桃水 | 二、〇 | 同三十凡 | 八、〇 | 同二凡 |
| 硝酸銀 | 〇、〇三 | 同半凡 | 〇、二 | 同三凡 |
| 硫酸亞篤魯必涅 | 〇、〇〇一 | 同六十分凡一 | 〇、〇〇三 | 同二十分凡一 |
| 貌羅謨化樟腦 | 〇、三 | 同四凡半 | 二、〇 | 同三十凡 |
| 樟酸攝留謨 | 〇、三 | 同四凡半 | 一、五 | 同二十三凡 |

| | | | | |
|---------|------|---------------------------|------|------|
| 咖啡涅 | 〇、二 | 同三氏 | 〇、六 | 同九氏 |
| 古魯聖篤實 | 〇、三 | 同四氏半 | 一、〇 | 同十五氏 |
| 硫酸銅 | 〇、一 | 同一氏半 | 〇、四 | 同六氏 |
| 硫酸銅 | 一、〇 | 同十五氏 <small>頓服</small> | | |
| 別刺敦那越幾斯 | 〇、〇五 | 同四分氏三 | 〇、二 | 同三氏 |
| 印度大麻越幾斯 | 〇、一 | 同一氏半 | 〇、四 | 同六氏 |
| 古魯聖篤越幾斯 | 〇、〇五 | 同四分氏三 | 〇、二 | 同三氏 |
| 非沃斯越幾斯 | 〇、二 | 同三氏 | 一、〇 | 同十五氏 |
| 阿片越幾斯 | 〇、一五 | 同二氏半 | 〇、五 | 同七氏半 |
| 番木鱉越幾斯 | 〇、〇五 | 同四分氏三 | 〇、一五 | 同二氏半 |
| 別刺敦那葉 | 〇、二 | 同三氏 | 〇、六 | 同九氏 |
| 實荳答利斯葉 | 〇、二 | 同三氏 | 一、〇 | 同十五氏 |

| | | | | |
|----------------------------|------|-------|-----|-------|
| 非沃斯葉 | 〇、三 | 同四氏半 | 一、五 | 同二十三氏 |
| 藤黃 | 〇、三 | 同四氏半 | 一、〇 | 同十五氏 |
| 古紐讓 <small>(矢鳩答)葉</small> | 〇、三 | 同四氏半 | 二、〇 | 同三十氏 |
| 刺苦丟葛留讓 | 〇、三 | 同四氏半 | 一、〇 | 同十五氏 |
| 昇汞 | 〇、〇三 | 同半氏 | 〇、一 | 同一氏半 |
| 赤色沃度化汞 | 〇、〇三 | 同半氏 | 〇、一 | 同一氏半 |
| 黃色沃度化汞 | 〇、〇五 | 同四分氏三 | 〇、二 | 同三氏 |
| 赤色酸化汞 <small>(赤降汞)</small> | 〇、〇三 | 同半氏 | 〇、一 | 同一氏半 |
| 結麗阿曹篤 | 〇、一 | 同一氏半 | 〇、五 | 同七氏半 |
| 抱水格魯刺爾 | 三、〇 | 同四十五氏 | 六、〇 | 同九十氏 |
| 亞砒酸加留讓液 | 〇、五 | 同七氏半 | 二、〇 | 同三十氏 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 | 同半氏 | 〇、一 | 同一氏半 |

| | | | | |
|----------|-------|--------|-------|--------|
| 巴豆油 | 〇、〇五 | 同四分八三 | 〇、一 | 同一八半 |
| 阿片 | 〇、一五 | 同二八半 | 〇、五 | 同七八半 |
| 磷 | 〇、〇〇一 | 同六十分八一 | 〇、〇〇五 | 同十二分八一 |
| 鉛糖(醋酸鉛) | 〇、一 | 同一八半 | 〇、五 | 同七八半 |
| 金硫黃 | 〇、二 | 同三八 | 一、〇 | 同十五八 |
| 剝度比爾林 | 〇、一 | 同一八半 | 〇、五 | 同七八半 |
| 鹽酸必魯加兒必涅 | 〇、〇三 | 同半八 | 〇、〇六 | 同一八 |
| 別刺敦那根 | 〇、一 | 同一八半 | 〇、四 | 同六八 |
| 珊篤寧 | 〇、一 | 同一八半 | 〇、三 | 同四八半 |
| 硝酸斯篤里幾尼涅 | 〇、〇一 | 同六分八一 | 〇、〇二 | 同三分八一 |
| 吐酒石 | 〇、二 | 同三八 | 〇、五 | 同七八半 |
| 蒔刺巴脂 | 一、〇 | 同十五八 | 三、〇 | 同四十五八 |

| | | | | |
|----------|-------|--------|------|--------|
| 別刺敦那丁幾 | 一、〇 | 同十五八 | 四、〇 | 同一字 |
| 錫答利斯丁幾 | 〇、五 | 同七八半 | 一、五 | 同二十三八 |
| 古爾矢屈謨丁幾 | 二、〇 | 同三十八 | 六、〇 | 同一字半 |
| 古魯聖篤丁幾 | 一、〇 | 同十五八 | 三、〇 | 同四十五八 |
| 實菱答利斯丁幾 | 一、五 | 同二十三八 | 五、〇 | 同一字十五八 |
| 沃度丁幾 | 〇、二 | 同三八 | 一、〇 | 同十五八 |
| 魯別里亞丁幾 | 一、〇 | 同十五八 | 五、〇 | 同一字十五八 |
| 舍電華謨阿芙蓉液 | 一、五 | 同二十三八 | 五、〇 | 同一字十五八 |
| 阿片丁幾 | 一、五 | 同二十三八 | 五、〇 | 同一字十五八 |
| 曼陀羅華丁幾 | 一、〇 | 同十五八 | 三、〇 | 同四十五八 |
| 番木鱉子丁幾 | 一、〇 | 同十五八 | 二、〇 | 同三十八 |
| 勿拉篤里涅 | 〇、〇〇五 | 同十二分八一 | 〇、〇二 | 同三分八一 |

| | | | | |
|--------|------|----------------------------------|-----|------|
| 古爾矢屈謨酒 | 二〇 | 同三十氏 | 六〇 | 同一号半 |
| 硫酸亞鉛 | 〇、〇六 | 同一氏 | 〇、三 | 同四氏半 |
| 硫酸亞鉛 | 一、〇 | 同十五氏 <small>吐劑 頓股</small> | 〇、三 | 同四氏半 |
| 纈草酸亞鉛 | 〇、〇六 | 同一氏 | 〇、三 | 同四氏半 |

第五篇

藥物量比較

第一章 瓦蘭謨氏比較表

| | | | | | |
|--------|--------|--------|------|---------|-------|
| 百二十分氏一 | 〇、〇〇五 | 四氏 | 〇、二四 | 百氏(五刃) | 六、二五 |
| 百分氏 | 〇、〇〇六 | 五氏 | 〇、三 | 五号 | 一八、七五 |
| 八十分氏一 | 〇、〇〇七五 | 六氏 | 〇、三六 | 五号半 | 二〇、七五 |
| 六十分氏一 | 〇、〇〇一 | 七氏 | 〇、四二 | 六号 | 二二、五 |
| 五十分氏一 | 〇、〇〇二 | 八氏 | 〇、五 | 七号 | 二六、二五 |
| 四十分氏一 | 〇、〇〇二五 | 九氏 | 〇、五五 | 八号(一号) | 三〇、〇 |
| 三十分氏一 | 〇、〇〇二 | 十氏(半刃) | 〇、六 | 十号 | 三七、五 |
| 二十分氏一 | 〇、〇〇三 | 十二氏 | 〇、七二 | 十六号(二号) | 六〇、〇 |
| 十五分氏一 | 〇、〇〇四 | 十三氏 | 〇、七八 | 十八号 | 六七、五 |
| 十二分氏一 | 〇、〇〇五 | 十四氏 | 〇、八五 | 廿号(二号半) | 七五、〇 |
| 十分氏一 | 〇、〇〇六 | 十五氏 | 〇、九 | 廿四号(三号) | 九〇、〇 |

第二章 瓦蘭謨名及ヒ用量名目表

| | | | | | |
|------|--------|---------|------|-----|-------|
| 八分氏一 | 〇、〇〇七五 | 十六氏 | 一、〇 | 三号半 | 一〇五、〇 |
| 六分氏一 | 〇、〇一 | 十八氏 | 一、一二 | 四号 | 一二〇、〇 |
| 五分氏一 | 〇、〇一二 | 二十氏(二刃) | 一、二五 | 四号半 | 一三五、〇 |
| 四分氏一 | 〇、〇一五 | 三十氏(半号) | 二、〇 | 五号 | 一五〇、〇 |
| 三分氏一 | 〇、〇二 | 三十二氏 | 二、一二 | 五号半 | 一六五、〇 |
| 二分氏一 | 〇、〇三 | 三十六氏 | 二、三六 | 六号 | 一八〇、〇 |
| 一氏 | 〇、〇六 | 四十氏(二刃) | 二、五 | 七号 | 二一〇、〇 |
| 一氏半 | 〇、一 | 五十氏(刃半) | 三、一二 | 八号 | 二四〇、〇 |
| 二氏 | 〇、一二 | 六十氏(一号) | 三、七五 | 九号 | 二七〇、〇 |
| 三氏 | 〇、一八 | 八十氏(四刃) | 五、〇 | 十号 | 三〇〇、〇 |

醫通附錄終

永坂周二訂

| | | | | | |
|------|---------|------|-----|------|--------|
| ミリ瓦 | 〇、〇〇一 | 千分一瓦 | 茶七 | 一号 | 四、〇瓦 |
| センチ瓦 | 〇、〇一 | 百分一瓦 | 半茶七 | 半号 | 二、〇瓦 |
| デシ瓦 | 〇、一 | 十分一瓦 | 食七 | 四号 | 一五、〇瓦 |
| 瓦蘭謨 | 一、〇 | 瓦蘭謨位 | 半食七 | 二号 | 八、〇瓦 |
| デカ瓦 | 一〇、〇 | 十瓦 | 酒蓋 | 凡ッ三号 | 一〇〇、〇瓦 |
| ヘクト瓦 | 一〇〇、〇 | 百瓦 | 茶碗 | 凡ッ三号 | 一〇〇、〇瓦 |
| キロ瓦 | 一〇〇〇、〇 | 千瓦 | 刀尖 | 半号 | 二、〇瓦 |
| ミリア瓦 | 一〇〇〇〇、〇 | 万瓦 | 小刀尖 | 一号 | 一、二五瓦 |

訂增醫通第四板正誤

| | | | | | | | |
|-----|----|------------------|-------------------|-----|----|------------|------------|
| 丁 | 行 | 誤 | 正 | 丁 | 行 | 誤 | 正 |
| 四 | 一一 | Pseud- 安息香〇.五 | Pseudo- 安息香一.五 | 一三六 | 一〇 | 膈壁 二三膜日 | 腹壁 二三日ヲ |
| 四一 | 一一 | 一包.五回 | 五回.一包 | 一三七 | 上欄 | 腹ヲ炎ヲ | 腹膜炎ヲ |
| 五三 | 五 | 齒部ノ | 其部ノ | 一三七 | 上欄 | Calica | Colica |
| 七一 | 九 | 蒸餾水五〇.〇 | 蒸餾水五〇〇.〇 | 一五一 | 六 | 候症 | 症候 |
| 七四 | 二 | 吐根末一.五 | 吐根末一.〇 | 一五六 | 上欄 | 温浴 | 温浴 |
| 八六 | 一 | ventri. culi | ventriculi. | 一五七 | 一〇 | Teri- | Peri- |
| 一〇九 | 三 | 硬固ナルニハ | 硬固ナルトキハ | 一五九 | 九 | 又水囊ヲ | 又水囊ヲ |
| 一二五 | 上欄 | Volvulus. | Volvulus. | 一六四 | 一〇 | cardis. | cordis. |
| 一二六 | 三 | Illens. | Illens. | 一六五 | 三 | 水片ヲ | 水片ヲ |
| 一二六 | 三 | | | 一六六 | 二 | | |

| | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|--------|
| 一七七 | 上欄 | 舟量 | 二四八 | 四 | 每二時一食匙 | 每二時一食匙 |
| 一八〇 | 上欄 | 左端ニ日射病症候ノ五字ヲ脱ス | 二六七 | 三 | 子宮 | 子宮 |
| 一八八 | 一 | 縮線ニ | 二七八 | 二 | 子宮腔内 | 子宮腔内 |
| 一九八 | 四 | Pharyn- | 三二〇 | 四 | 杜松實 | 杜松實油 |
| 二〇二 | 一〇 | 一〇・五 | 三二六 | 上欄 | 熱ハ發作 | 熱ハ發疹 |
| 二一五 | 七 | infantum. | 三五六 | 一 | 塞冷 | 塞冷 |
| 二二三 | 四 | 加留膜液 | 三六二 | 六 | 酸硝酸 | 酸硝酸 |
| 二二六 | 八 | 四回一包 | 三七四 | 一 | 十滿 | 十滿 |
| 二三一 | 九 | 一回四九 | 三八六 | 二 | 二倍 | 三十倍 |
| 二四五 | 三 | 每三時〇 | 四一四 | 四 | 〔信〕 | 〔人〕 |
| 二四七 | 一 | の列並底油 | 四一六 | 一 | 尼水 | 尼亞水 |
| 二四八 | 四 | 〇・二 | | | | |

訂增 醫通第四板正誤畢

明治十三年六月四日版權免許
 全 十五年十一月 第一版出版
 全 十六年十一月 第二版出版
 全 十九年一月 第三版出版
 全 二十年十月三日 第四版出版御届濟
 全 二十年十月 第四版出版

〔定價金壹圓八拾錢〕

編者兼出版人 醫學士 愛知縣士族 伊勢 錠五郎
 出版人 東京府平民 永坂 周二郎
 愛知縣士族 柴田 承桂
 神田區松枝町二拾三番地住
 半込區市谷加賀町二丁目拾番地寄留

東京發兌書肆 馬喰町二丁目 島村利勤
 本郷春木町二丁目 同支店
 日本橋通三丁目 丸屋善七

伊勢錠五郎同纂
柴田承桂

○臨床藥說

全一冊

定價金壹圓五拾錢

右ハ最近藥劑學ノ萃ヲ拔キ學生ノ備忘醫家ノ携帶ニ便宜ナル体裁ニ編纂シタル者ニノ多數ノ新藥ヲ網羅シ(一)(二)(三)等ト明瞭ニ件項ヲ分チテ種々ノ應用ヲ列記シ醫通及ヒ醫家十二要ト相待テ其用ヲ爲ス所ノ良書ナリ

伊勢錠五郎譯纂

○醫家十二要

全一冊

定價金八拾五錢

醫家殊ニ實地治療家ニ缺ク可カラサル十二項ノ要件即チ●体温驗測法●病床檢尿法●創傷療法●嘔嘔防護麻酔法●視力檢査法(視力表ヲ附ス)●耳科摘要●裁判上屍体檢式●結核バチルレン檢査法●虎列刺バチルレン檢査法●小兒營養品說●救急療法●假死回蘇法ヲ専門各家最新ノ學說ニ隨テ略述シ附スルニ日本著名諸續泉ノ分類及ヒ主治ヲ以テシ醫通及ヒ臨床藥說ト併立シ治療家ニ有益ナル三鼎足ヲナスノ書ナリ

ドクトル、ベルツ氏著 櫻村清徳閱 伊勢錠五郎譯

第三板 上中下三冊

定價金三圓九十五錢

内科病論

柴田承桂譯述

第四板

全一冊

定價金一圓五十錢

衛生概論

柴田承桂譯述

全一冊

定價金九十錢

顯微鏡用法

下山順一郎纂譯 柴田承桂校補

全一冊

定價金壹圓五十錢

檢尿法

飯盛挺三纂譯 丹波敬三 柴田承桂校補

上中下三冊

定價金三圓九十五錢

物理學

丹波敬三纂譯 下山順一郎校補

前後二冊

定價金二圓五十錢

無機化學

丹波敬三 下山順一郎 柴田承桂同譯

前後二冊

定價金二圓五十錢

有機化學

丹波敬三 柴田承桂 高橋秀松同譯

全一冊

定價金九十五錢

普通植物學

熊澤善庵 柴田承桂同纂

全一冊

定價金八十五錢

普通金石學

丹波敬三 柴田承桂同譯 高松數馬補輯
普通動物學 第三板 全一册 定價金一圓三十五錢

新宮涼園 武昌吉 柴田承桂同纂
獨逸醫學辭典 全一册 定價金一圓四十錢

榑村清德 編纂
伊勢錠五郎 編輯
柴田承桂 補輯

○日本藥局方隨伴 全二册 正價各金九拾五錢

日本藥局方ハ藥劑ノ品性ヲ示スカ爲メ發布相成リタル重要ノ法則ニシテ其性質、製法、試法等ヲ明示セラレタルモノナレドモ各藥ノ主治効用ニ至テハ固トヨリ該方ノ記載スヘキ限リニアラス故ニ本書ニ於テハ藥局方各條ノ全文ヲ掲ケタル上毎條ノ下該藥ノ主治効能用法用量等ヲ精密ニ記載シ加フルニ歐米各國局方トノ比較、本文中要點ノ參釋及ヒ必要ノ畫圖ヲ以テシ、其他生藥ノ產地、基源、成分、化學藥ノ化學記號及ヒ化學上性質及ヒ各藥獨英佛ノ通名ヲモ収載シタル完全ノ書ナリ

勝山忠雄譯補 柴田承桂校閱
調劑要術 第三板 全一册 定價金壹圓

終