


時方妙用

福建中医学院图书馆

地址：福州市榕兜



時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

單 脹

疫 脹

臌脹

咳嗽

噎隔

反胃

喘促

哮症

心腹諸痛

痛風

痺

腰痛

卷三

血症

癲狂癇

消渴

傷食

瘡疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

瘰癧

眩暉

眼目

耳聾

疝氣

瘻

泄瀉

卷四

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋癃閈

遺精

赤白濁

汗症自汗
盜汗

怔忡驚悸健
志治同

婦人科

傷寒科

詩方妙用卷二

閩吳航陳念祖修園甫著

男元豹道履古愚全梭字

元犀直照靈石

腫腫者皮膚腫大也。脹者心腹脹滿也。
腳者心腹痞滿而四肢瘦小。昔人謂之盛脹。或心眼脹滿外寃中害其氣如鼓。昔人謂之藏脹。茲分為二門。

腫症從來有氣腫水腫之辨。判經以按之宵而不起者為氣。即起者為水。後醫多反其說。然氣滯水亦滯。水行氣亦行。正不必分總以

不起為腫甚。即起為腫輕。腎囊反壅中腫大。
多死。

脉本沉。若浮而弦宜發汗。若浮而鼓
指有力宜越脾湯。若浮在皮外多死。
若沉而緊宜麻黃細辛附子之類。若沉
而緩易愈。若沉而微細宜溫補。

初起面上微腫。兩目下名臥蚕。更腫些。一
覺重滯微喘。小便不利。即腫症之漸宜。

香蘿飲。加杏仁防風各三錢。_{五寸}

如皮膚腫大氣喘小便不利宜。

五皮飲。上腫宜發汗。加蘿蔔防風杏仁各三錢。下腫宜利水。加猪苓防己各二錢。木通一錢。小水多為陰水。加附子乾薑各二錢。白朮三錢。川椒木香各一錢。小便不利為陽水。加防己。諸苓知母各二錢。凡脉虧人羸。宜加白朮。人參。肉桂。附子。脉寢人健。

加萊菔子枳殼各二錢。凡畏風之甚宜加
生黃芪三四錢或再加附子二錢八十
如小便點滴俱無氣喘口不渴宜

滋腎丸四十九

如前藥不效。宜用濟生腎氣丸藥料作湯服。
或前症愈後亦以此丸服一月收功。

濟生加減腎氣丸一百

如服利水之藥而小便愈少者宜

補中益氣湯。首煎常服。二煎服後。以手

指探吐五

愚按水腫病淺者。照上法治之愈矣。深者必遵金匱五水而治之。余著有金匱淺註頗有發明。風水由於外邪。法宜發汗。皮水者。外邪已去。經而入皮。故不惡風。病在皮間。故內不脹。而外如鼓。皮病不涉于內。故口不渴。然水在于皮。亦必從汗以泄之也。石水病在臍下。

陰邪多沉于下法用麻黃附子甘草湯重在
附子以破陰也。黃汗者外邪傷心鬱蒸成黃
胸滿四肢頭面俱腫病在于上法用桂枝湯
加黃芪啜熱粥以取微汗重在桂枝以化氣
尤賴啜粥取汗以發內外交癧之邪也。唯正
水一症正內經所謂三陰結謂之水症結則
脉沉水屬陰則脉遲三陰結則下焦陰氣不
復與胸中之陽相調水氣格陽則為喘其目

窠如蚕一身盡腫可知。金匱之論甚精。徐忠可之註甚妙。試節錄之。金匱云。寸口脉浮而遲。浮脉則熱。遲脉則潛。熱潛相搏。名曰沉趺陽。脉浮而數。浮脉即熱。數脉即止。熱止相搏。名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉則脉絡虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。即為水矣。徐忠可註云。此段論正水之由也。謂人身中鍛運不息。所以成雲行雨施之用。故人之汗以失。

地之雨名之人之氣以天地之疾風名之寸口脉主上猶之天道必下濟而光明故曰陰生于陽趺陽脉主下猶之地軸必上出而旋運故曰衛氣起于下焦今寸口脉浮而遲浮主熱乃又見遲者元氣潛于下也既見熱脉又見潛脉是熱為虛熱而潛為真潛故曰熱潛相搏名曰沉言其所下濟之元氣沉而不復舉也今趺陽脉浮而數浮主熱乃又見

數數者衛氣止于下也。既見熱脉又見止脉。是於客氣為熱而真氣為止故曰熱止相搏。名曰伏。言其宜上出之衛氣伏而不能升也。從上而下者不返而終沉從下而上者停止而久伏則旋運之氣幾乎熄矣。熄則陰水乘之。故曰沉伏相搏。名曰水。見非止客水也。又恐人之不明乎。沉伏之義。故又曰絡脉者陰精陽氣所往來也。寸口陽氣沉而在下則絡。

脉虛。小便者水道之所從出也。趺陽真氣上而在下。氣有餘即是火。火熱甚則小便難于。是上不能運其水。下不能出其水。又焉能禁水之胡行亂走耶。故曰虛難相搏。水走皮膚即為水矣。水者即身中之陰氣合水飲而橫溢也。沉伏二義俱於浮脉見之。非真明天地升降陰陽之道者。其能道隻字耶。此仲景所以為萬世師也。徐忠可此註妙不可言。獨惜

仲景不立方。忠可又不補出。應用何方。致世之患此者。或死于庸醫之舟車丸。神佑丸。蹠鑿飲子等方。或死于明醫之實脾飲。濟生腎氣丸。補中益氣湯。導水茯苓湯等方。以挺與刃。余不忍坐視而不救。故擬方于後。

消水聖愈湯 治水第一方。然必兩手脉浮而遲。足趺陽脉浮而數。診法絲毫不錯。一服即驗。五服全愈。否則不可輕用此秘方。

也。大道無私。方不宜秘。然黃帝有蘭臺之藏。長桑有無泄之戒者。一恐輕試之誤。一恐洩天地之機也。余出此方以俟一隅之反。非謂一方可以統治斯病也。

天雄一錢 紅桂二錢 細辛一錢 麻黃一錢
甘草一錢 生薑二錢 大棗二枚 知母三分
水二杯半。先煎麻黃去沫。次入諸藥煮八分服。日夜作三服。當汗出如蟲行皮中。

即愈。水盛者加防已二錢。

天雄補上焦之陽而下行入腎猶天道下濟而光明而又恐下濟之氣潛而不返故取細辛之一莖直上者以舉之牡桂煖下焦之水而上通於心猶地軸之上出而旋運而又恐其上出之氣止而不上故取麻黃之走而不守者以鼓之人身小天地唯健運不息所以有雲行雨施之用若潛而不

返則氣不外濡而絡脉虛故用薑棗甘草化氣生液以補絡脉若止而不上則氣聚為火而小便難故以知母滋陰化陽以通小便且知母治腫出之神農本草經而金匱治歷節風脚腫如脫與麻黃附子並用可以比例而明也此方即仲景桂甘薑棗麻辛附子湯加知母一味主治迥殊可知經方之變化如龍也

一野老某年八旬有奇傳予奇方用生金櫻
根去粗皮一兩半吳風草三錢香茵極小
團結者七枚水煎服一服小便即通而腫
愈○余細繹此方極妙麻黃大發汗而根
又能止汗橘肉生痰壅氣而皮又能化痰
順氣蠶因風而致殼反能驅風如神此大
開大閨之道金櫻子之大澁小便即可悟
其根之大通小便矣吳風草原名鹿啣草

能除濕熱。故素問與澤瀉白朮同用以治酒風。更妙是小香茵一味。此物本濕熱所化。用之于除濕祛熱。墮中同氣相感。引藥力。至於病所。而諸藥之性一發。則濕熱無餘地。以自藏。俱從小便而下矣。此必異人所授。遺下所謂禮失而求諸野也。惜余未試。

心腹脹滿甚者宜

脹此症與腫症相因者。宜以治腫之法治之。或內脹而外不腫者。治法稍異。

平胃散為主氣薑加麥芽香附各二錢傷食者加萊菔子山楂乾薑傷酒加甘草三錢砂仁一錢痰多加茯苓三四錢多嘔加半夏生薑各三錢胸上脉不橫通而脹加木通茜草麥冬桔梗貝母濁氣在上加柴胡半夏桔梗心下痞滿加黃連黃芩各一

錢乾薑八分腹痛加生白芍三錢腹痛因
大便不通者再加大黃二錢小便不通合
五苓散若貼臍左右上下脹者脹必兼痛
為衝脉逆而不舒去蒼朮加紅花歸芍柴
桂治之若季脇兩旁兼小腹脹痛者乃厥
陰內不交于少陰外不合于少陽加柴胡
人參半夏桂枝當歸治之入守
腹脹喜按者宜後四方

附子理中湯

一百
寒上

○
症寒

補中益氣湯

五
○

脾土失職
地氣不升

六君子湯加乾薑

二
○

脾虛痰
多腹脹


香砂六君子湯

三

愚按已上諸法治而不應者必以膀胱為主。喻嘉言云人身胸中空曠如太虛地氣上而為雲必天氣降而為雨地氣始收藏不動誠會上焦如霧中焦如漚下焦如瀆之意則雲

行雨施而後溝瀆皆盈水道通決乾坤有一
番新景象此義首重膀胱一經經云膀胱者
州都之官津液藏焉氣化則能出矣如人之
飲酒無算而不醉者皆膀胱之氣化而出也
膻中位于膈內膀胱位于腹中膀胱之氣化
則空洞善容而膻中之氣得以下運若膀胱
不化則腹已先脹膻中之氣安能下達耶然
欲膀胱之氣化其權在子模腎腎以膀胱為

肺者也。腎氣動必先注于膀胱。屢動不已。膀胱滿勢必連于胸膈。其窒塞之狀不可名言。腎氣不動。則收藏愈固。膀胱得以清淨無爲。而膻中之氣注之不盈矣。膻中之氣下走既捷。則不為牽引所亂。而胸中曠若太空矣。此論可為胸腹滿及痰飲症之金針。



臌症

臌症多是氣虛中滿。誤服枳朴寬脹之藥所致。屬實者少。屬虛者多。

臌症屬實者。其來必暴。有氣血飲食寒熱蟲之別。辨症詳於心腹九種之中。唯飲氣兩脇痛。有水氣。或嘔清氷。宜後三方酌其虛實。加減用之。

備急丸

五十

三

五積散四十

平胃散加減。照前血。膩加川芎。桃仁。蟲。去甘草。~~加黃連。~~榧子。乾薑。或另服烏梅丸。

四十九日

腋病屬虛者。其來必漸。若氣喘水氣盛者。宜黑錫丹。若腹大如箕。四肢消瘦。初因吐酸而起。後吞吐皆酸。宜附子理中丸。加黃連。若單腹脹。初服却奪之藥少效。久用增脹硬如鐵。

石昧者見之方謂何物邪氣若此之盛自明
者觀之不過為猛藥所攻即以此身之元氣
轉與此身為難首如驅良民為寇之比喻嘉
言治有三法一曰培養宜术附湯加乾薑陳
皮一曰招納宜補中益氣湯加半夏一曰攻
散宜桂甘薑棗麻細附子湯金匱枳术湯三
法分用互用可以救十中之三四

术附湯

一百零五

補中益氣湯

五

桂甘薑棗麻辛附子湯

金匱枳朮湯

俱出金匱
方載醫訣

外有血臌症。醫書俱云是婦人之病。唯喻嘉言謂男子恒有之。面色痿黃。有蟹爪紋。路脉雖虛極。而步履如故。多怒。善忘。口燥。便秘。胸緊。脇脹。腹疼。迨脹之既成。腹大如箕。遂不可救。東南最多。所以然者。東海擅魚鹽之饒。魚

者甘美之味多食令人熱中。塗者鹹苦之味其性偏於走血。血為陰象。初與熱合不覺其病。日久月增。中焦冲和之氣亦漸為熱矣。氣熱則結。而血不流矣。于是氣居血中。血裏氣外。一似婦人受孕者然。至彌月時。腹如抱甕矣。推而言之。凡五方之膏梁厚味。椒薑桂醬成熱中者。皆其類也。治之之法。以六君子湯料加乾薑川芎防已為末。以陳米荷葉煎湯。

泛九。每服三錢。日兩服。夜一服。一月漸愈。此執中央以運四旁法也。

六君子湯

二

腫脹症。以疏鑿飲子。舟車丸為禁劑。濟生腎氣丸。脹症亦須慎用。

噎膈反胃

食不得入。昔醫名噎食。雖入咽即帶痰涎吐出。為膈。朝食暮吐。暮食朝吐。名翻胃。丹溪主血液俱耗。噎為上稿。膈為下稿。以四物湯加甘蕉汁。蘆根汁。牛乳之類為主。薛立齋謂怫鬱傷肝。以逍遙散。左金丸。歸脾湯。六君子湯之類。與六八味丸間服。趙養葵充其說。而歸於治腎。以內經謂腎乃胃之關。關門不利。升。

降息矣。關即氣交之中天之經也。故腎旺則胃陰充。胃陰充則能食。以大劑六味湯八味湯為主。時賢高鼓峰楊乘六宗其法而變通之。專取陽明以六味湯去丹澤茯苓加甘草。枸杞生地當歸總使一派甘潤之藥以養胃陰。胃陰上濟則胃門寬展而飲食進。胃陰下達則幽門開門滋潤而二便通。十餘劑可愈人鏡經主內經三陽結謂之隔。一語大變其

法以隔食之人。五七日不大便。陳物不去。則
新物不納。以三一承氣湯。節次下之。後用芝
麻飲啜之。則愈。此數法皆從金匱大半夏湯。
中甘瀉蜜水得來。而却遺去。仲景以半夏為
主。而降衝脈之逆。人參為輔。而生既亡之液。
之義學者。必於此而得其悟機。而又審其寒
熱虛實而施治。則於噎膈之道。思過半矣。至
於食入反出。是中焦土寒。下焦火虛。以附子

理中湯。香砂六君子湯加乾薑。八味地黃丸。
間服多效。若食不得入。必以黃連黃芩人
參乾薑湯為主。瀉心湯亦妙。瘀血在膈飲
熱湯及食椒薑而呃者。宜加桃仁紅花之類。
○吳茱萸湯。不論噎膈反胃皆可用。唯以嘔
而胸滿為的證。乾嘔吐涎沫頭痛亦為的證。
脈浮緩而滑。沉緩而長皆可治。弦牆短小
為難醫。

藥方

四物湯

九道遙散

四十

左金丸

八十歸脾湯

二十六君子湯

二六味丸

四十八味丸

五十三

一承氣湯

五十附子理中湯

一百

香砂六

君子湯

三

治噎膈奇方

牛犬二灰散。不拘黃牛水牛。但遇有狗放尿
於牛屎上。連二屎共取和匀。候乾封固。每用

蝦灰存性三錢以好苦酒調服後用真雲南
基子一枚男以白的女以黑的搗研極細仍
用苦酒燉濃服之

甘蔗飲取甘蔗去皮切錢磁碗乘白米此步
以水潤透米將蔗錢放米內仍用磁碗蓋定
慢火蒸熟成飯先取蔗錢與本人徐徐嘴咽
蔗汁漫開喉嚨即食此飯為開膈之第一方
即審症議藥○一灰散不易得先用此法即

以黑白碁子繼之。再審症用藥以收全功。
一膈症湯飲不入口。鍼合穀穴亦可開通。

治翻胃奇方

斗門方。用附子一箇。最大者。以開水候溫和。
入附子。泡去鹽。一日。
二換湯。泡三日。取晒。坐於燉上。四面著火漸
逼碎。入生薑自然汁中。又依前火逼乾復淬
之。約生薑汁盡半碗許。搗羅為不用粟米飲
下一錢。不過三服瘥。

續論

膈噎症古今方法最繁遵之亦不甚驗已上論治未免太簡恐初學者領悟不來正欲續論以暢其旨適友人自安徽來遺予以張心在附經一書檢閱之下深喜其讀書有得可與共學適道也雖識荆侯諸異日而數千里神交不啻同堂時晤對請即以附經之原文演為問答未知心在以為

然否。

問曰。噎膈初起。有食入打倉。而因不能下咽者。肺氣上逆。會厭不及蔽。而氣喉為之病。當用何藥。余曰。治以枇杷葉。百合。天門冬。半夏。阿膠。甘草。令治節行。則逆者順矣。然必佐以乾薑之開。五味子之闔。細辛之撓動神機。全咽喉二竅。得順其出入之常。遂無嗆逆之患。非熟於仲景書者。不悟也。問曰。有食下如刀

勞草勒。胸痛畏食者。胃之上口內腫。而食管
為之不利。當用何藥。余曰。金銀花。蒸膏。以米
飲調下。常服。或白水牛喉焙乾。研末。佐之。以
金銀花能止痛消腫。且味甘而質潤。可滋胃
脘之陰。性寒而氣香。又除鬱熱之閉也。問曰。
每食必以飲送下者。胃中之氣不上吸。故食
不能自下。若非飲送。即見阻滯。應用何藥。余
曰。胃氣不能上吸。非人參之助胃。不可得食。

阻滯非甘潤水和白蜜之潤下不可。且其呻
滯者衝脈之為病。非半夏不能降。衝脈之逆。
仲景大半夏湯甚妙。問曰：有將食時必飲酒
而後能食者。胃氣鬱塞不開。得酒之慄悍而
始通。應用何藥？余曰：宜平胃散料加香附麥
芽半夏乾薑白豆蔻沙參川芎入羊肚內蒸
熟晒乾。又易羊肚如前法三次去羊肚為末。
以陳米湯送下三錢。日二服。以辛藥開結以

香藥醒脾而製法之妙化其霸氣方不傷其陰氣經云陰者中之守也此方頗為合度問曰有肝逆膽橫小絡相阨兩脅時痛食入不犯肝膽之絡則下犯其小絡則土受木制不能納穀而因吐者病由木鬱而土因之亦鬱應用何藥余曰宜用小柴胡湯遵原定分數折為小劑柴胡四錢半夏湯洗七次不可用
錢五分大棗一粒人參一錢甘草一錢生薑各一
二個水煎加紫蘇旁小梗整用生竹茹各

二錢橘皮內筋膜當歸鬚各一錢補虛清火
解鬱通絡配合得法則各藥相得而益彰自
不同他方之泛泛也。問曰有胃火自盛食入
則吐逆不已者應用何藥余曰食物不得入
咽是火阻於上宜用黃連黃芩之大寒以瀉
之大苦以降之更用人參以助胃俾胃喜於
納食而急迎之入內然必用乾薑大辛大熱
衝開其關方無拒格之意四味等分煎服仲

景得意之方也。如食既入咽隨即吐出是胃素有熱一得食物為兩熱相衝不能停留而即出宜大黃四錢甘草二錢為釜下抽薪之法此與黃連黃芩乾薑人參湯均是苦寒之劑而毫釐有千里之差況寒熱之相反乎。問曰有朝食暮吐完穀不化必噴囊倒篋盡淨無存而後快者則食久反出無火之謂也應用何藥余曰此症用溫補法人人共知每服


之而不效者有故當辨其為中焦無火與下焦無火。中焦無火有二。在陽明則胸滿。宜吳茱萸湯。在太陰則腹滿。宜理中丸。又恐此丸之過甘。則甘草不妨減半。恐其功之過緩。不妨加入草撥附子。吳茱萸半夏茯苓之類。勿泥定成法也。下焦無火亦有二。在厥陰則吐食而兼酸腐。亦宜吳萸湯。又以川椒乾薑肉桂。吳茱萸附子。當歸川練子。人參沙參研末。

棗湯泛丸。米飲送下三錢。一日二服。在少陰。
則吐食而兼水液。宜真武湯倍生薑。或以半
門方峻補之。愈後宜腎氣九味桂附以收功。
又問已上諸症未至于槁。皆足以致槁。至口
吐白沫。便如羊矢。津液枯竭。營衛不行。五臟
不通。則食全不入。而病不可為矣。未知先生
尚有法可以救之否。余曰。津液即是真水。水
由氣化。亦由火致。推其所以枯竭之故。非氣

虛不能化之即火虛不能致之也今人不明其理以滋潤甘涼爲生津養液實所以涸津液之源而速其死仲景云乾嘔吐涎沫吳茱萸湯主之雖非爲噎膈症立論而聖言無所不包少陽症火逆於上其嘔有聲而不吐穀名爲乾嘔若不吐穀而但吐涎沫名爲乾嘔吐涎沫此症食全不入無穀可吐亦是乾嘔例津液生於穀氣絕食則津液已枯又吐出

。涎沫則津液遂竭盡無餘所以不能下滋腸。
胃糞如羊矢唯吳茱萸一湯大辛以開其格。
大苦以鎮其逆大甘以培其中且辛從甘以
化陽苦從甘以化陰陰陽和而時雨降頃刻
間有萬里沃澤之景象矣况又佐以人參之
大生津液並以馴諸藥之性宜其為起死之
靈丹也至於停痰瘀血阻塞胃口致食入之
路滯碍者為有餘之症諸家之說不無可採

母庸修園之再贊也。經又有上氣下重之症。
治以驟馬尿而未愈者似可以烏梅丸繼之。
言不盡意亦視乎人之善惡而已。



10

痰飲

水氣上逆。得陽煎熬。則稠而成痰。得陰凝聚。則稀而為飲。皆以脾腎二經為主。以水歸於腎。而受制於脾也。金匱以痰飲。懸飲。溢飲。支飲。分四飲。後人加留飲為五飲。不知留飲即痰飲也。唐宋以後。名色愈多。而治法愈亂。茲舉數方為扼要之法。

凡痰脈多應於滑。脈沉而弦者主懸飲。

內痛

一痰飲諸方以二陳湯為通劑茲加減法做
金匱之意故取效倍於諸家

二陳湯

八十

久嗽氣短加桂枝一錢五分白朮二錢此
從水道以化氣也或與腎氣丸互服停飲
胸痛加白芥子一錢五分前胡二錢

四肢腫身體疼重加生黃芪三錢防已二

錢。

欬逆倚息氣短不得卧。加木防已三錢桂枝人參各一錢五分水煎好入芒硝八分服。

心下有支飲。其人苦眩冒。加澤瀉四錢白朮二錢。

咳嗽不已。加乾薑細辛五味子。

已上俱做金匱意加減。

火痰。加海粉、瓜萎仁、黄芩、海石。○寒痰。加乾薑附子。○風痰。加製南星、天麻、竹沥、薑汁。○燥痰。加天冬、玉竹、瓜萎仁。○濕痰。加白术、蒼术。○鬱痰。加川芎、貝母、香附、連翹。○虛痰。加人參、白术。○實痰。加旋覆花、枳實。○食痰。加萊菔子。

二 實熱老痰。變出怪症。不可名狀。宜

礞石滾痰丸。

六十

一中腕留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉步
宜

指迷茯苓丸六十

四十

按痰飲之病最多。胸脇疼嘔逆。神識不清。
及手足臂痛。皆是大抵痰為陽邪。隨氣所
到。其症變幻無常。凡苦辛酸鹹及竹瀝薑
汁童便皂角芒硝之類。隨症可加入。亦有
虛者。宜六君子湯。桂苓甘朮湯。腎氣丸。真

武湯。小半夏倍加茯苓湯等。以扶元氣。僥
為陰邪。唯停于心下。脇下為脹。為咳。為悸。
為眩。胃及溢於皮膚而為腫。必以桂苓术
附。加生薑汁之類。使離照當空。而群陰方
能退避。若以地黃麥冬五味附和其陰。則
陰霾冲逆肆空飲邪滔天莫救矣。

咳嗽

咳嗽症方書最繁。反啓人多疑之惑。其實不外

虛實二症。實者外感風寒而發。虛者內傷精氣而生也。總不離乎水飲金匱。以小青龍湯加減五方。大有意義。小柴胡湯自註云。咳嗽去人參加乾薑五味子。人多順口讀過。余於此悟透全書之旨。而得治咳嗽之秘鑰。因集溢未詳。大為恨事。向著有金匱淺注等十種言之。不厭於複業斯道者。請鑒予之苦心焉。

實症方

一外感風寒。內挾水飲。必咳嗽不已。兼見頭
痛發熱惡寒等症。若外感重者。宜香薷飲。
加杏仁防風各二錢。牛夏乾薑各一錢五
分。五味子搗扁細辛各八分。水煎服溫覆。
取微汗。外感輕者。宜二陳湯。加細辛乾薑
五味子杏仁前胡。若二症面目浮腫。俱
加桑白皮三錢。荳蔻子八分。微炒研末調
服。

香蘿飲三十

二陳湯五八十

一外感風寒。咳嗽頗久。每晚兩脇牽痛。發熱者。或寒熱往來者。宜。

逍遙散倍柴胡加半夏乾薑各一錢半。五味子一錢。四十八。

一夏月傷暑咳嗽。自汗。口渴。小便赤短。宜。

六一散滑石六錢。甘草一錢。加乾薑。細辛。

五味子各一錢水煎服。五十

一秋間傷秋金燥氣皮毛迺漸惡寒寒已確
熱漸生咳嗽咳嗽不已漸至瀉利宜

瀉白散二劑合為一劑去粳米加黃芩阿
膠各一錢五分乾薑一錢五味子細辛各
五分水煎服此方加減庸醫必駭其難能
讀孫真人書者方知從五味子湯麥門冬
湯二方得來也。六十八

已上咳嗽治之。大法多至吐血癆傷。

虛症方

一勞傷之人。土氣日虛。不能生金。每致咳嗽。惟補其中土。則百病俱愈。宜

六君子湯。加乾薑一錢五分。五味子細辛各八分。水煎服。方中雖有人參。久咳肺燥之人。不忌也。二

一久嗽不已。時見喘促者。是肺腎俱虛。天水。

不交之症宜

附子理中湯加茯苓四錢。細辛五味子各八分。阿膠天門冬各三錢。

寒一
百

一咳嗽雖為肺病。其標在肺。其本在腎。腎具水火。水虛者滋之。宜猪苓湯。服四五劑後。即服六味地黃丸。加蛤蚧麥冬、五味火虛者。溫之。宜真武湯去生薑。加乾薑。細辛五味子。四五劑後。即服桂附地黃丸。數方俱。

以利水為主。若讀張景岳書輩。必謂補腎不可利水。求正錄中有寶漏卮之喻。而不知咳嗽必挾飲邪。標在肺而本在腎。天下連地而連水也。今于水道一利。則上于之水飲亦必下行。源流俱清。咳嗽自愈。經云上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。但得三焦氣化。水道通決。則運行兩施。乾坤有一番新景象矣。

一經云。肺惡寒。又云。形寒飲冷。則傷肺。仲景不用人参。以参之性微寒也。然此為新病而言。若久嗽之人。肺必乾燥。且以多咳而牽引諸火而刑金。人参又為要藥。如病在金臟者。宜清燥救肺湯。如病在水臟者。宜瓊玉膏。

一實症不可妄用虛症諸方。恐留邪為患也。而虛症定不可廢實症諸方。以咳嗽必有

所以致之者。期其得病之由而治之。即治本之法也。

明方朔集

卷二

四庫

三

喘促

喘者氣上衝而不得倚息也。有內外實虛四症。宜與痰飲咳嗽參看。外則不離乎風寒。內則不離乎水飲。實則為肺脹。虛則為腎虛。宜分別治之。

脈宜浮滑 忌短濇

一外感風寒及傷暑。傷燥方治詳於咳嗽門。
不養。

一水飲之病。小青龍湯為第一方。若支飲內
痛亦可暫用十棗湯。如因支飲滿而氣閉。
氣閉則呼吸不能自如。宜用葶苈大棗湯。
肺湯今人畏不敢用。多致因循誤事。

一咳而上氣為肺脹。其人喘目如脫脈浮大
者。用麻黃三錢。生石膏四錢。半夏二錢。甘
草一錢。生薑一錢五分。大棗二枚。水二杯
半。先煮麻黃去沫。入諸藥煮八分服。日二

服即愈。名越脾加半夏湯。或咳嗽甚而
煩躁者。小青龍加生石膏四錢。

一腎虛氣喘。方治詳於咳嗽門。不贅。

一黑錫丹。為氣喘必用之藥。宜預製之以備急。

一喘症起於七情氣逆者。宜四磨飲。起于痰
喘。脹滿者。宜蘿子降氣湯。二方為喘症之

良方。

四磨散

二十一

薑子降氣湯

二十二

一聖濟總錄云。枸杞湯治氣短方。用枸杞四錢。薑棗水煎服。又云紫薑湯治卒氣短方。用紫薑四錢。陳皮一錢。棗二枚。水酒各半煎服。按二方同治氣短。何以彼此懸殊。而不知一治肺。一治腎也。肺主出氣。皮毛為肺之合。風寒客于皮毛。則肺之竅道閉。


竅道。閉則出氣不利而無故。用紫蘿陳皮。
之辛以開之。書中李字一字。大有意義。腎
主納氣。腎虛則吸氣不能歸根而短。故用
枸杞之補腎精以填之。與八味地黃丸同
意。但任專則效速。所以舍彼而用此也。

一過服辛燥等藥。喘促愈盛者。可用貞元飲。
然為緩劑。若痰多喘甚者。大忌之。

一喘氣諸家之說最雜。近有張心在之論。病

合鄙意。余所以數千里而掉交之也。心在
云。喘氣。耑在口也。鼻息出入氣未始不至
於口。而專在口。則喘矣。天氣通于鼻。一呼
一吸。吐故而納新。果順其常。則出心肺而
入肝腎脾。居中而轉運。此句最精。可以悟出絕妙。沾沾何
喘之有。唯鼻失其職。或肺壅衰寒。不能上
達其氣。復返心肺而出于口。或肺虛力弱。
不能下引其氣。止到心肺而出於口。則喘

作焉。皆肺之過也。至若氣短虛。真氣有出無入。能呼而不能吸。則責在肝腎之絕肺不任咎矣。



哮症

聖濟總錄。名呷嗽。咳而胸中多痰。結于喉間。
偏與氣相擊。隨其呼吸。呀呻有聲。用射干丸。
其方用射干半夏陳皮百部款冬花細辛乾
老薑五味子貝母茯苓郁李仁各一兩。皇葵
刮去皮子炙五錢。共為末。蜜丸。柏子大空心
以米飲下三十九。一日兩服。

脈喜浮滑 忌短濶代散

愚按哮喘之病。寒邪伏於肺俞。痰窠結于肺膜。內外相應。一遇風寒暑濕燥火。六氣之傷。即發。傷酒傷食亦發。動怒動氣亦發。勞役房勞亦發。一發則肺俞之寒氣與肺膜之濁痰。狼狽相依。窒塞關溢。不容呼吸。而呼吸正氣。轉觸其痰。鼾齁有聲。非常之藥所能治。故聖濟用前方之峻然體實者可用。若虛弱之人。宜用六君子湯料十兩。加貝母二兩共研。

末以竹瀝四兩生薑汁一兩和勻拌之又拌
又晒以九次為度每服三錢開水送下以竹
瀝薑汁可以透窠囊也然內之濁瘀蕩滌雖
為得法又必於潛伏為援之處斷其根株湏
用各家秘傳諸穴灸法如畏灸者宜於夏月
三伏中用張路玉外貼藥末余家傳有哮喘
斬根神驗藥散其方載於修園新按入麝五分薑汁調
塗肺俞膏肓百勞等穴塗後麻聾疼痛切勿

便去候三柱香足。方去之十日後。全一次。如此三次。病根去矣。哮喘辨症方治。俱詳痰飲咳嗽喘促三門不費。

心腹諸痛

心為君主之官。一痛手足青至節不治。俗謂心痛者。迺心胞絡痛。或胃腕痛也。昔人分為九種。宜辨而治之。

一曰氣痛。脈沉而濶。迺之情之氣鬱滯所致。

宜

七氣湯

五十四
微溫

百合湯

九十三
微涼

一曰血痛脈浮沉俱濶其痛如刺不可按捫或寒熱往來大便黑宜

失笑散

五十一

三一承氣湯

五十四

此方雖攻而痛甚便閉拒接者不得不加

桂枝桃仁各三錢

一曰痰痛即飲痛脈滑咳嗽痛連脇下或遊走無定宜傷寒十棗湯但此方近醫膽識不及不敢用宜

二陳湯

八十二〇加白芥子一錢五分皂角炒紫五分瓜萎三錢

滾痰丸

六十三〇諸藥不效大便閉者可謂用之

一曰火痛脈數而實口渴面赤身熱便秘其痛或作或止宜

金鈴子散

九十

丹參湯

九二

百合湯

九三

或用梔子炒熟四錢良薑二錢研末名越

桃散溫酒送下。

加味逍遙散。送下左金丸二錢。

一曰冷痛脈遲而微細。手足俱冷。其痛綿綿不休。宜附子理中湯。加當歸肉桂木通吳茱萸。

一曰虛痛。即憊痛。脈虛細小。或短濶心下憊喜。按得食少愈。二便清利。宜

歸脾湯。加石菖蒲一錢。

二十一

當歸補血湯加肉桂一錢五分。六

一曰注痛入山林古廟古墓及感一切異氣而痛語言錯亂其脈乍大乍小手若出兩人宜乎胃散加藿香二錢木香一錢調麝香七厘服以香者天地之正氣也正能勝邪。

一曰蟲痛脈如平人其痛忽來忽止聞肥甘之味更痛聞食而虫頭上昂按摩稍止虫驚而唇暫伏

紅舌上有白花點宜

附子理中湯去甘草加烏梅三枚。川椒黃連各一錢五分。黃柏肉桂當歸各一錢水煎服。愈後宜服烏梅丸。一百零七

一曰食痛。脈寃而滑。噯腐吞酸。惡食腹脹。其痛或有一條扛起者。宜

平胃散加麥芽。穀芽。山楂。半夏各二錢。脹甚者再加萊菔子生研三錢。水煎服如初。

病食尚在膈中。服此湯後即以手探吐之。
如腹脹滿拒按大便不通宜三一承氣湯
下之。八

又按已上九痛流傳已久不可不知而高士
宗醫學真傳分各部用藥其法甚捷今重
訂而節錄於左

一當心之部位而痛俗云心痛殊也乃心胞
之絡不能旁達于脈故也宜

香蘿飲加當歸四錢元胡索木通各一錢
桂枝二錢酒水各半煎服。此蘿須用旁小
梗整條不切碎更能通絡五十

一心脈之上則爲胸膈胸膈痛乃上焦失職
不能如霧之溉則胸痺而痛宜

百合湯半劑加瓜萎皮貝母各三錢薤白
八錢白豆蔻一錢五分水煎服九十

一胸膈之下兩乳中間名曰膺胸膺胸痛乃

肝血內虛氣不充於期門致衝任之血從
膺胸而散則痛宜

丹參飲半劑加當歸五錢白芍金銀花各
三錢紅花川續斷各一錢酒水各半煎卒
一膺胸之下則為中脘中脘作痛手不可近
乃內外不和外則寒氣凝于毛皮內則垢
濁停于中脘當審其體之虛實而施治莫
若以燈當痛處爆十餘點則寒結去而內

外通便不痛矣若爆後痛仍不止實者宜
五積散虛者宜加味香薷飲

五積散

四十

香薷飲加桂枝芍藥當歸各三錢細辛木
通各一錢五分吳茱萸二錢水煎服方中
紫蘿生薑細辛桂枝以驅外之凝寒吳茱
萸陳皮木通以降內之濁垢歸芍香附甘
草和其氣血安其中外頗合古法若虛甚

者去紫蘿加黃芪三錢。汗多者再加熟附子一錢五分。

一中脘之下當陽明胃土之間

銅人圖中脘下
叶名建

穴時痛時止乃中土虛而胃氣不和若服行血消洩之劑過多便宜溫補但以手重按之則痛稍平此中土內虛虛而且寒之明驗也宜

香砂六君子湯加乾薑二三錢

三

附子理中湯

一百

一乳下兩旁胸骨盡處痛者乃上下陰陽不和少陽樞轉不利也傷寒病中多有此症當助其樞轉和其氣血上下通調則愈矣

宜

逍遙散倍柴胡加生薑一錢五分

四十

一大腹痛者乃太陰脾土之部痛在內而緩中土虛寒也宜理中湯痛兼內外而急脾

倍人參

絡不通也。宜理中湯。蓋脾之大絡名曰大包。從經隧而外出於絡脈。今脾絡滯而不行。則內外皆痛。理中湯倍乾薑服之。不應者。再加肉桂一錢五分。木通一錢。太陽篇云。傷寒。陽脈濤陰脈弦。法當錢。腹中急痛。先與小建中湯。不瘥者。與小柴胡湯。此先補益於內。而後樞轉於外也。一臍旁左右痛者。乃衝脈病。衝脈當臍左右。若為寒氣所凝。其衝脈之血不能上行。外

達。則當臍左右而痛。當用血分之藥使胞
中之血通達肌表。若用氣藥無裨也。宜當
歸四逆加生薑吳茱萸湯。水酒各半煎服。
或用

四物湯丸去地黃。加肉桂一錢。生黃芪。生
薑各三錢。炙甘草。紅花各一錢。水酒煎服。
二。臍中痛不可忍。喜按者。腎氣虛寒也。宜通
脉四逆湯加白芍三錢。若脈沉實。口中熱。

渴腹滿拒按大便秘是有燥屎症

三一承氣湯五十

四

一臍下痛者乃少陰水臟太陽水府不得陽熱之氣以施行致陰寒凝結而痛少陰水臟虛寒用真武湯溫之太陽水腑虛寒用桂枝湯加熟附子茯苓溫之○按士材必讀云臍上痛屬脾臍下痛屬肝當臍痛屬腎此臆說也不可從又臍下痛有火逼膀

耽小便不利而痛者宜五苓散亦有陰虛陽氣不化小便點滴俱無脹痛者宜通關丸。有燥屎者辨方法方治見上條。

通關丸

五十

一小腹兩旁謂之少腹少腹痛乃厥陰肝臟之部又為胞中之血海。蓋胞中之水主于少陰胞中之血主於厥陰也。痛者厥陰肝氣不合胞中之血而上行也。肝藏不虛者。

當疎通以使之上。

宜香薰飲。加柴胡三錢。
當歸白芍各二錢。生橘

葉三片

肝臟虛者當補益以助其下。

宜烏梅九錢。以米

湯送下二錢。一日三服。

蓋厥陰不從標本從中見少陽之氣使厥陰上合乎少陽則不痛矣。

一兩旁季脇痛者肝氣虛也。

當歸四逆湯。加阿膠四君子湯。

去白朮。加當歸。粳米與烏梅丸互服。

兩脇之上痛者少陽之氣不和也。

宜小柴胡湯去

棗加牡蠣青皮時法用左金丸。

愚按凡心腹諸痛宜辨其內之脹與不脹便

之閉與不閉。脈之有力與無力。口中熱口
中和痛之久暫。以辨寒熱邪正虛實如痛
而脹且閉者。厚朴三物湯攻裏兼發熱者。
厚朴七物湯兼表裏治之。腹痛連脇痛脹
眩緊惡寒甚大便祕者。大黃附子湯主之。
若但脹而便不秘者。是實中之虛。宜厚朴
半夏人參生薑甘草湯。腹痛甚而不可觸
近。嘔吐者。大建中湯主之。雷鳴切痛嘔吐

者附子粳米湯主之。腹痛下利而厥者。通脈四逆湯主之。腹痛吐瀉者。理中湯主之。若繞脅疼痛。名寒疝。腹中疗痛者。當歸生薑羊肉湯主之。皆起死回生之法。時醫不講久矣。予著有金匱淺注十六卷。醫訣三卷。辨之頗詳。宜查對勿誤。

七

痛風

肢節走痛。均經謂之賊風。後人謂之痛風。又謂之白虎歷節風。宜審其寒熱而治之。

脈宜浮數。

忌虛弱。

一。痛風脈浮緊。頭痛惡寒。發熱為新疫之邪。

宜

五積散

四十

一。治風先治血。血行風自滅。宜


四物湯加生黃芩防風桂枝桑元桑枝紅花象甘草主之。九

一痛風久不能愈必大補氣血以為勝邪之本切不可徒用風藥宜

十全大補湯諸藥各一錢加真桑寄生三錢葛根再加附子防風竹瀝生薑汁為佐使十一

一痛風久不愈以痛久必入絡也諸方俱宜

加入金銀花。木通。紅花。釣藤。鈎刺。蒺藜之類。○又痛久則。鬱鬱而為熱。熱則生痰。必加入製南星。半夏。桔梗根。黃柏。貝母。竹瀝。薑汁之類。○又桑寄生。虎骨。俱為要藥。以柔為箕星之精。風從虎之義也。○久服辛熱之藥不效者。宜用玉竹。黑芝麻。直殼蠶。生芪。蹄鬚。菊花。蒺藜。阿膠。炙草之類。為柔潤熄肝風法也。



痺

痺者閉也。風寒濕雜至合而為痺。與痛風相似。但風則陽受之。痺則陰受之。雖內經痺論。風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。濕氣勝者為着痺。之分。而深究其源。自當以寒與濕為主。蓋以風為陽邪。寒與濕為陰邪。陰主閉。閉則鬱滯而為痛。是痺不外寒與濕。而寒與濕亦必假風以為之帥。寒曰風寒濕曰風濕。

此三氣雜合之說也。內經壽天剛柔篇曰：在陽者命曰風，在陰者命曰痺。以此分別，則兩症自不混治矣。若胸痺及臟腑諸痺，又當別論。醫門法律分別甚詳，宜參閱之。


一 痒症之實者宜

五積散

四十

一 金匱治血痺。脈陰陽俱微，寸口關上微尺中小緊。外症身體不仁，如風寒狀，用黃芪。

五物湯黃芪芍藥桂枝各三錢生薑六錢
大棗四枚水煎服一日三服愚謂為癆症
屬虛者之總方



腰痛

一。內經云。太陽所至為腰痛。其痛為外感。宜。

五積散。

四十

一。內經云。腰者腎之府。轉移不能。腎將憊矣。其痛為腎虛。宜。

六味丸。

十四治水虛

八味丸。

十五治火虛

二方俱加杜仲牛膝鹿茸。補骨脂之類。

一瘀血作痛。其痛如刺。輕者以鹿角炒爲末。
酒調服三錢。重宜

三一承氣湯去枳朴加桂枝。附子桃仁各
二錢。五十

四

一督脈爲病。脈尺寸中央但浮。三部俱直上直
下。宜鹿茸一兩。肉桂一錢。水煎服。

一帶脈爲病。關左右彈。主腰痠。如坐水中。

宜

腎着湯。八十。

四

一曰术一味補脾即所以驅濕而補脾又所以輸精及腎且能利腰臍之死血余遇腰痛症服藥不愈者每用一兩佐以牛膝三錢淫羊藿五錢以治水虛神農本草經謂淫羊藿性寒今人不明此理佐以附子三錢當歸肉桂各一錢五分杜仲五錢以治火虛佐乾薑二錢以治寒濕佐苡仁五錢。

以治濕熱其效如神。