

千金方衍義 卷十八



孫真人千金方衍義卷十八

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

大腸腑方

凡七類

大腸腑脈論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也肺合氣於大腸大腸者爲行道傳瀉之腑也號監倉掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精

神千金明堂外臺同難經云長二丈一尺大四寸鼻徑一寸之少半十六曲盛穀一斗水七升半

遂以長以候大腸

右手關前寸口陽絕者無大腸脈也若少氣心下有水氣立秋節卽亥刺手太陽治陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如鍼刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里

尋  
王菩

大腸有寒驚溏有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失便利厥氣

客於大腸則夢田野

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大  
者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直  
皮肉不相離者大腸結  
扁鵲曰手太陰與陽明爲表裏大腸若病實則傷熱  
熱則脹滿不通口爲生瘡食下入腸腸實而胃虛食  
下胃胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍

去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於氣水根在大腸方見治水篇中大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

手陽明之脈起於大指次指之端循指外側上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直上上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔是動則病齒癰頸腫是主津所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不爛

氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復盛者  
則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口

大腸虛實第二

脈二首 灸法七首

方二首

大腸實熱

右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腸  
滿善端欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱  
也

生薑泄腸湯 治大腸實熱腹脹不通口爲生瘡  
者方

生薑

橘皮

青竹茹

白术

黃芩

梔子仁各三兩

桂心

一兩

茯苓

芍藥各二兩

地黃十兩

大棗十四枚

右十一味㕮咀以水七升煮取三升去滓下芍藥  
分二服

衍義

本經言生薑久服去臭氣通神明故干金以之泄  
大腸之實熱兼大棗以治心腹邪氣安中養脾平  
胃氣通九竅橘皮下氣通神竹茹黃芩梔子清上  
熱口瘡地黃芍藥治傷中逐血渾除邪熱通脹閉  
共襄推陳致新之功白术茯苓保守中氣以助諸

藥之力桂心爲祛熱之內應也

治腸中臚脹不消方

灸大腸腧四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛冷也

黃連補腸湯 治大腸虛冷利下青白腸中雷鳴

相逐方

黃連四兩

茯苓

芎藭各三兩

地榆五兩

酸石榴皮五片

伏龍肝

雞子一枚大

右六味以水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末

分三服

衍義

方下雖言大腸虛冷痢下青白然腸中雷鳴火激  
痰動與生薑瀉心湯之用芩連佐乾生二薑同意  
此用黃連佐橘皮伏龍肝得寒熱相參之妙橘皮  
酸澀茯苓利之芎藭地榆佐橘皮以理血脫方下  
雖不治血而治血之義具見言外矣

治腸中雷鳴相逐痢下方

灸承滿五十壯穴在俠巨闕相去五寸巨闕在

心下一寸

灸之者俠巨闕兩邊各二寸半

治腸中常鳴時上衝心方

灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃陽綱主之  
腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腹中痛濯濯冬日重  
感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不  
嗜食身腫俠臍急天樞主之

腸鳴而痛溫畱主之

肛門論第三

論

一首

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號爲通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞泄肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和平依經調理

方見二十卷中

皮虛實第四

論一首

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓痛疼然陰陽表裏內髓外皮其病源不可不詳之也

皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

葫蘆蒸湯

治皮虛主大腸病寒氣關格方

葫蘆根葉

切三升

菖蒲葉

切二升

桃葉皮枝

二升

細糠

一斗升

秫米

五升升

右五味以水一石五斗煮取米熟爲度大盆器貯於盆上作一小竹牀子罩盆人身坐牀中周回四面將簾薦障風身上以衣被蓋覆若欲氣息時開孔對中洩氣取通身接汗可得兩食久許如此三日蒸還溫藥足汗用之若盆裏不過熱盆下安炭

火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉治之

術義

蒴藋治寒痺拘急菖蒲通利九竅桃葉辟邪散血

糠米蒸發肉腠共裹作汗之功也

梔子煎 治皮實主肺病熱氣方

梔子仁

枳實

大青

杏仁

柴胡

芒硝

生地黃

淡竹葉

切各一升

生元參

各五兩

石膏

八兩

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

術義肺主皮毛肺熱則皮實故用梔子杏仁柴胡元參

竹葉治外熱石膏芒硝大青地黃枳實治內實

喜嗽第五

論二首

方五十五首

灸法十四首

論曰經云五臟六腑皆合於肺居外而近上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易爲欬也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小

腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰陰引肩背  
甚者不得動動則欬劇經久不已傳入胃其狀欬而  
嘔嘔甚則長蟲出久欬不已三焦受之三焦欬狀欬  
而腹滿不能飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾  
而面浮腫氣逆也若順時有風寒冷人觸冒解脫傷  
皮毛間入腑臟爲欬上氣如此也有非時忽然暴寒  
傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脇支痛欬唾有  
血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深  
喜肺癰也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汗出  
惡寒是也天有非時寒者急看四時方也問曰欬病

有十何謂也師曰有風欬有寒欬有脾欬有肝欬有  
心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰  
十欬之證以何爲異師曰欲語因欬言不得竟謂之  
風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則  
肢痛其脈反遲謂之肢欬欬則引脇下痛謂之肝欬  
欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止  
引小腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬  
則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口  
苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬者不下  
之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺

足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽

陵泉厥陰欬刺手太陵

夫久欬爲癥欬而時發熱脈在九菽

一作  
卒弦

者非虛也

此爲胸中寒實所致也當吐之

夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可

吐耳欬家其人脈弦爲有水可與十棗湯下之

見下  
第十

方不能臥出者陰不受邪故也畱飲欬者其人欬不

得臥引項上痛欬者如小兒掣縱狀夫酒家欬者必

致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沉者不可發

汗久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者

必善冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣  
汗出而欬屬飲家欬而小便利若失渴不可發汗汗  
出卽厥逆冷

夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得臥者死寒家  
欬而上氣其脈數者死謂其人形損故也脈大而散  
散者爲氣實而血虛名曰有表無裏上氣面附腫肩  
息其脈浮大不治加痢尤甚上氣躁而喘者屬肺脹  
欲作風水發汗愈

小青龍湯 治欬逆倚息不得臥方

見第九卷  
傷寒上

小青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥

小逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉  
狀因復下流陰股小便難時復冒者與桂苓五  
味甘艸湯治其氣衝方

桂苓

四兩

桂心

各二兩

五味子

半升

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫分三服  
失衝氣卽低而反更欬胸滿者苓甘五味薑辛湯以  
治其欬滿方

茯苓

四兩

甘艸

乾薑

細辛

各三兩

五味子

半升

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓溫服半升

日三

欬滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲  
熱藥也服之當遂渴而渴反正止者爲支飲也支  
飲法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水

桂苓五味甘艸去桂加薑辛半夏湯方

半夏

五味子

各半升

茯苓

四兩

細辛

乾薑

各二兩

右六味咬咀以水八升煮取三升去滓溫服半升

日三

水去嘔止其人形腫者應內麻黃以其人遂痺故

不內麻黃內杏仁名苓甘五味加薑辛半夏杏

仁湯方

甘草

甘草各二兩

杏仁

半夏

各半升

五味子

各半升

茯苓

四兩

細辛

各半升

乾薑

半升

甘艸

各三兩

甘草

各半升

甘草

半升

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三若逆而內麻黃其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

若面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃利之

荅甘五味加薑辛半杏大黃湯方

大黃

細辛

乾薑

甘艸

各三兩

茯苓

四兩

杏仁

半夏

五味子

各半升

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓溫服半升

日三

衍義

小青龍湯余於傷寒門中大青龍條下具言之矣

而金匱治欬敘於痰飲之下趙以德衍義論之最詳以欬必因之痰飲而五飲之中獨膈上支飲最爲欬嗽根蒂外邪入而合之因欬卽無外邪而支

飲漬入肺中自足令人欬嗽不已況支飲久蓄膈上其下焦之氣逆衝而上尤易上下合邪也夫以支飲之故而令外邪可內下邪可上不去支飲則欬終無寧字矣其曰欬逆倚息不得臥小青龍湯主之明外內合邪之證惟小青龍湯爲的對耳然用小青龍湯其中頗有精義須防衝氣自下而上重增濁亂其欬不能堪矣傷寒用小青龍湯無少陰證者可服雜證用小青龍湯亦恐少陰腎氣素虛衝任之火易於逆上衝任火上無欬且增煩欬況久欬不已顧可動其衝氣耶蓋衝任二脈與腎

絡同出胞中腎虛不能固守於下二脈相挾從小腹逆衝而上也腎氣本虛之人卽素無痰飲纔感外邪則衝任之火便乘勢上墳膈上迫脅津液而爲痰飲支塞清道必致欬逆倚息不得臥也倚息本倚伏而喘息陰火內應外邪爲證最急不得不以外小青龍湯爲務祇緣真元素虧總有合劑不能逞迅掃之力所以餘邪得以久持致有如下變證也多唾飲上溢也口燥津液傷也寸脈沉尺脈微手足逆冷衛中陽氣耗也氣從小腹上衝胸咽陰火逆也手足痺榮血虛也其面翕熱如醉陽明

胃熱也因復下流陰股小便難陰火下流膀胱也時復冒太陽餘邪未散也然證雖屬變皆衝氣逆上之故且有時復昏冒一證卽定太陽表證確守冒家汗出自愈之例故反覆出入不離小青龍湯加減也設證多端衝氣最爲叵測所以首變茯苓桂心五味甘艸湯先治衝氣衝氣卽低而反更欬胸滿水在膈間不散也再變前方加乾薑細辛以治其欬滿欬滿卽止第三變而更復渴衝氣復發以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反正者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內

半夏以去其水水去嘔止 第四變其人形腫者  
以水尚在表也加杏仁主之其證應內麻黃以其  
人遂痺故不內之若逆而內之必厥所以然者以  
其人血虛麻黃發其陽故也 第五變若面熱如  
醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃以利之 前四  
變隨證加減施治猶未離本來繩墨至第五變其  
證頗似戴陽而能獨斷陽明胃熱乃加大黃以利  
之按陽明病面合赤色不可攻之爲其腎虛陽氣  
不藏故以攻爲戒而此平昔陰虧血虛反用大黃  
利之者以其證變疊見雖有面熱如醉而脈見寸

沉尺微澗非表邪怫鬱而爲胃中熱蘊無疑竟行  
滌飲攻熱不以陰虛爲慮而致扼腕也嗟夫仲景  
治歟全不從歟起見治其支飲下其逆氣衝氣法  
中之法遊刃有餘千金祖述其義以爲支飲歟逆  
之成則

歟而上氣肺脹其脈浮心下有水氣脇下痛引缺  
盆設若有熱者必躁其人常倚伏小青龍加石  
膏湯主之方

石膏

乾薑

桂心

細辛各二兩

麻黃四兩

芍藥

甘艸各三兩

半夏半升

五味子一升

升

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去沫下藥煮取二升半强者服一升羸者減之小兒服四合仲景治肺脹欬而上氣煩燥而喘脈浮者心下有水外臺同

義衍

小青龍湯原爲欬逆倚息不得臥之首推今因心

下有水氣而脈浮頗有似乎風水之候但彼因身腫自汗不渴知病在表故用越婢此因肺脹喘滿痛引缺盆知病在裏故用小青龍加石膏仍不出越婢法

射干麻黃湯 治欬而上氣喉中如水雞聲者方

射干

細辛

款冬花

紫苑各三兩

麻黃

生薑各四兩

半夏

五味子各一升

大棗七枚

右九味㕮咀以東流水一斗二升先煮麻黃去上沫內藥煮取三升去滓分三服日三

衍義

上氣而作水雞聲乃是痰凝其氣氣觸其痰風寒入肺之一驗故於小青龍方中除桂心之熟芍藥之收甘艸之緩而加射干紫苑欬冬紫苑潤燥半夏黃細辛發表射干五味下氣欬冬紫苑潤燥半夏生薑開痰四法萃於一方分解其邪大棗運行脾

津以和藥性也

厚朴麻黃湯 治欬逆上氣胸滿喉中不利如水  
雞聲其脈浮者方

厚朴五兩

麻黃四兩

石膏

細辛

乾薑各二兩

小麥一升

杏仁

半夏

五味子

各半升

右九味咬咀以水一斗二升先煮麥熟去麥內藥  
煮三升去滓分三服日三

衍義欬而脈浮者外邪居多法當發散爲主故於小青

龍湯中除去桂枝湯三味加入厚朴以下氣石膏

以清熱小麥引入胃中助其升發之氣也

澤棗湯 治上氣而脈沉者方

澤棗

三斤細切以東流水五斗煮取一斗五升去滓澄清半夏半升

生薑

紫苑

一作紫參

白前

各五兩

黃芩

甘艸

桂心

人參

各三兩

右九味內澤棗汁中煮取五升每服五合日三夜

一

衍義欬而脈沉邪在營分熱過於營吸而不出其血必  
結邪氣外裏故用澤棗破血爲君加以生薑半夏

半升

之開痰紫菀白前之下氣黃芩之清熱桂心之和  
營人參甘艸匡助胃氣以行藥力俾壘一空元氣  
不損製方之妙若此得不以之爲法耶

麥門冬湯 下氣止逆治火逆上氣咽喉不利方

麥門冬汁

三升

半夏

一升

粳米

三合

人參

甘艸

各二兩

大棗

二十枚

右六味以水一斗二升煮取六升去滓分四服日

三夜一

義衍

此胃中津液乾枯虛火上炎之候凡肺氣有胃氣  
則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也故於竹葉

石膏湯中偏除方名二味而加麥門冬數倍爲君人參甘艸梗米以滋肺母使水穀之精微皆得上注於肺自然沃澤無虞當知火逆上氣皆是胃中痰氣不清上溢肺隧占據津液流行之道而然是以倍用半夏更加大棗通津滌飲爲先與義全在乎此若濁飲不除津液不致雖日用潤肺生津之劑烏能建止逆下氣之勳哉俗以半夏性燥不用殊失立方之旨

麻黃石膏湯 治上氣胸滿方

麻黃 四兩

石膏 子大如雞

厚朴 五兩

小麥一升

杏仁半升

右五味以水一斗先煮小麥熟去麥下藥煮取三

升去滓分三服

深師用此治久逆上氣喉中如水雞鳴欬者加半夏五味子各半升

乾薑

三纍

衍義

此於麻杏甘石湯中除去甘艸之緩中易入厚朴以泄滿小麥以助肺胃而資少陽生發之氣以其得春升之氣最先也

十棗湯 夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至

一百日一歲可與此方

大棗

十枚

大戟

甘遂

芫花等分

右大戟甘遂芫花搗爲末以水一升五合煮棗取八合去滓內藥未强者一錢七羸者半七頓服平旦服而不下者平旦更加半匕下後自然補養

衍義十棗湯方在傷寒門中治表解裏未和痞滿脇痛在金匱中治懸飲內痛千金取治支飲欬煩胸中久痛總取峻攻痰積以破宿積

欬而引脇下痛亦十棗湯主之

溫脾湯 治食飢而欬者方

甘艸四兩

大棗二十枚

右二味咬咀以水五升煮取二升分三服若咽中  
痛而聲鳴者加乾薑一兩

衍義

肺胃虛寒則歎故用甘艸溫散臟腑寒熱邪氣大  
棗安中養脾共建溫脾之功世本方下註治食飽  
而歎豈有食飽胃實而歎反用甘艸大棗二味實  
之之理敢力正之

百部根湯 治嗽不得臥兩眼突出方

百部根

生薑

各一斤

細辛

甘艸

各三兩

貝母

白朮

五味子

各三兩

桂心

四兩

麻黃

六兩

右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三

服

古今錄驗有杏仁四兩紫苑三兩

義衍

嗽不得臥兩眼突出明是寒鬱熱邪爲患故首取

百部之溫散肺氣麻桂薑辛之開發肺邪貝母助

百部消寒木甘助麻桂透表五味收麻辛之散也

海藻湯 治欬而下利胸中痞而短氣心中時悸

四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒方

海藻

四兩

半夏

二兩

五味子

各半升

生薑

一兩

細辛

二兩

茯苓

六兩

杏仁

五十

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

三方無五味子生薑

衍義

欬而下利水飲溢於肺胃滲於大腸而見痞逆短氣心中時悸者心火惡水之象也四肢不欲動不

欲食者脾氣傷也背痛惡寒者陽氣失職不能榮

於陽位也故用海藻之鹹順而泄留飲水氣杏仁

下氣泄滯荅半辛薑滌除痰垢五味收斂肺氣也

白前湯 治水欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝

夜倚壁不得臥咽中作水雞鳴方

白前

紫苑

半夏

大戟各二兩

右四味㕮咀以水一斗浸一宿明日煮取三升分爲三服

衍義欬逆上氣而見肢體浮腫作水雞聲乃水飲溢於肺胃流入百骸故用白前以疏肺氣紫苑以散血氣半夏以滌痰氣大戟以利水氣皆從金匱澤漆湯中採出大戟之利水與澤漆不殊

治九種氣嗽欲死百病方

乾薑

半夏

細辛

紫苑

蕘花一作芫花

吳茱萸

茯苓

甘艸

甘遂

防葵

人參

烏頭

大黃

杏仁

各五分

蓼蘚

二分

巴豆

厚朴

三分

白薇

各三分

遠志

菖蒲

一分

五味子

前胡

枳實

一分

蜀椒

皂莢

當歸

一分

大戟

桂心

各半分

右二十八味爲末蜜丸如梧子大先食服二丸日  
二服以知爲度不知增之

氣嗽而兼九種百病之治故彙採寒熱補瀉氣血  
痰水及乎峻攻之味無一不具苟非龐雜之方亦  
無以療龐雜之病

麻黃散 治上氣嗽方

麻黃 半斤

杏仁 百枚

甘艸 三兩

桂心 一兩

右四味治下篩別研杏仁如脂內藥末和合氣上  
時服一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕可至  
三匕氣發便服卽止 一方去桂心甘艸

上氣而嗽非開泄肺氣無以逞止逆之功故取傷  
義

寒麻黃湯溫散胸中之邪不必更加一味紊亂先  
聖成則

蜀椒丸 治上氣欬嗽太醫令王叔和所撰御服  
甚良方

蜀椒

五分

烏頭

杏仁

石菖蒲

礬石

一云  
礬石

皂莢

各一  
分

款冬花

細辛

紫苑

乾薑

各三  
分

麻黃

吳茱萸

各四  
分

右十二味爲末蜜丸如梧子大暮臥吞二丸治二  
十年久嗽不過二十九丸

衍義

辛溫破結之劑彙集一方以治積年冷氣頑痰可謂峻矣更需譽石之專攻腹中堅癧皂莢之去風拔毒通關利竅何憚二十年久嗽不能克應乎

通氣丸

治久上氣

欬嗽咽中腥臭虛氣覺心痛

眼疼耳中嘈嘈風邪毒症時氣食不生飢肉胸

中隔塞嘔逆多嘔惡心心下堅滿飲多食少惡

疰淋痛病方

蜀椒

二升

飴糖

三升

杏仁

各四

天門冬

乾薑

人參

各四

烏頭

七分

桂心

六分

大附子

五枚

卷之五  
蜈蚣 五節

嘗右十味爲末別治杏仁如脂稍稍內藥末搗千杵  
燒飴乃內藥末中令調和含如半棗一枚日六七  
夜三四服以胸中溫爲度若夢與鬼交通及飲食  
者全用蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加  
天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後  
勿加也有停飲加蓼莖三兩

義衍  
金匱大建中湯專取蜀椒下氣止逆乾薑溫中破  
積人參補正除邪膠飴潤肺止嗽以治胸腹寒積  
出見有頭足上下痛不可觸干金加烏附桂心以

攻毒破結杏仁泄肺散滿蜈蚣截風解毒天門冬  
除欬逆寒熱并化烏附椒薑之燥烈也

治欬逆上氣方

蜀椒

各六分

桂心

各四分

海蛤

各四分

昆布

各六分

海藻

各四分

乾薑

各四分

細辛

各六分

麥門冬

各十分

右八味爲末蜜丸如梧子大飲服十九加至二十一  
丸日三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如欬  
管聲吸吸氣上欲欬服此方得瘥

衍義

欬逆日久不除必是寒痰膠積之故故用椒桂薑

辛以蒐肺絡之寒邪海蛤昆藻以破肺竅之痰氣  
用門冬者不特治欬并滋方中辛燥諸味詳喉中  
如吹管聲豈非病在肺竅之明驗乎

治欬嗽胸膈支滿多唾上氣方

甘譽石

一作礬石

烏頭

一方不用

菖蒲

各一分

細辛

黃環

各二分

杏仁

欬冬花

紫苑

各三分

吳茱萸

四分

杏乾薑

五分

蜀椒

五合

右十一味爲末蜜丸如梧子大每服一丸著牙上  
噙汁日五六服劇者常含不止

又方

玄薑汁一升半

砂糖五合

右二味煎薑汁減半內糖更煎服之

又方

白糖五分

皂莢末一方寸七

右二味先微暖糖令消內皂莢末合和相得丸如

小豆先食服三丸

又方

酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之

又方

巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二

日三枚

又方

服芥子七丸以油酒下之

義衍

欬逆胸脇支滿濁痰委積清道也上氣多嘔寒飲溢於膈上也方中舉石治堅癥邪氣烏頭散風寒濕痺心腹冷痛菖蒲細辛溫利九竅黃環治欬逆寒熱杏仁欬冬紫苑並主欬逆上氣乾薑蜀椒茱萸並泄胸中逆滿以溫欬逆多嘔也又方薑汁

辛散溫肺砂糖甘緩和脾火衰痰清者爲宜 又  
方皂莢滌除痰垢飴糖緩其暴烈 又方酒浸肥  
皂取吐較飴丸者尤甚 又方以巴豆炮黑勿破  
碎服者恐其毒烈傷犯喉吻也此惟令積年久嗽  
不止者宜之 又方服芥子入肺搜痰卽控涎丹  
之意

射干煎 治欬嗽上氣方

生射干

欬冬花

各二兩

紫苑

細辛

桑白皮

各半兩

附子

甘艸

各半

白蜜

竹瀝

生薑汁

各一升一云  
乾薑五兩

飴糖

三兩

右十一味先以射干內白蜜竹瀝中煮五六沸去之咬咀六物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴糖薑汁煎如餌服如酸棗一丸日三劇者夜二不止加之以止爲度

衍義

欬嗽上氣有腎寒肺熱之分此治腎虛火乘於肺故用附子攝腎歸源細辛下通腎氣射干上散肺結欬冬花紫苑滋燥潤肺薑汁開發桑皮竹瀝之性流動膠飴白蜜之滯也

杏仁煎 治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁 五合

五味子

款冬花 各三

紫苑

乾薑 各二

桂心 三兩

甘艸 四兩

麻黃 一斤

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥爲末又內膠餠半斤白蜜一斤合內汁中攬令相得煎如餚先食服如半棗許日三服不知者加之以知爲度

衍義

肺氣通於鼻肺爲客邪所遏以故鼻息不通喘嗽

痰清非麻黃湯不能開發肺氣加乾薑以溫腎氣

欬冬紫苑以溫肺經五味以收麻杏之散耳

又方 治忽暴噦失聲語不出方

杏仁

薑汁

砂糖

蜜

各一升

紫苑

五味子

各三兩

通艸

貝母

各四兩

桑皮

五兩

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓內杏仁脂  
薑汁蜜糖和攬微火煎取四升初服三合日再夜  
一後稍加之

衍義

肺爲諸氣之門戶暴噦失音必有寒飲阻積肺絡  
故用杏仁疎洩肺滿通艸通達肺氣薑汁開通經  
絡桑皮瀉肺之熱五味收肺之津得薑汁之辛散

杏仁之開泄可無斂閉邪風之患紫苑通肺經之  
血貝母消肺鬱之痰沙糖理胃中之滯蜂蜜滋膈  
上之燥也

通聲膏方

五味子

欵冬花

通艸

各三

兩

人參

青竹皮

細辛

各二

桂心

菖蒲

各二

杏仁

正兩

薑汁

各一

白蜜

二升

棗膏

三升

酥

五升

右十三味咬咀以水五升微火煎三上三下去滓

內薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服棗大二枚

衍義

肺臟方中酥蜜膏專滋肺胃之燥以化其氣此方

專滋脾肺之津以通其聲方中五味人參滋肺之氣欬冬竹茹清肺之燥桂心細辛搜肺之邪通艸菖蒲利肺之竅杏仁酥蜜薑汁棗膏滋培津氣而通其聲大腸主津故以此方隸之此門

杏仁飲子 治暴熱嗽方

杏仁四十枚

紫蘇子一升

橘皮一兩

柴胡四兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服

義衍

嗽起於暴是實非虛杏仁蘇子橘皮皆泄肺之品  
柴胡散寒熱之邪

蘇子煎 治上氣咳嗽方

蘇子

杏仁

生薑汁

地黃汁

白蜜各二升

右五味搗蘇子以薑汁地黃汁澆之以絹絞取汁  
更搗以汁澆又絞令味盡去滓熬杏仁令黃黑治  
如脂又以向汁澆之絹絞往來六七度令味盡去  
滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如餡每服  
方寸七日三夜一

崔氏無味酸飴東大

又方

乾薑末五兩 膠餈一斤

右二味和令調蒸五升米下冷以棗大含化稍稍  
咽之日五夜二

義衍

欬嗽日久而客邪未除蘊化爲熱故用薑汁散邪  
地黃滋熱且製入蘇子順氣味中更以杏仁熬黑  
如大陷胸丸中法專滌胸中宿垢內蜜熬煎如餈  
緩行搜逐而無驟傷中氣之患如或病人肥盛素  
多痰濕者宜從崔氏去地黃例 又方單用乾薑  
之辛散肺胃之寒膠餈緩其辛燥頻令噙化與上

方藥品雖變而功則一揆

芫花煎 治新久嗽方

芫花

乾薑

各二兩

白蜜

二升

右二味爲末內蜜中令相和微火煎令如糜每服  
如棗核大一枚日三夜一以知爲度欲利者多服  
深師以治冷飲嗽又治三十年久嗽者以水五升  
煮芫花取三升去滓內薑加蜜合煎如糜服之  
衍義以芫花走而不守之味製入乾薑守而不走味中  
使邪氣去而正氣守內入蜜中以和走守之性

欬冬煎 治同前

欬冬花

乾薑

紫苑

各三兩

五味子

二兩

芫花

一兩  
熬  
令赤

右五味咬咀以水一斗煮三味取三升半去滓內  
芫花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中  
微火煎令如飴每服半棗許日三

衍義

於芫花煎中加欬冬紫苑以緩芫花乾薑之烈五  
味以收耗散之津藥品雖倍而功反稍遜於前

治三十年欬嗽或喘或欬欬雖不同悉主之方

細辛

欬冬花

防風

紫苑

各三  
兩

藜蘆

二兩

蜀椒

五合

右六味咬咀取藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛

次欬冬次椒以大棗百枚間著諸藥間以水一斗  
二升微火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗  
不知明日服一枚以胸中溫溫爲度若強人欲噦  
吐者可小增服之便吐膿囊裹結吐後勿令飲食  
欬愈止藥勢靜乃食不爾令人吐不已

衍義方中細辛欬冬防風紫苑蜀椒等味助藜蘆湧吐  
之性製入大棗之中蒐逐腸胃積垢峻藥緩攻之  
妙用無以逾之

治三十年久嗽方

百部根二十斤搗取汁煎如飴服一方寸七日

三服

外臺和餳一斤熬成煎以溫粥飲調下深師方以白蜜二斤更煎五六沸服二合

義衍

久嗽諸藥不應寸白蟲生肺中故用百部專力殺

蟲匹馬單刀不假他味佐使外臺之飴深師之蜜

不過借甘溫之味引入蟲口近世師家治久嗽方

不問有蟲無蟲槩用此味每致苦寒傷伐胃氣而

致天札者不少是豈先哲立方之過歟

並且雖吸

又方

紫苑

二兩

欬冬花

三兩

右二味治下篩先食飲服方寸匕日三服七日瘥

義衍

此方無問暴嗽久嗽虛嗽實嗽有痰無痰有血無

血俱無妨礙但客邪勢甚者無益於治也

又方

白蜜一斤

生薑

二斤取汁

右二味先秤銅鏃兩訖內蜜復秤知數次內薑  
汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩乃止旦服如  
棗大含一丸日三服禁一切雜食

衍義

蜜取甘潤薑取辛散辛甘合劑專破痰結但火逆

咽痛非其所宜

治久嗽不瘥方

白蟲生糊中姑用百倍專止久

兔屎

四十枚

硇砂

二分

胡桐津

一分

右三味爲末蜜丸如梧子大每服三丸以粥飲下  
日三服吐令物盡卽瘥

衍義

免屎爲目科消翳要藥故千金取治肺中宿滯得  
礞砂之攻堅破積梧桐津之搜滌痰垢爲形濁氣  
穢久嗽之峻藥但梧桐津世鮮收取乃桐花開時  
飄忽沾衣汚不可滌者是專取濁惡之物以攻濁  
惡之垢也吾觀閨人用桐皮漬水沐髮則不染塵  
垢用皮代津未爲不可礞砂善爛金銀硼砂能柔  
五金無礞砂之毒劣以之代用亦無不可

紫苑丸 治積年欬嗽喉中呀聲一發不得坐臥

方

紫苑

貝母

半夏

桑白皮

百部

射干

五味子

各五分

皂莢

乾薑

欵冬花

細辛

橘皮

鬼督郵

各四分

白石英

杏仁

各八分

蜈蚣

二枚

右十六味爲末蜜和丸如梧子大飲服十九日再

服稍加至二十九

崔氏無半夏射干乾薑橘皮鬼督郵細辛白石英有麻黃二兩

芫根白皮一兩半以煮棗湯送下

行義久嗽積年不愈必有宿垢畱伏於中吁聲一發則伏火內動所以坐臥不安故用皂莢射干督郵之屬辟除惡毒兼石英薑辛助力祛邪紫菀欬冬等味助供佐使之用耳

欬冬丸 治三十年上氣欬嗽唾膿血喘息不得

臥方

欬冬花

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

菖蒲

人參

細辛

蕘花

各五分

紫苑

甘艸

桔梗

防風

芫花

茯苓

皂莢

各三分

茱萸

各五分

右十六味爲末蜜丸如梧子大酒服三丸日三

行義

前方專辟痰垢此方兼散滯血滯血未有不兼痰

垢者所以仍用皂莢滌垢薑辛破結更須蕘花利

水桂心散滯人參茯苓甘艸扶助胃氣以振祛邪  
之力餘皆疎風治嗽之常味也

又方

欵冬花

紫苑

細辛

蜀椒

桂心

菖蒲

一錢相

人參

甘艸

愈風

防風

土兼服

石斛

芎芻

當歸

藁本

白术

半夏

天雄

鍾乳

麻黃

獨活

烏頭

附子

茺花

各一兩

桃仁

二十枚

大棗

五枚

右二十四味爲末蜜丸如梧子大酒服二十九日

二服不知加之酒漬服亦得

衍義

此以麻黃附子細辛湯破除陰邪爲主而兼白术

鍾乳雄烏半夏茺花甘艸激諸味振發辛烈之性

加以散血祛風破結利竅更濟以人參大力無堅  
不克但當諒其人元氣能任與否庶幾無誤治之  
失

又方

欵冬花

紫苑

乾薑

桂心

各三分

細辛

二分

杏仁

皂莢

舉石

菖蒲

烏頭

各一分

川椒

五合

吳茱萸

六合

右十二味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日三夜  
一二十年嗽不過五十日愈患欬喉鳴上氣服

一劑永瘥

前  
礬石治腹中堅癥之峻藥兼用皂莢滌除痰垢濟  
以烏椒薑辛桂萸菖杏辛烈利竅等味得欵冬紫  
苑引入肺經共襄迅掃之功自紫苑丸至此四方  
首主宿垢次兼滯血三破陰邪此攻堅癥皆蕩練  
臟腑之劑不可與尋常治嗽等論也

治肺傷咳唾膿血腸澀背痛不能食惡風目暗眩  
蹠足脛寒冷方

白膠

生薑

各五兩

桂心

人參

紫苑

各二兩

地黃

切半升

桑白皮切二升

川芎

大麻仁

飴糖各一升

大麥三升

大棗二十枚

右十二味㕮咀以水一斗五升煮麥取一斗去麥  
內藥煮取三升分五服

衍義

白膠乃楓香脂其性疏通善於開發肺氣故取以

治欬塦膿血川芎地黃得桂心和榮之力紫苑散  
結之功可無委積頓湧之虞且人參助氣於上麻  
仁滋化於下桑皮瀉肺氣之滿大麥降肝氣之逆  
大棗飴糖滋腸胃之津氣也

五味子湯 治嘔中有膿血牽胸脇痛方

五味子

桔梗

紫苑

甘艸

川斷

各二兩

桑皮

地黃

各五兩

竹茹

三兩

赤小豆

一升

義衍

右九味㕮咀以水九升煮取一升七合分三服

此火乘於肺所以喉中有膿血而胸脇牽痛乃血

不榮筋之故故用五味紫苑滋培津血桔梗桑皮

疏泄肺氣竹茹小豆清膈上火生地逐傷中血川

斷通行經絡甘艸平調中氣不獨爲火乘肺氣之

專藥并可爲熱傷肺痿之神丹

竹皮湯 治欬逆下血不息方

生竹皮

二兩

紫苑

二兩

飴糖

一斤

生地升

切一

右四味㕮咀以水六升煮取三升去滓分三服

衍義

欬逆下血而用竹茹清胃紫苑和血飴糖滋津地

黃逐血然必不經火焙之鮮者方有散血之功若

止血之用必明標乾地黃矣設無鮮者不妨以乾

者酒浸或稍加桂心熱因熱用要在臨時權變可

也

百部丸 治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根

三兩

升麻

半兩

桂心

五味子

甘艸

乾薑

紫苑

各一兩

右七味爲末蜜丸如梧子大每服三丸日三以知爲度

義衍

嗽不得息明是火逆爲患故用百部導之於上升麻散之於上薑桂之辛以散火五味之酸以斂津紫苑甘艸既能治嗽并可和血

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁

杏仁各二升

豬膏二合

蜜

飴糖各一升

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令盡  
搗如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核  
大一枚日夜六七服漸漸增加之

衍義喉中氣結似乎有物故薑汁杏仁開發肺氣飴糖  
蜂蜜豬脂并滋津血然惟大便實者爲宜

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方

好酥三十斤三遍煉停取凝當出醍醐服一合  
日三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方

三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日二夜一

衍義

肺欬而用醍醐以滋津血之燥乃治無痰乾欬之

的方一法用乳酥烊化灌鼻孔以鼻爲肺竅也

鍾乳七星散

一名吸散

治寒冷欬嗽上氣胸滿噓膾

血方

鍾乳

礬石

欬冬花

桂心等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸  
取酒送下先食服日三不止加之數試大驗又云

臨臥吸服之

又方

鍾乳

細辛

款冬花

天雄

紫苑

石膏等分

右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸之日二  
只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知小益之  
勿太多

七星散 治三十年款嗽方

款冬花

紫苑

桑白皮

代赭

細辛

伏龍肝各一兩

右六味治下篩作七星聚如蘿豆者以竹筒口當  
藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三丸凡服

四日日復作七星聚以一燭肉炙令熟以展轉藥  
聚上令藥悉徧肉上仰臥咀嚼細細咽汁令藥力  
散散割割然毒氣入咽中藥力盡總咽却取瘥止  
衍義

七星之名聚其聚形以示靈驗之意方用鍾乳溫  
肺爲主礬石滌痰欬冬下氣桂心散結利關節也

又方除去礬石桂心易入石膏佐鍾乳爲去熱之

嚮導天雄烈勝桂心佐鍾乳以破結積之氣紫苑

佐欬冬以通肺氣細辛專利關竅也又以代赭之

重以鎮逆氣佐伏龍肝之暖以散滯血其餘欬冬

紫苑桑皮細辛雖治嗽常品專藉血肉同氣之物

以爲內應獨不用豕肉者以其能助痰內動風氣  
且又七星所禁也

治嗽熏法

以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以薰黃末薄  
布艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲之作十  
枚先以火燒纏下去荻煙從孔出口吸煙咽之  
取吐止明日復熏之如前日一二止自然可瘥  
得食白粥餘皆忌

又方

薰黃一兩研令細以蠟紙并上薰黃相入調勻

卷之如前法熏之亦如上法日一二止以吐爲  
度七日將息後以羊肉羹補之

又方

藍青布廣四寸上布艾艾上布青礬末礬上布  
少薰黃末又布少鹽又布少豉末急捲之燒令  
著內燥罐中以紙蒙頭便作一小孔吸取煙細  
細咽之以吐爲度若心胸悶時略歇烟盡止日  
一二度用三捲不盡瘥三七日慎油膩

衍義三法總爲頑痰固結藥所不應者設若有沉寒則  
兼熟艾有毒熱則兼蜂蜜有積垢則兼青礬及鹽

豉等味咸取熏黃取吐以辟歹毒惡氣也

論曰凡上氣多有服吐藥得瘥者亦有鍼灸得除者宜深體悟之

灸法

嗽灸兩乳下黑白際各百壯卽瘥 又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯 又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是口合度 灸從大椎數下行第五節下六節上穴在中間卽神道穴隨年壯并主上氣灸手屈臂中橫文外骨捻頭得痛處十四壯 上氣欬嗽

短氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣欬逆短氣

風勞百病灸肩井二百壯 上氣短氣欬逆胸背痛

灸風門熱府百壯 上氣短氣欬逆胸背痛灸

巨闕期門各五十壯 上氣胸滿欬逆短氣牽背痛灸

五十壯 上氣欬逆胸痺背痛灸胸腔百壯不鍼

上氣欬逆短氣灸膻中五十壯 上氣氣閉欬逆咽

冷聲破喉灸天瞿五十壯

一名天突

逆氣虛勞寒損憂恚筋骨攣痛心中欬逆泄症腹滿

喉痺頸項強腸痔痔血陰急鼻齶骨痛大小便澀鼻

中乾煩滿狂走易氣凡二十病皆灸絕骨五十壯穴

在內踝二三寸宛宛中

痰飲第六

論一首 方四十首 灸法一首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬嘔引痛謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲

凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒卽爲虛先熱卽爲實故水在於心其人心下堅築

築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲  
水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脇下支  
滿嘔而痛水在於腎心下悸

夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下  
甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後喜虛  
耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘  
而不能眠加短氣其脈平也畱飲形不發作無熱脈  
微煩滿不能食脈沉滑者畱飲病病有畱飲者脇下  
痛引缺盆噦轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者  
如小兒掣癭狀夫胸中有畱飲其人短氣而渴四肢

歷節痛其脈沉者有畱飲也心下有畱飲其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胸中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒自泣自出其人振振身瞶劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者爲微勞榮衛氣不周故也冬自瘥一本久作久自瘥

病痰飲者當用溫藥和之

小半夏湯

病心腹虛冷遊痰氣上胸脇滿不下

葉氏食嘔逆者方

半夏一升

生薑一斤

橘皮四兩

右三味㕮咀以水一斗煮取三升分三服。若心中急及心痛內桂心四兩。若腹滿痛內當歸三兩羸弱及老人尤宜服之。一方用參二兩仲景

無橘皮人參

義衍

金匱小半夏湯治支飲不渴更合嘔吐噦中橘皮湯專取辛溫散結之味以治心腹虛冷等證總以溫理中氣爲主若心中急痛寒熱糾結加桂心以散之血虛不能以統血脹滿腹痛加當歸以和之羸弱不能自主則加人參以補之此金匱法外法

也

又方

鹽半夏一升

生薑一斤

桂心三兩

甘艸一兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

義衍

小半夏湯金匱本方只薑半二味今加桂心之散

兼甘艸之緩卽苓桂术甘湯之變法

甘艸湯治心下痰飲胸脇支滿目眩方

甘甘艸二兩

桂心

白术各三兩

茯苓

四兩

右四味㕮咀以水六升宿漬煮取三升去滓服一升日三小便當利

衍義金匱本名苓桂术甘湯此名甘艸湯傷寒門中又名茯苓湯衍義見前十一卷中茯苓湯下

十棗湯 治病懸飲者若下後不可與也凡上氣

汗出而欬者此懸飲也

方見本卷  
欬嗽篇中

小青龍湯 治病溢飲者當發其汗范汪用大青龍

湯

方見本卷  
欬嗽篇中

木防己湯 治膈間有支飲其人喘滿心下痞堅

面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不

愈者用此方

木防已

三兩

桂心

二兩

人參

四兩

石膏

雞子大  
十二枚

右四味咬咀以水六升煮取二升分二服虛者卽愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩芒硝三合微下利卽愈 一方不加茯苓

義衍趙以德註金匱方曰支飲在膈間氣血皆不通利

氣不利則與水同逆於肺而發喘滿血不利則與水雜揉結於心下而爲痞堅腎氣上應水飲腎水之色黑血凝之色亦黑故黧之色見於面也脈沉

爲水緊爲寒兆別有寒邪卽水氣之寒也醫雖以  
吐下之法治然藥不切於病故不愈用木防已以  
散畱飲結氣石膏主心肺逆氣人參助胃祛水桂  
心和榮開結且支飲得溫則行若邪客之淺在氣  
分多而虛者服之卽愈若邪客之深在血分多而  
實者則愈後必再發以石膏爲氣分之藥故去之  
芍硝爲血分藥能治痰更堅茯苓伐腎利水而爲  
芍硝之佐故加之

厚朴大黃湯 夫酒客欬者必致吐血此坐久飲  
過度所致其脈虛者必胸滿胸中本有支飲此

方主之

厚朴一尺

大黃六兩

枳實四兩

右三味㕮咀以水五升煮取二升溫分二服

衍義

此卽小承氣湯以大黃多遂名厚朴大黃湯若厚

朴多卽名厚朴三物湯此支飲胸滿必緣其人素  
多濕熱濁飲上逆所致故用蕩滌中焦藥治之

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯治之

方見十七卷  
肺癰篇中

嘔家不渴渴爲欲解今反不渴心下有支飲故也小  
半夏湯主之又有先渴卽嘔者此爲水停心下小半

夏加茯苓湯主之

小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞膈間有水

目眩悸方

半夏 一升

生薑 半斤

茯苓 三兩

右三味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓溫分

再服

胡洽不用茯苓用桂心四兩

義衍

嘔家有痰嘔盡痰去而渴者爲欲解與傷寒之服

小青龍湯已渴者寒去欲解同義今反不渴是積飲尚畱去之未盡故用半夏散結勝濕生薑散氣止嘔干金更加茯苓佐之與治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸同法

五苓散 假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而顛眩

水也此方主之

方見前九卷傷寒上

椒目丸 治腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主

之

椒目

木防己

大黃各一兩

荳蔻

二兩

右四味爲末蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三  
後稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

義衍金匱名已椒黃歷黃丸水積腸間則肺氣不宣臍  
鬱成熱而腹滿津液遂不上行而口舌乾燥用木

防已椒目葶苈利水散結而葶苈尤能利腸然腸  
胃所受水穀之氣邪實腹滿非輕劑所能治必加  
大黃以瀉之若口中有津液則水去津回可勿藥  
矣若仍作渴者此痰飲聚於血分必加芒硝以祛  
逐之

甘遂半夏湯 痘者脈伏其人欲自利利者反快  
之 雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也此方主  
之

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚以水一升煮取半升

芍藥

三枚

甘艸

一枚如指大以水一升煮取半升

右四味以蜜半升內二藥汁合一升半煎取八合  
頓服之

衍義

留飲堵塞竅隊胃氣不得轉輸故脈伏不顯若留

飲既下胃氣受傷必欲自利自利而反快者中焦

所塞暫通也通而復積故續堅滿必更用藥盡逐

之然欲直達其積飲莫若甘遂快利用之爲君欲

和脾胃除心下堅又必以半夏佐之然芍藥停濕

何留飲用之甘艸與甘遂相反何一方並用蓋甘  
艸緩甘遂之性使不急速徘徊逐其所留芍藥木

鬱土中成堅滿又佐半夏以和胃消堅也

大茯苓湯 主胸中結痰飲滯臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

茯苓

各三

白朮

各二兩

半夏

各四兩

桂心

一作人參

細辛

各四兩

橘皮

各四兩

附子

各二兩

當歸

各二兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服服  
三劑良

衍義

水飲結於臍下雖有桂苓不得生附不能破除陰  
分之水癖雖有薑半不得生朮不能祛滌胸中之  
痰氣橘皮者茯苓之佐細辛者附子之佐當歸者

桂心之佐也

茯苓湯 治胸膈痰滿方

茯苓

四兩

半夏

一升

生薑

一斤

桂心

八兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚

衍義 痰氣聚於胸中故用小半夏加茯苓湯不得桂心之辛散難以逞破的之功冷極加附子是指真陽虛者而言氣滿加檳榔是指痰氣盛者而言非謂二味可以並入一方也 胃腑嘔吐門中名半夏

湯藥味雖同而分兩不類故兩存之

大半夏湯 治冷痰飲滯胸膈中不理方

半夏

一升

白术

三兩

人參

甘艸

桂心

附子

各二兩

生薑

八兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

衍義

金匱大半夏湯但用半夏人參甘艸三味水蜜和煎以治胃反嘔吐此用參附术附桂附合苓桂术甘湯仍用金匱三味以治冷痰飲滯故不用水蜜和煎而用生薑以滌痰氣也

半夏湯 治痰飲滯氣吞酸方

半夏

吳茱萸

各三兩

生薑

六兩

附子

一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老少各半

日三

衍義

前方以中氣不運冷痰畱積故用參术佐半夏附

子此以曲直作酸故用吳萸通達肝氣以佐半夏  
附子仍用生薑開豁痰滯也

生薑

乾棗湯 治腫及支滿滯飲方

中藥經方

大棗

十枚

大戟

頭莖兩錢

大黃

甘艸

甘遂

各二兩

黃芩

二兩

芫花

蕘花

各半兩

右八味㕮咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下爲度

衍義

此卽十棗湯加用甘艸之相反激發大戟芫花逐飲之性更加蕘花以佐芫花之破積大黃黃芩以佐大戟而攻懸飲堅滯也

當歸湯 治畱飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸

人參

桂心

黃芩

芍藥

甘艸

芒硝各二兩

大黃四兩

澤瀉

生薑各三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

衍義

中氣式微不能輸運而致癖積畱著水道不利故用參甘歸芍平調血氣硝黃薑桂攻理痰積黃芩澤瀉分利支河水道而通蘊阻之熱也

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參

旋覆花

橘皮

細辛

各一兩

澤瀉

白朮

杏仁

枳實

各二兩

茯苓

半夏

生薑

柴胡

芍藥

各三兩

右十三味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服

日二

衍義

痰氣阻逆於中非開提於上不能開痰進食降濁  
升清故用旋復花杏仁疎泄肺氣半夏枳實開豁  
痰氣人參白朮健運中氣柴胡芍藥調和肝氣細  
辛橘皮開發滯氣茯苓澤瀉通調水氣使肺氣降  
而胃氣升肝氣平而穀氣運濁氣散而正氣安矣  
治胸中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔十二枚

生薑

杏仁

柑皮各四兩

半夏八兩

茯苓五兩

橘皮三兩

桔梗一錢

枳壳一錢

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

義衍

杏仁開拓胸中之氣薑半消豁膈上之痰檳榔茯

苓泄利腸中之水柑橘二皮一寒一溫升降上下

諸氣此惟病氣未固元氣未漓者宜之

吳茱萸湯 治胸中積冷心嘈煩滿汪洋不下飲

食心胸應背痛方

吳萸三兩

半夏

四兩

人參

桂心

各二兩

甘艸

一兩

生薑

五兩

大棗

二十枚

衍義

右七味咬咀以水九升煮三升去滓分三服日三  
本氣虛寒之人胸中寒熱飲瀦積所以汪洋飲食  
難於消尅蘊積而從火化所以嘈煩榮氣不能充  
於陽位所以背痛故用萸桂通陽薑半滌飲人參  
甘艸扶胃進食大棗運行脾津乃大小半夏湯之  
發源也

治胸膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴  
多嘔口中清水自出脇肋急脹痛不能飲食此

皆胃氣弱受冷故也其脈來沉弦細遲悉主之

半夏

生薑

各五兩

芍藥三兩

茯苓

四兩

旋復花

細辛

半夏

人參

橘皮

桂心

細辛

半夏

甘艸

桔梗

各二兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服病先  
有時水下者用白朮三兩去旋復若欲得利者加  
大黃二兩須微調者用乾地黃

此亦大小半夏之發源彼以胸痛引背故用吳萸  
衍義

此以脇急脹痛故用桂心又以口出清水故用旋復細辛橘皮桔梗治冷涎泛芍藥佐桂心以治脇急茯苓佐人參以扶胃弱

治冷熱久滯實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡

半夏

茯苓

生薑

各四兩

枳實

白朮

甘艸

各三兩

桂心

二兩

右八味咬咀以水八升煮取三升分三服

衍義苓桂术甘湯滌除痰飲之專藥更合之以小半夏

湯茯苓湯枳木湯但加前胡以下氣也

前胡湯 治胸中久寒澼實膈塞胸痛氣不通利

三焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱身重臥

不欲起方

前胡

人參

當歸

半夏

甘艸

各二兩

大黃

防風

麥冬

吳萸

黃芩

各一兩

生薑

四兩

杏仁

四十枚

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

深師方云若脇下滿加大棗十二枚此利水亦佳

膈胸塞痛良由冷熱不調故方中寒熱兼濟補瀉

義衍

互投而加下氣滌痰之味

旋復花湯 治胸膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花

細辛

前胡

茯苓

甘艸各一兩

生薑八兩

桂心

四兩

半夏

一升

烏頭五枚

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

義衍

此以小半夏加茯苓湯滌痰劑中加旋復前胡烏

頭桂心細辛甘艸以祛風毒然惟上熱咽乾下元虛冷者爲之合劑若熱邪固結誤投禍不旋踵不可不慎

薑椒湯 治胸中積聚痰飲食減少胃氣不足

欬逆嘔吐方

薑汁

七合

川椒

三合

桂心

四錢

附子

半夏

芩

甘艸

各一

橘皮

八錢

桔梗

射干

木

茯苓

各二

半夏

三錢

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁  
煮取二升分三服服三劑止若欲服大散諸五石  
丸必先服此湯及進黃芪丸佳 一方不用甘艸

衍義 川椒桂附入於二陳湯中但加桔梗舟楫之劑載

諸藥以破胸中冷積寒痰也

薑附湯 治痰冷澼氣嘔沫胸滿短氣頭痛飲食

不消化方

生薑

八兩

附子

四兩生  
用破四

右二味咬咀以水八升煮取二升分四服亦主卒風

衍義

於前方中但取薑汁附子二味辟除冷癖校之前方其力倍專乃乾薑附子湯之變法彼取溫中故

用乾薑此取滌痰故用薑汁兩不移易之定法

擦膈散 治心上結痰飲實寒冷心悶方

瓜蒂

二十枚

赤小豆

二十七枚

人參

甘艸各一分

右四味治下篩爲末酒服方寸七日二亦治諸黃  
衍 捩膈者撩動膈上痰飲使之上涌也方用參甘  
義 艸入於瓜蒂散中使人參助其上涌之力一舉而  
傾囊盡出也

斷膈湯 治胸中痰濶方

恒山三兩

甘艸

松蘿各二兩

瓜蒂

二十枚

右四味咬咀以水酒各一升半煮取一升半分三

服後漸減之得快吐後須服半夏

方見本卷前篇

術義斷膈者斷除膈上痰澼也瓜蒂吐膈中寒實加以

恒山涌膈止調痰松蘿乃松上女蘿氣清味苦能  
吐肝膽風痰與赤小豆之涌吐心包熱痰似同而  
異吐後服半夏湯以實中土緣恒山瓜蒂皆傷伐

胃氣也

水一升二合蜜二勺去滓取桑白皮二兩

松蘿湯 治胸中痰積熱皆除方

瓜蒂二升

松蘿二兩

甘草

各三

兩

烏梅

梔子

各十

四枚

恒山

水一升二合蜜二勺去滓取桑白皮二兩

甘草

各三

兩

半夏湯

一劑

右五味咬咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮  
取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐

卽止

衍義

松蘿湯中不用瓜蒂而用梔子以吐肺胃熱痰卽用烏梅以收斂津液與吐後用半夏湯一意

杜衡湯 治吐百病方

杜衡

松蘿各三錢

瓜蒂一枚

右三味咬咀以水一升二合漬二宿去滓分二服若一服卽吐者止未吐者更服相去如人行十里久令藥力盡服稀糜一升卽定老小用之亦佳

衍義

杜衡下氣消痰以其氣濁故用以助瓜蒂松蘿之

涌吐

蜜煎 治寒熱方

蜜 五合

恒山

甘艸 各二兩  
方用半兩

右三味取二味㕮咀以水一斗煮取二升去滓內  
蜜溫服七合吐卽止不吐更服七合勿與冷水

又方

蜜 六合

醋 八合

右二味調和平旦頓服須臾猥猥然欲吐摘之若  
意中不盡明日更服無不大嘔安穩

衍義

蜜煎恒山兼甘艸之甘緩與蜜同爲戀膈之品專  
取緩搜膈上之痰也 又方以蜜醋多服須臾兀

兀欲吐乘勢以指摘吐之以無瓜蒂恒山等傷胃  
之藥故云安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胸膈中  
痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之卽瘥方  
單煮茗作飲二三升許適冷暖飲二升須臾摘  
令吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽汁乃止  
不損人而渴則瘥

衍儀

茗味若能達清淨之腑多飲數吐則嘔膽汁亦不

損人

正合

葱白湯治冷熱膈腋發時頭痛悶亂欲吐不得

者方

葱白

二七莖

桃葉

一握一作枇杷葉

珍珠

恒山

烏頭

甘艸

各半兩

右六味㕮咀以酒水各四升和煮取三升去滓內  
珠末每服一升吐卽止

衍義

葱白烏頭能吐風痰然須恒山佐之甘艸和之葱

白桃葉引之珍珠取以安神解毒此爲安榮人安  
心而用也自撩膈散至此八方總皆一系變法

大五飲丸

主五種飲一曰畱飲水停在心下二

曰滯飲水滯在兩脇下三曰痰飲水在胃中四

曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸  
間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷  
水過多所致方

白芷

遠志

苦參

白朮

藜蘆

烏賊骨

甘遂

大黃

石膏

桔梗

半夏

紫苑

前胡

五味子

芒硝

桂心

芫花

大戟

葶苈

黃芩

貝母

人參

茯苓

當歸

芍藥各三兩

甘艸

恒山

山藥

厚朴

細辛

附子各三枚

巴豆三十枚

右三十三味治下篩蜜和丸如梧子大飲服三丸  
日三稍稍加之以知爲度

衍義

金匱有四飲之名千金有五飲之治其法則一師

曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲  
飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲千金謂之  
滌飲三曰飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出

身體疼重謂之溢飲四曰欬逆倚息短氣不得臥  
其形如腫謂之支飲千金謂之流飲四飲之外又  
有畱飲畱飲伏在心下則背惡寒畱於脇下則痛  
引缺盆平時則短氣而渴四肢歷節痛發則喘滿  
吐逆寒熱背痛腰疼目泣自出劇則振振身瞶謂  
之伏飲伏飲卽畱飲之伏而不動者千金合而言  
之則爲五飲而四飲之中支飲爲最劇其畱伏之  
飲則心脇四肢中外皆病兼有四者之患所以千  
金首列畱飲夫病人飲水多必暴喘滿食少飲多  
水停心下微者短氣甚者則悸悸則水在腎也若

心下堅築短氣惡水不欲飲水在心也吐涎沫欲  
飲水水在肺也少氣身重水在脾也脇下支滿嘔  
而痛水在肝也此槩言五飲致病五臟見證之大  
端金匱分隸而治于金兼該而行大旨水飲爲陰  
類緣其人內乏真陽雖有濕熱但蘊爲粘剝不能  
稠厚所以五飲丸中必需辛溫益氣以鼓諸藥之  
力如人參白朮附子桂心助陽藥也藜蘆恒山涌  
吐藥也大戟芫花甘遂葶藶破水藥也大黃芒硝  
攻下藥也半夏巴豆滌痰藥也巴豆不獨滌痰兼  
能涌吐所以白散用之吐中便具發散之義使軀

穀之水從皮腠而泄也其用甘艸人參芍藥專取  
相反之味以激大戟芫花甘遂藜蘆攻伐之力因  
方中攻伐之劑過多恐其津隨飲脫是以蕤蓉薯  
蕷五味茯苓之屬又爲必需其餘諸藥或相扶正  
或佐去邪總不出五種諸法以爲五飲通治也

旋復花丸 治停痰滯飲結在兩脇腹脹滿羸瘦  
不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或濇或利  
腹中搖動作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起  
頭眩欲倒脇下痛方

旋復花

桂心

枳實

人參各五分  
甘遂三分

吳茱萸

細辛

大黃

黃芩

葶藶

厚朴

芫花

橘皮

各四分

乾薑

芍藥

白术

各六分

茯苓

狼毒

烏頭

礬石

各八分

右二十味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日二後

加以知爲度

延年方無白术狼毒烏頭礬石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有

皂莢附子各二分蜀椒杏仁防葵各三分地黃四分

義衍

瘧癥結聚腹脇喜嘔乾嘔眩暈欲倒故用旋復花

開結下氣行水消痰開發肺與大腸水氣之味爲  
主其間參术桂心芫花甘遂葶苈大黃等與五飲  
丸相同者十餘味更加烏頭乾薑狼毒礬石其破  
積散滯之力不減五飲丸中大戟巴豆之烈也

中軍候黑丸 治滯飲停結滿悶目暗方

芫花

三兩

巴豆

八分

杏仁

五分

桂心

各四

桔梗

各四

右五味爲末蜜丸如胡豆每服三丸稍增得快下

止

大黃

黃芩

術義  
黑丸之名專取杏仁熬黑以滌胸中宿垢與巴豆

破積不殊并取芫花利水桂心散血桔梗上通肺氣下走大腸所以水腫先從頭面至足頭眩身熱亦取用之本經治腹滿腸鳴幽幽豈非下走大腸之一驗乎

順流紫丸

治心腹積聚兩脇脹滿畱飲痰澼大

小便不利小腹切痛膈上塞方

石膏五分

桂心四分

巴豆七枚

代赭

烏賊骨

半夏各三分

右六味爲末蜜丸如胡豆平旦服一丸加至二丸

胡治有藜蘆旋覆當歸各三分范汪方無石膏半夏有當歸一分旋覆二分茯苓三分藜蘆五分

衍義

紫丸專取代赭煅赤以鎮心下痰滯配以石膏之  
寒而化心下結熱并取半夏滌除痰飲烏賊清理  
乾血桂心分解痰血巴豆上涌冷涎下破寒積服  
此則痰水順流而下故以名方

治停痰滯飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食不  
消喜嘔乾嘔大小便或澀或利方

旋復花

大黃

附子

茯苓

木通

甘草

枳實

桂心

丁香

大腹皮

狼毒

芫花

大腹皮

狼毒

大腹皮

乾薑

薑母

大腹皮

細辛

芍藥

甘草

枳實

桂心

丁香

大腹皮

狼毒

大腹皮

芍藥

甘草

枳實

桂心

丁香

大腹皮

狼毒

大腹皮

芍藥

甘草

枳實

桂心

丁香

大腹皮

狼毒

大腹皮

右十二味爲末蜜丸如梧子大飲下三丸日三服  
後漸增

衍義金匱大黃附子湯治脇下偏痛發熱以虛寒從下而上故用大黃附子溫藥下之細辛治陰邪上逆之發熱此治停痰滯飲故加狼毒芫花枳實以佐大黃之蕩滯乾薑桂心茯苓以佐附子之破結旋復椒目芍藥以佐細辛散熱也

治風氣膈上痰飲方

用不開口苦瓠一枚湯煮三五沸以物裹熨心

膈上

義衍

苦瓠大苦大寒大傷胃氣用以湯煮熨膈者取其  
引領濁惡之氣從皮毛泄也

治結積畱飲滯囊胸滿飲食不消方

灸通谷五十壯

九蟲第七

論三首 方四十五首

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而爲人大害尸  
蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居有頭尾長  
三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰蛻蟲長一尺  
三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀  
如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟆七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰

赤蟲狀如生肉丸曰蟻蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲  
則羣蟲之主也蛇蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉  
多其母轉大至長四五寸亦能殺人內蟲令人煩滿  
肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名  
膈蟲令人多嘔赤蟲令人腸鳴蟻蟲居胴腸之間多  
則爲痔瘻則爲癩因人瘡瘻則生諸癰疽癬瘻瘍疥  
癬蟲無所不爲人亦不必盡有有亦不必盡多或偏  
有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以  
白筵艸沐浴佳根葉皆可用旣是香艸且是尸蟲所  
畏也

論曰凡欲服補藥及治諸病須去諸蟲并痰飲宿滯

醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力

只蟲泄

治肝勞生長蟲在肝爲病恐畏腹中不安方

鹽蠟

吳茱萸東行根皮各三兩

乾棗四兩

雞子五枚去黃

粳米粉半斤

飴右五味搗吳茱萸皮爲末和藥銅器中煎可丸如  
小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小兒服五十丸

蟲當爛出

集驗方無吳茱萸根名雞子丸

衍諸蟲皆從濕熱生化濕熱之治莫善於風藥然蟲

之濕皆屬內因內因之濕仍須治內風之藥方

可直達病情如肝勞生長蟲則用蜂蠟至淡之味  
以散濕熱之病吳茱萸根走肝取東南走巽位者  
以通風氣而治內風乾漆殺蟲然非穀肉之味投  
其所喜不能引入其口使之爛出也

治心勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心爲病

方

雷丸

橘皮

桃仁

一作桃皮

石蠶

各五分

狼牙

六分

貫衆

二枚

殭蠶

三七分

蕪荑

青葙

乾漆

各四分

亂髮

如雞子大燒

吳茱萸根皮

七分

右十二味爲末蜜丸如梧子大空腹苦酒下七丸  
加至二七丸日二服 一方無石蠶

衍義治蟲諸藥如狼牙貫衆蕪夷青葙乾漆吳茱萸根皆能殺蟲獨雷丸專治心勞生蟲者昔有道士治楊勔應聲蟲得此而愈以心爲虛靈之藏言者心之聲故其所生之蟲亦靈慧而能應聲也

治脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔下蟲方

大麻子

八升

東引吳茱萸根

一尺

橘皮

二兩

右三味咬咀以水煎臨時量服凡合禁聲勿語道

作藥蟲當聞便不下切忌之

衍義萸根橘皮殺蟲得大麻子引入脾經誘入其口而

殺之

治肺勞熱生蟲在肺爲病方

狼牙

三兩

吳茱萸根白皮

五合

東行桑根白皮

切一升

右三味咬咀以酒七升煮取一升平旦頓服之

衍義狼芽萸根得桑根白皮引入肺經以殺其蟲爲寸

白專藥

治腎勞熱四肢腫急燒蟲狀如菜蟲在腎中爲病

方

白蕪荑

胡粉

槐皮

乾漆

二兩

貫衆

三枚

杏仁

四十枚

吳萸

五十枚

右七味治下篩平旦以井花水服方寸匕加至一  
匕半瘥止

衍義  
蕪荑乾漆貫衆吳萸雖皆殺蟲之品得胡粉引入  
於腎始能中的從甘艸粉蜜湯中採出

治蟻蟲方

以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸宿

不食空心頓服之

又方

珍珠二兩

亂髮

如雞大  
燒末

右二味治下篩以苦酒調旦起頓服之

肘後方用  
治三蟲

衍義

鹽醋皆日用之品惟是專用二物之鹹酸便有化

蠶之功效

蟲乃血之所化故用髮灰以散滯血

珍珠以散濕熱貴賤所稟不同主治不能無異

靡蕪丸 治少小有蛻蟲結在腹中數發腹痛微

下白汁吐悶寒熱飲食不生肌皮內瘡黃四肢

不相勝舉方

麝蕪

貫衆

雷丸

山茱萸

天冬

狼牙

各八分

藿蘆

甘菊

各四分

右八味爲末蜜丸如大豆三歲飲服五丸五歲已上以意加之漸至十九丸加藿蘆六分名藿蘆丸治老小及婦人等萬病腹內冷熱不通急滿痛胸膈堅滿手足煩熱上氣不得飲食身體氣腫腰腳不遂腹內狀如水雞鳴女人月經不調無所不治

衍義本經言麝蕪辟邪惡除蟲毒取其辛散也貫衆雷丸狼牙藿蘆皆殺蟲之味山茱萸既能治心下邪

丸狼牙藿蘆皆殺蟲之味山茱萸既能治心下邪

氣亦能斂肝腎精血天冬能殺三蟲去伏尸又能  
強骨髓甘菊能治惡風濕痺蟲乃風濕所化雖無  
殺蟲之功能散濕熱卽蟲失所養必隨諸殺蟲藥  
而下出矣

治蛇蟲方

藿蘆末以飲臍和服方寸七不覺加之

備急方 治蟯蟲

治熱患有蛇蟲懊惱方

藿蘆十分

乾漆

萹竹

各二分

右三味治下篩米飲和一合服之日三

治蛇蟲在胃中漸漸羸人方

乾棊外臺

醇酒

白蜜各一升

右三味內銅器中微火煎令可丸如桃核一枚溫  
酒中宿勿食旦服之蟲必下未下更服

外臺治  
燒蟲

又方

取棟實內醇苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中  
入三寸一日易之

集驗方用  
治長蟲

治蟻蟲攻心腹痛方

剉薏苡根二斤以水七升煮取三升先食服之

蟲卽死出

又方

鶴蠭爲末苦酒空腹服方寸七佳

又方

七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸七  
日三卽瘥

義衍

蘆殺蟲借臚引入蟲口 蘆走氣分更益以

乾漆破血萹竹殺蟲化濕熱 乾漆殺蟲酒蜜投

蟲所好 苦棟殺蟲浸酒入綿以內穀道專主肛

門之嬖 蒼朮根逐濕下行能治濕熱生蟲之善

藥 鶴蠭苦寒殺蟲得苦酒之酸收使不逆上然

須用天名精子爲眞否卽是僞 刺蒺藜治惡血

王金之術卷之六  
破癩痕積聚專祛風木之邪能治內濕生蟲之專味

### 治寸白蟲方

吳茱萸細根一握

熟搗

大麻子三升

熬搗末

右二味以水三升和搗取汁平旦頓服至巳時與好食令飽須臾蟲出不瘥明日更合服之不瘥三

日服

肘后治三蟲以酒漬取汁服

### 又方

蕪靡六分

狼牙四分

白蘞二分

右三味治下篩以苦酒二合和一宿次早空腹服

之

又方

胡麻一升

胡粉一兩

右二味爲末平旦空腹以豬肉臘汁啜盡卽瘥

又方

以榧子四十九枚去皮月上旬平旦空腹服七  
枚七日服盡蟲消成水永瘥

又方

以吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸  
一宿平旦分二服凡茱萸皆用細根東引北陰

者良若如指以上大不任用

又方

用石榴根如茱萸法亦可水煮服

又方

麻仁五升搗取汁分五服亦治小兒蛻蟲

又方

以好麻油二升煎令熟內葱白三寸令黑便熟

冷頓服之

又方

蒸餠令十分燥作末以方寸七內羊內臚中服

又方

桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食  
平旦空腹頓服之

又方

檳榔二七枚治下篩以水二升半先煮其皮取  
一升半去滓內末頻服暖臥蟲出或不盡更合  
服取瘥止宿勿食旦服之

義衍

萸根走肝麻仁入脾肺故治寸白有效  
牙治蟲猛藥白斂散結止痛能解風氣百疾  
胡

麻胡粉皆入於腎隱曲生蟲之專藥 椒子殺肺  
中寸白 荚根細者行於經絡以治腠理之蟲  
石榴根善透石罅故能治竅隧之蟲 大麻花治  
惡風毒血故其仁亦能治風殺蟲 麻油解毒葱  
白散風蟲亦風毒所化縱非治蟲之藥實爲治蟲  
之用專取其潤而導之使下也 銀糖濕熱之味  
雖熬本性猶存羊臍之膻投蟲所喜而爲匱濕同  
氣之治 桑根一味大泄肺氣故能下蟲非湯藥  
中配入他藥之比然必生者乃效 檳榔泄胸中  
至高之氣破腹中委積之蟲總取獨用以擅專功

論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸  
胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒齦無  
色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當  
數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者心內懊憹  
痛悶此蟲在上蝕其五臟下脣內生瘡者其人喜眠  
此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不爾  
蠶蟲殺人又曰凡患濕蠶者多是熱病後或久下不  
止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此  
病亦有乾蠶不甚瀉利而下部瘡瘻不問乾濕久則  
殺人凡濕得冷而苦利單煮黃連及艾葉苦參之屬

皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眼煩憒  
不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上  
不以上部爲意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛見五臟便  
死燒艾於竹筒熏之

治傷寒、蠶病方

取生雞子小頭叩出白入漆灰一合攬令極調  
當沫出更內著殼中仰吞之食傾或半日乃吐  
下蟲劇者再服蟲盡熱除病愈

衍義傷寒、蠶病多由熱傷榮血血結蟲聚令人狐疑昏  
惑勢劇難堪者卽以漆灰破血爲主調雞子生吞

引入肝經血分

治濕蠶方

黃連 十分

生薑 十分

苦參 四分

青艾葉 八分

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服久者服  
三劑

衍義

蠶乃濕熱蘊化故以黃連苦參苦燥之味療其濕  
熱兼取艾之純陽薑之辛散爲同氣之內應毋問

何蠶無不宜之

懊憹散 治濕蠶瘡爛殺除蠶方

荊竹

半兩

藿蘆

雷丸

青葙子

女青

桃仁

各三兩

右六味治下篩粥飲服方寸七日三加至二七亦可酒服

衍義懊懨亦是蟲匿爲患故用荊竹藿蘆殺氣分蟲雷

丸青葙子女青桃仁破血驥也

青葙散 治熱病有匿下部生瘡方

青葙子

一兩

橘皮

荊竹

各二兩

藿蘆

四兩

甘艸

一分

狼牙

三分

右六味治下篩米飲和每服一合日三不知稍加

之小品無  
甘艸

衍青葙葛竹蘆蘆狼牙治瘻專藥橘皮甘艸調和中氣以行藥力

薑蜜湯

治濕瘻方

生薑汁

五合

白蜜

三合

黃連

三兩

右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

衍義方中一寒一熱分解濕熱借蜜引入蟲口濕熱之

瘻無容身之地矣

治瘻蝕下部癢穀道中生瘡方

阿膠

當歸

青葙子

各二兩

艾葉

一把

義

青葙治蟲艾葉導熱阿膠當歸以和其血

合四一

杏仁湯

治蠶方

杏仁

五十枚

苦酒

二升

鹽

一合

右三味和者取五合頓服之小兒以意量之

義

杏仁上散肺氣下走大腸借酸鹹以收上逆之氣

桃皮湯

治蟯蟲蛔蟲及痔蠶蟲食下部生瘡方

桃皮

艾葉

各二兩

槐子

三兩

右四味㕮咀以水三升煮取半升頓服之良

衍義 桃根白皮散血殺蟲艾葉溫血導火槐子益腎清

火大棗入脾以通津液

猪膽苦酒湯 治熱病有蠶上下攻移殺人方

猪膽一具苦酒半升和之火煎令沸三上三下  
藥成放溫空腹飲三滿口蟲死便愈

衍義 蠶本肝家濕熱所化猪膽專治肝膽之熱以苦酒

和之乃猪膽導之變法

治濕病下部有瘡蟲蝕人五臟方

雄黃

皂莢

各一

麝香

硃砂

各二

右四味爲末蜜和搗萬杵初得病酒服如梧子大  
一丸日二若下部有瘡取梧子大末內下部日二  
衍義雄黃解毒殺蟲皂莢滌飲開癰麝香和榮利竅硃  
砂辟邪以安神氣

雄黃兌散 治時氣病墮下部生瘡方

雄黃

半兩

桃仁

一兩

青葙子

黃連

半兩

苦參

各三

右五味爲末綿裹如棗核大內下部亦可煮汁服

治大孔蟲癢方

蒸大棗取膏以水銀捻和長三寸綿裹訖塞內  
大孔中明日蟲皆出水銀損腸宜慎之

治傷寒熱病多睡變成濕瘡四肢煩疼不得食方  
羊桃十斤切搗令熟暖湯三斗淹浸之日正午

時入中坐一炊久不過二度瘥

治熱病蛇毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利  
膿血當數視其人下部孔稷稷然一云搜然赤卽  
匿瘡也劇困殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之

之方

以泥作小釀令受一升竹筒一枚如指大一頭  
橫穿入釀腹中一頭內入穀道中淺入可取熟  
艾如雞子大著釀中燃之於釀口吹煙令入人  
腹艾盡乃止大人可益艾小兒減之羸者勿多  
多亦害人日再熏不過三作蟲則死永斷亦可  
末燒雄黃如此熏之

衍義下部匿瘡雄黃兌散最捷方中雄黃殺蟲桃仁散  
血黃連苦參專解濕熱水連蘖青黛散濕熱麝香  
達竅隧丁香開導熱邪之去路 桃葉殺蟲下導  
上含俱無妨礙 削生薑導以楸葉裹內下部如

治大孔蟲癢方

蒸大棗取膏以水銀捻和長三寸綿裹訖安內  
大孔中明日蟲皆出水銀損腸宜慎之

治傷寒、熱病多睡變成濕瘡四肢煩疼不得食方  
羊桃十斤切搗令熟暖湯三斗淹浸之日正午  
時入中坐一炊久不過二度瘥

治熱病蛇毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利  
膿血當數視其人下部孔稷稷然一云搜然搜赤卽

瘡也劇困殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之

之方

以泥作小釀令受一升竹筒一枚如指大一頭  
橫穿入釀腹中一頭內入穀道中淺入可取熟  
艾如雞子大著釀中燃之於釀口吹煙令人入人  
腹艾盡乃止大人可益艾小兒減之羸者勿多  
多亦害人日再熏不過三作蟲則死永斷亦可  
末燒雄黃如此熏之

衍義

下部瘡瘍雄黃兌散最捷方中雄黃殺蟲桃仁散  
血黃連苦參專解濕熱水連蘖青黛散濕熱麝香  
達竅隧丁香開導熱邪之去路桃葉殺蟲下導  
上含俱無妨礙削生薑導以楸葉裹內下部如

無楸葉桃葉亦可代用不必二葉並裹也 胡粉  
入腎雄黃入心爲殺陰毒瘍瘍之專藥 馬蹄散  
血辟惡殺蟲亦可應用 水銀爲殺蟲猛藥雖和  
棗膏見熱本質猶動大能損腸故云宜慎 羊桃  
壓丹石毒亦能化蟲瘍 艾熏以辟下部陰瘍加  
雄黃尤效

孫真人千金方衍義卷十八 終