

內景篇

小便

大便

東醫寶鑑 卷四上  
下

東醫寶鑑內景篇卷之四上

東醫忠勤貞亮扈

聖功臣崇祿大夫陽平君

許浚

奉教撰

小便

小便原委

靈樞曰水穀者常並居胃山成糟粕而俱下于大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下

焦而滲入膀胱焉○內經註曰水液自迴腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而爲尿以泄出也○

難經註曰水穀自小腸盛受於闌門以分別也其

水則滲灌入於膀胱上口而爲洩便詳此三說則

小便卽泌別之水液滲入膀胱以出者也內經曰

飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則小便又似水飲精微之氣上升肺脾運化而後成者也夫洩尿者水也水

之 下 流 其 性 則 然 也 飲 入 於 胃 其 精 氣 雖 上 升 其  
本 體 固 不 能 上 升 則 豈 可 謂 小 便 獨 為 氣 化 所 成  
哉 內 經 曰 膀 胄 者 津 液 藏 焉 氣 化 則 能 出 矣 且 水  
者 氣 之 子 氣 者 水 之 母 氣 行 則 水 行 氣 滯 則 水 滯  
或 者 謂 小 便 純 由 泌 别 不 由  
運 化 蓋 不 明 此 理 故 也

**脬爲尿器** 膀胱雖曰津液之府至於受盛津液則又有  
膀胱而居膀胱之中焉故內經曰脬移熱於膀  
胱靈樞曰膀胱之脬薄以濡類纂曰膀胱者脬之  
室也夫脬之居於膀胱也有上口而無下口津液  
既盛於脬無由自出必因乎氣化而後能漸漬浸  
潤於胞外積於脬下之空處遂爲尿以出於前陰  
也若曰脬下無空處則人尿急時至廁安能卽出  
乎夫惟積滿脬下之空處而不可再容故急急則  
至廁卽出矣

# 辨尿色

水液渾濁皆屬於熱○小便黃者小腹中有熱也○肝熱病者小便先黃○足陽明之脉病氣

盛則尿色黃黶○疽證小便如黃柏汁點○小便有五色惟赤白色者多赤色多因酒得之白色乃下元虛冷證○下焦無血小便澁數而黃

癟○

小便不禁赤者有熱白者氣虛

# 脉法

少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣脈○腎脉滑實爲癃瀆

二證之的証

○遺精白濁當驗於尺結朮動緊

在膀胱

○兩尺脉洪數必便濁遺精癟○淋脉

盛大而實者

生虛細而澁者死黶○癃病脉細不

治瞤○

淋病之脉細數何妨少陰微者氣閉膀胱

女人見之陰中生瘡大

實易愈

虛澁則亡

# 小便難外候

候其鼻頭色黃者小便必難臚○候其鼻準色黃者知其小便難也癟

東醫寶鏡

卷四

# 小便不利

陰虛則小便難艸○小便澁者血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜補

陰降火四物湯

加知母黃柏

心火○小便難者出不快也

經曰陽入陰分則膀胱

小便澁數而黃四物湯

加知母黃柏牛膝甘草稍

熱而小便難惟陰分虛而陽熱乘之若小便黃赤

則萬全木通散利之

利之

若大便泄瀉而津液澀少者一也宜利而已若熱

搏下焦津液不能行者二也必滲瀉乃愈若脾胃

氣滯不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順

氣令施化而出宜茯苓琥珀散

○上盛下虛小

便赤澀或欲成淋宜清心蓮子飲

治小便澀溺

○上盛下虛方見

得效○○腎虛小便數而澀

○如欲滲之狀宜平補元氣

# 萬全木通散

治膀胱有熱小便難而黃滑石二錢木通赤茯苓車前子炒瞿麥各一錢右爲

末水煎服或取末

三錢水調服

臘

茯苓琥珀散

治小便澀數宜滲泄分利之澤瀉一兩滑石七錢赤茯苓白术琥珀猪苓各五

錢肉桂甘草炙各三錢右爲末每三錢以

長流甘爛水一盞調下以美餽壓之

平補元

治小便數而瀝如欲滲漏或遺尿不禁兔絲子酒製山茱萸酒浸焙當歸益智仁各五錢

川練肉牛膝胡蘆巴炒杜仲薑汁炒巴戟肉蔻蓉

酒浸各三錢半乳香二錢右爲末糯米糊和丸梧

子大棗湯或鹽

湯下五十九

指

一方

治心經蓄熱小便赤澀梔子仁大黃煨

連翹甘草各等分右剉

五錢水煎服

湯

小便不通

胞移熱於膀胱則癃尿血癪○膀胱不利爲

癃納八正散加木香主之

足厥陰之脉

過陰器所生病遺尿閉癃督脈者女子入繫挺孔其孔尿孔之端也其生病癃痔遺尿是二經者大陽之別也入絡膀胱約下焦實則癃閉虛則遺尿囉△閉癃合而言之一病也分而言之有暴久之殊蓋閉者暴病爲尿點滴不出俗呼小便不通是也癃者久病爲尿溢淋瀝點滴而出一日數十次或百次名爲淋病是也囉△熱在下焦填塞不便其證小便閉塞而不渴時見躁者是也囉△小便不通有氣血之異如渴而小便不通者熱在上焦氣分宜清肺散如不渴而小便不通者熱在下焦血分宜滋腎丸疎△小便不通贍下狀如覆碗痛悶難堪治法有二如氣不能化而不通則陳皮茯苓湯調木香沉香末二錢空心服兼用吐法以提之如血污於下而不通則用桃仁承氣湯之類貽小便以破之囉○夫熱則不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絕無其熱微者小便難而僅有蘊○小

便不通乃血滯致氣不通而竅滯宜導氣除燥湯  
棟○小便不通宜五苓散方見傷寒導赤元地膚子湯

宣氣散通關丸猪苓湯

加味五苓散透泉散

八正散

治膀胱熱積小便癃閉不通大黃木通瞿麥  
萹蓄滑石梔子車前子甘草各一錢右剉作

一貼入燈心一錢

空心水煎服

焗

清肺散

治渴而小便閉猪苓通草各一錢半赤茯苓  
澤瀉燈心車前子各一錢萹蓄木通瞿麥各

七分琥珀五分右剉作

一貼空心水煎服

棟

滋腎丸

治不渴而小便閉黃柏知母並酒洗焙各一  
兩肉桂半錢右爲末水丸梧子大空心白湯

下百丸一名泄腎丸△一人病小便不通腹脹  
腳腫雙睛凸出晝夜不眠苦痛不可言且苦嘔噦

衆醫無效東垣曰膀胱者津液之府氣化則能出  
矣小便癃閉是無陰而陽氣不化者也此人奉養  
太厚膏梁積熱故膀胱者腎之府久而乾涸小便  
不化今內關外格之病悉具死在朝夕但治下焦  
其疾自愈遂處此方服之

須臾尿出如涌泉卽差

導氣除燥湯

治小便不通赤茯苓一錢半黃柏一錢  
二分滑石知母澤瀉各一錢右剉作一

貼入燈心一錢

空心水煎服

五錢

導赤元

治膀胱有熱小便不通大黃一兩半炒梔子  
一兩二錢木通生乾地黃各八錢赤芍藥赤

茯苓滑石各四錢右爲末蜜丸梧子大以  
導赤散五味煎水空心吞下三五十丸

指

地膚子湯

治下焦熱結小便不通地膚子一錢知母  
黃芩冬芩瞿麥枳實升麻通草各葵子海

藻各七分右剉作一貼空心水煎服○女人房勞

後小便不通脈沉細用猪腎半隻同煎服最效

### 宣氣散

治癰閉急痛甘草梢木通各三錢梔子二錢葵子滑石各一錢右末三錢燈心湯調下心

### 通關丸

治小便不通黃柏知母並酒炒滑石各二兩木通一兩肉桂一錢右爲末水丸梧子大空

心白湯下

百丸

鑿

### 豬苓湯

治熱結小便不通猪苓木通澤瀉滑石枳殼黃柏酒浸牛膝麥門冬瞿麥萹蓄車前子各

七分甘草三分右剉作一貼

入燈心一錢空心水煎服

糲

### 加味五苓散

治虛寒小便不通五苓散料等分加當歸枳殼牛膝木通甘草梢亦等分右剉

入燈心一撮空

心同煎服

糲

透泉散

治小便赤澁不通滑石一兩芒硝甘草各五錢琥珀二錢半右細末每二錢空心以燈心

煎湯調

下  
熱

老虛人癃閉

年老人小便不通多是氣短血少四物湯加黃芪煎水吞下滋腎丸空心飄○

老人氣虛小便不通四物湯加黃芪人參吞下滋腎丸飄○老人虛人小便不通琥珀末以人參赤

茯苓煎湯調

空心服

調

癃閉宜吐

小便不通屬氣虛血虛有實熱有痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋

氣承載其水也氣虛用參术升麻血虛用四物痰

多二陳皆先服後探吐之實熱當利之用八正散

方見○一人病小便不通諸藥無效丹溪曰此積

痰病也積痰在肺肺爲上焦而膀胱爲下焦上焦

閉則下焦塞比如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以二陳湯先飲大吐之病如失瀉△痰多阻滯水道不通二陳湯加香附子木香木通煎之先服一盞以餘渣探喉中吐之以提其氣氣升則水自降○實熱不通砂糖水

調黑牽牛一二錢服探吐之

### 癃閉宜瀉

實熱癃閉用八正散蓋大便動則小便自通矣丹○水道不行其本在腎合用牽牛

澤瀉其末在肺合用葶苈桑皮更以木通滑石佐之又能透達雖然大便小便脈絡相貫人有多患

小便不通但用神保元氣門丸三花神祐丸並見通利○實熱尿閉宜用導水丸三花神祐丸並見

### 轉脬證

轉脬證候臍下急痛小便不通凡強忍小便或

房使水氣上逆氣迫於脬故屈戾而不得舒張也脬落卽知補△轉脬證候孕婦多有之患在忍縮

小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不得出膀胱淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦累急頻併似痢非痢必以手按臍下庶可立出小便甚者因此腹脹浮腫治法用涼藥疏利中腸中熱仍與泄大腸迨其腹中攬痛大便大下則尿脬隨卽歸正小便自然順流直指△胎婦轉脬之病稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方用滑利疏導藥鮮有應效因思脬爲胎所墮展在一邊脬系了戾不通爾胎若舉起懸在中央脬系得疏水道自行一婦患此診之兩手以濇重取則絃此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲遂以四物湯加參术半夏陳皮甘草生薑空心煎服隨以指探喉中吐出涼汁俟少頃又與一貼次早亦然如是與人貼而安此法恐偶中後歷數數人皆驗丹○轉脬宜二石散加大通車前子等分煎服仍施

陰陽熨法△轉脬用蒲黃散滑石散葱白湯○  
老人脬轉困篤欲死六味地黃丸倍澤瀉服之效

方見

○孕婦脬

轉宜參术飲

二石散

治脬轉入力目不得尿滑石寒水石葵子各一盞水十盞煎至五盞空心分二服臥

蒲黃散

治脬轉不得尿蒲黃滑石各等分爲末每二錢雞子清調下

醫鑑

滑石散

治脬轉不得尿寒水石二兩滑石亂髮灰車前子木通各一兩葵子一合右剉水一斗煮

取五升每服一升

日三次卽通

葱白湯

治小便卒暴不通小腹膨脹氣上衝心悶絕欲死此因驚憂暴怒氣乘膀胱鬱閉而脬系

不正陳皮三兩葵子一兩葱白三莖

右剉水五升煮取二升分三服

參术飲

治孕婦轉脬小便不通四物湯料加人參白术半夏陳皮甘草各一錢右剉作一貼入生薑三片大棗二枚水煎空心服服後探吐之瀨○

一方葵子梔子炒滑石各五錢木通三錢右剉作一貼水煎空心服外以葵子梔子滑石爲細末入

田螺肉搗膏或生葱汁調貼腦中立通癟○一孕婦九月轉脬尿閉脚腫形瘁脈左稍和而右澁此

以飽食氣傷胎系弱不能自舉而下壓膀胱故閉而不通以人參白术當歸芍藥陳皮半夏甘草煎

服四貼次早煎渣頓服探吐小便大通皆黑水瀨○一孕婦轉脬脉細氣弱胎壓膀胱下口用補藥

恐加急滿令產婆以香油抹手入產門托起其胎尿出如注瀨○又法將孕婦倒豎起胎自墜轉其尿注出勝於手托瀨

關格證

邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣邪在五臟則陰脉不和陰脉

不和則血畱之血畱之則陰脈盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營故曰格陽氣太盛則陰氣不得相

營故曰關陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡其命而死矣

靈樞

○關則不得小便格則吐

逆關者甚熱之氣格者甚寒之氣無出曰關無入曰格寒在胃中遏絕不入熱在下焦填塞不便

○陰陽易位病名關格寒在胸中水漿不下故曰格熱在丹田小便不通故曰關嶠○關者不得小

便格者吐逆上下俱病也

○內經曰人迎脈大

於氣口四倍名曰格氣口脉大於人迎四倍名曰

關○兩寸俱盛曰關格其證嘔逆而小便不通者

是也

○此證多死寒在上熱在下故也

○大便不通亦謂之陰陽關格乃三焦約之病也凡

大小便不通內經謂之三焦約約者不行也長流

水煎入正散服之

○聚

關格者謂膈中覺有所碍

欲升不升欲降不降欲食不食此爲氣之橫格也

**鑑**○關格宜芒硝湯大承氣湯勦覲中虛者補中益氣湯加檳榔以升降之痰格者枳縮二陳湯

### 芒硝湯

治關格不通芒硝二兩半滑石三兩冬葵子炒三合右以滑石葵子爲末取五錢水煎

至半入芒硝一錢

再一沸空心服

### 枳縮二陳湯

治關格上下不通此痰膈中焦也服此出痰枳實一錢川芎八分縮砂白茯苓

貝母陳皮蘇子瓜萎仁厚朴梗香附子各七分木香沉香各五分甘草三分右除二香剉作一貼薑三片同煎入竹瀝及沉香

木香濃磨水調和服之

鑑

### 關格宜吐瀉

關格必用吐以提其氣之橫格不必在出痰也有痰者二陳湯勦覲探而吐之

中氣虛而不運者補中益氣湯加木香檳榔以升降之訛○陰陽關格前後不通大便快利則小水

自行鉤○關格死在朝夕但治下焦可愈宜大承氣湯○方見寒門一婦人忽吐逆大小便不通煩

亂四肢漸冷無脈與大承氣湯一劑至夜半漸得

大便通脈漸和翌日乃安此關格之病極爲難治

垂死而活只此一人耳△關格忌用淡滲利小

便之藥門○一小兒小溲不通號跳旋轉下則成

砂石大便秘肛門脫出一二寸戴人曰此下焦寒

也不吐不下則下焦何以開不令飲水則小溲何

以利以調胃承氣湯一兩加牽牛子頭末三錢河

水煎服又用菰蒂末糊丸芥子許六十丸吞下上

吐下瀉一時齊出有膿有血涌泄既定令飲

新水二三十次每次飲一盞其病如失利

洗熨法陰陽熨法又名冷熱熨法治脬轉及二便不

數又以冷物熨之自通門○治脬轉小便不通生

薑葱白紫蘇葉各一握煎湯密室內熏洗小腹外

腎肛門等處再溫再洗拭乾於綿被仰坐垂脚自舒其氣次用赤茯苓赤芍藥白芍藥各三錢蜀葵子一錢半右剉一兩煎水調蘇合香丸方銳門三丸并青鹽末半錢空心溫服卽效方○小便難小腹脹不急治殺人葱白三斤細剉炒熟以柏子包分兩裹更替熨臍下卽通方○又炒鹽半斤囊盛熨臍下亦通方○產後小便不通腹脹如鼓悶亂不省此由產時尿脬運動不順用鹽填臍中葱白十餘根細切厚鋪鹽上用大艾炷灸之

覺熱氣直入於腹內卽通神驗○

### 掩臍法

轉脬一證諸藥不效失救則死以甘遂末水

調脬下內以甘草節煎湯飲之及藥汁至

臍二藥相反脬自轉矣小水來如泉涌此救急之良方也但二藥須兩人各買各處剉之不可一處同置爲妙方○小便閉大田螺生擣細封臍上卽

通方○治小便不通麝香半夏末填臍中上用葱

白田螺

二味擣成餅封臍上用布線縛定下用皂角入陰中自通女人用皂角煎湯洗陰戶內

烟

入陰中自通女人用皂角煎湯洗陰戶內

○治小便不通通臍法以白磁瓶滿盛水以有字紙七重密封瓶口於患人臍內用鹽一捻填之倒

置瓶口

覆在臍上偃卧如覺冷小便卽通

○治小便癃閉不通宜貼臍膏煩通關散

通關散

治小便不通白礬生白鹽各二錢半右研勻

難治不治證

嘔噦而小便不通者難治中滿鼓脹病小小

便不通

爲下焦血氣乾者死蹶○老人氣虛短作小

尿頭無汗者

可治有汗者死蹣○頭汗內外關格

小便不通

此爲陽脫不治蹣○凡關格見頭汗者

死蹣○傷寒熱病及風溫狂言直視

遺尿者死蹣△膀胱不約爲

小便不禁

遺尿者尿出不自知覺也瞞△膀胱不藏也註日

水泉者前陰之流注也納△腎與膀胱俱虛內氣不充故脬中自滑所多出而色白焉是以遇夜而陰盛愈多櫛○下焦蓄血與虛勞內損則便尿自遺而不知櫛○下焦虛寒不能溫制水液則便尿欲出而不禁櫛○肺氣虛則尿色變卒遺失無度乙卯○內經曰水之本在腎其末在肺則知天之一水自上而下相爲貫通也櫛○經曰下虛則遺尿下虛謂膀胱下焦虛也仲景曰下焦竭則遺尿夫便其氣虛不能自禁制也又云下焦不歸則遺溲世用桑螵蛸雞肫胫之類是也瞬○小便遺失者肺氣虛也宜安卧養氣禁勞役以參芪補之不愈則當責有熱用黃柏生地黃瞬○小便不禁色赤爲熱色白爲虛仄△小便無度或淋瀝不禁乃陰挺痿痺也六味地黃丸効去澤瀉加益智仁翻觀寒虛者五苓散合四物湯効門加山茱萸五味○小便不禁屬熱屬虛熱者五苓散合解毒湯効翻觀寒虛者五苓散合四物湯効門加山茱萸五味

子母○下虛內損而不禁宜補膀胱陰血瀉火邪爲主加減入味九六味地黃元加知母黃柏五味

子補陰丸最妙防癰○虛冷不禁遇夜愈多宜縮

泉元秘元丹老人虛人宜五子元家韭子元參芪

湯產後遺尿宜補脬飲猪脬湯小兒遺尿宜雞腸散

散雞肫胫散通用大兒絲子元茸香元旣濟丸○傷寒遺尿中

暑遺尿

各門

縮泉元

治脬氣不足小便頻數一日百餘次烏藥益智仁等分爲末酒煮山藥糊和丸梧子大臨

卧鹽湯下

七十九

秘元丹

治虛損小便不禁危急者

櫟門

五子元

治小便不禁遇夜愈多頭眩腳弱者人虛人多有此證大能耗人精液令人卒死兒絲子

酒製韭子畧炒益智仁茴香炒蛇床子炒各等分  
右爲末酒糊和丸梧子大糯米飲下五七十九微得

### 家韭子元

治腎陽衰敗脬冷遺尿不禁家韭子畧炒

六兩鹿茸燎去毛四兩肉蓯蓉酒浸牛膝

酒浸熟地黃當歸酒洗各二兩兎絲子酒製巴戟  
各一兩半杜仲炒石斛酒洗乾薑炮桂心各一兩

右爲末酒糊和丸梧子大空

心溫酒或鹽湯下百丸

### 參芪湯

治氣虛遺尿人參黃芪蜜炒白茯苓當歸熟地黃白术陳皮各一錢益智仁研八分升麻

肉桂各五分甘草三分右剉作一貼薑二

片棗二枚水煎空心服老人加炮附子

附子糊

### 補脬飲

治婦人因產傷脬小便不禁或漏濕不乾或

小便不利黃絲絹生者一尺剪碎白牡丹根

皮末二錢

糞葉者

白芨末一錢右水一椀同煎至

絹爛如錫空心頓服服時不得作聲作聲無效

微得

猪脬湯

治婦人因產脬破小便不禁人參白朮各二錢桃仁陳皮黃芪白芍芩川芎當歸各一錢

右剉作

一貼入猪脬或羊脬同煎空心服

○一

婦人難產因收生者不謹以致尿脬損破得小便

淋瀝病遂爲廢人予思之肌肉破傷在外者尙可補完脬雖在腹恐亦可治診其脈虛甚試與峻補

以此方煎以猪羊脬湯極飢時飲之一月而安蓋是血氣驟長其脬自完恐稍遲亦難成功也

雞腸散

治小兒遺尿不禁多因脬寒或稟受陽氣不足故也

雞腸燒牡蠣粉白芍芩桑螵蛸蒸各

五錢

桂龍骨各二錢半右剉每二錢薑三片

棗二枚

水煎空心服或爲末一錢米飲調服

得

雞肫胱散

治小兒遺尿雞肫胱一具雞腸一具燒存

大兒絲子元

治脬氣虛寒小便不禁兒絲子酒製肉蓯蓉酒浸各二兩牡蠣煅五味子附子

炮鹿茸酒炙各一兩桑螵蛸酒炙雞肫脰炙各五錢右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒或鹽湯下

九  
丸  
瓣

茸香元

(治虛損遺尿不禁或虛冷尿多雞內金炙七錢半鹿茸酥炙肉蓯蓉酒浸當歸酒洗各五

錢龍骨煅牡蠣粉巴戟赤石脂禹餘糧煅醋淬研白薑益智仁乳香各二錢半右爲末糯米糊和丸

梧子大空心鹽

湯下七十丸

鹽

既濟丸

(治脬氣不足有陰火小便不禁鬼絲子酒製益智仁炒白茯苓韭菜炒肉蓯蓉酒洗當歸

熟地黃各五錢黃柏知母並鹽水炒牡蠣粉山茱萸肉酒蒸各三錢五味子一錢右爲末麵糊和丸

梧子大空心鹽

湯下百丸

醫金

# 諸淋證

淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中○諸淋所發皆腎虛而膀胱有熱也心腎得

蓄在下焦故膀胱裏急膏血砂石從小便道出焉  
於是又有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間  
則令人悶絕矣○大凡小腸有氣則小便脹小  
腸有血則小便瀉小腸有熱則小便痛痛者爲血  
淋不痛者爲尿血敗精結者爲砂精結散者爲膏  
金石結者爲石攝○最不可用補藥氣得補而愈  
脹血得補而愈瀉熱得補而愈盛水道不行加之  
穀道閉遏未見其能生者也○淋者小便淋瀝  
瀉痛欲去不去去而又來曰淋瀦△淋皆屬熱間  
有冷者由心腎氣鬱小腸膀胱不利或忿怒房勞  
忍尿酒肉濕熱下流干於肝經挺孔鬱結初則熱  
淋血淋久則火燉爲砂石淋如湯罐煎久而生礞  
哌○腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨  
用利水藥正○五淋者膀胱蓄熱也翻○淋而小

腹脹滿甚者宜瀉腎湯臘○諸淋皆屬於熱雖有  
冷淋蓋千百之一也○瞬○淋雖有五皆屬於熱取  
滋腎丸百丸以四物湯加甘草稍虎杖根木通桃  
仁滑石木香煎湯吞下兼灸三陰交欲累試累效  
汗○淋病不可發

汗發汗則便血鞞

淋病有五

一曰勞淋二曰血淋三曰熱  
淋四曰氣淋五曰石淋鞞

勞淋

苦倦虛損小便不出小腹急痛鞞○勞淋者遇房  
勞卽發痛引氣衝欲痛墜及尻軀○勞傷虛損則

發宜四物湯飭加知母黃柏滑石琥珀臘○酒

慾過傷膀胱之氣虛損滯而成淋宜補中益氣湯

飭觀升補真氣鞞○縱慾強畱不泄  
淫精滲下而作淋宜益元固真湯鞞

益元固真湯

治縱慾強畱不泄淫精滲下作淋甘草  
梢二錢山藥澤瀉各一錢半人參白茯

**芩** 蓼藪巴戟升麻益智仁黃柏酒炒各一錢右剉作一貼水煎空心服

醫

**血淋** 小便不出時下血疼痛滿急鞚○遇熱則發甚則

尿血

熱結莖痛宜四物湯加知母黃柏澤瀉赤茯苓

草加黃芩色如黑豆汁者腎與膀胱火也宜五淋散

防見

○血淋宜增味導赤散金黃湯小

薊飲子

○死血作淋牛膝膏最妙

防見

**增味導赤散**

治血淋澁痛生乾地黃木通黃芩車前子梔子仁川芎赤芍藥甘草各一錢右剉作一貼

薑三片竹葉

十片空心水煎服

搐

**金黃湯**

治小便出血水道澁痛鬱金瞿麥生乾地黃車前子滑石芒硝各五錢右爲麩末每取五

錢空心水

煎服

類

東醫寶鏡

卷四

# 小薊飲子

治下焦結熱尿血淋痛生地黃二錢小薊根滑石通草蒲黃炒藕節竹葉當歸山梔

仁甘草炙各七分右剉  
作一貼空心水煎服

## 熱淋

小便熱赤色淋瀝不快膍下急痛草本○暴淋痛甚

尿赤淋瀝宜入正散

上方見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益

元散

上方見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益

元散

上方見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益

點服

門

心白湯

## 氣淋

小便澀滯常有餘瀝不盡小腹脹滿宜沉香散通

秘散或益元散加大香檳榔茴香爲末如上法點

服

門○氣虛而淋八物湯鬪飴加

黃芪虎杖根黃芩牛膝煎服

上方見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益

元散

上方見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益

## 沉香散

治氣淋小腹脹滿葵子赤芍藥各七錢半沉

香石韋滑石王不留行當歸各五錢陳皮青

上方見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益

皮木香甘草各二錢半右爲末每二錢空心以  
大麥煎湯調下入門△判取一兩煎服名沉香飲

### 通秘散

治氣淋痛不可忍香附子陳皮赤茯苓各等分右剉五錢空心水煎服效

### 石淋

莖中痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕革○莖中痛努力出砂石傳○沙淋凝

脂而易散石淋結塊而難消攻療石淋以枳殼散卽六散煎水吞來復丹砂爲妙久服則關絡開

通忽爾大便通泄石塊自小便出櫛△益元散偏主石淋胡△石淋宜石燕丸滑石散鵬砂散

### 石燕丸

治石淋石燕子燒赤醋淬三次研水飛焙乾滑石石韋瞿麥穗各一兩右爲末糊丸梧子

大空心以瞿麥燈心煎

湯下三十九日二日綱

### 滑石散

治沙石淋痛割滑石石膏各五錢石葦瞿麥木通蜀葵子各三錢右爲末每取二錢以葱

白二莖燈心一握蜜二

匙煎湯空心調下

鵬砂散

治沙石淋急痛鵬砂琥珀赤茯苓蜀葵子陳橘皮各三錢右爲末取二錢以葱白二莖麥門冬二十一粒蜜二

匙煎湯空心調下

淋病有八

五淋之外又有膏淋

沙淋冷淋合爲八也

膏淋

尿出如膏熱中澁痛吼△尿濁如膏浮凝如脂癰○膏淋宜鹿角霜丸秋石元海金沙散香兒散△

一少年患膏淋三年藥餌鍼灸無少減戴人見之曰惑蠱之疾也亦曰白淫實由小腹熱非虛也以

藥漏痰三升又瀉積穢

數行尋覺病去矣

鹿角霜丸

治膏淋或黃赤白黯如脂膏狀淋澁作痛鹿角霜白茯苓秋石煉者各等分右爲末

麵糊和丸梧子大空

心米飲下五十九丸

### 秋石元

治濁氣于清精散而成膏淋黃赤白黯如肥膏油蜜之狀白茯苓一兩桑螵蛸炙鹿角膠

珠秋石各五錢右爲末糕糊和丸梧子大空心人參湯下五十九丸

### 海金沙散

治膏淋海金沙滑石各一兩甘草二錢半右爲末每一錢麥門冬燈心煎湯調下

### 香兒散

治血淋及沙淋膏淋如條痛如刀割真麝香五分葱白一根同擣取汁孩兒茶三錢半琥珀二分半爲末調百沸湯

入葱汁空心同服如神種

### 沙淋

陰莖中有砂澁痛尿不得卒出砂出痛止○小便出細砂沉在缸底膀胱陰火煎熬津液凝結輕

則爲砂重則爲石○沙淋宜二神散魚石散苦杖散琥珀散

二神散

治沙石淋急痛海金沙七錢半滑石五錢右爲末取二錢以木通麥門冬車前草煎湯入

蜜少許

調下丹

魚石散

治沙石淋莖中作痛石首魚頭中骨五對火煅爲末滑石五錢右爲末分二服木通湯調

下砂出盡

乃安癒

苦杖散

治沙石淋每尿時器中剝剝有聲痛楚不堪杜牛膝榔細剉每一合卽一水五盞煎耗

其四畱其一去滓以麝香

乳香各少許研調服之

琥珀散

治沙石淋琥珀滑石各二錢木通當歸木香鬱金萹蓄各一錢右爲末每三錢以蘆葦葉

煎湯空心調下無

葦葉則代竹葉用

**冷淋**

必先寒慄小便澁數竅中腫痛臥○亦有挾冷而  
淋者其證先寒戰而得溲便蓋冷氣與正氣交爭

**冷氣勝則寒戰成淋**

正氣勝則寒戰解而得便  
尿也○**冷淋**宜八味丸附薑生附湯木香湯

**生附湯**

治冷淋小便澁痛增寒凜凜附子生滑石各  
七分木通半夏製瞿麥各一錢二分右剉作

一貼入生薑七片燈心二十

薑蜜半匙空心水煎服

**木香湯**

治冷淋小便淋澁身體清冷木通木香當歸  
白芍藥青皮茴香檳榔澤瀉陳皮甘草各七

分肉桂三分右剉作一貼

入薑五片空心水煎服

**諸淋通治**

淋證所感不一或因房勞或因忿怒或因醇  
酒或因厚味蓋房勞者陰虛火動也忿怒者

氣動生火也醇酒厚味者釀成濕熱也積熱既久  
熱結下焦所以淋滯作痛初則熱淋血淋久則煎

熬水液稠濁如膏如砂如石也夫散熱利小便只能治熱淋血淋而已其膏淋沙淋石淋必須開鬱行氣破血滋陰方可也古方用鬱金琥珀開鬱也青皮木香行氣也蒲黃牛膝破血也黃柏生地黃滋陰也東垣治小腹痛用青皮黃柏夫青皮疎肝黃柏滋腎蓋小腹乃肝腎之部位也○諸淋通用瀉腎湯鬱金黃連丸三因琥珀散石韋散五淋散通草湯琥珀散方見二神散方見必效散海金沙散澹寮方五淋散婦人白茅湯小兒藥毒成淋

### 瀉腎湯

諸淋小腹脹急甚者宜用此大黃二錢剉蜜器小浸一宿磁石碎一錢六分石菖蒲生地

黃各一錢玄參細辛各八分芒硝赤茯苓黃芩各六分甘草四分右剉水二盞煎藥至一盞半入大

黃煎至七分去滓下芒硝攪勻空心服臍

# 鬱金黃連丸

治小腸膀胱積熱或癃閉不通或遺尿不禁或白濁如疳或膏淋如濃或如柂

子水或如沙石米粒或如粉糊俱熱證也悉主之

滑石白茯苓各四兩黑牽牛頭末三兩黃芩大黃琥珀各二兩鬱金黃連各一兩右爲

末水丸梧子大沸湯下五十七丸

心

# 三因琥珀散

治五淋澁痛小便出濃血琥珀海金沙沒藥蒲黃各等分右爲細末每三錢空

心以萱草根

煎湯調下

# 石韋散

治諸淋滑石二錢白朮瞿麥赤芍藥冬葵子石韋木通各一錢當歸王不留行甘草各五

分右爲末每二錢空心以小麥煎湯

調下局方○或剉一兩水煎服亦可

# 五淋散

治五淋赤芍藥山梔仁各二錢當歸赤茯苓各一錢條黃芩甘草各五分右剉作一服空

心水煎

服醫

通草湯

治五淋通草葵子茅根桃膠瞿麥當歸蒲黃滑石王不留行各一錢甘草五分右剉作一

貼入薑五片空

心水煎服

必效散

治一切淋當歸生地黃赤茯苓滑石牛膝山梔仁麥門冬枳殼萹蓄木通知母黃柏酒燄

各七分甘草五分右剉作一貼

入燈心

一團空心水煎服

醫

海金沙散

治五淋一服如神當歸酒洗大黃酒浸牛膝酒洗木香雄黃海金沙各五錢右爲末

每二錢臨卧

好酒調下

醫

澹寮五淋散

治五淋梔子仁一錢半赤茯苓赤芍藥各一錢木通滑石甘草各八分竹葉茵

陳各五分右剉作一

貼空心水煎服

一方

治諸淋四苓散四錢益元散二錢梔子仁一錢右剉作一貼水煎空心服丹

白茅湯

治婦人產後諸淋無問膏石冷熱皆治之白茅根五錢瞿麥白茯苓各二錢半葵子人參

各一錢

二分半蒲黃桃膠滑石各七分甘草五分紫貝二箇煅石首魚頭中骨四箇煅右剉分二貼

入薑三片燈心二十莖空心水煎服

臘○或爲末每二錢木通湯調下

小兒藥毒成淋

一年少自初生七箇月患淋病五日七日必一發其發也大痛捫地叫天

水道方行狀如漆如粟者約一盞然後定診其脈輕則濁重則弦視其形瘦而稍長其色青而蒼量

其父必因多服下部藥遺熱在胎畱於子之命門而然遂以紫雪和黃柏細末丸梧子大晒十分乾

而與二百丸作一服經二時又以三百丸作一服  
卒以熱湯下以食物壓之又經半日痛大作連腰  
腹水道乃行下如漆如粟者一大椀許其病減十  
分之八後以陳皮一兩苦黃木通各半兩作一貼  
與之又下漆粟者

一合許遂安

翻

赤白濁小便出赤濁或白濁其狀漩面如油光彩不定  
赤濃皆是濕熱內傷也猶如天氣熱則水渾濁渾  
濁之病濕熱明矣△先賢有言夏則土燥而水  
濁冬則土堅而水清此其理也水火既濟則土自  
堅其流清矣小便白濁蓋脾有虛熱而腎不足土  
邪干水也○內經曰水液渾濁皆屬於熱○便  
濁之證因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使溲便  
或白或赤而渾濁不清也血虛而熱甚者則爲赤  
濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則

爲白濁肺與大腸主病屬金故也

傳

○赤白濁皆

因脾胃濕熱中焦不清濁氣滲入膀胱爲濁門○

赤者心虛有熱由思慮而得之白者腎虛有寒因

嗜慾而致也

醫

○小便濁主濕熱有痰有虛赤屬

血白屬氣與痢疾帶下同治

研

○赤白濁肥人多

濕痰二陳湯加蒼朮白朮升麻柴胡或星半蛤粉

九瘦人是虛火四物湯加知母黃柏或珍珠粉丸

方精門

柏子仁是虛火四物湯加知母黃柏或珍珠粉丸

金蓮丸房勞傷腎者草薢分清飲小兒絲子元貽

方精門

蠶芩元胃氣下陷宜補中益氣湯附觀○凡便濁

必兼服加減珍珠粉丸

門

○治法宜燥濕降火兼

升舉之二陳湯加二朮升麻柴胡白芍藥糴

方精門

○白

濁宜四君子湯

方精門

合五苓散

門煎

服瀉又秘

精元固本元半芩丸

導赤湯

皆宜○赤濁宜加味

清心飲清心蓮子飲瀉瀉○赤白濁通用芡實元

精門覗妙應九辰砂妙香散神門水火分清飲桑螵蛸散○赤白濁小腹疼痛不可忍宜作寒治東垣

酒煮當歸丸最妙

△方覗歸人

星平蛤粉丸

治濕熱白濁蛤粉二兩南星半夏並薑製蒼朮青黛各一兩右爲末薑汁煮神

麵作糊和丸梧子大空心薑湯下五十九帖

樗柏丸

治濕熱痰火小便濁黃柏三兩樗根白皮  
一兩青黛鱗乾薑礬肺氣各三錢滑石利蛤

粉臍神麴

鱗各五錢右爲末神麴糊和

丸梧子大空心白湯下五十九帖

金蓮丸

治思慮傷心小便赤濁石蓮肉白茯苓龍骨天門冬麥門冬柏子仁當歸酸棗仁紫石英

遠志乳香龍齒各一兩右爲末蜜丸梧子大

硃砂爲衣空心溫酒或棗湯下五十九帖

**草薢分清飲**

(治小便白濁凝脚如糊石菖蒲烏藥益智仁草薢白茯苓各一錢甘草五分右)

鹽一  
剗作一貼空心入  
捻水煎服

**蒼术難名丹**

(治脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足力乏腰背痠疼盍用蒼术等劑以斂脾

精斂脾謂何精生於穀也蒼术製四兩茴香炒川練子肉各七錢半川烏炮破故紙炒白茯苓龍骨各一兩右爲末酒麵糊和丸梧子大硃砂爲衣空心米飲下五七十丸噙

**四炒固真丹**

(治元藏久虛遺精白濁五淋七疝婦人崩帶等證蒼术一斤剗作四分一分以

茴香青鹽各一兩同炒一分以烏藥川練子各一兩同炒一分以川椒破故紙各一兩同炒一分以酒醋同炒俱以术黃色爲度只取术爲末以煮藥酒醋打糊和丸梧子大空心每取三五十丸男子

酒下婦人醋湯下臍○醉飽後色慾不節傷脾損腎脾來尅腎土尅水也小便黃濁其脈脾部洪數腳或如血點凝結在內法當補養脾胃宜此藥鑿蠟芩丸一名威喜元治腎有邪濕精氣不固小便白濁淋瀉不止及婦人白淫白帶小便如泔等證雪白茯苓四兩剉以猪苓剉二錢半同放於磁器中用水煮二十餘沸去猪苓取出焙爲末將黃芩四兩熔化和九彈子大空心細嚼以

棗湯徐徐送下以小便清爲度入喉得噉

### 加減珍珠粉丸

治赤白濁及白淫通用黃柏半斤蛤粉各三兩滑石二兩樗根白皮一兩

青黛乾薑炒褐色各五錢右爲末炒神麴打糊和丸梧子大空心溫酒下七十九或百丸○黃柏降陰火除濕熱蛤粉鹹補腎滑石利竅樗根白皮大燥濕熱青黛解鬱降火乾薑斂肺氣下降生陰血

鹽製炒微  
黑用之臘

秘精元

治下虛脬寒小便白濁牡蠣煨兔絲子酒製

螵蛸酒炙各等分右爲細末

酒糊和勻丸如梧子大空心鹽湯下七十九丸臘○一名固精元

固本元

治小便濁甘草炙三兩豬苓二兩半蓮花蕊黃連各二兩白茯苓縮砂益智仁半夏薑製

黃柏炒各一兩右爲末湯浸蒸餅和

丸梧子大空心溫酒下五十九丸臘

半苓丸

治白濁卽精門  
猪苓丸也臘

導赤湯

治尿如米泔色不過二服愈木通滑石黃柏赤茯苓生地黃梔子仁甘草梢各一錢枳殼

白术各五分右剉作

一貼空心水煎服

加味清心飲

治心熱小便赤濁蓮肉白茯苓各半錢益智仁麥門冬遠志人參各八分石

菖蒲車前子白术澤瀉甘草各五分右剉

作一貼入燈心二十莖空心水煎服

妙應丸

治赤白濁兒絲子酒製桑螵蛸酒炙川練肉各五錢牡蠣殼三錢龍骨辰砂石菖蒲白茯

苓益智仁蓮肉縮砂各二錢半右爲末山藥糊和丸梧子大午間人參酸棗仁湯下五十九臨卧梗

米湯下五

十九

研

雞清元

小便濁通用大半夏生爲末以雞子清和九梧子大稍乾以猪苓夾和慢火同炒丸子裂

爲度畱猪苓末養藥收貯器中以白茯苓煎湯空心下三五十九粒

水火分清飲

治赤白濁赤茯苓一錢益智仁草薢石菖蒲猪苓車前子澤瀉白术陳皮枳殼

升麻各七分甘草五分右剉作  
一貼酒水相半煎空心服

醫鑑

**桑螵蛸散**小便白如稠米泔日數十次心神恍惚瘦

志薑製石菖蒲鹽炒龍骨人參白茯神當歸酒洗  
鱉甲醋炙各五錢甘草炙二錢半右爲末每二錢  
臨卧以人參茯苓桑白皮煎湯調下蓋

桑皮行水接螵蛸歸腎經之意也

攏

**蠱病白淫**

內經曰脾傳之腎病名曰疝癰小腹冤熱而  
痛出白一名曰蠱註曰腎脈貫脊屬腎絡膀

胱故小腹冤熱而痛洩出白液也冤熱內結消蝕  
脂肉如虫之蝕日內損削故云交接漸微也△夫  
脾受風邪傳於腎經邪熱內燦故其證小腹冤熱  
而痛洩出白液病名曰蠱蓋邪熱內鬱真精不守  
故也宜肉蓯蓉丸△內經曰思想無窮所願不得  
意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲

白淫謂白物淋淫如精之狀也宜半苓丸方見○  
戴人曰遺尿閉癃陰痿脬精滑白淫皆男子之  
疝也血涸不月腰膝上熱足蹠噏乾癰閉小腹有  
塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也  
但女子不謂之疝而謂之瘕也

肉蓯蓉丸

治蠱病肉蓯蓉白茯苓黃芪澤瀉牡蠣粉  
五味子龍骨當歸各一兩右爲末蜜丸梧

子大空心酒

下三十九類

脬痺證

內經曰脬痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯  
澀于小便上爲清涕○夫膀胱者津液之府氣

化則能出今風寒濕邪氣客于脬中則氣不能化  
出故脬滿而水道不通也足太陽之經從巔入絡

腦膾氣下灌出於鼻爲涕也咽喉△脬痺卽寒  
淋之類也屬風寒濕宜巴戟九溫腎湯臘

**巴戟丸**

治脬痺小便澀而不通巴戟一兩半桑螵蛸  
麩炒遠志薑製生乾地黃酒洗山藥附子炮

續斷肉

茺蔚酒浸各一兩杜仲炒石斛鹿茸龍骨

兔絲子

酒煮五味子山茱萸官桂各三錢右爲末

蜜丸梧子大空心

酒下五七十九

驥

**溫腎湯**

治脬痺小便不利赤茯苓白朮澤瀉乾薑炮  
各一錢二分半右剉作一貼空心水煎服

**莖中痺痛**

童兒精未盛而御女老人陰巴癆而思色以  
降其精則精不出而內敗莖中痺澀而爲淋

八味丸料加車前子牛膝煎服

附子大若精已竭而復耗之則大小便道牽  
疼痛愈疼則愈欲大小便愈

便則愈疼八味丸

五味子附子救之凡此當滋化  
源不可誤用知柏淡滲之劑旣瀉真陽復損真陰

咽△肝經氣滯有熱玉莖引脇刺痛宜參苓琥珀

湯△肝經氣滯有熱玉莖引脇刺痛宜參苓琥珀  
湯△病淋而莖中痛不可忍六君子湯麩觀加

知母黃柏滑石石韋琥珀煎服研△莖中痛出白津小便閉時作痒小柴胡湯剗加梔子澤瀉黃連炒木通龍膽草赤茯苓煎服兼服六味地黃丸五臟爲妙翻○小便淋瀉莖中作痛屬肝經濕熱用龍膽瀉肝湯㕮陰方△精竭不痛莖痒者入味丸熱盛莖中澁痛導赤散五臟加梔子大黃入門△莖中痒出自白津多因脾土不足不能滋生金水以致肝經血虛火燥宜補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋脾胃爲肝腎之源心實主之門△陰莖痛乃厥陰經氣滯兼熱用甘草梢蓋欲緩其氣耳

憲

## 參芩琥珀湯

治淋瀉莖中痛不可忍川練肉甘草梢各一錢玄胡索七分人參五分赤茯苓

四分琥珀澤瀉柴胡當歸尾青皮黃柏各三分右剉作一貼入燈心一團空心水煎服

一方

治淋莖中痛甘草梢木通各二錢青皮黃柏澤瀉各一錢右剉作一貼空心水煎服

交腸證

婦人小便中出大便名交腸證服五苓散效如

後小便出屎此陰陽失於傳送名爲大小腸交也

先服五苓散期二劑又用補中益氣湯而愈翻

○一婦人性嗜酒常痛飲不醉忽糟粕出前竅溲

尿出後竅六脉皆沉澁與四物湯加海金沙木香

檳榔木通桃仁服之而愈此人酒多氣升不降陽

極虛又酒濕積久生熱煎熬其血陰亦太虛陰陽

俱虛而暫時活者以其形實酒中穀

氣尚在故也三月後必死果然

小便多寡

老人與壯年飲水無異多寡壯年小便甚少而老者小便甚多何也曰壯者如春夏之氣

升者多而降者少老者如秋冬之氣降者多而升者少故不同耳

# 飲後卽小便

內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入胃遽覺至臍

下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺故心火上攻使口燥咽乾宜補中益氣湯壘○靈樞曰人飲酒酒入胃穀未熟而小便獨先下何也蓋酒者熟穀之液其氣悍以清故後穀而入先穀而液出焉

# 單方

凡四十八種有

透膈散牛膝膏

## 滑石

能利竅以通水道爲至燥之劑

湯液

○利小便

治淋澁多單使滑石卽益元散

翳門是也 韶

## 硝石

治五淋及小便不通雪白硝石細研每二錢勞

淋葵子湯下血淋熟淋並冷水調下氣淋木通

湯下石淋隔紙炒溫水調下小便不通小麥煎湯下並空心服名曰透膈散諸藥無效服此立效

鈆

**海金沙**

通利小腸治沙淋尿閉每取一兩入臘茶末五錢和勻以生薑甘草煎湯調三錢服本草

**浮石**

治沙淋澁痛右爲末取一錢空心以甘草湯調下

**淋石**

患石淋人尿中出小石也土石淋水磨服之當得碎石隨尿出也出時收貯用之

**甘草梢**

味淡者主莖中刺痛同木通空心煎服△治尿管澁痛取味淡不甘者用之

**草薢**

治夜多小便或遺尿又治尿數日夜無度剉水煎服或爲末酒糊丸空心鹽湯下七十九粒

**牛膝**

療老人遺尿△小便澁莖中痛欲死酒煎空心服鞶△牛膝膏治死血作淋最妙牛膝一兩剉

**水**

五盞煎至一盞入麝香少許

**車前草**

利小便通五淋及癃閉不通採根葉擣取汁空心服蓋牛膝治淋聖藥也

末調服血淋取汁單服空心車前子與根葉同功煎服末服並佳  
鞞

澤瀉治五淋止小便澀數△去脬中畱垢止小便淋瀉以味鹹能泄伏水去脬中久陳積物也煎服

末服並

佳湯

地膚草利小便又主小便不通取汁服卽通有迴生起死之功△子與莖葉同功水煎服之鞞

木通

治五淋開關格又主小便數急痛剉煎空心服△通草同功鞞

瞿麥

主五淋及諸癃閉開關格水煎服之△治石淋瞿麥子爲末酒服一錢石卽下草本

黃芩

治五淋又治熱淋血淋水煎服鞞

益智仁

主小便頻數不禁又止滑數入鹽水煎服或丸服亦佳

鞞

**酸漿草**

(治諸淋澁痛利水道擣取汁一合酒一合空心和服立通鞞)

**石韋**

(治五淋癃閉及脬囊結熱不通利水道水煎服之鞞)

**牽牛子**

(主癃閉小便不通利水道取頭末二錢以木通梔子煎湯調下本草)

**燈心草**

(主五淋能利水道空心水煎服之鞞)

**篇蓄**

(治五淋及小便不通生水邊開紫花篇蓄根擣取汁一盞空心服卽通鞞)

**葎草**

(主五淋利小便擣汁服或水煎服△膏淋取汁二升和醋二合空心服一盞卽愈鞞)

**萱草根**

(治小便澀痛下沙石淋取根擣汁空心服卽通鞞)

**榆白皮**

(治五淋又主石淋水煎空心服滑能利竅也鞞)

茯苓治五淋主小便不通利水道煎服末服並佳韻

琥珀

通五淋又治諸般沙石淋能利小便爲末二錢空心以葱白煎湯調下一服立效

虎杖根

通五淋利小便剉取一兩水煎入麝香乳香末各少許調服空心卽效俗名杜牛膝韻

梔子

通五淋利小便又治血滯小便不利熱淋血淋尤效△梔子實非利小便乃清肺也肺氣清而

膀胱得此氣能化而出尿也

湯

猪苓

利小便通水道剉煎服之

韻

△五苓散有猪苓能利水道諸湯劑無若此驗


湯

山茱萸

止小便滑數又療老人尿不節煎服丸服並佳韻

桑螵蛸

止小便滑數療遺尿治白濁酒蒸爲末薑湯下二錢妙



**牡蠣粉** 止小便滑利或丸服或末服草本

**石首魚頭中骨**

主石淋火煅爲末空心和水服一錢草本

**石龍子**

主五淋利水道下石淋取一枚火炙爲末空心和水服草本

**蚯蚓汁**

療小便不通空心服半椀立通草本

**蠆姑**

下石淋下水道取七枚鹽二兩新瓦上拌焙爲末溫酒調一錢服卽愈草本△治小便不通諸藥無效取活者一枚生研入麝香少許新汲水調下空心立通

類

**桃膠**

破石淋取如棗子許夏冷水冬溫水空心和服日三石當下

**獮猴桃**

下石淋取熱者食之△藤中汁至滑下石淋取汁和薑汁少許服之

冬葵子

治五淋利小便 ◇ 根亦療淋  
利小便並水煮空心服之 韓

冬瓜

治五淋利小便  
取汁飲一盞 韓

紅蜀葵根莖

治淋利小便花與子  
亦同功水煎服之 韓

亂髮灰

主五淋又療轉脬小便不通取髮灰末二錢  
醋湯調服瞬 ◇ 血淋取灰二錢以白茅根車

前草煎湯調下頓 ◇ 髮

灰補陰之功甚捷

人爪甲

治轉脬尿閉自取爪  
甲燒灰和水服 韓

猪膽

主小便不通取膽納熱酒中調服 韓 ◇ 小便閉  
澁生猪膽籠住莖頭少頃汁入尿自出婦人以

汁滴入陰戶

中必通

**猪脬**

治遺尿洗炙熟空心溫酒嚼下

**羊肚**

主小便數取肥肚作羹食之  
系盛水滿線縛兩頭煮熟取中水頓服差

**牛尿**

利小便療小便不通  
取熱雄牛尿飲之

**雞腸**

主遺尿小便不禁取烏雄雞腸治如食法作臙  
溫酒和服○或燒爲末溫酒調服一錢妙

**雄雞肫脰裹黃皮**

主遺尿及小便滑數不禁取燒灰  
每二錢溫酒調下男用雌女用雄

并腸燒服

尤良

**鍼灸法**

瘻閉取陰蹻督大敦委陽大鍾行間委中陰  
陵泉石門印○小便淋閉關元俞三陰交

陰谷陰陵泉氣海太谿陰交印○石淋取關元氣  
門大敦印○血淋取氣海關元印○熱淋陰陵泉

關元氣衝棟○小便滑數中極炙腎愈陰陵泉氣海陰谷三陰交瞬○遺尿不禁取陰陵泉陽陵泉大敦曲骨棟○莖中痛行間塹壯又取中極太谿三陰交復泄贊○白濁腎俞炙又取章門曲泉關元三陰交瞬○婦人轉脬不得尿取曲骨關元印○婦人陰中痛取陰陵泉印

東醫寶鑑內景篇卷四下

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

大便

大便原委

難經曰大腸小腸會爲闌門蓋胃中水穀腐熟自胃下口傳入於小腸上口自小腸下口

泌別清濁水液入膀胱爲溲尿滓穢入大腸爲大便由闌門而分別闌闡分隔故名爲闌門也

內經曰大腸者傳導之官化物出焉註曰化物謂大便也

大便病因

邪氣風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五

臟入六腑則身熱不時卧上爲喘呼入五臟則暝滿閉塞下爲飧泄久爲腸癖癧疎繩繩○春傷於

風夏必飧泄○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄○久風入中則爲腸風飧泄○清氣在下則生飧泄○濕勝則濡泄註曰濕勝則內攻於脾胃脾胃受濕則水穀不分故大腸傳導而注瀉也繭○倉廩不藏者是門戶不要也註曰是大腸之門戶不得歛也繭○大腸有寒則多鶯溏有熱則便腸垢糲○腸垢者腸間積汁垢膩也亦曰滯下言濕之滯於腸中故謂之滯下臥○痢因有二一者暑日煩渴恣食生冷二者夜卧失被風濕外侵二者皆令水穀不化鬱而生熱熱與濕合傷氣分則成白痢傷血分則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢研○古人文云無積不成痢皆由暑月多食生冷不能剋化飲食積滯而成病也顯

辨便色

腸中寒則腸鳴飧泄腸中熱則出黃如糜樞○瀉白爲寒青黃紅赤黑皆爲熱也或以痢色青

爲寒者誤也傷寒少陰病下痢純青水者熱在裏  
也小兒急驚痢色多青爲熱明矣痢色黃者脾熱  
也痢色紅者爲熱心火之色或赤者熱之甚也色  
黑者由火熱亢極則反兼水化故色黑也脈○血  
寒則凝痢色必紫黑成塊或雜膿血蓋膿爲陳積  
已血爲新積也門○濕多成五泄如水傾下門○血  
熱痢紫黑色寒痢白如鴨溏濕痢下如黑豆汁風  
痢純下青水氣痢狀如蟹渤積痢色黃或如魚腦  
虛痢色白如鼻涕凍膠

蟲瘡痢黑如雞肝門

## 脉法

泄瀉脉緩時小結者生浮大數者死僵○病泄脉  
洪而大爲逆樞○泄而脫血脉實者難治繃○泄  
瀉脉多沉傷風則浮傷寒則沉細傷暑則沉微傷  
濕則沉緩黯○瀉脉自沉沉遲寒侵沉數火熱沉  
虛滑脫暑濕緩弱多在夏月翻○腸澼下膿血脉沉  
沉小留連者生數疾且大有熱者死繩○下痢脉

微弱數者爲欲自止雖發熱不死脉○下痢脉大者爲未止脉○下痢日十餘行脉反實者死脉○下痢宜微小不宜洪大脉○下痢微小却爲生脉大浮洪無差日脉○無積不痢脉宜滑大浮弦急死沉細無害脉○凡痢身涼脉細者生身熱脉大者死脉○下痢脉微小吉浮洪者難治脉○大便閉結脾脉沉數下連於尺爲陽結二尺脉虛或沉結而遲爲陰結右尺脉浮爲風結脉○燥結之脉沉伏勿疑熱結沉數虛結沉遲若是風燥右尺浮肥脉○老人虛人閉結脉雀啄者不治脉

泄證有五

有胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄○胃泄者飲食不化色黃宜胃風湯○脾泄者腹脹滿泄注食則吐逆宜胃苓湯○大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛宜五苓散方○小腸泄者洩瀉而便膿血小腹痛宜芍藥湯○大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛宜大黃湯

胃風湯

治腸胃濕毒腹痛泄瀉下如黑豆汁或下瘀血人參白朮赤茯苓當歸川芎白芍藥桂皮

甘草各一錢右判作一貼

入粟米一撮水煎服

婢

胃苓湯

治脾胃濕盛泄瀉腹痛水穀不化蒼朮厚朴陳皮猪苓澤瀉白朮赤茯苓白芍藥各一錢

肉桂甘草各五分右判作一貼

入薑三片棗二枚水煎服

醫

泄瀉諸證

有濕泄濡泄風泄寒泄暑泄火泄熱泄虛泄滑泄飧泄酒泄痰泄食積泄脾泄腎泄脾腎

泄濃泄暴泄洞泄久泄○凡泄皆兼濕初宜分利中焦滲利下焦久則升舉必滑脫不禁然後用滋

藥止之門○治泄補虛不可純用甘溫太甘甘則

生濕清熱亦不可太苦苦則傷脾惟淡劑利竅甚

妙門○治瀉之法先當分利水穀車前子煎湯調

五苓散

寒門次則理正中焦理中湯治中湯勦觀

理中治不效然後方可斷下固腸丸是也。○治瀉須先中焦理中湯丸是也。次分利水穀五苓散。是也。治中不效然後斷下赤石脂禹餘粮湯。○治泄瀉諸藥多作丸子服之。○凡泄瀉小便清白不瀉爲寒。赤瀉爲熱。○手足寒爲冷證。手足溫爲熱證。○大便完穀不化而色不變。吐利腥穢小便清白不瀉。身冷不渴。脉微細而遲者皆寒證也。凡穀肉消化無問色及他證。便斷爲熱。夫寒泄而穀消化者未之有也。○或火性急速傳化失常。完穀不化而爲飧泄者亦有之。仲景曰邪熱不殺穀。然熱得濕則爲飧泄也。○暴瀉非陽久瀉非陰。○通治用三白湯。燥濕湯。益元散。財

暑門

固腸丸

治泄痢日久滑數瘦弱以此瀉之龍骨附子炮枯白朮荳子皮各一兩丁香良薑赤石脂

白豆蔻縮砂各五錢木香三錢右爲末  
醋糊和丸梧子大栗米飲下三十丸臥

### 三白湯

治一切泄瀉白朮白茯苓白芍藥各一錢半  
甘草炙五分右剉作一貼水煎服○三白泄

瀉之要藥也臥

### 燥濕湯

治諸泄瀉白朮二錢白茯苓白芍藥炒各一  
錢半陳皮一錢甘草炙五分右剉作一貼水

煎服臥○此三白湯加陳皮

一味也○一名术苓芍藥湯

### 濕泄

卽濡泄也亦名洞泄其證如水傾下腸鳴身重腹  
不痛臥○左傳曰兩濁腹疾是也○寒濕傷於脾

胃不能腐熟水穀故洞泄如水謂之濡泄胃苓湯  
加草豆蔻主之臘○濕瀉身痛五苓散加羌活蒼  
朮蠍○水穀不化清濁不分是濕泄也臘○凡瀉  
水腹不痛是濕泄宜麴芎丸臘○大渴引飲因致瀉

水穀一時併下宜五苓散鶴○洞泄實瀉濕湯衛生湯萬病五苓散

麴芎丸

治風濕滑泄神麴芎藭白术附子炮各等分右爲末麴糊和丸梧子大空心米飲下三五

十九○左傳云麥麴芎藭能除濕若脾濕而泄者萬無不中亦治飧泄

瀉濕湯

治洞泄白术炒三錢白芍藥炒二錢陳皮炒一錢半防風一錢升麻五分右剗作一貼水

煎服之○此劉草窓治洞泄要方也

衛生湯

治洞瀉人參白术白茯苓山藥陳皮薏苡仁澤瀉各一錢黃連甘草各五分右剗作一貼

空心水

煎服

萬病五苓散

治濕泄瀉水多而腹不痛腹響雷鳴脉細赤茯苓白术猪苓澤瀉山藥陳皮蒼朮

术縮砂炒肉豆蔻煨訶子煨各八分桂皮甘草各五分右剉作一貼入薑二片梅一個燈心一團空

心水煎

服之

風泄

惡風自汗或帶清血由春傷風夏感濕而發動故其瀉暴

門△風邪入於腸胃故大便不聚而瀉

而瀉

△瀉而便帶清血宜胃風湯

翻○風邪

寒泄

惡寒身重腹脹切痛雷鳴鴨溏清冷完穀不化宜理中湯加赤茯苓厚朴或治中湯

加縮砂

門△

○協寒自利不渴曰鴨溏亦曰鷺溏所下清白如

鴨尿狀也

門○寒泄一名鷺溏大便如水宜附子

溫中湯或平胃散

加觀合理中湯

門○寒泄宜四

柱散六柱散

○寒泄須早晚服藥蓋平朝服燒藥

到夜藥力已盡無以敵一夜陰氣

所以無效故臨卧再服可也

門

附子溫中湯

治中寒腹痛泄瀉水穀不化附子炮乾薑炮各一錢半人參白朮白茯苓白芍

藥

甘草炙各一錢厚朴草豆蔻煨陳皮

各六分右剉

作一貼水煎空心服

瞗

四柱散

治元臟虛冷臍腹冷痛大便滑泄耳鳴頭暈木香白茯苓人參附子炮各一錢二分半右

剉作一貼

入薑三片棗二枚

鹽少許

水煎空心溫服

六柱散

治元藏虛冷臍腹痛泄瀉不止四柱散本方加訶子肉豆蔻等分剉水煎服

暑泄

煩渴尿赤暴瀉如水宜薷荅湯加白芍藥車前子或桂苓甘露飲

渴自汗香薷散

散勣覲合異功散勣覲加白芍藥車前子入陳米炒百粒烏梅一箇燈心一團同煎服

糲○暑泄宜麵术元清六丸通荅散

益元散

六和湯清暑益氣湯貯防暑

**薷荅湯**

治夏月泄瀉欲成痢澤瀉一錢二分猪苓赤  
茯苓白术香薷黃連薑汁炒白萹豆厚朴製

各一錢甘草三分右

剗作一貼水煎服

**桂苓甘露飲**

治傷暑煩渴泄瀉或霍亂吐瀉滑石二  
兩白术肉桂猪苓各五錢右爲細末每二錢  
熱湯冷水任下入蜜少許尤好薑湯尤妙研

**麴术丸**

治傷暑暴瀉神麴炒蒼术製各等分右爲末  
麴糊和丸梧子大空心米飲下三五十丸

**清六丸**

治濕熱泄瀉益元散勑隈三兩加紅麴半兩  
炒右爲末陳米飯和九梧子大空心白湯下

五七十

丸剗

**通荅散**

治暑濕泄瀉分水穀解煩熱澤瀉白术猪苓  
赤茯苓木通茵陳瞿麥車前子各一錢右剗

作一貼入燈心一團麥

門冬十粒同煎服

婢

火泄

卽熱泄也口乾喜冷痛一陣瀉一陣其來暴速稠

粘宜黃連香薷散勦

門合四苓散加白芍藥梔子

炒

門○腹中痛痛一陣瀉一陣所下如湯後重如

滯瀉下赤色小便赤澁煩渴脉數宜萬病四苓散

翻○腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者

是火四苓散加木通滑石黃芩梔子

研

萬病四苓散

治熱瀉赤茯苓白术猪苓澤瀉蒼术炒

山藥

白芍藥炒梔子炒陳皮各一錢甘

草炙五分右剗作一貼入烏梅一箇燈心一團同煎服

四苓散

卽五苓散去肉桂一味也

黠

虛泄

困倦無力遇飲食卽瀉或腹不痛四君子湯勦

加木香縮砂蓮肉陳糯米爲末砂糖湯調下空心

門○飲食入胃卽下注或完穀不化者是虛泄宜升陽除濕湯

碑

○飲食入胃卽瀉水穀不化脉微

弱宜參苓蓮术散

翻

△氣虛泄瀉四君子湯倍白

术加黃芪升麻柴胡防風以提之而愈癟△虛泄

養元散加味四

君子湯皆佳

翻

升陽除濕湯

治氣虛泄瀉不思飲食困弱無力蒼术一錢半升麻柴胡羌活防風神麴澤瀉

猪苓各七分陳皮麥芽炒甘草炙各

五分右判作一貼空心水煎服

蟬

參苓蓮术散

治氣虛泄瀉人參白术白茯苓山藥蓮子陳皮各一錢縮砂蔻香訶子肉豆蔻

乾薑炮甘草炙各五分右判作一貼

入烏梅一箇燈心一團水煎服

翻

養元散

治泄瀉少食糯米一升水浸一宿濾乾慢火炒極熟爲細末入山藥末一兩胡椒末少許

和勻每日清晨用半盞再入砂糖二匙滾湯調服  
其味極佳大有滋補或加蓮肉芡仁末尤好

醫鑑

### 加味四君子湯

治氣虛泄瀉四君子湯加肉豆蔻煨  
訶子炮各一錢右剉作一貼入薑三

片棗二枚空心水煎服

煎藥

### 滑泄

滑泄不禁瀉久不止大孔如竹筒直出無禁氣陷下者補中益氣湯酌觀加白芍藥訶子肉豆蔻門

○日夜無度腸胃虛滑不禁脉沉細宜八柱散

○滑泄宜固腸丸防見禹餘粮丸木香散實腸散

○大腸滑泄小便精

出者宜萬全丸

### 八柱散

治滑泄不禁人參白朮肉豆蔻煨乾薑炒訶子炮附子炮鷄粟殼蜜炒甘草炙各一錢右

剉作一貼薑二片烏梅一箇

燈心一團空心水煎服

禹餘糧丸

治虛寒滑泄不禁禹餘糧煅赤石脂煅龍骨草薢研訶子炮乾薑炮肉豆蔻煨附子炮

各等分右爲末醋糊和丸梧

子大空心米飲下七十九丸

木香散

治臟寒滑泄米穀不化上熱下冷口瘡瘦痒木香破故紙炒各一兩良薑縮砂厚朴各七

錢半赤芍藥陳皮肉桂白朮各五錢吳茱萸胡椒各二錢半肉豆蔻煨四箇檳榔一箇右爲末每三

錢猪肝四兩批開重重移藥漿水一椀入醋少許蓋覆煮熟入薑白三莖生薑彈子大同煮水欲

盡空心作一服冷食之初微溏不妨經年

滑泄與冷痢只一服效渴則飲粥湯粥

實腸散

治虛冷泄瀉厚朴薑製一錢半肉豆蔻煨訶子炮縮砂研陳皮蒼朮末茯苓各一錢木香

甘草各五分右剉作一貼入

薑三片棗二枚水煎服

搗

萬全丸

治久痢及泄瀉寒滑不禁赤石脂乾薑炮各一兩胡椒五錢右爲末醋糊和丸梧子大空門入

心米飲下

五七丸

門入

飧泄

飧泄者米穀不化而泄出也○夕食謂之飧以食之難化者尤重於夕故食不化泄出者謂之飧

泄瀉○內經曰清氣在下則生飧泄註曰清氣陽氣也陽爲熱熱氣在下則穀不化故爲飧泄也○

又曰久風入中則爲腸風飧泄夫脾胃冲和之氣以化爲事今清氣下降或風邪久而干胃是木賊泄土也故冲和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃受傷亦致米穀不化俗呼爲水穀病也加減木香散主之○飧泄之證奪食則一日可止夫奪食之理爲胃弱不能剋化食則爲泄如食不下何以作泄更當以藥如養元散八仙糕之類滋養元氣候泄漸止少與食胃勝則安矣

陳○殼泄宜防風芍藥湯蒼术防風湯○人病

殼泄腹中雷鳴泄注米穀不化小便澁滯以桂枝

麻黃湯勦覲加薑棗煎大劑連

進三服汗出終日而卽愈

### 加減木香散

治殼泄水穀痢木香良薑升麻檳榔人參白朮各二錢半神麌炒二錢肉豆蔻

煨吳茱萸湯洗乾薑炮陳皮縮砂各五分右龜末每五錢空心水煎服之○亦治腸風殼泄瞞

### 八仙糕

治脾胃虛損泄瀉不止最益老人小兒枳實炒白朮土炒山藥各四兩山楂肉三兩白

茯苓陳皮炒蓮肉各二兩人參一兩右爲末梗米五升糯米一升半打粉蜜三斤入藥末和勻入甑蒸熟焙乾取食之以湯漱口送下

### 防風芍藥湯

治殼泄身熱脈弦腸痛而渴防風白芍藥各二錢黃芩一錢右剉水煎服

蒼术防風湯治久風爲殼泄不飲水而穀完出蒼术六錢麻黃二錢防風一錢右剉作一貼

入薑七片

水煎服

痰泄或瀉或多或少二陳湯加乾葛白术神麴實者海青丸虛者六君子湯方見痰飲○痰泄脉沉滑宜萬

病二陳湯

細

海青丸治痰積泄瀉海粉一兩青黛三錢黃芩二錢神麴五錢右爲末別以神麴作糊和丸梧子

大空心白湯下

二十九

萬病二陳湯治痰濕泄瀉半夏陳皮赤茯苓白术蒼术山藥各一錢縮砂厚朴木通車前子

炒甘草炙各五分右剉作一貼入薑  
三片烏梅一箇燈心一團水煎服

# 食積泄

泄而腹痛甚。瀉後痛減，臭如抱壞雞子。噫氣作酸，平胃散加香附縮砂草果山楂子麥芽。

煎

服。○腹痛甚，而瀉後痛減，脈弦而滑，宜香砂平胃散加砂。

積而泄，糞白可驗。○凡積滯泄瀉，腹必耕痛，方泄者是也。或肚腹滿，按之堅者亦是也。宜用神麴。

麥芽山楂之類，以消之。○有停飲食，數日乃瀉。名曰瀉泄宜枳术丸。○砂。

# 酒泄

飲食過傷，遂成酒泄，骨立不能食。但飲一二盃，經年不愈。宜香草丸。○患酒泄，飲酒後持甚，平胃散加丁香縮砂乾葛麥芽神麴爲末，空心米飲調。

下二錢，立愈。○傷酒晨起必泄，宜理中湯加生薑乾葛煎水，蒸黃連丸。○砂。

砂。○空心吞下二錢，爲妙。○砂。

# 香草丸

治酒泄乳香三錢鹿茸燎去毛酥炙黃五錢。內豆蔻一兩，每箇切作兩片，入乳香在內，麴。

裹煨麝香二錢另研右爲末陳米

飯和丸梧子大米飲下五十丸

### 脾泄

脾泄者肢體重着中脘有妨面色萎黃肚腹微滿宜用蒼白木厚朴木香乾薑生肉豆蔻輩搘○脾

泄者食後倒飽瀉去卽寬

脈細宜香砂六君子湯

糊○脾泄多老人腎虛謂之水土同化宜吳茱萸

湯糊○脾泄久傳腎爲腸癖

經年不愈者宜調中健脾丸

脾丸○脾泄已久大腸不禁此脾氣已脫

宜服固中丸糊○老人奉養太過飲食傷脾常常泄

急澁之用赤石脂

肉豆蔻乾薑之類糊○脾泄宜

服固中丸糊

○老人奉養太過飲食傷脾常常泄

瀉亦是脾泄宜

用山楂麴末丸

### 香砂六君子湯

治脾泄香附子縮砂研厚朴陳皮人參白朮白芍藥炒蒼朮炒山藥炒各

一錢甘草炙五分右剉作一貼

入薑三片烏梅一箇水煎服

糊

一箇水煎服

吳茱萸湯

治脾泄吳茱萸揀淨每五錢白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能緩膀胱水道

既清大腸自固餘藥雖

熱不能分解清濁也

調中健脾丸

治脾腎氣虛早晚溏泄白术破故紙炒訶子炮肉豆蔻煨各一兩赤茯苓陳皮

各八錢黃連以吳茱萸煎水炒過七錢神麴六錢木香厚朴茴香炒縮砂山藥蓮子各五錢右爲末粥丸梧子大空心以蓮

子煎湯下七十丸

固中丸

治脾久泄蒼术肉豆蔻煨各一兩右爲末粥丸梧子大空心米飲下五七十丸○若加破

故紙炒一兩名曰固

下丸治腎久泄瞞

山楂麴术丸

治老人奉養太過飲食傷脾常常泄泻白术炒二兩神麴炒山楂肉炒各一兩

半黃芩炒白芍藥酒炒半夏薑製各五錢右爲末

以青荷葉裹燒飯和丸梧子大白湯下五十九丸

腎泄

一名晨泄一名瀼泄每五更溏泄一次此腎虛感

陰氣而然宜五味子散丸。每日五更初洞泄服

他藥無效此名脾腎泄宜二神丸四神丸。老人

人脾腎虛泄宜猪臘丸。腎虛色慾所傷多足

冷久則肉削五鼓臍下絞病或只微響溏泄一次

宜二神丸四神丸五味子散。腎泄者腹痛無

定處似痢骨弱面黧腳下時冷尺脉虛弱者是也

當以破故紙生乾薑肉桂木香當歸主之。脾

腎虛晨泄宜三神丸調中健脾丸六神湯香薑散末香散

五味子散

治腎泄每於五更天明洞泄一次謂之晨泄五味子二兩吳茱萸五錢右並炒香爲

細末每二錢空心米飲調下。朴

**二神丸**

治脾腎虛泄破故紙炒四兩肉豆蔻生二兩右爲末肥棗四十九枚生薑四兩切片同煮

爛去薑取棗肉入藥末和勻丸如梧子大

空心鹽湯下三五十丸

一丸一粒豆蔻煨

**四神湯**

治脾腎虛泄病又治晨泄經年者破故紙酒浸炒四兩肉豆蔻煨五味子炒各二兩吳茱萸湯泡炒一兩右爲末生薑切八兩大棗百枚

同煮爛去薑取棗和丸梧子大服如上法

**猪臢丸**

治老人脾腎虛泄瀉吳茱萸不以多少鹽水浸透瀆猪藏頭一截去脂膜洗淨入茱萸於

臢中兩頭扎定蒸爛擣千杵丸如梧子大米飲

下五十丸緩膀胱固大腸進飲食清水道

**三神丸**

治脾腎虛泄瀉卽二神丸一精加木香一兩補脾許學士云補脾不若補腎蓋腎氣怯弱則真

陽衰虛不能上蒸脾土脾胃虛寒則遲於運化飲

食不進或虛脹或嘔吐或泄瀉譬如釜鼎之中盛諸米穀若無火力雖終日不熟其何能化乎用破故紙則補腎用肉豆蔻則補脾二藥雖兼補脾腎但無斡旋若加木香以順其氣使之斡旋空虛倉廩倉廩空虛則受

物累用見效

鞣

六神湯

治脾腎俱虛泄瀉肉豆蔻煨破故紙炒白朮白茯苓各一錢半木香甘草炙各七分右剉

作一貼入薑三片棗二枚空心水煎服

○得效方名木香散

香薑散

治晨泄生薑四兩切如豆大黃連二兩剉右同淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連

爲末每二錢茶清調服一劑而

愈若欲速效一料分作四服

燭

木香散

治脾腎泄肉豆蔻破故紙白朮白茯苓各一錢半木香甘草各七分右剉作一貼入薑三

棗二水

煎服謂

暴泄

太陽傳太陰下痢爲驚瘓大腸不能禁固卒然而下大便如水其中有小結糞硬物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜溫之理中湯勦觀

漿水散

○有暴下無聲身冷自汗小便清利大

便不禁氣難布息脈微嘔吐此爲寒泄急以重

藥溫之宜漿水散

○暴泄宜漿水散朝真丹

漿水散

治暴泄一身冷汗脈沉弱氣少不能語甚者加吐此爲緊病半夏製二兩乾薑炮肉桂附

子炮甘草炙各五錢良薑二錢半右爲麗末

每服五錢水二盞煎至一盞空心熟服

○謂

朝真丹

治寒盛泄瀉不止腸鳴腹痛手足厥冷脈微

弱硫黃生研三兩白礬煅七錢半右爲末水

浸蒸餅和丸梧子大朱砂三

錢爲衣米飲下三十丸

久泄 厥陰經動下利不止其脉沉遲手足厥逆涕唾膾血此證難治法曰風邪縮於內宜散之用桂枝麻

黃湯

勦覲汗之暢

○凡久瀉之由多因真陰虛損元氣下陷遂成久泄若非補中益氣湯

○

丸滋其本源則後必腎瘡腹脹小便淋澀多致不

起翻

○久泄是風邪內縮宜發其汗此證係風邪

縮於內宜麻黃升麻湯以發之散邪於四肢布於

經絡外無其邪則藏氣安矣

○

傳變爲痢

宜厚朴枳實湯

○久泄不止用破故

紙肉豆蔻

藥則止

○

泄宜參术健脾丸

除濕健脾湯溫脾散

○

飲食不節起居不時損其胃氣則上升精微之

氣反下降泄久則太陰傳少陰而爲陽潰瘍

○

麻黃升麻湯

○

治風邪內縮久泄不

止宜以此發之

○

麻黃升麻湯

○治風邪內縮久泄不

止宜以此發之

○

# 厚朴枳實湯

虛滑入不愈多傳變爲痢太陰傳少陰  
是爲鬼賊宜以此防其傳變厚朴薑製

訶子皮半生半熟枳實麸炒各二錢木香一錢大黃六分黃連甘草炙各四分右剉作一貼煎服

治久年泄瀉臍腹冷痛以此溫補脾胃  
蒼木八兩二兩鹽水浸兩米泔浸二

兩醋浸二兩葱白炒人參白术白茯苓山藥炒破故紙酒炒枸杞子鬼絲子酒製蓮肉各二兩川練肉五味子牛膝各一兩半川椒炒茴香鹽炒陳皮木香遠志各五錢右爲末酒糊爲丸梧子大空心

鹽湯下

百丸

細

# 除濕健脾湯

治久瀉色蒼而齒疎怠倦食減白术一錢半蒼术炒白茯苓白芍藥炒各一錢

當歸陳皮各八分猪苓澤瀉各七分厚朴防風各六分升麻柴胡各五分甘草四分右剉作一貼入

薑三片棗二枚

空心水煎服

翻

溫脾散

治久瀉米穀不化水穀入口卽時直下下元虛冷滑脫黃芪蜜炒人參白朮土炒白茯苓

山藥炒乾薑炮訶子炮肉豆蔻煨鷺粟殼蜜炒草果丁香肉桂附子炮黃蓮薑汁炒縮砂陳皮厚朴

甘草各五分右剉作一貼入

薑三片棗二枚水煎服

翻

訶子散

治久泄不止訶子皮一兩半生半熟木香五錢黃連三錢甘草二錢右爲末每取二錢以

白朮白芍藥

煎湯調下

泄瀉宜用升陽之藥

暑月霖雨時人多病泄瀉乃濕多成五泄故也內經曰在下者引而

竭之又曰治濕不利小便非其治也法當以淡滲之劑利之然客邪寒濕之勝外入裏而甚暴若

皮利小便之藥則是降之又降復益其陰而重竭其陽也茲以升陽之藥是爲宜耳羌活獨活升麻各一錢半防風甘草炙各一錢右剉水煎服卽愈大法曰寒濕之勝助風以平之又曰下者舉之正

謂此也據

### 瀉與痢不同

泄瀉之證水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血

相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異而皆裏急後重逼迫惱人赤白交下爲異

### 久泄成痢

太陰經受濕而爲泄虛滑身重微滿不知穀味久則傳變而爲膿血痢癰○夫痢者皆

由榮衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客於腸胃之間泄而爲痢也願○飲食不節起居不時損其胃氣則上乘精微之氣反下降是爲飧泄久則太陰傳少陰而爲腸澼

痢疾諸證

滯下之證內經所載有血溢血泄血便注下古方則有清膿血及泄下近世並呼爲痢疾

其實一也

因

痢有赤痢白痢

赤白痢水穀痢

膿

血痢噤口痢

休息痢風痢

寒痢濕痢

氣痢虛

痢滑痢積痢久痢疫

痢蟲症痢五色痢

赤痢

赤痢自小腸來濕熱爲本

側赤痢卽血痢也

下痢赤積身熱益元散

方加木通芍藥炒陳皮

白朮煎湯吞下保和丸

勸門赤痢宜導赤地

榆湯加減平胃散地榆散固腸丸

清六丸坊見

導赤地榆湯

治赤痢及血痢地榆當歸身酒洗各一

花炒各一錢阿膠珠荆芥穗各八分

甘草炙五分右剉作一貼空心水煎服

驥

加減平胃散

治血痢赤痢夫脾胃虛則血不流於四肢却入於胃而爲血痢白朮厚朴陳皮

各一錢二分桃仁人參黃連阿膠珠赤茯苓各七分甘草九分木香檳榔各五分右剉作一貼入薑

三片棗二枚空心水煎服

湯

地榆散

治血痢赤痢地榆赤芍藥黃連青皮各等分右爲末每三錢空心以淡米飲調下

固腸丸

治血痢赤痢去腸胃陳積之後用此以燥下濕樗根白皮焙乾爲末粥丸梧子大空心米

飲下二三十丸此藥性涼而燥須少用

一方樗根白皮四兩滑石二兩爲末粥丸

漱

白痢

白痢屬氣自大腸來濕熱爲本

附

○痢爲濕熱甚於腸胃怫鬱而成其病皆熱證也俗以痢白爲寒

誤也如熱生瘡癧而出白膿可以白爲寒乎若以白爲寒赤爲熱則兼赤白者乃寒熱俱甚於腸胃之間而爲病乎况下迫窘痛小便赤澁而痢白者亦多有之爲熱明矣附○凡泄痢無已變作白膿

點滴而下爲之溫脾不愈法當溫腎蓋腎主骨髓  
白膿者骨髓之異名也其證面色微黑骨力羸弱  
的見腎虛當用破故紙當歸木香乾薑肉桂之屬  
搗。白痢宜益元散黠覬溫六丸水煮木香元瀉  
白安

胃飲

溫六丸

治白痢益元散一劑加乾薑一兩右爲  
末飯丸梧子大白湯下五七十丸研

水煮木香元

治白痢及淡紅痢乾薑二兩鷺粟殼一  
兩訶子肉三錢當歸白芍藥各二錢半

木香青皮陳皮甘草各一錢半右爲  
末蜜丸彈子大熟水化下一丸研

瀉白安胃飲

治白痢蒼术炒白芍藥酒炒蓮肉各一  
錢白朮七分半人參陳皮白茯苓黃芪

蜜炒當歸酒洗各五分木香乾薑炮甘草  
炙各三分右剉作一貼空心水煎服

**赤白痢**

冷熱不調赤白各半宜薑墨丸乍溏乍澁似痢  
非痢宜茱連丸服○或赤或白冷熱不調宜小

駐車元

門○赤白痢宜黃連阿膠

元固腸湯

真人養藏湯茱連丸

**薑墨丸**

治赤白痢及蠱症痢乾薑炒松烟墨煅右等  
分爲末醋煮麪糊和丸梧子大空心米飲下

三十五丸  
日三服

**茱連丸**

治赤白痢吳茱萸黃連各二兩右以好酒同  
浸三日乃各揀取焙乾爲末醋糊和丸梧子

大赤

痢則黃連丸三十粒以甘草湯吞下白痢則

茱萸丸

三十粒以乾薑湯吞下赤白痢則各取三

十粒

以甘草乾薑湯

下丸○

一名黃連丸

**小駐車元**

治赤白痢黃連三兩阿膠珠一兩半當歸  
一兩乾薑五錢右爲末醋糊和丸梧子大

空心米飲下

三五十九臥

黃連阿膠元

治赤白痢及熱痢黃連三兩赤茯苓二兩右爲末水調阿膠炒末一兩和丸梧

子大空心米飲

下三五十九臥

固腸湯

治赤白痢鷄粟殼醋炒二錢白芍藥一錢半當歸甘草炙各七分半陳皮調子乾薑各五

分人參木香各三分右剉

作一貼空心水煎服

真人養臟湯

治赤白痢及諸痢鷄粟殼一錢甘草九分白芍藥八分木香七分調子六分肉豆蔻各三分

桂人參當歸白朮肉豆蔻各三分

右剉作一貼空心水煎溫服

水穀痢

脾胃氣虛則不能消化水穀糟粕不聚變而爲水穀痢。○飧泄亦曰水穀痢宜參看

膿血痢

如煩燥或先便膿後見血非黃連不止此上部血也○如惡寒脈沉或腰痛臍下痛非黃芩不

除此中部血也○如惡寒脈沉先見血後便膿非地榆不除此下部血也芻○膿血稠粘裏急後重

皆屬於火內經曰洩瀉而便膿血知氣行而血止也蓋洩瀉而便膿血者言病因也氣行而血止者言治法也故曰行血則便膿自愈調氣則後重自除芍藥湯主之芻○洩瀉而便膿血宜大黃湯下之是謂重劑黃芩芍藥湯和之是謂輕劑芻○膿泄亡津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血所謂瀉屬脾而痢屬腎也芻○熱積紫黑色者瘀血也腹痛後重異常桃仁承氣湯肪泄下之要知諸痢皆血瘀惟黑爲瘀甚耳芻○膿血痢宜桃花湯寒門導氣湯黃連阿膠湯導滯湯地榆散解毒金花散芍藥柏皮丸赤石脂丸人參

散

芍藥湯

治痢洩瀉而便膿血令行血則血膿自愈調氣則後重自除此藥是也白芍藥二錢黃連條芩當歸尾各一錢大黃七分木香檳榔桂心甘草各五分右剉作一貼水煎服

大黃湯

治熱痢膿血稠粘裏急後重日夜無度大黃

一兩剉好酒二盞浸半日煎至一盞半去渣分二次頻服以利爲度又服芍藥湯以和之此滌蕩邪熱之劑也酒煎者欲上至頭頂外徹皮毛也

糊

黃芩芍藥湯

治下痢膿血身熱腹痛脉洪數黃芩白芍藥各二錢甘草一錢右剉作一貼水

煎服腹痛甚加桂心三分研○一名黃芩湯三

導氣湯

治下痢膿血裏急後重當歸二錢半大黃黃芩白芍藥各一錢黃連木香檳榔各五分右

剉作一貼

水煎服

黃連阿膠湯

治熱毒下痢膿血或如爛肉汁黃連阿膠珠黃柏梔子各一錢二分半右剉作

一貼水

煎服

藏海

導滯湯

治下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度白芍藥二錢當歸黃芩黃連各一錢大黃七

分桂心木香檳榔甘草各三分

右剉作一貼

空心水煎服

臘

地榆散

治熱毒下痢膿血地榆犀角黃連炒葛根黃芩各一錢梔子五分右剉作一貼入薤白五

莖同煎

服法

解毒金花散

治熱毒膿血痢黃連黃柏各二錢白朮  
黃芩赤芍芩赤芍藥各一錢右剉作一

貼水煎

芍藥柏皮丸

治濕熱惡痢下膿血白芍藥黃柏皮各  
一兩當歸黃連各五錢右爲末水丸小

豆大溫水下

三四十九枚

赤石脂丸

治下痢膿血腹痛赤石脂乾薑各一兩黃  
連當歸各二兩右爲末蜜丸梧子大米飲

下三五十

丸空心臥

人參散

治酒毒挾熱下痢膿血腹痛久不差百藥無  
效樗根白皮人參各一兩右爲末每二錢空

服

水

附

米飲調下忌酒麪

雞

猪

魚

果

菜

等物

糀

# 噤口痢

痢疾不納飲食者俗謂之噤口痢如頭痛心煩手足溫熱此乃毒氣上衝心肺敗毒散

寒門方

五

錢加蓮肉一錢陳米百粒薑二棗二煎服如過飲苦澁涼藥以致聞食先嘔山藥剉如小豆銀石器

內擣半炒半生共爲末米飲調下卽效。噤口痢胃口熱甚故也宜參連湯卷臍法人不知此多

用溫熱藥及甘味此以火濟火以滯益滯也。噤口下痢噤口不食亦由脾虛宜以參苓白朮散防觀

去山藥加石菖蒲爲末梗米飲調下二錢或人參赤茯苓石蓮子入些菖蒲煎服。晝次一開自然思

食餌。凡治痢早用鶴粟殼則令毒氣閉塞心絡令噤口不食宜以御米煮稀粥溫啜解之。噤口

口痢宜倉廩湯開噤湯石蓮散解噤丸納臍膏

# 參連湯

治噤口痢胃口熱甚黃連三錢人參石蓮肉各二錢右剉作一貼水煎取濃汁細細呷之

如吐再喫但得一呷下  
咽便開仍用罨臍法

引熱令下行田螺二箇入麝香

罨臍法

少許擣爛罨臍中以帛包定砌

倉廩湯

治噤口痢心煩手足熱頭痛此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食人參敗毒散寒加黃連一錢石蓮肉七枚陳倉米三百粒入

薑三片棗二枚同煎服

亦治熱痢

開噤湯

治噤口痢砂糖七錢細茶五錢縮砂研一錢生薑五片右剉作一貼水煎露一宿次早面

北溫服○外用木鱉子去殼三錢

麝香二分共擣罨臍中

卽思食

石蓮散

治噤口痢石蓮子搗去殼留心併肉研爲末每二錢陳米飲調

此疾由毒氣上衝心肺

借此以通心氣便覺思食仍以東壁土炒橘皮爲末入薑棗畧煎服佐之

卽思食

**解噤丸**

治噤口痢黃連八兩生薑四兩切同炒令焦去薑只取黃連爲末陳米飯和丸梧子大

每服七八十九赤痢陳米飲下白痢

橘皮湯下赤白痢陳米橘皮湯下

**納臍膏**

治噤口痢危重者用之立愈王瓜藤連莖葉經霜者晒乾燒灰香油調納臍中卽效

**休息痢**

凡痢乍發乍止者名休息痢飄。休息痢經年不差以致氣血虛而不斂入物湯方

虛加陳皮  
加鹽

阿膠珠黃連黃芩各少許脾胃虛者補中益氣湯參苓白朮散並見內傷○

三根飲訶黎

勒丸神效丸

**加味養臟湯**

治休息痢真人養臟湯方見加附子青皮烏藥茯苓右剉薑三片棗二枚煎服

得效

三根飲

治休息久病如神五倍木根蒼耳草根臭橘木根刮取白皮各等分右剉每服七錢入生薑三片大棗二枚黑豆三十六粒

糯米

四十九粒空心同煎服

僵

訶黎勒丸

治休息病百藥不效榔根白皮二兩訶子肉五錢母丁香三十粒右爲末醋糊和丸

梧子大陳米飲久醋少

許存下五十九日三帖

神效丸

治休息病膿血不止疼痛困弱當歸烏梅肉黃連阿膠珠各等分右爲末蜜丸梧子大空

心厚朴湯下三五十

丸病甚者蠟丸

風痢

風痢惡風鼻塞身重色青或注下清水宜蒼术防風湯方見上○風痢所下似痢非痢似血非血宜

倉廩湯

○方見上○得效

○風痢

宜胃風湯

○方見上○

露宿湯

**露宿湯**

治風痺純下清血杏仁去皮尖七箇苦木瘡一掌大白芍根烏梅一箇草果一箇酸石榴

皮半箇青皮二箇甘草一寸右剉作一貼

入薑三片煎

露星一宿次早空心服

糊

**寒痢**

寒病白如鴨溏腸鳴痛墜不甚宜理中湯方見寒門加

石脂

散

**黃連補腸湯**

治大腸虛冷痢下青白黃連四錢赤茯苓川芎各三錢酸石榴皮五片地榆五

錢伏龍肝二錢右剉入錢

作一貼

空心水煎服

附

**赤石脂散**

治冷痢赤白腸滑肉豆蔻煨一兩縮砂五錢赤石脂甘草炙各二錢半右爲末每二

錢粟米飲

調下

糊

濕痢

濕痢腹脹身重下如黑豆汁或赤黑渾濁此危證也宜當歸和血散鬱加味除濕湯戊己丸。

下痢如豆汁者濕也

蓋脾胃爲水穀之海常兼四

臟故有五色之相雜

當先通利此迎而奪之之義

心丹也

加味除濕湯

治傷濕下痢如黑豆汁半夏厚朴蒼朮各一錢二分藿香陳皮赤茯苓各七分

木香桂皮甘草各五分右剉作一

貼薑三片棗二枚空心水煎服心丹

戊己丸

治濕痢黃連吳茱萸白芍藥各等分右爲末麴糊和九梧子大空心米飲下五十九丸

熱痢

熱痢與暑痢同。大凡痢疾多因伏暑而得但背寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲皆暑證也不宜輕用附子等熱藥宜酒蒸黃連丸

方見血效。其冷熱蘊積腸胃間滑泄垢膩者名腸垢卽

熱痢也。偏熱純赤見暑證輕者黃芩芍藥湯。

重者導滯湯。

日久者黃連阿膠湯。

下痢

者身熱口渴小便澁少大便急痛所下黃赤色。

熱痢。

黃芩芍藥湯最妙。

下痢。

壯熱須用倉

廩湯。

下痢欲飲水有熱故宜白頭翁湯。

## 烏梅丸

治熱痢腹痛下純血黃連一兩半烏梅肉當歸枳殼各一兩右末醋糊和丸米飲下七十

丸空心

## 寧胃散

治赤白熱痢白芍藥二錢黃芩黃連木香枳殼各一錢半陳皮一錢甘草炙五分右剉作

一貼。

水煎服一名。

芩連芍藥湯。

湯。

## 氣痢

氣痢狀如蟹渤海拘急獨甚宜

茱連丸。

上方見氣痢丸牛乳湯。

氣痢丸

治氣痢狀如蟹渤海訶子皮橘皮厚朴各一兩右爲末蜜丸梧子大空心米飲下三十丸

牛乳湯

治氣痢草撥二錢剉牛乳半升右同煎減半空心服之。唐太宗苦氣痢百方不差有衛

七進此方服

之卽愈

譏

虛痢

氣弱困倦穀食難化腹微痛或大痛並無努責嘯△滑痢與虛痢同虛滑不禁甚則氣血俱脫血虛

四物湯加人參白朮地榆樗白皮氣虛真人養藏

湯△氣虛色白如鼻涕凍膠理中湯加木香肉

桂厚朴赤茯苓△如力倦自覺氣少惡食此爲

挾虛症宜用補氣血之藥虛廻而痢自止△痢△

疾日久氣血虛弱宜用八物湯

方覲內傷△病稍久者不可下胃虛故也調中理

氣湯加味香連丸擇用之

△久痢五虛證危困者宜大斷下九五虛者脉細皮寒氣少泄利前後

飲食不入是也如漿粥入胃泄注止則虛者活矣  
辨△虛寒痢脫肛宜訶子皮散

### 調中理氣湯

治虛痢氣弱困倦白术枳殼白芍藥楨榔各一錢

木香五分右剉作一貼水煎服此治痢調理之劑也

### 加味香連丸

治虛痢及久痢一切諸痢黃連四兩以吳茱萸煎水浸炒木香一兩啞芙蓉二

錢右爲末陳米糊和丸茱豆大每二三十丸以蓮肉煎湯吞下被蓋就睡奏效神矣

### 大斷下丸

治久痢滑數消瘦困弱龍骨附子炮白朮肉豆蔻煨牡蠣煅訶子皮酸石榴皮各

一兩良薑乾薑赤石脂各七錢半細辛三錢七分半右爲末醋糊和丸梧子大栗米飲下三十九丸

### 訶子皮散

治虛寒赤白痢脫肛御米殼蜜炒橘皮各五分乾薑炮六分訶子皮七分右爲末作

一貼水煎空心和渣服疎

積痢

積痢色黃或如魚腦漿腹脹痛惡食嘔△無積不成痢△痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積

欲出氣滯而不與之出所以下墜裏急乍起乍止

日夜凡百餘度人有此證不論色之赤白脉之大

小一皆以通利行之△飲食傷飽者注下酸鼻

諸有積者以肚熱纏痛推之△傷積滯則糞白

有效難○食積痢宜保和丸助

曠感應元蘇感元生熟飲子

感應元

治積痢久痢赤白膿血相雜肉豆蔻煨白薑

炮

百草霜各二兩木香一兩半草澄茄三稜

丁香各一兩

巴豆百粒去皮尖雙仁炒另研酒煮蠟四兩清油

一兩右七味爲細末入巴豆杏仁末先將油煎蠟

令溶化拌和藥未成劑每一兩分作十錠每一錠

米調服或作丸菜豆  
大白湯吞下十九嬪

### 蘇感元

治積痢腹內緊痛麝香蘇合元氣門四分感應元六分研勻丸菜豆大米飲下三十九嬪

### 生熟飲子

治大人諸痢及小兒虛積痢日夜無度驚栗殼大者四箇去瓢蒂半炙半生陳皮二片半生半炒甘草二寸半生半炙烏梅二箇半生半煨大棗二枚半生半煨生薑二塊半生半煨木香一錢作兩片半生半煨訶子大者二箇半生半煨黑豆六十粒半生半炒黃芪二寸半生半炙白术二塊半生半煨當歸二寸半生半煨右剉和匀

每服五錢水一盞半同入磁瓶內煮至半去滓溫服小兒服一二合此方分生熟均冷熱冷熱既散腸胃既厚則水穀自分何患瀉痢哉翁藥炒白术炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十久痢

粒然此丸性燥若滯氣未盡不可遽用。久痢體虛氣弱滑泄不止當以訶子肉豆蔻白朮半夏等藥澁之甚者添牡蠣須以陳皮爲佐恐太澁亦能作疼也。研。久痢不止服理中湯益甚此痢在下焦赤石脂禹餘粮湯主之。方見理中者理中焦用此以固其下焦故也。久痢宜大斷下元萬全丸。二方見上真人養藏湯木香散

實腸散加減益氣湯桔白皮散

木香散

治久痢及血痢甘草炙一兩木香黃連各五錢同炒鷺粟殼生薑各五錢同炒右爲末入

麝香少許空心米

飲調下二錢

加減益氣湯

治久痢疲弱甚不能起床白朮白芍藥陳皮各一錢當歸七分黃芪人參澤瀉

縮砂地榆各五分升麻木香白豆蔻御米穀醋炒甘草炙各三分右剉作一貼空心水煎服

**樗白皮散** 治久痢諸藥不效樗根白皮一握梗米一  
合葱白一握甘草一寸豉二合右水一升

煮取半升

頓服

**實腸散**

治久痢不分赤白用此藥換出黃糞來山藥炒一兩炒黃米一合右爲末用砂糖調熱湯

和勻藥末適稀稠漸漸服後用清米湯漱口最效

**疫痢**

一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也當察運氣之相勝以治之

曰疫痢人參敗毒散

加陳皮

白芍藥煎服或薑茶湯以防之

**薑茶湯**

治痢疾腹痛者生薑春茶葉等分同煎服

解之不問赤白冷熱疫痢腹痛通用之  
之櫛 ◇ 热痢留薑皮冷痢去薑皮

蠱疰痢

久痢不已毒氣蝕於臟腑下血如雞肝雜膿瘀

渴

五內切痛此因服五石湯丸所致其血自百脉

經絡而來以茜根丸救之

△蠱疰痢宜羚羊角元薑墨

九方

見

茜根丸

治蠱疰痢茜根犀角升麻地榆當歸黃連枳殼白芍藥各等分右爲末醋糊和丸梧子大

米飲

下五

七十丸

羚羊角元

治蠱疰痢黃連二兩黃柏羚羊角鰲各一兩半白茯苓一兩右爲末蜜丸梧子大茶

清下

五七

十九丸

見

五色痢

痢疾五色俱下乃脾胃食積及四氣相併以茱連丸救之臍脾胃爲水穀之海無物不受常

兼四臟故病有五色之相雜當先通利心△濕毒甚盛下痢腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜地榆

散黃連阿膠湯

二方見上

◇五色病宜

服秘方養臟湯絲瓜散神效參香散

### 秘方養臟湯

治五色病鷺粟殼蜜炒一錢半陳皮枳殼黃連木香烏梅厚朴杏仁甘草炙各

七分右剉作一貼入黑豆三

十粒大棗二枚煎服立效

### 絲瓜散

治五色痢及酒痢便血腹痛乾絲瓜一枚連皮燒灰爲末酒調二錢空心服

### 神效參香散

治下痢五色及噤口痢蟲時疫諸病陳皮鷺粟殼各一兩二錢肉豆蔻赤茯苓各

各四錢白扁豆人參木香各二錢

右爲末每三錢空心米飲調下

### 八痢危證

一曰熱赤二曰冷白三曰冷熱相加赤白四日食積酸鼻五曰驚青六曰脾虛不化七曰

時行有血八日曰瘡卽瀼瀉癰。一曰冷痢白積二日熱痢赤積三日冷熱不調積下赤白四日瘡痢黃白積或見五色五日驚痢青積不臭六日休息痢糞黑如魚腸七日釀痢腹脹便臭肛痛八日蠱症痢下紫黑血如猪肝門。○通用

小駐車丸真人養臟湯

二方見上類聚

### 痢疾腹痛

下痢腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間實者下之虛者以苦梗發之。○下痢腹痛不可

用參芪。○凡痢腹痛以白芍藥甘草爲君當歸白朮爲佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏。○或食粥及肉稍多作痛宜以白朮陳皮煎湯服之且宜奪食奪食者減其粥食絕其肉味也。○下痢膿血腹痛不止調胃承氣湯加薑棗煎服  
方見寒門瀉訖以五苓散煎水益元散調下△痢疾腹痛宜香連丸

九薑茶湯

方見上

神效越桃散

**香連丸**

治赤白膿血下痢腹痛及一切諸痢黃連一兩吳茱萸五錢水浸一宿同炒去茱萸木香

二錢半右爲末醋糊和丸梧子大空心米飲下二三十丸

**神效越桃散**

治下痢腹中滿痛不可忍此名陰陽反錯不和之甚大梔子仁良薑各三錢右

爲末米飲調

下二三錢

瞬

**痢疾裏急後重**

裏急窘迫急痛是也後重者大腸墜重而下也其證不一有因火熱者謂火性

急速而能燥物是也有因氣滯者此大腸之氣壅而不宣通也有因積滯壅盛者是有物結墜也有

氣虛者此大腸氣降而不能升也有血虛者所謂虛坐努責是也治法火熱者清之氣滯者調之積

滯者去之氣虛者升之血虛者補之。後重者本因邪壓大腸而墜下故大腸不能上升而重用

大黃檳榔輩瀉其所壓之邪今邪既瀉而其重仍在者知大腸虛滑不能自收而重用御米殼等瀉

劑同其滑收其氣亦愈也

心

○下墜異常積中有

紫黑血而又痛甚此爲死血用桃仁泥滑石行之

心

△後重窘迫當和氣宜木香檳榔

謁○自古治

裏急後重但用木香檳榔調氣及大黃下積至丹

溪始用桃仁滑石活死血其效如鼓應桴。

氣

行血和積少但虛坐努責此爲亡血證倍用當歸

身尾却以生地黃芍藥生桃仁佐之陳皮和之

血生自安血虛則裏急故用當歸身

心○裏急者

腹中不寬快也虛坐而大便不行

者血虛也後重者虛氣墜下也

心

### 痢疾大孔痛

下痢大孔痛因熱流于下用木香檳榔芩

連加炒乾薑煎服

心

○下痢大孔痛一曰溫之一曰清之如久

病之艸○下痢大孔痛一曰溫之一曰清之如久

病身冷脈沉小宜溫之如暴病身熱脈浮洪宜清

之。作痛熱流於下也。下痢大便不禁大孔開如空洞用葱椒末爛擣塞穀道中併服酸澁固腸之劑如御米殼訶子皮之類收之。下痢大孔痛此大虛也瓦片圓如銅錢大燒紅投童尿中急取令乾紙裹安痛處以人參當歸陳皮濃煎飲之。又炙枳實熨之炒鹽熨之又熟艾黃蠟訶子燒烟熏之妙。

## 痢疾宜下

痢初得一二日間元氣未虛必推蕩之此通因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下

後看氣血調理五日後不可下脾胃虛故也。此亦大槩言之氣血弱者雖一二日不可下實者十餘日後亦可下之。下痢腹滿爲實當下之。

繩。下痢脉反滑者當有所去下之乃愈。仲下痢已差至其年月日時復發者以病不盡故也當

下之宜大承氣湯艸。仲景治痢可下者悉用承

氣等湯加減下之大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快積行卽止局方例以熱藥爲主瀉藥爲佐用之於下痢清白者猶可其裏急後重經所謂下迫者皆屬火熱所爲加以瀉熱非殺之而何瀉

### 治痢要訣

行血則便膿自愈調氣則後重自除。○下痢治法曰後重者宜下木香檳榔又木香檳

榔丸

積方觀

○腹痛者宜和芍藥陳皮又芍藥甘草湯

肛門

○身重者除濕茯苓澤瀉又五苓散

方觀

○脉弦者去風秦艽防風又敗毒散

寒方觀

○膿血

稠粘者

以重藥竭之大黃芒硝又大黃湯○身冷

自汗者以熱藥溫之附子乾薑又漿水散○風邪

內縮者宜汗之麻黃白芷乾葛又麻黃升麻湯

○膿○驚瘡爲痢者宜溫之肉桂木香又水煮木香

丸肥皂○又曰在表者發之在裏者下之在土者

涌之在下者竭之身表熱者內疎之小便澁者分利之暢○又曰盛者和之去者送之過者止之暢

○治痢藥法色黑大黃色紫地榆色紅黃芩色淡生薑色白肉桂色黃山楂水泄栗殼痛甚木香梔

子丸○凡痢之初宜立效散一服卽愈或木香導氣湯以散其毒皆良法也醫○治痢者必用寒以

勝熱苦以燥濕微加辛熱佐之以爲發散開通之用固無不效矣附○痢疾宜以阿膠珠當歸青皮

赤茯苓黃連作劑入烏梅濃蜜同煎最能蕩滌惡穢積滯既去則遍數自疎矣附○大要以散風邪

行滯氣開胃脘爲先不可遽用豆蔻訶子白朮輩以補住邪氣及粟殼龍骨牡蠣輩以閉澁腸胃必

爲日久淹延之疾待其腹痛後重皆除然後乃用斷下之藥

## 立效散

治赤白膿血痢腹痛裏急後重一服立止黃連四兩以吳茱萸二兩水拌同炒去茱萸枳

殼麩炒二兩右爲末每三錢空心黃酒送下此治熱積氣滯之痢黃連清熱枳殼破氣鑿

### 木香導氣湯

治痢初起腹痛裏急後重赤白相雜發熱噤口大黃一錢半白芍藥朴硝黃連

各一錢二分厚朴檳榔各一錢當歸尾

赤茯苓各八分右剉作一貼水煎服鑿

### 痢疾通治藥

痢疾諸證臍腹病痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相雜或如

黑豆汁或如魚腦或如茅屋漏水皆裏急後重頻欲登廁日夜無度通用水煮木香膏六神丸香連丸<sub>上</sub>加味香連丸白朮安胃散百中散和中飲易簡斷下湯寧胃散<sub>上</sub>見救命延年丸。瘧後痢

黃連木

香湯

### 水煮木香膏

治一切諸痢鴟粟殼蜜炒三兩縮砂肉豆蔻煨乳香各七錢半木香丁香诃子

藿香當歸黃連厚朴陳皮青皮白芍藥甘草炙各  
五錢枳實乾薑炮各二錢半右爲末蜜丸彈子大  
水一盞棗一枚同煎至

七分去棗和滓服

### 六神丸

治諸痢要藥黃連木香枳殼赤茯苓神麴炒  
麥芽炒各等分右爲末神麴糊和丸梧子大  
每五十九赤痢甘草湯下白痢乾

薑湯下赤白痢乾薑甘草湯下門

### 加味香連丸

治諸痢之總司也黃連炒一兩吳茱萸  
梔炒一兩木香一錢白豆蔻煨一錢半  
加乳香沒藥各一錢右爲末烏梅水浸取  
肉和丸梧子大每三十九服如上法

### 白术安胃散

治一切瀉痢無問膿血鷄粟殼蜜炒二  
錢赤茯苓白术車前子各一錢五味子

烏梅肉各五分右剉

作一貼水煎服

百中散

治一切病無問赤白二三服便愈  
鷺粟殼密炒赤色厚朴薑製各二兩半右爲末每二三

錢空心米飲調下

忌生冷毒物

和中飲

治痢無問赤白久近無不效但發熱噤口者不可服  
鷺粟殼醋炒一錢半陳皮白朮赤芍

芩赤芍藥各一錢陳倉米二錢草果仁七分甘草三分砂糖三錢烏梅一箇右剗作一貼薑三片棗

二枝水

煎服

劑

易簡斷下湯

治一切病尤治虛滑痢鷺粟殼十四枚去筋膜蒂萼剗醋淹炒擣爲末白朮

赤茯苓各一錢甘草炙五分草果一箇連皮剗右作一貼水一椀薑七片棗梅各七箇煎至一盞分

二服

劑

# 黃連木香湯

治瘧後痢疾白芍藥炒二錢白朮一錢半黃連炒木香縮砂研黃芩炒陳皮當

歸酒洗各一錢甘草五分右

剗作一貼薑三片水煎服

櫻

# 救命延年丸

治男女一切重病黃連乾薑當歸阿膠珠各等分右三味爲末以醋煮阿膠令

消化和丸梧子大每三五

十九丸米飲吞下甚妙

軀

# 泄痢易治難治辨

太陰脾經受濕而爲水泄久則傳變而爲膿血痢是脾傳腎謂之微邪故愈

難愈若先痢而後瀉是腎傳脾謂之賊邪故

易愈○殼泄脉大手足寒難已脉小手足溫易已

渴○下痢有微熱而渴脉弱者自愈○下痢脉數有

微熱汗出當自愈○下痢脉大者爲未止繩○

下痢手足溫易治手足寒難治繩○

下痢嘔噦發呃煩燥身熱者難治繩○

泄痢吉凶證

下痢如魚腦髓者半生半死○身熱脈大

純血者死

○下如茅屋漏水者死

○大孔開如竹筒者死

○唇如朱紅者死

○死犯溪上

○內經曰腸澼便

血身熱則死身寒則生○內經云身熱則死寒則

生此是大槩言之必兼證詳之方可豈無熱生而

寒死者乎

○下痢手足厥冷無脉者炙之炙之

不溫若脉不還反微喘者死

○下痢脉絕手足

厥冷眸時脉還手足溫者生脉不還者死

○腹

鳴而滿四肢清而泄其脉大是逆也不過十五日

死

○腹大而脹四肢清脫形泄甚是逆也不及

一時死

○下痢之證身涼能食小便通易安若

體熱多汗渴甚小便不利或手足厥冷炙之不溫兼微喘不食者死

○凡下痢譫語直視及厥躁

不得眠汗不止無脉及自利不禁身熱脉實者皆死

○泄瀉久不止手足寒脉虛脫煩躁發呃氣

短目直視昏冒不識人皆死證也翻○病不治證  
○脈大○身熱○鴨屎○發渴○咳逆○五色○  
噤口○紅水○唇紅○手足冷○氣喘○痢後煩  
渴欲飲爲心絕○小便絕不通爲胃絕○下痢小  
便不通或絕無者此毒氣併歸一藏胃乾者死翻  
○小兒之病重傷胃氣全不飲食名曰噤口肛門  
寬大深黑可畏腹肚疼痛裏急後重鮮血點滴名  
曰刮腸日夜頻併飲食直過名曰滑腸皆爲惡候  
餚○小兒痢穀道不閉黃汁長流者  
不治翻○病人卧遺屎不覺者死翻

### 飯後隨卽大便

飯後隨卽大便者蓋脾腎交濟所以有  
水穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲

食下咽而大府爲之飧泄也治法取二神丸空心  
鹽湯送下使脾胃之氣交通則水穀自然化此

所謂妙合而  
疑者也

# 大便秘結

腎主五液津液潤則大便如常若飢飽勞役或食熱物火邪伏於血中耗散真陰津液虧

少故大便結燥又有年老氣虛津液不足而結者經曰胃惡燥急食辛以潤之者是也

○脾有陽

結陰結者何以別之曰脈浮而數能食不大便此爲實名曰陽結也期十七日當劇脈沉而遲不能

食身體重大便反硬名曰陰結期十四日當劇

○肺

○有熱燥風燥陽結陰結經曰結者散之治法陽

結者散之陰結者溫之陽結宜大黃牽牛散陰結

宜半硫丸

○燥結者大便秘滯不通也燥屬少

陰津液不足以辛潤之結屬太陰有燥糞以苦泄

之臍○藏府之秘不可一槩論有實秘有虛秘

秘者物也虛秘者氣也胃實而秘者能飲食小便

赤脾約丸防見七宣丸主之胃虛而秘者不能飲

食小便清利厚朴湯主之

○秘結之證有虛有實實則宜蕩滌腸胃開結軟堅如大黃芒硝枳實

厚朴承氣湯之類是也。寒虛則宜滋養陰血潤燥散結如當歸地黃桃仁麻仁條芩潤燥湯之類是也。○桃杏仁俱治大便秘當以氣血分之。晝則便難行陽氣也宜用杏仁夜則便難行陰血也。當用桃仁老虛人大便燥秘脉浮在氣杏仁陳皮脉沉在血桃仁陳皮所以俱用陳皮者以手陽明與手太陰俱爲表裏也。○血燥以桃仁酒大黃通之氣燥以杏仁枳實通之風燥以麻子仁加大黃利之氣澁而不通者以郁李仁皂角仁潤之。○風燥宜疎風潤腸丸。皂角元活血潤燥丸。○血燥宜潤腸丸。潤麻丸。蕤沉丸。五仁丸。小麻仁丸。通幽湯和血潤腸湯當歸潤燥湯。○氣滯參仁丸。接風潤腸丸。三和湯。四磨湯。六磨湯。

○婦人秘結宜通神散大磨仁丸

# 大黃牽牛散

治相火遊走臟腑大便秘結大黃一兩黑牽牛子頭末五錢右爲末每三錢手

足冷者酒調下手足

熱者蜜湯調下保

半硫丸

治老人痰結大便秘澁半夏薑製爲末硫黃研極細以柳木槌殺過右等分薑汁浸蒸餅

和丸梧子大溫酒或

薑湯下五七十九帖

七宣丸

治熱留腸胃大便秘結大黃一兩木香檳榔诃子皮各五錢桃仁十二箇右爲末蜜丸梧

子大溫水下

五十九帖

厚朴湯

治大便虛秘白朮二錢厚朴一錢三分陳皮甘草各二錢半夏麴九分枳實八分右剉作

一貼入薑三片棗

二枚水煎服

當歸潤燥湯

一名潤燥湯治血燥大便秘澁當歸大黃熟地黃桃仁麻仁生甘草各一錢生

地黃升麻各七分紅花二分右剉先取七味作一  
貼煎將至半方入桃仁麻仁煎至半空心服

### 疎風潤腸丸

治風熱鬱滯大便閉澁乾燥須潤燥和血疏風則自然通矣

麻子仁二兩半桃仁二兩  
兩 兩 三錢 大黃羌活各一兩  
防風當歸各三錢 右爲末蜜九梧子大白湯下三

丸頭  
五十

### 皂角元

專治風人大便秘澁羌活防風猪牙皂角枳殼桑白皮檳榔杏仁麻仁白芷陳皮各等分

右爲末蜜九梧子大溫湯下

三十五

十九有熱加大黃

### 活血潤燥丸

治風秘血秘大便常常燥結此與上潤腸丸同但皂角用仁

丸頭

### 潤腸丸

治大便秘澁杏仁枳殼麻仁陳皮各五錢阿膠珠防風各二錢半右爲末蜜九梧子大每

五十九老人蘇子湯  
下壯者荆芥湯下瓶

潤麻丸

治血燥大便不通能潤之麻仁桃仁生地黃當歸枳殼各一兩右爲末蜜丸梧子大白湯

下五十九丸○

正傳名潤體丸

蕤沉丸

一名蕤蓉潤腸丸治二津液大便常秘結肉蕤蓉二兩沉香一兩右爲末用麻仁汁打糊

和丸梧子大每七十

丸空心米飲吞下

五仁丸

一名滋腸五仁丸治津液枯竭大便秘結婦人產後便秘尤宜橘紅四兩另爲末桃仁杏仁各一兩柏子仁五錢郁李仁炒二錢松子仁一

錢二分半右各另研爲末蜜丸梧子大空心米飲

下五十七

# 小麻仁丸

治血燥大便秘結此方與上潤麻丸同用

# 通幽湯

治幽門不通大便難宜以辛潤之升麻桃仁泥當歸身各一錢半生地黃熟地黃各七分

炙甘草

紅花各三分

右剉作一貼

水煎去滓

調檳榔細末半錢

服頓

# 和血潤腸湯

治大便燥結不通升麻桃仁麻仁各一錢半大黃熟地黃當歸梢各七分生地

黃生甘草各五分紅花三

分右剉作一貼

水煎服頓

# 參仁丸

治氣壅大便秘麻子仁大黃各三兩當歸身一人參七錢半右爲末蜜丸梧子大空心

熟水下三

十九帖

# 搜風潤腸丸

治三焦不和氣不升降脅腹痞滿大便秘澁郁李仁一兩木香檳榔青皮陳皮

沈香蘿蔔子炒槐角枳殼大黃各五錢右爲末蜜丸梧子大空心米飲下五七十九劑

三和湯

治氣滯大便秘澁卽氣門三和散也

四磨湯

治氣滯大便秘澁大檳榔沉香木香烏藥右四味等分各濃磨水取七分盞煎三五沸微

溫服空

心謂

六磨湯

治大便秘澁有熱者四磨湯加大黃枳殼如上法濃磨汁服謂

通神散

治婦人大便不通大黃芒硝桃仁郁李仁各一兩木香五錢右爲末每二錢米飲調下剉

大麻仁丸

治婦人風秘木香檳榔枳殼各一兩麻仁大黃炒各三錢右爲末蜜丸梧子大空心

# 老人秘結

老人臟腑秘滯不可用大黃緣老人津液少  
所以秘滯若服大黃以瀉之津液皆去定須

再秘甚於前只可服滋潤大腸之藥更用槐花煎  
湯淋洗肛門亦效。老人秘結宜疎風順氣元  
小皂角元二仁元橘杏丸黃芪湯膠蜜湯蘇  
麻粥三仁粥○常食乳酪血 腻麻汁爲妙

# 疎風順氣元

治腸胃積熱二便燥澁諸風秘氣秘皆  
治之老人秘結尤宜大黃酒蒸晒七次

五兩車前子炒二兩半郁李仁檳榔麻子仁微炒  
兎絲子酒製牛膝酒洗山茱萸各二兩枳殼  
防風獨活各一兩右爲末蜜丸梧子大每五七十  
丸空心茶酒米飲任下○此藥專治大便秘滯真  
良方也久服精神康健

百病不生尤宜老人

# 小皂角元

治風秘尊年人宜服皂角炙枳殼各等分  
右爲末蜜丸梧子大米飲下七十丸

二仁元

治老人虛人風秘杏仁麻仁枳殼阿子肉各等分右爲末蜜丸梧子大溫水下五十九粒

橘杏丸

治老人虛人氣秘服之大便自無澁滯橘皮杏仁各等分右爲末蜜丸梧子大米飲下七

十九

○此治晝便難若夜

便難

去杏仁用桃仁

燒

黃芪湯

治老人大便秘澁黃芪陳皮去白各五錢右爲末另取麻子仁汁一盞於銀石器煎候有

乳起卽入白蜜一大匙再煎令沸調前藥末三錢

膠蜜湯

治老人虛人大便秘澁連根大葱白三莖新水一盞煎葱爛熟去之入明阿膠珠二錢蜜

二匙攬令熔

化空心服

蘇麻粥

順氣滑大便治老人虛人風秘血秘大便難澁婦人產後便秘皆宜服之蘇子麻子不拘

多少等分同擣爛和水瀘取汁梗米末少許同煮  
作粥食之久服尤佳。一老婦忽爾腹痛頭痛  
恶心不食正是老人風秘臟腑壅滯氣聚胃中則  
腹脹恶心不欲食上至於巔則頭痛神不清服此  
粥兩啜而氣泄下結糞十餘枚臟腑流暢諸疾自去矣。

### 三仁粥

治大便秘結老人虛人皆可服桃仁海松子  
仁各一合郁李仁一錢右同擣爛和水瀘取  
汁入碎粳米少許

煮粥空心服

### 脾約證

傷寒陽明病自汗出小便數則津液內竭大便  
必難其脾爲約脾約丸主之。

方見下。  
仲景。成無已

日胃强脾弱約束津液之得四布但輸膀胱故小  
便數而大便難制脾約丸以下脾之結燥丹溪曰  
旣云脾弱脾弱則土虧肺金受火之剋肺耗則津  
竭脾失轉輸之令肺失傳送之職宜大便秘而難

小便數而無藏蓄也 宜滋養陰血使陽火不熾  
則肺金行清化脾土清健而運行津液則腸潤而  
自通矣今此丸用之於熱甚而氣實與西北人壯  
實者無有不安若用於東南人與熱雖盛而氣血  
不實者將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在 西北以開結爲主在東南以潤燥爲功 潤

脾約丸 一名麻仁丸治小便數大便難名爲脾約證  
大黃蒸四兩枳實厚朴赤芍藥各二兩麻子仁一兩半杏仁一兩二錢半右爲末  
蜜丸 梧子大空心溫湯下五十丸

## 大便不通

大便秘結者常常乾燥而艱難放下也不通者累日不得通閉塞脹滿也○熱邪入裏則

胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也虛人臟冷而血脉枯老人腸寒而氣道澁此大腸之挾冷然也腹脹痛悶曾痞欲嘔此宿食留滯也腸胃受風濁燥秘澁此風氣燔灼也若氣不

下降而穀道難噫逆泛滿必有其證矣熱者三黃  
湯方門視冷者半硫丸宿食宜脾積元風秘宜麻仁  
丸門脾氣不下降則苦黃枳殼湯門視大腸與肺  
爲表裏大腸者諸氣之道路關焉孰知流行肺氣  
爲治法之樞紐乎門久病腹中有實熱大便不  
通潤腸丸微利之不可用峻利之藥門大便閉  
服承氣湯之類不通者四物湯門加檳榔枳殼  
桃仁紅花醫鑒○古方通大便皆用降氣之劑蓋肺  
氣不降則大便難於傳送用杏仁枳殼沉香訶子  
等是也老人虛人風人津液少而秘者宜以藥滑  
之用麻仁脂麻阿膠等是也若妄以峻劑逐之則  
津液走氣血耗雖暫通而卽復秘或更生他病矣  
心研○大便不通宜靈寶丹蘇感元坊見潤腸湯大  
黃飲子老人虛人宜潤腸丸潤腸湯婦人宜通神  
散坊見調導飲○外  
治宜宣積丸提益散

脾積丸

治飲食停積腹脹吞酸大便秘結蓬术一兩半三稜一兩青皮五錢良薑以醋煮切片焙

乾木香百草霜巴豆霜各二錢半右爲末

麴糊

和丸麻子大橘皮湯下五七十九瓣

靈寶丹

治大便不通推下積滯木香沉香乳香各半錢巴豆去皮心油二錢右爲末大棗三枚蒸

取肉和勻擣作丸如菉豆大每服一丸涼水送下如加欲利三行先喫涼水三口然後用涼水送下如

欲五行六行

依數喫水

仰

潤腸湯

治大便秘澁久不通麻子仁一盞半細研水浸濾去皮取汁脂麻半盞細研水浸絞取汁

桃仁一兩研爲泥荆芥穗一兩擣爲末右和合入鹽少許同煎代茶飲之以大便通利爲度

仰

大黃飲子

治熱燥大便不通生地黃二錢大黃煨杏仁梔子升麻枳殼各一錢人參黃芩甘草

各五分右剉作一貼入薑五片豉

二十一粒烏枚一箇同煎服搗

### 潤腸丸

治老人血少腸胃乾燥大便閉結甚至七八日難下色如猪糞少如羊糞者當歸生地黃枳殼桃仁麻仁各等分右爲末蜜丸梧子大空心米飲下四五十丸

### 潤腸湯

治老人虛人大便閉結蜂蜜一兩香油五錢朴硝一撮右合水一鍾煎數沸溫服

### 調導飲

治婦人產前後大便不通當歸川芎防風枳殼各一錢二分半甘草三分右剉作一貼入

薑三片棗二枚

空心水煎服搗

### 宣積丸

治大便閉塞巴豆去殼乾薑韭子良薑硫黃甘遂白檳榔等分右爲末飯丸如雞子黃大

早朝先以椒湯洗手麻油塗手掌握藥一粒移時便瀉欲止則以冷水洗手軸

提盆散

治大便不通草烏爲極細末葱白一枚切去根其頭上有汁濕蘸草烏末納肛門中卽通

○卽霹靂箭能治

大小便不通

大便不通

凡大小便不通內經謂之三焦約者不行也又曰大小便不通者陰陽關格乃三

焦約之病也

癩

○三焦約大小便不通宜枳殼丸

五味子散

癩

○大小便不通宜三一承氣湯車狗

散鐵脚丸

癩

○倒散倒換散蟻娘散甘遂散貼脣

膏○外治宜迴生神膏丁香散掩臍法導便法

○治氣不升降大便秘澀小便赤黃黑牽牛頭

推氣丸

治氣不升降大便秘澀小便赤黃黑牽牛頭

末大黃檳榔枳實陳皮黃芩各等分右爲末

薑汁煮糊和丸梧子大

淡薑湯下三五十九

瓣

三一承氣湯

治傷寒及雜病熱盛大小便不通胃腹

滿痛

門

○芒硝以大黃引之直入大

腸潤燥軟堅瀉熱以在下言之便尿俱陰以前後  
言之則前氣後血以腎言之總主大小便難夫尿  
澁便秘俱爲水少經曰熱淫于內治以鹹  
寒佐以苦故用芒硝大黃相須爲使也

棗

### 車狗散

治大小便久不通煩滿欲死推車客七箇土  
狗七箇如男子病推車用頭土狗用身女子

病土狗用頭推車用身右二物新瓦上焙乾爲末

以虎目樹皮向東南者濃煎湯調服卽通如神

○推車卽蟻娘也土狗卽蠅蛆也虎目

樹一云樗木一云虎杖恐樗木爲正

### 甘遂散

治大小便不通赤皮甘遂二兩煉蜜二合和  
匀每一兩分四服日進一服蜜水調下婢

### 鐵脚丸

治大小便不通大皂角燒存性爲末酒麪糊和九梧子大酒下三十九粒

### 顛倒散

治大小便不通或小便不通或大便不通皆  
治之大黃滑石皂角各三錢如小便不通滑

石加三稜如大便不通大黃加三錢如大小便俱不通大黃滑石各加三錢右爲末每取三錢空心溫酒調

下  
鑿

貼臍膏

治大小便不通甘遂爲末麪調作糊貼臍中及臍下硬處別煎甘草湯服之以通爲度

倒換散

治大小便不通如大便不通大黃一兩杏仁三錢如小便不通大黃三錢杏仁一兩右剉

分二貼水

煎服

顆

蟻娘散

一名二妙散治大小便不通六七月間尋牛馬糞中蟻娘不以多少用線串起陰乾收貯

用時取一箇要全者放淨磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截二便俱閉全用爲細

末新汲水調服即通

**廻生神膏**

治陰證大小便不通數日危急者用之非急勿用牡蠣陳粉乾薑炮各一兩右爲細

末男病用女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男子唾調手內擦熱緊掩二乳上得

汗出愈蓋卵與乳乃男女

之根蒂坎離之分屬也

瀛海

**丁香散**

治大小便不通如神苦丁香五錢川烏炮草烏炮白芷猪牙皂角炮細辛各三錢胡椒一

錢麝香少許右爲細末用竹

筒將藥吹入肛門內卽通

韻

**罨臍法**

治大小便不通以白礬末一匙安臍中冷水滴之令冷透腹內卽通

卽通○治大小便不通連根

葱一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽二匙同研作餅烘熱掩臍中以帛繫定良久氣透自

通不通再換一餅渾○治大便閉結至極昏不省人  
生大田螺一二枚鹽一匙和殼生搗置病人臍

下一寸三分用帛包繫卽大通讎。又方田螺連殼擣爛入麝少許貼臍中以手揉按立通臍。治大小便不通巴豆肉杏仁皂角右爲末作餅掩臍上火炙自通讎。蠅牛膏治大小便不通蠅牛三枚連殼擣爲泥加麝香少許貼臍中以手揉按之立通無蠅牛則用田螺歷試殊效。

### 導便法

諸大便不通老人虛人不可用藥者用蜜熬入

導法

取蜜七合微火煎如飴捻作錠如棗核樣納

導法

取蜜七合微火煎如飴捻作錠如棗核樣納

導法

取蜜七合微火煎如飴捻作錠如棗核樣納

導法

取蜜七合微火煎如飴捻作錠如棗核樣納

導法

取蜜七合微火煎如飴捻作錠如棗核樣納

黃色傾入冷水中急撿如指大隨用皂角末麝香  
共爲衣將油塗抹大腸內納入穀道大便卽通  
○猪膽汁導法猪膽一箇傾去汁少許入醋在內  
用竹管相接套入穀道中以手指撚之令膽汁直  
射入內少時卽通。香油導法用竹管蘸葱汁  
深入大腸內以香油一半溫水一半同入猪尿脬  
內燃入竹管將病人倒放脚向上半時立通。糊。  
大便不通多日百方不效令人口含香油以小竹  
筒一箇套入肛門吹油入肛內病者自覺其油如  
蚯蚓漸漸上行片時下黑糞而安寧。俗方以清  
醬香油相和灌肛內卽通或以生苦蘋浸油  
醬插入肛內亦通。蜜導非皂角則不通。

## 單方

凡七種

硫黃

治冷瀉暴瀉所下如水碗黃滑石等分爲末溫水調下三錢立止。

**焰硝** 治關格大小便不通蜜一鍾硝二錢白湯一鍾空心調服卽通

**好黃土**

治泄痢赤白腹痛下血好黃土水煮三五沸去滓緩服一二升

**鞞**

**百草霜** 治暴瀉病取細末二錢米飲調下鞞久瀉不止百草霜末粥丸白湯吞下

**蒼术** 治傷濕泄瀉或合茯苓或合芍藥每五錢水煎服之若傷風泄瀉合防風水煎服之

**白术**

治一切泄瀉煎服末服丸服並佳或合白芍藥白茯苓同煎服止泄尤佳

**瀉**

**車前草**

治熱泄取莖葉擣取汁一盞入蜜一合溫分二服

**車前子**

治一切泄瀉炒爲末空心取二錢米飲調下最妙或水煎服亦良

**木香**

治諸泄瀉病疾皆佳煎服末服並良或合黃連爲丸治赤白諸痢甚佳

**白芍藥**

治泄瀉痢疾煎服末服丸服皆佳  
酸收甘緩下痢必用之藥也  
湯

**黃連**

治赤白痢腹痛或下膿血黃連三錢酒煮服或  
爲末雞子白和丸服並佳黃連治痢蓋以苦燥

之義若熱痢血痢則

佳冷痢則不可用

**乾薑**

主冷泄冷痢煎服末服並佳若血痢  
則燒存性爲末每一錢米飲調下

**土瓜根**

治大便不通擣取汁以  
竹管吹入肛內卽通

**馬蘭子**

治水痢熬黃爲末同白  
麴等分米飲下二錢

**萱草根**

治大便不通取一握同生  
薑擣取汁服之立通

**黃芩**

主腸澼赤白痢腹痛身熱與芍  
藥同用煎服九服末服並佳

東醫寶鏡

卷四

艾葉

主赤白痢及膿血痢  
醋煎空心服之

地榆

治痢性沉寒入下焦赤白痢及膿血痢水  
煎空心服三合如水瀉及白痢不可用

肉豆蔻

主泄瀉如暴水泄不止取三箇麪裹煨爲末  
作一服米飲調下神效若冷痢腹痛不能食

取末一錢  
米飲下

縮砂

治冷泄及休息痢取末  
一錢空心米飲調下

大黃

通利大小便又治熱痢下膿血欲  
通大便水煎服熱痢酒煎服之

黑牽牛子

通利大小便如大便不通半生半炒爲末  
每二錢薑湯調下如未通再以熱茶清調

下○風秘結瀉微炒爲末一兩炒桃仁  
末五錢蜜丸梧子大溫水下三十丸

**萹蓄**

治大小便不通開紫花水邊生者爲佳  
採根擣取汁一盞服之得通卽止

**榆白皮**

主大小便不通  
水煎空心服

**檳榔**

通利大小便又治大便不通  
取細末二錢空心蜜水下

**五倍子**

治腸虛泄瀉取爲末以  
白湯調二錢服立止

**訶子皮**

主泄瀉及赤白諸痢訶子三箇兩枚炮一枚  
生用同爲末溫水和服○氣痢久痢煨取皮

爲末二錢和  
米飲頓服

**樗根白皮**

主赤白痢及久痢腸滑不禁取皮一握陳  
米一合葱白三莖甘草三寸豉二合水煎

空心頓服血痢尤神效  
爲末作丸名固腸丸

橡實

溼腸止泄瀉作細末和米飲常服

槿花

主赤白痢作末和米飲服或和麯作煎餅食之

蜜

治痢爲最蜜與薑汁各

一合溫水和頓服

鞞

蠟

主下痢膿血黃蠟不拘多少用銀篦梳於香油燈上燒熏洛下水椀內如此七次爲九蘿蔔子大每

三十九白痢甘草湯

下赤痢烏梅湯下鞞

牡蠣粉

止大小便治遺尿不覺牡蠣粉白礬枯等分爲末酒服二錢日三亦治遺尿鞞

鱉

大痢後脫肛○一人患痢月餘糟粕不實晝夜五治次又脫肛取鱉一箇治如食法用生薑米糊作

羹入砂糖一小塊不用鹽醬熟煮喫一二椀三日而愈蓋鱉乃介虫屬金而補肺與大腸故有效焉

卷四下

藥

鮒魚膾

主久赤白痢腸澼和醋醬蒜蘿食之。或血痢及噤口痢魚肚釀白礬燒灰爲末米飲調

下或入白礬蒸熟

和鹽醋喫卽效

露蜂房

療赤白痢亦治大小便不通取房蒂爲末溫酒調一錢服之卽效一名紫金砂

顆

糞蛆

治噤口痢甚效取蛆焙爲

末清米飲調下一錢

蓮子肉

止痢又治噤口痢去皮留心爲末米飲下二錢

方一

烏梅

瀉腸吐痢○血痢白梅肉一箇合蠟茶加醋湯沃服之一啜而差○赤痢及久痢烏梅水煎和

蜜服○休息痢合建茶

乾薑爲丸服之大驗

**桃花** 利大小便花落時拾取陰乾爲末水調服  
或作煎餅喫治大小便不通卽效好和

**桃葉** 主大小便不通擣取

**桃仁** 治大便血結血秘血燥秘瀧  
不通研取汁作粥服之瀧

**酸石榴殼** 止赤白痢燒赤爲末米飲下二錢亦治暴瀧不止○冷熱不調或下赤白青黃者石

**榴五枚合殼杵絞取汁每取一合數**  
服卽斷或取殼爲末飯丸服亦得

**大麻仁** 治大小便不通及風秘熱秘血秘研取汁作粥食之或與蘇子取汁作粥名蘇麻粥

**生脂麻油** 治熱秘大便不通每服一合取利爲度

**赤小豆** 止泄痢作粥食之○赤白痢  
作粥和蠟一兩頓服差

糯米

止泄瀉半生半炒  
煮粥食甚效

醫書

神麴

時暴泄神麴炒蒼术製等分爲末麴糊和丸梧

子大米飲下三十丸

丸名麴术丸

鷺粟殼

主一切痢若日久腹中無痛當瀉腸則去瓢  
蒂醋炒爲末米飲調一錢服一瓶○此物治痢

如神但用早則性緊澁多令人嘔逆或成噤口痢

○久痢虛滑一日百行取殼薑汁浸一宿炒乾

爲末每二錢米飲調

下卽效名百中散

冬葵子

治大小便不通腹滿欲死取二升水四升煮取一升入猪脂一合調服卽通

雞腸草

主小兒赤白瀉取汁一合和蜜服之良

薺菜

主赤白痢取根葉燒灰爲末和米飲服極效

葱白

治大小腸不通取白搣爛和醋封小腹上卽效○赤白痢葱白一握細切和米煮粥食之

韭菜

治諸痢如赤痢韭汁和酒溫服一盞如水穀痢作羹粥或燂炒任食之白痢則煮食之

薤白

治久痢冷瀉常煮食之○赤白痢取白和米作粥食之

獨頭蒜

治大便不通取一枚煨熟去皮綿裹納下部冷則易卽通

馬齒莧

利大小便和米糲五味作羹食之○赤白痢擣取汁三合和雞子白一枚和勻溫服再服

卽愈或取莧煮熟入鹽醬薑醋拌勻食之○小兒血痢取汁一合和蜜一匙服

白蘿蔔

治久痢鍾煎勻溫服立止

**亂髮**

主大小便不通燒爲灰取一錢調溫水一日三服○赤白痢服如上法或作丸服韎

**黃雌雞**

治赤白久痢取一隻治如食法作羹常食之○腸滑下痢取一隻治如食法火炙鹽醋刷

之又炙令燥空腹

食之名炙雞散韎

**雞子**

治久赤白痢醋煮熟空心食之或取一箇打破用蠟一錢熔化拌勻炒食之又取黃和胡粉燒

成末酒服

一錢韎

**烏骨**

治小兒噤口痢取一隻治如食法雞煮取清汁頻與服之病止胃開餉

**家鴨**

止痢治如食法煮爛飲汁食肉或作羹食之韎

**雉**

主久痢腸滑不下食治如食法着橘椒葱鹽醬調和作餽飪食之韎

牛肝 治痈醋煮

食之

韌

牛角鰓

主赤白痢及冷痢瀉血燒存性爲末溫酒

或米飲調下二錢或蜜和作丸服之

韌

黃雄狗頭骨

主久病勞痢休息痢取腦骨炙黃爲末米飲調二錢服或蜜和作丸服之

韌

狗肝

治下痢臍腹痛狗肝一具細切米一升和煮粥着葱椒鹽醬喫之

猪肝

主冷泄濕泄滑泄取肝薄切溫塗煨訶子皮末微火炙盡末五錢空心細嚼米飲送下

韌

泄濕泄猪肝漿水煮熟食之

薑○氣虛下痢瘦乏

韌

猪肝一具切片入醋

一升煮乾空心食甚妙

猪膽

治大便不通

詳見導

鍼灸法

大渴飲水多爲滑泄水入卽泄泄而復飲此無藥當灸大顧三五壯陽○泄瀉三五年不愈灸

百會五七壯卽愈

醫

○久泄痢炙天樞氣海大能

止泄瀉

○泄痢不止灸神闕七壯

七壯三關元三

十壯

劙○塘泄灸臍中爲第一三陰交次之蟻

泄痢

灸脾俞隨年肚臍中二十壯開元百壯三報

二七壯

劙○殫泄取陰陵泉然谷巨虛上廉太衝

灸

氣海百壯劙○下痢腹痛便膿血取丹田復溜

小腸

俞天樞腹衰鍼○冷痢關元窮谷各灸五十

壯

鍼○裏急後重取合谷外關鍼○痢不止取合

谷

三里陰陵泉中脘關元天樞神闕中極瞤○諸

下痢

皆可灸大都五壯商丘陰陵泉各三壯瞤○

大便

秘滯取照海噉瀉六竅端通支溝翻半附太

白瀉

之瞤○大便不通取三間承山太白太鍾三

里涌泉

崑崙照海章門氣海瞤○大小便不通取

大都

環崗水道瞤○開格吐逆而小便不通先灸

氣海天樞各三七壯吐止然後用益元散以利小

便癟○婦人產後腹脹大小便不通  
取氣海足三里關元三陰交陰谷瞞

東醫寶鑑卷四下終