


武昌醫館叢書

經史證類大全本草卷之六

草部上品之上


兗州黃精



滁州黃精



丹州黃精



丹州黃精


解州黃精



丹州黃精


本草六

商州黃精




本草綱目

永康軍黃精



商州黃精

解州黃精




解州黃精

解州黃精


本草綱目

卷之六

荆門軍黃精



洪州黃精



洪州黃精

相州黃精



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服
輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名

救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾

陶隱居云今之處

一枝多葉葉狀似竹而短根似菱菱葉根如荻根及芎藭
皆既節而平直黃精根如鬼曰黃連大節而不平雖燥並柔輒
有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉華實皆可餌服酒散
隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鈎吻相似惟莖不紫花不黃
為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇事
唐本注
云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指菱葉肥根頗
類其小者肌理形色都大相似今以鬼白黃連為比殊無髣髴
又黃精葉似柳葉及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生殊非比
類今初別本注云今人服用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐
為爛壞臣禹錫等謹按抱朴子云一名垂珠服其花勝其實其
實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而
服之日可三合非大有役力者不能辦也服黃精僅十年乃可
大得其益耳且以斷穀不及木木餌令人肥健可以負重涉險
但不及黃精甘美易食凶年可以與老小代糧人食之謂為米
脯也廣雅云黃精龍銜也永嘉記云黃精出崧陽永寧縣藥性
論云黃精君陳藏器云黃精陶云將鈎吻相似但一善一惡耳
按鈎吻即野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不
知陶公憑何所說其葉偏生不對若為偏精功用不如正精者

蕭炳云黃精寒

日並子

云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒

暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用

圖經曰

黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之
以高山茅山者為佳三月生苗高一二尺以來葉如

竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細
青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色

二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中入九蒸九暴作果賣
甚甜美而黃黑色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭

極尖而根細蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類此恐南北所產之
異耳初生苗時人多採為菜茹謂之筆菜味極美採時尤宜辨

之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名菱蕤一名仙
人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及二

月二月採根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗煮去
苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相

和令得所捏作餅子如錢許大初服二枚日益之百日知亦焙
乾篩末水服功與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛

乾之可得五六斗服之十年乃可得益又博物志云天姥謂黃
帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生世傳華佗漆葉青黏散

二云青黏是黃精之正葉者
書傳不載未審的否也

雷公云


凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇

是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以
溪水洗淨後蒸從已
食療 餌黃精能老不飢其法可取甕子
至子刀薄切曝乾用 去底釜上安置令得所盛黃精令

滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五寸服三百日後盡見鬼神餌必升天根葉花實皆可食之但相對者聖惠方神仙服黃精成地仙根莖不限多是對者各偏精任意多少一年稽神錄臨川有土人虐所使婢婢乃逃入山之周變老為少食之甚美自是常食此而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身款然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即道藏神仙芝草經黃精寬中益氣使五藏調良黃精也多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下尸蟲上尸好寶貨百日日下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根二等花為博物志昔黃帝問天老曰天地所生豈有飛英根為氣精草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎靈

芝瑞草經黃芝即黃精也

戎州菖蒲



衛州菖蒲




衛州菖蒲

本草六

七

衡州菖蒲



菖蒲味辛温

臣禹錫等謹按久風濕痺通用藥云菖蒲平

無毒主風寒濕痺

效逆上氣開心孔補五藏通九竅明目目出音聲主

耳龍癰瘡温腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小

兒溫瘧身積熱不解可作浴湯又服輕身聰耳明目
不忘不迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上

洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五

月十二月採根陰乾

秦皮秦芄為之使惡地膽麻黃陶隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡

今乃處處有生石積上概節既節為好在下濕地大根者名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蟲并蚤蝨而今都不言之真

菖蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦小釐華也東間溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此為石上菖蒲者謬矣此止主欬逆亦斷蚤蝨爾不入服御

用詩詠多云蘭蓀正謂此也臣禹錫等謹按吳氏云菖蒲一名堯韭

羅浮山記云山中菖蒲一寸二十節藥性論云菖蒲君味苦辛無毒治風濕痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥

瘰石澗所生堅小一寸九節者上此菖蒲亦名昌陽日華子云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹

痛霍亂轉筋治客風瘡疥澀小便殺腹藏蟲及蚤蝨耳痛作末炒承熱裏罾甚驗忌飴糖羊肉石菖蒲出宣州二月八月採取

圖經曰

菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有脊狀

如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九

節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中
心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥沙石土中臘月移之
尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治擇一斤許以
水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾擣篩以糯米粥和勻更
入熟蜜搜丸梧子大絺葛袋盛置當風處令乾每日酒飲任下
三十九臨臥更服三十九久久得效如本經所說又蜀人用治
心腹冷氣擣痛者取一二寸槌碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀
蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送亦效其生
蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻
人持來者此即醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤
中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石
菖蒲不堪入藥用但可擣末油調塗疥癬今藥肆所貨多以兩
種相雜尤難辨也

雷公云

凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑
氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊

硬節稠長一寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑
硬節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

金方

日月未足而欲產者搗菖蒲根汁一二升灌喉中
又方 以服聰明益智甲子

者陰乾百日為末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

又方

治產後崩中下血不止菖蒲

去滓分三服

又方

治好忘久服聰明益智七月七日取菖蒲
酒服三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗

之不可犯鐵若
犯之令人吐逆
肘後方
扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類為
治比目參取而用之已死搗菖蒲生根

絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中或有如嘯聲
腹間暖是也搗乾菖蒲棗核大著舌下人臥忽不寤勿以火照

照之殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際多唾其
面即活又菖蒲末吹兩鼻中又桂末內舌下
又方
耳聾菖蒲根一

寸巴豆一粒去心二物合搗分
作七丸綿裹塞耳日著一丸效
又方
卒胎動不安或腰痛胎

根計三
升服之
又方
產後下血不止菖蒲三兩酒
經驗方
治癰腫發背生

菖蒲搗貼若瘡乾搗末以
水調塗之孫用和方同
子母秘錄
治胎動勞熱不安去血

二升分
三服
產書
治產後下血不止菖蒲二兩
夏禹神仙經
菖蒲

薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水一斛清者醎也者懸此
菖蒲密封閉一百日出視之如綠菜色以一斗熟黍米內中封


十四日開出飲酒則一切三
十六種風有不治者悉效
漢武帝內傳
武帝上嵩山忽見

之曰吾九嶷山人也聞中嶽有石上菖蒲
一寸九節食之長生故來採之忽然不見
抱朴子
南中多鹿每一雄遊

牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也及夏則唯食菖蒲一味即肥當
角解之時其茸其痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者

先以繩繫其茸截取之以其血未散然後斃鹿又韓聚服菖蒲
十二年身上生毛日視書萬言皆誦之冬袒不寒又菖蒲須得

鄧州菊花




石上一寸九節紫花尤善別說云謹按今陽羨山中生水石間者其葉逆一寸不啻九節入藥極佳今二浙人家以瓦石器種之旦暮易水則茂水濁及有泥滓則萎近方多稱用石莖蒲必此類也其池澤所生肥大節疎麤慢恐不可入藥唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡爾

衡州菊花



本草六卷

菊花



本草

菊花味苦甘平無毒主風頭頭眩腫痛目欲脫淚出

皮膚死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胃中煩熱

安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年

一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖

一名更生一名周盈一名傳延年一名陰成生雍州

川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採

花十一月採實皆陰乾木枸杞根桑根白皮為之使陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而

味甘葉可作羹食者為真一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪

食者名苦薏非真其華正相似唯以甘苦別之爾南陽鄆縣最

多今近道處處有取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白

五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊為妙用但難多得宜

常服之爾臣禹錫等謹按爾雅云鞠治瘡注今之秋華菊藥性論云甘菊花使能治熱頭旋旋倒地腦骨疼痛身上諸風令消

散陳藏器云苦薏味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩

花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而薏苦語曰苦如意是也

又云白菊味苦染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不

老益顏色又靈寶方茯苓合為丸以成鍊松脂和每服如雞子

一丸令人好顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月採抱朴子劉生丹法用白菊花汁和之楊慎之云甘者入藥苦者不任

華子云菊花治四肢遊風利血脉心煩胃膈壅悶并癰毒頭痛

作枕明目葉亦明目生熟並可食菊有兩種花大氣香莖紫者

為甘菊花小氣烈莖青小者各野菊味苦然雖如此園蔬內

種肥沃後同一體花上水益色壯陽治一切風並無所忌

圖經曰菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭

者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種

類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘

此為真有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者其華亦大名苦意

非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白藥

黃其黃菊葉似蒿蒿花藥都黃然今服餌家多用白者南京又

有一種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正

月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用

唐天寶單方圖載白菊云味辛平無毒元生南陽山谷及田野

中頰川人呼為回蜂菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡

並名羊歡草河內各地薇蒿諸郡皆有其功主丈夫婦人久患

頭風眩悶頭髮乾落曾中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲

倒者是其候也先灸兩風池各二十七壯并服此白菊酒及丸末

差其法春末夏初收輒苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰

酒服之日再漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服之亦

得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯浸三大斗

酒中經七日服之日三常令酒氣相續為佳

今諸州亦有作菊花酒者其法得於此乎

食療云

甘菊平其葉正月採可作羹莖五月五日採花九

生苦菊不堪用

聖惠方

治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家糯

多用細麩麴為候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

外臺秘要

治酒醉不醒九月九日真菊花末飲服方寸匕

肘後方

犯丁腫垂死菊葉一握搗絞汁一

食醫心鏡

甘菊主頭

風目眩胃中胸胸目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥并生食並得

玉函方

王子喬變白增年方甘菊三月上寅


日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰

乾百日取等分以成日合搗千杵為末酒調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服七丸一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白


變黑服之二年齒落再生服之三

年八十歲老人變為童兒神効


兗州人參




滁州人參



潞州人參



威勝軍人參



人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄

止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓

痛胃脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積

令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名

神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神

生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀

刮暴乾無令見風茯苓為之使惡叟疏反藜蘆陶隱居云

形長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形

細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛

輒不及百濟百濟人云屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取

之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易姓

音姓 唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上
四五葉相對生花紫色高麗人作人參讚曰三極五葉背陽向
陰欲來求我報音賈樹相尋報樹葉似桐甚大陰廣則多生陰
地採作甚有法今近山亦有但作之不好唐本注云陶說人參
苗乃是薺芫桔梗不悟高麗讚也今潞州平州澤州易州檀州
箕州幽州媯州並出蓋以其山連亘相接故皆有之也今注人

參見用多高麗百濟者路州太行山所出謂之紫團參亦用焉
陶云俗用不入服非也

臣禹錫等謹按藥性論云人參惡鹵鹹
生上黨郡人形者上次出海東新羅國又出渤海主五藏氣不
足五勞七傷虛損痿弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏

六腑保中守神又云馬蘭為之使消胃中痰主肺痿吐膿及癰
疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之蕭炳

云人參和細辛密封經年不壞日華子云殺
金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

圖經曰人參生上黨山谷及遼東今向東諸州及泰山皆有
之又有河北樵場及閩中來者名新羅人參然俱不

及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗多於深山中背
陰近根漆下濕潤處初生小者三四寸許一椹五葉四五年後

生兩椹五葉未有花莖至十年後生三椹年深者生四椹各五
葉中心生一莖俗名百尺杆三月四月有花細小如粟藥如絲

紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形
者神二月四月八月上旬採根竹刀刮去土暴乾無令見風泰

山出者葉幹青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與
桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七節根亦如桔梗而柔

味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或用
之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不

與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其
人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即

吐困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取
四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與噉李直方司勳徐郎中

於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十
餘日發入京絳每與名醫特論此藥難可為儔也又雜他藥而
其効最著者張仲景治胃痺心中痞堅留氣結胃脘滿脅下逆
氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草各二兩四味以水八升
煮取三升每服一升日三如臍上築者為腎氣動去朮加桂四
兩吐多者去朮加生薑二兩下多者復其朮悸者加茯苓二兩
渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至
四兩半滿者去朮加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許
微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者無
不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中
湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴
諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齋自隨唐石泉公王方
慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預
排比也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附
子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升半分四服若
下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云

出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以杉木夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹脹消食補養

藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩躁變酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人謹之

雷公云

凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心疰之患也

外臺秘要

治蜂蝎螫人方

千金方

開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一

百日後體髓益日誦
千言肌膚潤澤去熱風痰
肘後方 治卒上氣喘急鳴息便欲

六**經驗後方** 治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半
夏一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麩糊丸如棗

豆大每服十九食
後生薑湯吞下
又方 治狗咬破傷風以人參不計多少桑
柴火上燒令煙絕用蓋子合研為末

搽在瘡
上立效
勝金方 治吐血以人參一味為末雞子
清投新汲水調下一錢服之
靈苑方 治

嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者搗為末每服三錢匕雞子清
調之五更初服便睡去枕仰臥只一服愈年深者再服忌腥鹹

鯨醬麩等并勿
過醉飽將息佳

建州天門冬




本草方

漢州天門冬




漢州天門冬


温州天門冬



西京天門冬



兖州天門冬



梓州天門冬



天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨

髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力

利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛

勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黃

為之使畏曾青陶隱居云奉高太山下縣名也今處處有以高

地大根味甘者為好張華博物志云天門冬逆將有逆刺若葉

滑者名締休一名顛棘可以浣練素白如絨音越紆類金城人

名為浣草擘其根温湯中按之以浣衣勝灰此非門冬相似爾

按如此說今人所採皆是有刺者本名顛勒亦粗相似以浣垢

衣則淨桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連

數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬亦何必不即是

浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剥去皮食之甚

冬禁食鯉魚唐本注

云此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者

俱是門冬俗云顛棘浣草者形貌詔音暕

之雖作數名終是一

物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也今按

陳藏器本草云天

門冬陶云百部根亦相類苗異爾按

天門冬根有十餘莖百部

多者五六十莖根長尖內虛味苦天門冬

根圓短實潤味甘不

同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人

或以門冬當百部者說

不明也臣禹錫等謹按爾雅云牆藜藟冬注云門冬一名滿冬

抱朴子云或名地門冬或名筵門冬或名巔棘或名淫

羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地

者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜

令人下氣為益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於木及黃精

也入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散

并搗絞其汁作液以服散尤益藥性論云天門冬君主肺氣效

逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去

熱中風宜久服煮食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔

之疾令人白淨蜀人使浣衣如玉和地黃為使服之耐老頭不

白能令補患人體虛而熱加而用之揚損之云服天門冬誤食

鯉魚中毒浮萍解之日華子云貝母為使鎮心潤五藏益皮膚

圖經曰

天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵

股高至丈餘葉如茴香極尖細而踈滑有逆刺亦有

澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有

黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或

黃紫色大如手指長二三寸大者為勝頗與百部根相類然圓

實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四破之去心

先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥谷中出

者葉大蔞麤殊不相類嶺南者無花餘無他異謹按天門冬別

名爾雅謂之藜巨彼切一名藟與門同冬山海經云條谷之山


其草多芍藥藟冬是也抱朴子及神仙食服方云天門冬一名

汾州甘草



日後怡泰拘急者緩羸劣者強
 三百日身輕三年走及奔馬
 門冬茯苓等分爲末服方寸
 匕日再服大寒時單衣汗出
 赤頂子食天門冬齒
 抱朴子
 二云杜紫微服天門冬御
 八十妾有男一百四十
 人日行
 三百里
 在人間三
 百餘年
 神仙傳
 甘始者太原
 人服天門冬
 道書
 八帝聖化經
 欲不畏
 寒取天


府州甘草



本草方

十一

汾州甘草



本草綱目

十一

甘草

老國

味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨

長肌肉倍力金瘡腫

時勇切

解毒温中下氣煩滿短氣

傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之

精安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年

一名蜜甘一名美草一名蜜草一名露草生河西川

谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成

木乾漆苦參為之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物陶隱

居云河西上郡不復通市今出漢蜀中悉從汶山諸夷中來赤

皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾

者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不

如又有紫甘草細而實之時可用此草最為眾藥之主經方少

不用者猶如香中有沉香也國老即帝師之稱雖非君為君所

宗是以能安和草石而解諸毒也臣禹錫等謹按爾雅云藟大

苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當疏

引詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藥性論云甘草君忌猪

肉諸藥眾中為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒

調和使諸藥有功故號國老之名也主腹中冷痛治驚癇除腹

脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦人血滯

腰痛虛而多熱加而用之
切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨解冷

熱入藥
灸用

圖經曰

甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西及河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫

花似柰冬結實作角子如華豆根長者三四尺麤細不定皮赤
上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去
蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳
其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藟大
苦釋曰藟一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤
有節節有枝相當或云藟似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之
巔是也藟與苓通用首陽山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處
相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景
傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸
方用之最多又能解百毒為眾藥之要孫思邈論云有人中烏
頭芭豆毒甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒嘗試之不効乃
加甘草為甘豆湯其驗更速又備急方云席辯刺史嘗言嶺南
俚人解毒藥並是嘗用物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言
三百兩銀藥辯久住彼與之親狎乃得其實凡欲食先取甘草
一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都淋藤黃藤二物酒
煎令温常服毒隨大小便出都淋藤者出嶺南高三尺餘甚細
長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若
經含甘草而食物不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法

李北海云此方神授極奇秘以甘草三兩大兩生搗別篩末大麥麩九兩於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水浸如餅劑方圓大於瘡一分熱傳腫上以油片及故紙隔令偏風冷則換之已成膿水自出未成腫便內消當患腫者藥時常須喫黃耆粥甚妙又一法甘草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子置露中經宿平明以物攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸

午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上外臺秘要救急瘦疾

炙酥盡為度又先炮令內外赤黃用良甘草三兩

炙每曰以小便煮百一方小兒初生亦可與朱蜜取甘草一三四佛頓服之良指節長炙碎以水二合煮取一合

以綿纏點兒口中可得一蜆殼止兒當快吐胃中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩服並不吐盡一合止得吐惡汁兒智惠無

病又方中蠱生煮甘草服之吐即出若平生預服防蠱者宜熟炙甘草煮服之若中蠱毒即內消不令吐也神驗

又方食牛羊肉中毒者煮甘草經驗方崔宣州衍傳赤白痢以淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用生薑去梅師方治

皮半兩二味以漿水一升半煎取八合服之立效得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服孫真人食忌傷寒甘

草如中指長炙細剉取童子小便一
升和煎取七合空心服日再服之
廣利方 治肺痿久咳嗽
涕唾多骨節煩

悶寒熱甘草十二分炙搗為末每日取
小便三合甘草末一錢匕攪令散服
御藥院 治二三日咽
痛可與甘草

湯去滓
日三服
今古錄驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五
升煮取三升漬洗之日三五度差
金

匱玉函 菜中有水莖若葉圓而光有毒誤食之令人
狂亂狀若中風或吐甘草煮汁服之即解
又方

治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥
可解只煎甘草薺菀湯服之入口便活
又方 治小兒撮口
及發噤方用

生甘草一分細剉以水一盞煎至六分去滓温
與兒服令吐痰涎後捻乳汁點兒口中即差
又方 治小兒
中蠱欲


死甘草半兩剉以水一盞煎
五分去滓作二服當吐蠱出
又方 治小兒羸瘦
瘳瘳方甘草

菘豆大每温水
下五丸日二
傷寒類要 治傷寒三二日咽痛者與甘草二
兩炙水三升煮取一升半服五合

日
又方 傷寒脉結代者心悸動方甘草二
兩水三升煮取升半服七合日三
姚和衆 治小兒
尿血甘

草五分以水六合煎取二合
去滓一歲兒一日服令盡
淮南子 甘草主
生肌肉


冀州地黃



本草

地黃

沂州地黃



乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺墮
骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七
傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃
中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血脈益氣力
利耳目生者尤良

生地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心
悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踈折瘀血留血衄
鼻吐血皆擣飲之 又服輕身不老 一名地髓 一名芩

一名芑生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰

乾得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑陶隱居云咸陽即長安也

生渭城者乃有實子實如小麥淮南七精散用之中間以彭
城乾地黃最好次歷陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法搗
汁和蒸殊用一意而此直云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作
為失乎大貴時乃取牛膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要
用其葉又善生根亦主耳暴聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈

日暴既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也
按陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二
物別蒸乾即溫補生乾則平宜當依此以用之
爾雅云芑地黃注云一名地髓江東呼芑曾帖
藥性論云乾地

黃君能補虛損溫中下氣通血脈久服變白延年治產後腹痛
主吐血不止又云生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通
利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加
而用之蕭炳云乾生二種皆黑鬚髮良藥日華子云乾地黃助

心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血暈衄婦人崩中血
運助筋骨長志日乾者平火乾者溫功用同前又云生者水浸
驗浮者名天黃半浮半沉者名人黃沉者名
地黃沉者力佳半沉者次浮者劣前忌鐵器

圖經曰

地黃生成陽川澤黃土地者佳今處處有之以同州
者為上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而

不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有
黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通黃
色麤細長短不常二月八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟
地黃陰乾者是生地黃種之甚易根入土即生一說古稱種地
黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席
圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實
土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠也乃以地黃根
節多者寸斷之蒔壇上層層令滿逐日以水灌之令茂盛至春
秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斲傷故也得根
暴乾之熟乾最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生地

黃草煙熏使乾黑洗之煤盡仍白也令乾之法取肥地黃三二
十斤淨洗更以揀去細根及根節瘦短者亦得二三十斤搗絞
取汁投銀銅器中下肥地黃浸漉令液飯上蒸三四過時時浸
漉轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須瓷
器內收之以其脂柔喜暴潤也又醫家欲辨精粗初採得以水
浸有浮者名天黃不堪用半沉者名人黃為次其沉者名地黃
最佳也神仙方服食地黃採取根淨洗搗絞取汁前令小稠內
白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十九丸如梧子日三亦入青州棗
肉同丸又前膏入乾根末丸服又四月採其實陰乾篩末水服
錢匕其効皆等其花各地髓花延年方有單服二法又治傷折
金瘡為最要之藥肘後方療跪折四肢骨破碎及筋傷蹉跌爛
擣生地黃熬之裹所傷處以竹簡編夾之遍急縛勿令轉動一
日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久
以生地黃一味隨人所食多少擣絞取汁搜麩作餅餅或冷淘
食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患
此病三年不差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本
果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餅餅亦與之隨
即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事
舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可
方一寸已來如蝦蟇狀無目足等微似有口蓋為此物所食自
此遂愈食冷淘不用著鹽

雷公云

採生地黃去白皮瓷鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇
拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并

白髭髮男損
榮女損衛也
食療
地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒飲並炒生則寒主齒痛唾血折傷葉

可以搗絞汁盡分再服若利即減之以身體涼為度
外臺祕要
張文仲治骨蒸方生地黃一升搗取汁三度

千金方
治牙齒根欲動脫生地黃細剉綿裹著齒上唾之漬齒根日三四并煎汁十日大佳
肘後

方
治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以差為度一云以紙裹微灰火中煨之用良
百一方
妊娠漏胎生地

黃汁
一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服
又方
治狗犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口百度止
梅師

方
治墮損筋骨蹉跌骨碎破搗生地黃熨熱裹二三日夜數易若血聚以針決之
又方
治吐血神效方生地黃汁

一升二合白膠香二兩以瓷器盛入甑蒸令膠消服
又方
治乳癰搗生地黃汁傳之熱即易之無不見效也

食醫心鏡
主勞病骨蒸日晚寒熱咳嗽唾血生地黃汁二合煮白粥臨熟入地黃汁攪令勻空心食之


博濟方
治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黃杵如泥隨腫大小攤於布上搽木香末於中又再攤地黃一重

貼於腫上不
過三五度差
孫兆方
治鼻衄及膈上盛熱乾地黃龍腦薄荷等分為末冷水調下
子母


秘錄
小兒患蠱毒痢生地黃汁
產寶
妊娠下血如月信通恐胎漏方乾地黃乾

薑等分為末用酒調方寸匕
抱朴子
楚文子服地黃八年夜視有光手上車弩
淮南子
屬骨


商州木



荆門軍木



石州木



石州木

越州木



越州木

本草

十

舒州木



本草綱目


卷三

齊州木



齊州木

歙州术



术味苦甘温无毒主风寒湿痺死肌痙

巨井切

疸止汗

除熱消食主大風在身向風眩頭痛目淚出消痰水

逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利

腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餅又服輕身

延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山

谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾防風地榆為之

使陶隱居云鄭山即南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者為

勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除

惡氣弭災疹丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水木

乃有兩種白木葉大有毛而作極根甜而少膏可作丸散用赤

木葉細無極根小苦而多膏可作煎用昔劉涓子按取其精而

丸之名守中金丸可以長生東境木大而無氣烈不任用今市

人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之臣禹錫等謹

按吳氏本草云木一名山芥一名天蘇爾雅云木山薊注今木

似薊而生山中疏云生平地者即名薊生山中者各木抱朴子

云木一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精藥性論云

白木君忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒能主大風癘痺多

年氣痢心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止下泄主面

光悅駐顏去黥治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不住及胃

氣虛冷痢日華子云木治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰

膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痠痺氣塊婦

人冷癥瘕温疾山嵐瘴氣除煩細切後米泔浸一宿入藥如常

用又名吃力
伽蒼者去皮

圖經曰

木生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者為佳春生苗青色無極一名山薊以其葉似薊也

莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黃白色中有膏潤紫色二月二月八月九月採暴乾乾濕並通用今八月採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石菖蒲並搗末旦日水調服晚再進久久彌佳又斷取生木去土水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今茅山所製木煎是此法也陶隱居云昔者劉涓子採取其精而丸之各守中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹按木有二種爾雅云木山薊楊枹音子薊釋曰此辨薊生山中及平地者名也生平地者名薊生山中者名木陶注本草云白木葉大而毛甜而少膏赤木細苦而多膏是也其生平地而肥大於眾者名楊枹音呼之馬薊然則楊枹即白木也今白木生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作極生二月三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者為勝又名乞力伽凡古方云木者乃白木也非謂今之木矣

唐本云

利小便及用苦酒漬

聖惠方

治雀目不計時月用蒼木三兩搗羅

為散每服一錢不計時候以好羊子肝一箇用竹子批破摻藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟為度患人先薰眼藥

氣絕即喫之簡要濟
衆方亦治小兒雀目
外臺秘要
療忽頭眩暈經久不差四體
漸羸食無味好食黃土木三

斤麴三斤擣篩酒和併丸如梧桐子大
曝乾飲服二十九忌桃李雀蛤日三服
千金方
治中風口噤
不識人木四

兩酒三升煮
又方
療煩悶白木末
經驗方
烏髭鬚駐顏色
壯筋骨明耳目

除風氣潤肌膚久服令人輕健蒼木不計多少用米泔水浸三
兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火

炒令黃色細搗末每一斤末用蒸過茯苓半斤鍊蜜為丸如梧
桐子大空心臥時溫熱水下十五丸別用木末六兩甘草末一

兩拌和勻作湯點之下木
又方
治內外障眼蒼木四兩米泔
浸七日逐日換水後刮去黑

皮細切入青鹽一兩同炒黃色為度去鹽不用木賊二兩以童
子小便浸一宿水淘焙乾同搗為末每日不計時候但飲食蔬

菜內調下一
梅師方
治心下有水白木二兩澤瀉五兩
錢匕服甚驗
集


驗方
治毒氣攻瘰足脛久瘡不差白木為細末鹽漿水洗瘡
乾貼二日一換可以負重涉險凶年與老小代糧人不

能別之謂
產寶
產後中風寒遍身冷直口噤不識人方
荀

子注
列仙傳劉涓子齊人隱
抱朴子內篇曰
南陽文氏
於室山餌木能致風雨
值亂逃壺

山中飢困欲死有一人教之食木遂不飢數十年乃還鄉里顏
色更少氣力轉勝故木一名山精神農藥經曰必欲長生常服

單州菟絲子



山精異術
木草者山之精也結陰陽之精
 氣服之令人長生絕穀致神仙
 梁庾肩吾
居資木
 啓曰味重金漿芳踰玉液
 足使坐致延生伏深銘感

菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥

健汁去面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺

有餘瀝口苦燥渴寒血為積久服明目輕身延年一

名菟蘆一名菟縷一名蘆蒙一名玉女一名赤網一

名菟纍音羸生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而

細為赤網色淺而大為菟纍九月採實暴乾得酒良

脂為之使惡萑菌陶隱居云且丸不宜煮田野墟落中甚多皆

浮生藍紵麻蒿上舊言下有茯苓上生菟絲今不必爾其莖按以

浴小兒療熱癩晉沸用其實先須酒漬之一宿仙經俗方並以

為補藥臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不

屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏兔之根無此兔則

絲不得生於上然實不屬也又內篇云菟絲初生之根其形似

兔掘取割其血以和丹服之立變化藥性論云菟絲子君能治

男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色又

主消渴熱中日華子云補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺

苗莖似黃麻線無根採多附田中草被纏死或生一叢如席闊

開花結子不分明如碎黍米粒八月九月已前採

圖經曰

菟絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之以菟句者為勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣

而生六七月結實極細細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纒其功用

並同謹按爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙為一名又詩云葛與女蘿

毛傳云女蘿菟絲也陸機云今合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如菟

絲寄生草上豈一物同名本經脫漏乎又書傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纒若絲遍地不能自起得他草梗

則纏繞隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初生

之根其形似兔掘取剖其血以和丹服之今人未見其如此者豈自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡

節末酒服久而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效

雷公云

勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澀并粘不入藥用其菟絲子稟中和疑正陽氣受

結偏補人衛氣助人筋脉一並從樹感枝成又從中春上陽結實其氣大小受七鎰二兩全採得去麤薄殼了用苦酒浸二日

漉出用黃精自然汁浸一宿至明微微火煎至乾入臼中熱燒鐵杵一勁二千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與菟絲子相

對用 肘後方 治卒腫滿身面皆供大菟絲子一升 又方 治

發痛如蟲嚙菟絲子熬令黃黑末
和雞子黃塗之亦治穀道中赤痛

又方

治面上粉刺搗菟絲子絞取汁塗之差

經驗後方

治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴

乾為末將元浸酒再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十九

又方

固陽丹菟絲子二兩酒浸十日

水淘焙乾為末更入杜仲一兩蜜炙搗用薯蕷末酒煮為糊丸如梧桐子大空心用酒下五十九

子母秘錄

治小兒頭瘡及女人面瘡免絲湯洗

產書

治橫生菟絲子為末酒調下一錢匕米飲調亦得

修真方


神仙方菟絲子一斗酒一斗浸良久漉出暴乾又浸以酒盡為度每服一錢温酒下日二服後喫三五匙水飯壓之至三七日

加至三錢匕服之令人光澤三年老變為少此藥治腰膝去風久服延年


滁州牛膝




懷州牛膝



單州牛膝



歸州牛膝



本草六

牛膝

牛膝

為君

味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛

不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子

陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊

痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白又服輕

身耐老一名百倍生河内川谷及臨朐二月八月十

月採根陰乾

惡螢火陸英龜甲畏白前陶隱居云云出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為

名也乃云有雌雄雄者莖紫色而節大為勝爾唐本注云諸藥

八月已前採者皆曰乾火乾乃佳不爾艱爛黑黯其十月已後

至正月乃可陰乾臣禹錫等謹按藥性論云牛膝臣忌牛肉能

治陰痿補腎填精逐惡血流結助十一經脉病人虛羸加而用

之圖經曰牛膝生河内川谷及臨朐今江淮閩粵關中亦有之

然不及懷州者為真春生苗莖高二三寸青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青細者為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘡久不斷者取葉莖一把切以酒三升漬服

今微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘡
用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨洗切焙
乾搗下筵酒煎溫服
云治婦人血塊極效

雷公云

凡使去頭并塵土了用黃精自然

聖惠方治眼

珠管牛膝并葉搗絞
取汁日三四度點之

又方

治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤
切以米三合於豉汁中相和煮作

粥和鹽醬
空腹食之

外臺秘要

治勞瘧積久不斷者長大牛膝一握切
以水六升煮取二升分二服未發前服

臨發又

千金方

治婦人小戶嫁痛牛膝五兩酒三
升煮取一升半去滓分作三服

又方

治風

瘙癢癰牛膝末酒服方寸匕
日三并主骨疽癩病及痞瘤

肘後方

口中及舌上生瘡爛取
牛膝酒漬含漱之無酒

者空含
亦佳

又方

治卒暴癰腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤
以酒一斗漬密封熱灰中溫令味出服五合至

一升量
力服之

又方

治齒痛燒牛膝
末著齒間含之

又方

凡痢下應先白後赤若
先赤後白為腸蠱牛膝

三兩搗碎以酒一升漬經一
宿每服飲一兩盃日三服

又方

治小便不利莖中痛欲死
兼治婦人血結腹堅痛牛

膝一大把并葉不以
多少酒煮飲之立愈

經驗後方


治消渴不止下元虛損牛膝
五兩細剉為末生地黃汁五

升浸晝暮夜浸汁盡為度蜜九梧桐子大空心溫
酒下二十九丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生

梅師方

治竹

菴蔚子



木針在肉中不出取生
 牛膝莖搗末塗之即出
 又方 治胞衣不出牛膝八兩葵子一
 兩以水九升煎取三升分三服
 又方 治金瘡痛用生牛
 膝搗傅瘡上立差
 孫真人食忌 治牙齒疼痛燒牛
 膝根灰致牙齒間
 又方 治卒得惡瘡人不識
 者以牛膝根搗傅之

荒蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣

療血逆大熱頭痛心煩又服輕身

莖主癰音隱癰音診癰可作浴湯一名益母一名益明一

名大札一名貞蔚生海濱池澤五月採陶隱居云今處

莖子形細長三稜方用亦稀唐本注云擣荒蔚莖傳丁腫服汁

使丁腫毒內消又下子死腹中主產後血脹悶諸雜毒腫丹油

等腫取汁如豆滴耳中主聾耳中虺蛇毒傳之良今按陳藏器

本草云此草田野間人呼為鬱臭草本功外苗子入面藥令人

光澤亦擣苗傳乳癰惡腫痛者又擣苗絞汁服主浮腫下水兼

惡毒腫又按別本注云其子狀如疥瘡子而稍龐大微有陳氣

作煎及擣絞取汁服之下死胎也臣禹錫等謹按爾雅釋草注

云萑萑今荒蔚也葉似荏苳方莖白華華生節間又名益母疏引

劉歆曰萑臭穢臭穢即荒蔚也日華子云治產後血脹苗葉

同功乃益母草子也作節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰

荒蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中國

似荏苳方莖白華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云推益母也

故曾子見之感恩劉歆亦謂推臭穢臭穢即荒蔚也今園圃及

田野見者極多形色皆如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠

子黑色莖作四方稜五月採又云九月採實醫方云稀見用實

者唐天后鍊益母草俚呼面法五月五日採根苗具者勿令著土
暴乾搗羅以水和之令極熟團之如雞子大再暴仍作一罈四
傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火
養之勿令絕經一伏時出之甕器中研治下篩再研三日收之
使如燥豆法廣濟方療小兒疳痢困垂死者取益母草煮食之
取足差止甚佳韋丹治女子因熱病胎死腹中擣此草并苗令
熟以少許暖水和絞取汁頓服良又主難產搗取汁七大合煎
半頓服立下無新者以乾者一大握水七合煎服又名鬱臭草
又名苦低草亦主馬齒細切此草和醋炒傳之良

聖惠方

治婦人勒乳痛成癰益母為末水調塗乳上一宿自差生搗爛用之亦得

又方

治產後血

不下益母搗絞汁每服一合溫攪勻服

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每小盞入酒一合溫攪勻服

疾神方三月採益母草一名負檐一名夏枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用刀即置鍋中以

水二碩以來令草上水深二三十寸煎煮候益母爛水三分減二

灑出草取五六斛汁寫入盆中澄之半日已來以綿濾取清汁

盆中滓殿盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一斛以來如稀

能稀煎去即更鍊可丸得每服之七日內則疼痛漸廖七日平
復或有產婦惡露不盡及血暈一二服差其藥治風益心力無
忌
肘後方 婦人一切血病及產婦一切傷損益母草不限多
少竹刀切洗淨銀器內鍊成膏甕器內封之並以

酒服之
孫真人
治馬咬方益母草
細切和醋炒封之
食醫心鏡
治小兒疳痢疾
以益母草葉

黃粥食之取
汁飲之亦妙
簡要濟眾
新生小兒
浴法益母劉水
一斗門

方
治癰子已破用
益母搗傳瘡妙
丹房鏡源
燒益母灰用麩湯
溲燒之
集

驗方
治婦人帶下赤白
色益母草花開時
子母秘錄
治產後血

暈心氣絕益母草
研絞汁服一錢妙
又方
治小兒疳益母
草絞汁稍稍服

滁州菱薹



舒州萎蕤



女萎萎蕤味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋

結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目

痛皆爛淚出久服去面黑野好顏色潤澤輕身不老

一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷

及丘陵立春後採陰乾畏鹵鹹陶隱居云按本經有女萎

用同惟名異爾如此女萎即應是萎蕤也今處處有其根似黃

精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷

莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此

都無止洩之說疑必非也萎蕤又主能理諸石人服石不調和

者煮汁飲之唐本注云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中

品今本經朱書是女萎能效墨字乃萎蕤之功今以朱書為白

字臣馬錫等謹按爾雅云熒委萎釋曰藥草也一名熒一名委
萎葉似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如指長
一一只可啖藥性論云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞
客熱頭痛不安加而用之良陳藏器云女萎萎蕤二物同傳陶
二云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此都無止洩之說
疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂洩痢腸鳴
正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二物蘇
乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹為其

似竹一名地節為其有節魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和潔葉為散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也蕭炳云萎蕤補中益氣出均州日華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌

圖經曰

萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖莖強直似竹節實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名又

有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可噉三月開青花結實云自是一物苗蔓與功用全別爾雅謂煖委萎上於為切下人垂切郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能效黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞下蜜下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今錄驗治身體癱瘓斑剥女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去肝好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字萎蕤緣其主虛熱濕毒腰痛故也二者主治既別則非一

物明矣然陳藏器以為更非二物是不然矣此女萎性平味甘
中品女萎味辛性溫性味既殊安得為一物又云萎蕤一名地
節極似偏精疑即青黏華佗所服漆葉青黏散
是此也然世無復能辨者非敢以為信然耳

雷公云

凡使勿用鈎吻并黃精其二物相似萎蕤只是不
可有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃

點採得先用竹刀刮上節皮了洗
淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

外臺秘要

主發熱口乾小便澀
萎蕤五兩煮汁飲之

楊氏產乳

療久痢脫肛不止取
女萎切一升燒薰之

襄州防葵



本草綱目

四二

防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不

下效逆溫瘧癩瘡驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿

臙脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火

者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名

爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川公及

嵩高太山少室三月三日採根暴乾陶隱居云北信斷

本與狼毒同根猶如二建今其形亦相似但置水中不沉爾而

狼毒陳久亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣

驚狂之要其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時

者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀有襄

陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為隣蜀

土也臣禹錫等謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣瘕癖

氣魂膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼瘧主百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰

防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望

隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一葍其端開花如葱花景天輩而色白根似防

風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置
水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月二日採六月
開花即結實
採根為藥

陳藏器云

按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但
置水中不沉爾然此二物善惡不同形質又別陶

既為此說後人因而用之防葵將以破堅積為下品
之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云

凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効又不
同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採


得二十日便蚰用之唯輕為妙欲使先須揀去蚰末後用甘草
湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令

黃精汁盡

肘後方

治癲狂疾防葵末温酒服一刀圭
至二三服身潤又小不仁為候

丹州紫胡



丹州紫胡

本草綱目

五十四

襄州柴胡




本草綱目


本草綱目

四四

淄州柴胡



江寧府柴胡




柴胡

本草

卷

壽州柴胡



芘柴胡君為味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣

飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸

痰熱結實胃中邪逆五藏間游氣大腸停積水脹及

濕痺拘攣亦可作浴湯又服輕身明目益精一名地

薰一名山菜一名茹草葉名芸蒿辛香可食生弘農

川谷及冤句二月八月採根暴乾得揆苓枯梗大黃石膏麻子仁甘草桂以

水一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒熱頭痛心下煩

滿半夏為之使惡皂莢畏女苑藜蘆陶隱居云今出近道狀如

前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白莖晉騷長四五

寸香美可食長安及河內並有之此芘胡療傷寒第一用唐本

注云芘是古柴字上林賦云芘薑及爾雅云藐音邁芘草並作

芘字且此草根紫色今太常用芘胡是也又以木代系相承呼

為芘胡且檢諸本草無名此者傷寒大小柴胡湯最為痰氣之

要若以芸蒿根為之更作茨音大謬矣臣禹錫等謹按藥性論

云芘胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸

瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服之蕭炳云主痰滿

止嗽潤心肺添精補髓天行瘟疫熱狂之絕肖脅氣滿健忘

圖經曰

柴胡生弘農山谷及寃句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉

稍緊亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色以前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨葉長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此為最要

藥之

陳藏器

陶云芸蒿是茈胡主傷寒蘇云紫薑作紫此草紫色上林賦云茈薑今常用茈胡是也

雷公曰

凡使莖長輭皮赤黃鬚鬚出平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是茈胡香

直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銅刀削上赤薄皮少許却以籠布拭了細剉用之勿令犯火立便無

效孫尚藥

治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一碗白茅根一握同煎至七分絞去滓任


意時時服一日盡

別說云


謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真故市人多以

同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

隨州麥門冬



睦州麥門冬



本草方

大

麥門冬為君味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽

胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱

口乾燥渴止嘔吐愈痿蹇強陰益精消穀調中保神

定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子又服輕身不

老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊著一

名禹葭一名禹餘糧葉如韭冬夏長生生函谷川谷

及堤坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰

乾地黃車前為之使惡欬冬苦瓠畏苦參青蘘陶隱居云函谷

即秦關而麥門冬異於羊韭之名矣處有以四月採冬月

作實如青珠根似穠麥故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤

抽去心不爾令人煩斷穀家為要二門冬潤時並重既燥即輕

一斤減四五兩爾合按陳藏器本草云麥門冬本經不言生者

按生者本功外去心煮飲止煩熱消渴身重目黃寒熱體勞止

嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經方家自有分

別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大

小有三四種功用相似其子圓碧又服輕身明目和車前子乾

地黃為丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光臣禹錫等謹


按吳氏云一名馬非一名麴冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名隨脂神農歧伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒季氏甘小温扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃**藥性論**云麥門冬使惡苦笑畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客熱**日華子**云治五勞七傷安鬼定鬼止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

圖經曰

麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色


有鬚根作連珠形似穰麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取新根去心搗熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成酒化温服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛又主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草一兩炙三物下篩蜜丸如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於白中搗爛即內黃連末白中和搗候丸得即併手丸大如梧桐子食後飲下五十九日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十九丸第二日服一百二十九丸第三日一百九第

文州獨活




四日八十九丸第五日依本服丸若欲合藥先看天氣晴明其夜
方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知如似可每日只服二十五
丸服訖覺虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大斗煮令
爛去頭取汁可一斗已來細細服之亦不用著鹽不過三劑差


文州羌活



鳳翔府獨活



茂州獨活



寧化軍羌活



獨活味苦甘平微温無毒主風寒所擊金瘡止痛賁

豚癩瘞

音熾

女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者

久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者

一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自

動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾

為之使

陶隱居

云藥名無豚實恐是豕豕實此州郡縣並是羌活

羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活

色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖

故名獨活至易蛀宜密器藏之唐本注云療風宜用獨活兼水

宜用羌活

臣禹錫等謹按藥性論

云獨活君味苦辛能治中諸

風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛又云

羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂

口面喎邪遍身癩痺日華子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣

四肢羸劣頭旋明目赤目疼及伏梁水氣五勞七傷虛

損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母類也

圖經曰

獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今用蜀漢出者

佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實

時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無

風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同

一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味了不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收得寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而市人或擇羌活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西川者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲為謬矣篋中方療中風纒覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及繆針灸但用補治湯餌自差

雷公云採得後細剉拌淫羊藿裏二日**千金方**治中風通身冷口噤


不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫再服**肘後方**治風齒疼頰腫獨**經驗**

後方治中風不語獨活一兩剉酒二升煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久溫服三合未差再服

必效方治產後腹中絞刺疼痛羌活二兩**子母秘錄**治中

痛或子腸脫出酒**小品方**治產後風虛獨活湯主之又白鮮煎羌活取汁服皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮

漢州升麻



各三兩水三升煮取一升半分三服耐酒
 者可以酒水中煮之佳用白鮮亦同法
 急羌活三兩為末每服五錢水酒
 各半盞煎去滓溫服經驗方同
 兩末每服三錢水一盞
 煎和滓溫服臥時再用


文潞公

治牙齒風上攻腫
 痛獨活地黃各三

又方

治產後中風
 語澁四肢拘


茂州升麻



本草綱目

五


滁州升麻



本草六

五

秦州升麻



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃
鬼辟温疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時
氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕
身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

陶隱居

云舊出益州者第一形細而黑極堅實頃無復有今惟

出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又
虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦根不
必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒收葉按作小兒浴
湯主驚悸今按別本注云今高高出者色青功用不如蜀者

禹錫等

論云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱疾能

治口齒風蠶腫疼牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅
閉不通口瘡煩悶瘰癧腫疏豆瘡水煎綿洗拭瘡上主百邪鬼
魅陳藏器云陶云人言升麻是落新婦根非也相似耳解毒取
葉作小兒浴湯主驚悸今人多呼小升麻為落新婦功用同於

升麻亦大小有殊日華子云安魂定魄并鬼

附啼泣遊風腫毒口氣疳蠶又名落新婦

圖經

曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以
蜀川者為勝春生苗高二尺以來葉似麻葉並青色

四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根
多鬚二月八月採暴乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷

寒頭痛凡腫毒之屬殊效細判一兩水一升煎鍊取濃汁服之
入口即吐出毒氣蜀人多用之揚炎南行方療燔疽湯用升麻
又有升麻膏升麻搗湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方
服乳石補壅法云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三
兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜丸如梧子每日食後服三
丸又有七物升麻丸升麻犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩豉
二升微熬同搗散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十九丸取微
利為好若四肢小熱於食上服二十九丸非但辟瘴兼甚明目

雷公云 採得了刀刮上麓皮一重了用黃精自然
汁浸一宿出暴乾細判蒸了暴乾用之

聖惠方 治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠卧不安用川升麻一味
不計多少細判水一盞煎去滓取汁以綿露汁洗拭

外臺秘要 比歲有病天行發斑瘡頭面及身須與周匝
狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日

千金翼 必死治後瘡盤黯一歲方減此惡毒之氣所為以水
煮升麻綿露洗之苦酒煮彌佳但躁痛不可忍也

治產後惡血不盡或經月半歲升麻二兩清酒
五升煮取一升半分溫再服當吐下惡物極良

梅師方 治時行病發瘡升麻五兩以水
蜜二味同煎二佛半服半傅瘡

姚和衆 小兒尿血蜀升麻五分水五合煎
取一合去滓一歲兒一日服盡

劉含之喉
塞亦然

滁州車前子



車前子味甘鹹寒無毒主氣癰止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令

人有子明目療赤痛又服輕身而老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血痕下血小

便赤止煩下氣除小蟲一名當道一名芣苢音苢一

名蝦蟇衣一名牛遺一名勝鳥音昔生真定平澤仁陵

阪道中五月五日採陰乾陶隱居云人家及路邊甚多其

冷利仙經亦服餌之令人身輕能跳越面容不老而長生也韓

詩乃言芣苢是木似李食其實宜子孫此為謬矣唐本注云今

出開州者為最臣禹錫等謹按爾雅云芣苢馬鳥馬鳥車前注

今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟇衣疏引陸機疏

云馬鳥一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也

幽州人謂之牛舌草可驚作茹大滑其子治婦人難產藥性論

云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛障

腎腦痛淚出壓丹石毒去心肖煩熱葉主洩精病治尿血能補

五藏明目利小便通五淋蕭炳云車前養肝日華子

云常山為使通小便淋瀝壯陽治脫精心煩下氣

圖經曰

車前子生真定平澤仁陵道路中今江湖淮甸近京

北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長

及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如亭蕨赤黑色五月五

日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之

蜀中尤尚北人取根曰乾作紫苑賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾推云芣苢馬烏馬車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸機云馬烏一名車前一各當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻與煮同作茹大滑其子治婦人難產是也然今人不復有噉者其子入藥最多駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今醫家生研水解飲之治衄血甚善

雷公云凡使須一窠有九葉內有藥莖可長一尺二寸者使藥莖使葉判於和藥葉根去土了秤有一鎰者力全堪用使葉勿新瓦上攤乾用之

聖惠方治熱痢不止者搗車前草葉絞取汁一盞入蜜一合煎溫分二服

又方治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服屢試有效

外臺秘要治陰痒痛車前子以水三升煮三沸去滓洗痒痛處

又方治尿血車前草搗絞汁五合空心服之

百一方小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服

梅師方治姪娘患淋小便澁水道熱不通車前子食盡服之

子母秘錄治橫生不可出車前子末酒服二錢匕


治瀉歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈夫人云市人有此藥三文一貼甚効公曰吾輩藏腑與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知

本草
五七
之召賣藥者厚遺之問其方父之乃肯傳但用車前子一味為
末米飲下二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分
穀藏自
止矣

海州青木香




滁州青木香



本草方

五八

廣州木香



然此香木

木香味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露

療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱

毒行藥之精久服不夢寤癩寐輕身致神仙一名蜜

香生永昌山谷

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶晉自上來乃云大秦國以療毒腫

消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾

胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之

要用陶云不入藥用非也

花黃苗高二四尺葉長八九寸皺軟而有毛

治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣

氣疔癰癥塊脹痛逐諸擁氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疔刺

多瘴氣獻青木香以禦霧露

草根狀如甘草

圖經曰

木香生永昌山谷今准廣州

健脾消食療羸瘦

脫冷痛嘔逆反胃

居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其

形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用爲蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙糖和之駙馬都尉鄭某誌其去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下二十九日再其效甚速然用藥不類古方而云仲景者不知何從而得之也按修養書云正月一日取五木煑湯以浴令人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香爲五香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木香青木香名爲五香信然矣

海藥

謹按山海經云生東海崑崙崑崙山

雷公曰

凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬

如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

外臺秘要

療腋臭方醖醋浸青木香置腋下夾之即愈

傷寒類要

天行熱病若發赤黑斑如痲青木香二兩水二升煮取一升頓服之效

孫尚藥

夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾爲末三服第一橘皮湯


第一陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

別說云

謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說爲得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載除州


海州者乃馬兜鈴根此山鄉俗名爾治療冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

永康軍薯蕷



本草六
六

明州薯蕷




本草綱目


本草

卷

滁州薯蕷



眉州薯蕷



薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補

中益氣力長肌肉主頭面游風頭風眼眩下氣止腰

痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明

輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷

除音生嵩高山谷二月八月採根暴乾紫之為之使惡甘

道服食亦用之唐本注云薯蕷曰乾搗細篩為粉食之大美且

愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀道

者尤良臣馬錫等謹按吳氏云薯蕷一名諸薯齊越名山芋一

名脩脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨胸鍾

山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮

黃類芋藥性論云薯蕷臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心

神安竟鬼開達心孔多記事滿心氣不足患人體虛羸加而用

之異苑云薯蕷預野人謂之土藷若欲掘取嘿然則獲唱名便不

可得人有植之者隨所種之物而像之也日華子云助五藏彊

筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前

圖經曰薯蕷生嵩高山山今處處有之以北都四明者為

佳春生苗蔓延籬垣空紫葉青有二尖角似牽牛更

厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月
八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪暴乾用
之法取麤根刮去黃皮以水浸末白礬少許摻水中經宿取淨
洗去涎焙乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞
作畦種苗生以竹梢作援援高不得過三尺夏月頻澆之當年
可食極肥美南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯
煮之作塊不散味更珍美云食之尤益人過於家園種者又江
湖閩中出一種根如薑芋之類而皮紫極有大者一枝可重斤
餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於北地者耳彼土人單呼為
諸音若殊亦曰山藷而山海經云景山北望少澤其草多藷與
音與薯蕷同郭璞注云根似芋可食今江南人單呼諸音儲語
或有輕重耳據此注則薯蕷與諸乃一種南北之產或有不同
故其形類差別然字音殊儲不
同蓋相傳之訛也一名山芋

食療

治頭疼利丈夫助陰力和麪作饅飀則微動氣為不
能制麪毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之

入藥更妙也

雷公曰

凡使勿用平田生二三紀內者要經十紀者
山中生皮赤四面有髭生者妙若採得用銅

刀削去上赤皮
洗去涎蒸用

聖惠方

補虛損益顏色用薯蕷於砂盆中細
研然後下於銚中先以酥一大匙熬

令香次旋添酒一盞
煎攪令勻空心飲之

食醫心鏡

主下焦虛冷小便數瘦損無
力生薯蕷半斤刮去皮以刀

切碎研令細爛於錫中著酒沸下薯蕷不得
攪待熟着少鹽葱白更添酒空腹飲一二盃妙

薏苡仁



薏

音意 苡

音仁 味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸

風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人

能食久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠱一名屋

莢音一名起實一名贛音生真定平澤及田野八月

採實採根無時

陶隱居云真定縣屬常山郡近道處處有多生人家交趾者子最大彼土呼為薏音幹珠

馬援大取將還人讒以為真珠也實重累者為良用之取中仁

今小兒病虻蟲取根煮汁作糜食之甚香而去虻蟲大効今按

陳藏器本草云薏苡收子蒸令氣餹暴乾磨取仁炊作餅及作

麩主不飢温氣輕身煮汁飲之主消渴又按別本注云今多用

梁漢者氣力劣於真定取青水色者良臣禹錫等謹按藥性論

云能治熱風筋脉攣急能令人食主肺痿肺氣吐膿血欬嗽涕

唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫種於彼取仁甑中蒸使氣

饑暴於日中使乾按之得仁矣孟詵云性平去乾濕脚氣大効

圖經曰

薏苡仁生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖

青白色形如珠子而稍長故名薏苡子小兒多以線穿如貫珠

為戲八月採實採根無時今人通以九月十月採用其實中仁

古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心肖甲錯者停苦酒煮

薏苡仁令濃微温頓服之肺有血當吐愈廣濟方治冷氣薏苡

仁飯粥法細舂其仁炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳或煮粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又背脊痛者判根濃煮汁服三升乃定今人多取葉為飲香益中空膈甚勝其雜他藥用者張仲景治風濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏仁薏苡仁湯麻黃三兩杏仁三十枚甘草薏苡仁各一兩四物以水四升煮取二升分溫再服又治背痺偏緩急者薏苡仁附子散方意以仁十五兩大附子十枚炮二物杵末每服方寸匕日三

合陳藏器餘 主消渴熱蛇蟲 雷公曰 凡使勿用糲米顆大為糲糲是也若薏苡仁顆小色青味甘咬着粘人齒牙用一兩以糯米二兩同熬入之糯米熟去糯米取使若更以鹽湯煮過別


是一般修 治牙齒風齩薏苡根四兩水 又方 喉制亦得 又方 蛔蟲攻心腹痛薏苡根二斤切水七卒癰腫吞薏 又方 升煮取三升先食盡服之蟲死盡出以仁二枚

梅師方 肺疾唾膿血取薏苡仁十兩杵碎以 食醫心鏡 治脉拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣力薏苡仁一升搗為散每服以水二升煮兩匙未作粥空


腹食 後漢馬援傳援在交趾常餌薏苡實以實用能輕身省之 馬援 慾以勝瘴氣南方薏苡實大援欲以為種軍還載

之一

齊州澤瀉




邢州澤瀉



本草方

卷五

澤瀉



澤瀉

本草

卷

澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏
益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩
精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水又服耳目聰明不飢
延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一
名水瀉一名及瀉一名苦芋一名鵠瀉生汝南池澤
五月六月八月採根陰乾畏海蛤 文蛤

身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪
濕久服面生光令人無子九月採

陶隱居云汝南郡屬豫州今近道亦有不

堪用惟用漢中南鄭青弋形大而長尾間必有两歧為好此物
易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆
用之亦云身輕能步行水上
唐本草云今汝南不復採用惟以
涇州華州者為善也

葛即藥草澤瀉也藥性論云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治

五淋利膀胱熱宣通水道日華子云治五勞七傷主頭旋耳虛

鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補

女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血脉

圖經曰澤瀉為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長

秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人秋

未採暴乾用此物極易朽蠹當須密藏之漢中出者形大而長

尾間有兩歧最佳爾雅謂之漚犀朱切一名葛輿馬同私夕切素

問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉木各

十分麩銜五分合以二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後

飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉湯主之澤瀉五兩木

二兩水二升煎取半升分溫再服治傷寒亦有大小澤瀉湯五

苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉

木但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以水一升煮澤

取五合合此二汁分為再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單

服澤瀉一物搗篩取末水調日

分服六兩百日躡輕久而健行

雷公曰不計多少細剉酒浸


末鍊蜜為丸如桐子大空心以

溫酒下十五丸至二十九丸甚效

經驗方常服澤瀉皂莢

水煮爛焙乾為

泗州遠志




威勝軍遠志


齊州遠志



解州遠志



商州遠志



遠志

為君

味苦温無毒主效逆傷中補不足除邪氣利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心

氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃及服

輕身不老好顏色延年葉名小草主益精補陰氣止

虛損夢洩一名棘苑一名蔓繞一名細草生太山及

冤句川谷四月採根葉陰乾

得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊

齊蛤郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤止得三

兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入仙方藥用

是百合非也會注遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾

銳而黃其上謂之小草藥性論云遠志畏螻蛄治心神健忘安

魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪日華子云主膈氣驚魘長肌

肉助筋骨婦人血嗽不失

音小兒客忤服無忌

圖經曰

遠志生泰山及冤句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如華豆

葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根
葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅根葉俱大於它處商州者
根又黑色俗傳夷門遠志最佳古方通用遠志小草今醫但用
遠志稀用小草古今錄驗及范汪方治背痺心痛逆氣膈中飲
不下小草丸小草蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六
物合搗下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三九日三不知
稍增以知為度禁
猪肉冷水生葱菜

雷公曰

遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶去
心了用熟甘草湯浸一宿曬出曝乾用之也


肘後方

治人心孔昏塞多忘喜誤丁酉日密自至市
買遠志者中角中還為末服之勿令人知

抱朴子

內篇云陵陽仲子服遠志二十年有
子二十七人開書所視便記而不忘

襄州草龍膽



本草綱目卷之四十五

本草綱目


卷之四十五

信陽軍草龍膽




藥性論

沂州草龍膽



睦州山龍膽



睦州山龍膽

龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕
傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢
去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕又服益智不忘輕身
耐老一名陵游生齊胸山谷及冤句二月八月十一

月十一月採根陰乾

貫衆為之使惡防葵地黃陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚

苦故以膽為名今按別本注云葉似龍葵味苦如膽因以為名

臣等謹按藥性論云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨

執癰腫治時疾熱黃口瘡日華子云小豆為使治客

忤疝氣熱病狂語及瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰

龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有之宿根黃白
色下抽根十餘本大類牛膝直上生苗高尺餘四月

生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形
青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾

俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑
自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢匕溫服之治四肢疼

痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治痘多用
之集驗方穀疸丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先

食以麥飲服之如梧子五九日三不知稍增刪繁方治勞疸同
用此龍膽加至二兩更增梔子仁三七枚三物同篩搗丸以猪

尙嵐軍細辛



膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞爲名穀疸者因食而勞也

雷公曰

採得者陰乾欲使時用銅刀切去髭土頭了對於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之

令人弱不禁

聖惠方

治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮取一盞去滓隔宿不食平旦頓服

外臺秘要


治卒下血不止龍膽一虎口以水五升煮取二升半分爲五服差

肘後方

治卒心痛

龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服

華州細辛



信州細辛



華州細辛

細辛味辛溫無毒主效逆頭痛腦動百節拘攣風濕

痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺齷

音 癩鼻風癩癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝

膽通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生

華陰山谷二月八月採根陰乾曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹

藁木甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆陶隱居云今用東陽臨海者

形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節人患口臭者含之多效最能除痰明目也臣禹錫等謹按范子云細辛出

華陰色白者善吳氏云細辛一名細草神農黃帝雷公桐君辛小溫岐伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑一根一葉相連藥性論

云細辛臣忌生菜味苦辛治效逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痒能止眼風淚下明目開胃中滯

除齒痛主血閉婦人血滯腰痛日華子云治嗽消死肌瘡肉胃中結聚忌狸肉

圖經曰細辛生華陰山谷今處有之然他處所出者不及華州者真其根細而其味極辛故名之曰細辛二月

八月採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細辨耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸莖如麥

藁竈細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間鑿
內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見間結實如豆大窠內有
碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成窠有似飯帚密開
細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香以人多誤用
故此詳述之

雷公云

凡使一一揀去雙葉服之害人須去頭土
了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方

治口臭及鬩齒腫痛細辛
煮取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要

治卒客忤停尸不能言
細辛桂心等分內口中

別說云


謹按細辛非華陰者不得為細辛用若杜衡之類自
應依木性以用爾又細辛若單用未不可過半錢匕

多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年關中或用此毒人者聞
平涼獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用
因此有此

温州石斛



春州石斛



春州石斛

石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸

瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪

熱痺音佛氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定

志除驚一名法蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂音逐

生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾陸英為之使惡

凝水石巴豆畏蠶雷丸陶隱居云今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蛭音窳蝥音蝥蛄者為佳近道

亦有次宣城間生椽樹上者各木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮湯

用爾俗方最以補虛療脚膝唐本草注云作乾石斛先以酒洗將蒸炙成不用灰湯今荆襄及漢中江左又有二種一者似大麥

累累相連頭生一葉而性冷一種大如雀解名雀解生酒漬服乃言勝乾者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也

臣禹錫等謹按藥性論云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益

力日華子云治虛損劣弱壯筋骨暖水藏輕身益智平胃氣逐虛邪

圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及溫

台州亦有之以廣南者為佳多在山谷中五月生苗


天戟巴州滁



莖似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗搗蒸炙成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用

雷公云 凡使先去頭土了用酒浸一宿曬出於日中曝乾却用酥蒸從已至酉却徐徐焙乾用石斛鎖涎澁丈夫元氣如斯修事服蒲一鎰求無骨肉痛也

歸州巴戟天



巴戟天味辛甘微温無毒主天風邪氣陰痿不起強

筋骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰

中相引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳

山谷二月八月採根陰乾覆盆子為之使惡朝生雷丸丹

者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐本注云巴戟天苗

俗方名二蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色

嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝臣禹錫等謹按藥性論

云紫巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主

下氣大風血癩病人虛而損加而用之日華子云味苦安五藏

定心氣除一切風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠

有小孔子堅硬難擣

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有

又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋

結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白

色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色為良蜀人云

都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣

味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土

人採得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者亦

白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫而鮮索者偽也真者擊破其中雖紫又有微白糝如粉色理小暗也

雷公曰

凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用

布拭令乾用

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣又服

輕身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉

夏採莖秋採花冬採根

陶隱居云諸方藥不用此乃有解音鮒菜出水中人蒸食之此乃生

山谷當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此

唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五極實圓若龍葵子生青熟紫黑煮汁飲解毒東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨

今按陳藏器本草云白英主煩熱風痺丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目

爾雅云符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳瑞珠若云子熟黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

白蒿



白蒿



白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣

長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明

不老生中山川澤二月採

陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆

無復識之所生療既殊佳應更加研訪服食七禽散云白兔食之仙與前菴藺子同法爾唐本注云爾雅繁音煩音高即白蒿也此蒿葉麗於青蒿從初生至枯白於眾蒿頗似細艾今所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛麗音俗呼為蓬蒿臣禹錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦繁爾雅陸機云凡艾白色為蓬蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰繁游胡游胡旁勃也孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黃及心痛其葉生接醋淹之為菹甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以米飲和一匙空腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾


圖經曰

白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉麗上有白毛錯音從初生至枯

白於眾蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂繁音是也疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦繁爾雅陸機云凡艾白色為蓬蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云繁游胡游胡旁勃也此草古人以為菹唐子孟詵亦云生接醋食今人但食婁蒿不復食此或疑此蒿即婁蒿而孟詵又別著婁蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵陳蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云繁之醜秋蒿言春時各有種各至秋老成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿

究州赤箭


詩小雅所謂非莪伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿牡蒿牡蒿（愆刃切）
 也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆角
 銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子者而陸云有
 子二說小異今當用有子者爲正下品又有角蒿云葉似白蒿
 花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有
 茵陳蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治癩疾多用之深師
 方云取白艾蒿十束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候
 熟稍稍飲之但是惡疾遍體面目有瘡者皆可飲之又取馬新
 蒿搗末服方寸匕日三如更赤起服之
 一年都差平復角蒿醫方鮮有用者



本草六

十

赤箭



赤箭味甘平虛至殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿
 疝音下血又服益氣力長陰肥健輕身增年一名離

母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月

四月八月採根暴乾陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此
草亦是芝類云莖赤如箭幹葉生其

端根如人足又云如芋有十二子為衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似而益人垂異恐並非此赤箭唐本注云此芝類莖似箭斨赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦棟子核作五六稜中肉如麩日暴則枯萎也得根即生噉音澹之無乾服法也良醫錫等謹按藥

圖經曰

赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭斨葉生其端四月開

花斨葉俱赤實似苦棟子核作五六稜中有肉如麩日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有伏兔之根無此菟則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏兔亦不復聞有見者始其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於


此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春宜早秋宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云

謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云

出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公括最為博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭是說都不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者此所未嘗見用今就此赤箭根為天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子黃熟而落返從籜中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理

秦州菴蘭子



寧州菴蘭子



菴音菴子味苦微寒微温無毒主五藏瘀血腹中

水氣臃脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中

寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年

不老音駮食之神仙生雍州川谷亦生上黨及

道邊十月採實陰乾荆實意改為之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之

人家種此辟蛇也**臣禹錫等謹按藥性論云菴藟味辛苦益氣**

主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血**日華子云治腰脚重**

骨節痠痛不下食**圖經曰**菴藟子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春

採陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛇謹按木經又

服輕身延年不老而古方書少有服食者准入諸雜治藥中如

胡洽療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙

獨行方主腕折瘀血單用菴藟一物煮汁服之亦未服今人治

廣利方治瘀血不散變成癰搗生菴藟蒿取汁一升服之

薺莫子



新錫質

音覓

子味辛微温無毒主明目目痛淚出除痺

補五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名葳

新一名大戟一名馬辛一名大薺生咸陽川澤及道

傍四月五月採暴乾

得荆實細辛惡乾薑苦參

方甚稀唐本注

云爾雅云是大薺然驗其味甘而不辛也臣禹錫等謹按蜀本云似薺菜而細俗呼為老薺藥性論云新質子

苦參為使能治肝家積聚眼目赤腫

大而扁薺蘇引爾雅為注云大薺按大薺即薺非薺質也薺質圓二物殊別也

圖經曰

薺質子生咸陽川澤及道傍今處處有之爾雅云新質大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云

是大薺又云然薺質味辛大薺味甘陳藏器以大薺即是薺薺非薺質薺質大而扁薺蘇引爾雅為注云大薺按大薺即薺非薺質也薺質

謂之薺音典注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今眼目方中


多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以薺質子一物搗篩為末欲臥以銅筋點眼中當有熱淚及惡物出并去努肉可三

四十夜點之甚佳

著日實



蔡州著實



蒼實味苦酸平無毒王益氣充肌膚明目聰慧先知

久服不飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日

乾唐本注云此草所在有之以其莖為筮陶誤用楮實

圖經曰著實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖

生便條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖為筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃游於蓮葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫

徐廣注曰劉向云龜千歲而靈著百年而一本生百莖又褚先生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之

傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上著

長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所生者皆不言如此然則此類其神物乎

故不常有也

赤芝味苦平主膏中結益心氣補中增智慧不忘久

食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山陶隱居云南嶽本是

衡山漢武帝始以小霍山代之非正也此則應生衡山也

英公云安心神

黑芝味鹹平主瘰隆利水道益腎氣通九竅聰察久

食輕身不老延年神仙一名玄芝之生常山唐本注云五芝經云

比皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身

不老延年神仙一名龍芝生泰山

英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意

勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華

山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘温主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六

芝皆無毒六月八月採

薯蕷為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青


茵陳蒿
菌陳蒿
俗所稀見族種甚多形色壤異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上生狀如木樛音魁名為紫芝蓋止癢痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也
臣禹錫等謹按爾雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生

瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也
抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如黃金而皆光明洞


澈如堅冰也
又云木芝者松栢脂淪地千歲化為茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之

不焦帶之辟兵
藥性論云紫芝使畏髮味甘平無毒主能保神益壽

海州卷栢



兗州卷栢



兗州卷栢

本草

卷

卷

君免切

栢味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子

陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結

頭中風眩痿蹇強陰益精久服輕身和顏色令人好

容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常

山山谷石間五月七月採陰乾

陶隱居云今出近道叢生石土上細葉似栢卷

屈狀如雞足青黃色用之去下近石有沙土處臣禹錫等謹按

范子云卷栢出三輔吳氏云卷栢神農辛平桐君雷公甘建康

記云建康出卷栢藥性論云卷栢君能治月經不通尸疰鬼疰

腹痛去百邪鬼魅日華子云鎮心治邪啼泣除面疔頭風暖水

藏生用破血灸用止血

色高二五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下土近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭

痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麤塊蒼木節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗
莖青色花黃色葉摘之有乳汁搗汁飲驗

兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上
燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香
聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳
云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用爲衆
草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如
中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺
虎狼蟲虺等毒天行瘡瘡寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉

瘡腫小兒寒熱丹毒中惡症忤痢血等並煮汁服之
其功用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗
高二三尺獨莖根如細辛研服更良生水者各木
犀也

海藥云

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖獨葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷

溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉
似萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色
不異武王誡之不食死廣志曰薇葉似萍可食利人

也

海藥云

謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾
若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云

謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性温平無毒主頭面游風遍身癢煮汁淋蘸陶朱術云五月五

日採諸山野
往往亦有之

零餘子味甘温無毒主補虚強腰脚益腎食之不飢
曬乾功用強於薯蕷有數種此是其一也一本云大
如雞子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類
云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日
煎爲丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地
肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白
却老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病
煮之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫
者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸
胃生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕
饑年當穀也

石藥主長年不飢生太山石上如花藥爲丸散服之
今時無復有王隱晉書曰庾袞入林慮山食木實餌
石藥得長年也

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傳之酢瘡頭小大
硬小兒此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必
危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚

醫接汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似
離鬲草此地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白歛
出會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹
出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五臟開胃令人能
食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思炭味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天
行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨
傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今
江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思炭所主頗有

異同終非一物也陳思安蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘴蠱毒灸服之吐下亦搗傳瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸癖溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸

瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾
故名倚待生桂州始安山谷葉圓高二三尺八月採
取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州
記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹
花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收
之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久
服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞根如葛
黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃

天行黃疸疽瘡瘧瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫
並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但
霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延
根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹
與毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心膏煩熱天行
溫瘴出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之號蔓及根
並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食
之與婆羅門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如
防己出四明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李
邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓

赤珠似龍葵但子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷陰地苗如萱草根似天門冬用之去心

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閃癖

孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻癩癧癭瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山

人取以爲菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖煮服之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

整菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁瘡生江南國陰地似益母方莖對節白花花中甜汁飲之如蜜

益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補肝除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少許

蓼蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內

不調產後血攻膏脇刺痛煮服之亦食其苗如苾韭亦擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺竈味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛

七仙草主杖瘡搗枝葉傅之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此一藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已

南甘家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏
嶺南多毒物亦多解物豈天資乎

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹
下痢腰背疼疔癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑
小黃一名胡乾薑

池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也
胡國人用之

經史證類大全本草卷之六