

圖書集成

脉經卷第八

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平卒中厥脉證第一

平瘧濕渴脉證第二

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

平霍亂轉筋脉證第四

平中風歷節脉證第五

平血痺虛勞脉證第六

平消渴小便利淋脉證第七

平水氣黃汗氣分脉證第八

平黃疸寒熱瘧脉證第九

平背痺心痛短氣賁脉脉證第十

平腹滿寒疝宿食脉證第十一

平五藏積聚脉證第十二

平驚悸衄吐下血胃滿瘀血脉證第十三

平嘔噦下痢脉證第十四

平肺痿肺癰欬逆上氣喘飲脉證第十五

平癰腫腸癰金瘡淫脉證第十六

平卒尸厥脉證第一

寸口沈大而滑沈則為實滑則為氣實氣相搏血氣入於藏即死入於腑即愈此為卒厥不知人唇青身冷為入藏即死如身温和汗自出為入腑而復自愈

平瘧濕暍脉證第二

太陽病發熱無汗而反惡寒者名剛瘧

太陽病發熱汗出而不惡寒者名柔瘧

太陽病發熱其脉沈而細者為瘧

太陽病發其汗因致瘧

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤

獨頭動搖者為瘧

太陽病無汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語欲

作剛瘧葛根湯主之

剛瘧為病胃滿口噤卧不著席脚攣急其人必齟齒可與大承氣湯

瘧病發其汗已其脉澹澹如蛇暴腹脹大者為欲解

脉如故反伏弦者必瘧

瘧脉來按之築築而弦直上下行

痲家其脉伏堅直上下

夫風病下之則痲復發其汗必拘急

太陽病其證備身體強几几然脉沈遲此為痲枯樓
桂枝湯主之

痲病有灸瘡難療

瘡家雖身疼痛不可發其汗汗出則痲

太陽病關節疼煩脉沈而緩者為中濕論云中濕為濕痺之候其

人小便不利大便反快但當利其小便

病者一身盡疼一云發熱日晡即劇此為風濕汗出

所致也論云此病傷於汗出當風或久傷取令所致

濕家之為病一身盡疼發熱而身色熏黃也

濕家之為病其人但頭汗出而背強欲得被覆向火

若下之早則噦或胃滿小便利一云舌上如胎此為

丹田有熱背上有寒渴欲飲而不能飲則口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便利一云者死若下利

不止者亦死

問曰風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨

不止師云此可發汗而其病不愈者何也答曰發其

汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風

濕者發其汗微微似欲出汗者則風濕俱去也

濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗為宜慎

不可以火攻之

風濕脉浮身重汗出惡風者防已湯主之

病人喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無

病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈

論云濕家病身疼痛

發熱面黃而喘頭痛鼻窒而煩

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便秘小便自利者木附子湯主之

風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也白虎湯主之

太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中所致也瓜蒂湯主之

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細乳遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加溫針則發熱益甚數下之淋復甚

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

陽毒為病身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤班班如錦文喉咽痛唾膿血五日可治至七日不可治也有傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒升麻湯主之

陰毒為病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數身如被打五六日可治至七日不可治

也或傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒甘草湯主之

百合之為病其狀常默默欲卧復不能卧或如強健人欲得出行而復不能行意欲得食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如寒無寒如熱無熱朝至口苦小便赤黃身形如和其脉微數百脉一宗悉病各隨證治之百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難治

千金方云見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗為逆也見在於陽而攻其陰則陽不得解也復下之其病不愈

狐惑為病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐狐惑之病並不欲飲食

聞食臭其面目乍赤乍白乍黑其毒蝕於上者則聲

喝其毒蝕下部者咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於

下部苦參湯淹洗之蝕於肛者雄黃熏之

其六脉數無熱微煩默默欲卧汗出初得三四日目

赤如鳩眼得之七八日目四眦黃黑若能食者膿已

成也赤小豆當歸散主之

病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之

平霍亂轉筋脉證第四

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此為霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何病師曰當為霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其

脈微澀本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必吐利

轉筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之

平中風歷節脈證第五

夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脈微而數中風使然

頭痛脈滑者中風風脈虛弱也

寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪啗僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人邪入

於藏舌即難言口吐於涎

寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛遲則為中風邪氣中經則身癢而癢癢心氣不足邪氣入中則肯滿而短氣

跌陽脈浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出

少陰脈浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如掣

盛人脈濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致也

寸口脈沈而弱沈則主骨弱則主筋沈則為腎弱則為肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節也味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿

名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮
衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大
黃汗出脛冷假令發熱便為歷節也病歷節疼痛不
可屈伸烏頭湯主之

諸肢節疼痛身體魁癩脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲
吐桂枝芍藥知母湯主之

平血痺虛勞脉證第六

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重
因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之形如風
狀巢原云其狀如但以脉自微濇在寸口關上小緊
宜針引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不

仁如風狀黃耆桂五物湯主之

夫欲治病當先知其證何趣乃當攻之耳

男子平人脉大為勞極虛亦為勞

男子勞之為病其脉浮大手足煖春夏劇秋冬差陰
寒精自出酸削不能行少陰虛滿

人年五十六十其病脉大者痺俠背行苦腸鳴馬刀
俠嬰者皆為勞得之

男子平人脉虛弱細微者喜盜汗出也

男子面色薄者主渴及止血卒喘悸其脉浮者裏虛也
男子脉虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白
時時目瞑此人喜衄少腹滿此為勞使之然
男子脉微弱而澀為無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眦痛目一云眩髮落脉極虛芤遲為清穀亡血失精

脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交通桂枝加龍骨牡蠣湯主之

脉沈小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也

脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

平消渴小便利淋脉證第七

師曰厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢而不欲食食即吐下之不肯止

寸口脉浮而遲浮則為虛遲則為勞虛則衛氣不足遲則榮氣竭跌陽脉浮而數浮則為氣數則消穀而緊要略緊作大堅氣盛則溲數溲數則緊要略緊作堅緊數相搏則為消渴

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣圓主之

師曰熱在一作結下焦則溺血亦令人淋閉不通淋之

為病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中寸口脉細而數數則為熱細則為寒數為強吐跌陽脉數胃中有熱則消穀引食大便必堅小便則數少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋

淋家不可發汗發汗則必便血

平水氣黃汗氣分脉證第八

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證肘腫按之没指不惡風其腹如鼓如鼓一作不滿渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身體發熱背滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

脉浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則為癰瘳身體為癢癢為泄風久為痲癩氣強則為水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上瞧有寒其口多涎此為黃汗

寸口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如新卧起狀其頸脉動時時欬按其手足上陷而不起者風水太陽病脉浮而緊法當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺背中空不能食反聚痛暮躁不眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹其形如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脉浮浮為在表其人能食頭痛汗出表無佗病病者言但下重故從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之一云風水脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱

者越婢湯主之

師曰裏水者一身面目洪腫其脉沈小便不利故令

病水假如小便自利亡津液故令渴也越婢加朮湯

主之一云皮水其脉沈頭面浮腫小便不利故令病水假令小便自利亡津液故令渴也

皮水之為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者

防已茯苓湯主之

跌陽脉當伏今反緊本自有寒疝腹中痛醫反下

之下之則胃滿短氣

跌陽脉當伏今反數本自有熱消穀一作消渴小便數今

反不利此欲作水

寸口脉浮而遲浮脉熱遲脉潛熱潛相搏名曰沈跌

陽脉浮而數浮脉熱數脉止熱止相搏名曰伏沈伏

相搏名曰水沈則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水

走皮膚則為水矣

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒水

不沾流走在腸間

少陰脉緊而沈緊則為痛沈則為水小便即難師曰

脉得諸沈者當責有水身體腫重水病脉出者死

夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病

水腹大小便不利其脉沈絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也

答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈

水之為病其脉沈小屬少陰浮者為風無水虛脹者

為氣水發其汗即已沈者與附子麻黃湯浮者與杏

子湯

心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其陰大腫
肝水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液
微生小便續通

肺水者其身腫小便難時時鴨澹

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難
腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上

汗其足逆冷面反瘦一云大便反堅

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發
汗乃愈

師曰寸口脉沈而遲沈則為水遲則為寒寒水相搏
跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則鶩澹胃氣衰則身腫

少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水

不通經為血血不利則為水名曰血分一云水分

問曰病者若水面目身體四肢皆腫小便不利師脉

之不言水反言胃中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬

喘審如師言其脉何類師曰寸口脉沈而緊沈為水

緊為寒沈緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽

衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動緊氣上衝喉

咽塞噎脇下急痛醫以為留飲而大下之氣擊不去

其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不

利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶圓下水當時

如小差食飲過度腫復如前背脇苦痛象若奔豚其

水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬欬

止其喘自差先治新病病當在後

黃汗之病身體洪腫一作發熱汗出而渴而渴一作不渴狀

如風水汗沾衣色正黃如藥汁其脉自沈

問曰黃汗之病從何得之師曰以汗出入水中浴水

從汗孔入得之黃者芍藥桂枝苦酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出

又身常暮卧盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱

者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重

汗出已輒輕者久久必身瞶瞶則脊中痛又從腰以

上必汗出下無汗腰寬弛痛如有物在皮中狀劇者

不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗桂枝加黃

耆湯主之

寸口脉遲而濇遲則為寒濇為血不足跌陽脉微而

遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足

逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉

膀胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼

陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃

行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍

藥加麻黃細辛附子湯主之

平黃疸寒熱瘧脉證第九

凡黃候其寸口脉近掌無脉口鼻冷並不可治脉沈

渴欲飲水小便不利者皆發黃

腹滿舌痿黃躁不得睡屬黃家

師曰病黃疸發熱煩喘冒滿口燥者以發病時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之

師曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差反劇為難治

又曰疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也

師曰諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加黃耆湯又男子黃小便自利當與小建中湯黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃黃蘗梔子芒消湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也

心中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸

酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沈弦者先下之

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈

酒疸黃色心下結熱而煩

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜薑狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節

疼痛當煩不煩而極汗出跌陽脉緩而遲胃氣反強少陰脉微微則傷精陰氣寒冷少陰不足穀氣反強飽則煩滿滿則發熱客熱消穀發已復飢熱則腹滿微則傷精穀強則瘦名曰穀寒熱

陽明病脉遲者食難用飽飽則發煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也師曰寸口脉浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行

跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食即滿也尺脉浮爲傷腎跌陽脉緊爲傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治消石礬石散主之

夫瘧脉自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可溫藥若脉緊數者可發汗針灸之浮大者吐之脉弦數者風發也以飲食消息止之

瘧病結爲癥瘕名曰瘧母鼈甲煎圓主之

瘧但見熱者溫瘧也其脉平身無寒但熱骨節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解名曰溫瘧白虎加桂枝湯

主之

瘧多寒者牡瘧也蜀漆散主之

平脊痺心痛短氣賁豚脉證第十

師曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦則脊痺而痛所以然者賁其極虛也今陽虛知在上臆所以脊痺心痛者以其脉陰弦故也

脊痺之病喘息欬唾脊背痛短氣寸口脉沈而遲關上小緊數者栝樓薤白白酒湯主之

平人無寒熱短氣不足以息者實也

賁豚病者從少腹起上衝咽喉發作時欲死復止皆從驚得其氣上衝脊腹痛及往來寒熱賁豚湯主之師曰病有賁豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆

從驚發得之

平腹滿寒疝宿食脉證第十一

跌陽脉微弦法當腹滿不滿者必下部閉塞大便難兩胛云疼痛此虛寒從下上也當以温藥服之

病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃自去腹滿時減減復如故此為寒當與

温藥

跌陽脉緊而浮緊則為痛浮則為虛虛則腸鳴緊則堅滿

脉雙弦而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰也可下之

病腹中滿痛為實當下之

腹滿不減減不足言當下之

病腹滿發熱數十日脉浮而數飲食如故厚朴三物湯主之

腹滿痛厚朴七物湯主之

寸口脉遲而緩遲則為寒緩即為氣氣寒相搏轉絞而痛

寸口脉遲而澀遲為寒澀為無血

夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏

中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒一作痛

夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

寸口脉弦者則脇下拘急而痛其人齧齧惡寒也

寸口脉浮而滑頭中痛跌陽脉緩而遲緩則為寒滑

則為虛虛寒相搏則欲食温假令食冷則咽痛

寸口脉微尺中緊而澀緊則為寒微則為虛澀則血

不足故知發汗而復下之也緊在中央知寒尚在此

本寒氣何為發汗復下之耶

夫脉浮而緊乃弦狀如弓弦按之不移脉數弦者當

下其寒脇下偏痛其脉緊弦此寒也以温藥下之宜

大黃附子湯

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒緊

則不欲食弦緊相搏則為寒疝

跌陽脉浮而遲浮則為風虛遲則為寒疝寒疝繞臍

痛若發則白汗出手足厥寒其脉沈弦者大烏頭湯

主之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有宿食

寸口脉緊如轉索左右無常者有宿食

寸口脉緊即頭痛風寒或腹中有宿食不化

脉滑而數者實也有宿食當下之

下利不欲食者有宿食當下之

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥屎也

所以然者本有宿食故也

宿食在上管當吐之

平五藏積聚脉證第十二

問曰病有積有聚有繫氣繫一作穀下同何謂也師曰積者

藏病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移為

可治繫氣者脇下痛按之則愈愈復發為繫氣夫病

已愈不得復發今病復發即為繫氣也

諸積大法脉來細而附骨者乃積也細一作結寸口積在

胷中微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關上積

在心下微下關積在少腹尺積在氣衝脉出在左積

在左脉出在右積在右脉兩出積在中央各以其部

處之

診得肺積脉浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛

少氣善忘目瞑皮膚寒秋差夏劇主皮中時痛如蟲

緣之狀甚者如針刺時癢其色白

診得心積脉沈而芤上下無常處病胷滿悸腹中熱

面赤嗌乾心煩掌中熱甚即唾血主身痠瘕主血厥
夏差冬劇其色赤

診得脾積脉浮大而長飢則減飽則見臍起與穀爭
減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢
重足脛腫厥不能卧是主肌肉損其色黃

診得肝積脉弦而細兩脇下痛邪走心下足腫寒脇
痛引少腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤喜轉筋爪
甲枯黑春差秋劇其色青

診得腎積脉沈而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則
減少腹裏急口乾咽腫傷爛目眈眈骨中寒主髓厥
善忘其色黑

寸口脉沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其脉弦腹

中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脉弦緊而微細
者瘕也夫寒痺瘕瘕積聚之脉皆弦緊若在心下即
寸弦緊在胃管即關弦緊在臍下即尺弦緊

有積在臍左
右上下也

一曰關
脉弦長

又脉癆法左手脉橫癆在左右手脉橫癆在右脉頭
大者在上頭小者在下

又法橫脉見左積在右見右積在左偏得洪實而滑
亦為積弦緊亦為積為寒痺為疝痛內有積不見脉
難治見一脉一作脇相應為易治諸不相應為不治

左手脉大右手脉小上病在左脇下病在左足右手
脉大左手脉小上病在右脇下病在右足
脉弦而伏者腹中有癆不可轉也必死不治

脈來細而沈時直者身有癰腫若腹中有伏梁
脈來小沈而實者胃中有積聚不下食食即吐

平驚悸衄吐下血胃滿瘀血脈證第十三

寸口脈動而弱動則為驚弱則為悸

跌陽脈微而浮浮則胃氣虛微則不能食此恐懼之
脈憂迫所作也驚為生病者其脈止而復來其人目睛
不轉不能呼氣

寸口脈緊跌陽脈浮胃氣則虛

寸口脈緊寒之實也寒在上臑背必滿而噫胃氣
虛者跌陽脈浮少陽脈緊心下必悸何以言之寒水
相搏二氣相爭是以悸

脈得諸澀濡弱為亡血

寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則
為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則
亡血

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

問曰病衄連日不止其脈何類師曰脈來輕輕在肌

肉尺中自溢一云尺脈浮目睛暈黃衄必未止暈黃去目

睛慧了知衄今止

師曰從春至夏發衄者太陽從秋至冬發衄者陽明

寸口脈微弱尺脈澀弱則發熱澀為無血其人必厥

微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛為實下虛上實必衄也

太陽脈大而浮必衄吐血

病人面無血色無寒熱脈沈弦者衄也

衄家不可發其汗汗出必額上促急而緊直視而不能眴不得眠

脉浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血

寸口脉微而弱氣血俱虛男子則吐血女子則下血嘔吐汗出者為可

跌陽脉微而弱春以胃氣為本吐利者為可不者此為有水氣其腹必滿小便則難

病人身熱脉小絕者吐血若下血婦人亡經此為寒脉遲者肯上有寒悸氣喜唾

脉有陰陽跌陽少陰脉皆微其人不吐下必亡血脉沈為在裏榮衛內結肯滿必吐血

男子盛大其脉陰陽微跌陽亦微獨少陰浮大必便

血而失精設言淋者當小便不利

跌陽脉弦必腸痔下血

病人肯滿唇痿舌青口燥其人但欲漱水不欲嚥無寒熱脉微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血當汗出不出內結亦為瘀血病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脉反無熱此為陰伏是瘀血也當下之下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠血也

平嘔吐噦下利脉證第十四

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治

跌陽脉浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不入其人即嘔而不得食恐怖而死寬緩即差

夫嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

先嘔却渴者此為欲解先渴却嘔者為水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲也問曰病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐

寸緊尺澀其人胃滿不能食而吐吐止者為下之故不能食設言未止者此為胃反故尺為之微澀也

寸口脉緊而芤緊則為寒芤則為虛虛寒相搏脉為陰結而遲其人則噎閉上脉數其人則吐

脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於

上醫反下之今脉反弦故名曰虛

跌陽脉微而澀微則下利澀則吐逆穀不得入也

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胃中冷跌陽脉浮而澀浮則為虛澀則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而澀其病難治

夫吐家脉來形狀如新卧起

病人欲吐者不可下之

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之

噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

夫六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五藏氣絕於

內者下利不禁下甚者手足不仁

下利脉沈弦者下重其脉大者為未止脉微弱數者

為欲自止雖發熱不死

脉滑按之虛絕者其人必下利

下利有微熱其人渴脉弱者今自愈

下利脉數若微發熱汗自出者自愈設脉復緊為未解

下利寸脉反浮數尺中自澀其人必清膿血

下利手足厥無脉灸之不温若脉不還反微喘者死

少陰負趺陽者為順也

下利脉數而浮一作渴者今自愈設不差其人必清膿血

以有熱故也

下利後脉絕手足厥冷晬時脉還手足温者生脉不

還者死

下利脉反弦發熱身汗者自愈

下利氣者當利其小便

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿其藏寒者當下之

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱

下利清穀必鬱冒汗出而解其人微厥所以然者其

面戴陽下虛故也

下利腹脹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表

下利脉遲而滑者實也利未欲止當下之

下利脉反滑者當有所去下乃愈

下利差至其年月日時復發此為病不盡當復下之

下利而譫語者為有燥屎也宜下之

下利而腹痛滿為寒實當下之

下利腹中堅者當下之

下利後更煩按其心下濡者為虛煩也

下利後脈三部皆平按其心下堅者可下之

下利脈浮大者虛也以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴當溫之

病者痿黃躁而不渴胃中寒實而下利不止者死

夫風寒下者不可下之下之後心下堅痛脈遲者為

寒但當溫之脈沈緊下之亦然脈大浮弦下之當已

平肺痿肺癰欬逆上氣淡飲脈證第十五

問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病從何得之

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從

便難數被駛藥下利重亡津液故得之

寸口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澀三焦踰

躡入而不出陰脈不澀身體反冷其內反煩多唾唇

燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚

腦但坐發汗故也

肺痿其人欲欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利

甚則脈浮弱

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所

以然者以上虛不能制下也此為肺中冷必眩多涎

唾甘草乾薑湯以溫其藏師曰肺痿欬唾咽燥欲飲

水者自愈自張口者短氣也

欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也

問曰寸口脉數其人欬口中反有濁唾涎沫者何也
師曰此為肺痿之病若口中辟辟燥欬則腎中隱隱
痛脉反滑數此為肺癰

欬唾膿血脉數虛者為肺痿脉數實者為肺癰

問曰病欬逆脉之何以知此為肺癰當有膿血吐之
則死後竟吐膿死其脉何類師曰寸口脉微而數微
則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼
氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風
舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時
時振寒熱之所過血為凝滯畜結癰膿吐如米粥始
萌可救膿成則死

欬而腎滿振寒脉數咽乾不渴時時出濁唾腥臭又

久吐膿如粳米粥者為肺癰桔梗湯主之

肺癰腎滿脹一身面目浮腫鼻寒清涕出不聞香鼻
酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

寸口脉數跌陽脉緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脉
浮緩胃氣如經此為肺癰

問曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故
此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何
以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在
腎中者為肺癰其人脉數欬唾有膿血設膿未成其
脉自緊數緊去但數膿為已成也

夫病吐血喘欬上氣其脉數有熱不得卧者死上氣
面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚上氣躁而

喘者屬肺脹欲作風水發汗則愈

一云欬而上氣肺脹其脉沈心下有

水氣也要畧千金外臺沈作浮

夫酒客欬者必致吐血此坐極飲過度所致也

欬家脉弦為有水可與十棗湯下之欬而脉浮其人

不欬不食如是四十日乃已十日云三欬而時發熱脉

卒弦者非虛也此為胃中寒實所致也當吐之欬家

其脉弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐之其

脉沈者不可發汗久欬數歲其脉弱者可治實大數

者不可治其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胃中

故也治屬飲家

問曰夫飲有四何謂也師曰有淡飲一云留飲有懸飲有

溢飲有支飲問曰四飲何以為異師曰其人素盛今

瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之淡飲飲後水流在脇下

欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而

不汗出身體疼重謂之溢飲欬逆倚息短氣不得卧其

形如腫謂之支飲

留飲者脇下痛引缺盆欬轉甚一云輒已

胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沈者

有留飲

夫心下有留飲其人背寒冷大如手

病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿

此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

病淡飲者當以溫藥和之

心下有淡飲胃脇支滿目眩甘草草一作遂湯主之

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之

支飲亦喘而不能卧加短氣其脉平也

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日或一歲可與十棗湯

膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出

目泣自出一作目眩

其人振振身瞤劇必有伏飲

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多心下水停甚

者則悸微者短氣

脉雙弦者寒也皆大下後喜虛脉偏弦者飲也肺飲

不弦但喜喘短氣

病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沈細非風也

必有飲在上瞧其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也

久又自差

一云冬自差

腹滿口苦乾燥此腸間有水氣也防已椒目葶藶大黃圓主之

假令瘦人臍下悸吐涎沫而癩眩者水也五苓散主之

先渴却嘔為水停心下此屬飲家半夏加茯苓湯主之水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿噎而痛

水在腎心下悸

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證第十六

脉數身無熱內有癰也

一云腹無積聚身軀作一本熱脉數此為腸有膿薏以附子敗醬湯主之

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發其癰

脉微而遲必發熱弱而數為振寒當發癰腫

脉浮而數身體無熱其形嘿嘿脊中微躁一作胃不

知痛之所在此人當發癰腫

脉滑而數數則為熱滑則為實滑則主榮數則主衛

榮衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

師曰諸癰腫欲知有膿與無膿以手掩腫上熱者為

有膿不熱者為無膿

問曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿為

下之則愈師曰寸口脉滑而數滑則為實數則為熱

滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上昇榮衛相干

血為濁敗少腹痞堅小便或澀或時汗出或復惡寒

膿為已成設脉遲緊聚為瘀血血下則愈

腸癰之為病其身體甲錯腹皮一作支急按之濡如腫狀

腸癰者少腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自

汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉


洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

問曰寸口脉微而澀法當亡血若汗出設不汗者云

何荅曰若身有瘡被刀器所傷亡血故也
侵淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口

者不可治

脉經卷第八



卷一