



重訂 增補

内科撰要

卷十八

洋学文庫
文庫8
C 27
18



增補重訂外科撰要卷十八

遠西玉函涅斯垓我爾德兒 著

宇田川玄隨 晉 譯

津山 男 玄真 璘 校註

加賀 藤井 方亭 俊 增譯

白帶下篇第六十 羅甸名コウコルア
和蘭名ワツテブルト

白帶下ノ大較ヲ論ス

婦人常ニ粘稠ノ白液ヲ陰處ヨリ漏泄シテ絶ス。或時
ニ是ヲ通泄シ。自後漸變ノ酷厲 其觸ル所侵
蝕スルヲ云 臭穢ノ液

白帶下



トナリ且種々ノ色アル者老少懷孕ニ論ナク是ヲ白
帶下ト曰フ

白帶下ノ分別ヲ論ス

白帶下ト分別スヘキ症四種アリ○其一ハ善性淋ナ
リ其液尿道ヨリ漏泄スルカ故ニ月經ト共ニ來ルト
雖モ自ラ分別アリ○其二ハ漏精ナリ是情欲妄動ニ
テ暫時是ヲ漏泄ス○其三ハ經血其常色ヲ失フナリ
故ニ月經ノ定期ニ是ヲ通利ス○其四ハ膿ヲ通ス。是
陰所ニ疼痛。或潰瘍アリテ其膿小水ト共通スルナリ
白帶下漏泄ノ所在ヲ論ス

白帶下ノ液漏泄スル處一ナラス○其一、腔ヨリ出ツ
故ニ孕婦ハ子宮口閉塞スト雖モ是ヲ漏泄ノ歎ヲナ
シ○其二、尿道ヨリ出ツ。此即淋疾ナリ○其三、子宮中
ヨリ出ツ。是子宮頸。或子宮裏面或喇叭管或卵巢ヨリ
滲泄ノ子宮内ニ聚出ルナリ。然レ孕婦ハ子宮口閉塞
スル故ニ孕メハ其漏泄自ラ止ム○其液ノ漏出スル脉
管三種アリ○其一、別烏爾私腺子宮及腔ノ裏面ニ布
蔓スル幾多ノ腺ナリ○其二、神經ノ末端弛開シテ一種ノ
潤滑スル者ナリ○其三、神經ノ末端弛開シテ一種ノ
液ヲ漏泄ス子宮及腔ニ布
蔓スル神經○其三、卵巢ヨリ出ツ。是常

二卵中ニ充ル所ノ精液ナレ氏今其常性ヲ失ハ漏泄
スルナリ○或子宮喇ハ管卵巢ヲ榮養スル所ノ良性
ノ液ヲ滲出ノ此白帶下ノ病トナル者アリ此液ハ精
動脈其諸器ニ循行ノ其血ヨリ分泌シ出ル者ナリ○
平常右ノ諸部ヨリ滲出スル諸液ハ其性皆柔和ニノ
侵刺セス白色ニノ稍粘滑ナリ。割烏爾私腺ヨリ出ル
液ハ粘液ノ如シ水脈及神經ノ端末ヨリ滲出スル液
ハ稀薄ニノ水ノ如シ○右ノ粘液滲泄ヌルヲ過多ナ
レハ變ノ水ノ如キ稀涼酷厲ノ液トナリ恰モ胃寒ノ
清涕漏泄ヌルカ如シ胃寒病ノ清涕觸ル所侵蝕狀
痛ス是稀涼酷厲ナル徴ナリ○

右ノ諸液其所ニ鬱滯シ或他部ニ轉移シ或其液ヲ
泌別スル諸器損敗スルハ其液常性ヲ失テ變壞シ
惡臭ノ酷厲毒トナリテ其觸ル處ヲ侵蝕シ或膿汁ノ
如ク或青黃黑色ノ液トナルナリ

白帶下ノ起原ヲ論ス

白帶下ノ起原一ナラス○其一子宮及腔ノ稟賦ニ因
テ自ラ其液ヲ漏泄スル者アリ○其二失苟兒陪苦經
閉崩漏流產難產房勞過度或寒冷ニ胃觸シ或浴湯過
度或溫湯ヲ過飲スル等ニ因テ子宮及腔大ニ弛緩ノ
虛弱シ括約衛固ノ力ヲ失テ溫液過多流溢シ此病ヲ

發ス○其三ハ瀉下劑。利尿劑。通經劑等ヲ過用シ此病
ヲ誘發ス○其四傷冷毒。子宮及腔ニ侵襲シ或其毒體
中各部ヨリ子宮及腔ニ轉移ノ此症ニ罹ナリ○或微
毒。子宮及腔ノ別ベル烏爾私腺注上ニニ滯著ノ此症ヲ發ス
ル一猶微毒ノ涕膜ニ滯著ノ涕液淋漓ノ症ヲ發スル
カ如シ

白帶下ノ諸症ヲ論ス

白帶下連綿暫留ノ歇サレハ次ニ說如キ諸險症ヲ發
ス○其一白帶下ノ漏泄止サルニ因テ百體ヲ榮養ス
ル所ノ良血液減損シ。患者肢體懈惰。憊弱。羸瘦シ或其

産兒尙儂病ヲ發ス○其二此荏苒タル漏泄ニ因テ血
液全熟化釀セズ。是ヨリ萎黃病。惡液腫ヲ發シ皮膚色
澤ヲ失ヒ。眼胞青輪ヲ見シ或子宮衝逆ニ罹ルナリ○
其三此病久ヲ經ハ全體ノ血液溶解ノ稀釋シ凝體諸
器。虛衰シ是ヨリ脚腫。粘液腫。眼下浮腫。子宮及卵巢ノ
水腫ヲ發ス○其四此病久治セサレハ子宮及腔弛弱
シテ下墜シ脱出ス○其五此漏泄專ラ神經ヨリ滲出
スル片ハ腰部冷テ疼痛ス。是子宮及腔ニ蔓延スル神
經ノ起原ハ腰ニ在ハナリ○其六此液。卵巢。子宮内。喇
叭管ヨリ滲出スル片ハ無孕或流産ヲ爲ス。是子宮口。

常ニ閉塞セス。且其部ノ胎兒ヲ資養スヘキ諸液腐敗スレハナリ。○其七、此漏泄ノ液酷厲ナルキハ是ヲ以テ陰所ヲ侵蝕潰爛ノ惡臭ヲ生シ或靜脉ヨリ其敗液ヲ喻收シテ全體ノ血液ニ混淆スレハ勞瘵熱ヲ發スルナリ

白帶下ノ治法ヲ論ス

治法ノ要唯其病原ニ蹤蹟シ。患部ヲ辨識シテ法方ヲ施スニ在リ。○第一、此病稟賦ニ得テ早歲ヨリ是ヲ患ル者ハ殆ト不治トス。○第二、子宮及腔弛緩虛弱ニシテ維持約ノ力ヲ失ヨリ發スル者ハ強壯劑。護膜劑。華爾

斯劑。乾燥劑。溫煖劑。萎黃病篇ノ健胃劑。壞液篇ノ寒壞劑。乾溫ノ良効アリ。症ヲ内服シ或外用。鉄泉類尤シテニ隨テ撰用スヘシ。○第三、汚液患部ニ流溢ノ浸淫スル一甚キヨリ發スル者ハ催睡劑ヲ用テ其轉輸ノ勢ヲ抑遏シ且發汗劑傷冷毒ニ出テ用テ其液ヲ皮表ニ發泄ノ治スヘシ。○第四、傷冷毒ニ因テ是ヲ發スル者ハ藥木ノ發汗劑薩撒弗刺斯。朴窟福烏篤。白檀。杜松木。土茯苓ノ類。ヲ用テ其毒ヲ發泄シ或打膿法名ヲ施メ是ヲ排除スヘシ。○第五、微毒ニ因ル者ハ先其毒ヲ驅除スルニ非ハ此病亦治スヘカラス。○第六、其漏泄ノ液酷厲ナルニ因テ陰所剝爛腫痛

搔痒臭氣アル者ハ尋常斯ノ如キ諸症ヲ治スル法方
ヲ施ノ是ヲ療スヘシ

注子宮及膻弛緩虚弱シ維持括約ヲ失フヨリ發ス
ル白帶下ハ左ノ方良驗アリ

方 **幾那硫秦散**

幾那 半錢

應的刺皮補 關ニ達ハ桂ヲ代用ス

秦皮 各一錢

硫黃精名 五十滴

右研末レ合レ散劑トシ。硫黃精ヲ和シ。指環ニ一

孕婦諸病篇第六十一

孕婦嘔吐ノ症治ヲ論ス

大約宛水ヲ以テ送下スル一日ニ三四次

孕婦ノ患症嘔吐ヨリ困難ナルハ方シ。是飲食ヲ吐ス
ルノミナラス僅ニ胃中ニ受容セル物モ其非常ノ運
動ニ因テ全熟化醸スル一能ハス。其甚ニ至テハ墮胎
スル一アレハナリ。○受胎後三月ノ間多此症ヲ患フ。
是其停止セル經血未タ悉ク胎兒ノ長育ニ資用スル
一能ハスノ剩餘トナリ。又其子宮ノ新夕ニ發スル非

常ノ運動ヲ胃ニ感觸シテ共ニ非常ノ運動ヲ發スレ
ハナリ○嘔吐桂苒トシテ分娩ニ至ルマテ止サルハ凶
候トス○分娩ニ瀕シテ嘔吐ヲ發スルハ難産ノ候ト
ス○右ノ諸症ハ健胃劑及催睡劑ヲ用テ是ヲ靜止ス
ヘシ但受胎ヨリ二三月中多血ノ候アリテ嘔吐ヲ發
スルハ刺絡ノ効アリ○嘔吐連綿ノ臨月ニ至リ或分
娩ニ瀕シテ始テ嘔吐ヲ發スルハ多血ノ候アレ氏刺
絡スヘカラス胎兒既ニ長大ナルカ故ニ血液饒多ニ
非レハ是ヲ資養スルヲ能ハス且分娩ニ臨テ惡露ノ
脫血アレハナリ

第三章

孕婦惡心ノ治法ヲ論ス

惡心及食進サル症ハ通例孕婦ノ多ク患ル所ニシテ
子宮ノ新ニ發スル非常ノ運動ヲ胃ニ感觸ノ發スル
前章説ク所ノ如ク且嘔吐ノ如キ劇症ニ非レ氏仍
是ヨリ飲食ノ化熟ヲ妨ケ胎兒ヲ養長スヘキ良血液
ヲ製造スルヲ能ハサル故ニ此症亦前章説ク所ノ方
法ヲ用テ是ヲ治スヘシ

第四章

孕婦異嗜ノ症治ヲ論ス

受胎後三月ノ間異嗜ノ症ヲ發シ平常嫌惡ム食物ト
雖モ嗜好スルヲアリ此症ハ其食シテ害ナキ物ハ許

與へし。但過食ヲ禁スヘシ。○若患者食シテ害ナル物
ヲ嗜スハ宜鎮嘔劑惡心篇嘔吐篇ニ出健胃劑善黃病篇不食篇
ヲ用テ其異嗜ヲ療スヘシ。然レ其嗜好太甚ナクハハ是
ヲ許與フヘシ。強テ禁絶スレハ此ニ由テ更ニ患害ヲ
生スルヲアリ。且此症大抵三四月ヲ過レハ自ラ治ス
レハナリ

第五章

孕婦便秘ノ治法ヲ論ス

孕婦ハ胎兒ヲ以テ直腸ヲ壓窄シ。動スレハ大便秘閉
ヲ患ルヲアリ。此症臨月ノ頃殊甚シ。然レ是ヲ以テ危
險ニ至ル稀ナリ。○但大便久直腸ノ上部ニ滯積スル

片ハ是ヲ以テ腸ノ括約縮收ノ機カヲ失故ニ時ニ輕
下劑ヲ與テ通利セシムルヲ佳トス。孕婦ハ峻下劑害
アレハナリ

第五章

孕婦腰痛ノ症治ヲ論ス

凡孕婦。殊初孕ノ婦人ハ子宮盈脹シテ腰部ニ繫著ス
ル所ノ腸間膜ヲ壓下シ或經血閉止スルニ因テ腰痛
ヲ發スルヲアリ。若其痛劇シケレハ眠ヲ妨ケ或是ヨ
リ諸部ニ感觸シテ幾多ノ患症ヲ發ス。○平素經血過
多ナル婦人。受胎シテ二三月ノ間ニ腰痛ヲ發スルハ
經血鬱積スル症トス。故ニ刺絡スレハ其痛大ニ寛解

ス○子宮盈脹シテ腸間膜ヲ壓下スヨリ發スル腰痛
ハ鎮痛劑崩漏篇ノ催
睡劑ト同シヲ用テ其痛ヲ止メ。又繃締ヲ腹
部ニ施シテ良効アリ。大抵臨月頃ニハ是ヲ以テ其胎ノ
重垂ヲ擡舉シテ尤良

產婦諸病篇第六十二

產後腹痛ノ症治ヲ論ス

產後。子宮空虚ニシテ弛緩シ其諸血脉收固ヲ失テ甚
夕膨脹シ其血是ニ凝聚シテ停止スルハ頻ニ腹痛
ヲ發ス。若繃締ヲ上腹ニ施スハ其痛殊甚シ。此症ハ

先上腹ノ繃締ヲ去リ。更ニ繃締ヲ全腹ニ施シ。是ヲ以
テ子宮ノ諸血脉ヲ維持シテ收固シ是ヲ治スヘシ○
或凝血。子宮ノ諸血脉ニ滯積シテ子宮ヲ壓迫シ腹痛
ヲ發スルアリ。此症ハ惡露。自ラ通泄スルニ因リ或
惡露ヲ驅泄スル劑即經閉篇ノ解凝下劑ヲ用テ治ス
及通經ノ方法ヲ云
ヘシ○或子宮毀傷。破裂。難產。若ハ強テ胞衣ヲ拽出ス
等ニ因テ腹痛ヲ發スルアリ。此症ハ緩和ノ蒸湯劑
ヲ施シテ是ヲ治スヘシ○或他部ノ病患。子宮ニ感觸
シ若ハ攣急ニ因テ腹痛ヲ發スル者アリ。此症ハ催睡
劑即鎮
痛劑ヲ用テ是ヲ靜止スヘシ

注我爾德兒君一書ヲ著シ產婦ニ繃帶ヲ施メ腹部
 ヲ緊攝固持メ大効アルヲ説ク其法疊綿布ノ濁
 全腹ヲ被フ可キヲ取り腹ヲ匝シテ繃縛シ緩急宜ニ
 適セシメ前部ニテ扎住ス半時若ハ一時ヲ經テ腹
 稍縮收シ繃帶弛緩スルキハ復是ヲ緊窄ス○崩漏
 ニ施ス一種ノ縛帶アリ此症ニ施シ亦良功アル
 前法勝レリ其法綿布ヲ以テ縛帶ヲ造リ紐ヲ著テ
 緊緩適宜ニ扎住セシメ宛モ男子兜肚和蘭人ノ衣服ニ用ル
卷ナリ其佩ル所ヲ見テ知ルヘシノ如クス然氏通例產婦ニ用ル縛
 帶ノ如キ臍以上ニ施スナク唯臍骨全少腹ヨリ

產後

陰所ヲ被フ許ニシ且動作ニ由テ上腹ニ舉ラサル
 爲ニ其下端ノ兩側ニ紐ヲ著ケ臀下ニ繞シ縛止ス
 ヘシ

產後惡露壅滯ノ症治ヲ論ス

分娩後惡露稀少或絶テ下ラサルヲ惡露閉滯ト名ク
 各其原由ヲ辨識メ治法ヲ施ヘシ○其一子宮ニ痙攣
 様ノ運動ヲ發メ牽縮スルニ因ル此症ハ子宮衝逆ノ
 病アリ若ハ物ニ感動シ易キ人或產後腹痛甚ク或驚
 駭等神思ノ感觸擾動ニ因テ子宮攣急メ牽縮スルヨ
 リ發ス故ニ速ニ鎮痙劑鎮痙散名或ハ痙攣描掣及催

睡劑前ニ注スヲ用テ是ヲ治スベシ○其二、寒氣ニ胃觸ノ
子宮内、血若ハ其諸血脉ノ血凝固シテ壅滯スルニ因
ル。此症ハ疏釋融解ノ蒸漏藥ヲ以テ腹部并ニ陰所ヲ
温蒸ノ是ヲ治スヘシ○其三、患者ノ精力虧損シ腹部
ノ纖維緩弛シテ充張健輸ノカナキニ因ル。此症ハ速
ニ適宜ノ縛縲ヲ腹部ニ施シ。強壯劑ノ藥液ヲ腹部ニ
貼シ強壯ノ効アル蒸露油、精等或、脫血過多ナラサル
者ハ通經劑ヲ内服スヘシ○其四、難産ニ由テ子宮若
ハ腔陰所ヲ毀傷シ及、焮腫スルニ因ル。此症ハ軟和劑
ヲ以テ患部ニ塗リ若ハ蒸漏スヘシ○其五、惡露閉滯

スルニ因テ他ノ諸竅ヨリ失血ヲ發シ或、下利シ其他。
通泄過多ナル者ハ先其通泄ヲ遏止シ然シテ腹部ニ
縛縲ヲ施スヘシ

惡露壅滯

惡露壅滯ノ諸症ヲ論ス

凡、惡露壅滯スレハ瘀血凝聚ノ子宮内或、其諸血脉中
ニ滯積シ。子宮及、腹脹痛シテ苦悶シ。大小便閉塞シ。是
ヨリ胃及、上腹ニ施及シテ諸險症ヲ發ス○其鬱積ノ
血腐敗スレハ時ニ惡臭ノ敗血ヲ下シ。是ヲ以テ子宮
腔陰所、侵蝕剝爛シ。或、其敗血ヲ大便ニ瀉下シ或、痔ヨ
リ迸出シ或、其他諸竅ヨリモ亦漏泄スルアリ○其

敗血全體ノ良血液ニ混淆スレハ勞瘵熱惡寒振慄肢體羸弱精力缺脫譫妄頭痛惡心嘔噦食不進咽喉焮腫萎黃病發熱搐掣子宮衝逆昏冒消耗汗腰痛呼吸促迫小便惡臭頭旋等ヲ發ス

惡露壅滯腐敗ノ治法ヲ論ス

惡露壅滯ノ症其原由ニ從ヒ療法ヲ施セ凡通利セス其血終ニ腐敗シ全身ノ血液ニ混淆スル者ハ仍宜ク勉強シテ是ヲ其常道ヨリ通泄スル法方ヲ連用シ其諸症ハ腐敗病ノ諸症ノ治法ヲ施シテ是ヲ治スヘシ壞液篇失苟兒陪苦篇等ノ治法ヲ云

惡露崩泄ノ症治ヲ論ス

分娩後若ハ流産ニ因テ崩血太甚ナル者是ヲ惡露崩泄ト名ク其原由ニ隨テ治法亦異ナリ○分娩後或流産ニ因テ血ノ凝塊若ハ胞衣ノ碎片崩漏篇畸胎ニ注ス等子宮中ニ殘留ル間ハ子宮ノ諸血脉口開哆シテ收閉スルヲ能ハス其血崩泄スルナリ此症ハ手術ヲ以テ子宮内ニ懸留セル物ヲ拽出シ然レ腹部ニ繃帶ヲ施スヘシ○產媪ノ手術麁暴ニ因リ或胞衣ヲ拽出スニ因テ子宮ヲ毀傷シ崩血ヲ發スル者ハ繃帶ヲ腹部ニ施シ且其血ヲ子宮中ニ凝結セシメサル爲ニ緩和ノ

蒸劑ヲ以テ少腹及陰所ヲ蒸濕スヘシ○諸般ノ内因ニ由テ血ノ運行増盛シ或熱性香竈ノ劑慄悍銳烈ノ飲料ヲ用ヒ或利尿劑通經劑等ヲ過服スルニ因テ崩血ヲ發スル者ハ先右ノ諸件ヲ歇メ然シテ熾衝ヲ治スル劑熱病篇清涼飲ノ類及催睡劑ヲ用テ治スヘシ○患者血液稀薄及凝體諸部弛弱ノ候アリテ此症ヲ發スル者ハ宜ク強壯劑ヲ用テ是ヲ治スヘシ○腹部ノ括約收固ノ力ヲ失ヒ或季肋上腹ノ部ヲ緊紮スルニ因テ靜血脈ノ血上輸復行スルヲ能ハズシテ下部ニ鬱滯シ崩漏ヲ發スル者ハ速ニ其上腹ノ縛帶ヲ去リ強壯藥

ヲ腹部ニ外敷シ治スヘシ

惡露崩泄

諸症ヲ論ス

產後惡露過多ナレハ血液減損シ全身衰弱黧澹灰白色厥冷頭旋昏冒脉小弱ニシテ數搗掣子宮衝逆或ニ觸テ感動シ易等ノ症ヲ發ス若是ニ自性ノ壞液ヲ兼レハ萎黃病水腫粘液病顛振羸瘦熱勞瘵譫妄其他神思變動ノ症ヲ發ス

惡露崩泄

治法ヲ論ス

此症ハ先其病原ヲ考索ノ治法ヲ施スヘシ其原ヲ除治スレハ子宮自ラ縮收シ崩血隨テ治ス然ラスニテ唯

陰所ニ就テ是ヲ閉止セントスルハ錯誤トス

產後乳房痛ノ症治ヲ論ス

產後初テ乳出ル時動モスレハ乳房腫痛硬結ス。此症ハ徐々ニ摩シ。且數乳ヲ吸出サシメ或軟化ノ効アル

蒸溺藥ヲ施ノ是ヲ治スヘシ

產後發狂ノ症治ヲ論ス

產婦ハ臨產ノ脫血及惡露過多ニ因テ虛憊シ發狂スル者アリ此症ハ揮發強壯劑ヲ用テ治スヘシ此猶遷延熱病後或羸弱虛損ノ人其他遷延頑滯ノ諸病ニ於テ發狂スル者ハ強壯劑ヲ用テ治スルカ如シ

〔註〕產婦ノ發狂ハ虛損ヨリ來ル者甚多シ是ヨリ危險ニ至リ數日ニノ死シ或頑滯ノ治セサル者アリ此症ハ左ノ劑屢治驗ヲ得タリ

壯神昆設爾弗

鹿角鹽名 半月或十五氏

幾那名 半刀

薄荷昆設爾弗名 少許

右煉和ノ一服トシ朝夕一服宛用テ八日○此劑用ニ臨テ作ルヘシ鹿角鹽消散スレハナリ○患者幾那ヲ嫌惡ナキ者ハ其服量ヲ適宜ニ增加テ良効

アリ

產後下利ノ症治ヲ論ス

分娩後六七日ノ間ニ下利ヲ發スレハ患者大ニ虚脱スル故ニ此症甚危篤トス。動モスレハ是ヲ閉止シ難ク救レサル者アリ左ノ劑此症ニ用テ屢奇効アリ

收斂幾那糕

幾那 細末

阿煎藥 細末 各三錢

玫瑰舍利別 名 適宜

右煉和シ。粟大ヲ取半時毎ニ服ス○患婦是ヲ服ス

ル₁能ハサル者ハ劑中ノ舍利別ヲ増テ匙數ト爲シ。半時毎ニ三匙若ハ四匙ヲ用ヒ或ハ分時毎ニ一匙ヲ與ヘシ。是暫時ニ分量多服セシメニカ爲ナリ

病屬皮表

痘瘡篇第六十三

羅甸名バリヲラ
和蘭名ギンデル
キース

痘瘡ノ大較ヲ論ス

痘瘡ハ初發替留熱ノ如ク惡寒戰慄シ。次テ發熱シ替留スル₁三日。或ハ四日。其後紅點ヲ見ス₁顔面ニ始テ遍體ニ彌延シ。漸ヲ以テ皮上ニ起脹シ。其次序ニ順

增訂月斗集

卷一

ヒ大抵第七日ニ至テ皆膿疱トナリ。第十一日ニ至テ收靨シ。漸ク斂結シテ第十四日ニ至テ盡乾痂ヲ成スナリ

痘瘡ノ察法ヲ論ス

初熱ノ時未タ小疱紅點ヲ發セサル間ハ他病ノ熱ト辨別シ易カラス。然レ大率是ヲ察スルニ第一世間一般痘瘡流行スルヲ以テ察シ。第二此疾ニ罹ルヘキ年齡ヲ以テ察シ。第三其人痘ヲ患者ノ側ニ在リシヲ以テ察シ。第四一歳ノ中痘ノ起伏衰旺ノ時アルヲ以テ察シ。第五痘ノ初發尋常ノ病ト異ナル一種

第三百八十章ニ出

痘ノ順逆ヲ論ス

ノ諸症アルヲ以テ是ヲ察スルナリ

此疾春月ニ發シ見點シテ初熱解シ。夫ヨリ漸次ニ起脹シ。總テ險惡非常ノ諸症ヲ見スナク。傳變ノ次序第三百七十五章ニ舉ル如キ常例ノ時ニ差フ^カ無シ是ヲ順痘ト名ク。○或此疾ニ罹^カテ冬月ニ發シ傳變ノ次序常例ヨリハ速ニシテ皆短促シ。若ハ慢緩ニシテ時ニ後レ。或險重ノ諸症ヲ發スルハ是ヲ逆痘ト名ク

痘ノ稀稠ヲ論ス

痘疹論

痘疹論

凡痘發見シテ兩三個連串スルヲナク。各顆分間稀疎。界地分明ナル者はヲ稀痘ト名ク。○痘發スルヲ夥シテ稠密相接シ。或渾然トシテ隙地ナク叢簇シテ一大斑ノ如クナル者はヲ稠痘ト名ク。

痘ノ病原ヲ論ス

痘瘡ノ由來スル所三因アリ。其一ハ人ヲシテ一般此疾ニ罹シムル所ノ天行ノ毒氣ニ因リ。其二ハ痘ヲ患ル人ニ就テ傳染スルニ因リ。其三ハ種痘法ヲ施スニ因テ是ヲ發スルナリ。此三因ノ一無シテ此疾ニ罹ル者殆ト稀ナリ。

痘起

痘起伏衰旺ノ時アルヲ論ス

痘ハ大抵春月晝夜等分ノ頃ニ起リ。春末夏初ヲ以テ漸旺盛滋蔓シ。秋ニ至テ衰へ。冬ニシテ伏止ス夫ヨリ又春ニ至リ再起ルヲアリ。○然レ冬末ヨリ起ルハ大抵逆痘ニシテ且惡性ナリ。

痘年

痘ニ罹ル年齢ヲ論ス

痘瘡ノ疾タル大抵小兒ノ未此疾ニ罹ラサル者ニ患フ。大人ハ是ヲ患イ稀ナリ。若是ニ罹ルハ危險トス。此疾再患ル者亦稀ナリ。

痘毒

痘毒ヲ論ス

若體中ニ於テ生クノ機ヲ賊害シ及侵刺スル者アル
 片ハ假令竹木刺ノ纖細ナルカ如キモ必ス生氣ノ運行
 ヲ奮起増發シテ是ヲ排出シ或制服シテ平全ノ故ニ
 復スルナリ。是生活ノ身體ニ具ル自然良能ノ常道ナ
 リ○若右ノ如ニシテ容易ニ其毒ヲ制服スルヲ能ハ
 サル片ハ輒諸液ニ具ル所ノ自然ノ良能亦カヲ戮セ
 テ相共ニ營救シ更ニ一箇ノ液ヲ製造シテ其毒ヲ包
 攝圍繞シ誘導シテ是ヲ驅除スルナリ。此液。是ヲ膿ト
 謂フ第四章熱病ノ毒ヲ論スル條ト併考フヘシ○若其賊害スル毒ノ性。生
 氣ノ元カヲ以テ能揮散發越スルヲ得ヘキ者ハ初

ニ其運行ヲ増發シテ發熱ヲ云是ヲ揮發シ。其毒ヨク揮發
 シテ既ニ皮表ニ排泄シ去片ハ其増發セル運行漸靜
 止シ。其賊害スル毒更ニ膿ヲ成スシテ盡消散スルナ
 リ麻疹ノ如キヲ云○然其毒甚膠粘ニシテ生氣ノ運行ヲ
 以テ是ヲ揮散スルヲ能ハサル片ハ亦初ニ生氣ノ運
 行ヲ増發シ次テ諸液ノ良能ヲ藉テ更ニ膿ヲ釀成シ。
 兩箇ノ常道カヲ戮セテ其毒ヲ膿中ニ包攝圍繞シ。是
 ヲ驅除スルナリ痘瘡ノ如キヲ云○右ノ如クニシテ盡其毒
 ヲ驅除シ去ヘキ症ハ其傳變ノ次序順正ニシテ定期
 ニ差フヲ無シ。然其毒過多ナルカ或毒ノ性惡厲ナ

ルカ或生氣ノ運行。其毒ヲ驅除シテ善績ヲ成スヘキ
 度ニ越テ大過強盛ナルカ或是ニ反シテ微弱不及ナ
 ルカ。此ニ一モアレハ必、非常ノ諸症ヲ發現シテ危險
 ニ至リ或傳變ノ次序緩慢ニシテ定期ナク或他病ニ
 變シ或死ス。其變症茲ニ盡舉ントス。ハ甚繁長ニ涉
 ルカ。故ニ只其中ニ就テ較著ノ諸症ヲ論シ。學者ヲシ
 テ是ニ據テ其他ヲ推擴シテ辨知セシム

痘ノ善惡ヲ論ス

順痘ハ初熱ヨリ第四日ニシテ先面部ニ紅點ヲ發シ。
 每疱隙地アリ。次テ全體ニ彌蔓シ第七日ニ至テ面部

痘論全章

彼此ニ膿ヲ釀シ。始、白シテ漸、黃色ヲ帶フ第十一日ニ
 シテ始テ乾キ收靨シテ痂ヲ結ヒ。第十四日ニシテ面
 部始テ落痂シ。次テ全體悉乾燥ノ落痂スルノ尚能、兩
 三日ヲ經ルナリ。○逆痘ハ大抵發出スルノ速ニシテ
 初熱ヨリ第二日或第三日ニシテ赤斑或水疱ヲ見ハ
 シ。灌膿スレハ或黯赭色或黑色ヲ見ハシ。疱平塌或頂
 黑點ヲ現シ。其他傳變ノ次序亦定期アルノナシ。○是
 ヲ以テ痘ハ遠ニ驅發スヘカラサルノ當ニ知ヘキノ
 傳變皆定期アリ。妄ニ驅發ノ劑ヲ用テ自
 然良能ノ妙機ヲ妨害スヘカラサルヲ云

痘間ノ隙地ヲ論ス

痘論全章

增訂內科綱要

卷十八

順正ノ善痘ハ痘間ノ隙地腫脹シ紅色ヲ帶テ玫瑰花ノ如シ○若發熱劇ニ因リ或熱藥ヲ與ニ因テ初ニ元運カヲ費耗シ罷弊スルヲ甚キキハ其痘猶能起脹シ或膿ヲ以テ充テアレハ痘間ノ隙地縱弛シテ黯澹色トナリ其痘起脹シナカラ死スルヲアリ

第二章

痘ノ發熱ヲ論ス

夫痘毒體中ニ在テ刺戟スル故ニ自然ノ良能是ヲ驅除シ去シカ爲ニ生氣ノ運行ヲ增益シ發熱スルヲ第三百八十二章ニ論スル如シ但其熱アル間ハ多ハ頭痛腰痛ヲ兼ヌ然ハ順痘ハ放點シ來レハ其毒皮上ニ

發越スルヲ以テ頭痛腰痛共ニ解散ス○其後膿將ニ熟セントスル時ニ當テ再微熱ヲ發ス所謂膿熱是其膿ヲ釀熟センカ爲ニシテ發スル者ナリ若其熱微ナルヘクシテ却テ劇盛ナルハ是其毒過多ナルカ或惡厲ナル候トス若熱解セス膿熱連絲暫留スルハ是生氣ノ運行ヲ增益シテ是ニ膺ルト雖モ其毒衆多ニシテ盡是ヲ制伏シ驅除スルヲ能ハサル候トス故ニ啻ニ危候タルノミナラス其連絲暫留スル壯熱大過ノ運行ニ因テ體中ノ諸器血液毀壞シ精力虛脱シテ其膿ヲ成ス時ニ方テハ皆變シテ腐敗液トナリ究竟其毒ヲ

驅除スヘキ餘カヲ遺スナキニ至ルナリ

痘ノ播擲ヲ論ス

小兒ノ體ハ甚感動シ易クシテ播擲ヲ發スルヲ其生齒ニ於テモ是ヲ知ルニ足ル小兒齒ヲ生スル時斷ノ皮厚キ者ハ齒透出シ難クノ動スレハ壯熱吐瀉但痘ノ未發出セサル時播擲ヲ發スルハ危症ニ非ス見點以後是ヲ發スルハ大抵痘丹攻ノ候トス或見點スレト播擲仍止サルハ痘毒體中ニ殘テ未盡發越セサル候トス○大人ノ痘ニ播擲ヲ發スルハ危症トス小兒ハ感動シ易シテ播擲ヲ發スレト大人ハ否スノ特是ヲ發スヘキ大ナル病因アレハ

ナリ增註初熱ニ播擲ヲ發ノ休マサルハ胃中汚物鬱滯ノ發スル者アリ此症ハ輕吐劑ヲ與テ粘痰ヲ吐セシムレハ治ス羅

痘ノ謔妄ヲ論ス

少年輩及壯實人痘ノ初熱若ハ見點ノ始謔妄ヲ發スルハ是生氣ノ運行強盛ニノ腦ヲ攪擾スル候トス宜刺絡及下劑ヲ用テ是ヲ抑制スヘシ患者其劇盛ナル運行ニ堪スシテ死スルヲアレハナリ○灌膿ノ時謔妄ヲ發スルハ痘毒腦中ニ上攻シタル候ニノ大抵死ヲ免レス此時ニ於テハ刺絡下劑亦功ナシ增註初熱危險ナラス清涼劑吉利詞爹兒ヲ施ノ熱解スレハ此症自ラ休ム灌膿ニ是ヲ發スルハ惡症トス後ニ舉ル

痘毒

膿熱ノ治法ヲ用テ
是ヲ療スヘシ

痘ノ下利ヲ論ス

痘瘡ハ津液ヲ皮表へ驅發スルノ多キカ故ニ大便秘
閉ヲ常例トス。故ニ下利ヲ發スルハ甚害アリ但小兒
ハ大人ニ比スレハ害鮮シ大人ハ小兒ニ比スレハ津液少キカ故ナリ○若
寒冷ニ感シ或痘ノ勢攻ニ因テ下利ヲ發スルハ殊ニ
危険トス○若膿ヲ釀スル時ニ當テ下利ヲ發スルハ
最危険トス。是其内攻ノ徵トスルノミナラス其毒變
シテ腐敗液ト爲ル候ナレハナリ痘毒ハ善膿トナリ
常トス。然ルニ其毒惡厲ニシテ良血液ヲ毀壞シテ盡ク
腐敗液トナラシム。是ヲ以テ自ラ焔解洩崩シテ下利

此症ハ第四十九章ニ舉ル發汗劑ヲ用テ勉テ

其毒ヲ皮表ニ驅發スヘシ增註初熱見點灌膿下利
益アリ然レ膿様ノ汚物ニ血ヲ交テ瀉下シ或黑物ヲ
下シ腹滿ノ疼ヲ兼テ下利○或腹滿スルハ腸中寒積
ヲ生スル候ニ死症トス○或利カス益病者アリ故ニ
善痘ノ下利ハ速ニ閉止セハ利ケル甚ケル病者ニ由テ
除スルハナリ然レ初熱ニ下利ハ甚ケル病者ニ由テ
ク故ニ見點下利劇者ハ大黃劑ヲ抑テ發出テ妨
見熱ノ初下利止ス者ハ大黃劑ヲ抑テ發出テ妨
厲毒ヲ緩和シ閉止ス者ハ大黃劑ヲ抑テ發出テ妨
濾テ滓ヲ去リ右煮テ或左少許ト麥粉適宜ニ加テ
其方左乳汁ニ的里亞加少許ト麥粉適宜ニ加テ
ノ末ニ肉豆蔻或桂末少許ト麥粉適宜ニ加テ
以後下利甚キ者ハ龍腦阿芙蓉ヲ散劑トシ用ヒ或幾那

此言... 羅

ヲ用テ是ヲ止ヘシ

痘ノ血症ヲ論ス

少年輩痘ノ初熱血症ヲ發シ。殊大熱脉強。頭部鼓動シテ痛。或譫妄ヲ兼ハ多ク利益アリ。然氏灌膿ノ時或其後血症アルハ害アリ。或婦人ニ於テ第十一日ニシテ月支適來ルハ則予其死症タルヲ知ル。是血ノ腐敗シ崩壞シテ脫泄スル徵ナレハナリ。是故ニ縱其血ヲ閉止スト雖モ仍其患者ヲ保全スルヲ能ハス。增註初血ハ利益アリ然氏其刺クノ脉微弱ナル者ハ是ヲ止ハシ其方明礬ヲ雞子白ニ研和シ之ニ塗テ鼻中ニ挿シ其血止ト雖モ自ラ脱落スルテ是ヲ拔去スルハ利益アリ

痘ノ治法ヲ論ス

痘ノ治法ハ第七章ニ論スル熱病ノ治法ト同一一般ナリ唯其消毒法ヲ闕テ用サルノミ。○是ヲ以テ唯第十章載所ノ自然治法ニ從テ是ヲ治スヘシ。乃チ元運生氣自ラ強盛ナル運行ヲ發シ其勢力ニ因テ痘毒ヲ皮表ニ驅發シ更ニ膿ヲ釀シテ其毒ヲ包攝シ順序定期アリテ盡是ヲ驅除シ。平全ノ故ニ復スルヲ是自然良能ノ治法ナリ。故ニ其自然ニ本キ良能ヲ助テ善功ヲ成シメニカ爲ニ若初熱ノ時生氣ノ運行大過壯熱刺盛ニシテ是ニ由テ必損害アラシクテ慮ル者ハ刺絡シ

曾下... 卷十八

テ瀉血シ又第十二章ニ舉ル清涼飲ヲ用ヘシ第十二
行大過ノ諸症ヲ然レ其中ノ下劑ハ除ヘシ其故ハ患
論ス併考ヘシ者以前ヨリ大便壅閉或腐敗ノ汚物胃若ハ腸ニ鬱積
スル徵候ヲ得ルニ非スシテ是ヲ用レハ徒其浸潤滋
養ノ津液ヲ腸中ニ引泄シテ亡脱スレハナリ然レ若
腐敗ノ汚物鬱積ノ徵候ヲ見ス者ハ初先是ヲ滌除ス
ルヲ肝要トス○或第十三章ニ論スル如キ生氣ノ運
行不及微弱ニシテ其轉移ノ次序甚緩慢ニノ遲延ス
ヘキ諸候アル者ハ即同章ニ舉ル所ノ溫暖劑ヲ用テ
諸症ヲシテ常例ノ時日ニ後レス順序定期ヲ以テ發

セシムヘシ○灌膿ノ時發スル熱熱膿ハ刺絡及下劑ヲ
以テ制止スヘキニ非ス唯宜第百十三章ニ舉ル如キ
輕催睡藥ヲ用テ其大過ノ運動及不寐ノ症ヲ靜止ス
ヘシ○平穩ニシテ危懼ナキ催睡藥ハ阿芙蓉液製法
第十三章四滴許或白罌粟舍利別製法第五十
二出テ一服トシ大麥煎其他適宜ノ飲液ニ加ヘ一時毎ニ
與ヘシ其寢息スルヲ能ハサル患者ヲシテ能安靜ナ
ラシム小兒ハ其服量ノ三四分一ヲ取テ一服トスヘ
シ○凡發現スル諸症ニ就テ生氣ノ運行大過強盛ニ
屬スルカ或不及微弱ニ係ルカヲ能熟察ノ自餘ノ法方

フ處スヘキ一肝要ナリ
刺絡清涼下劑ヲ用テ抑
利詞參兒ヲ施ヘシ是ニ由テ痘能發出ス
痘快發シ難キ症ハ次ノ見點治法ヲ施ス
痘眼喉痘ヲ防テ多下部ニ發出セシムルニ
脚ニ貼シ結痂マテ乾愈セサ
レハ極テ驗アリ見點患者虛弱痘發出シ難ク起
セスハ攻スヘキ症ハ龍腦雜腹蘭ヲ用テ接骨花
多與ハ功ナキ者ハ幾那ヲ用テ充張スヘシ險痘劑
暈脚灰白行漿ノ黃熱セス或青紫點黑等ナリ此候
ル症ハ起脹ノ始ヨリ幾那ヲ用テ紫點見熱解セ
效嗽甚キハ肺喉ニ發トス刺絡ノ痛編ノ後熱解
効アリ灌膿膜熱ノ諸症劇キハ難キ症ハ脚ニ發
酷厲毒ヲ緩解シ或玫瑰幾劑ヲ少許宛別ヲ與テ
熱止渴防腐ノ効アリ玫瑰幾劑ヲ少許宛別ヲ與テ
通泄ス半時或一時間ニテ宛飲液ニ壞液ヲ小龍
外攻ハ手脚ニ發泡膏ヲ貼シ吉利詞參兒ヲ甘施シ忽布

滿鎮痛液名雜腹蘭龍腦幾那ヲ用ヘシ○結痂ノ時惡
症ヲ發スル者ハ下劑ヲ與テ其毒ヲ驅泄シ玫瑰丁幾
劑幾那等ヲ前說ノ如ク用ヘシ

痘ノ看待攝養ノ法ヲ論ス

醫家痘ノ看待調護ヲ論スル一一定ナラス。或牖戸ヲ
閉チ衣被ヲ厚シ患者ヲシテ鬱蒸セシムルヲ佳トシ
或專ラ爽涼ナラシムルヲ良トス。是鬱蒸スレハ痘ヲ
腐敗セシメテ大害ヲ致セハナリ故今鬱蒸ノ說ヲ廢
セリ○然レ縦ニ冷氣ヲ犯スハ害アリ。見點ノ前若ハ
猶見點スル時冷氣ヲ受ルハ害少シト雖モ灌膿ノ時
ニ於テハ其害殊甚シ是其毒皮表ニ排泄スルヲ阻遏

シ且是ニ由テ痘ヲノ内攻セシムレハナリ。故ニ過不
及ナキ温煖ヲ斟酌シテ保護スルヲ良トス。○牖戸ヲ
開テ新氣ヲ引キ衣服衾蓐ヲ更ルニ於テハ諸說大ニ
異同アリ然レ其室ニ鬱閉セル傳染ノ穢氣ト其汚
セル舊衣衾ハ痘ノ腐敗ヲ助進ル。固ヨリ論ナキ故
ニ宜新鮮清爽ノ氣ヲ迎納レ新淨ノ衣ヲ更テ鬱陳汚
敗ノ氣ヲ除ヘシ。然レ灌膿及收靨ノ時ニ於テ新氣ヲ
引舊衣ヲ更キハ殊戒慎ヲ加冷氣ヲノ裸體ニ中ラシ
ムルヲ勿レ。是ニ由テ表發ノ蒸氣ヲ抑遏シ或其毒ヲ
内攻セシムレハナリ。○痘ノ危症多クハ血液府

ルヨリ起カ故ニ凡肉ヲ以テ調製シタル食物ヲ禁シ
只粉麩類及園菜蔬根ヲ調和シタル物ニ多飲液ヲ加
テ與ヘシ

醫言九十章

稠痘ノ症治ヲ論ス

稠密ノ痘ハ其毒過多ノ徵トシ且腐敗ニ進ム。稀痘
ヨリ多ク且速ナリ故ニ殊戒慎ヲ加精細ニ意ヲ用テ
治ヲ施スヘシ。初發ハ治法復異ナル所ナシ但第七八
日ニシテ多ハ面部頸項大ニ腫脹ス若涎唾流泄シ難
キ程ニ膠粘ナル片ハ大抵見點ヨリ第十一日ニテ連
綿シテ止サル者ナリ其腫脹及涎唾ハ右ノ日數ニテ

連綿スルヲ宜トス若俄ニ腫消シ涎止片ハ上ニ説如ク催睡藥ヲ用レシ是ニ由テ腫脹及涎唾再發起スルナリ腫消シ涎止ハ酷厲毒多クノ神經ヲ刺戟シ病毒復ノ内托排泄ヲ妨ク故ニ催睡藥ヲ用テ神經ノ罷弊ヲニ充ツトナルハ是皆腐敗ノ徴ニシテ甚惡症トス故ニ最戒慎シテ是ヲ療スヘシ若涎唾稠厚ニシテ咽喉窒塞スル者ハ生蘿蔔汁ニ蜂蜜消石錠名各少許ヲ調和シ是ヲ以テ口中ヲ灌漱スヘシ

麻疹篇第六十四

羅甸名「モルビル」和蘭名「マッセレ」

麻疹ノ大較ヲ論ス

麻疹流行ノ起伏衰旺患者ノ年齢及諸症候等大抵痘瘡ト一般ニシテ初發ニ於テハ辨別シ難シ但其發見スルニ及テハ痘ハ疹ニ比スレハ差硬クシテ隆起シ且麻疹ハ痘ノ灌膿ノ頃大抵第八日頃其熱ト共ニ消散シ唯皮上ニ糠秕ノ如キ痂屑ヲ遺ノミ

麻疹ノ病原ヲ論ス

麻疹ノ毒亦生々ノ機ヲ賊害スル者血中ニ混淆シテ是ヲ發スルヲ第三百八十二章ニ論スル痘瘡毒ノ如シ然レ生氣ノ運行ヲ以テ是ヲ皮表ニ驅逐スル片ハ

麻疹論

其毒能揮散發越スルヲ得テ徑ニ消散シ。自然ノ良能更復膿ヲ製シカヲ戮テ排泄スルヲ須サルナリ故ニ其毒ノ體中ニ在間ハ生氣ノ元運是ニ齎敵シテ其運行ヲ増發スト雖モ其毒消盡シ身體賊害ヲ免ニ從テ其運行漸ク靜止シ熱解シテ其常ニ復スルナリ

麻疹ノ治法ヲ論ス

麻疹治法更ニ深思遠慮ニ及ハス唯其生氣運行ノ大過不及ヲ視テ過_タ強ナラシメス已_タ弱ナラシメサルヲ標準トシ以テ是ヲ將息スレハ則能_ク克畢ル。又從テ其血液ノ腐敗ヲ助ル飲食攝養ヲ禁戒スルヲ痘瘡

篇中說所ノ如クスヘキノミ

增補重訂内科撰要卷十八 大尾



書賈

江戸淺草茅町三丁目

須原屋伊八

浪華心齋橋通北久太郎町

河内屋儀助

同心齋橋通唐物町

河内屋太助

京三條寺町西入町

丸屋善兵衛



