

元戎

五

内閣文庫	
番號	漢 12421
冊數	12 (5)
函號	300 216



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

醫聖元戎
卷第五

少陽證

人傷寒同一法

易簡小柴胡湯

易簡逍遙散

文潞公茱萸湯
李方

柴胡桂枝乾姜湯

深師黃芩湯

易簡溫膽湯

許學士地黃丸

統





錢氏地骨皮散

四順飲子

大柴胡湯

易簡參蘘飲

易簡降氣湯



金匱大薯蕷丸

外臺秘要仲景病源小品方

龍胆雞蘇丸

黃香膏子煎丸

地骨皮枳壳散

黃龍湯

柴胡鱉甲散

王氏秦艽散

生犀散

活人妊婦傷寒加減例

不老丹例

不老丹散

又方

又方

遂凡丹

治瘰癧方

消癭丸

治瘤氣癰起

五香連翹湯

治癰鱉鱉丸

孫尚菜方

青蒿散

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蛎湯

小柴胡去半夏加枳實湯

柴胡桂姜湯

九轉靈砂丹

又方

海藏瘰癧論

通脈四逆散

小柴胡湯議論

古胎滑門

三焦熱用茶大例

卷第六

三陽拾遺例

海藏通聖散一作評議 談論

韓氏微旨論和解因時法

調脈湯

葛根柴胡湯

人參桔梗湯

薄荷湯一作奠

防風湯

香薷湯一作芎

六物大黃湯

七物柴胡湯

發表湯

人參湯

石膏湯

解肌湯

芍藥湯

知母湯

韓氏十茶定註

仲景瓜蒂散例

仲景瓜蒂散

宋氏仲景針法噀茶瓜蒂散

勝金丸

瓜蒂散

三聖丸散

經驗方

外臺時後方

又方

鈴

病
疰

仲景治百合例

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子湯

百合洗方

百合地黄湯

百合滑石湯

百合栝蒌牡蛎湯

海藏百合四君子湯

痔原小兒葶藶湯

栝蒌實湯

千金翼五苓散

耳中傷心湯

陽旦湯

海藏十餘證并并茶

牙齒例

陳希夷神仙刷牙茶
廣香間玉散

犀角升方湯

梧桐淚散

丸

升方方

白牙齒茶

又方升方散

三聖散

治齒根宣露動搖方

治牙齒脫落
牢不方

簡要方

二十八宿散

草檉散

擦牙茶

立効散

益神散

返老還童丹

古今巴豆例

仲景備急丸

仲景白散

仲景飞尸走马汤方
黑神丸

扶元丸
酒癖丸

神志丸
青娥丸

红粉丸
解毒雄黄丸

玉霜丸
活人黑神丸

钱氏茶霜丸
感志丸

神志丸
局方感志丸

简易感志丸
五脂丸

木香五灵脂丸
三倍丸

解毒丸
软红丸

比金丸
青娥丸

柔金丸
导气丸

安中丸
透罗丹

温白丸
易老活五积

万病感志丸
万病紫苑丸
全注

春安万志丸
小广香丸

神保丸

治

醫聖元戎卷第五

趙州教授兼提舉管内醫學王好古進之笈次

少陽證一先足經從湯液 次手經從雜例

據目錄方當是法

海藏論男子婦人傷寒同一方一作法

活人云婦人傷寒治法與男子不同舉男子調

氣女子調血以為大異畧舉脈緊脈緩脈洪為

傷寒傷風熱病為一證當行當下不必調而血

後行仲景不分男女良以此歟此論然當猶

為未也仲景聖也世醫所知仲景不知有

是理乎聖人和物賢者述之事可以為天下

叙

青沿肯

榮

脾腎作脾臍舊
人蘇筆標記脾作腰

則聖人已據之矣。何得世人明之乎。聖人言不以其男子同診也。後人不知湯液之源。故立原作聽似非為婦人法。則異於男子。常人取易聽明眼者。肯以此為是乎。然以藥考之。則可知也。惟令桂枝芍藥固本而開衛。非血藥如何。廣黃防風。雖為之。然行本治乳子餘疾。非血藥如何。白虎小柴胡中。知母則治腎。柴胡則調經。皆氣中之血藥也。當飲地黃。不言可知。為血藥。白朮人參。皆以為氣劑。本草言能利腰臍腎。同血非。血藥平。太抵用之。在陽。便是氣藥。用一

之在陰。便是血藥。若男子與女人。傷寒皆榮衛受病。其證一也。何必云男先調氣。女先調血也。此二句。雲收子以為治雜病法之常體。非為傷寒設也。其所以異者。以其仕衛盛而百子。月事行有期。有熱入血室。一證。不得不異也。在妊孕。不得不保。在經血。不得不調。表裏汗下。何嘗有異也。每汗下。藥中增損。自有調保之義。活人云。妊娠不用桂枝。板半夏。桃仁。柴胡湯。減半夏。為黃龍湯。是則是矣。必竟畜血極。而隣於死。頃抵當湯。九則安。得不用一作也。

輕身毒

是減劑從輕可也故黃帝云自重去之何如
岐伯曰有故無損亦無損也大積大聚可輕
犯也衰其大半乃止過者死此取以有從輕
之美活人注中舉似其言甚當仲景不言男
子婦人有異其意蓋由諸此以知桂枝半夏
桃仁可用處必用不可全無但當從輕則可
以保安丸中有桂一有棧字附子附子曠皆墮胎之劑以其
數多之中些少是亦從輕而無妨也又為引
用必須少而不可無也大意如此後之君子
更宜詳定保劑多破劑少破者從其保破劑

牛膝

多安劑少安者從其破此理不可不知一又
寒熱多少例寒者多熱者少熱不為之熱熱
者多寒者少寒不為之寒
此婦人之病多在經血不調故婦人傷寒一
條例少陽條下

仲景小柴胡湯

治往來寒熱胸脘痛而耳聾或咳或嘔尺寸

脈俱浮而弱

柴胡 三兩 人參 半夏 黃芩 甘草

按人參以平兩數

亦

右以咀、半夏、東煎、本經加減之法、此方又

雜病

治瘧、与經、癰、中外不相及

及微非

雜病寒熱往來

經水不調、加秦艽芍藥當歸、知母、地骨皮、牡

丹皮、川芎、白朮、茯苓、去半夏、治婦人虛勞

發熱、如蛤蚧、赤茯苓、小柴胡湯、与四物湯

各半、一名調經湯、無孕吐者、加半夏、亦可

无汗者、加柴胡、惡寒者、加桂、有汗者、加

地骨皮、嗽者、加紫苑、通經、加三稜、廣茂

勞者、加鱉甲、

又小柴胡、後加減法、若胸中煩、不吐者、去半夏

人參、加枳實、二枚、若渴者、去半夏、加人

參、合煎、成四兩半、括蕁根、四兩、若腹中痛

者、去黃芩、加芍藥、三兩、若腹下痞、鞭者、去

大棗、加牡蠣、四兩、若心下悸、小便不利、去

黃芩、加茯苓、四兩、若不渴、外有微熱、去人

參、加桂、三兩、溫覆、取微汗、愈、若嗽、去人參

大棗、生姜、加五味子、三兩、乾姜、二兩、血弱

氣盡、暎理、開邪氣、因入、與正氣、相搏、結於胸

下、正邪分爭、往來寒熱、發作者、時然、不欲

飲食、臟腑相連、其痛必下、邪高痛下、故便吐

使有開

也、小柴胡湯主之

易簡小柴胡湯

過

治傷寒溫病身熱惡風頸項強胸滿眼痛煩渴吐噦小便不利大便秘艱或通鍾未解潮熱不除非汗非下之證並宜服之及產後勞復發熱頸疼往來寒熱及婦人傷寒經水適來適斷發熱發寒晝則明了夜則譫語此為熱入血室則血必結故使寒熱如瘧狀此藥主之小兒溫熱悉能治療

柴胡二兩 半夏 黃芩 人參 甘草 各二

右以水一斗五升煮取六升分三服

煎六分去滓食前服 若腹痛去黃芩加芍

藥半兩 心悸去黃芩加茯苓一兩 若不

渴外有熱者去人參加桂三分 溫服令有汗

則解 若咳嗽去末加五味子三分 乾薑半

兩 胸中煩而不吐者去半夏人參加枳實

半兩 渴者去半夏加栝蒌根一兩 胸中

痞鞭者如煨子牡蛎一兩 傷寒十三日不

解胸脹滿而嘔者晡則發熱已微利醫以丸

藥利之非其治也宜加芒硝一兩 傷寒十

余日結熱在裏往來寒熱或心下急前之微

參

了

煩或口生白胎大便不通或發熱汗出或嘔
中滿一作痛或日晡發熱如瘧或六七日目中不
了睛不和無裏証大便難身發熱者實也
去人參加枳實大黃一兩各大柴胡湯服之
以利為度熱除不宣處用補藥仍忌羊肉腰
子一作酒并拜酒難化之物或有取傷是名食復難以
治療切宜忌之

逍遙散

主治脩製並見局方

柴胡 二兩 當歸 芍藥 白朮 茯苓
甘草 半兩 薄荷 少許

右以咀、生姜煎服 勿謂云 治婦人大人小

兒男女同法

易簡逍遙散

治血虛勞倦、五心煩熱、肢體疼痛、頭目昏重
心忪、頰赤、口燥咽乾、發熱盜汗、減食嗜臥、及
血熱相搏、月水不調、眩暈脹痛、寒熱如瘧、又
療室女榮衛不和、痰嗽潮熱、肌腠羸瘦、漸成
骨蒸

白茯苓 白朮 當歸 白芍藥
柴胡 各一兩 甘草 半兩

塊

右以胆、每服四錢、水一鐘、煨生薑一塊、切片煎至六分、去滓、熱服、無時。一方名人参飲。治婦人血熱、虛勞、骨蒸、兼治邪熱、客於經絡、肌熱、痰嗽、五心煩燥、頭目昏疼、夜多盜汗、補正氣、解勞倦。用人參、白朮、茯苓、柴胡、半夏、當歸、赤芍、芎藭、乾葛、甘草、黃芩、各等分、右剉、每服四錢、水一作鍾中半、生薑四片、棗一枚、煎至六分、不拘時服。忘有勞熱證者、皆可服之、熱退即止。但婦人寒熱、亦因有經血、經閉者、致令五心

結

積日既久、乃成真病、法當行其經血。若月更以時、自然平治。或以局方大聖散、用紅花煎酒調服、不能飲者、以醋代之。仍以紅花子醋湯嚥下。此二藥、大治經事不調、或腹有血塊。若久無子息、服之數月、其効特異、非可數服、責其無功。或因下血過多、發為寒熱、當用當歸、地黃之類。如大建中、樂令、養勞、双和輩是也。然有痰飲停積之人、則難用此。蓋當歸、地黃、與痰飲不得其宜、及傷胃氣、因是不進飲食、遂成真病、至於不救者多矣。痰飲

勞當作榮

身取
更指療之
本有一
空位

中積致生寒熱者，宜以二陳湯參蘇飲、木茱

因而咳嗽下利發熱自汗，皆不可用之。惟真

武陽增損，名固陽湯，仍以震靈丹服之，病輕

者可療。重者當別求治法。

錢氏地骨皮散

秦艽黃甲柴胡甘草湯

秦艽青蒿烏梅甘草湯

○文潞公茱萸準注李琬方

柴胡 連翹 山梔子 防風 甘草

活人連翹梔子防風甘草湯 連翹飲子

四順飲子 一名清涼飲子 治夜則在血熱而

不厥 加荊芥 白朮 廣黃 為洗心散

守真柴胡飲子 治便鞭氣血各半 柴胡煮散

錢氏黍粘子荊芥防風甘草湯

局方消毒散 減防風餘三味

舉御舉疑古敗散 治婦人產後傷寒凡瘧角弓反張

柴胡桂枝湯 小柴胡湯加桂枝芍藥是也

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡 黃芩 甘草 枳實 芍藥 桂枝

柴胡 黃芩 甘草 枳實 芍藥 桂枝

乾姜 牡蛎

柴胡龍骨牡蛎湯 小柴胡湯去甘草加鈔丹

桂枝龍骨牡蛎茯苓大黃

小柴胡加芒硝湯

治十三日過經不解大抵須看少陽證不退

而臟結宜用小柴胡加桂湯治瘧疾兼支結

大柴胡湯 主治數條並見本經并他人某證

柴胡 黃芩 半夏 生薑 大棗

芍藥 枳實 大黃

活人舉伊尹湯液大柴胡湯八味今監本無黃

芩脫落之也

潔古老人云治表證仍在裡證已急不如此不

可用小柴胡去參芩加枳實大黃如緩治不

減人參甘芩

深師黃芩湯

治傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不

利胸脘痞滿微熱而煩

茯苓 四錢 柴胡 半夏 各八 桂心

黃芩 各三錢

右以咀、生薑水煎服

易簡參蘘飲

治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以為熱
並互服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以
被蓋卧連進數服微汗即愈尚有餘熱更互
徐飲食服之自然平治因痰飲發熱但連
日頻進數服以熱退為期不可預止雖有前
胡乾葛但能解肌耳既以枳壳橘紅輩自能
寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞悶吐逆
惡心開胃進食無以踰此母以性涼為疑一
切發熱皆能作効不必拘其取因也小兒室

女尤互服耳

前胡

加三分

橘紅

紫蘘

乾葛

半夏

茯苓

枳壳

陳皮

甘草

桔梗

木香

各半兩

右以咀每服四錢水一鐘半鐘生姜七片束一

枚煎至六分去滓不拘時候服素有痰飲者

俟熱退以二陳湯或六君子湯間服本方

治痰飲停積中脘閉塞眩暈嗜煩忪悸吐逆

及痰氣中人停留關節手脚躄曳口眼喎斜

半身不遂食已即吐頭疼發熱狀如傷寒者

名

悉主之一方用此茶三兩加四物二兩合和
各茯苓補心陽大治男子婦人虛勞發熱或
五心煩熱並治吐血衄血便血并婦人下血
過多致虛熱者並得其宜又有用心過度
發熱者用之又有神効往未寒熱尤宜服之
易簡溫膽湯

旁當作夢

治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸
易驚或旁寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽
怯氣弱生涎夕氣搏變生諸證短氣悸之
或復自汗或四肢浮腫飲食無味心虛煩悶

坐卧不安悉能主之

半夏 一兩 枳實 二兩 橘紅 二兩半

甘草 四錢 茯苓 三錢

右以咀每服四錢水一鐘半生薑七片棗一
枚竹茹一塊如錢大煎至六分去滓食前熱
服竹茹即刮竹青也大治傷寒後虛煩若
傷寒後尚有餘熱并熱在上焦兼汗下後表
裡俱虛不可攻者宜用人參竹葉湯下利者
於竹葉湯中去石羔加熟附各既濟湯
者二陳湯一法治傷寒壞證時或發熱消煩

躁用新羅參不拘多少煎湯浸令冰冷候盛
沿之時與之頓服熱則隨去矣大抵傷寒渴
者不可多與水多積胸中便為結胃矣然
又濡沫之可也傷寒之後有吃逆者此證
亦最急其他證有此又然當用半夏一兩生薑
半兩白水煎服一方用丁香十粒柿蒂十
五枚煎湯半鐘鍾乘熱無時頓服

易簡降氣湯

治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈塞痰
實咽乾不利咳嗽中喘喘急氣粗膝腹膨脹

滿胸虛煩微渴引飲頭目眩腰痛脚氣四
肢倦怠此茶專治脚氣上攻中滿喘急下元
虛冷服補茶不効者立効

前胡 厚朴 甘草 當歸 各二兩
肉桂 陳皮 各三兩 半夏五兩 易簡
一本有

右以胆七味并拜紫葳子五兩極易綠難得真者不
治用紫葳如前胡之數代之共為八味每服
四錢水一鐘半生薑五片棗一枚煎至七分
去粗食後服凡人中凡中氣腫滿及脚氣
等患多是虛氣上攻胸膈不快不進飲食此

名

茶大能降气真俞山人降气湯後加參附五
 味大腹皮之類却非其真加易若素脚气只是
 上气喘急不得卧者宜用橘皮紫葳人參五
 味子桔梗各等分各神秘湯一有者字甚用此調鐘乳
 粉下養正丹脚气入腹大便秘不任冷茶
 者宜用養正丹以溫利之一方以八味丸
 加川芎細辛桔梗茯苓共十一味名大降气
 湯治法一同若尊年人虛氣上壅當間以生
 取加生姜煎臨熟磨以沈香薯蕷之尤為穩當
 許學士地黃丸此方當在大薯蕷後

附

補

生地 秦艽 黃芩 世胡 赤芍藥各半
 右細末蜜為丸烏梅湯下三十丸無明時日二
 服學士云楮澄治寡婦僧尼室女別得其法
 診其脉左手關獨出寸口過魚際乃知女子
 思男而不可得也 或云寡婦師尼不可言
 僧字然為當以經勞之二陽病發心脾不得
 隱曲故女子不月此一條本為女子而言王
 原作灌 注內復云男子少精是經言女而註言男皆
 勞也言僧字亦兼男之義 倉公傳濟北王
 侍人甘病惺昧疼熱倉公曰病得之欲男

褚

不可得何以知之診其脉弦出寸口是知之
婦人以血為本血盛所以思男諸澄云僧
危則異於妻妾學士改僧宗為師勞甚當經
云女子不月條下刊註云男子少精兼之意
也又知僧字兼男之象易老云仲景治婦
人經不調盡在小柴胡調治條下以此推之
活人梔子烏梅甘草黃芩柴胡湯

治懊憹煩躁不得眠
右五味粗末生薑水煎加竹葉薑豉三十粒

仲景云少陰證四逆條下言或咳或悸或自
便是假令一證並不是上下一條通為一證
也或悸而又舉之言姑以四逆散主之若果
四逆必不用於此也何以然下文云悸者加
桂腹痛不利者加附子即知雲岐子於此正
條內去或悸二字拜散使用四逆湯下亦主
甚當

金匱大薯蕷丸 治虛勞諸不足凡氣百病

薯蕷 分三十 甘中 十分 當飯
熟地黄 大豆黃芩 桂枝 麴 各十分

阿膠蛤粉炒人參各七分芍藥各七分麥門冬各六分

芍藥 白朮去皮杏仁尖炒防風各六分

柴胡 茯苓 桔梗各五分乾姜三分

白欬二分大棗百枚為膏

右二十一味細末煉蜜丸彈子大空心酒下

一九一百九劑似脫字

外臺秘要仲景病源小品方

太陽病過經十餘日及二三下之後四五日

柴胡湯證仍在者先與小柴胡吧不止心下

胡湯下之即愈

半夏 湯洗 柴胡各半黃芩 芍藥各三分

大棗二十枚生薑五兩枳實四個炒

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更

煎取三升溫服一升日服一方加大黃二兩

今不加大黃恐不名為大柴胡湯也忌羊肉

湯外臺作錫當改治天行千金翼肘後同 海藏云正經

吧家雖多陽明證不可下大柴胡主治但言

吧不止心下急大柴胡湯下之不可疑也及

點示正方即內無大黃却与本條相合 注

中小字又作吧止小安仍不解者即空大黃也故注後有加大黃一句若全用有大黃却是易老法治表證仍在裏證已急者也古人用茶其精妙如此此龍腦雞蘘凡增損此之御茶院尤妙

除勞解熱下氣散鬱去肺熱咳血心熱驚悸脾胃熱口乾吐血肝膽熱氣出口苦腎熱神老不定上而酒毒隔熱消渴而血利五淋血崩此茶清神爽氣開肺開心益志滋肝補腎在腎令人身強體輕耳目聰明又能利膈化熱痰

去膀胱中積熱三焦永無滯塞

雞蘘葉即龍腦新蒲黃黃芩人參

木通各二麥門冬云心甘草一兩半

黃連一兩乾地黄六兩阿膠炒焦二兩

柴胡用銀州鼠尾紅色者二兩到同木通

右為細末用西路好蜜二斤餘先煉一二沸

然後下生地黄末不住手攪徐徐入絞下者

木通柴胡汁遣漫火熬成膏勿令火緊焦不然

後將其餘茶末和丸如豌豆大每服二十九

白湯下虛勞煩熱梳子湯下肺熱黃芩

遺原作邊

湯下 心熱悸^動恍惚 人參湯下 唾咯吐血
衄血去心麥門冬湯下 脾胃熱赤芍藥生
耳聾湯下 肝熱防風湯下 腎熱黃柏湯
下以上諸證並食後臨臥 治立淋及婦人
血崩漏下車前子湯下 葶中痛蒲黃滑石
各一匙溫水調下 室女虛勞寒熱潮作煎
柴胡人參湯下 痰嗽生姜湯下 氣逆橋
皮湯下

黃耆膏子煎丸

人參 一季一兩半 白朮 各一兩 白芷 各一兩

柴胡 揀淨 黃芩 各一兩 鱉甲 一箇半 豐一豐上有手字

右細末黃耆膏子丸如梧子每服三十九

至五十九百沸湯食前服 一有寒字 製黃耆膏用黃

耆半斤粗末水二斗熬至一斗去滓再熬不

住半攪成膏至半斤入白蜜二兩再熬令蜜

錫熟得膏子十兩放冷丸藥此為下劑各酌

量用之

地骨皮枳壳散

治骨蒸勞熱肌肉消瘦少力困乏夜多盜汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳壳

當飯

蟹甲

醋炙黃

知母

右等分為末、水一鐘、桃柝枚頭各七、姜三

片、烏梅一箇、每服三錢、煎至七分、去滓、臨卧

空心溫服

黃龍湯

治胎前產後寒熱

小柴胡

一有湯字

去半夏加芍藥是也

一法以四物

湯加蒲黃亦又名黃龍湯

○柴胡蟹甲散

大便硬者柴胡蟹甲散

大便溏者半氣半

血道遙散

柴胡

知母

貝母

地骨皮

蟹甲

醋炙黃

右為細末、蒿心七葉、烏梅三箇、同煎

○王氏秦花散

蟹甲

醋炙黃

秦花

各一兩半

知母

灸耳中

各一兩

柴胡

二兩

右以咀、東、煎服

局方秦花蟹甲散

局方秦花蟹甲散

局方人參荊芥散

以上三方一主治脩製並見局方

治

孫用和小柴胡治瘴疫久瘧面黃肌瘦不以日

日月
不作日

月淺深悉皆作之 心胸痞不思飲食加陳

皮渴者加枯葶根喘者加杏仁便秘加大黃

腹痛者加牡蛎二字疑去半夏加

人參似藥字括葶根名曰黃龍湯 虛煩熱竹葉湯

此濕熱證夕濕熱證夕傷寒稍別 療傷寒

一桂枝二廣黃三青龍四白虎五柴胡精當

不差立時見効不必須便轉世一作壞其間變壞悔

之晚矣如色脉文亂須辨明白無疑 陽

晚

盛熱多則白虎竹葉湯盛寒濕則四逆理中

以此思之又豈有三百九十七法耶 雲收

子論正法夕此同意 王朝奉舉杜士當士云凡

春夏回發汗秋冬不汗汗秋冬傷寒尸用小

柴胡頓服自愈無汗亦愈若求便傷寒疑是

凡氣痰壅等皆治之若渾身痛小柴胡加桂

尤妙也

生犀散

治小產一作兒骨蒸日晚潮熱夜間盜汗能飲食無

肌肉病後證毒傷寒後服藥物發熱不除及

食羊肉物

餘

只

羚羊角 地骨皮 秦艽 枳壳

大黃 麥門冬 赤芍藥 茯苓

柴胡 人參 桑白皮 黃耆

鱉甲 醋炙黃色各等分

右以咀青蒿水煎去粗當粗濕服

活人妊婦傷寒加減例

妊婦傷寒仲景無治法非無治法也以其有
岐伯有故無損可犯衰其大半一條更不必

云謂紛也所以不言明者當識謂如瘧濕

得一篇無茶仲景豈無治法而不知茶恐後

人有取遺耳 活人治婦人傷寒妊婦服茶

予謹考而詳之無論有胎無胎產前產後主

治茶味皆不出此聖人意詳云俗方可擬者

與其間參用則知其間亦有違古人意者何

必云以法考之疑非古方也 於熱惡寒不

離桂枝芍藥 往來寒熱不離柴胡前胡

大渴不離知母石羔五味子麥門冬 大便

者不離桂附白朮干姜 大便燥結不離大

黃、苓 經水適來適斷者小柴胡 安胎

不離人參阿膠白朮黃芩 發汗不離生薑

失

的嘗耳

不老丹例

不老丹

何首烏

蒼朮

桑椹

並煎

如

並見

活法

局方何首烏蒼朮地黃煎

右地黃膏子煎與蒼朮煎合煎服全養氣

血益上神菜也

不老丹歌

甫 皇世敬之作為德甫服此七十而無白髮

豆豉麻黃旋覆花 乳疼不離前胡石羔枳
子 傷寒一作暑乳痛不離柴胡石羔耳草 滿
不離枳實陳皮 胎氣不安不離黃芩麥門
冬人參 發班變黑不離黃芩枳子升麻
觀此數條皆不出古人意豈可云仲景無治
法不言婦人妊娠之方也仲景一書婦人
小兒兼之矣活人論婦人傷寒但云仲景不
言其意已是不可云仲景無治法以治之某
求之皆仲景本意曷嘗出古人哉活人此言
雖失亦急為後人不知湯液者言之也豈敢

云仲景不知也活人之言失之過而不甚

蒼朮四斤泔浸軟 竹刀刮皮切作片

一斤炒以四兩塩 一斤椒炒黃色變

一斤各以酒醋浸 三味出之以日見

何首赤白各二斤 泔浸竹刮切來勻

曝 東豆五升同一甌 東豆爛時曝乾成

一作黃 地骨二斤通搗細 棗汁和之如麩劑

平 不火置在盆中 仍澆棗汁高三指

晝 不火夜取月精晝日華 汲盃棗汁菜乃佳

一作靡 其菜精乾摩作塊 亦用石臼搗無害

搗之細熟頃細羅 煉蜜為丸桐子大

空心酒服一百丸 此是人間不老丹

又方

何首烏一斤 赤白相雜 棗一斤入鍋內用河水

炒乾去核同用 牛膝酒浸焙 防風用芦二兩

右為細末石臼杵塞肉丸梧桐子大空心温

酒下五十粒

又方

何首烏一斤 牛膝兩 熟地黃兩

蒲黃兩 乾桑椹兩

右為細末蜜丸桐子大棗蜜各半丸亦得

逐風丹 治風痰通身疔瘡

按此似非脫行

地骨皮一兩 何首烏一斤 黑豆三升
荆芥穗四兩 甘草四兩 水煎乾

右為細末酒調三錢或蜜丸彈子大細煖一丸茶酒任下

治癰瘰 瘰氣癭起結疔瘡潰癰 疑癰

右用黑熟桑椹二升新布絞汁砂鍋內然不化鐵釜後成膏子沸湯點服 疑熬

世間缺一頁逐風丹治疔瘡方二道 以玄明粉傳之日

官庫古寫本亦全

消癭丸 治結核瘰瘰氣

連翹 梔子 桔梗 甘草 乾柿

防風 牡蛎 玄參 丹參 荊芥

續斷 鼠李 海藻 昆布 何首烏

白僵蚕 一作蜜 牛李子 白頭翁 各半

煉下恐脫蜜字 右為末一作細煉丸食後茶酒任下

○治瘰氣癭起

連翹 梔子 瞿麥 防風 乾柿

桔梗 甘草 各半

逐風丹 治風痰通身疙瘩

按此似非脫行

地骨皮一兩 何首烏一斤 黑豆三升 河

荆芥穗四兩 甘草四兩

右為細末酒調三錢或蜜丸彈子大細煖一丸茶酒任下

治癰瘰 瘰氣癰起結疔瘡癩癧

右用黑熟桑椹二升新布絞汁砂鍋內然不

犯鐵釜後成膏子沸湯點服

又治癰瘰經年久不差者 以玄明粉傳之日

二次

消癰丸 治結核瘰瘰氣

連翹 梔子 桔梗 甘草 乾柿

防風 牡蛎 玄參 丹參 荊芥

續斷 鼠李 海藻 昆布 何首烏

白僵蚕 一作蜜 牛李子 白頭翁 各木

煉下恐脫蜜字

右為末一作細煉丸食後茶酒任下

○治癰氣癰起

連翹 梔子 瞿麥 防風 乾柿

桔梗 甘草 各木分

右細末蜜丸桐子大服

○五香連翹湯

治癰疽瘰癧瘰癧凡結腫氣惡瘡毒氣瘡氣入腹
嘔逆惡心并皆治之

木香 沈香 杜活 升麻 甘草

射香 各半兩 連翹 乾葛 大黃

素寄生 薰陸香 各二兩 然竹茹 二兩

雞心香 雞心尚作雞香半

右以水煎終入竹茹

治癰鷺鷥丸

海蔞 海帶 海蛤 鷺鷥木通

青皮 昆布 訶子核 連翹各等分

晚蠶沙 欵冬花

右細末煉蜜丸雞頭實大每服一丸食後臨

卧嚕化津液嚥下

○孫尚菜方 治小兒盜汗潮熱往來

南蕃胡黃連 柴胡 各半分

右細末煉蜜丸雞頭實大每服二丸至三丸

五丸銀石銚子內用酒少許化開更入水五

分重泥煮二三十沸放溫食和粥滓服

件

治傷寒勞復身自焚大小便赤如血色者元

胡黃連 山梔子去壳各一兩 蜂蜜半兩

右仲和炒微焦二味為細末用豬胆汁和丸

桐子大每服生姜三片烏梅一箇童子小便

三合浸半日去粗食後煖小便令溫送下十

九臨卧再服妙

渴

青蒿散 治骨蒸便軟濁者

青蒿 烏梅 秦艽 甘草 各木分

右以咀同小麦煎服

金匱要畧癰病脉證并治證三條方六首

師曰癰脉自弦二教者多於弦遲者多寒弦小

急者下之若弦遲者可溫之弦緊者可發汗

鍼灸也浮大者可吐之弦數者凡疾非發也以飲食

消息止之不問曰癰以日一發當以十五

日愈設若不差當月益解无如其不差當云

何師曰此結為癥瘕名曰癰母急治之也

鱉甲煎丸

鱉甲煎丸

鱉甲十二分 烏扇三分 黃芩三分 柴胡六分

石葦三分 厚朴三分 瞿麥二分 紫葳二分

半夏一分 人参一分 牡丹皮五分 麝虫五分

阿膠三分 蜂窠四分 芒硝十二分 蜣螂六分

大黃三分 芍藥五分 桂枝三分 葶藶一分

桃仁一分 鼠婦一分 鼠婦一分

右二十二味為末取鍛竈下灰一斗清酒一

斛五斗浸灰候酒益一半着鯨甲於中煮令

泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如桐子

大空心服七丸日三服

師曰陰氣孤絕陽氣独發則熱而少氣煩寃手

足熱而欲吐名曰瘴瘧若但熱不寒者邪氣

內藏於心外舍分肉之間令人消銖脫肉温

瘴者其脉如平身无寒但熱骨節煩疼時吐

空用

白虎加桂枝湯主之

知母六兩 甘草二兩 石膏一斤 桂枝三兩

粳米六合

右五味以水一斗二升煮米熟去滓煎

至三升温服一升日三汗出愈

此方某函悅今以本書補之 蜀漆散 治瘴多寒者名曰牡瘴

蜀漆 雲母 龍骨 右并為細末未祭前以漿水服三錢 温瘧

加蜀漆半分、臨食時、服一錢匕、
作雲實

牡蛎湯 治牡瘰

麻黃 去節 牡蛎 各四兩 蜀漆 洗去甘草 各二兩

右以咀、以水八升、先煮蜀漆麻黃去上沫、得

六升、內諸藥、取二升、去粗、溫服、一升、壯則勿

更服、見外臺

小柴胡去半夏加栝蒌湯 見外臺 經心錄治勞瘵

柴胡 八兩 黃芩 二兩 生薑 切片 大棗 十二枚

人參 三兩 栝蒌根 各四兩 甘草 二兩

右七味、以咀、以水一斗二升、煮取六升、去粗

再煎、取三升、日三服

柴胡桂姜湯

治寒多微有熱、或但寒不熱、服一劑如神、故

錄之

柴胡 八兩 桂枝 去皮 黃芩 各三兩 牡蛎 炒

甘草 炙 乾姜 各二兩

右七味、以咀、以水一斗二升、煮取六升、去粗

再煎、取三升、溫服、一升、日三、初服微煩、後服

汗出、愈、出得寒、論

傷

九轉灵砂丹 治瘰

紫河車 一钱二分研 细和後二味 鉛 一钱 信 一钱

右用雄黑豆一百粒水浸一宿去皮透時研如泥和三味勻末丸桐子大菜豆大黍粒大三等量虚实老幼大小眼之每眼一二丸或三丸臨晨日未出面東每根水下不癸日眼經日當其盛必毀因其衰也是必大昌此之謂也

又方治瘰久不愈

右用蒜不以多少杵和 鉛丹 凡雞乳實大每

眼一丸臨晨面東新水下

海藏瘰論

瘰之為病以暑舍於榮衛之間得秋之風寒所傷而後癸亦有非暑感風寒而得之邪並於陽則癸熱冰水不能涼邪并於陰則癸寒湯火不能温并則病作離則病止故有時而休在气則癸之早在血則癸之晏淺則日作深則間之或在頭項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則一也或在四肢者凡搖之所及隨所傷而作不必盡當風火

也

之先寒而後癘者為之寒癘先熱後寒者為

濕

之溫癘二者不當治水火當從乎中治中治

者少陽也渴者燥盛也不渴者溫盛也癘雖

傷暑過秋而發其不應者秋病寒甚太陰多

也

也冬病寒不甚陽不爭春病則惡凡夏病則

多汗二者乎少陽虛之其病隨四時而作異

形如此又有得之於寒而發之於暑邪舍於

腎足少陰也者藏於心居之於內熱索於肺

少陰也至於少氣煩冤當手足熱而不寒為之

瘴瘧足陽明也治之奈何當其盛而必毀因

其衰也是必大昌矣治法易老癘論備矣

問曰婦人經痛大人小兒內熱潮作并癘寒熱

其法同否帝又問曰病中外何如岐伯曰從

內之外者調其內若盛於外者先治內而後

治外此言表裏而出之異也又云中外不相

及則治主病中外不相及者半表裡也自外

而入者有之自內而出者亦有之外入內出

雖異也在半表半裏則一矣此從外之內者

治其內若盛於內者先治外而後治內中外

不相及為少陽也治主病者治少陽也帝問

復

異適

大熱之病、惡寒、發熱如瘧、或發一日、或發間日、或伯對曰、以勝腹元氣會過之時、有多有少、陰多陽少、其發日遠、陽多陰少、其發日近、此勝復相持、盛衰之節、瘧亦同法、瘧者少陽也、少陽者東方之氣也、逆之則發寒、順行則發熱、故分之氣、往來之不定也、婦人經水適來、適斷、病作、少陽治之、傷寒雜病一經、一經云、自有姓、而脈有邪、經閉也、又云、月事不來者、胞脈閉也、經閉者、尺中不至、胞閉者、生化絕源、二者皆血病、厥陰生之、厥陰病、則少陽病矣、累及其夫也、小兒外感內傷、若有潮作寒熱等證、並同少陽治之、男女同、已上男子、婦人、小兒、閏女、或大實、或大熱、或虛變成勞、脈有浮中沉之不同、故某有表裡和之不一、察其在氣在血、定其行陽行陰、使大小不失、其宜輕重各得其所、從緩從急、逆順而舉、則無不當、乃可以萬全矣、此少陽一治、不可不知也、

素問五藏一作瘧某證湯液

息 肝瘧令人色蒼、然大急、其狀若死者、通脈

四逆湯主之

胃瘧令人病已善飢而不能食食而支滿腹

大理中湯理中丸主之

心瘧令人煩心甚欲吐清水及寒多不甚熱

桂枝加黃芩湯主之

脾瘧令人寒腹中痛熱則腸鳴鳴已汗出小

建中湯芍藥甘草湯主之

肺瘧令人心寒不甚熱之間善驚如有見者

桂枝加芍藥湯主之

腎瘧令人洒洒腰脊痛不能宛轉大便難目

眇然手足寒桂枝加當歸芍藥湯主之

素問六經一作瘧候湯液

少陽令人身熱解傷寒不甚熱不甚惡寒人

見人心惕然熱多汗出甚小柴胡湯

厥陰令人腰痛小腹滿小便不利如瘧狀非

瘧也救瘧意恐懼氣不足當腹中挹四物洪一作玄

胡苦鍊附子湯

陽明令人先寒洒淅寒甚及乃熱去汗出

喜日月火光氣乃快然桂枝二白虎一黃芩

芍藥加桂湯

酒

瘧 便

奈當是禁

禁奈湯也、後人用六乙涼隔和餅之、不知何意

小柴胡湯、不汗、不下、不利、小便、故深古名

小柴胡湯、議論

戶牖而處其病難已、小柴胡加半夏湯

少陽當令人胸嘔吐甚之、寒熱、多寒少、欲閉

柴胡加桂湯

心、喝、然、熱、止、汗、出、難、已、羌、活、生、地、黃、湯、小

太陽、令人腰痛、乳重、寒從背起、先寒後熱、熇

病至則善嘔、病已乃衰、小建中湯、異功散

太陰、令人不樂、好太息、不嗜食、多寒熱、汗出

感當是感

則某不至於差感也

後之表、半在裏、非下之半、在裏、乃身前之裏

古人之意、其害非輕、明者當識、半在表、乃身

古人麻黃、兼氣、五苓、合而用之也、豈為有矣一作失

證、豈可輕用變偽哉、若以利下之劑、為可用、則

六乙涼隔、既利而復下之、故有畜血、心下痞

半表裏、所以小柴胡、不汗、不下、不利、小便、今

便某也、而少陽證、當陽明與太陰之間、故云

涼隔、氣中之下某、六乙則雜病、膀胱中知小

舌胎滑例

王朝奉證治論藏結附

身

舌上胎滑此丹田有热也脉阴阳俱紧者口中气出唇口乾燥倦卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄語也治依辨脉法改到七八日以来微热手足温為欲解或八日以上及大发热為難治設使惡寒者必欲吐也可以柴胡湯去半夏加人参枳實芍藥湯出小柴胡湯加減法腹中痛者可理中丸藏結如結胸狀飲食如故時下利脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗滑者難治可刺関元穴藏結無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上胎滑者難治也可刺関元穴服小柴胡湯佳陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒及惡熱自重若下利則胃中虛客熱薰膈心中懊憹舌上胎滑者服小柴胡湯胃气和汗出而解

三焦热用茶大例

上焦热

不清神散 連翹防凡湯 凉膈散

龍腦飲子

犀角地黄湯

中焦热

小養氣湯 調胃養氣湯 洗心散

四順清涼飲 桃仁養氣湯

下焦熱

大養氣湯 五苓散 立効散

八正散 石葦散 四物湯

抵當湯丸

海藏云此內熱之大畧也 有外熱者當求別

法兼此例有輕重氣血之分 用者當擇其

可焉而已矣

醫聖心裁卷第五

於

壬子十一月十九日夜三更校于直舍是日大雪縫風如刀呵手把筆元簡記

