


漢書門			
1115011			
六	一	一	
册	架	函	號

內閣文庫			
三	一		漢
函			書
架	册	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12302	
冊數	6 (6)		
函號	301	21	



經水不調

大校局

經之為物
乃手太陽
經主之
經相為表
裏在上為
乳汁在下
為月水如
脾胃之氣
壯衝任之
氣盛自起
止應時

醫林繩墨大全卷之九

婦人調經

婦人得陰柔

之體以血為本蓋陰血如水之行地陽氣

若風之旋天故風行則水動氣暢則血調此自然之理

也經云二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下

交感則有子其天癸者天一生水也任脉通者陰陽之

通泰也太衝脉盛者氣血之俱盛也何謂月信月者陰

也信者實也對月而來應時乃合常度參差則曰不調

明錢塘方

穀著

江周京輯

松江陳

陳

婦人調經 卷之九 調經一

大抵經病
肝脾血燥
四物為主
脾胃血虛
補中益氣
為主肝脾
鬱結舒脾
湯為主肝

如調則百病不生故經曰血調氣和有子之象否則逆
之諸疔蠱起蓋婦人內傷外感一切疾病俱同男子治
法惟月經孕產崩漏帶下則所治不同然緣婦女性情
中和者少偏拘者多稍不如欲強者忿怒於色弱者憂
思於心鬱結日久血因疑滯妄生諸症今之治者不究
病源漫投四物之劑而曰婦以血為主不知婦女病根
於心成於氣氣行則血行氣滯則血滯不先調氣而徒
益血血愈停積以致發熱疼痛漸以疴羸厥有由矣根
本所在須知心為榮衛之主心氣鬱結者宜調心血通

經怒火加
味迥散為
主若夫八
物湯四君
子六君子
湯補心丹
益氣養榮
湯四製香
附丸俱婦
人之要藥
也

心經而血自行又脾胃為氣血之運飲食勞倦損其中
氣則血亦不行或行之而間斷又宜補養脾胃而氣血
自生自運仍以開鬱行氣為要鬱開氣行諸病自解矣
若其心調脾旺察其果有血熱血少血枯血寒血虛等
症而後為之行血通經用四物加減焉有如經水不及
期而前來者血熱也宜四物加黃芩生地白朮阿膠過
期而來者血少也宜四物加參朮香附紅花牛膝閉而
不來考血枯也宜四物加參朮續斷金銀花淡者痰多
宜二陳加歸芍白朮枳殼黃芩之類紫者熱勝宜四物

肥人痰多
尤宜二陳
海石三木
芎歸香附
等作丸藥
燥濕化痰
瘦人血熱
宜四物生
地丹連
香附等
藥為丸去

加丹皮生地芩連之屬熱極則黑調榮降火宜四物加
柴芩生地蒲黃童便之屬經過作痛虛中有熱宜四物
加參朮阿膠生地黃芩行而痛者宜四物加香附澤蘭
紅花桃仁此血實也不行而痛者宜二陳加香附芎歸
續斷牛膝黑乾薑此血寒也甚者去香附加官桂經行
而過期痛者宜四物加參芪薑桂牛膝續斷此血虛也
在治者存而思之乃調經不易之大法也若古方用耗
氣破血而調經者豈宜也哉且太衝者氣也任脈者血
也血氣調和由於衝任之升降氣升則血升氣降則血

潮濕熱

降若耗其真氣則血無所施血病自此生矣若破其血
室則血無所附氣病自此生矣所施若此望其調乎又
有傷寒病不當行經而經行者此熱入血室也宜以和
解少佐養血之劑如小柴胡湯加當歸川芎炒黑乾薑
香附治之使邪從血解可也又或平日行經之時不戒
暴怒有損衝任不遠色慾有傷血海又或兼以抑鬱則
宿血必走腰脇為脹為痛注於腿膝為痠為軟遇新血
擊搏則疼痛不已散於四肢則麻痺不仁入於血室則
寒熱不定或怔忡而煩悶或譫語而狂言或湧吐上出

血枯經閉
東垣分三
焦治悉以
瀉火補血
為主上焦
治以三和
四物涼膈
當歸湯中
焦治以調
胃承氣湯
下焦治以
玉燭散四
物合承氣
後服五補
衛生湯使
陽旺生陰
此指血少
腸胃枯燥

或下泄大腸此皆因六鬱七情之所致而寒熱溫涼之
失調也治療之法如心氣拂鬱宿停經候者以歸芍川
芎香附續斷牛膝以治之瘀血蓄積散於四肢者以大
調經散行之濕熱阻經者以蒼朮二陳開之潮熱者以
逍遙散清之入室寒熱譫語者以小柴四物主之久而
盛者玉燭散下之湧上吐者治宜經行血順自可用四
物加童便服之苟能如此調治不但病免而孕育亦可
多望矣

愚按經水之行當用熱而不可用寒寒則稽留其血使

者而言也
五補衛生
湯熟地人
參白
次地骨各
八分當歸
白芍各一
錢五分黃
芪二錢甘
草五分如
去歸芍芪
草即五補
丸方

濁穢不盡帶淋痕滿所必成矣惟當於經行之時食之
以熱用之以溫禁生冷避寒涼遠房室勿鬱結則諸病
俱不能生焉若夫經來陣痛者屬血實四物加黃連香
附紅花桃仁玄胡丹皮經後作痛者屬血虛而氣不運
四物加參芪挾寒加乾薑經前潮者血虛有滯逍遙散
加丹皮玄胡桃仁經後潮者同血虛有熱逍遙散加柴
胡丹皮生地此俱治經之良法也
治法主意經行不可用寒經閉不可用補

調經主

四物湯

婦人以陰為主是以月事不調宜以此方

調經四

何山堂

四

何山堂

用治隨其寒熱虛實而斟酌加減是方也當歸芍藥地黃皆味厚之品味厚為陰中之陰故能益血

折而論之當歸辛溫能活血白芍酸寒能斂血熟地甘濡能補血又當歸入心脾芍藥入肝熟地入腎川芎則輒上輒下而行血中之氣者也此四物湯所以為婦人調經之要藥

當歸酒洗白芍酒洗

川芎

二陳湯見中風 理一身之氣燥一身之痰

小柴胡湯見傷寒 能治熱入血室

大調經散 能除濕鬱

蒼木二陳湯 卽二陳加蒼木 能除濕鬱

小柴四物湯 卽小柴胡合四物

逍遙散 乃清肝和血之劑婦人肝經血分中有風

有火口燥咽乾發熱盜汗皮膚搔癢小便澀滯悉

皆治之 當歸 芍藥 白朮 白茯苓 甘草

柴胡 水煎服

玉燭散 四物合承氣

崩中

經曰陰虛陽搏謂之崩丹溪曰婦人崩漏者皆因勞傷

過極有損衝任則氣血不能約制其宜忽然衝逆而來

故曰崩中暴下此其症有因產後不禁男女致傷衝任

而來者有因好食生冷阻滯惡露凝結而暴下者有因

臨產惡露不來阻滯胞絡而一時崩中者有先產而後

崩者有先崩而後產者有當經不行遇氣阻格若孕而

成崩者有妊娠勞傷氣力而大崩者有年大氣血衰弱

經脈不調忽然而崩者有年少情慾不遂思傷心脾過

此而已
還其舊如
用補血以
澄其源末
熱涼血以
流中用清
血以塞其
者初用止
水沸也治
木搖火燃
崩如風動
致火亢暴
情過極以
死病由七

極而作崩者有中年情慾過多損傷衝任經絡阻滯而崩者其惡露一來如水勢不可遏故曰崩中此由血氣俱虛之故治宜大補氣血為主如四物湯加人參炒阿膠炒荆芥炒地榆炒艾葉臨服加童便妙
愚按心主血肝藏血脾裹血若崩中者皆因心火亢甚以致肝不能藏血脾不能裹血何也出納之道廢由是子能令母實相火隨挾心火之勢而相煽所以血脉泛溢錯經妄行也其始則由於憂愁思慮傷心恚怒氣逆傷肝飲食勞倦傷脾心傷則思而氣結肝傷則逆而不

舒脾傷則行而不止故有崩中之症也治宜大和脾氣清理肝氣調攝心氣使血有所歸而心有所主肝有所藏而脾有所裹然後崩可治而血可止臨症之時最忌徬徨恐懼必要安心靜養調攝肝脾服童便使陰有所附炒黑薑使陽有所歸配四物而養血和血元虛者可加參朮血運者可加酒炒黃芩或者以火醋煮面收斂正氣此俱治之不易之法也至如脈大者難治冷汗出者難治面青舌青者不治

治法主意崩中之藥補養脾胃為主切不可用寒涼之

藥雖用黃芩蒲黃荆芥香附炒黑方可

崩中主方
四物湯見調經

附秘方

二灰散 黑驢糞陰陽性血餘灰 二味各一錢五

分用火酒調下崩漏卽止屢試屢效

栢子仁湯 治憂思過傷心經而血崩者 茯神八

土歸錢 鹿茸 瓜川芎 芎阿膠 續斷 香附 六分

遠志 細甘草 栢子仁 四分 棗子煎空心服

五靈脂散 治崩漏初發遽止便有積瘀不止又恐

昏暈必服五靈脂末 五靈脂 炒盡烟酒下一錢

其性能行能止然後分虛熱用調和血氣之劑二

三帖再單服靈脂末去故生新末則服四物加乾

薑以固之

烏沉湯 治悲哀甚則胞絡絕陽氣內動發則心下

崩而血亦流 川芎 當歸 白芍 各一香附

烏藥 各五分 水煎服

帶下

夫帶下者此濕熱之邪聚於胞絡經脈而然也其症皆
因不善養生或值經水之來恣性妄食生冷之物或將
涼水灌口淨手稽留惡血凝滯不行或行之不盡卽繼
之以房勞有傷心腎使經血蓄於下焦留結不散或因
濁氣鬱結胃中積有濕痰於是小腹作痛赤白從帶脈
而下然帶下白者乃濕熱傷於氣分宜以理氣清熱用
香附柴胡青皮白朮當歸生地官桂玄胡之屬熱甚者
加酒炒黃芩帶下赤者乃濕熱傷於血分宜以清熱涼

東垣云白帶是胃中濕痰流下滲入膀胱當升之二陳加二木升柴爲要藥

婦科經帶 卷之九 帶下一

大抵此病
辛溫治濕
寒苦寒治
濕熱可寒
正治辛溫
從其性
甚者從治
為宜輕者
正治可也

血如歸芍炒蒲黃生地丹皮牛膝黃芩之屬如因清氣
下陷而成帶者必四肢無力法宜補養正氣而兼升提
之藥用補中益氣湯加以香附條芩肉桂俱宜斷却厚
味酒麩煎炒或肥人多濕痰當為導痰瘦人多熱當為
養血也

愚按帶下者古人謂帶脉係於腰腎如帶之盤桓故曰
帶下舊方用羌獨活為君歸芪蒼為臣升柴防風為佐
藁本蔓荊甘草為使然吾嘗驗之於妓者之家當經之
時日服花椒三五十粒連吞三口經亦止矣帶下之症

並不見有可見血熱則行所行既速則惡血難留安有
得滯而為帶下者哉此理可明則治之亦可想而見矣
近之醫者以為濕熱槩用寒涼治之非惟加病亦且鬱
遏惡血反成不可治之症則治者當善詳之

治法主意

帶下主方

補中益氣湯 見中風

附效方

硫麥丸 治婦人白帶如神

硫黃一兩炒 蕎麥麩一兩炒 牡蠣七錢

其為丸空心酒下

赤白帶神效方

棉花子一斤燒存性 栝子一兩燒存性

右二味共為末空心淡酒調服三錢神效

治白帶神效丹方

白果肉 四兩 硫黃末 一錢

右二味同炒熟去黃不用將熟果肉空心鹽湯嚼

秘驗帶下丸

艾實粉 二兩 白茯苓 赤石脂 煨 牡蠣 煨 酒 泮

禹餘糧 煨 各一石 灰 風 化 入 好 醋 晒 乾 再 煨 過

用糯米煮粥和搗為丸梧桐子大空心大湯下五

十九丸加至六七十丸

胎前

氣血旺脾 胃和胎自 無虞一或 有乖其胎 卽墮以胎 元賴氣血 以養氣血 又藉脾胃 飲食化生 也 條芩固中 氣瀉火能 滋子戶之 陰俗以黃 芩為寒多 不用不知

經曰調理妊娠清熱養血又曰胎前無實宜以補養為

主丹溪則云清熱者非用苦寒等藥但補藥中而少兼

涼血之劑此蓋恐血熱則行也又不可因胎前宜補而

妄用艾膠香燥助火消陰之劑致血熱妄行則有半產

漏下之患若夫胎遇漏下者此屬血虛之症亦當用補

然宜涼補可清而不可熱以四物為主加以黃芩參朮

阿膠若胎漏不止宜用四物去川芎加生地條芩地榆

阿膠參朮之類至若胎動者屬氣虛故胎不自安時時

此為安胎之聖藥耳

而動宜當安胎為要用以四物湯大加參朮雖有腹痛佐以香附蘇梗如其胎動有因傷損不安者又須四物去川芎加朮芩香附為主如心血不足者加山藥棗仁如因怒氣傷肝觸動胎元不順者少加砂仁枳殼厚朴如氣血虛弱不能榮養胎元致動而不安者四物去川芎加參朮阿膠山藥黃芩其人身體如素羸弱太甚者宜本方中加大補氣血之藥如參芪白朮阿膠杜仲炒黃芩又有腹脹胎不安者可加腹皮氣勝胎不安者可加枳殼如得胎二三月不安者宜加蘇梗四五月不安

子懸腹痛之甚大加砂仁木香

者宜加砂仁七八月不安者宜加枳殼九月十月不安者不必再安其胎當從其病而調治然胎動最忌腰痛或腰痛宜急用固胎飲加杜仲續斷此皆調理胎前之活法也若夫子煩子腫等症隨四物而論之子煩者宜清宜補加人參麥冬之屬子腫者宜散宜清加枳殼腹皮之類子嗽者宜斂宜降加麥冬五味條芩之屬子嘔者宜溫宜補加白朮香附厚朴之類子淋者宜涼宜補加黃芩生地之屬子懸者宜補宜養加人參阿膠之類若由氣血不和脾土虛弱不能運化精氣致使食積生

痰痰生熱熱生風者宜以清氣養血健理脾胃為主而諸症自可調也

愚按胎前無實宜以補養為先故安胎之藥必須用補蓋以一人之元氣為二人之運用非補不足以安養胎氣也宜用歸芍為主參木佐之欲其清氣少用香附欲其涼血加以黃芩不可妄施寬胎之劑而佐以補中之藥醫者其謹之至於臨產催生當分寒熱夏月熱產血散氣沸宜五苓散加葵子為要劑冬月凍產血凝氣滯當令房中火煖催生以五積為要劑今人催生不分寒

活人書入五積散加

皮稍一兩能治死胎化泥而下其藥陳皮厚朴白茯苓木當歸桔梗枳殼川芎赤芍甘草半夏肉桂乾薑白芷

熱例用一方良可晒也

治法主意胎前無實宜以補養為先即有他症母犯胃氣與上中二焦不可汗下及利小便是之謂三禁


上胎前生方四物湯見調經

固胎飲 治胎氣不安或腹微痛或腰作痛或飲食一不喜宜服此方 白朮 當歸 白芍 熟地

錢人參 川芎 條芩 陳皮 芍五 甘草 砂仁 紫蘇 絡二 加薑二片水煎服

催生主方 夏月五苓散 見中暑 冬月五積散 見上

砂香飲 治七八個月心腹疼痛異常者 砂仁 木香 桑寄生 絡二 香附 白芍 當歸 枳榔



各入分

煎服即愈

易產

人參、陳

東胎散

即達生散

妊娠臨月

服之易產

人參、陳

皮、絡、五、白、木

紫、蘇、五、分、大、腹、皮、三、錢、一、水、前、臨、產、服

詩云

誕彌厥月

先生如達

先生首生也

達羊子也

羊子易生而無留滯

故先醫以此名方

婦多是血氣虛弱

故榮衛滯是方也

參、木、甘、草

以益氣歸芍以益血

紫、蘇、腹、陳、疏、其、滯、氣、血、足、氣

順則其生也

猶夫達參

聖佛催生散

治漿盡胎乾

產難急痛者

川、芎、二、錢

當、歸、三、錢、益、母、草、三、錢

製、香、付、二、錢、陳、皮、二、錢

冬、葵、子、服、七、十、粒、炒、研、細、以、酒、調、泥、俟、藥、熟、中、入、溫

安胎萬全神應散

治孕婦三

月前或經惱怒或

行走失跌損傷胎氣

腹痛腰痛一服即安

雖見血

一二日未離宮者加一劑

自安倘先三四五月內

已經半產者將及前月

分略覺腰骨酸脹

忙服一

劑安之過此必安

萬全秘傳屢經試驗

不可加減

百發百中

當歸

酒浸

川芎

六分

白芍

七分

熟地

阿膠

六分

茯苓

七分

甘草

三分

杜仲

陳皮

六分

白帶

或紅

加阿膠

多

加紫蘇

鍾煎

入分

空肚

服如痛急

將銅鍋煎

一鍾

即服

大腹皮

洗淨

積殼

去殼

紫蘇

二錢

香附

難產

奪命丹

治難產

墜下

服藥

猶遲者

好魚

產久

吾曰

催生

之方

此為

神妙

而穩妥

不拘

多少

用香油

燈火上

煎手

燃燒

令焦

碾成

細末

一錢

入麝香

三釐

研入

末內

調服

下自然

易產

如再

遲阻

少頃

刻一

又方

取梁上

有懸掛

下屋

塵垂

下如

繩串

胞衣

不下

如神

治婦人

五七日

不產

垂死者

服之立

加味芎歸散

治婦人

五七日

不產

垂死者

服之立

醫林繩墨

卷之九

胎前四

生

向山堂

生

向山堂

生及矮石女交骨不開者並皆治之
 龜殼一斤自死者佳亂髮一握取人的生過男女婦當
 歸尾一斤洗兩川芎三錢水煎至八分服約人行
 五里生胎死胎並下無死龜殼瑣龜廢殼亦可
 驗胎法經脈不行兩三月時用川芎末空心艾葉
 乃經滯也
 轉胎法治橫生逆產臨產時或見手見足用柘
 樹葉不拘多少用水七八碗鍋內煮熟連飲二碗
 少頃不動又進一碗少頃又進連進四五碗其胎
 藥氣提上自然轉身順下矣先與產婦說明有此
 方決無恙免致心慌神亂
 臨產至妙法凡產婦將滿月腹覺微痛不可便聲
 揚每人家不諳事婦人入房不查時候即多人捺
 扶苦令着力不知時候未到用力無濟甚至橫生
 逆產次則將產時母無力送下為害不小須要識
 候產門腫滿方是時候一用力即生矣如產門未

腫縱肚痛須勉強行走使氣血流動倘體弱倦怠
 痛不能忍即臥牀無妨但用一大枕放在兩腿之
 中令其開而弗閉或坐在尿桶上尤妙
 取胞衣要訣產下如胞衣不來先將嬰孩抱定不
 可斷臍帶用一伶俐老成女眷將右手二指緊跟
 臍帶而上帶盡處將指向上曳寸餘摸之覺有血
 便是包衣逆轉盛血在內不得下即以指連胞衣
 向下一捺其血覆其衣自隨而下法甚簡明每見
 產婦衣不下多服藥或用吐法甚至以足挂腹者
 至喪命小必至于成病不知衣之不下正為嬰
 孩出門臍帶一扯衣必逆轉而上汚血淋下盡入
 衣中以致衣漸滿大不能出夫豈藥力之所能與
 哉故特書之以免此患
 無乳催乳方猪蹄下雙川山甲計七當歸身五錢
 白芍五錢通草五錢王不留行四錢人參三錢
 川芎三錢濃煎汁人酒少許飲之外以葱椒頭
 洗乳卽下如不用乳用麥芽二三百炒熟為末分
 四次湯調服立消

胎前五

乾薑能入
肺分利肺
氣又能入
血分引衆
藥生血然
必與補陰
藥同用乃
可

頭汗者芎
歸湯加炒
乾薑人參
黃芪服立
效

用乾薑夫產後之熱非有餘之熱也或惡露不行而致
熱用黑乾薑借辛溫以行血也或者陰虛生內熱用乾
薑溫中以除熱也炒乾薑性溫入腎經而能行血生血
味辛存陰分而和血補血故補陰藥中用乾薑俱此意
也又有產後之時宜服芎歸湯爲要如惡露上行加童
便惡心如乾薑頓悶加酒香附切不可與寒涼生冷等
治設若產後二三日頭暈身疼發熱腹脹等症當審其
惡露行與不行之謂若不行而腹脹腹痛有硬塊者必
瘀血蓄積而然也宜以溫熱行血之劑治之如芎歸薑

產後血虛
因發熱氣
虛因發寒
氣血兩虛
寒熱並作
只宜補虛
爲主半月
前感有內
外之邪亦
當輕揚表
散如半月
後若有雜
症則不可
專主產後
治療矣此
至訣也

桂香附白芷丹皮紅花益母之類若血行腹內無塊而
惡寒發熱者此係外感風寒不宜大表發汗亦宜溫中
散寒自可以前方中加荆芥炒黑乾薑治之如自汗者
加人參血來多者去桂薑四物加炒黑蒲黃童便之類
忽然運去不知人事者此血虛挾火上行而然也先用
醋蒸酸氣於病者之前以斂神氣後以補血清熱之劑
以定運氣如芎歸炒芍白朮益母童便之屬七日後者
加酒炒芍藥十日後加酒炒黃芩因風寒而作者加炒
黑荆芥又產後中風切不可作風治必宜大補氣血爲

素有痰火
氣血既虧
痰火頓起
作暈者入
物合三陳
湯服

如產後水
腫亦禁導
水泄氣之
藥宜大補
脾胃少助
以蒼朮茯苓
使水月
行而腫消

主然後清痰理氣當用四物湯加香附參朮陳皮荆芥
南星之類中風口眼喎斜者亦不可服小續命湯宜服
前藥加秦艽續斷之類或單用炒黑荆芥亦可產後腫
滿者亦宜調養氣血為先如四物湯加參朮蒼朮沉香
木香之類產後發熱乳汁不通者宜壯脾胃益氣血乳
乃自行者也如歸芎青陳山查葱白天花粉甘草節等
類若乳膨脹作痛者宜當內消用瓜蒌仁粉草節麻黃
天花粉葱白之類慎勿妄用敗毒之藥攻成乳癰亦不
可用涼血等劑致生癥瘕帶下崩中之病也謹之

去血過多
眼花頭眩
昏悶煩燥
芎歸湯加
炒乾薑人
參黃芪服
立效

愚按產後無虛則產初生之下當以行血為要血行不
盡頓悶惡心呵欠眩暈惡露愴心為禍不淺故一日至
七日必須用芎歸湯佐以薑桂紅花童便等味行之而
復下為最妙或用益母童便酒煎於將產時熱服或臨
產時用金銀花酒煎服能使惡血自行隨即就下諸症
不出或用砂糖薑汁酒服亦妙故古黑神散用芎歸生
地薑桂芍藥蒲黃甘草無非溫熱可逐瘀而已蓋敗血
見熱則行見寒則凝也雖有血虛之症並不可用芍藥
心脾之症亦不可用茯苓大熱之症尤不可用黃芩即

遇風寒大忌發散虛勞相兼亦忌大補至於八日以後
氣血平復然後用治少可也

治法主意產後無虛宜以行血為要蓋血上搶心須臾
即死故治者必先逐瘀瘀消然後方可行補雖有雜症
以末治之

附產後辨疑

或問產後氣血大虛縱有雜症以末治之又謂產後須
以去惡露為主二說孰是余謂古人立言各有攸當今
人師古貴善變通假如產後去血過多有血昏作暈虛

狀其脉决然弦浮大散乃陰血既亡陽無所依急用芎
歸大劑加熟附子一錢炒乾薑五分頗服常用醋炭法
使孔竅一開血不能冲甚者用補虛湯縱有滯作痛兼
用行血之藥此所謂大補為本以他症為末也若產後
未經三四日餘瘀卒止腰腹疼痛漸生潮煩口渴咳嗽
臉紅喉腥二便澀秘脉洪實而數是乃敗血停積上冲
心肺緣平日孕時過食酸鹹炮炙熱物留蓄胃口客於
胞胎今既分娩胞胎一下其熱毒與血相搏留結不行
非用莪朮玄胡香附等藥以破其穢血何以得安若徒

知當補不知當瀉病日益劇死日益迫矣此回生救苦丹雖用大黃蘇木紅花等劑不為暴也蓋產後雖為不足之病亦有有餘之症經云陰中有伏陽陽中有伏陰是也故不當泥產後無熱胎前無虛之說假如胎前惡阻少食心腹虛脹三便清滑經水時下胎動不安此非用辛溫之藥曷以起病非胎前亦有虛乎假如產後復得傷寒熱病潮熱煩渴便秘不用苦寒之劑何以解利非產後亦有熱乎今人但見產後六脈浮洪弦緊便說有熱不知產後脈與別病脈不同看產後脈洪大是氣

血耗散內無存蓄故顯是脈如用涼劑其脈愈加浮大弦長妄執脈訣云浮滑弦長命必徂吁既不知用藥之過又不知轉手之能殺人反掌傳習謬悞終無返日深可悼惜故脈訣未可執泥過信在人通變宜病書此以破世俗之見

又奇效醫述云予瀟一婦人產後感寒入裏先清後補得效其治法也一婦年二十餘歲冬月產女其未產前一二日已略感寒產後二三日內因洗手面又感寒身熱頭痛予用參蘇飲發其汗頭痛止而煩熱連日不除

但產後血氣大虛俱不可用峻利藥如遇內傷或外感其勢不得治其標耳故亦可用輕可之品所以無碍

診其脉弱疑其去血多內虛發熱用補中益氣湯服一劑煩熱不減而有加予思產後脉弱其常也而煩熱不除服補不效得非外邪入裏與男子內傷挾外感久而入裏同症乎因用酒炒黃芩酒蒸花粉前胡貝母麥冬桔梗甘草乾葛赤芍連翹童便香附之類清解之服一劑而煩熱減半服至三劑而煩熱悉除粥食如常隨用入物湯二三劑補之而安此婦若拘執治產後常規治之不敢用清解之藥則其熱經旬不除熱久則血氣焦枯變症傳風而死矣以此知病情多端不可執滯隨機

應變神而明之可也予治此一婦因思古人之言亦多有欠周匝欠分曉而不可盡信者朱丹溪輩俱云產後大補血氣為主雖有他症以未治之若拘泥此言而不變通則此婦斷無生路矣今備論之產後大補血氣為主此一言非不有理然用之於無他症者則當用之於有他症者則乖何以謂之無他症如產後或去血過多或勞倦太早以致或五心熱身熱或頭重昏痛或多汗或偏身軟弱無力或骨節酸痛或腰膝運轉艱難而痛此則總是血氣虛弱之症而非他症也此惟大補血氣

則諸症自除不必治也亦非以未治也何以謂之有他
症如產後或洗浴太早而感寒或身觸風涼而感寒或
口吃冷物而感寒以致身熱頭痛四肢痛等症則當先
用參蘇飲之類汗之發散其寒邪而後用補如或寒邪
日久未發入裏鬱為熱邪以致煩燥發熱則當先用清
解之劑除其熱邪而後用補凡此他症皆當先治急治
而大補血氣次之又何可以未治也若視為未不急治
而遽用補劑則反助邪為害鮮不斃矣是以從來產婦
傷寒百不救一二非獨時醫之拙亦古人立法疎漏之

失也予故表而出之以補醫工之闕漏以救婦人之危

亡

產後主方
芎歸湯一名佛手散

治妊婦跌仆子死腹中惡露

妄下疼痛難生又治臨產難生胞衣不下及產後

血暈當歸 川芎 各二錢煎服

四物湯見調經 參蘇飲 見傷風 八物湯 見中風

黑神散黑豆 炒 升 生地 酒 浸 當歸 酒 去 製 肉 桂 粗

乾薑 炮 甘草 炙 芍藥 炒 蒲黃 各 四 右為細末

每服二錢酒半盞童便半盞不拘時煎調服

附效方

產後發熱自汗以血虛治 人參一錢白朮八分白

茯苓八分粉草四分黃芪錢半川芎八分當歸一錢

如發暈氣不和加陳皮熱甚加乾薑誤服涼藥腹

痛作泄亦加乾薑冷厥倍加參朮甚則加附子

一片頭疼腹痛木方去參朮黃芪加肉桂八分

產後七

脾瀉本方加車前五分蒼朮猪苓各六分
加麥冬乾葛烏梅

產後大便秘緣去血過多芎歸湯加麻子仁

產後生腸不收八物湯加防風升麻倍酒芪服

產後陰戶中宮脫突出謂之陰脫 人參 當歸 各

錢 黃芪 三錢 白芍 錢半 升麻 一錢 生薑 煎服

產後鼻衄由氣血散亂不得歸元單益母九童便化

下甚捷如黑氣如煤是胃絕肺敗不治 益母九

益母 半斤 加當歸 三兩 赤芍 二兩 木香 一兩 蜜九

彈子大

產後痢疾四物加桃仁黃連木香

產後瘧疾二陳合小柴胡加白朮 蘇葉 五

分 產後離牀太早外感寒熱似瘧頭痛不歇 生薑 五片 煎

服 寒甚者熟料五積散 熱甚者黃龍湯柴苓

人參甘草切不可以傷寒法治

室女月水不通

夫衝任之脈起於胞內為經脈之海手太陽少陰二經

表裏所屬也蓋女子十四而天癸至任脈通腎氣盛經

脈行血海盈滿七情不擾應時而下則一月一來若憂

思太甚積想過多勞傷心脾飲食失節則多成虛損之

症在男子神色消散在女子月水不通何也憂愁思慮

則傷心而血海竭矣所以神光失散不能發越於面飲

食勞倦則傷脾而血源衰矣所以諸經不能運布而四

肢痿弱且也心傷則不能養脾多見食而畏脾傷則不

能生金常發成咳嗽如是而望其經之行也何可得也
治療之法必爲之養氣血益津液健脾胃使氣勝血足
則經自行藥宜用四物湯加參朮丹皮紅花香附之類
又當究其所因或如平日經通有因他事觸犯而不來
者或因鬱怒滯氣而不行者或因憂思損傷心脾而不
行者或因思想房室不遂而不行者或因氣結而不行
者或因血閉而不行者當從其症而治之如怒傷肝者
加味道遙散主之鬱結傷脾者加味歸脾湯主之思慮
傷心者加味定志丸主之腎經火動者加味地黃湯主

之俱當考究本源發揚心機參而用之此治室女調經
之大法也決不可用通經之藥有傷血海

愚按室女月水不來亦有因於賦性愚濁者蓋愚則血
不通其心濁則氣能鬱其志夫既心志未舒則氣血何
有不閉者哉若夫行而不來是稽遲也阻而且閉是元
虛也雖有一月三月之格半年一年之閉此非病也乃
氣血之薄也然血足則經自來氣旺則經自行不可擅
用通經之藥有傷血室遂使終身有不育之患也

治法主意室女月水不行宜以養血爲上婦人月經不

通宜以和血為要

室女月水主方

四物湯 見調經

加味逍遙散

當歸

芍藥

酒炒 茯苓

白朮

各一錢

柴胡 五分

丹皮

甘草

炙 山梔

水煎服

加味歸脾湯

人參

茯苓

龍眼肉

黃芪

酸棗仁

炒研

白朮

各二錢

木香

炙甘草

丹皮

山梔 一錢

薑棗煎服

加味定志丸

加味地黃丸

痔漏

附腸風

丹溪曰痔漏者風熱燥毒歸於大腸也初則腸中下血
 來如一線上後就來或有糞前糞後二者不定次則肛
 門掀癢指擦成核沿肛腫起出膿出血破而為痔設又
 不謹則通腸穿破或加惱怒則膿水不乾日夜腫脹空
 疼出血必待食飽少可因名之曰漏謂漏泄津液氣血
 也治每多難必須戒暴怒遠房室少勞碌禁薑椒辛熱
 發毒之物其症漏眼自閉若不慎此數者朝傷暮損脾
 氣不能運化大腸日加積滯風邪濕熱化為燥毒蘊蓄

肛中故成牛妳成鼠妳成雞心成雞冠成蓮花成通腸
成蜂巢成外痔內痔成腸風臟毒形雖不同其病則一
治療之法治痔則宜涼血降火如槐花生地歸梢赤芍
芩連地榆枳殼連翹秦艽大黃之屬治漏則宜瀉火和
血用芩連苦寒以瀉火當歸辛溫以和血在下重墜痛
者以升麻柴胡提之燥熱拂鬱以大黃生地麻仁枳殼
潤之瘡口久爛不收者以參芪歸木補之風勝作癢者
以防風秦艽驅之作腫作脹者以連翹金銀花散之再
能絕慾止怒無有不安者也再觀痔漏之源痔輕而漏

重痔實而漏虛實則可瀉虛則可補痔止出血始終是
熱漏出膿水雖曰濕熱治宜祛風散濕風行則熱自解
風勝則濕自散矣吾嘗用槐角黃連爲末入猪臟煮熟
爲丸米飲送下屢用屢驗其漏不疼又無重墜水亦少
來默然輕快誠爲好方家常秘之再加保養果能一年
絕慾漏孔俱實並不發也否則非惟又發抑亦漏孔多
出終身之害或者不知事體妄施別法用割用爛或用
掛線之法此但可行於少壯之時若中年多病虛弱反
致有喪身之患也慎之慎之

愚按此症在上人多有之若奔馳勞苦之人則無此症者矣蓋上人多食熾燻酒麪膏粱肥厚之物朝夕坐臥而不行腸胃積滯而不散加之色慾以陶其情兼之忿怒以動其志腸糞不能流利濕熱聚而成毒所以膿水不乾便紅又出此下元之致虛也欲其痊可必須窒慾治法主意治漏必絕其慾治痔必遠其怒慾怒不行痔漏自可

痔漏主方
白製臍連丸 許本症

附效方
五根薰洗方 治痔初起即已成形俱即內消

韭根 艾根 楮根 芎藭根 枸杞根 用水
三瓢煎至二瓢半置罈內先燻候水溫再洗一次

即好屢試屢驗
一套三方煎藥方 一套三方用此藥治其痔並肛
再不出矣 荊芥 防風 連翹 牛旁子 金

銀花 防己 茯苓皮 大腹皮 何首烏 威
靈仙 升麻 苡仁 胡麻仁 槐角 地榆

玄參 各等分 燈心二十節 水煎先服四劑
一套三方洗藥方 大皂角 五楮子 各五錢 用

水煎燻洗
一套三方敷藥方 胡連 山豆根 龍胆草 蘆

蒼 宣黃連 川黃栢 青黛 各一錢 水片 五厘
共研為極細末先將前藥燻洗過再將此藥末以

茶子油調勻用鵝翎搽之數次即愈

秘傳痔漏內消丸 不問通腸等漏皆治
棕間灰 一兩 髮餘 二兩 枯礬 一兩 刺蝟皮 一個 醋
牛角腮 一個 燒防風 五錢 槐角 五錢 黃連 二錢 一兩
白木 炒一黃芩 炒五錢 地榆 炒五錢 川山甲 尾 炒成珠

一方止用
犀角山甲
川連歸尾

野全蠍
甘草節象
牙末各一
兩破琉璃
刺蝟皮地
榆渾栢葉
各二兩犀
甲琉蠟俱
醋炒成珠
丸亦如下
法

醫林繩墨

卷之九

三

向山堂

苦參皮一兩 石菖蒲一兩 猪蹄殼二十個 雷丸一兩
 胡麻仁一兩 漏蘆一兩 蕪荑一兩 青姜香五錢 象
 牙末五錢 乳沒各三錢 共一處加麝五分 用黃
 蠟四兩加麻油一兩和藥為丸 梧子大每服一錢
 日服二三次 乾膿止痛 褪管生肌
 退管驗方 用烏雞一隻 煮熟取兩足骨去髓入藥
 在內用確封固 打火一香 取出為末 以紙糊為
 條 插入管內 其管自出 藥用豆漿煮過 白砥六
 日 礬水銀三味 合插極細 納骨內 入確打
 治漏笑出方 驚頭一個 外用泥包裹 入火內煨烟
 盡為度 取出去火毒 為末 以驚胆汗調敷 上神效
 先以驚湯煎荆芥 洗淨 始敷 藥并治脫肛
 全蠍丸 治裏外痔瘡 如神 全蠍用淨洗 淨
 去頭雄黃 白礬各三象皮二兩 炙用 乳香去
 油沒藥油去 右碾細末 用黃蠟二兩 溶化 揉勻
 為丸 桐子大 空心每服七粒 茶酒俱可
 神驗丹 此丹治二十四種痔漏 白礬二兩 砥六
 將此二味 張合一處 煉煨 以色如白粉 全無氣味

為度 自然銅 粉紅醋 碎為 同前藥 共研一處 為
 主藥 再加 乳香 油去 沒藥 油去 硃砂 各五 雄黃
 一錢 輕粉 五分 冰片 一分 用紙裹藥 麪糊為條 子
 先以軟草心 探其淺深 依淺深 插入 漏孔內 每日
 早中晚 進藥 三次 待其管 出再用 生肌散 收疤 倘
 或通腸者 用芫花 池濃汁 浸絲 穿過 掛開 亦用 生
 肌散 收功 如外痔 只消 砒礬 蛇含 石之藥 每兩加
 雄黃一錢 乾沒水 片皆不必 用
 生肌散 赤石脂 一服過 白龍骨 煨 乳香 炙 沒藥 炙
 兒茶 血竭 輕粉 海螵蛸 各一 分 過 黃丹 過水
 紅片 其為末 如要速愈 加象皮 灰白蠟 珍珠末 水
 片各二分 極效
 護肛膏 如入前藥 恐毒水 淋於兩傍 生小瘡 先以
 此藥 護之 始上前藥 鬱金 白芨 黃連
 等分 為細末 清水調敷 肛上
 殺虫去管 槐花丹 粉霜 四分 歸尾 四分 血竭 一錢
 硃砂 四錢 槐花 微炒 各一兩 六錢 曬乾 沉香 五分 丁香
 乳香 沒藥 血餘 錢一兩 六錢 牙皂 大黃 白芷 稍

醫林繩墨

卷之九


三

向山堂

陳棕灰 銹二牛黃 水片 麝香 五木香 兒
 茶 入 共為細末 用菜豆粉打糊為丸 如黍米
 大 每服九釐 日進三服 用土茯苓牙皂半枚煎湯
 送下 升粉霜法 水銀一兩 鉛十錢 礪砂石黃
 錢 各一 硃砂雄黃 各五分 錢 砒胆礬 各一錢
 錢 共為末 入陽城確如法升打取用 鹽礬硝皂 各
 天下第一方 杏仁 十四粒 燒去尖 針挑 輕粉 一錢
 兒茶 七分 水片 二厘 共為末 雄猪胆 汁調敷
 一方 加雄黃 無水片 三日即愈
 冬青 槐角 丸 冬青子 炒 槐角子 炒 生地 酒洗 荆
 芥穗 炒 黑各 川黃連 炒 黑 川歸身 酒洗 側柏葉 茶
 水 煮 各 一兩 右共為末 水糊加醋少許為丸 每次空
 心滾水吞二錢

瘡瘍

大者為瘡小者為瘍由熱毒蓄於臟腑發於肌肉為瘡
 為痛為膿為腫為脹原病式曰瘍有頭小疹也經曰諸
 痛癢瘡瘍皆屬心火又曰微熱則癢熱甚則痛腐近則
 灼而為瘡雖係心火之有餘而實風濕之相搏也蓋因
 濕熱蓄於肉理乃生燥癢風濕流於肌肉乃成潰爛風
 熱發於皮膚乃生瘡瘍治療之法風勝者當驅其風熱
 勝者當清其熱濕勝者當燥其濕是治之之活法也吾
 嘗用之不驗不若以當歸芍藥養血為君黃芩黃連涼



血為佐連翹防已驅風為臣生地苦參和血為使少加防風白芷以達乎皮膚天花粉金銀花以解其蘊毒隨用隨效未有不收其功者也

愚按諸痛癢瘡瘍皆屬心火當以治火之法行之此治病求本之說也藥無不驗若依治風治濕之論而用燥烈之劑是謂抱薪救火不惟無功後反加重惟以涼血和血敗毒之藥治之自無不漸輕漸減者

治法主意瘡瘍宜以涼血和血之藥服之於內油潤殺虫之藥擦之於外

瘡瘍主方
養血和血驅風解毒方 詳本症

附效方
膿窠疥瘡十劑永不生方 金銀花 防風 荆芥

當歸 黃芩 何首烏 蒼朮 黃柏 羌活
獨活 茯苓 白芍 枳殼 陳皮 甘草

五分 升麻 水二碗煎入分半飢時服臨服
加熱酒一大杯或服後飲酒亦可
治膿窠立驗方 當歸 甘草 金銀

愈如前加酒更妙 藥共二兩水煎服三服後全
疥瘡除根方 川椒 獐腦 石硫 火煨牙

末再用硫黃二兩用鹵醋煮數十次候乾用火溶
化急將前藥入硫黃內攪均滴於磚地下過一宿
去火毒收起作大丸如澡豆搽瘡

治大膿窠經驗方 豬胆汁以鵝翎塗搽隨搽隨愈
下府方 不用製藥凡人點眼藥有芦甘石珍珠水

片琥珀者取來用金銀花地骨皮甘草煎水洗過
搽上即愈或少加去油乳香沒藥更妙
坐板瘡方 乾西瓜皮一錢 孩兒茶五錢 以上
共為末瘡時擦破搽之

香油調搽 花椒一兩 白礬煉一兩 硫黃二兩 共研末
末敷上即好

內外膝瘡綠玉膏方 黃蠟二兩 提過松香四兩 白蠟五
輕粉五錢 杏仁五錢 銅綠五錢 煇麻子調勻 多
右共搥干餘下成綠色色勻為度磁瓶盛貯遇患
者熱水捏開貼之先將苦茶洗淨用布縛緊每日
一洗去藥上膿又捏開再貼之即愈

定痛生肌杖瘡膏 乳香五錢 血竭五錢 象皮五錢
未龍骨五錢 煇麻子五錢 水片一錢 牡
嗎鼓一箇 煇麻子五錢 以上入味共研細末先用麻
油十二兩 猪板油淨四兩 入砂鍋內下海頭髮二
兩 雞子清五六筒 同熬俟油滴水成珠入白蠟二

兩黃蠟二兩 洋淨再入滾水泡過飛淨黃丹二兩
鉛粉二兩 用槐條急攪成膏取起離火入前細藥
如遇杖者先將韭菜葱頭猪肉三味煎湯淨洗後
膏塗患處再將油紙貼上加棉花裹好再用布包
毋令出氣一日一夜換洗一次如打見骨者再加
細藥滲上患處其痛立止不二七即行走如故矣
忌房事並諸發物

白玉膏 治賺瘡及脚腿上一切瘡 鉛粉一兩
輕粉三錢 白蠟 黃蠟 五各一分 錢 朝腦腦三分 水
猪脂調於油紙上貼之 神效加紅粉霜更易收口
升打紅粉霜方法 凡脚上賺瘡及一切瘡不愈者
用紅粉霜少許滲於應貼膏藥上略烘熱貼之次
日即收口神驗 水銀 火硝 晒乾 明礬 去油淨
兩一 共和研勻一處再將小鐵鍋一箇燒去油淨
以前藥安入中間上蓋以圓磁碗一箇有確的好
無確的恐藥粘入難以取下覆密碗弦上用大紙
搥一條水微濕圈圍封固紙搥上再用篩盡香灰
灰過圍蓋密約有半碗高再以香匙按緊倘打火

時有些微煙氣出急將香匙又緊按碗底常以水
刷之鍋下架炭火先文後武打三炷線香取起冷
定掀蓋碗內刮下即成紅粉霜治各項諸瘡極能
生肌長肉收口如加鹽皂礬同打即成白粉霜

治湯火瘡 用絲瓜花葉搗爛敷之即止痛散毒無
花單葉亦可

又方 凡遭此患不可下冷水惟以溫酒浴之以雞
子清調黃栢末搽患處立止痛

附楊梅結毒受病之源用藥之異論 出醫說備錄

夫楊梅一瘡非內因非外因正經謂不內外因也何言
之人之精周流一身骨節上徹泥丸下通尾闕尾間有
竅衣狀如笙簧每交姤時慾火冲開竅衣精從竅泄值
不潔之婦內藏惡毒之氣乘其精出竅空惡氣鼓射而
入竅衣閉合其毒逆上泥丸轉降斷交傳入五臟散及
周身瘡始出焉凡治是瘡當遵古道先扶正氣次伐病
邪毒盡瘡自愈矣患者茫然欲求速效醫者圖利思邀
近功過用硝黃巴丑瀉傷元氣或投硃粉水銀毒留筋
骨或點胆菘杏霜以閉毒門種種霸藥不能枚舉然病

弱之人受此戕伐必喪其軀即不然而綿延日久釀成
結毒在筋筋痛在骨骨疼在上則蝕頂崩鼻在中則癰
喉蛙幹在下則腐廉爛足甚至毒流胎孕殃及子女仍
有偏身麻木手足拘攣角弓反張穢汚呼號不減阿鼻
夫醫仁術也古人用王道以生人今人投勦術以戕世
可不慎歟予秘得一方求之雖甚艱辛驗之真為蓋世
名曰先天一氣湯輕者二三十貼重者四五十貼終身
廢疾不兩月而痊矣其病愈後身肥氣壯永無後患敬
將本方次第錄於左

先天一氣湯 專治多年楊梅結毒輕粉毒不收口
筋骨疼痛晝夜呻吟并手足拘攣角弓反張梅瘋

等症

皂角樹皮俱身機剉片每斤用食鹽二兩半木柴

灰二兩半米醋六兩無灰好酒六兩拌勻炒乾每

眼用藥一兩二錢 獾猪肉四兩好土茯苓四兩

水四碗煎肉熟為度取肉切碎酒下藥汁多作二

次少作一次服上部食後服中部食遠服下部空

心服渣再煎中時服渣三煎臨睡服多煎亦可代

茶一日一貼切莫間斷服三四貼後或手足酸軟
 遍身反疼是藥追毒出之驗不必驚疑至十貼自
 效肌肉漸生服至瘡好精神倍常忌燒酒牛肉茶
 房事患者如是教門以羊肉同煎
 上部加桔梗川芎升麻頂上再加藁朮面上再加
 蔓荆子中部依本方下部玉莖陰囊加猪苓
 澤瀉葛足加牛膝木瓜防己薏苡仁
 又秘傳仙遺根散專治遠年楊梅風漏筋骨疼痛
 輕粉毒仙遺根二斤土茯苓荆芥五錢防風五錢
 五加皮五錢白蘇皮五錢威靈仙五錢木瓜五錢
 生地酒洗當歸酒洗白芍炒兩兩白茯苓一兩川芎
 一兩牛膝酒洗杜仲炒去絲白芷一兩地骨皮兩
 青風藤一兩槐花一兩黃連一兩
 共十九味咀片作十貼每一貼用水一鍾半白酒
 一鍾煎熟瘡在上食後服瘡在下食遠服渣再煎
 每一日服一貼煎二次合為一處使濃淡得均分
 作二次溫服其藥渣逐日曬乾至三貼共煎湯洗
 浴初服五貼之內瘡勢覺盛乃毒氣攻外勿懼輕

者至十日內可見效重者雖服二三十貼無妨此
 藥亦補元氣但要切忌房事茶生冷煎炒雞鵝羊
 牛血蝦猪蹄首各發物動風之物味只用雄猪肉
 而已

治楊梅瘡效方

當歸二錢 蟬退 金銀花 土茯苓 各一兩 人退 指即人
 後用羊肉啞頭生酒恁醉覆被取汗服三次遍身
 出紅點此藥驗立愈恐有餘毒再用全蝎洗淨一
 兩焙乾為末用白糖一兩五錢拌勻以核桃肉四
 十箇蘸藥同吃永無後患

楊梅瘡神方

水楊柳根 三錢 細辛 木通 皂角刺 各入當歸
 二錢 土茯苓 四兩 如楊梅者河邊小樹上生子
 共作一大劑生酒一碗水一碗煎至一碗服之七
 劑全愈十劑無有不效

五聖丸

治梅瘡如神
 川大黃 四兩 先用酒浸半日後用酒將大黃全蝎
 煮爛入酒後藥在內濃搗為丸

醫林編覽

卷之九

三

向山堂

按如豆瘡成凹不起者不治毒如陽毒者可治毒如陽
毒流水者難治作癢而無膿者不治其初起也宜與以
大劑真人活命飲以散其毒氣既則用前法敷之若係
發背癰疽對口腫毒其症多起於七情六慾忿怒鬱結
煎炙厚味或服種子壯陽燥劑以致腠理秘固氣盛於
內經云氣盛則火有餘火有餘則癰疽生故癰者壅也
疽者阻也氣血壅阻輕者趕於六腑屬乎陽名癰主面
赤便秘寒熱交作紅腫高大根清皮薄氣熱炙手晝夜
疼痛勢雖兇猛宜以性平藥解散為主重者趕於五臟

屬乎陰名疽根大毒沉面色青慘見食惡心大小便如
常骨間隱隱而痛腫與肉色稍異勢雖覺緩其症陰惡
外急宜隔蒜灸之內服薑桂辛溫之劑轉陰爲陽此妙
理也倘錯認其候或宣或下或以寒涼圍貼毒不能出
勢必內攻變症百出死生反掌又有一種大毒初起癢
入骨髓口渴飲水嘔吐不食似陰非陰似陽非陽最惡
之候不遇良醫混投以敗毒涼藥血復受寒肌肉變黑
遂成危殆良可痛也雖治毒舊有汗下二法然下之當
止救目前之急潰後必難收口若下之不當則爲害不

小矣慎之慎之至於疔腫惟以菊花一味夏苗冬根搗汁酒服未有不輕者也

治法主意惡毒惟以內托解毒勿用涼藥

腫毒主方

榮胃返魂湯

又名通順散又木通尖去皮赤芍藥炒白芷不見

何首烏不犯當歸陳枳殼加薑汁炒惡心甘草

右方止此九味各等分水酒湯使隨證用之水酒相半亦可惟流注加獨活每服四錢病在上食後服病在下食前服此藥扶植胃本不傷元氣蕩滌邪穢自然順通不生變症真仙劑也凡流注癰疽發背傷折非此不能效至於救壞病活死肌疔患於未萌之前拔根於既愈之後中間君臣佐使如四時五行更相迭旺隨症加減其效無窮何則此藥大能順氣勻血故也夫氣陽也血陰也陽動

則陰隨氣連則血行陽滯則陰凝氣弱則血死血死則肌死肌死則病未有不死者矣必調其陽和其陰然後氣血勻二者不可偏廢只調陽不和陰則氣耗而血凝肌必不活如五香連翹之類是已只和陰不調陽則血旺而氣弱疾必再作如內補十宣之類是已然二藥亦須參用不可執一為妙用法列之於左

一發背既久不愈乃前醫用涼藥過也涼藥內傷其脾外冰其血脾主肌肉脾既受傷飲食必減血為脈絡血一受水氣復不旺肌肉糜爛宜于此方中去木通少用當歸倍加厚朴陳皮盛則用家傳對金飲子又盛則加白豆蔻之類為妙一凡治流注可加獨活流注者氣血凝滯氣滯則血注此藥可以動蕩一身血脈血脈既動流注何有流注起於傷寒傷寒表未盡餘毒流于四肢經絡流于所滯而後為流注也如病尚有潮熱則裏邪未散此方中可加升麻蘇葉如服此而熱不退可加乾葛如有頭疼加川芎並用薑水煎如無潮熱

可用藥者人虛弱者尤宜去之
於用藥者人虛弱者尤宜去之
者不可便用此方宜先用止瀉藥
溶開黃蠟為丸米飲下三十九丸
蓋人身以血氣為主病癱之人氣
膿若臟腑不固必元氣泄而血愈
能順氣故也一此藥丸散末皆可
時裁度用之病者如有熱痰咳嗽
富沉香貧蘇葉湯皆可下丸用蜜
但治癰疽發背傷折至于男子婦
人疝氣血氣皆

可用屢獲效矣有一婦人患氣疾
塊痛嘔逆水漿不下一發便欲死
香湯下一服嘔止再服氣順疾遂
皆不脫此方但加減有瘥如尋常
心胞並皆治之在頭上則去木通
皮常用加丁皮蘇葉能活血加破
破宿血水煎熟用濃酒一盞侵入
黃末空心服之如通順藥只四服
黃後二服不必用一經年腰痛加
以酒煎服一脚氣加栝榔木瓜穿
之 一宿痰失道凡胸背頭項腋
聚腫硬或痛或不痛急於此方中
藥以治之一肚腸內癰宜服十宣
間用之並加忍冬藤此藥最治內
實或通或補補須用附子通則用
實則此方亦自能通順十宜自能
也

蟾酥解毒丸

蟾酥

二錢 輕粉 五分

枯礬

寒水石

蝦銅綠 乳香 沒藥 胆礬 射香 雄黃
二錢 蝸牛 二寸 硃砂 三錢 以上各為末稱準于

端午日在淨室中先將蝸牛研爛再同蟾酥和研
稠粘方入各藥共搗極勻丸如菉豆大每服三九
用葱白五寸患者自嚼爛吐于男左女右手心包
藥在內用無灰酒送下蓋被出汗為效甚者再進
一服修合時忌婦人雞犬等見

十全大補湯 見中風

異授真人活命飲 治一切惡毒疔腫如神

穿山甲 炒片 蛤粉 天花粉 甘草節 白芷
赤芍 貝母 防風 乳香 陳皮 沒藥 皂角刺
各五當歸 射在頭用 在尾 用 陳皮 五錢 金銀花
三錢 若在背角刺為君 在腹赤芍為君 在

胸加瓜 蔓仁 二錢 在四肢金銀花為君 如疔瘡
加紫河車 三錢 如無河車即加金綿重樓到一劑
用好酒二碗煎一碗溫服煎法須用瓶以紙密封
瓶口勿令泄氣服時看瘡之上下飢飽服之能飲
者藥後再飲數杯此藥不動臟腑不傷元氣血脈

忌酸物鉄氣服後睡覺痛生即回生矣其神功治
大不可臆度當服于未潰之先

神授衛生湯

治一切癰疽未成者即消已成者即

潰能宣風行瘀活血解毒消腫疎通臟腑藥性平
和功效甚速 羌活 八分 防風 白芷 穿山甲
研炒 沉香 紅花 連翹 石决明 煨各 金銀花
皂角刺 歸尾 甘草節 花粉 各 六分 乳香 五分

大黃 酒拌 炒 二錢 脈 水二碗煎八分病在上部
先服藥隨後飲酒一杯病在下部先飲酒一杯隨
後服藥以行藥勢

內消散藥治一切無名腫毒能令內消化毒為黑水
從小便而出 金銀花 知母 貝母 天花粉

白芨 半夏 川山甲 皂角刺 乳香 各一
酒水各一碗煎八分隨病上下食前後服之藥渣
搗爛加芙蓉葉細末一兩白蜜調敷一宿自消

內固散 服此預防毒氣內攻以免變症
茯苓 辰砂 人參 玄明粉 白芷 甘草

乳香 明雄黃 各二錢 水片 一錢 真菘豆粉 六錢
右為細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時候

托裏散 凡毒已成不得內消者服此以托之
人參 川芎 白芍 黃芪 當歸 白朮 白
茯苓 金銀花 各一錢 白芷 甘草 皂角刺 白
梗 各五分 水二鍾煎八分食遠服脾弱者去白芷

回陽三建湯 治陰疽發背起不疼不腫不熱不紅
硬若牛皮堅如頑石十日外脈細身涼者倍人參下加牛膝

或根脚平散軟陷無膿又皮不作腐手熱足冷者
急宜服之 附子 人參 黃芪 當歸 白朮
茯苓 枸杞 陳皮 黃肉 各一錢 木香 甘草

紫草 厚朴 蒼朮 紅花 獨活 各五分 煨薑
三片皂角樹根上白皮二錢水二碗煎八分入酒

一杯隨病上下食前後服之服後手足溫暖瘡毒
發熱掀腫疼痛是藥之效再以別治之

三香定痛飲 木香 黃芪 紫蘇 人參 厚朴
甘草 桔梗 官桂 烏藥 當歸 白芍 白

芷 川芎 防風 乳香 沒藥 右用薑三片
棗二枚同煎食後服

千金內托散 當歸 芍藥 白芷 川芎 羌活
桔梗 川山甲 皂角刺 各一錢 連翹 二分 人參

官桂 各七分 黃連 甘草 各五分 水煎食遠服此方
妙在用人參官桂庸醫不知而誤去之即無效矣

奇驗灸法 治無名腫毒初起灸之立愈 取公雞
糞不拘多少收起晒乾研為細末臨用時拌入真

蕪艾內丸 如黃豆大每于瘡頂上灸數狀不必以
火至根又換一九灸之初起即時消散神驗

飛龍奪命丹 治一切疔瘡腫毒惡瘡神效
蟾酥 酒化 血竭 一錢 乳香 二錢 沒藥 二錢 寒水石
一錢 雄黃 三錢 輕粉 五分 胆礬 一錢 射香 五分 銅

綠 二錢 雄黃 三錢 輕粉 五分 胆礬 一錢 射香 五分 銅
去頭足金黃頭黃肚黑背肥者不用為末將蝸
牛研為丸如菘豆大蝸牛少不殼和藥以酒打糊
為丸每服二丸服法同蟾酥解毒丸

醫林綱目 卷之九 腫毒六 向山堂

湯發雪 梅花片 當門麝 五輕粉 辰砂 各六分
 酥乳香 沒藥 瓜兒 明雄 各一錢
 酥于端午辰時製度候至午時將上藥九
 準分數于端午辰時製度候至午時將上藥九
 味和入蠟酥膏內向日丸之如茄種大一時內晒
 乾用川椒二十七粒燈心二十七段同藥收入磁
 瓶內養之以蠟封口不泄藥氣為妙凡遇惡瘡大
 毒取出以一粒先食飽用無根水漱淨口內再含水
 一少頃待溫用葱白五寸同水嚼爛下隨將
 藥餅安放舌下睡于煖處以被覆蓋藥化苦水徐
 徐嚙之毒勢大者二三餅亦可藥盡汗淋諸病如
 失如冬月難汗喻後將葱白湯催之若失治入裏
 人昏沉者不能依法急用連鬚葱白五段煎酒一
 杯研藥五餅灌之即便甦醒此外科第一奇方也
 神燈照全方 佛乘盧萬鍾日余治癰疽發背無分
 陰陽不用宣下之劑不敷敗毒之藥使毒氣疏暢
 百用百效一入病家先用蟾酥點舌丹拘毒不令
 走覺次服漏蘆湯開其腠理毒隨汗散外以神燈

照之毒得照提隨火而出照之久其毒盡散輕
 者自平毒甚肉腐照久自化為膿不礙不穿近世
 用此法有不效者以外科諸書失漏蘆湯方故也
 膿出後內塞以白玉膏外科貼以太乙膏此五法最
 穩當者如法循序而行何患癰疽不愈哉今將各
 方開列于左
 點 舌丹 真蟾酥 乳三錢 真麝 三分 蜈蚣 三條 川山
 甲 三錢 全蝎 薑蚕 去 蟬退 明雄 黃 硃
 砂 錢 一 乳香 沒藥 各 五分 共為細末用乳浸蟾
 酥搗為丸菘豆大每至病家先用二九置病人舌
 下頃刻口舌覺麻將藥三九包于葱內用無灰熱酒
 送下急煎漏蘆湯服外用神燈照之但疔毒一症
 有急疔已走細看疔上有紅筋一條或上或下即
 于紅筋盡頭以針挑破納藥一丸子針眼上膏藥
 蓋定其疔自回原處春夏秋急尋菊葉冬尋菊根
 同葱搗爛裹吞左用神燈照之
 漏蘆湯主方 如治便毒加猪苓澤瀉煎服

神燈

神燈

神燈

漏蘆 紫花地丁 荆芥 當歸 連翹 薄荷

白芷 升麻 各一錢 在上部加川芎 桔梗 面上加

蔓荊子 中部依木方下部加牛膝 木瓜 薏苡仁

如紅腫勢兇大便秘結加大黃三錢 麻黃三錢 甘

草四分 水二鍾 煎八分 熱服出汗 大便不秘 減大

黃錢半 次日紅腫盡退 只用神燈照之 若紅腫未

退 依主方加大黃 麻黃各錢半 甘草一錢 服後腫

消 止服若紅腫未盡 主藥及加藥各一錢 五分煎

服無不效者 神燈照 治對口發背 腦贅 疔瘡 癰 疔

毒一切不識惡瘡 並效 真血竭 大硃砂 明

雄 紙裁條長六寸 潤三指入藥 三分成 搥真麻油

綿紙 將患人坐定 燃離肉半寸 周圍照之 卽外

浸透 將患人坐定 燃離肉半寸 周圍照之 卽外

旋內 至中央 猛力向外 一提及 次如法 毒小照二

三 燃止 勢大照五七 燃止 每日照二次 不拘日數

輕以毒散 止照若勢已成 膿以膿出 腫消 止照如

膿出 紅腫未退 宜連服 湯蘆湯尚不可 止照直待

紅腫消盡 方止 膿水洗盡 以白玉膏 攤黑膏藥中

心貼之 腐肉自化 新肌自生 腫痛自減 若是陰疽

照後 腫疼必甚 此陰變為陽 起死之驗 慎勿疑是

火毒之過 亦勿以為庸常 棄之 雖兇毒亦可回生

太乙膏 貼諸瘡 治諸病 有引載于古方 未錄

生地黃 貼諸瘡 治諸病 有引載于古方 未錄

肉桂 各一兩 文火熬 柳條急攪 以滴成珠 為度 入瓶 埋土中

斤浸三日 文火熬 柳條急攪 以滴成珠 為度 入瓶 埋土中

文火熬 柳條急攪 以滴成珠 為度 入瓶 埋土中

七日去火毒 取出紙布 任攤中 塗白玉膏藥 貼之

重論前症 經云 若見小異 必當大驚 又云 外貌如

錢裏可有燎原之勢 所用神燈照法 當看勢之大小

微已有燎原之勢 所用神燈照法 當看勢之大小

自毒外照 起漸次入裏 旋至中央 用力向外 一提

其燈必滅 卽當剪去 燃過燈 煤重燃 再照 條一次

次皆如此 法照過一次 其毒上皮膚 覺有縐形 一日

矣 勢如拳大者 照久毒收 於中及膿出時 不過如

錢而已凡看毒若皮軟大熱以手按下手起即復
定是有膿恐皮厚一時難穿不妨從權用針砭穿
亦不疼痛膿出後即以太乙膏內塗白玉膏緊對
瘡口貼之瘡口自不再生合任其膿出毒盡肌肉漸
生自然平滿不必多方始見神異其不憚反覆重
論者恐人不如法而少效皆棄之不用不獨辜吾
敷藥或照不如法而少效皆棄之不用不獨辜吾
至念反將有用之奇方置諸無用矣高明詳察焉
去腐白玉膏專貼結毒粉毒疔疔爛癰一切癰疽
頑瘡臘月取猪板油切碎鍋熬勿焦去渣凝後
始白用四兩黃蠟淨者化開傾磁盤內露二三夜
自白用一兩白蠟淨者一兩真鉛粉二兩龍骨
螺蛳象牙末鳳凰退焙真雞內金乾不現水陰
乳香沒藥各去真輕粉各俱研細樟腦研末放
粉霜在打法冰片二分
銅盆內以大碗蓋定濕綿紙封口上用生麩調糊
厚塗紙上以微火離盆底拳高少頃冷定取升上
碗者用四錢先將猪油人銅鍋內重湯煮化投黃

白蠟次下鉛粉攪勻離火方下龍骨等味待將凝
下水銀急攪緩則沉底末下樟片再攪極勻磁礮
收固每用少許攤於黑膏藥中心腐肉自化條條
片片粘聯而下方見神功
收口紅寶膏專治頑瘡結毒去疔長肉收口如神
松香一兩大麻仁三錢銀硃乳香沒藥各三
錢輕粉錢先將麻仁搗爛次下松香再搗成
膏方入衆藥搗干餘下磁礮裝重湯頓化每用少
許填瘡口內外以黑膏藥固之
護心散大凡患癰疽者見食惡心即是毒氣攻心
矣急宜服之真菜豆粉錢乳香末一錢
研酒調服之傷寒流注冷毒癰腫或誤用涼藥
醫壞已成附骨疽者用醋煮桑葉同葱加蜜搗為
膏敷上半日後發痒痒後方疼變為好症始用前
方治之
觀音露治諸般惡毒瘡疽用小蝦蟆骨獨裝酒
瓶內入皮硝四兩埋陰處四十九日取出化為水
遇腫毒着筆粘水從外腫密圈至中即結一紅疱

醫林通墨

卷之九 腫毒九

單

月

醫林繩墨 卷之九 向山堂

又一方 針刺出血立愈且奇速驚人
清明日取蝌蚪即蝦蟆用大毛竹筒兩頭

留節節上開一小孔裝蝌蚪入竹筒內又將硃砂一

兩五錢雄黃五錢真麝香五分共裝入竹筒內以

桐油灰如捻船封固不可泄氣放在廁內三七之

期開筒取汁水并硃砂雄黃麝香研細入磁罐內

收藏凡遇患者將新羊筆塗上即愈如藥乾瘡好

仍掃前藥入罐後用
治發背及無名腫毒仙方
用白蘇二兩味二兩咬咀或為粗末以好酒煎熟去

渣空心服下其瘡即促起亦不疼痛捺着如棉絮

總不疼也即有頭出些紫血即愈真奇秘仙方也

治各樣腫毒敷藥方
無名異大黃生白礬各等分共為末醋調

敷患處極效
治便毒方
皂角刺生用五錢川山甲火煨一兩白礬一兩

煉蜜為丸空心好酒送下三錢服一次其毒即內

消也即成膿亦從大便而出也

治便毒內消神方
用蜈蚣三條研為細末再用黃蠟三錢咬咀如

二味拌勻五更空心用頭生酒照量將前藥一次

服下出汗為度遍身隱隱發出紅斑如刮沙樣者

是其驗也其毒即漸漸內消後亦不發瘡誠驗過

仙方如未愈再服一次壯實者可服得三次無不

醫林繩墨大全卷之九 終

醫林繩墨 卷之九 瘰癧十 巳





