

且精滑甚玉莖絕舉其精即流目見婦人精即  
注下夫婦之私皆廢背心痛如被椎兩耳皆聾  
腰痠膝軟此大虛症也用補天丸加上澁之藥  
鹿茸沙苑蒺藜白蟬之類服之一月精固二月  
耳聰而背心痛上次年育女

仲景云夫失精家少腹弦急陰頭寒冷目眩髮落  
脉極芤虛遲為清毅亡血失精脉得諸芤動微  
緊男子失精女子夢交以桂枝龍骨牡蠣湯主  
之

桂枝

白芍藥

生姜

牡蠣

煅

龍骨

煅

各

甘草

二兩

大棗

十二枚

作八帖水煎服

豬苓丸

半夏

一兩剉如豆大

猪苓末

二兩先將一半炒半夏色

黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大  
候乾更用前一半猪苓末子同炒微烈入砂  
瓶內養之空心溫酒鹽湯下三四十丸常服  
于申未間溫酒下○蕭氏云此古方也今盛  
行于時而人多莫測其用蓋半夏有利性而

猪苓導水緣腎司閑藏久用瀉藥及有欝滯  
用之使氣通而欝散予醫囊中嘗貯此藥緩  
急與人三五服皆隨手而驗又云詳治夢遺  
方屬欝滯者居大半庸醫不知其欝但用龍  
骨牡蠣等瀉劑固脫殊不知愈瀉愈欝其病  
反甚常治一壯年夢遺白濁少腹有氣冲上  
每日腰熱卯作酉涼腰熱作則手足冷前陰  
無氣腰熱退則前陰氣耕手足溫平旦多泄  
屁暮多噫時振隔一旬二旬必遺脉朝弦滑

而大午後洪大子知其有欝滯也先用沉香  
和中丸大下之次用四物湯吞滋腎丸百粒  
若稍與蛤粉等瀉藥則遺與濁反甚或一夜  
二遺遂改用導赤散大劑煎湯服之遺濁皆  
止漸安又一中年夢遺醫或與瀉藥反甚連  
遺數夜愚先與神芎丸大下之却再製此猪  
苓丸服之皆得全安又丹溪先生治鎮守萬  
戶蕭伯善便濁精滑不禁百藥不効試倒倉  
法而安于此見夢遺屬欝者多矣

嘗治丁氏一友壯年軀肥而色蒼善飲酒常兼人之食每五日則夢遺一度准二如此醫近一年因効季冬就予治診左弦數右三部皆滑數知其酒多濕熱重況厚味生痰但清其濕熱或可愈也乃製一方名曰端本丸

苦參

二兩本草苦參解酒毒補陰氣清溫熱補陰最捷

川黃柏

二兩

牡蠣

蛤粉一兩白螺螄殼一兩各

川黃柏

二兩

清痰

葛根一兩引清氣上升而

青蒿

一兩清熱而利小便是上

其湿也下分消

以神龜糊為丸梧子大空心及食前

白湯吞下七十丸服至第五夜竟不遺至十九夜又被酒過醉其夜又遺乃令却酒一月未終劑而精固矣次年生子

端本丸至今年百發百中行

潔古珍珠粉丸

治白淫夢遺精滑不收

年壯節慾精溢

者降火補陰為主

黃柏

一斤新瓦上炒赤

真蛤粉

一斤

滴水丸如梧子大每服一百丸空心溫酒送下法曰陽盛故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而

補腎陰

丹溪云精滑不禁用蛤粉青黛香附黃柏知母之

類

大鳳髓丹

治心火太盛陽狂不已又補腎水真

陰虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水大有神効

黃柏

炒兩

縮砂

一兩

甘草

半兩

半夏

炒

猪苓

茯苓

蓮蓬

益智仁

各三分

錢

右神麴糊丸梧子大每服七十丸

若只用黃柏甘草縮砂三味名正鳳髓丹若

只用黃柏甘草一味名小鳳髓丹古人云鴻

心者非也乃鴻心包絡相火益腎水之劑

許學士清心丸 治經絡熱夢遺心忪恍惚膈熱

黃柏

一兩

研為末加生腦子一錢同研極細煉蜜

丸梧子大每服十丸至十五丸濃煎麥門冬

湯下

大智禪師云夢遺不可全作虛冷治亦有經絡熱

而得之者嘗治一男子至夜脊心熱夢遺用珍

珠粉丸豬苓丸遺止終服紫雪脊熱始除又一

男子脉洪腰熱遺精沉香和中丸下之導赤散

治其火而愈由此知身有熱而夢遺者皆熱遺也

治夢遺之藥若清之不止者為虛寒愚壯年得夢遺症每四五夜必一遺累用鳳髓丹秘真丸雖少効終不能除根後改用石菖蒲遠志韭子桑螵蛸益智酸枣仁牡蠣龍骨瓊陽等劑為丸服良愈又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無効亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈矣

河間秘真丸 治白淫小便不止精氣不固及有餘滯或夢寐多泄

龍骨

一兩另研硃砂一分為衣

大訶子皮

五錢縮砂

五錢

右麵糊為丸菉豆大每服一二十丸空心

溫酒白湯下不可多服恐太秘也

思想外淫者宜鎮心導端補虛此方得之矣

五參丸 治虛而泄精脉弦大累與加減八物湯吞秘真丸及珍珠粉丸精泄不止後用五倍子瀦脫之功敏於龍骨蛤粉矣

海藏烏金散

治夢泄精滑不禁九肋鱉甲每用

二枚以清酒一碗童便三盞葱白七寸同煎七

分服之日進二次

快亦補陰意也本草云主心腹癥瘕堅積

東垣治男子夢與鬼交心神恍惚刮鹿角屑為末

三錢酒調下日進二服

本草云鹿角逐惡氣惡血然亦是補劑否則何能治快

婦人良方鎖精丸

治下元虛弱小便白濁白淫

白帶淋漓小便頻數

破故紙

炒五味子

炒白茯苓

青鹽

各等分

固精丸

治胞冷虛寒小便白濁白淫夢遺等症

菟系子

酒浸蒸炒

五味子

炒

白茯苓

桑螵蛸

牡蠣

龍骨各煅

荳子

炒

白石脂

分各等

酒糊丸

梧子大每七十丸空心盜湯送下

汗門

附頭汗手足汗

無汗

治汗之法有數種各列治於後

陽虛自汗者宜嚴氏著附湯黃蓍建中湯

陰

虛盜汗者當歸六黃湯

熟甚盜汗者正氣湯

虛盜汗者當歸六黃湯

熟甚盜汗者正氣湯

溫勝自汗者表虛不任風寒者周衛湯 痰熱者涼膈散或滾痰丸 飲食飽甚汗出于胃宜消其食詳所飽何物以枳實山楂之類治之驚而奪精汗出於心宜紫石英小草龍骨酸棗仁人參之類搖斛勞岩汗出於脾宜歸脾湯或當歸補血湯 疾走恐惧汗出于肝宜龍酸東仁當歸枸杞山茱萸之類 持重遠行汗出于腎以山藥山茱萸熟地黃鹿角膠羊脊髓之類東垣治汗春夏用黃耆秋冬用桂枝此亦是治自汗法也

夏月汗多口渴氣喘促者及陰虛注夏斛熱自汗或盜汗者急以生脉散加黃耆治之 六味地黃丸加知母龍骨牡蠣治勞損盜汗殊妙

蓍附湯 治陽氣大虛汗出不止肢斛倦怠

黃蓍去根  
蜜炙 大附子炮去皮  
各等分

每服四錢姜十片水一鍾煎八分食前溫服丹溪治陽虛汗多者人參黃耆少佐桂枝湯甚者附子亦可用按此即東垣黃耆建中湯意也東垣當歸六黃湯 治陰虛盜汗之聖藥也

當歸

黃連

黃芩

黃柏

黃耆

生地黃

熟地黃

各等分

每服七錢水煎服

東垣正氣湯

治熱在陰分盜汗

黃柏

炒  
錢

知母

錢

甘草

一  
錢

水煎食遠服

許學士人參丸

通治諸虛補精氣止肝邪平補五臟虛羸六腑怯弱充肌膚進飲食止虛汗

人參

白朮

茯苓

山藥

石斛

五味子

黃耆

取頭  
末

各一兩為細末蜜丸梧子大每服三十丸空心食前米飲下久服不熱尤宜少

年

東垣周衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不

任風寒

黃耆

麻黃根

各一  
錢

生甘草

當歸梢

生黃芩

半夏

各五  
分

猪苓

羌活

各七  
分

麥門冬

生地黃

各三  
分

五味子

七  
粒

紅花

蘿木

各一  
分

水煎溫熱服中風癇必自汗汗多不得重發汗故禁用麻黃而用根節也

羌活勝濕湯

治濕勝自汗惡寒重添厚衣心胸

悶躁頭目昏憒壅塞飲食減退熱大盛汗出不休以風藥去其濕以甘草瀉其熱

甘草

錢三條

黃蓍

七分

生甘草

五分

生黃芩

三分

酒黃芩

防風

各三分

人參

三錢上取氣益胃已分

升麻

各三分

紫胡

各五分上瀉胸中之熱

獨活

二分

川芎

各三分

藁本

各三分

蔓荆子

各三分

薄荷

一分上清利頭目

細辛

羌活

各三分

荳荊子

各三分

滾痰丸

方見瘧門

右水二鍾煎鍾半統入後四味細辛等藥再煎至一鍾熟服一服而止諸症悉去

涼膈散

方見熱火門

滾痰丸

方見瘧門

附雜方

陳無擇牡蠣散 治諸虛不足及新病暴虛津液

不固射

常自汗

許學士云亦治盜汗

不止

黃蓍

麻黃根

牡蠣

研各二錢

石水煎入浮小麥一百粒不拘時服

河間白水散

治飲酒中風汗多不可單衣食則

汗出如洗久不治必成消渴症

牡蠣

錢二兩

白朮

一兩

防風

二兩

為末每服

一錢溫水調下不計時如惡風倍

防風白朮如多汗面腫倍壯蠟

丹溪白朮湯 治盜汗

白朮

四兩 分作四製○一兩黃芪同炒○一兩石斛同炒○一兩牡蛎同炒○一兩桂皮

炒同

各味炒黃色餘藥不用只用白朮研末每服

三錢用粟米煎湯送下藥盡為効

濟世良方

治盜汗

山藥為末臨卧酒調下三錢

衍義云椒目治盜汗尤切將椒目微炒搗細末用五錢以生豬上唇煎湯一合調勻臨卧服無有

不効蓋椒目能行水治水蟲尤勝

治盜汗桑葉為末茶服之

治藥不應者累驗出醫說

豆豉能治久盜汗以一升微炒令香清酒二升漬

兩三日取汁任人服之不瘥更作三兩劑即止

愚謂此方出緇目必是傷風表中有風邪以致毛腠不閉豆豉原能發汗散邪以邪散而腠理致  
閉也今取其能治久盜汗豈豆豉亦能補陰乎錄此以備參考

衍義以煅過牡蠣麻黃根等分同研細末治盜汗及陰汗

頭汗

王海藏云頭汗出剗頸而還血痣也額上偏多何謂也曰首者六陽之所會也熱薰蒸則汗出也額上偏多以部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入于心之分故發為頭汗而額上偏多者屬心之部而為血痣也至于雜症陰火迫腎水上行入於心為盜汗或自汗傳而為頭汗出者或心下痞者俱同血痣例治之無問傷寒雜病酒積下之而心下痞者皆血痣也可參宿門同治

生生子曰頭汗亦非止血之一字可盡予族伯每飲食入腹則登時頭面汗出如雨剗頸而還稍頃自收此胃中有熱陽氣虛甚而然何則頭面屬陽明為多飲食入胃冲動其熱如霧露之升騰越出而為汗經謂雲出天氣而出地氣是也觀海藏以痞症為對俱同血痣例治之緣其以下多亡陰謂亡陰而陽失依附故飛越也今益脾土而以血藥兼之可謂得治法之本矣

手足汗

手足汗乃脾胃濕熱內鬱所致脾胃主四肢亦有  
腸胃中有實熱者仲景承氣症謂手足濺々然  
汗出乃腸胃熱甚而傍達四肢也

東垣安胃湯 治因飲食汗出日久心中虛風虛  
邪久則令人半身不遂見偏風瘻痺之病先除  
其汗慄慄之氣按而收之

黃連 五味子 升麻 水 生甘草 各一錢 炙甘  
草 六分 四分 二鍾煎一鍾食遠溫服忌  
溫麵五辛大料發熱之物

治脚汗

白礬 乾葛等分 每用五六錢水三碗煎十數  
沸洗逐日洗一次纏三五日自然無汗  
無汗

丹溪曰盛夏浴食無汗為表實一人脈濶而短重  
取而弱此久受濕傷且多年無汗遇勞身熱倦  
怠如沙病狀

蒼朮 白朮 芍藥 甘草 紅花各五錢 陳皮  
六兩 當歸身 二兩 分六帖姜三片煎服

治夏月無汗成久嗽病半蘆散

半夏 紫蘆葉 二味為末入蛤粉神麌覘散  
灰等分為末以桃仁泥五錢瓜萎穰一枚為  
丸先服三拗湯三帖却服此丸臨卧白湯送

下七十丸

治虛勞自汗不止芍藥黃蓍湯

黃蓍 二兩 白芍藥 白朮 各一兩 半甘草 一兩

每服五錢煨姜二片棗一枚水煎服

參术散 治同前陽虛甚者加附子

人參半 一兩 白朮二兩 桂心 七錢

每服五錢水煎服

消癰門

啟玄子註 癰為消熱病也

渴而多飲為上消 消穀善飢為中消 渴而便

數有脂膏為下消

東垣曰上消者舌上赤裂大渴引飲經曰心移熱  
於肺傳為膈消是也以白虎湯加人參主之  
潔古曰上消者上焦受病又謂之膈消多飲水而  
少食大便如常小便清利知其燥在上焦治宜

流溫以潤其燥

上消者經謂之膈消渴而多飲是也

治上中下三消水火圖

上消

熬豬肚湯

羊肉冬瓜湯

上消手太陰

大渴不止

麥門冬飲子

化水丹

中消

調胃承氣湯

瘡成消中而數小便

消中足陽明

胃熱消穀善飢

易老順氣散

下消

益火之源以消陰翳則便溺有節

腎氣丸

地黃丸

既消足少陰

飲少溲多小便如膏

內化丸

鳳髓丹

壯水之主以制陽光則渴飲不思

東垣論消渴末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹聖濟總錄皆為必死不治之

症惟潔古分而治之能食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根主之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨哉或曰末傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或亦水者是也經曰有形而不痛者陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生失强者死末傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制

失其服皆適其至所為故知過與不及皆誅罰無過之地也如膈消中消制之太急速過病所久而成中滿之疾正謂上熱未除中寒復生非藥之罪失其緩急之宜也處方之際宜加審焉總錄論消渴有三種一曰渴而飲水多小便數有脂似麸片而甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少有似油而數者消中病也三者雖渴飲水不能多腿脚瘦小瘦弱小便數此腎消也特忌房勞千金方云消渴病宜慎者有三一忌

酒二忌房勞三忌鹹食及麵能慎此三者雖不服藥亦可自愈消渴之人愈與未愈嘗湏慮患大癰必於骨節間忽發瘡疽而卒

內經云熱中消中不可服膏粱芳草石藥石藥發瘍芳草發狂芳草之氣羨石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者東垣謂滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津液也天令濕氣太過者當用之若無濕而用之是犯禁也小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥也溫宜泄之

燥宜潤之

內經云脉實大病久可治脉懸小堅病久不可治  
又脉經曰消渴脉數大者生細小浮短者死

上消治例

渴而多飲為上消

丹溪云治消渴養氣降火生血為主瓜萎根治消渴之神藥心移熱于肺傳為膈消

人參石膏湯

治膈消

上焦煩渴不欲多食

人參

五錢

石膏

一兩

知母

七錢

甘草

四錢

每五錢水煎食後溫服

索古治能食而渴者白虎倍加人參湯主之  
王海藏治脾胃虛弱大渴不止而食少小便不利  
大便不調精神短少腹窄狹如繩束

白茯苓

橘紅

各二兩

生姜

五錢

右煉蜜丸彈子大每二丸空心白湯化服忌  
生冷硬物怒發思慮過度如脉弦或腹中急  
甚者加甘草三錢

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴

人參

枸杞子

白茯苓

甘草

各三分

卷之三

三

五味子

麥門冬

各五錢

加姜水煎服之

羅太無門冬飲子 治膈消胸滿心煩精神短少  
多為消渴

知母

甘草

炙

瓜萎仁

五味子

人參

葛根

茯神

生地

麥門冬

各一兩

每五錢加竹葉十四片同煎服

火府丹 治消渴

本事方云一卒病渴日飲水三斗不食者三月

心中煩悶時益冬子謂心中有伏熱與此丹數  
服每服五十丸溫水下越二日來謝云當日三  
服渴止又次日三服飲食如故此方本治淋用  
以治渴得効信乎藥要交通曷能執一

丹溪治消渴泄瀉先用白芍藥白朮各炒為末調  
服後隨症用藥

錢氏加減地骨皮散 治上消

知母 紫胡 甘草

炙半夏

地骨皮 赤朮

芩 黃芪

石膏

黃芩 桔梗

白芍藥

每三錢姜五片水煎食遠服

東垣止渴潤燥湯 治消渴大便乾燥喜溫飲陰  
頭縮舌上白燥唇裂口乾眼澁難開及於黑處  
如見浮雲

本草治飴

冷水  
多者川烏  
肢大者四枝炮去皮  
用厚者為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新  
炮六兩  
水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服  
愈王海藏此藥能化停水

甘草石膏湯 治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽  
喉嚨唾覺痛嗌腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃  
止 升麻半錢 紫胡七分 甘草梢五分 石膏六分

黃柏 桃仁 防風 荆芥穗 生地 知母  
當歸身各一錢 杏仁六枚 熟地 黃連各三分 細辛一分

紅花

少川椒  
許粒

水煎食後熱服

丹溪云消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生姜汁冷服虛者可用

人參湯

東垣六經渴治例

太陽經渴其脉浮無汗者五苓散滑石之類主之陽明經渴其脉長有汗者白虎湯涼膈散之類主之少陽經渴其脉弦而嘔者小柴胡湯加瓜萎之類主之○太陰經渴其脉細不欲飲綴與之

飲思湯不思水者四君子湯理中湯之類主之○少陰經渴其脉沉細自利者猪苓湯三黃丸之類主之○厥陰經渴其脉微引飲者宜少少與之

聖濟治時氣煩渴用生藕汁一盞入蜜一合和勻分為三服

中消治例

消穀善飢為中消

癰成為消中胃中熱則消穀善飢東垣曰消渴中消自古只治燥止渴悞矣殊不知內經云三陽

結謂之消三陽者足太陽也又手陽明大腸主  
津液所生病熱則目黃口乾是津液不足也足  
陽明主血所生病熱則消穀善飢血中伏火是  
血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為  
病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為  
消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏梁芳草石  
藥其氣悍烈能助熱燥也越人云邪在六府則  
陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉  
盛矣陽脉太虛則陰氣不得榮也故飢肉皮膚

而消也

素問有病口甘者病名為何何以得之岐伯曰此  
五氣之溢也名曰脾瘅夫五味入口藏于胃脾  
為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥  
美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者  
令人多熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消  
渴治之以蘭除陳氣也

潔古治胃熱善消水穀以甘辛降火之劑治之用  
黃連末生地白蘿各自然汁牛乳各一升熬成

膏和黃連末一斤丸如桐子大每服三十丸白  
湯下日進十服

河間豬肚丸 治消渴

豬肚

具一兩

黃連

一兩

天花粉

四兩

麥門冬

四兩

知母

一兩

為細末納豬肚中線縫置甌中蒸極

爛乘熱于石臼中杵可丸為度如硬加蜜丸

如桐子大每服三十丸漸加至四十丸渴則  
進之○三因方多梁米杜仲本草云豬肚能

補中益氣止渴

調胃承氣湯 治消中渴而飲多食

此初服時宜之

三黃丸 治三焦熱渴

易老順利散 治中熱在胃而能食小便赤黃微  
利至不欲食為効不可多服

厚朴

枳實各一兩

大黃

四兩

每服五錢水煎食遠服

大腸移熱于胃善食而瘦又謂之食佈食佈者謂過不生肌膚亦易飢也東垣云善食而瘦者胃伏火邪于氣分則能食脾虛則肌肉削也

胃移熱于胆亦曰食佈

河間參蒲丸

治食傷胃中結熱消穀善飢不生

肌肉

人參

菖蒲

赤茯苓

遠志

地骨皮

牛膝

酒浸各一兩

右煉蜜丸每服二十

丸米飲下

下消治例

渴而小便數有膏為下消

羅太無治張芸夫四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度小便數多先師以此方治之良愈消渴多傳瘡瘍為不救之疾既効後亦無患享年七十五而終名之曰生津甘露飲子治消渴上下

齒麻舌硬赤爛腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵晝色脇下急痛善噫善怒健忘鶯肉腰背疼兩丸冷甚

生津甘露飲子

一方石膏用一兩二錢

石膏

一分

人參

甘草

生山梔

白芷

連翹

荳蔻

黃連

姜黃

藿香

灸甘草

杏仁

木香

各一錢

白葵

麥冬

當帰身

蘭香

紫胡

各五錢

黃柏

酒炒一升

麻

根

知母

酒炒二錢

桔梗

三錢

全蝎

二枚去毒

右為末湯浸蒸餅和勻捏作餅子晒乾杵碎如黃米大每服二錢桃子掌內以舌舐之津液送下或白湯食後服之神効凡消渴為病燥熱之氣勝也內經云熟淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為君啟玄子曰壯水之主以鎮陽光故以柏連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當帰杏仁麥

門冬全蝎連翹白芨蘭香甘草甘寒和血潤燥為佐紫胡升麻苦平行陽明少陽二經草澄茄白豆蔻木香藿香反佐以取之又用桔梗為舟楫使浮而不下也

東垣和血養氣湯 治口渴舌乾小便數舌上赤裂此藥生津除燥生肌又名地黃飲子

黃連

酒炒

生地

各七分

紅花

炒少許

黃柏

酒炒一錢

升麻

一錢

甘草

灸三分

防已

酒洗三分

桃仁

六枚

當帰

四分

知母

酒煮

羌活

各五分

麻黃根

三分

口渴舌乾再加杏仁

一枚

生甘草三分 小便數加石膏六分

右作一服水煎稍熱 忌酒麵房失

清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大便

結小便數

羌活梢

紫胡梢

甘草梢

知母

製黃芪

黃芩

酒炒一錢

升麻梢

四分 防風梢

防已

生地

酒洗各五分

當歸

六分 石膏

龍胆草

黃柏各一分

錢五

分紅花少許

桃仁

杏仁

各一枚

甘草

一条錢五

水二鍾酒一小盞煎服

甘露膏 治消渴飲水極多善食而瘦大便結燥  
小便頻數又名蘭香飲子

石膏

二錢

知母

一錢

甘草

生

防風

各一錢

甘草

人參

半夏

蘭香

白豆蔻

升麻

桔梗

連翹

各五分

右浸蒸餅為丸或捏作餅子晒乾

碎如米大每用淡姜湯下二錢

黃連末治消渴要藥加天花粉末人乳生地黃汁  
生藕汁二物為膏入山藥末搜和以姜汁和煉  
蜜為膏徐徐桃子舌上以白湯少許送下亦可

能食而渴者加石膏

治消渴以天花粉為末用人乳汁生薑汁煎膏丸  
如菉豆大每服百丸食後白湯下

肘後方治消渴小便多者煮瓜萎根汁飲之良  
濟世方云治消渴無方可治者用天花粉大烏頭  
炒等分為細末蒸餅丸每服百丸黑豆湯下  
已上四方皆以天花粉為君本草主消渴止小  
便通月水乳汁夫既能止小便又能通月水知  
其流濕潤燥治消渴之要藥也

千金地黃丸 治腎渴

黃連

四兩  
為末

生地

半斤  
連末

取汁連

查并黃  
和匀

乾用  
晒

為細末煉蜜為丸食後麥門冬湯下五六十

丸

麥門冬湯 治消渴日夜飲水無度飲下即溲

麥門冬

黃連

冬瓜

各二  
兩

每服五錢水煎去渣溫服若無乾冬瓜用新  
冬瓜肉三斤去穰分作十二片為十二服每  
服用一片劈破水煎日三服

冬瓜飲子 治消渴能食而飲水多小便如脂麩  
片日夜無度

冬瓜一枚黃連細末

十兩為細末

先以冬瓜破開去穰摻

黃連末在內却用頂蓋定于熱灰中煨熟去皮切細爛研絞汁每服一盞至二盞日三服

夜一服

三消丸 用好黃連為細末不拘多少切冬瓜肉研取自然汁和成餅陰乾再為細末用汁浸和加七次即用為末仍以瓜汁為丸煎大麥仁湯

送下尋常渴疾只一服効 已上五方黃連冬

冬為君丹溪云冬瓜性走而急火病與陰虛者忌之又有黃連為佐用者尤當裁酌

治消渴飲水不止小便數用田螺五升水一斗浸一宿渴則飲之每日一度易水換螺為妙

又方以水煮取汁飲之螺亦聽食

愚按已上諸方列于下消之例觀其用藥在上中為多亦是端本澄源之意上中既平不復傳下消矣故于真陰虛腎消之病而又自

有補下焦之藥也用藥者宜審焉

張子和治飲水百杯尚猶未足小便如沙或如杏色此方三五日小便毒大注下十日除根此方和

自云此重劑也試有驗 水銀四錢錫二錢熔化同水牡蠣

知母 蜜佗僧 紫苑 呷參 貝母各一兩

天花粉半斤黃丹半兩俱為細末用雄豬肚婦人用獐猪肚一具納藥于內以麻線縫之用新瓦二片繩縛一二遭別用米一升天花粉末半升于新水內煮熟取出放冷不用米及

天花粉只將豬肚併肚中藥爛搗和為丸如硬加蜜食前米湯下三四十丸 三因方無貝母

河間胡粉散 治大渴百方不痊者亦治腎消

黃丹 胡粉 漆鴻 石膏 赤石脂 白石脂各五錢天花粉二兩半甘草一兩蜜為丸菉豆大每服十五丸至二十丸止多則腹痛日進二服

葛根湯 治消渴消腎目飲石水者

葛根

三兩

瓜萎根

黃丹

各二兩

大附子

炮去皮  
一兩

蜜丸

桐子大每十九日進三服春夏去附子

六味地黃丸

治腎消効

經驗方

治消不止下元虛者用牛膝五兩細剉

為末生地黃汁五升晝晒夜浸以汁盡為度蜜丸空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑鬚髮生津液

仲景治消渴小便反多如飲水一斗腎氣丸主之  
張子和治腎消以腎氣丸本方加山藥一味外桂

附從四時加減冬用一兩春煑用三錢夏用一  
錢又法腎氣丸去附子加五味子一兩半

張子和治諸虛不足胸中煩悸時常消渴唇口乾燥或先渴而欲發瘡或病瘡疽而後渴宜用黃蓍湯多服 方見瘡疽門

凡消渴而小便反多有脂者皆腎氣不營攝津液也宜多服黃蓍黃蓍乃補氣之要藥

外臺秘要 治消腎小便數鹿角一具炙焦搗為極細末酒服方寸匕漸漸加之

心移寒于肺消者飲一溲二不治腎臟消燥氣  
無所攝故飲一溲二也

口燥咽乾

此尋常口乾者非前消渴症也

本事方以黃蓍湯治心煩躁不生津液不思飲食  
黃蓍 人參 五味子 麥門冬 熟地

甘草

白芍藥

各三兩

白茯苓

一兩

天門冬

五錢

每服三錢姜棗、烏梅同煎食後服

燥熱咽乾忌南星半夏 又渴者不得利小便是  
以五苓散在所當禁也

赤水玄珠第十二卷目錄

痺證


痛痺 附鼻額夾車痛 肩背痛 臂痛

著痺 附麻木 口舌麻木

鶴膝風

癰

一身盡痛 產後身痛



國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

赤水玄珠第十二卷

新安生生子孫一奎著輯

痺門

生生子曰按內經靈樞所云痺證有臟腑營衛筋脉肌皮骨及俞合刺法論包甚廣而世之認痺証者絕少丹溪擬名痛風編門論治是從內經寒氣多者為痛痺論得其一也其有不痛及各臟腑俞合等証世皆不詳載者意其以風寒濕三氣為病之本散寓于各証之下隨各証而分

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

治之如胞痺寓淋腸痺寓飧泄心痺寓噫氣肺  
痺寓喘滿之類皆是然則痺之不名也久矣宜  
乎其有認為痿認為風認為脚氣同治者此不  
務研經旨而惟務求同俗也可慨夫予今列經  
旨於篇首以全軒岐舊意以痛風復痛痺以昭  
中古諸賢証治得痺之一俾合前後而考之庶  
可因名而循其實也設不復之則痛者固可以  
為風而于不痛者獨不可以為風乎抑凡見筋  
骨作痛而亦有血虛有陰火有痰涎者又皆可

以風名之乎在丹溪諸公必自能融會體認其  
如因名迷實之弊流害已久名不正則言不順  
予故不能無容言也後之明哲幸鑒予心

黃帝問曰痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至  
合而為痺也其風氣勝者為行痺行痺者行而  
為走注疼痛及歷節風之類是也  
稱為痛風及白虎湿氣勝者為著痺不定也今稱  
飛尸之類是也  
稱為麻木不仁必著而不移劉河間所謂氣之  
道路著而麻者得矣或痛著一處始終不移者  
是也啓玄子註曰風則陽受之故為痺行寒則陰受之故為陰

痺著而不去也故乃痺  
從風寒濕之所生也

卷之三

三

帝曰其有五者何也岐伯曰以冬遇此者為骨痺  
以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至  
陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺此皆以  
所遇之時所客之處命名非行痺痛痺著痺之外又  
別有此五痺也以時令配五臟所合而言也  
帝曰內舍五臟六腑何氣使然啟玄子註白言皮  
時之外遇然內居腑  
腑何以致之岐伯曰五臟皆有合病又而  
不去者內舍於其合也故骨痺不已復感於邪  
內舍於筋筋痺不已復感於邪內舍於脉脉痺

不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪  
內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂  
痺者各以其時重感於風寒濕之氣也凡痺之  
客五臟者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脉不通  
煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善厥氣上則恐  
肝痺者夜卧則驚多飲數小便上為引如懷孕  
腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾者四肢解  
墮發欬嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得  
中氣喘爭時飧泄胞痺者少腹膀胱按之內痛

若沃以湯澁於小便上為清涕陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在

腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾

王註

淫氣謂氣之妄行者各隨其藏之所主而入為痺也 諸痺不已亦益內其風氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其飲食

居處為其病本也六腑亦各有俞風寒濕氣中其俞而飲食應之循俞而入各舍其腑也帝曰以鍼治之柰何岐伯曰五臟有俞六腑有合循脉之分各有所發各隨其故則病瘳也甲乙經以隨為治

帝曰營衛之氣亦令人痺乎岐伯曰營者水穀之精氣也和調於五臟酒陳於六腑乃能入於脉也故循脉上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣剽疾滑利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之間熏於肓膜散於胃腹逆

其氣則病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺也帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者痛久入深營衛之行濇經絡時踈故不通甲乙經  
作痛皮膚不營故為不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故為痺熱其多汗而濡者此其逢溫甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也帝曰夫痺之為病

不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在於脉則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則緩帝曰善

### 刺痺穴法

冬感風寒濕者為骨痺久不已則內入於腎病腎脹足攣尻以代踵身蹠脊以代頭取太溪委中春感風寒濕者為筋痺久不已則內入於肝病卧則驚多飲數小便取太衝陽陵泉

夏感風寒濕者為脈痺久不已則內入於心病心  
下滿暴喘嗌乾善噫恐俱 取太陵少海

長夏感風寒濕者為肉痺久不已則內入於脾病  
解墮發欬嘔汁 取太白三里

秋感風寒濕者為皮痺久不已則內入於肺病煩  
滿喘嘔 取太淵合谷

靈樞黃帝問於岐伯曰周痺之在身也上下移隨  
脉其上下左右相應間不容空愿聞此痛在血  
脉之中邪將在分肉之間乎何以致是其痛之

移也間不及下鍼其搐痛之時不及定治而痛  
已止矣何道使然願聞其故岐伯答曰此衆痺  
也非周痺也黃帝曰願聞衆痺岐伯曰此各在  
其處更發更止更居更起以右應左以左應右  
非能周也更發更休也帝曰善此痛安在何因  
而有名岐伯曰風寒濕氣客於外分肉之間迫  
切而為沫得寒則聚則排分肉而分裂也  
分裂則痛之則神歸之神歸之則熱之則痛解  
痛解則厥之則他痺發之則如是此內則不在

臟而外未發于皮獨居分肉之間真氣不能周

故命曰衆痺

仲景金櫃要略論血痺乃尊榮人骨弱肌膚盛重  
困疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之但  
以脉自微濇在寸口閑上小緊宜鍼引陽氣令  
脉和緊去則愈血痺陰陽俱微寸口閑上微尺  
中小緊外証身體不仁如風痺狀黃蓍桂枝五  
物湯主之

嚴用和曰痺証因體虛腠理空疎受之而成逢寒

則急逢熱則緩隨所受邪氣而生証也診其脉  
大而濇為痺脉來急亦為痺脉濇而緊者亦為  
痺又有風血痺陰邪入于血經故也

劉宗厚曰人之感三氣而為痺者以其形虛血虛  
耳但有在肌皮血脉淺深之異故入藏者死緣  
痺之為証有筋挛不伸肌肉不仁者與風証絕  
相似故世俗類於風痺痺証通治此千古之弊  
也大抵固當分其所因風則陽受之痺感風寒  
濕之氣則陰受之為病多重痛沉著患者難易

得去如錢仲陽為宋之一代明醫自患周痺止能移于手足為之偏廢不能盡去可見其為難治也况今世俗多類于風証通治宜乎不能得其病情也

統旨曰風痺者遊行上下隨其虛邪與血氣相搏聚于關節筋脉弛緩而不收也宜防風湯

寒痺者四肢掣痛關節浮腫宜五積散

濕痺者畱而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神

昏塞者宜茯苓川芎湯

熱痺者臟腑移熱復遇外邪客搏經絡畱而不行陽遭其陰故痺痺煥然而悶肌肉熱極體上如鼴走之狀唇口反裂皮膚色變宜升麻湯

三氣合而為痺則皮膚頑厚或肌肉痠痛此為邪中周身搏於血脉積年不已則成癰疹風瘡搔之不痛頭髮脫落治宜疎風涼血

腸痺者數飲而小便不通中氣喘爭時作飧泄宜五苓散加桑白皮木通麥門冬或吳茱萸散木香丸

胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯瀆於小便

上為清溼宜腎著湯腎瀝湯方見淋閉門

血痺者邪入於陰血之分其狀體常如被風所以

骨弱勞瘦汗出卧則不能搖動也宜當歸湯

周痺者在血脉之中上下遊行周身俱痛宜觸痺

湯大豆孽湯

支飲者手足麻痺臂痛不舉多暱眩冒忍死不便  
膝冷成痺也宜茯苓湯

東垣云身體沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱

不得伸附著於有形也宜蒼朮黃柏之類

行痺治劑 即走注疼痛

仲景桂枝芍藥知母湯

治諸肢節疼痛身體倦

羸脚腫如脫頭眩短氣元々欲吐痛風神効

桂枝

知母

防風

各四

芍藥

三

甘草

麻黃

附子

炮各二

生姜

白朮

各五

水七

升煮取二升溫服一日三服

烏頭湯

歷節風不可屈伸疼痛

麻黃

芍藥

黃耆各

三

甘草炙

川烏五枚咬咀以蜜二

升煎取一升即去

烏頭水三升煎一升去渣納蜜再煎七合不服時之

河間防風湯 治行痺走注無定 痛風神効

防風 當歸 赤茯苓 杏仁去皮尖炒各一錢甘草

桂各五分黃芩 秦艽 葛根各二分麻黃去節五分

水酒各二盞枣三枚姜五片煎一盞去渣溫本事方薏苡仁散 治濕傷腎不能生肝；自生風遂成風濕流注四肢筋骨或入左肩頸肌肉疼痛漸入左指 薏苡一兩當歸 芍藥

乾姜 甘草 官桂 川烏 防風 白朮

茵芋藥即山 麻黃 獨活各五錢右末每服二

錢空心臨卧酒調下一日三服

麝香丸 治白虎歷節風疼痛遊走無定狀如虫

齒晝靜夜劇及一切足疼痛 川烏大者三錢生用

全蝎一十一錢黑豆二十一錢地龍五錢右末

入射香半字同研勻糯米糊為丸菉豆大每服七丸甚者十丸夜卧令膈空溫酒下微出冷汗一身便瘥予得此方凡足歷節及不測疾痛一二服便瘥在歙州日有一貴家婦人

遍身走注疼痛至夜則發如蟲齒其肌多作鬼  
邪治予曰此正歷節風病也三服愈

丹溪龍虎丹 治走注疼痛或麻木不遂半身疼

痛 蒼朮 草烏 白芷各二兩 右末水拌待

發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊

為丸彈子大酒化下

無擇附子八物湯 治歷節風四肢疼痛如鉗鋸

不可忍 附子炮皮去 乾姜炮 茯苓

半夏 桂心各二兩 白朮四兩 人參三兩

每服五六錢水煎

加味二妙散 痛風走注疼痛 黃柏酒炒 蒼朮

酒炒各二錢 水煎調酒洗歲靈仙末羚羊角灰臣

蒼朮佐 白芥子使 生姜一片入藥末一錢擂碎以前藥再溫服

東垣和血散痛湯 治兩手十指一指疼了一指

疼痛後又腫骨頭裏痛膝痛左膝痛了右膝痛  
發時多則五日少則三日晝輕夜重痛時覺熱  
行則痛輕腫却重註云先血後氣乃先痛後腫

形傷氣也

羌活

升麻

麻黃

去節

各一錢

半炒

各

桃仁

箇十

柴胡

防風

黃柏

知母

酒一錢

炒各

黃連

炒酒

防已

各六分

紅花

一分

二服水煎

食前熟服

當歸

各一分

羅太無治真定府張大素好嗜酒五月間病手指  
節腫痛屈伸不利膝臍亦然心下痞滿身體沉重  
不欲飲食食即欲吐面色痿黃精神減少至  
六月間求予治之診其脉沉而緩緩者脾也內  
經云諸湿腫滿皆屬脾土仲景云濕流閔節肢

體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之

羌活

升麻

各一錢

獨活

分

蒼术

防風

甘草

葳靈仙

菝葜

當歸

澤鴻

各五分

分二帖

水煎食前一服食後一服忌酒麵生冷硬物  
牛蒡子湯治風熱成歷節手指赤腫麻木甚則攻  
肩背兩膝遇暑熱或大便閉牛蒡子新豆

枝炒

羌活

各三

生地

二兩半

黃耆

一兩半

為末湯調二錢空心食前日三服

此病胸

膈生痰久則赤腫附着肢節久久不退遂成

屬風此孫真人預戒也宜早治之

河間大荳孽散 治周痺走注五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤澤皮毛補腎 大荳孽一升炒香熟為末

每服五分溫酒調下空心服加至一錢日三

服 本草云大荳消淤血破婦人惡血治熱痺筋挛膝痛古人多用酒沃豆孽取汗蓋表藥也

犀角湯

治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角二兩

羚羊角一兩

黃芩

梔子 射干

大黃

升

麻各四兩

豉一升 每七八錢水二鍾煎服

張子和治一稅官風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿繆靴足膝皮膚少有跣露則冷氣襲之流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其痛極劇便牽急而腫起肉色不變腠理如虫行每遇風冷病必轉增食燥熱燔針著灸真知其數前後三年不愈一日予脉之其兩手臂沉滑有力先以導水丸通經

散各一服是夜鴻三十餘行痛減半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治癰方是也日三服煎七八錢繫繫然汗出余欲作玲瓏竈法薰蒸血熱必增極諸汗法古方中多有之惟以吐法者世罕知之

丹溪控涎散 治身及腸走痛痰挾死血加桃仁泥丸治走注疼痛 蔡靈仙 梔子炒 蒼朮當歸各一 川芎分七錢 生姜五片 甘草分五錢 肉桂分桃仁七錢

瀝半盞熱服忌肉雞麵  
定痛方 治一切風濕痺痛 乳香 没藥  
地龍 木鱉子肉 金星石 五靈脂等分  
蜜丸彈子大每一丸臨卧酒下

升麻湯 治熱痺肌肉熱極體上如風走唇口反縱皮毛黑兼治諸風 升麻三分 茯神 人參防風 犀角銚 羚羊角 羔活各一 官桂五錢 每服五六錢生姜一塊搗碎竹瀝少許同煎至一盞溫服

八珍丸 治痛風走注腳氣頭風 乳香 泡藥

代赭石 穿山甲

生用各三錢

羗活

草烏

生用各五錢

各

全蝎

二十一大箇炒

川烏皮

生用尖一兩

右末醋糊丸梧

子大每服十一丸

四妙散 治痛風走注

歲靈仙

酒浸五錢

白芥子

一錢

蒼耳子

一錢云是蒼朮又五分

羊角灰

二錢

右末每服

一錢姜

一大片搗汁入湯調服

二妙散同

調丸炒

濟生丸活湯 治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛

發作不定

羗活

附子

炮去皮附

秦艽

桂心

甘草

炙

木香

牛膝

酒浸

桃仁

骨碎補

川芎

當歸

防風

各一兩

姜五片

每服五六錢水煎

痛痺

丹溪編

為痛風

門今改

之以復舊從經旨也

丹溪痛風論曰痛風者四肢骨節走痛也他方謂之白虎歷節風夫氣行脉外血行脉內晝行陽二十五度夜行陰二十五度此平人之造化也得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷

于七情外傷於六氣則氣之運或遲或速而疾作矣彼痛風者大率因血受熱已自沸騰或再涉冷受濕取涼或坐卧當風熱血得寒汚濁凝滯所以作痛夜痛甚者行於陰也治當以辛熱之劑流散寒濕開發腠理則血行氣和而愈然亦有數種治法不能無少異也因濕痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非烏附氣壯者不能行故用為引經若以為主治非惟無益而有殺人之毒此病必行氣流湿舒風導滯血補新

血降陽升陰治有先後須明腫與不腫可也不可食肉三屬火大能動火素有火盛者小水不能制若食肉厚味下有遺溺不已上有痞悶之甚雖魚麵醬醋酒皆斷之先以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黃連降心火看作何應而為之區處生生子曰按丹溪不以癰分門而以痛風分門謂血先受熱而後受冷濕乃所以為痛夜痛甚行於陰也及戒人不可徒以烏附為主斯言不惟補前人之餘蘊而猶有深意存焉者實懲時俗

與脚氣瘦証混治之悞而另立瘦門脚氣門分治之而又另分麻木為一門者此尤有見也麻木固亦有湿有痰所致者而氣血不足居多分而治之良有特識設一槩而作風寒濕治則虛痺之中未能無虛者或又作風寒濕治用躁風剛燥之劑太過而氣血為之暗損或氣血先虛而後受邪經曰邪之所湊其氣必虛此皆不可以不慎也陳無擇謂有支飲作痺此均有補

于經文者誠以今之患痛痺者歷之每：如丹溪無擇所論治驗數條猶其精工故畢錄之以大法用蒼朮南星川芎白芷當歸黃芩在上者加羌活桂枝桔梗威靈仙在下者加牛膝防己木通黃柏治痛風取薄桂者以其味淡獨此能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處一方四物湯加桃仁牛膝陳皮茯苓甘草白芷龍膽草在上屬風在下屬湿加藥同俱倍之桂等分無桔梗氣虛者加蒼朮龜板痰加南星血虛加芍歸佐以桃仁紅花