

丁氏醫學叢書

家庭新本草

總發行所上海文明書局

八
五
以

家庭新本草序

丁先生仲誥。達於醫學。著醫籍甚夥。家庭新本草一書。先生曩時所編纂也。將付梓以之示人。且囑爲之序。允據歸秘。燈而讀。讀竟喟然曰。此起死人而肉白骨之良方也。安得人置一編。以備不時之需乎。書共十六類。類各有細目。詳釋其產地及服法功用。清朗宛如列眉。雖不解醫藥之人。一檢卽知也。其次第錄如下。第一類強壯劑。第二類瀉劑。第三類利尿劑。第四類發表劑。第五類退熱劑。第六類祛痰劑。第七類殺蟲劑。第八類止痛及寧睡劑。第九類收斂劑。第十類刺戟劑。第十一類變質劑。第十二類防腐消毒藥。第十三類吐劑。第十四類緩和劑。第十五類雜類。第十六類家庭療法。凡家庭所必用之藥。搜羅殆盡。是眞無愧家庭新本草之名也。乃不揣固陋。而叙之曰。曩者允嘗論醫藥之重要。筆之簡編。播之報章。以譖讀者。而作嚶求。奈吾國士夫。競以談政說理爲高。於醫藥素未究心。絮聒不休。不見噴於人也。幾希不知醫藥。雖似細微。實爲人民生命之所托。豈可輕易視之。彼以巫醫並稱。醫卜同論者。固未知醫藥之重要也。不然東西各國。互以醫藥相尙。至以之靚國之強弱。何爲也哉。卽以近事而論。英

人設華人救急會。以曾任總稅務之赫德爲之長。意欲造就中國醫科人材。籌集鉅款。代我擘畫。夫急而不自救。至他人代爲之救。斯眞急矣。孰謂研求醫藥。而尙可一日緩也耶。然之所竊以爲急者。不在高深之醫學藥學。而在普通之醫理藥理。且以藥理爲尤要。務使人人知醫。人人知藥。人人能自治其疾而已。蓋一家之中。有知藥理者一二。人。其家人不幸而患病。不致倉皇失措。誤服藥餌。其未病者。則施以豫防法。隔離法。自不患其傳播矣。至於高深之醫學藥學。自有專門家在。非尋常之人。所能通曉者也。先伯父臨終時。猶以不知醫藥。引爲大憾。嘆曰。余學生誤於醫藥。他日汝輩必略習之。勿如余之後悔。而當視爲殷鑒也。今日思之。此言良信。

自歐力東漸。舉國之人。咸心醉歐風。大而官吏。小而人民。莫不競相仿效。雖衣食服御之微。亦惟恐其不肖。而獨於醫藥。則深閉固拒。視如蛇蝎。允百思而終不得其解焉。意者吾國之習尙。與彼國靈柩而不相容耶。抑亦捨其所長。而取其所短也乎。先生灼知國人之心理。故是書所輯。無一西藥。而爲彼國所同有者。則附註焉。世有拘忌西藥。而不敢服之者。對於此。當可釋然無疑矣。倘記述高妙。說理精深。則祇足備專門家之採擇已爾。而此書詞意。則極簡明。如香山之詩。老嫗都解。即使婦人女子習之。良亦不難。

而收效之巨。當更不淺。蓋各人之家庭。有知藥理之婦女。其便利也何如。倘置之行篋。以作肘後之方。當雨夜雪天。獨窮塊僻。臥病荒廬。求醫維艱之際。第煩一檢之勞。如與良醫相晤對。其便利也。更何如。尤知此書雖小。其裨益於國人也實大。必不僅供好事者之揮架。徒壯觀瞻而已也。金濟蔡允。

昔西班牙公使。謁法王於私第。見王跪於地。一幼子跨於背。作乘馬狀。公使不敢入。王問曰。汝亦爲父子。公使曰。然。王曰。然則我將與子女同玩矣。不獨王家爲然。卽平民作工。暮歸。讀新聞紙。與子女談笑。或教幼子用木塊作小屋。以爲玩。其母或教幼女作耍孩之衣服。俟子女既睡。則夫婦對坐。其妻或讀書。或唱歌。或彈風琴。以慰其夫終日之勤勞。此家庭之樂。不獨西人爲然。徵諸吾國亦如此。詩云。宜其室家。樂爾妻孥。庚蘭成云。左對孺人。右弄稚子。昔古人所造家庭之樂也。然家庭中。或有咳嗽吐血。傷食發熱等病。則情焉家歡。盡變爲愁慘之象。於是不得不乞靈於藥物矣。西藥之性太劇。斷非普通人所能運用。稍一不慎。禍卽隨之。而中藥共有二千餘種。無用者十之五。誤述其

作用者十之三四。此乃科學未明。不能化驗之故。不必爲古人諱也。茲擇西人所用之中藥。性極平和。而確有實效者。得若干類。分別部居。以便檢查。如患虛損。則服強壯劑。患傷食。或便秘。則服瀉劑。小便秘少。則服利尿劑。感冒無汗。則服發表劑。壯熱不退。則服退熱劑。咳嗽吐痰。則服祛痰鎮咳劑。腹痛而腸內有寄生蟲。則服殺蟲劑。疼痛及不能安眠。則服止痛靈劑。吐血泄瀉白濁白帶等。則服收斂劑。吊炎而引病外出。則用刺戟劑。散癰消腫。改變血中壞質。則用變質劑。拔膿生肌。則用防腐消毒劑。嘔吐胃內毒物。或食物。則用吐劑。柔潤內皮。或滅外來之刺戟。則用緩和劑。凡此種種。對症施治。雖有小誤。亦無大害。此乃普通人用於家庭中最相宜之藥品。即徐靈胎先生之所謂淺近也。徐氏之言曰。夫所謂淺近者。如傷風。則防風荊芥。感寒。則蘇葉葱頭。咳嗽。則蘇子杏仁。傷食。則山查神曲。傷暑。則香薷廣藿。瘧疾。則柴胡湯。加減。痢疾。則黃芩湯。加減。婦人。則四物湯。加減。小兒。則異功散。加減。此皆歷聖相傳之定法。千古不能易也。或謂是書也。能化重症爲輕症。化輕症爲無病。能與家庭以絕大幸福。然耶否耶。讀者可以實驗矣。無錫丁福保。

家庭新本草目錄

- 第一類 強壯劑行氣藥階.....一
- 第二類 瀉劑.....十
- 第三類 利尿劑.....十二
- 第四類 發表劑.....十四
- 第五類 退熱劑.....十六
- 第六類 祛痰鎮咳劑.....十八
- 第七類 殺蟲劑.....二十一
- 第八類 止痛及安睡劑.....二十三

第九類	收斂劑	二二十七
第十類	刺戟劑	三十二
第十一類	變質劑	三十四
第十二類	防腐消毒藥	三十五
第十三類	吐劑	三十七
第十四類	緩和劑	三十八
第十五類	雜錄	三十九
第十六類	家庭療病法	四十一

附錄

普通防疫法

家庭新本草

無錫丁福保仲祐編纂

第一類 強壯劑 行氣藥附

肉膏

牛肉一分或用羊肉亦可冷水一分、先將牛肉切碎、入水內、加文火、不至沸、泡兩點鐘、再加快火煮半點鐘、濾渣入燙鍋、散氣成膏、其功用養生、病人胃弱、苟不存宿食、用此最妙、平日亦可常食、
服法、用膏一分者、加沸水五分至十分、化勻服之、不拘多寡、

牛肉湯

家庭新本草

牛肉一斤切碎凉水二斤、入鍋蓋嚴、置火旁、待二點鐘、再用快火熬半點鐘、去渣、酌加鹽、能養生、各病俱可服之、

山茱萸

此藥中國美國英國皆有、入藥用該樹之皮、內瀝一精、其功用作補劑、收斂、解瘵、作煮水法

龍膽草

此藥出歐洲之南、及中華等處、入藥用根、色黃味苦、內含一精、即珍提昆蟲、

其功用作補劑、開胃、治胃弱、身虛、

服法 每服二分至七分、研末服之、

薏麥仁 即大麥也

此藥各國皆有、入藥宜先春去外層粗皮、其功用作潤劑、養生、

薏苡仁

此藥中國各處有之、乃薏草所結之子粒、其功用與薏麥仁同、病人食此易消化、

黃連

此藥出中華、江左及四川雲貴等處、其根連珠而色黃、故名、其功用作補劑開胃、與龍膽草同、舊說以爲苦寒敗胃、此說不確、慎勿誤信、

服法 每服一分至三分半、

牛乳

此物爲養生上品、各國皆有、其功用能養生、改病、治嘔吐不止、宜加石灰水四分之、和服、常服治久瀉、久痢、久滯積、尿滯蛋青類、病人虛弱、宜加伯蘭地酒、雞蛋、各少許、調勻服之、

雞蛋青

蛋青之質、不但卵屬有之、精血乳內亦涵之、即動物植物汁內亦皆有之、其功用作潤劑、養生、解雙綠汞（即昇汞）及藍礬之毒、配水藥類、若混濁、加蛋青少許、即可變清、

懸鈎子

此藥中西均有、入藥用根、味苦而澀、

其功用作補劑、收斂、治久痢疾、作痰水用、

補血丸

鐵繡或鐵屑研極細、大黃末、苦參末、各一錢、薑末四分、糖稀和丸、桐子大、每飯後服、二三粒、日二三服、能補血、治黃病、及腦氣筋痛、疳積、及牙齦白色、或久瘵不愈者、頭暈因虛者、均宜之、然日日必食肉方可、

補血調經丸

鐵繡或鐵屑一錢、沒藥一錢、大黃末一錢、冰釅一錢、外國肥皂或糖稀、和爲丸、桐子大、每飯後服、二三粒、宜服二三月之久、治黃症、並調經、方內

家庭新本草

鐵屑、即鐵店打鐵飛揚之鐵、此一方、必日日食肉一次、

鐵醋

濃醋六兩、鐵繡或鐵屑一兩、同貯器內、常搖動四日後、濾清去渣、取貯玻璃瓶內緊閉、每服半錢至一錢、日二三次、可和水服、其功用同補血丸、

郁李皮

此樹產陝西河南等處、入藥用根皮果仁、其功用作補劑、開胃、

茯苓

產北方、在松根上寄生、其功用開胃、解熱、

白菴
入藥用根、其功用開胃、煖胃、行氣去風、治

飯不消化、傷食、

服法 每服二分至四分、與瀉劑同服、免
肚痛、

當歸

其功用能開胃、煖胃、

野菊花

與洋苦菊略同而力稍遜、洋苦菊、主治胃
弱、積滯、過服能令人嘔吐、其功用補劑、
開胃、

蒿艸

此藥種類甚多、功力則同、近來所用者、多
青蒿、其功用作補劑、開胃、

白朮

此藥出安徽浙江等處、入藥用該草之根、

其功用開胃、煖胃、行氣、利小便、

四

蒼朮

此藥出湖北山東江蘇等處、入藥用根、功
用與白朮相同、

苦陳皮

此藥出法國西班牙中國南方等處、入藥
用該果之皮、市肆所售乾皮、恆有柑皮橘
皮枸橼皮等類相雜、功力則同、其功用
溫補、祛風、開胃、暖胃、配他藥用、味甚適口、

辣椒

此藥各國皆有、結實分紅綠二種、其臭略
香、味苦而辣、其功用 大行氣、開胃、暖胃、
主治 肚瀉、霍亂、黃熱症、吐黑水、
滯積、 壘船、治瘧熱症、宜和金雞納霜

同服、其服法 每服一盞至二盞、爲丸服之、外用 弔炎、令皮熱、起水泡、作漱水、治喉類症、

胡椒

此藥出安南大小呂宋及印度羣島、入藥用子、其功用 去風、行氣、行血、開胃、暖胃、在直腸及尿管內、發其功力、主治 痔瘡、白帶、治瘧疾、和桂尼纒同服、其服法每服一分至四分、

加非

此藥出呂宋及印度海島等處、入藥用仁、內涵一精、其功用 開胃、行氣、解洋烟毒、

土茴香

家庭新本草

產英法及甘肅等處、入藥用子、其功用 行氣、祛風、化痰、治肚風、佐瀉藥同服、能治肚痛、每服四五分、

大茴香

產福建廣西日本等處、入藥用子、其功用 行氣祛風、每服六分至一錢、

小茴香

此藥各國皆產、顆粒長圓、面凸背平、較土茴香稍異、其功用 行氣祛風、治小兒肚痛、每服三分至六分、

小茴香泡水、小茴香一百二十至一百八十株末、沸水十六泡一刻鐘、濾渣爲度、每服半兩至二兩、治小兒肚痛、作射水亦可、

木香

此藥出廣東西畿印度等處，入藥用根，其功用 開胃、煖胃、行氣、免蟲蛀。

水菖蒲

此藥出中國美國印度等處，入藥用根，味苦辛而香，其功用 開胃、煖胃、治飯不消化，作酒等服之

菖蒲

水菖蒲一斤，淡酒酌用，先用酒一斤，泡八天，髮尖淋筍，淋乾，再加酒漂淋，至藥無味，入燙鍋，散氣成膏，每服一分。

菖蒲泡酒

水菖蒲一分，沸水十六分，泡一點鐘，濾渣為度，每服三四兩。

石菖蒲

此藥出西國並中華陝西等處，入藥用根，其功用 開胃、煖胃、與水菖蒲同。

雞內金

此藥即雞肫內皮，取出，晒乾，其功用 補胃、治滯積、飯不消化。

蒲公英水

蒲公英又名、黃花地丁、又名、黃苦草，或葉或根

入錢 碎，清水一斤，煎沸至一刻之久，隔淨，再加些沸水，收足一斤為度，每服一兩至二兩，半日服完，利大小便，胃不消化，肝積血，即口苦面黃，眼白發黃是也，此根生嚼之，亦效。

蒲公英酒

蒲公英鮮根扭汁三兩，濃酒一兩，浸

七天 每服一二錢，可沖水服，功用同上。此藥宜留涼處，此書所言濃酒，即火酒，若無火酒，可將上品之高梁酒代用。

蒲公英膏

蒲公英鮮根扭汁四斤，澄清，煮一刻，再入湯鍋散氣成膏，每服一二分，功用同上。

棗子酒

紅棗子三升，泡開水洗之，日光中晒乾，紅糖一斤半，燒酒一二斤，甜酒半斤，清水四五十斤，均和，夏天泡五日，冬天泡十日，後裝入玻璃瓶內，用新軟木塞之，以細麻繩索之，過五

家庭新本草

日，至十日，可服。然冬天必留於暖處，如此必迸起沫，其功用助胃易消化。夏天服解熱，每日服一瓶，即一斤四兩可也。此棗子可泡三四次，惟每次當加紅糖一斤半，燒酒一二斤，甜酒半斤，清水三四十斤，仍泡如上方可。

亞你瑟德酒

八角末八錢，蒔蘿子或小茴香粗末四錢，玉桂末二分七釐，肉荳蔻一分三釐，濃酒一瓶即一斤五兩，浸七日，濾清，加白糖十兩，水三兩，每服一小杯，能補火，補胃。

乾薑酒

七

乾薑末一兩、酒一斤、浸六日、每服一錢至三兩、暖胃、止嘔吐、止腹痛、

生薑湯

生薑片一錢、沸水六兩、浸半點鐘、每服一二兩、功用同上、身熱勿服、

乾薑湯

乾薑搗爛四錢、沸水十二兩、浸半點鐘、每服一二兩、宜乘熱服、治腹痛、氣噎、或輕痢症、服此亦效、

胡椒復音酒

胡椒五錢研末、酒一斤、浸十四日、每用此酒二三錢、水四兩漱喉、此酒可服五分至一錢、以煖胃補火用、

當歸酒

當歸一兩、燒酒半斤、先用燒酒六兩、浸當歸兩天、屢次搖動、濾清、後以燒酒二兩、再浸當歸半天、每服一錢五分至三錢、可與熱水相服、其功用能開胃、煖胃、

蒿草水

蒿草一兩、沸水十五兩、浸一點鐘、可作補藥用、日日服之、並開胃、

龍胆酒

龍胆草研末或苦參二錢、柑皮末或陳皮五分、八角末五分、燒酒二兩、清水六兩五錢、先以燒酒浸此藥、約六日、然後將水加入、濾淨、每服四

錢至八錢、飯前約半點鐘服、開胃補身、

苦參酒

龍胆或苦參三錢、燒酒一斤、浸兩日、每飯前服一酒杯、功用同上、服完再備、服至全愈為度、

龍胆草酒

龍胆草一兩五錢、陳皮七錢五分、砂仁七錢五分、燒酒一斤四兩、浸七天、每服五分至二錢、和沸水沖服、兩方功用同、作全補用、日三四次服、

苦參煖胃酒

家庭新本草

苦參或龍胆草研末二兩、甘草粗末六錢、

生薑粗末三錢、燒酒一斤半、同浸六

日、每服一錢至四錢、能煖胃、補胃、令

易消化、

白木酒

白木或赤木一兩、燒酒半斤、浸法與

當歸酒同、其功用補胃、行氣利小

便、每服一錢、

陳皮酒

鮮陳皮六兩、濃酒一斤四兩、浸七天、

法與當歸酒同、每服一二錢、功用見下、

陳皮酒又方

乾陳皮一兩、燒酒十兩、浸七天、法同

九

上、每服一二錢、

兩方均作補藥用、日服五六次、

高良姜酒

高良姜或子或根一兩、濃酒八兩、浸

七天、每服五分至一錢、沸水送下、

其功用補胃去風、

第一類 瀉劑

凡身熱脈壯、舌有厚白苔、腹內有氣、大便秘結、膈熱頭痛、俱宜瀉之、

元明粉

其功用能代洋朴硝、性頗寒、功力更峻、能治熱症、利小便、瀉大便、凡閉結者、服此能作水瀉、小服微瀉、其服法二錢至四錢、可輕瀉、四錢至六錢、能大瀉、服一錢可利小

便、

大黃

產四川滿洲、質脆臭香、味苦略澀、其功用清熱、去積滯、通秘結、助消化、若研至極細、功力愈大、蓋因其易入血也、其服法、重用利大便、輕用反能止瀉、故服末二分至三分、則利大便、服五釐至一分、可助消化而益身、

酸棗

產浙江、市肆所售、乃其乾果、入藥用皮、存過一年、方可用、其功用輕瀉、治滯積、

芝蔴

產中國及印度等處、入藥用葉及子之油、其功用潤劑、輕瀉、

蒲公英

入藥用根，宜在中秋後取之，功用輕瀉、

動膽汁、
主治肝塞、生膿症、同窩瘰癧疾後

黑紫蘆

入藥用根，性酷毒，慎勿妄用，其功用暴瀉、

瀉、調經、改病、治臌症、其服法、每服令瀉、二分至三分、改病每服四五盞、

牽牛子

此藥中國隨處皆有，雖分黑白二種，功力則同，其功用大瀉、水瀉、其服法、每服六七分、研末用、

花生油

此油自花生仁即長生菜榨出者、各國皆

家庭新本草

有、其功用瀉劑、養生、與洋橄欖油同、

菜子油

此油出大江南北等處、乃自油菜子製出、其功用潤劑、養生、與香油洋橄欖油同、

萬應丸

大黃二兩、二丑二兩、地骨皮、各二兩、

大椒研末、外國肥皂、和爲丸、桐

子大、每服五粒至十粒、日二次、即臥前、及中飯前二點鐘、連服二三日、每無精神不進食、素說不好過、宜之、

輕瀉方

蓖麻子油、即大麻子油、五錢至一兩、飯後兩

點鐘、或調溫水同服、或不用水、加白

糖、或雞蛋黃調服、小兒每服一二錢、或三四錢、服後隔三四點鐘必瀉、凡痢症初起、因腸內有不消化之雜質、及結糞在內、阻塞墜痛、欲下不下、服此良、傷食積滯宜之。

熬蓖麻子仙法

蓖麻子五斤、冷水泡一夜、次去水、將子再泡水、煮兩點鐘、去水、將子日光中晒三日、後搗爛、加水十斤、火上煮、屢次攪動、至油全浮上面、取出裝入瓶內、

二丑甘草水

牽牛即黑丑和_錢白丑_錢、_{研細五錢}甘草_{研末三錢}、每服二分至五分、開水送、日服一

二次消臌症

第三類 利尿劑

側柏一名扁柏

此樹中西均有、入藥用該葉與子、其功用行氣、祛風、利小便、主治白痢、臌症、其服法作泡水或服油酒等、

側柏泡水製法、側柏子_{一兩或}水十

六兩、泡一刻鐘、濾渣、分三次服、利小便、治老人小便閉甚效、

側柏油一名柏子油

此藥自未熟柏子蒸出、無色、味辛、臭香、功用利小便、與側柏子同、而力較勝、其服法 每服四釐、

側柏酒製法 側柏油一分、濃酒四十九

分、化勻爲度、每服六分至一錢、能利小便、治噤症、

琥珀

松香入地、年久卽成、其功用行氣、能轉筋、生精液、利小便、主治、經脈不調、羊癲風、牙關緊閉、哮喘、抽風、琥珀一分、濃酒十六分、浸七天、過淋紙、每服五分、治頭疼、

茅根

功用輕瀉、利小便、在尿具發其功用、

榆皮

其功用潤劑、利小便、外用爲潤皮劑、解炎、

榆皮漿水、榆皮一分、汽水八分、共入鍋、

家庭新本草

熬十分鐘、濾渣、加水、仍足八分、每服二兩至四兩、

榆皮漿、榆皮一分、沸汽水十六分、入有蓋器內、浸兩點鐘、濾渣、每服二兩至四兩、

外用治大頭瘟、火眼、

杜仲

此藥出中國西南等處、入藥用該樹之皮、功用利小便、

野芹菜

此藥中西皆有、根葉與子均可用、其功用開胃、暖胃、利小便、調經、其服法、每服用子二分至三分、根葉泡水、可多服、或服其油、功力較大、

金雀花

此花數種，產歐洲西南，並美國英國，及中華廣東肇慶瓊嶺等處，鄉人取以爲帚，枝稍花蕊極繁，黃色如雀嘴，故名，入藥用該草之嫩枝，鮮乾均可，其功用 利小便，輕瀉，治臟症。

金雀花水

金雀花一兩，沸水一斤四兩，煮一刻，每服二兩至四兩，其功用 輕瀉，利小便，治水臟。

金雀花汁

金雀花嫩枝五斤，入石臼內搗爛，盡出其汁，每汁三錢，加入火酒一錢，放下七日，隔淨，收貯冷凍之處，每服五分，至一錢，日一二服，此方消水臟甚效。

槐葉水

槐樹葉四錢，八角研木一錢，沸水一斤，待冷，每服四兩，一日服完，治水臟，服至全愈爲度。

風濕湯

火硝七分，每日三服，用薏仁湯化，療風濕，但每日分兩，以漸加多，服至每次一二錢，而每日，仍宜三服，大抵依此治法，亦須服至二三旬，方效，患者服之良。

第四類 發表劑

凡熱症初起，宜發表，惟當熱症盛發之時，須先服涼劑，如瀉藥，俾熱少減，然後可發表。若發燒皮乾汗少，此非發表不治，神

經痛如火牙痛、面痛等、發表亦妙。外感而血積內踣發表則能令血散行於外皮而愈。小兒出麻遲慢或出麻後旋收宜發表。凡服發表藥臥時須多蓋被窩爲要。

沸水

其功用能發表外用則行氣、運血、沐浴發汗、又沸水所發之氣功能化痰。

荊芥

種類各國相同、梗葉鮮乾、皆可用、其功用補劑、解熱、發表、收斂、

地骨皮

此藥出江蘇河南陝西甘肅等處、用樹根之皮、其功用補劑、解癥、發表、

地骨皮泡水 地骨皮_{半兩}沸水十兩、納

有蓋器內、浸一點鐘、濾渣、每服一兩至三兩、

火硝退燒散

火硝三分半至五分、水二兩、化服、

可以發表、並治風濕痛、治吐血安心平脈、

樟腦發表散

樟腦_{研末}三厘、火硝_{研末}三厘、和勻、

每睡前服三厘半、或加鴉片土一厘七、同服更好、薄荷水送下、可發表、

薄荷發表湯

薄荷葉二錢、清水八兩、煎服、功用發表、止悶祛風、治肚痛、

硫黃發表方

硫黃研末分半至五分、薄荷水煎服、可

發表、

發表湯

生姜三錢、煮湯加些胡椒、燒酒、紅糖、作一大碗、睡前熱服、多蓋被單、亦可發表、

榆柴湯

榆樹內皮三錢、柴胡二錢、甘草三分、水一斤、煎去三分之一、作兩服、可發表、

熱水汽發表方

病人將衣服卸去、坐於板凳上、頸項以下、用衾圍覆將熱水一桶、置於板凳下、熏身、若水稍冷、續加煨紅石卵、或青

磚、按諸水中、使水之熱氣騰蒸、自可

發表、

第五類 退熱劑

冷水

其功用能解熱、平脉、凡患熱症、皆可飲之、若外用能止血、消炎、沐浴退熱、

冰

其功用能解熱、消炎、主治 咽喉類、病、胃內皮生炎、大小腸內皮生炎、腸胞膜生炎、嘔吐不止、若外用、止血、消炎、

治腦類病、裝象皮袋用、或猪尿泡亦可、

白藜蘆

入藥用根、其功用 去火、除煩、平脉、

礪砂

此藥出西藏印度等處，生成而經練者，結冰無色過光，露空氣微化，分成白散，味始略甜，繼則略鹹而苦，內含糊酸，其功用解熱，利小便，動經，令子宮收縮，與肉桂汽水同服，治胎衣不下，其服法每服一分至五分，若分用治皮類病，治白屑風，及連環癩，宜將此藥入水內，至溼而不化，洗之最妙，硼砂漱水，硼砂一錢，蜂蜜五兩，共化勻爲度，治咽喉類痛。

生菜

此藥各國皆有，花葉梗俱可用，其功用

寧睡、平火、安心、發表、利小便、輕瀉。

金棗

家庭新本草

此藥出中國等處，與檸檬同類，而菓甚小，其功用與檸檬同。

桑椹汁

此藥中西皆有，乃桑椹扭出之汁，其功用爽神、輕瀉、解熱，其服法加

火硝常服方

火硝一錢至一錢八分，水四兩至六兩，

每服一兩，日服完，次日再服，能退

熱、利小便、消臃症。

火硝龍胆水

龍胆草研末五分，火硝一錢，沸水一

斤四兩，俟冷，每服一兩，一日服完，

次日再服。

功用同上。

火疔治眼方

火疔五分至一錢，水一兩，均化，常洗

眼，可治眼病。

冷水治傷方

跌打損傷，扭傷骨絞，刀傷鎗傷等症，宜用

冷水浸二三點鐘，並敷以濕布，頻頻

換水，略半日，能散血止痛，免發炎，不

致成膿。

冷水消熱方

療大熱症用冷水，其法有三，一，以冷水

抹身，此法隨時可用，一，以冷水淋

身，一，以衾蘸水覆蓋全身，外加衣

被護衛，此法須用諸多發熱時，令冷

氣透入臟腑，俟一二點鐘，並飲些冷

水，方能散血退熱。

第六類 祛痰鎮咳劑

蒜頭

此藥各國皆有，味辛而熱，其臭刺鼻，其功

用 化痰、開胃、外用能弔炎。

蒜頭敷藥 製法，蒜頭入臼搗爛，敷患處，

治肚痛胃痛。

蒜頭糖 製法，蒜頭四兩，醋十二兩，

浸半天，濾渣，加白糖半斤 燻熱，令化，適

布為度，治嬰兒咳嗽，每服半杯至一

小杯，大人每服一酒杯，患乾咳者尤宜。

硝砂

此藥製法不一，古人自駝糞升鍊而出，今

則自蒸煤氣餘水、或蒸骸骨餘水、與磺強水、及食鹽製出者、其功用 化痰、動膽汁、調經、發表、利小便、主治 久氣管炎、咳嗽、風濕、癱症、吸核變大、面部腦筋痛、每服一分至三分、加水、日三次、

杏仁

其功用 化痰、潤劑、治咳嗽類病、

鳳尾艸

此藥出英美及中華山西等處、其功用化痰、治久咳嗽、作糖服、

鳳尾艸糖 鳳尾艸一分、沸水十分、泡一天、過濾紙、加煉白糖十九分、化勻爲度、

阿魏

此藥色紅黃而白、味苦而辛、其臭頗烈、功

用 止咳化痰、每服宜用五釐至分半、

每三四點鐘一服、若小兒則減半、凡有咳症、無論童叟、均宜服、老者服之尤佳、此蓋能補腦、而化痰也、

天花粉

此藥出中國美國等處、乃以栝樓根作粉、其色潔白如雪、故名、其功用化痰、多服能吐瀉、主治咳嗽、肺胞膜發炎、其服法每服四分至一錢、治風寒咳嗽、

甘草

此藥各國皆有、入藥用根、以甘味甜、故名、其功用 潤劑、化痰、主治 肚腸內皮生炎、尿管內皮生炎、咳嗽、

天門冬

此藥出中國迤南及安南等處，入藥用該草之根，其功用 化痰、治咳嗽、

麥門冬

此藥出中國兩江等處，入藥用根，其功用 化痰、止咳、與天門冬同、

天門冬酒

天門冬根或麥門冬根一兩，燒酒八兩，浸八天，每服五分至二錢，沸水

和服，其功用化痰止咳、

硫磺化痰水

硫磺末一錢至三錢，糖水開服，治久咳多痰、

鳳尾草水

鳳尾草一兩，沸水十兩，浸一天，用布

濾淨，加白糖一觔三兩，化調，止咳嗽化痰，每日服一二兩、

化痰止咳茶

胡麻子粗末四錢，甘草粗末二錢，沸水一斤，浸半點鐘，每服一兩至二兩，一日服完，次日再服，潤肺，止咳，化痰，療小兒熱痛奇效、

沒藥研末 每服一分至四分，日一二服，治久咳，並化痰，行血，開胃，腹內有風，及大便結者，宜服、

氣喘烟

火硝一錢，清水六錢，調化，將小茴香不拘多少，打碎，浸之，取出晒乾，用新烟

沒藥研末

沒藥研末 每服一分至四分，日一二服，治久咳，並化痰，行血，開胃，腹內有風，及大便結者，宜服、

臺裝之、每日當烟吃、或將紙浸之、後晒乾、或燒之吸其烟、或卷起當外國烟吃、治氣喘、

止咳漿

鳳尾草一兩、天門冬一兩、砂仁一錢、沸水一斤九兩、泡六點鐘、濾淨、加鴉片膏六釐、白糖二斤半、攪勻、待十二點鐘即成、其功用 止咳化痰、每日服一二兩、可沖沸水化服、

止咳糖

紅棗去核三兩、甘草五錢、天門冬二錢五分、鳳尾草三錢、罌粟花殼二錢五分、沸水一斤、煮極爛、用粗夏布濾隔、擠出漿肉來、加白糖半

家庭新本草

斤、攪和、微火散氣、倒於洋鐵皮上、打扁成餅、其功用 止咳化痰、每日服一二兩、

第七類 殺蟲劑

檳榔

其功用收斂、殺蟲、治腹內蛔蟲、每服四五錢、煎服、其外用 燒成炭、研末、作刷牙散、

使君子

產安南四川閩粵等處、入藥用子、其功用殺蟲、服法每用四五個、打碎、取仁、蜜調、空心服、

硫磺

此質萬物中多涵之、而地中及近火山處

更多用法、須煉成粉質、較淨、其功用輕瀉、

發表、化瘤、痔瘡、久風溼、其外用、

硫磺一分、煉猪油四分、調勻為度、治瘡疾

最妙、服法、發表化瘤服二三分、輕瀉服四

分至一錢、

肥皂

外用治疥癬與皮類等病、

棟根皮

此藥出中國印度等處、鮮乾根皮皆可用、

其功用 收斂殺蟲、

棟根煎水 鮮棟根皮二兩、水二十兩、入

鍋熬至十兩為度、每服半兩、

棟根酒 棟根皮二兩半、淡酒一斤、納有

蓋器內、浸七天、間時搖動、絞渣、過淋紙、再

加酒、仍足一斤為度、可作補劑、殺蟲、

苦棟子又名金鈴子

此藥即棟樹所結之子、色黃、味苦、其功用

補劑、殺蟲、

苦棟子酒 苦棟子一分、濃酒八分、先用

酒六分、浸二天、裝淋甯淋乾、再加餘酒漂

淋、仍足八分為度、每服半鐘、

南瓜核

此藥中西均有、即南瓜乾核、去皮用之、其

功用 殺扁蟲、其服法 每服一二兩、

疥癩膏

硫黃末一兩、猪膏即猪油四兩、和勻、

搽疥癩、宜先洗身換衣、然後搽藥、

疥癩膏又方

硫磺二兩、冰鹹一兩、清水一兩、猪膏七兩、先把鹹化於清水、後和硫磺、用法同上、或不用水亦可、

虱子膏

水銀一兩、黃臘一兩、猪油四兩、先將猪油黃臘、微火化開、離火等冷、加入水銀、研至不見水銀爲度、殺虱、或搽頭上、或搽身上、均妙、

第八類 止痛及寧睡劑

草烏頭

此藥出於歐洲、印度、中華等處、根葉皆入藥、味甜而苦辛、入口能令唇舌麻木刺痛、其功用、甯睡、止疼、平腦、平脉、解熱、解炎、其服法、約一分至二分、

過服能使遍體麻木、主治、痛風、胃氣痛、毒瘡、心體變大、梅核生炎、牙關緊閉、癆痰、其外用、治風濕疼、腦氣筋疼、

關羊花草 又名羊躑躅

此藥中西均有、入藥用該草枝葉與花及根、內函二精、一卽海瀝夏民精、二卽海溫鮮精、其功用、止疼、寧睡、平火安心、若服鴉片不驗者、可用此代之、主治、驚悸不寐、小便頻數、佐瀉劑免其肚痛、其服法作酒膏等服之、見下

鴉片

此藥出印度波斯土耳其及中國等處、乃

罌粟之汁造成、今西醫通用者、以土耳其所產爲上品、

其功用 止疼、寧睡、發表、阻內臟津液、雖能發表、總滯周身津液、少服提神、行血、使人脈數而實、多服令人昏睡、發表頭疼、煩渴、便燥、嘔吐等狀、過服則令人沈睡不省、常服使人胃弱不化、呼吸短少、致血內養氣不足、其服法 每服一二釐、

解此毒者、先用吐劑、如白礬半兩、或芥末半兩、用水一碗化服、令吐後、再多飲溫水助嘔、至吐清水爲止、後再飲加非茶、或濃細茶、或服加非精、又扶助行走、勿寐、外用冷水洗面、及前後心、或用手巾蘸水拍打

亦可、但行此數法之後、若見氣息還不舒展、急將患者二臂屈伸、助其呼吸、亦救急之一法也、

柏子治風濕方

柏子杵爛半斤、能治風濕痛、及腰痛、週身疼痛、用洋鐵盒或碗盛貯、再以火鉢貯火炭、以微火炙之、俟烟起時、將身睡臥、用棉被蓋好、卽以柏子烟火鉢一併放於膝下、蒸之、使烟週身蒸透、血氣活絡、如在上身疼痛、卽放傍邊蒸之、

老大農鴉片酒

鴉片碎二兩、紅藍花一兩、桂皮末一錢五分、丁香末一錢五分、淡酒

一斤、和勻、浸七日、入羅器濾隔、由是再加些酒、至濾淨、共有十六兩爲度、每服十滴、至二十滴、其功用、止痛、令人安臥、久患眼熱及有膜者、滴入眼內、耳膿滴入耳內、蟲牙滴入牙內、小兒忌服、

收口止痛膏

鉛粉、又名白粉、又名光粉、又名官粉五兩、

花生油或茶油或別油十兩、白

臘或黃臘九錢六分、清水十兩、先

將油放入銅鍋、次以鉛粉末篩入、頻

頻攪動、然後加入清水、用火煎三四

點鐘、不住頻攪、若上面起大泡、並變

色、卽成、此時離火、加臘、然後以布、或

皮紙開調、能生肌、收口、並治頭痛、頭風、貼兩太陽、治風氣痛、腦筋痛、跌打損傷草

三七、王不留行、石勒草、紅花、葱韭汁、霸王鞭、七星劍、凡對葉方骨之草、杵爛、以酒麵煮糊、敷傷腫疼痛之處、可以見效、

樟腦膏

樟腦二錢、豬油六錢、黃蠟一錢、微

火化調、至冷、其功用止痛、治風濕、頭

痛等、擦患處、

樟腦酒

樟腦八錢、燒酒六兩、和化、擦風濕、跌

打甚效、

樟腦油

樟腦一百搗碎、普梁酒少許調之、花生油或麻油四兩、風濕、骨絞痛、擦患處、

樟腦辣椒酒

樟腦二錢、辣椒五分乾的、濃酒一斤四兩、浸七天、其功用止痛、治風濕、頭痛等、擦患處、

樟腦安心淡酒

樟腦一錢、燒酒二錢、水一斤、先將樟腦入酒少須、研細消化、再加餘酒與水、每服一二兩、服三四次、能治咳嗽、氣喘、舊症、止痛、安腦氣筋、心跳、腦不安、

樟腦安心濃酒

樟腦八錢、燒酒六兩、和化、每服五滴至三十滴、沖水服、功用同上、

止痛油

樟腦四五錢、花生油或菜油二兩、鴉片酒四錢、或熟鴉片膏一二分、和勻、擦痛處、良、耳痛點耳內、

止痛酒

樟腦二錢、鴉片膏一錢、燒酒一斤半、浸七日、濾渣取用、每用一錢至二錢、調水服、止咳、令人安臥、止痛甚效、

玉桂薤菘散

玉桂末一兩六錢、薤末一兩六錢、壹

寇末八錢、八角末八錢、和均、每服
分半至五分、沸水泡、治腹痛、氣脹、

玉桂茵蔯酒

玉桂粗末八錢、八角末四錢、葦末三
錢、茵蔯酒一斤、浸十日、每服一二
錢、沖沸水服、

功用同上、

小茴水

小茴香研末三錢、沸水一斤、浸一刻、
治小兒肚痛、每服半兩至一兩、

大茴酒

大茴香一兩研末、澁酒四兩、浸七天、
治腹痛、行氣、去風、每服二分至
三分、沖水服、

第九類 收斂劑

白礬

此藥自礬石煉成、色白、透光、味甜而澀、後
則略酸、其功用 收斂、吐劑、解血中
鉛毒、

主治 血崩、久痢疾、消渴、尿變甜、內

腎血出、嘔吐痰涎、

服法 每服約一錢、三次、蜜水調服、治內

部血出、及解鉛毒、

又可作吐劑用、

又可治小兒哮喘、加蜂蜜、以吐爲

愈、

外用 收斂、止血、治咽喉類、白帶、白

濁、

白礬敷藥製法、白礬一錢、雞蛋青二枚、調

勻爲度、敷眼胞上、治火眼最效、

亦治凍瘡、損傷、

白礬洗水製法、白礬一分、水一兩、化勻爲

度、治眼火眼、

白礬射水 白礬二錢、水二十兩、化勻爲

度、水節射之、治白濁白帶、

治小兒肺炎喉喘方、白礬末一錢、開糖

水、每日服二三次、至嘔爲度、倘一

日未驗、次日再服、

柳樹皮

中西均有、種類雖多、功力則同、白柳爲佳、

入藥用枝皮、味苦澁、臭味香、其功用 補

益、收斂、開胃、主治 胃弱、飯不消

化、久欬多痰、其服法、柳樹皮一分搗

爛、沸水十二分、泡二點鐘濾渣、每服二兩

至四兩、

沒石子

此藥在柞木等類之上、因蟲而生、出印度

島及波斯中國等處、水與酒均能提出功

力、其功用 大收斂、主治 內部血出、

尿血、血山崩、肺血欬出、痢疾、其服

法、每服二三分、研末服之、外用 止血、

治鼻衄、牙齦血出、白濁、白帶、

五倍子

此藥出中國四川等處、乃鹽麩子樹上因

蟲而生、其功用 收斂、與沒石子同、而

力較遜、

石榴

此藥出歐洲小亞西亞及中國等處，入藥用該菓之皮及樹根皮，其功用 收斂、殺扁蟲、

地榆

此藥出中國湖南湖北等處，入藥用根、酒醋均能提出功力，其功用 收斂、止血、崩、經漏，其服法，配醋酒等用、

樹樹皮

此藥中西均有，與橡柞等樹相類，入藥用該樹之皮，去外層粗皮，用內細嫩者，水與淡酒均能提出功力，其功用 收斂、補劑、止血、治久痢疾，其服法，每服六分至二錢，其外用，治牙齦潰爛，白

家庭新本草

帶、

白芍

此藥出河南安徽等處，入藥用根，其功用 收斂、治痢疾、經漏，其服法，作泡水及酒等用、

臭椿水

臭椿皮一兩，沸水一斤四兩，浸兩點鐘，作收斂用，止血止瀉，每服一二兩，日三四服、

吐痰血丸

白礬末一錢，鴉片末二分，兒茶一分，共研勻，和糖稀，作丸六十粒，間兩點鐘，服一粒，鴉片末即鴉片膏，熬乾成末，止吐痰血甚效、

二十九

脫肛水

白礬一錢或二錢、清水六兩、和勻、以水篩

射入糞門、治痔漏流血、及脫肛、

白礬漱口水

白礬末一錢、清水五兩、和勻、漱喉甚

妙、治喉熱痛爛、

石榴果水

石榴果皮一兩、浸沸水一斤四兩、煮去

一半待冷、每服五錢至一兩、日三四

服、治吐瀉盜汗、喉嚨痛、用此水漱口

亦妙、

五倍子丸

五倍子研細五、鴉片膏九釐、樟腦一

分七釐、和蜂蜜研勻、作十丸、每

服一丸、日服三次、治吐瀉痢疾、

胆礬眼熱方

胆礬二釐、水一小酒杯、調化點眼內、日

三四次、治眼熱、胆礬搽眼蓋內皮、

兩日一次、治眼蓋紅腫、

地榆醋

地榆研末一、酸醋八兩、和勻入磁鉢、

煮去一半、待十二點鐘、治血崩、經

漏、每服一二錢、日數次服、

地榆醋叉方

地榆乾根四兩、酸醋一斤四兩、浸七

天、每服一二錢、功用同上、

白礬痔瘡膏

白礬一錢半、豬油三兩、黃臘一兩、先

將豬油黃臘、火上化之待冷、與白礬調和、塗痔瘡上極效、

兒茶桂皮末

兒茶末二錢半、桂皮末五分、沸水八兩、同浸半點鐘、渣淨、每服八錢至一兩、治瀉、若痔流血、及鼻流血、用此藥水洗之、或摻以藥末亦妙、牙肉浮腫、宜取兒茶一粒、含化可愈、

兒茶桂皮酒

上品兒茶二兩、桂皮末八錢、燒酒十五兩、浸七日隔淨、每服五分至一錢、沖水和服、每一點鐘服一次、其功用、治久痢、治久瀉、甚效、治痢若兼以外治、如敷止痛敷藥、或貼膏藥、或刮

痧、或熱水布措於腹部、則見效更捷、

兒茶豬油膏

兒茶一錢、豬油八錢、和勻、敷膿瘡、奇效、

敗麥水

小麥變壞色黑、或粟米變壞、新採者研細二錢

沸水十兩、浸半點鐘、每服半

兩至二兩、每半點鐘一服、其功用

收斂、能令子宮收縮發力、逼胎

兒速生

敗麥酒

敗麥或粟米如上方五兩、燒酒二十兩、

浸七天、每服十滴至一錢、沸水送、

功用收斂

以上兩方凡臨盆乏力者、或胎衣不下者、宜服、但胎兒橫生、或兒頭未落者、切忌勿服、凡產後或小產流血、服此能止、閉經服此亦或可治、凡鼻血、咳血、大小腸流血、內腎流血等症、服之皆驗、凡大人小兒、或日間、或夜裡、溺急卽遣、不能忍耐者、服之可愈、遺洩者亦效、

棉花根水

棉花根鮮皮四兩、浸沸水二斤、煮去一半、

主治 催生、每服一二兩、每半點鐘一服、其餘功用、同前、

槲樹敷藥

槲樹皮搗爛外敷患處、治肌肉有紅腫、

槲樹洗疥水

槲樹皮一兩、清水一斤、同煎一刻、濾隔、再加水以仍得一斤爲度、凡患膿瘡等症、可用此藥水洗之、若牙肉浮腫、及有喉症、可用此水漱口、

兒茶復音水

兒茶二三分、水一二兩、漱口、治喉嚨

軟弱、語音不響者、

第十類 刺戟藥

斑蝥

此藥乃豆莢上飛蟲、出西班牙佛蘭西俄羅斯等國、中國所產、狀殊而功力同、其功用行氣、利小便、補陽、其服法、

每服二三釐，作丸用，多服令小便熱痛，宜
慎用。

主治久悻病類，久白濁，便澀，陽痿，外用，甲
炎，起水泡，引病外出，治肺膿生炎，心胞絡
生炎，肺胞膜生炎。

斑蝥膏

斑蝥研末四

黃蠟二兩，松香二兩，

豬油二兩，先將黃蠟、松香、豬油資鎔，
然後將斑蝥末加入，攪至凝結爲度，
此膏用布開條，或紙亦可，大約貼三
四點鐘，或五六點鐘，俟其畧起水泡，
隨即撤去，再用麥糠甘菊敷之，其功
用凡臑腫發炎，俟其稍退，宜貼此膏，
令引炎出，頭腦積血伏熱等症，宜

家庭新本草

先用藥清熱，次用吊膏貼頸後及小
腿裏，眼內久患熱症，宜貼太陽空
及貼耳後頸後等處，自可免生翳膜，
肺內熱症已退，尙覺痛而未愈，宜
貼胸前，臑筋作痛，宜貼患處，若骨
絞作痛發腫，宜貼數次，方能見效。

斑蝥椒樟酒

斑蝥末一錢，青蒜一錢，樟腦四錢，

芥子

研末四錢

川椒四錢，共搗爛

濃醋四兩八錢，火酒或高粱酒
九兩六錢，攪和，浸七日，濾去渣，其
功用止痛，擦皮肉交節等處，日二
次，能引病外出，極妙。

瘋癩搽膏

三十三

斑蝥

細末八錢

樟腦細末一錢

豬油八兩

調和治四肢癱症，每用一錢至三錢，擦患處，日一次，擦數日。

芥子敷藥

芥子粗末一二錢，清水少須調和，鋪在

布上外敷，若小兒則用芥末、麵粉，各

半調敷，牙痛，宜敷頰部，隔症敷

心口，腦筋作痛，骨絞作痛，發腫，及

患走風脚症，敷患處，臍內發熱痛，

按其部位敷之，傷風頭刺，及顛狂

症，敷胸心，心口痛，敷心口，若嬰兒

抽筋，敷背心。

第十一類 變質劑

土茯苓

產中國南方，入藥用根，與洋茯苓同，其功

用，補劑，改病，發表。

主治 楊梅結毒，久風溼，膿瘡，頑

癬，服法二三錢。

芭蕉根

此藥出南方近赤道各處，用其樹乾根，其

功用改病，治瘰癧類症，配流膏用。

芭蕉根流膏 芭蕉根粗末一百分 淡酒酌用。

先用酒三十五分，潤末，照流膏方，實裝

長圓淋筒淋淨，先淋七十五分，另存按公

法製成一百分為度。

昆布散瘰方

乾昆布半斤 燒酒一斤，共浸十日，每

服一錢，日三四次，宜服一二月，其功

用散燻化瘤、治癰癤、又肥人服之、可瘦、

又方

昆布一兩、海藻一兩、研末、和蜜爲丸、如彈子大、每日置口化服四五丸、服一二月、功用同上、

水銀膏

水銀二兩、花生油或別油一錢、硃砂四錢、

末一分半、密陀僧膏或平常萬應膏四兩六錢、先以油研化硃末、次將水銀加入、研至不見水銀星爲度、然後將萬應膏、煨熟、合共相勻、主治

肝脾發大俗名脾塊、骨絞發腫、及頸溼癬癩、疔毒等症、用洋布開調、貼

患處、

水銀搽膏

水銀藍膏四兩、黃臘二兩、茶油或生油

二兩、樟腦一兩、燒酒二錢、但此物須加

先將黃臘煑燥、次以茶油相和、俟其將冷、然後加入樟腦、及水銀藍膏、

一併攪勻、此二膏主治、骨絞發

腫及皮膚發症、係因久患疔毒而致

者、但須在兩腋下、及兩脾裏搽之、則效、

第十二類 防腐消毒藥

拔膿生肌膏

采油一斤、白肥皂三錢、紅丹五兩

三錢、鉛粉二兩、黃臘二錢、熟

豬油三兩、樟腦二錢半、枯礬四錢、

先將油與肥皂放入銅鍋，次以紅丹鉛粉末，漸漸篩入，頻頻攪動，以火煎三四點鐘，不作頻攪，若面上起大泡，並變色即成，此時離火加臘、樟腦、枯礬末，拔膿生肌奇效。

密陀僧膏

密陀僧四兩、豬油四兩、花生油或麻油四兩、水半斤、先將油放入銅鍋，次以密陀僧末篩入，頻頻攪動，然後加入清水，用火煎二三點鐘，宜頻攪，若太稠則再加水，以燙至恰可成膏爲度，待冷，以手浸水，將膏成條，此膏多和別藥，成膏藥用。

收口膏

密陀僧膏一斤十一兩、番鹹即洋肥皂四兩八錢、松香八錢、宜照密陀僧膏法製之，成後用布開紙開調，均可。凡瘡科及皮膚等症，不能收口者，以此膏貼之。

化腫膏

密陀僧三兩、醋三兩、花生油或麻油九兩、微火煎成膏，貼患處，熬法見密陀僧膏。

拔膿膏

吧油又名柏油二兩、黃臘二兩、松香二兩、油半斤、火化成膏，遇膿瘡拔毒，甚效。

消乳癰草

蒲公英、能消婦人乳癰、將蒲公英、或根、

或葉、搗爛敷患處、

炭末毒瘡敷藥

堅炭末研極細 麵包二兩、胡麻子末

一兩半、沸水十兩、先以淨水浸

麵包、一小刻之久、攪勻、漸加胡麻子

末、以一半堅炭末攪勻、再將一半堅

炭末、摻勻上面、作一服、敷貼患處、其

功用治腐爛毒瘡毒癰之類、能止痛

辟臭穢之氣、

金銀湯

忍冬或金銀花三五錢、沸水一斤、凡

患風濕、水腫、及口生白苔、以及疔毒

者、宜當茶日服之、

石灰水

生石灰一兩、涼水五斤、和勻、澄清打

出上面浮水服之、治胃酸作瀉、嘔

吐不止、每服半兩至二兩、日三四

服、凡金錢癬、爛頭、耳孔喉際作痒、及

惡瘡、用此洗之、亦驗、

第十二類 吐劑

芥末

分黑白二種、黑者有油、入藥用黑白各半

為佳、其功用 服至一錢、即能作嘔、誤服

鴉片者、用此救之、頗驗、治胃不消化、每

服三分、日三服、

外用、大行氣、引皮炎、運血、弔炎、作敷藥用、

白礬取吐方

白礬一二錢，糖水開化服之，能取吐，救

服鴉片各毒物，宜白礬三四錢，開糖水化服，未吐，再服，服後多飲煖水，助嘔。

第十四類 緩和劑

胡麻消腫敷藥

胡麻子四兩粗末，生油或別油四錢，沸水

半斤，先以沸水將胡麻末和勻，漸逐加入生油，加時不住手攪勻，主治：凡皮肉發炎，紅腫成瘡未破者，及心肺肝胃，大小腸發炎作痛，按照各處部位，在外敷之，勿令勞動，可減輕炎痛，漸漸消散，在外者，則或消，或

熟，令其成膿，破穿出外，不致釀成大患。

榆皮消腫敷藥

榆樹皮剝花，以煖水浸之，可敷熱腫之處，或和以胡麻子末，甘草末，濕敷之，亦取其溫軟，溫潤，以止痛，消腫之效耳。

蜂蜜

此藥中西均有，乃蜜蜂所作，味甜而美，其功用：潤劑，輕瀉，多食令人肚疼，佐他藥和服最宜，其外用敷惡瘡，漱口喉等。

柏子敷藥

柏子四錢搗爛，麥糠八兩，甘菊二錢，

炭燭乘熱敷之、凡毒瘡初腫未潰者、塗之、良、或以柏子桐子飯或藕粉或別藥可也。

麥皮消腫敷藥

麥皮

四兩或半斤

甘菊花四錢

胡麻子錢六

搗和成礮、乘熱敷之、其用有二、

一、取其溫煖、一、取其濕潤、一、取其軟滑、故能引炎腫從外面消也、主

治 凡肌膚發炎、骨發發炎、腫痛、外敷患處、勿令發炎肢體轉動、冷即換熱者再敷、內腫等處、或連網發炎、按各部位在外敷之、勿勞動甚效、

第十五類 雜類

檀香

家庭新本草

產安南雲貴等處、內含油質、入藥用、其功用行氣、治白濁、

食鹽

功用行氣、殺蟲、治肺血吐出、解癥、多服能吐瀉、補劑服三四分、瀉劑服二三錢、吐劑服半兩加水半斤沖服、治暴吐血、用一錢、治瘧疾、服一兩、分爲數次服之、趁病發過、服之、用榆皮灰水和服、免嘔吐、今鮮入藥用、外用治手足扭傷、及跌打損傷、法用沸水將鹽浸濡、至濡而不化、用布蘸敷患處、效、用水箭射鼻內、治鼻涕變臭、凡咽喉久病、用此漱之、治感冒傷風、法用水化食鹽少許、或漱口喉、或漱鼻孔、均可、蛇咬、用刀刮去傷口之毒、再用食鹽敷之、

菸葉

其功用平膈、寧睡、吐劑、化痰、外用吸之、治氣喘、研末嗅之、治新頭風、按此藥有毒、外用亦宜慎

白芷

此藥屬香味類、中西皆有、入藥用根、外用作粉擦牙等用

大麥茶

大麥鍋內炒、泡開水、夏天當茶噓、甚涼、凡胃痛痢症皆宜常飲、

枯礬

白礬入磁鍋鎔化、加熱不過四百度、煨枯研末、每百分得枯五十四分、其外用、丹類、去菌肉、治口瘡、

小粉

此粉不一、有麥粉、米粉、粳末及萊豆小米等粉是也、粉異而用同、其功用潤劑、外作撲粉、治皮類病、

小粉漿、小粉二錢、汽水十兩、和勻、入鍋熬至成漿、作射水用、或用布織入漿內、泡透、提出、裹紮患處、治骨斷折最效、

石膏

此藥中西皆有、乃自然生成者、白色、狀如方解石、作煨石膏、西國不入藥用、其透光者、爲元精石、

煨石膏

將石膏入爐加熱、不過三百度、存性、去火、研細爲度、不宜內服、此藥見水變硬、醫家

慎作外用之品，塗抹布條，內外裹紮骨折等症，酒水變硬，使骨不動移。

珍珠 石決明 牡蠣 蛤粉

鍾乳石 石蟹 凝水石 龍骨

龍牙 雲母

已上十種，本草綱目，誇其語多妙用，而究無實據，西醫常用法細覈，始知各物，均固有石質，及炭養氣，故功用，祇同火石粉，若用烈火煨之，則炭養氣散去，即變爲石灰，其妙處不過如此，然則入藥者，何必以珍珠等物，而徒取其貴也，誠知火石粉足以代之，則虛糜可省矣，但此物必須研細飛淨，乃堪內服，至若論其功用，亦只解酸而已。

第十六類 家庭療病法

治刀割輕傷法

先用清水，將患處洗淨，如流血，用涼水，不流血，用溫水，後用潔淨新布，蘸溫水，洗訖，包裹宜嚴密，外用油紙纏繞，使不透風，一日換一次，便愈，不必用藥，或當時，能將傷口洗淨，妥合緊嚴，則無生癰化膿之弊，後亦無疤痕，若誤用麵物，置入傷口，後必化膿，遺痕醜陋，傷口迸裂，可用合口膏黏合，更佳。

治受傷流血不止方

其傷流出之血色紅，而有噴流之力者，（此乃動脈）可於傷處以上壓之，如血色紫黑，而無噴流之勢者，（此乃靜脈）可

於傷處以下壓之，二法皆可止血外流，又方，用白礬末敷患處，若不能止，即用手大指按之，經兩刻時便止，若遇冬日，用水敷患處，後加布捆紮，要勿輕動，亦愈，又方，剪毳包患處，亦可止，如用以上各法，流血仍不能止，且流得甚多，宜請西醫生用法止之，否則恐有性命之虞，慎之。

治燙火傷方

生石灰一水一泡一日，去渣，用水一半，加香油一半，調勻，再用棉花蘸貼患處，後用油紙蓋上，用布包裹嚴密，使不透風，每日換貼兩次，小心不可傷皮，若傷太重，不可揭換，宜將油澆在棉花上，使之透入患處，過三四日後，必須揭去，但須先用溫水

泡透，慢慢試探揭看，另換新棉花，蘸油水再貼。

治胃症大要

忌食生冷鹹菜堅硬等物，飯菜務要熟爛，食飯宜多費工夫，細嚼慢咽，飯前不可飲水，飯後湯水亦不可多飲，更宜慢飲，濃茶涼水總不可飲。

治胃疼方

人生此病，有多故，如吸旱烟多則疼，食飯粗則疼，多食生物，燒酒，辣味，煎炒等則疼，多食菜則疼，多食鹹鹽，乾物，則疼，肉飯不熟，食之則疼，飯後飲茶多則疼，懶於行動則疼。

其方用上好黃連一兩，淨水十兩，熬成，每

服藥水半兩、加溫水半兩、強壯人飯前服、
羸弱人飯後服、又方、野菊花頭二兩、水十
兩、熬成、疼時用菊花水半兩、加溫水半兩、
飯前服、

又方、用大黃、飯後每服一分、若疼重
時、多服至四五分、亦可、

又方、砂仁一兩、大茴香一兩、小茴香一兩、
肉桂一兩、潮磨半兩、酒一觔、共浸七日、過
布爲度、疼時服半小酒杯、

治瀉肚紅白痢疾並霍亂良方

鴉片土二錢、樟腦半兩、砂仁半兩、乾火酒
一觔、共入瓶內、塞嚴、泡七日、過淋紙、再添
火酒、足一觔、每服大人一小酒杯、若小
童一歲、每服五滴、二歲、每服十滴、再上、每

歲加五滴、至十二歲、可服半小酒杯、初

服入口、待一時許再服、以後每兩時許一

服、病愈爲止、病人飲食、宜用稻米稀飯雞

子、忌生冷瓜果等物、如渴、飲酸茶、用呢布

兩層、圍繞肚腹、凡痢症源於過食不宜之

物所致、戒口爲最要、每日
既宜食白粥、肚痛宜以熱
水布溫、松節油外敷腹部

治咳嗽方

上甘草四兩、蜂蜜二兩、醋二兩、

右藥加水一觔、煮二刻、收存瓶內、咳嗽時

溫服藥水半兩、病愈爲止、

治眼熱法

眼爲人身至寶、功用多而症亦繁、稍不留
意、漸延爲翳、抱憾終身、故凡遇眼有病、急
宜治理、初起有熱者、宜先服瀉劑、外用溫

水一觔、生鹽一分、或白礬三分、調化、日洗五六次、不論大人孩子、皆宜常洗、洗畢、滴入藥水、外用藍布遮眼、一切工作看書、勞神傷目之事、皆不宜矣、

熱眼藥水方 硫磺銅（錐磺發口）二釐、清雨水八錢、和勻、日滴二三次、若睫毛倒插、宜請西醫治理、

治童子腹炎眼方

白礬一分、溫水一兩、共入一處、化開、先用棉花蘸清水、將眼暗洗淨、再用翎管、將礬水滴入眼中、每日二三次、即愈、忌冷風、忌煙氣、

即成人炎眼、用此亦妙、

即小兒初生二三日、眼若生炎、致膜黏胞

皮者、用此法亦良、如眼胞腫、不能開合、藥水不能內入、可用法撥開、以水箭射洗方妙、

治吞洋煙白砒宮粉方

無論何毒、必先急令吐出、宜先用生芥末麪一羹匙、和溫水一碗、灌之、或用白礬二錢亦可、少頃、必盡吐出、復照前如數與飲水至二三次、如覺肚腹發熱、再多飲涼水、使胃潔毒淨、可保無憂、若解鴉片毒、俟吐後、再與以濃茶、或噴以涼水、或用人架行院內、令其清醒無睡、必永安矣、解宮粉毒、亦用此法、令吐、再服朴硝半兩至一兩、錢五六錢者服一二、朴硝不但能令毒下、且善解宮粉毒氣、解白砒毒、亦用此法、

令吐、再服香油一二後再服藕粉蛋清等
潤劑、

止疼拔膿方

一凡紅腫瘡癤打背對口等症、並咳嗽心
疼之症、用麥麩敷患處、無不立效、但用此
方、必先酌量患處大小、裁布用麩、裁布、要
比患處大加兩倍、總得幾斤、蓋嚴、用鞋務
按患處大小、約縫小尺二寸厚、用法、將麩
倒在盆內、使滾水隨浸隨攪、調和乾溼、如
乾飯糰、倒在新布當中、卽速攤勻、將布四
角疊起、敷於患處、用帶纏好、待至麩冷、照
法再換、務要三四塊布、更換使用、但布更
換一次、卽有毒氣、必得洗淨、方可再用、麩
子用過一次、萬勿再用、曠生齋無妨、如此

治法、約每日至少三次、多則更好、一凡瘡
症、總以頭破膿淨爲度、咳嗽心疼等症、以
氣順疼止爲度、

止疼退火方

此方治心口疼並筋骨

胸中有火或腰子通疼或高壯時
肚疼無證久病新症皆可試用

凡用此方、必先將布比量患處大小、摺疊
七八層、或十數層、疊訖、仍比患處較大、使
溫水將布泡透、掣出、稍擰、愈溼愈好、但不
可流水、卽速將布貼在患處、布上宜加油
紙、或油布、再比溼布較大、以防透氣、卽使
帶子纏好、待到時候、照法再換、如早晨貼
上、至午再換、自午至晚、自晚至二更、皆照
法更換、總以疼止爲度、若患處愈發熱、卽
愈勤換、至終、務使布蘸涼水、將患處印印、

如此治幾日，若患處多起小疙瘩，便可停止。○此方用過兩日，若不甚見效，即不必祇用溫水，可用一把辣椒細末，使一筋溫水泡一日，以後照常服用，但使椒子水，即用布三四層，亦可。

救溺水法

凡遇溺水，若既拯出水中，須先抹乾口鼻之痰涎，庶免壅塞，有礙呼吸，並即除去溼服，全體拭乾，或用蠟，或用瓶，將熱水灌入內，再將罐口瓶口，塞嚴緊，又或將鹽炒熟，用布包裹緊密，圍繞其身，使煖，令血流行，隨即更換烘煖衣裳，將其人覆睡，雙足撐高，並以棉被絨氈等物蓋護，令其溫煖，須小心細驗其氣，尚有

呼吸否，儼無呼吸，即將其身側睡，用薄荷油，擦其鼻際，或將其身仰臥，以衣物墊高其脊，以兩手向其臍兩旁，腰腹間軟肉無骨處，運開手中虎口，兩手把住腰間，一按一放，蓋按之使緊，則令其氣吸，放之使鬆，則令其氣呼，如此數次，自可令其呼吸相通，又或提高其兩手，依住兩耳，即迭提其兩手，或揚之使上而高，或押之使下而低，一高一低，令其氣運動以出，如此數次，而呼吸之氣，自可生也，既得復甦，宜用熱茶薑湯美酒等物灌之使飲，其手脚腿腋，務令和暖，寒冷之物，莫露其體，最忌多人圍看，致不通生氣，又不可將身倒豎，希冀流水，誠

能依法救之，鮮有誤事者也。

調經善法

經脈雖許久不見，後日却必還來，其當來之日期，本人細心揣摩，即能知之，大約腿腰肚腹與頭，每月犯疼之時，即月經當來之時，亦可從上次見經時，計此月宜來之期，若下次一過此等疼症，即急尋一洗澡之盆以備用，盆之大，必須容得人身，或容得身之半，亦可，總以人坐之寬容爲要，當晚臨睡時，倒上熱水，本人脫衣坐盆中，浸一終食之久，但用水不可太熱，更不可稍涼，總以手可抒下水中爲度，亦得要水沒過腋摺之處，水中若加胡椒末，或辣椒末，能教皮色發紅更好，浸透，就急起拭乾，愈

乾愈好，即刻躺臥，若到明晨仍不見輕，可在兩大腿裏邊，每邊拔兩罐，（以紙燃火燒去罐中空氣以罐蓋於皮上）或用粗布或刷子，將腿上下徧刷，直刷到皮紅爲止。

初次用此法，必連用三晚上，下月二次用此法，並後再用，務得連用五晚上，更要切記上月腿腰頭肚犯疼之日，今月要在未疼前二三日，就用此法以治。

論服藥，幾時晚上用浸身法，即先在白晝服瀉肚藥，使大便一日瀉兩三次，即如服大黃丸等藥，皆可。

若經脈過期不來，身體虛弱，可服補血藥，即如飲龍膽草酒，或鐵酒，鐵丸等藥，此鐵

酒鐵丸、凡有西國醫院藥房等處皆有、若經脈已過期不來、萬不可再用熱水燙、或拔罐等法、惟恐病更加重、如此治法、若前一月不見效、照法用二三月、未有不見效者、

再者、身若無甚大病、不過月經將來時、或稍覺受風、或因困乏生氣等情、從此經脈不來、無庸服藥、本人可在當日晚上、浸腳一終食之久、大約經脈必見、

痘症防痘發之法、取治痘症之法、尤宜於小兒初生一月內、月之後、先種牛痘、以避天花之毒氣、隨時隨月皆可種之、亦不必拘定節氣也、

此症最難醫治、因有一定之序、不能快愈、初起發熱、痘出熱即稍減、有十數日、漿變膿時、又發熱者、大約初次熱減、不

可認為病愈、隨便起坐、亦不可任意飲食、只有小米粥、薏仁米粥、牛乳半熟雞蛋牛肉湯等、最為合式、

初覺發熱、當服 元明粉一錢、使其瀉肚、不瀉、再服、外用 芥末麵和溫水、將兩腳泡在水中、

痘出之時、先用 香油、或豆油擦臉、能免磨臉之病、若有疼痛瀉肚等症、可用 鴉片煙一二盤止瀉、若體弱、可服

黃酒、或龍膽草酒、此方開後

若二次復熱、可服 芒硝、使其瀉肚、療癢者、用 石灰水搥油、擦癢處、此方開後

熱退痘變瘡者、當服補藥、可用 龍膽

草酒、此方開後

計開

龍膽草酒方 龍膽草三兩、陳皮一兩

、砂仁半兩、燒酒一觔、將各藥泡

酒中二日、去渣、

每服半酒杯 每日三服 小兒少

用亦可加水

石灰搗油方 石灰一兩、水一觔、化

開、澄清、

用此水半酒杯、和香油半酒杯、調勻、

擦瘡癢處、便愈、

柴歸飲

當歸三錢、芍藥錢半、柴胡錢半、荆芥

穗一錢、炙甘草一錢、

家庭新本草

火盛者、加黃芩、熱渴者、加乾葛、腹痛者、加木香、砂仁、嘔惡者、加陳皮、

凡瘡疥初起、發熱未退、無論是痘是

邪、疑似之間、宜用此方、有毒者可托、

有邪者可散、

涼血發營煎

生地三錢、當歸三錢、芍藥二錢、地骨

皮二錢、紫草錢半、紅花錢半、黃芩三

錢、甘草一錢、

渴甚、加天花粉、肌熱毒甚者、加牛蒡

子、木通、連翹、凡瘡疥、血虛血熱口渴、

或色燥不起、及便結溺赤等症、宜用

此方、

搜毒煎

紫草二錢、地骨皮三錢、牛蒡子二錢、黃芩三錢、木通二錢、連翹二錢半、澤瀉一錢半、芍藥二錢、

渴者、加天花粉麥冬、頭面牙齦腫者、加石膏知母、大腸乾結、脘腹實脹者、加大黃、芒硝、血熱妄行者、加犀角、小便熱閉者、加山梔、車前子、

凡痘疹熱毒熾盛、紫黑乾枯、煩熱便秘、純陽等症、宜用此方、

英國醫學博士合信氏曰、猪牛羊肉及雞鴨魚鮮與夫穀果蔬菜、日食所需、養育身體、不得不用、非可治病、即不應擬名爲藥、若夫狗馬之肉、食之傷人、龍骨、虎骨、犀牛角、羚羊角、象牙、象皮、蟾酥、蠶退、龜板、鼈甲、

金銀箔、雲母石、磁石、琥珀、珍珠、白石莖、紫石英、滑石各物、中土所習用、其實毫無功力、又有污穢之物、如人中黃、金汁、人中白、童便、秋石、紫河車、紅鉛、鬼屎、夜明砂、龜尿、鴿糞、怪毒之物、如蝮蠍、蜈蚣、五靈脂、蜥蜴之類、即無大害、亦斷無益、皆不應收入本草、醫者切勿妄用、藥有略具功力、而華人信用過當者、如燕窩、海參、阿膠、鹿膠之屬、功力止於能潤、不過與猪蹄魚膠雞蛋白等物相似、因其價貴、奉爲至寶、殊可不必、唐人有因身虛弱、或年老、買食人乳者、不知人乳止合小兒吮食、大人應食牛乳、乳有益、食人乳毫無功力、徒令乳母母子俱損、戒之戒之、

普通防疫法

日本川田德治郎述

衛生法。世名之曰延命術。其旨在保身體之健康。而求延長壽命之法。大凡慘害生人。無甚于傳染病。然豫防之法。苟得其宜。亦非不可避之。昔英之倫敦。以傳染病而死者。日以百計。千四百四十六年。衛生事業興起以來。病死之數頓減。中國以痧症痘瘡諸傳染病而陷於死亡者。號稱繁夥。此皆防疫法之未臻於完備而然也。傳染病之毒害。由一人一家而及於四方。關係於國家之消長。其爲患有不堪設想者。今以傳染病毒之種類及病毒之侵入於人身之門戶。並由何法而能豫防而能免疫。皆一一指示。防患未萌。諸君其書諸紳可也。

傳染病之源因

傳染病之原因。舊俗別之爲三。曰瘴毒。曰染毒。曰鬼病。

(甲)瘴毒者。言爲生於空氣中之一種毒氣。人觸此氣則病。又此病體及死體。發瘴氣尤多。故人接此氣。則所得之病。亦同。因之日漸蔓延。此甲之說也。

(乙) 染毒者。言各種疾病中有一種發毒之病。人觸此毒。則爲所感染。其所發之病亦同。此病毒由人傳染而漸蔓延。此乙之說也。

(丙) 鬼癘者。卽鬼神爲祟之說。此迷想時代之謬妄。不足論也。

至於今日。諸說皆吐棄不脛道。經諸學者之研究。知傳染病之原因在於細菌。

細菌

細菌者。微細之菌。或爲似霉類。蓋一種至微極細之生物也。千八百四十年。因顯微鏡之力。以世人所未能見之極微細物。放大千倍至三千倍。精細研究之。始知傳染病者。皆微生物。即細菌寄生於人體內而發也。

今舉一例。取患虎列拉者(霍亂吐瀉)糞便之一滴。以顯微鏡視之。則見是糞中有無數之微生物。而游走於前後左右。復取此糞。窠而沸之。或於此中加石灰少許。後復以顯微鏡視之。則向之游走者皆停止。而惟有無量數(ノ)狀之物群列。此卽石灰及糞沸所殺之微生物之屍也。惟此現象。惟於虎列拉患者之糞有之。尋常患下痢者之糞。不能見之。名之曰虎列拉細菌。或直呼之爲虎列拉菌。試取此虎列拉菌。雜之於食

物中使鼠食之則移時鼠即患下痢而死由是觀之則傳染病之原因其爲微生物也必矣

又取患痘瘡者之膿汁按殖於人之皮膚則接種者發痘瘡設取癰之膿汁而接種之則無發痘瘡者然則痘瘡者其原因由痘瘡菌之發生可知也故傳染病以有生活力而能播殖之細菌爲其原因並隨其傳染之種類而各自有其細菌此其故不待言矣凡細菌之種類其數雖有百數十種而其能釀疾病者僅四十餘故以細菌之種類可大別之爲二

- 甲 非病源細菌
- 乙 (非釀病菌)

非病源細菌雖接觸于人身而不發病此類甚多常附着于空氣中土地家具食器衣服及人之皮膚等有生活力能耐寒熱雖乾燥而不死有時得適當之溫度或濕潤及養物則發育繁殖而生或釀酸或腐敗而放惡臭此曰微菌曰釀菌曰腐敗菌苟能預防此等細菌之不使侵入則即可防物之腐敗釀酵如販賣於市場之罐詰類

能豫防腐敗之源因。即得以防其腐敗也。

病源菌者。即慘害人生最可惡可懼之物也。其數有四十餘種。苟欲豫防病源菌之傳染。宜先知病源菌各種類生活之狀態及傳染之媒介物。並其侵入於人身之門戶。一說明之如左。

病源細菌之狀類

- 一 腸窒扶斯菌 瘧疫苗 (傷寒)
- 二 發疹窒扶斯菌 熱毒斑疹菌
- 三 間歇熱菌 瘧疾菌 (瘧疾)
- 四 回歸熱菌 反復熱菌
- 五 猩紅熱菌 全上
- 六 流行性感胃菌 天行中風菌
- 七 流行性腦脊髓炎菌 全上

八 麻疹菌

麻疹菌

九 風疹菌

全上

一〇 痘瘡菌

全上

一一 水痘菌

全上

一二 霍亂菌

全上

一三 黑死病菌

歷子菌

一四 黃熱菌

瀉黃菌

一五 丹毒菌

全上

一六 破傷風菌

全上

一七 狂犬病菌

全上

一八 傳染性眼菌

全上

一九 肺炎菌

全上

二〇 耳下腺炎菌

全上

普通防疫法

(輕麻)

二一 虎列拉菌

痧病菌

(霍亂吐瀉)

二二 赤痢菌

紅痢菌

二三 肺癆菌

全上

二四 梅毒菌

全上

二五 淋疾菌

全上

二六 瘰疾菌

全上

二七 實扶帝里亞菌

馬脾風菌

(爛喉痧)

二八 癩病菌

全上

上之所舉皆主要者。其他尚有數種不贅。

病源細菌之播殖

細菌之播殖雖因其種類而有異。然苟得適當之溫度與濕潤及其養物。則均播殖非常之速。今試舉一例。如取虎列拉患者一滴之糞便。投之於盛肉羹之玻璃器中。密封其蓋。溫之至于人體同溫之度。四小時之後。嚮之無菌而黃色透明之肉羹汁。則變

爲混濁之白色。且不復透明矣。以顯微鏡視之。則見無數之虎列拉菌。是卽一滴糞便中所含數個之虎列拉菌。閱四小時而孳生蕃殖。以至無量數者。凡細菌勿論其爲病原菌。爲非病原菌。入於人體及飲食物等之後。苟得適可之溫度。則已透其播殖之性。或爲病源。或腐敗其物品。

細菌之生命。有甚永者。有極促者。極烈之熱。與藥品及日光等。皆有害於細菌之生育。如能避是數者。雖至數十年之久。而不死者亦有之。惟虎列拉菌。則甚薄弱。少寒冷。卽死滅。如肺癆菌在日光不到之地。雖無濕潤。逾三四年之久。仍能保其生命。

凡細菌必有卵。名爲芽胞。芽胞較細菌體。其抵抗力爲尤強。細菌體遇各種障害物而死滅。芽胞則復生存如故。有時得適可之溫濕及養物。卽發育播殖。苟能加以劇烈之熱。及有效之藥。則細菌體與芽胞。可使同歸於盡。如破傷風細菌之在土中也。生育播殖後。遇養物缺乏。則細菌悉滅。而芽胞則復生存。人若接觸此芽胞。則由皮膚之創口而侵入。乃發育播殖。而爲破傷風。世人以破傷風爲風。由創口而入者是也。設此時自覺爲破傷風菌傳染。則以有效之藥水。洗滌創口。或於該部施以劇烈之熱。以撲殺之。

則傳染可免。更舉一例。飲食物。必十分煮沸之。以期細菌及芽胞之盡滅。而後應用。無他。豫防病患之從飲食傳染之也。

病源細菌之傳染

病源細菌之性各不同。故其蔓延傳染之途不能無異。或有因人而傳染者。或有因媒介物而傳染者。或兼是二者。而其間不能顯為區劃。今大別之。則為直接傳染。媒介傳染二種。

直接傳染者

猩紅熱菌

痘瘡菌

麻疹菌

淋疾菌

梅毒菌

黑死病菌

由媒介傳染者

狂犬病菌

肺癆菌

赤痢菌

間歇熱菌

回歸熱菌

破傷風菌

所謂媒介物。列舉如左。

一 空氣

病源細菌之混雜於外氣也。或由於地上。或由於枯草落葉之表面。大都借風波之力而傳達於四方。其入於室內者。留止於家具。牆壁。及窗簾等處。洒掃之時。因空氣之流動。而與塵埃飛散。遂由外界混入於室內。此等細菌。隨呼吸。從氣道。直達于肺。或先入于口腔。與唾液共咽。以達於腸胃。疾病。因以傳染。

二 水

病源菌之入於水也。或由於土之表面。或由於人所棄置之家具。物件。因雨雪流注而入於水。又有與飛塵。共由空氣而入於水者。病源菌既入于水。亦隨水而流布。大凡因水而傳染者。不止吸飲之水。卽洗滌。食器。盥濯。衣服。沐浴。身體之水。亦有此慮。

三 土

傳染病者之咯痰及吐瀉物。並其屍體。終則皆同歸于土。故土之表裏細菌最多。又地上所棄之污液。敗汁。及其他污水等物。與雨雪流走而入於河。或入於飲料水中。或入

於常用水中。又地上之污物。乾燥之後。混雜於空氣中。而與塵土共襲人者。亦其常也。

四 食物

食物之中。藏病芽者不少。譬如肺癆菌之獸肉及牛乳。是或有食物本自潔淨。而用水洗濯之時。黏此菌者。亦有爲昆蟲所媒介。或爲人之手指污染而得菌者。大凡食物。不僅適於病芽之發育。亦能爲其蔓延之助。

五 衣服

衣服能留止菌芽。又能爲其蔓延之媒助。病源菌雖甚乾燥。亦不失其生活之度也。

六 生人及死體

傳染病。不第患是者。散其細菌於四方。即無病者。亦能爲是病之媒介。以無病之人。見病者之時。而細芽或適黏附其衣服毛髮及皮膚等。而不自覺。乃以此病源傳染于人。是醫師及看護人病者親族之所宜注意者也。至由傳染病而死之屍體。其散布細芽也。不待言矣。

七 動物及昆蟲

動物及昆蟲。其能傳播病毒者不少。蠅能爲結核菌、釀膿菌、虎列拉菌、腸管扶斯菌（傷寒）之媒介。蚊能啣間歇熱菌之病芽。鼠能傳播黑死病菌。犬能傳播恐水病等。故動物昆蟲能爲搬運惡疫之媒介。毋庸置疑者也。

病原細菌之所在

空氣、水、土、飲食物、衣服、家屋、家具、廢棄物及傳染病者之外表。以至內臟、血液、咯痰、唾液、鼻汁、淚液、糞便皆細菌存在之所。

第一 空氣中之病原細菌

空氣中之細菌及芽胞極多。室內之空氣爲尤甚。其數於一立方生的米突中有三十萬個。然其能爲病原菌者亦僅五種。

釀膿菌

肺癆菌

肺炎菌

丹毒菌

流行性感胃菌

以上爲主要者。此等細菌及芽胞。迨乾燥後。與塵埃共飛揚於空中。呼吸之際。臭空氣共侵入而爲病源。或附於創面及微細之創口。而發爲病症者。

第二 水中之病源菌

水亦爲諸細菌及芽胞生息之所。當傳染病流行之際。宜注意者。卽公共飲用水、井水、河水等是也。嘗有某處共數十戶。其三戶同時罹疫病而死。及細察其因。乃知三戶合用之井水。有數多之病源菌存焉。此可爲寒心者也。今將生活於水中細菌之種類。舉之如左。

脾脫疽菌

察扶斯菌

間歇熱菌

破傷風菌

惡水浮腫菌

虎列拉菌

以上其主要者。然此等細菌之在於水中也。不能即時釀病。含有此菌之水。必適觸於皮膚之面。細菌由創面及創口侵入。或用此水洗滌食器。其菌附着於食器。後遂與食物嚥下而成疾病。此其常也。

第三 土中之病源菌

土中亦有多數之細菌芽胞。得資物與溫濕。則非常繁殖。今舉其最宜注意者如左。

間歇熱菌

脾脫疽菌

窄扶斯菌

破傷風菌

惡性浮腫菌

第四 食物中之病源菌

食物中有溫度又多。濕潤及養物。是最適於細菌之發育時。或發育一種細菌。同時或

發育數種細菌。夏間傳染病流行之時。販賣於市中之食物。切宜注意。

第五 衣服中之病源菌

無論裏衣外服。及衣服之材料如何。大都皆有細菌。惟衣服中之濕潤與溫度及養物。皆未甚適於細菌之發育。是以繁殖甚少。而患傳染病者之衣服。尤爲菌所黏附。最宜注意。舉其要者如左。

肺癆菌

癩病菌

以上二種。皆附着於衣服。若不知其人之患是病。遇可疑者。卽以其衣服煮沸至二小時以上。而後用之。

第六 家屋中之病源細菌

家屋、家什、壁障、窗、床、最適宜於細菌之栖止。倒棄爐灰之地。最富于溫度。濕度。與養物。細菌尤爲繁殖。

第七 體表之病源細菌

體表。如皮膚、腋窩、趾間、爪裏、及脂垢等。皆爲細菌栖止之地。不常沐浴者。尤其中國人多患濕陰瘡者。是亦身體不潔之故也。又在左開列之諸種及其他之病症。雖其病痊癒之後。仍有若干日細菌芽胞附留於其外皮之上。

虎列拉菌

霍扶斯菌

赤痢菌

實扶帝里亞菌

痘瘡菌

麻疹菌

第八 體內之病源菌

口腔、鼻腔、息路、陰道等處。皆含有適於發育細菌之溫度、濕度及養物。故各種之細菌。乃易於遂其播殖。設口腔常不飲食。鼻腔常不排泄鼻汁。氣道常不咳嗽。陰道常不洗滌。則細菌漸播殖。漸增加。漸及於深部。口腔則生鵝口瘡。口內炎。氣道則發肺炎。肺

結核陰道則發子宮諸病。甚至釀爲不測之症。可不慎歟。

上所云。窺宇宙之所至。無弗有細菌者。人悉易犯疾病。是故也。雖然。幸有自然之防線。在防線。凡二。一曰侵入門。二曰免病質。

細菌之侵入門

細菌各自有其侵入之門。今取虎列拉菌植於外皮之時。僅於其所植之處。發紅脹而已。未至於發爲病也。然以之植於腸內。即發虎列拉病。又植釀菌於外皮。其外皮隨即醱脹。若以之植於腸內。則復如散乳母之乳頭。以少許釀菌附於其上。乳兒亦不受其害。故細菌者。隨其種類而異其侵入之門也。

蓋細菌芽胞之性質。不能進入於完全無缺之內皮。外府即外府。內皮有傷。少許細菌非得其門而入。則亦不能釀成疾病。故置釀菌於完膚之上。而不醱化。醫師屢以手指觸病毒。而不傳染。皆以其皮健全之故也。苟能常保其皮膚健全。則病源菌自未易侵入。雖然。皮膚之創。爲病源菌侵入之門。亦不在大。雖觸於目。面。爲完膚。究不敢保其無有所欲。蓋吾人之內皮。外府。非必常能健全。且細菌之附於內皮。外府之上。苟得

溫度濕潤及養物則即繁殖其初雖絕無感染而日漸浸潤因其所生之毒而傷及於皮膚乃為病源菌侵入之門是其常也要之門戶先開菌芽乃得由之以入耳。

第一 外皮

外皮者身體外圍之皮膚所以被覆頭部軀幹四肢者是也。

由外皮而侵入之病源菌有數種。宜注意者如左。

丹毒菌

破傷風菌

狂犬病菌

醱膿菌

黑死病菌

第二 內皮

內皮為食道腔氣道腔陰道腔之內皮常被覆體腔之內質極薄弱。細菌最易侵犯。別之為三。

一 由食道腔而侵入者。

虎列拉菌

(霍亂吐瀉)

腸塞扶斯菌

(傷寒)

赤痢菌

脾脫疽菌

結核菌

梅毒菌

二 由氣道腔而侵入者。

猩紅熱菌

肺炎菌

結核菌

黑死病菌

(鼠瘟)

實扶帝里亞菌

(爛喉痧)

三 由陰道腔而侵入者。

淋毒菌。

梅毒菌。

產毒熱菌。

感病質與免病質

凡傳染病之病源菌非得其門而入固不能發病然即得其門矣亦未必遽成疾病也蓋人有二質其因病毒之侵入而釀病者曰感病質病毒侵入而不釀病者曰免病質人之生也體質有堅脆剛柔之別堅剛者為免病質脆弱者為感病質然細菌之種類有不問其堅脆剛柔而均感受之者有時此種族之人為感病質而他種族盡為免病質者如黃熱病黑人為免病質而白人則常感染之如梅毒及虎列拉惟人類為感病質而他動物則絕無罹是病者。

分感病質為二先天感病質

後天感病質

先天感病質者生而易為細菌所犯之質也如顏面蒼白羸瘦脆弱之人易犯肺勞菌。

剛堅肥滿之人。視脆弱之人而易犯梅毒菌。此爲先天感病質。

後天感病質者。謂人生而強壯。對於百般細菌皆爲免病質。後因其衣食居處。生有變動。或因疾病。而其人之體質。遂呈異狀。而爲感病質者是也。如居高丘之民。素不患脚氣病。忽移於海岸。則感染之。又如瘧疾。人苟爲其所襲。則其人卽爲易於犯瘧之質。此皆爲後天感病質。

分免病質爲二種。先天免病質。

先天免病質者。生而剛強。其所以防病源菌侵入之裝。置如鼻腔內之鼻毛。鼻纖悉備具。卽病菌偶入於身體內部。其撲殺之力至爲強大。是謂先天免病質。如細菌與塵埃飛揚而入於鼻腔也。鼻腔之內有堅硬溫潤之鼻毛。以阻止之。非僅其脫落及乾燥之時。則細菌不能侵入其內部。卽過鼻腔。而至於氣管。氣管之內。皮其既毛。則常蠕動。有外物至。則卽却之於外。咳嗽能使外物附帶於咯痰中。而排除於外方者。卽此理也。既有如是之裝。置故能排除病菌。而不至釀成疾病。或因疾病而既毛之一部運動。偶不完。其則不能排除病菌。而反於是處叢生細菌。以成疾病。

口腔者。細菌最易侵入而最易發生之地也。雖然以其常有唾液吐出於外或直經口腔而達于胃而胃囊之中常有能軟化肉類之液汁故細菌至此蒙其變化而爲所撲滅故非因疾病而使胃之消化力減少非因細菌藏於堅硬食物中不經胃之變化而直達於腸則不至釀成疾病。

外皮者被覆全身極薄而類于象皮之膜也。外皮健全則細菌不得侵入。今試取醱臘菌置之於健全之皮上。固不成膿汁。然苟以針尖微損其外皮再使之觸接臘汁則其創雖微細其皮膚必赤熱腫脹而至醱臘。

人身之血液中有撲殺細菌之毒液。即「アレキシン」是也。故病源菌常有透過皮膚至血中而即死者則「アレキシン」之力也。雖然「アレキシン」之力。因人不同。由其強弱之度。而有患病不患病與夫強弱之別。故小兒之種痘。每以其感病質之強弱而分種痘感染之強弱也。

以上鼻毛。睫毛。牙齒。皮膚。胃腸以至血液。苟堅剛完全而無闕損。是即爲先天免病質。而病源菌之不易侵犯無待言已。

甲 豫防接種

人罹痘瘡、麻疹、虎列拉、腸窒扶斯等傳染病。經治愈後。其血質中之抗毒力遂強。故罹該疫一次以後。則無再行傳染之患。但此種疾病。於人生甚屬危險。故必有豫防接種之法。始能變重症為輕症。如痘瘡接種法發明以來。將其菌體接種于健兒。則重症之痘瘡。即獲豫防之效。今諸大家將各種傳染病細菌之性質。發明其原因。則必得完全豫防接種之法。而毒焰危險。自消除于吾人所居之世界也。

第壹例 種痘

種痘之法。乃取天然痘瘡之細菌。接種于牛身。迨牛之痘瘡發生。遂搾取其痘胞中之漿痘。是曰痘漿。因其菌在牛身種過一次。毒力減也。以此接種于人。自能即由該局部發生。不致全身傳染。而能免疫。與天然痘一次罹病而不傳染者相等。今日本政府普設牛痘漿製造廠。製成極全完之牛痘漿。小兒生後。凡六個月。即使行牛痘接種之法。近來該國之人。染天然痘瘡者甚寡。非預防接種之奇効乎。

第貳例 虎列拉豫防接種

人之消化器爲虎列拉細菌侵入之門戶。一經侵入。則即感染。反之。若將其細菌。密附于人之健全皮膚。則不能逞其害。以不得其門而入也。若以列虎拉之殺菌液。由皮下注入。即能免疫。是即豫防接種之法。倘值虎列拉流行之時。病者之家族。看護者。與醫士。皆須行此豫防接種之法。以免染此疫焉。

乙 血清療法

先將某種傳染病之細菌。移植于動物體中。迨其病發。將此動物治癒之。癒後。復移植細菌于其體。則不發病。蓋以其血液中新生成。有能抵抗此疫毒之物質也。而此抗毒物質。又永含有于此動物之血液中。可取製爲血清。以資治療疫症之用。

血清療法。緣此血液。中含有一種抗毒力。將此液體精製之。爲血清。注入于人體。及動物體中。即能豫防疫之傳染。其已染此疫者。取對症之血清。用法治之。則即奏效。動物之能製造血清者。爲牛、馬、羊、猿、犬、兔、及鼠等類。或用人之肉汁。亦可傳染病之。宜施血清療法者。如虎列拉、腸室扶斯、黑死病、破傷風、實扶帝里亞、狂犬病等。類。今日本政府。亦設立血清藥院。製造種種血清。以備不虞。

傳染病之潛伏期

自病源菌之經侵入門而入體內。以至於其發育增加而發爲病之時。其間名曰潛伏期。當行豫防法及消毒法。苟知潛伏期之長短。則豫防及消毒之奏效與否。可明知也。且即不得豫防而染病。其本源之所在。亦可確知。蓋或發病而發病源。因以至發病之時間長短。於潛伏期。則該病之原因。不在是而在他。亦可知也。更舉一例詳言之。如人與虎列拉病者相接觸。即行豫防及消毒之法。經四日而病不發。則其人。不爲其病所感染。可明徵也。豫防及消毒之法。可奏效也。又有人接觸患痘瘡者。越三日。其人。有痘發于顏面。此痘。決非因感染而發。何則。痘菌。侵入于人身之後。至早必經十日而發。今僅三日而發痘。其非得之于該病者。亦甚明矣。

各種傳染病之細菌。各因其種類而異。其潛伏之日。今列表如左。

麻疹菌

至早七日

至遲九日

流行性耳下腺炎菌

一日

二二日

猩紅熱菌

一日

一四日

肺炎菌	二日	四日
風疹菌	一五日	一八日
流行性感胃菌	二日	四日
痘瘡菌	一〇日	一四日
梅毒菌	二二日	二八日
水痘菌	一〇日	一七日
狂犬病菌	二〇日	六〇日
發疹寧扶斯菌	七日	一四日
丹毒菌	二日	一四日
蜜扶斯菌	一四日	二一日
產毒熱菌	四小時間	二六小時間
實扶帝里亞菌	二日	三日
結核菌	無定	

普通防疫法

普通防疫法

二十六

百日咳菌

五日

六日

虎列拉菌

二日

四日

赤痢菌

三日

八日

傳染病之豫防法

傳染病之豫防法。雖因病之種類而異。然有可以通行者。亦有可括二三而爲一。卽以此施行之者。

第一 官權防疫法

官權防疫法者。爲命官吏實行豫防規則之法。日本凡經醫師診其人爲有傳染病後。卽須報明官衙。遂使病者移入常備之避病院。離隔他人之來往。以豫防其病之傳染及蔓延。卽病者已痊。必察其無傳染他人之患。始令回家。至病家及其附近。則命官吏嚴行消毒之法。或某地有傳染病。卽封鎖其地。不許他方之人出入。

海上亦設檢疫之所。由傳染病流行地而來之船舶。則於其上岸之前。診查其船內之客員。如有患傳染病者。或疑似者。卽命其停船。使患者入附近海岸。或島嶼。所設之避

病院而治療之。同船之健康人員、貨物及郵便物等。凡搭載於是船者。或以蒸氣。或以藥水行消毒之法。待病無蔓延之恐。而後許其上岸。是皆以官吏之權保護人民。安寧幸福而後行之者也。若忽視之。則發病之地。即爲發播病毒之中心。由中心而蔓延。四方如天津有黑死病。北京若不以官權嚴施豫防之法。則其禍患必及於帝都。而人民安寧之秩序。紊亂殆有不堪設想者。

第二 隔離法

有患傳染病者。則隔離之於一室。或移至於城外之避病院。不令其與健康人相接。以防其病毒之傳播。是之謂隔離法。是以一室內。居有數人。其中有罹病者。則即以其室爲隔離室。

凡病者室內之室。其不問其觸接于患者與否。苟非經嚴密消毒之後。則一物亦不得持出於室外。如看護人。扶持病人之日。與病者觸接。非經消毒之後。不得去望家族及來訪者。則嚴禁其入室。

隔離之期。日以病者之痊癒或死亡。以至於室內消毒完畢之日爲限。但室內消毒之

法。未甚完備。自三禮拜至六禮拜。仍須續行消毒。最宜注意者。患者痊癒後。消毒法不其完備。猶能播病毒于外人。如痘瘡、霍亂、傷寒等。其尤者也。故患病者。治愈後。必待無傳染之患。使之沐浴而後許之交通。又患者之咯痰、唾液、大便等。偶有附於衣服。被褥及什器等。尤易侵襲于健康之人。又當審慎者也。

第三 豫防注意條規

傳染病流行之際。須遵守之項目如左。

- 一 房舍周圍。須常掃除潔淨。室內以空氣流通為要。並常使日光透入。
- 二 茅廁、井、溝渠、堆積爐灰之地。亦宜時時掃除。掃除之污穢物。以火燒之。或于庭隅掘一極深之穴。棄污穢物于其中。其上復加以多量之石灰。
- 三 飲食物及飲水。非資滯後。皆不可用。
- 四 飲食物。皆覆蓋之。以防蚊蠅聚集。
- 五 日用器皿。以熱湯、石灰水、煤灰水、洗滌之。
- 六 蠅類。最易傳染病毒。宜設法竭力驅除之。

七 臥具宜常曝。以日光有濕氣者不可用。

八 患傳染病者之家。勿論如何近親。以不相往來爲要。

九 不問其患何病。於患病者及死者之家。不飲食其物。

一〇 不可於夜間釋帷及不閉窗戶而眠。

一一 遇有傳染病者。其疑似者。則離絕之。有疑於感染者。則亦以一定之時間斷離之。

一二 不可信巫姑。祭厭而怠治療。

一三 勤於沐浴。剪除爪甲。以使身體清潔。

第四 傳染病預防注意

第一 飲食。

甲 飲食物。

一 飲食物之與胃腸不慣者不可用。

三 勿甜飲暴食。

二 飲食勿過平日之量。

四 飲茶不可無限制。

五 冷水與冰不可飲。

乙 決不可飲食之物。

一 蠅與小蟲黏附之物。

二 魚貝獸肉之不新鮮者。

三 乾魚乾酪等之生霉而有臭氣者。及生蟲者。又鹽肉等之腐敗而有臭氣者。

四 肉類之發臭氣及紫黑色者。及帶蒼白色者。

五 夫熟之果實。及其將腐敗者。

六 生霉或將腐敗之米飯類及麵包。

七 販賣於路店之一切飲食物。

八 衆人萃集地之飲食物。

丙 如左所舉亦以不食爲宜。

一 由醃藏及煙烤所製之飲食物。

二 蔬菜。

三 魚肉類之脂肪最多者。及油炒物類。

丁 不可飲者。

一 不醇良及帶有酸味之酒類。

二 變造之酒酢醬油等類。

三 混雜小蟲之諸飲料。及有浮游物者。

第二 住居

- 一 家庭庭園。時時灑掃之。決不可令其積塵。
- 二 晴朗之日。時開窗以換空氣。且使日光透入爲佳。
- 三 室內及床。常使通風。以期乾燥。若地質濕潤。則以乾砂及乾煤灰敷之。
- 四 陰雨之時。則以炭火。及白熾子置於室內。令其乾燥。
- 五 新建房屋。壁塗未全乾之時。不可移入。
- 六 大小便。積水等。常使其流出。或投之於地窟中。用石灰及煤灰壓之。防遏蛆蟲之發生。

- 七 居住牛馬豚羊之室。及棄置穢物等處。不可設之于住宅及井水之傍。
- 八 不可於井旁洗肉菜及衣服等類。
- 九 井水須時常淘之。若有污水侵入之患。則改造之。

- 一〇 野菜之切屑。煮滓。骨屑等。速棄之於培料場。及堆積處。不可置之家中。
- 一一 宅內之池沼等。須隨時浚之。或俾其水時常流通。若不必使用。則埋却之爲便。

一二 臥室不可置便壺。

一三 蠅最善於媒介病毒。飲食物上。宜預備繩網以驅除之。

第三 身體

一 不可爲過劇之勞動。

二 不可過勞其心思。

三 勿觸雨濕陰霧夜氣等。

四 勿露臥於屋外。勿於夜間開窗而眠。

五 勿赴戲園寺院及衆人聚集之所。

六 沐浴以清潔其身體。至少以三日爲斷。

七 勿裸體而就寐。

八 衣服、腹卷、兒肚襪衣。時時更換洗濯之。勿用其有垢膩者。

九 鋪蓋類。時時曝以日光。有濕氣者不可用。

消毒法

消毒法者。對於含有病毒之污物及爲病毒所染之物品。又疑似傳染病毒之諸物。撲殺其病源菌之法也。此法能防遏病毒之感染及傳播。消毒法苟完備。則雖觸是物亦無感染病毒之恐。惟消毒法。感消滅其細菌體。而不及其芽胞。則猶可以有再播種之機。故撲滅芽胞亦消毒法之所必講。

應消毒之物件如左。

- 一 由患者體內所排出之物。如糞便、吐物、喀痰、膿汁、粘液、皮垢等。
- 二 接觸於患者之人。及其物品。如衣服、衾褥、室具、飲食器、食物、看護人、醫師等。

三 有疑於傳染病毒之物。分消毒法爲八。

第一 燒却法

燒却法。其時最速。其用最確。能使菌芽殲盡。然用之難廣。惟金屬製食器及便器等之耐火者。與其他值賤而人所不甚愛惜之被服什器等。可用此法。或病勢猖獗而最易於傳染蔓延之時。則將家屋被服什器及其他重要之物品付之一炬。

燒却時混雜燃料而燒之。至一無所餘之時。方可奏效。

第二 煮沸消毒法

煮沸法其用最廣。其熱正透於物體各部之時。則病源菌及芽胞無一能保其生者。然煮沸時之長短。因菌芽之種類不一。有自十五分鐘至一小時之不同。尋常以三十分鐘為準。由此法而消毒者。衣服、被褥、吐痰巾、手巾、磁器、飲食器、飲食物等。是也。

第三 蒸熱消毒法

此法用蒸氣消毒。自其熱透於消毒物經三十分時之後。雖抵抗力極強之芽胞。亦必殞盡。雖用燒却法及煮沸法之物。如棉花、書籍、鐘表等。用此法尤便。然此法用一定之裝置。經費甚巨。在中國則用俗用蒸餾頭之蒸籠代之可也。但此時宜注意者。須固封其蓋。延長蒸熱之時。而為一小時。則毒盡消滅矣。

第四 日光消毒法

細菌及芽胞遇太陽光線之直射。無論冬夏。必害其生育。故乾燥之芽胞。長為日光所射。則必死。但在塵埃蓄積濕氣及糞物多之地。光線止能撲殺表面之菌芽。而內層陰

影之處。苟溫度濕潤。發物皆適其宜。則菌芽多于日光不及之冷地。故日光消毒法。用于單薄易透日光。及易乾燥之物。其效乃大。如單裕衣服。毛氈大箱之類。若衾褥棉衣。以日光消毒之時。則必須去其表而曝之。棉花亦必須使其表裏均受日光之直射爲要。

日光消毒法。必以乾燥爲要。故消毒之時。必以竿及繩排之。能俾空氣流通。其需要之時。則曝露三日。每日以給小時爲常。然物品又因其厚薄而於時之長短不同。如洗滌衣服。自人死後。及入水後。以至乾燥之時。皆所不計。是法固最簡便而易行。然往往有失於時間之短者。與其失於短。寧失於長。是用此法者之所宜牢記者也。

欲試驗日光消毒之有功與否。則試取甲乙二磁。均盛肉羹。再以虎列拉菌之業已發育者。同量加之。甲器則以玻璃蓋之。乙器則以塗黑之玻璃板蓋之。同曝於日光。經若干時之後。甲器內之虎列拉菌。均已死滅。而乙器則以其黑板能遮日光之故。虎列拉菌。反見增殖。由是可知日光之撲殺細菌。爲有力也。諺有之曰。日光不入之家。常有病人。是之謂也。

第五 藥品消毒法

凡消毒所用藥品四十餘種。皆係毒藥及劇藥。苟非醫師及檢疫員。不許用之。今擇其最有効而價亦最廉。無論何人皆可使用之消毒藥品。開列於左。

一 石灰

甲 生石灰末

生石灰末者。加少量之水於生石灰中。作為粉末者也。臨時製之。用於吐瀉物。及排泄物。又溝渠茶溜及床下等。用以消毒。消毒品。用於吐瀉物。及其他排泄物之時。以學理上成績考之。汚物百分。投以生石灰末二分。勻布之。即可以撲殺病原菌。用於溝渠茶溜之量準此。在床下者亦然。

乙 石灰乳

製生石灰乳者。一分生石灰。加以九分之水。徐加而勻拌之。即得其乳。其用量。則毒物百分。石灰乳用十分。製此者。必於使用之際。為宜。

丙 石灰

〔尋常石灰。代生石灰末及生石灰乳之用。汚物百分。石灰亦用百分。〕

丁 木炭灰

木炭灰者。於三者未能得之時。以供虎列拉患者之吐瀉物。及赤痢病患者腸壅扶斯患者之排泄物消毒之用。其用量則吐瀉物百分。搜木炭灰三十分而勻拌之。

戊 灰汁

灰汁者。一分之木炭灰。加以四分之水。而煮沸則得之。其用量則吐物排泄物百分。灰汁亦百分。

己 石炭灰

以石炭灰消毒之時。其用量在回容積以上。吐物百分。石炭灰宜百五十分。

庚 蒿灰

燒蘆葦、高粱、玉米等類之桿所得之灰。名曰蒿灰。其用量。亦百五十分。

辛 煤球兒灰

煤球兒灰者。吐物及排泄物。若有百分。則須用二百分。必倍其量。始有效果。

二 食鹽

食鹽。用爲消毒之具則稀。然可以防食品及菜蔬等物之腐敗。野菜每百分。用食鹽二十分。

三 燒酒

燒酒。雖不能爲消毒之用。而消手指及小物品之毒。則甚方便。如手觸於污物之時。卽可以燒酒洗之。又病者所用之煙袋。其口以燒酒浸之。則可無傳染之虞。

第六 掃除消毒法

此法但爲掃除之法。非完全之消毒法。而亦不可忽。

一 揮

牆壁、窗戶、簾子、棹椅之塵埃。宜常以揮敲打而除去之。其効驗雖不顯著。亦得爲排除菌芽發育之一策。此際尤所不可忘者。卽以一定之時間。開放窗戶。俾空氣流通是也。

二 帚

以帚掃地及牀榻。其効用與揮同。

三 雜巾

雜巾。爲拂拭戶扉棹椅等之用。凡塵埃黏附之樑柱等。亦可拂拭之。是爲最便之法。但此時宜注意者。拂拭之後。須以清水洗之。勿使絲毫塵埃留於其上。

第七 洗滌消毒法

此法用水與胰子。凡附着于四肢、五體、磁器、玻璃器、唾壺、便器、衣服、居室、戶扉等之菌芽。皆可以用此法洗去。而使失其蔓延之機會。故爲防遏傳染病之最良手段。可勉力而行之。

第八 消毒法之應用

一 全身

全身及體面之消毒。以溫浴法爲常。即以胰子與溫水摩擦身體是也。中國所製之胰子。最富于苛性。曹達尤適于消毒之用。或求所以代溫浴者。則以胰子與開水洗之亦可。毛髮及爪。則以胰子刷毛清淨之。浴後則必擇已經消毒之衣服。或決無病源菌者。衣之爲宜。故凡有疑似于傳染者。無論手巾、煙袋。非豫先消毒。皆不可用。

手指之消毒。關於病毒後。即以胰子洗之。洗後用燒酒浸之。爲通用之常法。

二 死體

患傳染病而死者。歛屍於棺之時。先用白布包之。後用石灰或木灰填之。以免病毒傳播。

三 看病人、病家家族及其他接觸於病毒者

看病人、病家家族及其他因搬運死體及排泄物等。而接觸於病毒者。每時須用手、衣服、消毒之法。或沐浴以潔之。

四 搬運病者及死體之器

搬運傳染病者及死體之器具。車箱類使用後。每次先滿潑石灰水。經若干時後。將其拭淨。

五 茅廁、溝渠、堆積穢物處

混入傳染病者所出之排泄物之茅廁糞池糞廠等。必以石灰、石灰乳、及煤灰等灌而勻拌之。但茅廁經石灰等攪拌之後。雖即可使用。其糞尿必經兩禮拜而後可供糞田。

之用爲病毒所污染之土地。則以石灰乳或煤灰蓋之。混入病毒之堆積塵埃處。則先以石灰末煤灰末撒布之。而後焚之。病毒混入之溝渠。宜以多量之石灰或煤灰投之。

六 衣服、器具、毯氈等

傳染病者所用之衣服臥具。並其病室所用之諸器具。又看病人及其他接觸於病者之人所用衣類。與一切有病毒傳染之慮者。各隨其種類。而行消毒之法。或燒却。或煮沸。或日射。或洗滌之可也。

七 膠製器具、帶木皮之傢具、象皮製物、革皮製物、毛皮、書物、

此等物之消毒。頗難。其在醫師。則可以消毒藥熏蒸之。民間可用之法。惟能以石灰水或酒精丁寧拂拭之。或用日光消毒之法而已。至於書籍。則舍日光消毒法之外。更無良法。

八 牆壁、窗戶、

患病者所住之室。先以帚掃其四周。至於牆隙。以揮敲打之。敲打後。開放窗戶。俾日光射入。空氣流通。以期室內乾燥。掃除後。將牆壁所糊之紙。更換之。

九 步床

床無論其爲木床瓦炕常潮濕而易於發育細菌消毒時可先以多量之石灰木灰煤灰撒布之經過一定之時間而後掃除之。

十 居室

患病者去其室之後必留許多之細菌於室內非十分消毒之後則決不可使他人居之室之消毒。不過掃除壁障步床等法。然猶有言。日光之射入是也。傳染病者所居之室各部掃除之後可除去天棚使日光射入。放開窗戶使空氣流通以期乾燥或用灰火以爲乾燥之助亦可。

一 飲食物

飲食物之消毒。祇火熱一法。故水必煎沸而後可飲。室扶斯、虎列拉、赤痢、小兒虎列拉等流行之際。必熟食而後可。

十二 廚具

廚具器具等之消毒法。則投之於熱湯中。或時時熱沸之爲善。至傳染病流行之時。則

箸、匙、肉叉、茶碗、皿、鉢及食物所用之手巾等。皆投之於大釜中。而煮沸之。經三十分時以上。然後以預先消毒之手。取手巾而擰之。又取出而拂拭之。然後置之預先消毒之檯上。此時手巾。必以熱水洗之。決不可用冷水。此時所最應注意者。不可使此等物件與衣服及未曾消毒之物相觸接也。

木製及漆製之食器。先以石灰水浸之。而後用煮沸水洗之。是爲常法。

消毒法行之似易而實難。必擇其人而任之。庸人不可用也。日本民間。有傳染病者。則由官行消毒之法。病者或死亡。或痊癒。節由戶主及家族報告於地方警察署。由衛生課派出衛生委員。或防疫委員。皆行消毒法多年而富于經歷者。確實施行消毒法。委員消毒後。有一點。照此執照爲完畢。消毒之據。未領此據之前。決不許他人往來於病者之家。敬告我后及我大夫。凡白君子。吾儕小民。疫病流行之際。須如法以預防之。毋使肉眼不得窺視之。細菌之肆其狂飢也。無錫徐勤業識。

普通防疫法

四十四

普通防疫法終

新醫書出版廣告

總發行上海棋盤街文明書局

各省文明書局

分售處

上海科學書局中國圖書公司
上海及各省商務印書館

增訂第二版醫學指南

無錫丁福保著，凡歷代醫學之源流，中西醫學之分類，內科學藥物學之大要，內經本草等各書之謬誤，皆言之甚詳，為門徑中之門徑，階梯中之階梯，故曰指南，著者欲以醫學智識，普及齊民，故定價極廉，每部收回印工洋二角。

實驗却病法

此書乃德人山都氏原本，其習練法共十九式，為正式之運動，其功效有四端，能使全身肌肉及各臟腑，同時發達，一也，能堅忍耐勞，二也，能增加抵抗病毒之力，三也，子女有壯健活潑之遺傳性，四也，凡習此術者，一月小效，兩月大效，能使全體內外發達極速，以達却病之目的，每部三角。

新傷寒論

無錫丁福保譯述，共分三篇。其第一篇曰復寒初步，為醫學士宮本叔所著，論傷寒之病原，傳染，病狀，病變之注意，回復期之注意，食物之注意，及消毒法，等。抑發詞題，皆人所易知之事，列於卷首，示引入入勝之意也。其第二篇曰傷寒綜論，為醫學士橋本節翁所著，述定論，原因，症候，診脈後，醫劑的變化，療法，等。學理深透，非淺人所能曉。皆醫學家專門之事也。其第三篇曰傷寒類症

鑑別法，為日本寺尾國平所著，凡疾病之與傷寒易於混淆，一時難於辨別者，計二十五種，茲將二十五種之病狀，與傷寒病狀，一一比較其異同之點，醫生診斷時，可以不為疑似之病狀所誤也。茲將以上三篇，有淺顯者，開其途徑，有精奧者，實其研究，有鑑別法，助其診斷，吾於傷寒一症，曠觀止矣。洋裝精本，每部五角。

醫學補習科講義正續二編出版

無錫丁福保編，營養醫學博士二十五人之新學說

乃醫學界中獨一無二之巨著也。其目次如下：○生理衛生學概論○北里博士說傳染病○長與博士論胃之攝生法○土肥博士論淋病與家庭○井上博士述眼科衛生談○中川氏論病人注意之要點○結核之預防法○吳秀三博士論神經之攝生○遠山博士論家庭與微菌○木下博士論產時之創傷傳染○井上博士論便秘○伊庭博士論婦人之妊孕力○伊庭博士論不妊症○緒方博士論分娩時之攝生○中川氏論花柳病○井上博士論眼科衛生談○宮本叔博士論黑死病○竹中博士論黑死病預防法○吳秀三博士論狐憑病與歇私的里之關係○三輪博士論小兒病之注意○弘田長博士論小兒之衛生○井上博士再續眼科衛生談○中川氏述日本醫學界之現象○井上博士腸胃譚○岡田博士論耳之攝生○木村博士肝臟譚○緒方博士論乳兒之衛生○瀨川博士論小兒身體上之監視○遠山博士論消毒法大意○石原久學士論口內衛生之注意○緒方博士論妊娠中之發生○岡村博士論皮膚之衛生○桐淵博士論婦人及小兒之眼

之衛生○三輪博士創傷譚○衛生叢譚○大澤博士論身心之養生○大澤博士
生殖譚○三島博士家庭之學校衛生○筒井博士徵毒與家庭之關係○中川氏
婦人之衛生雜話○消化之衛生雜話○凡勝胃肺臟肝臟神經皮膚耳目生殖器等
等之衛生生理病理以及傳染病花柳病小兒科產科婦人科等之微言大義無不
略具於此學者果能研讀一過可以得普通之生理衛生可以得普通之醫學智識
可以爲學習專門內科學之基礎故是編之終即紉之以內科學 ○續編之
總目傳染病凡三十三種運動器病凡四種全身病凡十五種消化器病凡二十
種腹膜病凡二種肝臟病凡六種循環器病凡二十種呼吸病凡二十八種腎臟病
凡十七種神經系病凡六十五種每種疾病之原因病狀診斷療法皆言之甚詳爲
醫界中最新之書也每部二冊共有八百餘頁定價三元

看護學

無錫丁福保譯共十六章其次第共分五步一解剖生理之概要二看護
法三繃帶法四看護傳染病雜病之通則五救急法女子教育學科中宜
添授看護學爲他日作良妻賢母之助不但醫院中宜添設看護婦也中國之有看
護學當推此書爲鼻祖矣每部大洋七角

公民衛生必讀

無錫丁福保著，欲為立憲時代之公民，不可無健全之體格，不可無衛生普及之思想，甚苦莫羅宏富，凡關於個人衛生，公眾衛生之事項，門別列，靡不備載，先出

初編，每部二角。

公民醫學必讀

無錫丁福保著，公民之體格，至為寶貴，不具醫學智識，每為庸醫所誤，是書分上

下兩編，上編論中西醫學之要理，下編臚列各種普通疾患，及最普通最簡易之療法，其藥劑皆用極和平者，凡猛烈之劑，概不列入，每部二角。

家庭新本草

無錫丁福保著，貴國士夫，每因西藥力猛，不敢嘗試，復嫌中藥力弱，不能奏功，此書

所選藥，皆標中藥，曾為西人化驗，確有實效者，性極平和，猛烈者已盡刪去，用於家庭，最為合宜，所論藥性，及處方，均本草不同，共分十五類，曰強壯劑，曰瀉劑，曰利尿劑，曰發表劑，曰退熱劑，

曰祛痰鎮咳劑，曰殺菌劑，曰止痛及防腐劑，曰收斂劑，曰利尿劑，曰發汗劑，曰防菌消毒劑，曰吐瀉劑，曰緩和劑，

曰雜錄，未附普通預防法，曾傳染病之細菌，及預防之法，甚詳，皆居家必要之智識也，每部四角。

家庭新醫學講本

無錫丁福保譯述，讀者為普及醫學起見，特編是書，以供家庭演講之用，分

國舊名，病原，症狀，療法，言之甚詳，藥劑平和，中西皆備，熟讀之，雖非醫生，亦能治病，雖有錯誤，亦無危險，文理

清淺，盡人能解，每部四角。

初等診斷學教科書

無錫丁福保譯述，詳論望診法，問診法，檢查部濕法，檢脈法，檢尿法，打

理，暨普通人閱之，亦能為診斷學之大概，以助醫生之不足，此乃學醫者之指南針也，臨牀醫學之基礎也，每

部定價七角（限三月底出版）

普通藥物學教科書

無錫丁福保譯，共正續二編，凡配藥處方等法，皆言之甚詳，且健胃、強壯、解熱、防腐、收斂、麻醉、驅蟲、發汗、利尿、皮膚病等普通藥。

及近發明之新藥，亦無不備具，某藥無效，某藥無功，皆搜羅確實之證據，詳言無隱，學者果能照方施治，皆獲奇效。誠藥物學中最易明自，最有經驗之書也。每部二冊，定價二元。

花柳病療法

無錫丁福保譯，述先述花柳病學之歷史，次述淋病，次述軟性下疳，次述梅毒，次述花柳病之新藥方，書中所論病源病狀及療法，皆理明詞達，閱之即能瞭解其藥方，皆從確實之證據得來，苟能照方試治，必得事半功倍之效。每部定價七角。

實扶垵里亞血清療法

實扶垵的亞症（我國名梅毒）以免疫動物血清治療，百無一死，不用嘔吐化痰之舊法，僅用血清注入皮內，咽喉痧之毒素，即不能逞其作用，以傷人體細胞，為咽喉痧之特效藥。此書為陽南李祥麟譯述，凡血清之製造法及免疫原理，與夫注射之分歧及手術，皆懇為說明，誠喉科之寶鑑，醫界之良書也。每部五角。

蒙學衛生教科書

無錫丁福保著，共三十六課，內分飲食空氣日光運動休息等，為衛生學中最淺顯最簡明之書，已銷售至十萬部，為南北各學堂通行之本。每部一角。

蒙學生理教科書

無錫丁福保著，共二十七課，內分官能肌肉皮膚消化器循環器呼吸器排泄器神經系五官器等，提要鉤元，繪畫為於尺幅，為生理學中最簡之書。故

南北各學堂，都用此書為課本，現已銷至十餘萬部矣。每本一角。

新內經

無錫丁福保編纂。第一集曰新素問。上編論短人壽之原理。凡十章。一、柔弱之教育。二、放逸之淫樂。三、腦力使用之過度。四、疾病及不合理之處置。五、不潔之空氣。六、飲食之過度。七、害人壽之氣質及情慾。八、誇大之想像力。九、毀壞人壽之毒物。十年齡及早老。下編論延長人壽之原理。凡十九章。一、遺傳上壯健之出。二、合理的身體之教育。三、活潑能動的之青年。四、負重以外之肉慾。五、幸福之夫妻關係。六、睡眠。七、身體之運動。八、精神之空氣。與適當之溫度。九、田園生活。十、旅行。十一、清潔與皮膚之衛生。十二、良好之食品。十三、精神之平和。十四、快速之感覺及刺激。十五、疾病之預防及療法。十六、總死之救助。十七、老年之衛生。十八、精神及身體之修養。十九、因體質氣候及生活法不同之各長壽法。其第二集曰新靈樞經。凡二十一章。一、和煦。二、和燥。三、竹箴之解剖。四、骨節之生理衛生。五、肌肉之解剖。六、肌肉之生理衛生。七、皮膚之解剖。八、皮膚之生理衛生。九、消化器之解剖。十、消化器之生理衛生。十一、循環器之解剖。十二、循環器之生理衛生。十三、呼吸器之解剖。十四、呼吸器之生理衛生。十五、排泄器之解剖。十六、排泄器之生理衛生。十七、神經系之解剖。十八、神經系之生理衛生。十九、五官器之解剖生理。二十、男女生殖器之解剖生理。二十一、男女生殖器之生理。

為醫家必讀之書

教員學生必讀之書。可為高等小學堂。中學堂。生理衛生學。最新之課本。洋裝二冊。每部一元四角。

國民醫學綱要

無錫丁福保譯述。第一類序篇。為各類醫學書序。學者讀此。可以識醫學各科之大略。及歷代之變遷。誠門徑中之門。階梯中之階梯也。序錄之後。曰肺癆

病新學說。曰產後之攝生。曰胎生學大意。曰產科學大意。曰育兒法大意。皆普通智識中之最要者也。其次曰傳染病學大意。曰內科學大意。曰外科學大意。曰皮膚病學大意。曰婦人科學大意。曰微菌學大意。凡系狀菌。芽生菌。分裂菌等。其名目亦略備焉。其次曰內科病之救急法。凡卒倒。疼痛。吐血。胃血。腸血等。急治之法悉備。曰中毒之急救法。凡鴉片中毒。菌中毒。石炭酸中毒。以及昆蟲之刺傷。瘋犬之咬傷等。急治之法悉備。曰異物之取出法。凡外物之入於呼吸器。消化器。以及五官器者。其取出之法悉備。曰火傷及凍傷。曰止血法。曰失氣及假死。皆救急法中之不可不知者。曰創傷。凡頭部之創傷。耳之創傷。顏面之創傷。舌之創傷。眼之創傷。頸部之創傷。食道之創傷。胸部及腹部之創傷。救急之法悉備。以上各書。在一二月內。已可卒讀。普通醫學智識。可得其大凡矣。共分三冊。每部一元二角。

肺癆病預防法

無錫丁福保譯述。是書共二十一章。第一原因。第二注意。第三衣服。第四呼吸器。第五烟草。第六入浴。第七飲物。第八食物。第九運動。第十寢室。第十一談話。第十二對冠。第十三職業。第十四藥物。第十五溫泉。第十六病狀。皆本竹中氣靈原書。而參考各家之說者也。第十七肺癆病初期之診斷法。第十八肺癆病醫案一則。第十九肺癆病類症鑑別法。皆寺尾國平之所著也。第二十衛生古蹟。皆古人衛生學之精理也。第二十一虛勞古蹟。凡素問。楚經。金匱。金元四大家等。關於肺癆病之學說。皆備載焉。洋裝精本每部五角。

內科全書

無錫丁君保壽述。共分七類。曰傳染病。爲如腸塞扶斯、(即腸塞)實扶的里、(即癩疾)虎列斯、(即霍亂)麻拉利亞、(即瘧疾)等。凡二十三種。曰呼吸器病。爲如

鼻加答兒、(即鼻之流涕凡結膜內多流出液體皆謂之加答兒)喉頭加答兒、(舊譯作聲管炎)氣管枝加答兒、(舊譯作氣管炎即咳嗽)鼻血、(即歎血)肺結核、(即肺癆病)等。凡三十種。曰循環器病。如心臟內膜炎、(舊譯作心房炎)心包氣腫、(舊譯作心包絡結水與氣)胸部大動脈瘤、(舊譯作胸腹脈管生血囊)神經性心悸亢進、(舊譯作心跳症)等。凡十七種。曰消化器病。爲如胃炎、(即胃毒症)腹水、(即水腫)胃潰瘍、(舊譯作胃內反生潰瘍)腸結核、(即腸癆)胃加答兒、(舊譯作胃炎)食道狹窄、(即腸症一作噎膈拒食)耳下腺炎、(即非腮)肝臟腫脹、(即肝腫)腸管內寄生蟲、(即腹內蟲症)等。凡三十五種。曰泌尿器病。爲如遺尿、(即小便不禁)膀胱炎、(即膀胱熱症)腎臟結核、(即腎癆)腎臟癌腫、(舊譯作腎生毒瘤)尿毒症狀、(舊譯作尿毒入血)等。凡十六種。曰運動器病。爲如關節病、(即癩癰症)舊譯作頸胸肢及頭肢)貧血、(即血虛)佝僂病、(舊譯作小兒骨軟症)血友病、(即出血不止)密尿病、(即中消病又名消渴)岡仙魯地質斯、(舊譯作風濕古名痛痺)等。凡一十九種。曰神經系病。爲如癱瘓、(即羊癲風)腦出血、(即中風)腦膜炎、(即符風)神經衰弱、(舊譯作腦筋失力)歇私的里、(舊譯作癡傻等意)等。凡三十種。每一病名之下亦列西文原名。凡教會中已有舊譯名者亦詳注於目錄中。藥品之治療法。不畧分量者。檢卷末之藥物分量用表。即知對症之療法者。即便秘而療。以對症。咳嗽而療。以鎮咳藥。發熱而療。以退熱藥等。對各症而施各種療法也。洋裝精本。每部卅元。

內科學綱要

無錫丁福保譯述，共二十八卷。曰傳染病篇，曰血行器疾患，曰鼻腔疾患，曰喉頭疾患，曰氣管枝疾患，曰膀胱疾患，曰腸胃疾患，曰腎臟疾患，曰副腎疾患，曰膀胱疾患，曰延髓疾患，曰腦髓疾患，曰官能的精神疾患，曰中毒症，所載之病，都四百四十種，其病名，為吾國所固有者，則以吾國之舊病名，依注而列於下（如以中前病注，糖尿病，以中風注，腦出血等，為古人所未知而於後會醫院中已譯有定名者，則以譯名注於下（如以胃生毒菌注，胃病，以傷風時症注，流行性感冒等）發既

有譯名，復有古名，則古名與譯名，摺指香茶而列之（如實扶的里之下，注香譯作假白皮，或白皮瘡，或時疫白皮，即爛喉痧，古名辟風，喉急，馬瘋風，鎖喉風等）是書於各種疾病，每詳列于目八項，曰原因，官疾病之原源也（如結核桿菌，為肺癆之因，白斯桿菌，為鼠疫之因）曰潛伏期，官病原隱伏於體內之日數也（如痘症之潛伏期，約十日，至十四日，爛喉痧之潛伏期，約二日至七日）曰前驅期，官發病以前之先兆也（如出寒未發以前，其先兆為食慾不振，全身倦怠，頭痛不試，肌肉酸痛，或疲倦等）曰症狀，官患者之病狀也（如出寒之第一週，為何種病狀，其第二第三週，則為何種病狀）曰合併症，官患者於本病之外，發患他種疾病也（如患出寒者，發患氣管枝炎，或肺炎，或心囊炎，或腎盂炎，或脾臟破裂等症）曰轉歸，官疾病之轉歸，進行時，於治愈，或死亡，以廢疾，或畸形，之預釋也（或作前後，後譯作決病，如肺癆病在第一期，可預決其能愈，在第二期，則預決其必死，曰療法，治病所用之藥劑，及手術之方法也（療法中有對症者，即官病人患咳症，則對其咳症而治之，思使便與發熱，則對其便秘發熱而治之，曰類症，言各種類似之病症，直接其異同之點，下釋之，附以確定其病名也

每部兩元五角

藥物學綱要

無錯丁願保證其十六章曰：藥用以後神經系之中樞、神經系之末梢、呼吸中樞之效者也。日與、欲藥能奏強壯心、助精神、快利呼吸、備進血液、盡欲而去睡眠之效者也。日解熱、藥用以減退病人之身熱者也。日清涼、藥由主宰於心臟及脈管之神經中樞之作用以減退、酸化、模能及體溫之亢進、血液之循環者、亦解熱之一類也。日防腐及消毒、藥用以防物質之腐敗、發酵、又能奏殺滅傳染病微菌之效者也。日口鼻、藥用以殺滅寄生於口腔及皮膚之蟲類者也。日變質、藥用以改良新陳代謝之作用者、謂之清血劑、或用以消除寄生於血液的毒物者、謂之解毒藥、凡各種之慢性病、身體內有障礙之毒物者、能以此種藥品、而掃除之、日強壯、藥內分苦味、藥消化、藥補血、藥三種、若能改良營養、變衰弱面為強壯者也。日散、藥能散積聚於小血管減少分泌而止出血、且有防腐、防腐之作用者也。日刺激、藥貼於皮膚或組織、能奏刺激、神經三種之效者也。日下、藥其間雖有較下、較下之別、發音能刺激、腸、結、腸、催進、大腸之蠕、動、逐去腸之內、毒物者也。日吐、藥促起嘔吐、中樞受刺激、利用胃、腸、筋、及、胸、膈、痙、攣、性、之、收、縮、以、驅、送、胃、之、內、容、物、藥、有、祛、痰、之、效、也。日利尿、藥能奏尿、分泌、增多、之、效、凡、水、腫、淋、毒、及、肺、癰、疾、症、均、利、用、之。日祛、毒、藥、能、輸、導、血、之、分、泌、物、或、使、分、泌、物、增多、易、於、咯、出、以、奏、祛、毒、之、效、也。日發汗、藥、或、則、發、汗、腺、之、神、經、或、能、促、血、液、之、循、環、以、增加、皮、膚、水、分、之、排、泄、者、也。日緩、和、藥、為、結、滑、性、之、物、用、以、減、退、包、質、之、刺、激、性、及、過、敏、之、知、覺、者、也。每、藥、之、下、皆、列、西、文、原、名、於、勝、藥、標、使、凡、藥、名、之、異、品、及、致、會、中、之、舊、譯、名、皆、詳、注、於、目錄、內、以、便、檢、查、洋、裝、精、本、每、部、一、元、五、角。

變後神經細胞之化學的變分而奏鎮靜神經、鎮麻、全身、知覺、延、延、及、呼吸中樞之效者也。日與、欲藥能奏強壯心、助精神、快利呼吸、備進血液、盡欲而去睡眠之效者也。日解熱、藥用以減退病人之身熱者也。日清涼、藥由主宰於心臟及脈管之神經中樞之作用以減退、酸化、模能及體溫之亢進、血液之循環者、亦解熱之一類也。日防腐及消毒、藥用以防物質之腐敗、發酵、又能奏殺滅傳染病微菌之效者也。日口鼻、藥用以殺滅寄生於口腔及皮膚之蟲類者也。日變質、藥用以改良新陳代謝之作用者、謂之清血劑、或用以消除寄生於血液的毒物者、謂之解毒藥、凡各種之慢性病、身體內有障礙之毒物者、能以此種藥品、而掃除之、日強壯、藥內分苦味、藥消化、藥補血、藥三種、若能改良營養、變衰弱面為強壯者也。日散、藥能散積聚於小血管減少分泌而止出血、且有防腐、防腐之作用者也。日刺激、藥貼於皮膚或組織、能奏刺激、神經三種之效者也。日下、藥其間雖有較下、較下之別、發音能刺激、腸、結、腸、催進、大腸之蠕、動、逐去腸之內、毒物者也。日吐、藥促起嘔吐、中樞受刺激、利用胃、腸、筋、及、胸、膈、痙、攣、性、之、收、縮、以、驅、送、胃、之、內、容、物、藥、有、祛、痰、之、效、也。日利尿、藥能奏尿、分泌、增多、之、效、凡、水、腫、淋、毒、及、肺、癰、疾、症、均、利、用、之。日祛、毒、藥、能、輸、導、血、之、分、泌、物、或、使、分、泌、物、增多、易、於、咯、出、以、奏、祛、毒、之、效、也。日發汗、藥、或、則、發、汗、腺、之、神、經、或、能、促、血、液、之、循、環、以、增加、皮、膚、水、分、之、排、泄、者、也。日緩、和、藥、為、結、滑、性、之、物、用、以、減、退、包、質、之、刺、激、性、及、過、敏、之、知、覺、者、也。每、藥、之、下、皆、列、西、文、原、名、於、勝、藥、標、使、凡、藥、名、之、異、品、及、致、會、中、之、舊、譯、名、皆、詳、注、於、目錄、內、以、便、檢、查、洋、裝、精、本、每、部、一、元、五、角。

必讀 育兒談

無錫丁福保譯述。共八章。曰嬰兒之發育及看護者。凡能見之現象。及身體精神之發達。與夫小兒衣服居住運動之事屬焉。曰嬰兒之母。乳。養育官生母之授乳。停乳。

乳房之注意。及授乳之時間規則。母乳等皆屬焉。曰乳母。言生母之乳時。及不能授乳時。對乳母之性質。及管理宜避之法。曰牛乳。言牛乳之性質。管理法。及養育法。曰乳兒。養法之要。經列小兒飲食之不良品。及食物調劑之法。曰自掃掃時。至七歲之發育法。自衣服。沐浴。寢室。以至呼吸器。運動器。及五官等。言之甚詳。曰病兒看護法。及諸病預防法。凡普通之疾病。及傳染病之預防法備焉。曰智育。精神上之教育。曰為每部四角。

蒙學衛生教科書

之本，每部一角

無錫丁福保著。共三十六課。內分飲食空氣日光運動休息等。為衛生學中最淺顯最簡明之書。小館售至十萬部。為南北各學堂通行

生理衛生學講義

京師醫學館生理學教習丁福保編。第一起總論。第二起各部生理。第三起各部病理及治法。每部大洋五角

精印人體生理圖五幅

每圖皆說明語。茲已譯成華文。述全衛生生理。頗為簡要。第一圖骨格。第二圖肌肉。第三圖消化器。第四圖呼吸

及腦髓。第五圖腦筋。每幅長二尺。長三寸。全由京洋五彩粉精印成。照諸課堂。最為合宜。教育家必備之品也。定價洋一元

宣統元年己酉正月印刷
宣統元年己酉閏月發行

(家庭新本草)

定價大洋四角

譯述者 無錫丁福保

總發行所 上海棋盤街 文書局

分售處 上海棋盤街 商務印書局

上海棋盤街 中國圖書公司

上海棋盤街 科學書局

上海棋盤街 會文堂

各埠文明書局 各埠商務印書館

各埠中國圖書公司 各埠會文堂



各省分售處

