

傷寒總病論附札記

一



叢書集成  
初編

王主編  
五青者

商務印書館發行

論病總寒傷  
記札附

(一)

撰時安龐

本館據士禮居叢  
書本排印初編各  
叢書僅有此本

啓久不爲問思企日深過辱存記遠枉書教具聞起居佳勝感懾兼集惠示傷寒論真得古聖賢救人之意豈獨爲傳世不朽之資蓋已義貫幽明矣謹當爲作題首一篇寄去方苦多事故未能便付去人然亦不久作也老倦甚秋初決當求去未知何日會見臨書恫恫惟万万以時自愛不宣再拜安常處士閣下

五月廿八日

又白

人生浮脆何者爲可恃如君能著書傳後有幾今此便當爲作數百字仍欲送杭州開板也知之知之

# 目錄

(以前原缺一葉半)

結胸證 大陷胸湯  
小陷胸湯 三大陷胸丸

三物白散方

心下痞證 半夏瀉心湯  
生薑瀉心湯

大黃黃連瀉心湯  
甘草瀉心湯

加附子瀉心湯

陽毒證 升麻湯

甘草瀉心湯

陰毒證 甘草湯  
硫黃丸

附子瀉心湯

狐惑證 赤小豆當歸散

附子飲子

百合證 百合知母湯

百合石代赭湯  
百合湯  
桔梗牡蠣散  
百合知母湯  
百合散

瘡濕暌等證

瘡證 蒂根麻黃湯

甘草附子湯

濕證 黃耆湯  
桔梗附子湯

甘草附子湯  
小橘皮湯

暌證 瓜蒂湯

甘草附子湯

發汗吐下後雜病證

陰陽易證

炙附

毛足  
際甲  
靚灰  
散

臘

傷寒勞復證

鼠矢  
火湯

枳  
實  
附  
湯

桂  
枝  
根  
蘆  
薈  
湯

黑五黃  
雄黃  
龍膽  
子升  
散麻  
子湯

喉嚨  
閉  
于微  
骨煎  
散飲

升武  
麻沙  
大散  
黃

雄黃  
黃芩  
散杞  
子根  
散橘  
子

青秦  
黃芩  
豆漿  
大黃  
子黃

黃芩  
內黃  
豆漿  
大黃  
藥湯

夢荳  
香白  
根散  
杞子  
散橘  
子

黃芩  
中大  
黃芩  
大黃  
藥湯

葛根  
連翹  
散龍  
膽丸

赤石脂  
柏子仁  
散橘  
子

桔梗  
散橘  
子

葛根  
連翹  
散龍  
膽湯

柴胡  
桔梗  
散橘  
子

桔梗  
散橘  
子

葛根  
連翹  
散龍  
膽湯

乾茯苓  
蘇子  
散橘  
子

桔梗  
散橘  
子

葛根  
連翹  
散龍  
膽湯

暑病表證代葛根證

大青黃證葛根湯

代青龍證葛粉散

素問載五種暑病無方

### 時行寒疫論

時行寒疫治法桂枝湯

推文行解散葛根湯

柴胡湯

葛根解肌湯葛根湯

白薇散

葛根湯

### 班豆方論

溫病發班治法小兒證附

黃連解肌湯葛根湯

葛根湯

黃芩解肌湯葛根湯

葛根湯

### 第五卷

### 天行溫病論

辟溫疫方論葛根湯

葛根解肌湯葛根湯

葛根散葛根散

傷寒總病論葛根湯

月錄

葛根散葛根散

傷寒總病論 目錄

青筋牽證 柴胡地黃湯 石膏竹葉湯

赤脈攢證 石膏地黃湯

黃肉隨證 灸法附 玄參寒水石湯

白氣裡證 石膏杏人湯 石膏葱白湯

黑骨溫證 灸法附 菖夢石膏湯 知母解肌湯

溫病癥方論 茅根葛根湯 桑皮飲子 茅根橘皮湯

黃病證 癰煎 風下散

傷寒感異氣成溫病壞後及癰證 知母石膏湯 丹砂丸

白虎加桂枝湯 石膏甘草散

敗壞別行方 附子鱉甲湯 木通桂枝湯 鱉甲桓山湯

小兒傷寒證 萆薢芍藥湯 蕃蕷散 射干湯 地皮湯 鈞麻大黃湯

第六卷

傷寒雜方 時雨散 麻黃杏子湯

妊娠雜方 仲龍肝散 黃耆人參湯

回春散子法 朴硝石湯 朴硝石湯

阿膠散子法 蒜皮牛散 瓜蒂牙消散

傷寒暑病通用刺法期門  
列缺 太都 天柱 滾泉 摟合中肺俞  
大淵 商陽 太白 復溜 陰谷  
地黃生薑飲子 紅花散 生薑小便飲子  
鹿角屑湯 地黃生薑飲子 紅花散 生薑小便飲子  
大黃桃人湯 大黃桃人湯 石膏桔梗湯  
石膏桔梗湯

傷寒死生候  
熱病死生候  
溫病死生候  
天行差後禁忌

解仲景脈說 牛夏桂枝甘草湯

解華佗內外實說  
辨論

與有位辨傷寒論書

惣論音訓

脩治藥法

# 傷寒總病論卷一

宋 駢水龐安時撰

敍 論凡言龍曰。其下有注。皆安時言。

太陽證

陽明證

少陽證

太陰證

少陰證

厥陰證

兩感證

三陰三陽傳病證

敍論

龐曰。素問云。冬三月是謂閉藏。水冰也。地裂也。無擾乎陽。又云。彼春之暖。爲夏之暑。彼秋之忿。爲冬之怒。是以嚴寒冬令。爲殺厲之氣也。故君子善知攝生。當嚴寒之時。周密居室。而不犯寒毒。其有奔馳荷重。勞房之人。皆辛苦之徒也。當陽氣閉藏。反擾動之。令鬱發腠理。津液強瀆。爲寒所搏。膚湊反密。寒毒與榮衛相渾。當是之時。勇者氣行則已。怯者則著而成病矣。其即時成病者。頭痛身疼。肌膚熱而惡寒。名曰傷寒。其不即時成病。則寒毒藏於肌膚之間。至春夏陽氣發生。則寒毒與陽氣相搏於榮衛之間。其患與冬時即

病候無異。因春溫氣而變，名曰溫病也。因夏暑氣而變，名曰熱病也。因八節虛風而變，名曰中風也。因暑濕而變，名曰濕病也。因氣運風熱相搏而變，名曰風溫也。其病本因冬時中寒，隨時有變病之形態爾。故大醫通謂之傷寒焉。其暑病濕溫風溫死生不同，形狀各異，治別有法。

龜曰：天寒之所折，則折陽氣。足太陽爲諸陽主氣，其經夾脊膂，貫五臟六府之腧，上入腦，故始則太陽受病也。以其經貫五臟六府之腧，故病有臟府傳變之候。以其陽經先受病，故次第傳入陰經，以陽主生，故足太陽水傳足陽明土，土傳足少陽木，爲微邪，以陰主殺。故木傳足太陰土，土傳足少陰水，水傳足厥陰木。至第六七日，當傳足厥陰肝木必移氣克於脾土，脾再受賊邪，則五臟六府皆危殆矣。榮衛不通，耳聾囊縮，不知人，則死。速用承氣湯下之。方在可下證中，則可保五死一生。勿從容拯溺，令病人水漿不入，湯液不下，無可柰何也。素問云：脾熱病則五臟危。又云：土敗木賊則死。若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮，其證寒熱似癢，此爲必愈。宜桂枝麻黃各半湯和之。方在可汗證中，微緩微浮爲脾胃脈也。故知脾氣全不再受克，邪無所容否。極泰來，榮衛將復，水升火降，則寒熱作而大汗解矣。人將大汗必冒昧者，若久旱天將時雨，六合皆至昏昧，雨降之後，草木皆蘇，庶物明淨，玉冊所謂換陽之吉證也。

王叔和云：土地溫涼，高下不同，物性剛柔，聲居亦異。是以黃帝興四方之間，岐伯立四治之能，以訓後賢，開其未悟，臨病之工，宜兩審之。

龜曰。叔和非醫之圓機。孰能臻此也。如桂枝湯自西北二方居人。四時行之。無不應驗。自江淮間地偏暖處。唯冬及春可行之。自春末及夏至以前。桂枝麻黃青龍內宜黃芩也。自夏至以後。桂枝內故須隨證增知母。大青石膏升麻輩取汗也。若時行寒疫及病人素虛寒者。正用古方。不在加減矣。夏至以後。雖宜白虎詳白虎湯。自非新中暎而變暑病。乃汗後解表藥耳。一白虎未能驅逐表邪故也。或有多及始春。寒甚之時。人患斯疾。因汗下偶變狂躁不解。須當作內熱治之。不拘於時令也。南方無霜雪之地。不因寒氣中人。地氣不藏。蟲類泄毒。嵐瘴間作。不在此法。治別有方也。又一州之內。有山居者爲居積陰之所。盛夏冰害其氣。寒腠理閉。難傷於邪。其人壽。其有病者多中風中寒之疾也。有平居者爲居積陽之所。嚴冬生草。其氣溫。腠理疎。易傷於邪。其人夭。其有病者多中濕中暑之疾也。凡人稟氣各有盛衰。宿病各有寒熱。因傷寒蒸起宿疾。更不在感異氣而變者。假令素有寒者。多變陽虛陰盛之疾。或變陰毒也。素有熱者。多變陽盛陰虛之疾。或變陽毒也。

龜曰。四時之中。有寒暑燥濕風火相搏喜變諸疾。須預察之。其飲食五味禽魚蟲菜果實之屬。性偏有嗜者。或金石草木藥素嘗有餌者。人五臟有大小、高下、堅脆、端正偏傾。六府亦有大小、長短、厚薄、緩急。令人終身長有一病者。貴者後賤。富者乍貧。有常貴。有常富。有暴富。有暴貧。有暴樂。有暴苦。有始樂後苦。有離絕蘊結。憂恐喜怒者。夫常貴後賤。名曰脫營。常富後貧。名曰失精。暴樂暴苦。始樂後苦。精竭體沮。脫勢候

王精神內傷情慕尊貴妄爲喪志始富後貧焦皮蠶筋常富惡勞驕墮精消離間親愛者魂遊絕所懷者意喪所處者神勞結怨恨者志苦憂愁者閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者蕩憚而不收喜樂者蹕散而不藏此皆非外邪所中而得之於內也良工必預審問其由先知臟府經絡受病之所可舉萬全工不思曉令五臟六府血氣離守迨至不救又何言哉

龜曰陰陽虛盛者非謂分尺寸也榮衛者表陽也腸胃者裏陰也寒毒爭於榮衛之中必發熱惡寒尺寸俱浮大內必不甚躁設有微煩其人飲食欲溫而惡冷謂陽虛陰盛也可汗之則愈若誤下則死也若寒毒相薄於榮衛之內而陽勝陰衰極陰變陽寒盛生熱熱氣盛而入裏熱毒居腸胃之中水液爲之乾涸燥糞結聚其人外不惡寒必蒸蒸發熱而躁甚則讝語其脈浮滑而數或洪實或汗後脈雖遲按之有力外證已不惡寒腹滿而喘此皆爲陽盛陰虛當下之則愈若誤汗則死也仲景載三等陽明是陽盛陰虛證矣調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒以此別之若陰獨盛而陽氣暴絕必四肢逆冷臍築湊痛身疼如被杖面青或吐或利脈細欲絕名曰陰毒也須急灸臍下服以辛熱之藥令陽氣復生誠然汗出而解若陽獨盛而陰氣暴絕必發躁狂走妄言而赤咽痛身班班如錦文或下利赤黃脈洪實或滑促名曰陽毒也宜用針泄熱服以苦酢之藥令陰氣復生濁然汗出而解也

龜曰夫邪逆陰陽之氣非汗不能全其天眞素問云辛甘發散爲陽謂桂枝甘草細辛薑棗附子之類能

復陽氣也。酸苦澆泄爲陰。謂苦參、大青、芩、蘇、苦酒、艾之類。能復陰氣也。酸苦之藥。既折熱復陰。亦當小汗而後利者。經云。身汗得而後利。則實者可活是也。

華佗治法云。傷寒病起自風寒入於腠理。與精氣分爭。榮衛否隔。周行不通。病一日至二日。氣在孔竅皮膚之間。故病者頭痛惡寒。身熱。腰背強重。此邪氣在表。隨證發汗則愈。

龜曰。凡發汗須如常覆腰以上。厚衣覆腰以下。以腰足難取汗故也。半身無汗。病終不解。凡發汗後。病證仍存。於三日內可二三發汗。令腰脚周遍爲度。若病不解。便可下之。設令下後不解。表裏邪亦衰矣。足觀脈證調治。七日內可期正汗爲善也。發汗後不可再行汗者。始發熱惡寒。今不惡寒。但倍發熱而躁。始脈浮大。今洪實。或沈細數。始惺靜。今狂語。此胃實陽盛。再行汗藥即死。須當下之。有人始得病變陽盛之證。須便下之。不可拘日子深淺次第也。病三日以上。氣浮上部。填塞胸心。故頭痛胸中滿。或多痰涎。當吐之。則愈。

龜曰。若虛損及新產人。不能吐者。可服枳實散。枳實細末。米飲調服。日可三四服。若有虛寒。手足冷及脈微弱者。枳實武兩加桂枝壹兩。同末之。如前服。

病五六日以上。氣結在臟府。故腹滿身重。骨節煩疼。當下則愈。若小便少。手足冷及脈微弱者。枳實武攻之。當消息其候。不可亂投湯藥。虛其胃氣也。以上解華佗治法。

太陽證

尺寸俱浮者。太陽受病也。一二日發。以上連風府。故頭項痛而腰脊強。

此是太陽膀胱經。屬水。  
病源云小腸者。非也。

太陽病發熱。汗出惡風。其脈緩者。名爲中風。太陽病或已發熱。未發熱。必惡寒。體痛。脈陰陽俱緊者。名爲傷寒。

傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳。頗欲吐。若煩躁。脈數急者。爲傳也。

傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。病發熱而惡寒。邪發於陽也。不熱而惡寒者。邪發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。陽數七陰數六。故也。

發於陽者。隨證用汗藥攻其外。  
發於陰者。用四逆散溫其內。

太陽病。頭痛至七日以上。自愈者。其經竟故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳。

補足陽明土。  
三里穴也。

風者解表而不了了者。十二日愈。

方言曰。南楚疾愈或謂之達。或謂之了。

太陽病初服桂枝湯。反煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。

太陽病自汗。四肢難以屈伸。若小便難者。可與陽旦證內加附子壹枚。炮去皮尖。八破同煎服之。

陽旦即桂  
枝湯異名

若小便數者。慎不可行此湯。宜用芍藥甘草湯。若誤行桂枝附子湯攻表。則咽乾煩躁。厥逆嘔吐者。作甘草乾薑湯與之。以復陽氣。若厥愈足溫。更與芍藥甘草湯。其脚即伸。若胃氣不和。讌語者。少與調胃承氣湯。微滲則讌語止。

芍藥甘草湯主脈浮而自汗。小便數。寸口脈浮大。浮爲風。大爲虛。虛則生微熱。虛則兩脰攣。小便數。仍汗出。爲津液少。不可誤用桂枝湯。宜補虛退熱通治。誤服湯後。病證仍存者。按古之參兩。准今之壹兩。古之參合今升。即明升。升合之分毫。非以從俗。莫若以古今升秤均等。而減半爲一劑。稍增其枚粒。乃便於俗。方云。一劑盡。內中猶在者。更行減半之劑。此古方。削入其半。庶可防病未盡而服之也。有不禁大湯者。再減半升。酌減。謂或以壹分爲兩。或以忒互爲兩。以適當升可也。賢家難辦。或臨時抄撮皆可。適水每抄五錢。水兩平滿。煎八分服之。有發瘧者。每服入姜三片。柴三枚。一日三服。未中病可六七服也。有不可作資散者。是病勢大。宜依古方行之。凡渴一劑。有附子一枚半。古方不折枚者。是枚力要。半兩以上。大附子可一枚半。四錢以下者。可用兩枚爲准。枚傷多不妨。仲景云。強人可加附子成兩枚。是也。完也。半兩以上。大附子可

芍藥  
甘草各三兩

細剉。水壹升半。煎七合半去滓。溫溫分再服。

甘草乾薑湯

甘草二兩  
乾薑一兩

煎如前方。

調胃承氣湯

大黃一兩  
甘草半兩  
芒消一錢大

細剉。水壹升。煎上二味至五合。去滓下芒消烊化。暖服。微溏爲度。如難利者。再與一劑。

太陽病汗證。反下之。遂利不止。脈促。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩湯主之。

黃芩 半錢

黃連 半兩

甘草 半兩

乾葛 二兩

細剉水壹升半煎七合半去滓溫飲壹盞日三服

陽明證

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目痛鼻乾不得臥此證惡寒可發汗若惡寒而反自汗惡熱者爲胃家實屬正陽明宜調胃承氣湯方在太陽證下

龜曰有三陽陽明者其太陽陽明本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥大便難也正陽陽明者病人本風盛氣實津液消鑿或始惡寒汗出多寒罷而反發熱或始得病便發熱狂言也

凡陽明證俱宜下唯中寒惡寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗

二陽合病脈必浮大而長外證必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也浮大者太陽受病也長者陽明也頭腰太陽也肌目鼻陽明也

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱汗出大便難而讐語者大承氣湯下之則愈方在可下證中

二陽併病太陽初得時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明自微汗不惡寒若太陽證不能不可下下之爲逆如此者可小發其汗設面色正赤者陽氣怫鬱在表當解之蒸之若汗出不徹當短息不足言陽氣

慄慄不得越。當汗出而不汗。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。宜麻黃湯。更發其汗即愈。何以知其汗不徹。其脈溫故知也。方在可汗證中。古本字多瘡誤。以從來所見病人證候中。符合如此。故改正。陽明病能食爲中風。不能食爲中寒。

陽明病中寒。脈浮無汗。其人必喘。發汗則愈。宜麻黃湯。

方在可汗證中。

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解。發汗則愈。宜桂枝湯。

方在可汗證中。

若不惡寒。爲外欲解。手足濶然汗出者。大便已鞶。宜大承氣湯。

方在可汗證中。

陽明病有不可攻者。謂陽明病心下鞶滿者不可攻。攻之利不止者死。利止者愈。

陽明病或發汗。或自汗。大便雖鞶。小便少者。未可攻。津液恐還入胃。必先鞶後瀝也。小便自如。乃可攻之。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。其脈浮緊。若下之。則腹滿。小便難也。

此證必無汗。與後證相合。且惡寒無汗爲異。以病乾腹滿。

不宜正汗藥。別用消詳也。

陽明病脈浮而緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒而反惡熱。身重。若發汗。則煩躁憤憤。反讐語。若加溫針。必憤揚顰躁不得眠。若下。則胃中空虛。客氣動鬲。心中懊憹。苔生舌上者。梔子香豉湯主之。

肥梔子

一枚。去核。炒熟。

香豉

一升。研末。

水二升。煮梔子減半。下豉再煮。擗合去滓。溫服壹盞。得快吐者。止後服。

脈浮緊。必無汗。而反有汗。咽燥。腹滿惡熱。法當下之。而又脈浮緊。不當下。此恐變風溫。宜細詳。

陽明病口鼻燥。但漱水而不欲嚥者。必衄。

少陽證

尺寸俱弦者。少陽受病也。當二三日發。以其脈上循脣絡於耳。故胸脣痛而聾。足少陽膽。屬木。弦者。細是白弦。非謂此聾脈也。凡傷寒脈浮翳相兼。皆屬弦之類也。有屬太陽。有屬陽明者。少陽正得弦脈。皆是小弦長大脈也。多宜和表。鮮有汗證。

少陽之證。口苦咽乾目眩也。

此三陽經皆病。未入於藏。可汗而解。

仲景少陽證唯小柴胡。乃和表藥耳。

弦細頭痛發熱屬少陽。宜小柴胡湯。不可發汗。發汗則讞語。此屬胃。胃和則愈。不和則煩而躁。宜調胃承氣湯。此屬少陽陽明證也。方在太陽證中。

木太陽病不解。轉入少陽者。脇下鞭滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尙未可吐下。脈緊者。小柴胡湯主之。少壯無

若已吐下發汗。溫針讞語。小柴胡湯證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。

知犯何逆者。犯四種溫病。壞候也。

少陽中風。兩耳微聞。目赤。胸中滿而煩。不可吐下。吐下則驚悸。小柴胡湯主之。

方在和表證中。

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠睡。合目則汗。不言弦者。隱於長大也。

三陽合病。面垢讞語。腹滿身重。不能轉側。遺尿。發汗則讞語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗者。宜白

虎湯。方在脈陰證中

傷寒四五日或六七日無大熱其人躁悶此爲陽去入陰也。

傷寒三四日陽爲虛三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也。病到陰必

傷寒三日少陽脈小者欲愈也。小而平匀者也

### 太陰證

尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發其經布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾宜大承氣湯下之。方在可下證中太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭自利不渴者屬太陰其藏有寒故也。當以通散之

傷寒三日太陽脈弱至四日太陰脈大脈大而胸滿多痰者宜吐之無此證者宜汗之傷寒脈浮緩亦大之手足自溫者繫在太陰小便不利者必發黃五苓散加茵陳主之若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實膚穢當去故也橘皮湯主之。

### 五苓散

以茵陳濃煎湯調五苓散武錢服之日三四黃從小便下以小便清爲度。

### 橘皮湯

橘皮 壹兩 生薑 貳兩

細剉水壹升半煎七合去滓分貳服稍熱呷未差再作服

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝芍藥湯主之

桂枝 壹兩

芍藥 參兩

甘草 壹兩

大棗 隨枚

生薑 壹兩

咬咀以水參升煮取壹升半去滓每溫壹盞日參服

注云小建中湯不用鵝糖故芍藥爲君止痛復利邪故也

少陰證

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其經貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴大承氣湯下之在方中可下證

少陰之爲病脈微細於寐也

少陰中風陽微陰浮爲欲愈也

凡少陰病四逆者宜溫之

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃細辛附子湯主之

麻黃 貳兩

細辛 貳兩

附子 壹枚

咬咀以水三升先煮麻黃十數沸去上沫內諸藥煮取壹升去滓每溫壹盞日三服

少陰病得之二三日，麻黃附子甘草湯微汗，以二三日無陽證，故微發汗也。

謂初得病二三日，常見少陰證，無陽者，須發小汗也。

麻黃 武兩 甘草 武兩 附子 壹枚

啜咀以水參升，先煮麻黃十數沸，去上沫，內諸藥，煮取壹升半，去滓，每溫一盞，日三服。

脈浮、少陰病脈沉，不知何沉也。且沉緊發汗則動經，沉數爲病在裏，不可發汗。詳此脈或沉而濡，或沉而微，是表中寒而裏不消，脈應裏而發熱在表，故以小辛之藥溫散而微微，取汗也。

少陰病吐利手足不適冷，發熱者不死，脈不至者，灸少陰七壯。

太谿穴在內踝後跟骨上，動脈陷中，言發熱者，即其身發熱也。

少陰病吐利煩躁，四逆者死。煩躁者，內煩躁也，與藥黃湯，證宜細審其生死也。

少陰病惡寒而勃，居貞 時時自煩，不欲厚衣，宜大柴胡湯。方在可下證中。

少陰病四逆，惡寒而自勃，脈不至而吐利，煩躁者死。此重詳定

少陰病下利利止而眩，時自冒者死。此合是少陽胃味，汗濶出，眩晕。

少陰病六七日，息高者死。

少陰病脈微細沉，但欲臥，汗出不煩，自欲吐，至五六日自利，復煩躁不得臥寐者死。

少陰病得之二三日以上，心中煩不得臥者，黃連阿膠湯主之。

黃連 壹兩 黃芩 壹分 菟藥 壹分

雞子黃 半枚

阿膠 炙，各分  
爲末

以水貳升。先煮三物。取壹升去滓。內阿膠烊盡。小冷內雞子黃。攪令相得。溫溫一盞。日三四服。  
少陰病下利清水。色純清。心下必痛。口乾燥者。大承氣湯下之。方在可下證中。

少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。茱萸湯主之。

茱萸 擘兩半，湯洗三遍。

人參 各分

生薑 壹兩半

大棗 參個

以水參勝半。煮取壹勝半去滓。每溫一盞。日參服。

少陰病咽痛者。桔梗甘草湯主之。

桔梗 半兩

甘草 壹兩

細剉水壹勝煎半勝去滓。作參服。細呷之。

父半夏散亦主之。

半夏 湯洗七遍。

桂枝 去皮

甘草 炙。

右各等分。各別搗篩。已合治之。每服參錢。水壹盞半煎至八分。溫冷少少嚥之。

少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。

脈不出者，通脈四逆湯主之。

甘草

壹兩

附子

大者半個，強人加半個，強人

乾薑

參分，強人加壹兩半

細剉水叁升煎至壹升去滓每溫服一盞日三四服未差急更作一劑不可作煮散其脈續續出者愈暴出者死面赤者加速須葱四莖去青腹痛去葱加芍藥壹兩咽痛者加生薑壹兩咽痛者去芍藥加桔梗半兩利止脈不出者去桔梗加人參半兩病與方皆相應者乃與服之

少陰病下利六七日歟而嘔渴心煩不得眠者宜豬苓湯

豬苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠各半兩

咬咀以水貳升先煮四物取壹升去滓內阿膠末烊盡每溫一盞服

少陰病下利咽痛胸滿心煩豬肝湯主之

豬肝

半斤

以水五升煮取貳升半去滓加白蜜半升白粉貳合半熬香和令相得每溫服一盞日三四服

少陰病四逆其人或歎或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

甘草

枳實

柴胡

芍藥

各伍分

擣篩爲細末白飲和服方寸匕日三服歎者加五味子乾薑炮各貳分半并主下利悸者加桂貳分

半小便不利者加赤茯苓二分半腹痛者加附子壹箇炮去皮臍泄利下重者先以水參升薤白壹升半煮取貳升去滓以散方寸匕用薤白湯一盞煎八分日三四服

厥陰證

尺寸俱微者厥陰受病他六七日發以其脈循陰而絡於肝故煩滿而脣縮微緩者脣必不縮若外證發然惡寒氣得也若尺寸俱沉短者脣必縮宜水氣得下之方在可下證中

厥陰之爲病消渴氣上衝心中痛熱飢而不欲食食則吐或下之利不止烏梅丸主之

傷寒脈微而厥至七八日府冷其人躁無暫安者此藏厥非蛔厥也蛔厥者其人當吐蛔令病者靜而復煩也此藏寒蛔上入其鬲故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛔聞食臭卽出其人常自吐蛔蛔厥者烏梅丸主之又治久痢藏厥宜四逆散極冷服之

烏梅

壹百伍拾個

乾薑

伍兩

黃連

捌兩

當歸

貳兩

川椒

桂枝

附子

人參

黃蘖

細辛

各三兩

異擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之貳斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內白中與蜜再杵二千下丸如梧桐子大先飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑臭食物等厥陰中風脈微浮者爲欲愈不浮爲未愈

脈遲。反以黃芩湯得微其熱。腹中應冷。當不得食。今反能食。此爲除中。必死。  
先厥後發熱。下利必自止。而反汗出咽痛者。其喉爲痺。發熱無汗。其利自止。若不止。必便膿血者。其喉不  
痺。

脈曰。熱少微厥。指頭寒。嘿嘿不欲食。煩躁數日。小便自如此熱除也。宜乾薑甘草湯。方在太陽證中。

脈曰。手足逆冷。皆屬厥陰。不可下亦不可汗。有須下證者。謂手足雖逆冷。或有溫時。手足雖逆冷。而手足  
掌心必煖。非正厥也。故可消息汗下也。

傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前發厥者。後必發熱。厥甚熱亦甚。厥微熱亦微。厥不過五日。六日不  
厥者必愈。若六日厥者。必發熱愈甚。仍下利也。

脈曰。寒熱而厥。面色不澤。冒昧者。當用絲衣包手足令溫煖。必大汗而解也。有不因大汗下。而兩手忽無  
脈。謂之雙伏。或一手無脈。謂之單伏。或利止。如此必有正汗。急用四逆輩溫之時。有汗便安。脈終不出者  
死。下利先厥後發熱。利必自止。不爾。咽中痛。或喉痺。若便膿血者。其喉不痺。

厥而下利者。當不能食。反能食者爲除中。必死。能食反發熱。脈數者。必發癰。膿厥而嘔。胸脇煩滿。後必便  
膿血。

病者手足冷。小腹按之痛。此結冷在膀胱關元也。當關元灸之。發熱下利。厥逆躁不得臥者死。

病人手足厥冷。脈乍緊者。邪結在胃中心下滿而煩。不能飲食者。病在胸中。當吐之。宜瓜蒂散。凡病可吐者。皆宜此方。

瓜蒂 赤小豆 等分

細末。別以香豉壹合。熱湯參蓋。煮作稀糜。去滓。取汁和散壹錢。溫溫頓服。不吐者。少少加藥。再服得吐快乃止。諸亡血虛家。不可與服。有用丁香者。吐之多霍燥人。

傷寒厥而心下悸。宜先治水。當服茯苓甘草湯。次治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。茯苓甘草湯。

茯苓 桂各壹兩 生薑壹兩 甘草半兩

細剉水貳升。煎壹升。溫飲壹盞。悸止爲度。

傷寒六七日。大下後。寸脈沉而遲。手足厥逆。下部脈不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。爲難治。宜麻黃湯。有不因下而自利。加鵝血者。永宜此方。

麻黃壹兩 升麻 當歸各半兩 知母 黃芩

萎蕤各參錢

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草

石膏

白朮

乾薑各壹錢

細剉水貳升半。先煎麻黃一二沸。去沫。內諸藥。煮壹升。溫服一盞。如人行七八里。久進一

服以汗出卽住服。

本自寒醫復吐下之寒格愈逆食入口卽吐宜乾薑黃芩湯。

乾薑 黃芩 黃連 人參 各一兩半

細剉水煮升煮取壹升半去滓溫服一盞。

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治。凡厥通用四逆湯方在四逆證中謂其脈浮遲或微或細或沉皆屬裏有寒也。厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之。

知母 石膏 捺兩 甘草 半兩 糯米 叢合

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩。

龜曰三陽皆有合病凡合病者有十四證唯三陰無合病。

兩感證

龜曰素問載兩感於寒其脈應與其病形者一日則巨陽與少陰俱病頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病腹滿身熱不欲食讐語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入口不知人六日死言其六日死者是藏府榮衛或有所通行故四日少陰與太陽俱病五日與太陰與陽明俱病六日厥

陰與少陽俱病。是重傳得六日死矣。其有三日死者。素問謂陽明爲五藏十二經脈之長。其邪氣盛。故不知人。三日其氣乃絕。故死矣。夫邪氣盛則實。表裏邪實。併領血氣。入胃不通於榮衛氣血。故氣血隨邪而盡。則三日死矣。其脈候。素問已脫。今詳之。凡沉者皆屬陰也。一日脈當沉而大沉者。少陰也。大者太陽也。二日脈當沉而長。三日脈當沉而弦。乃以合表裏之脈也。沉長沉弦。皆屬於沉大。凡陰不當合病。唯三陽可以合病。今三陰與三陽合病。故其脈似沉緊而大。似沉實而長。亦類革至之死脈也。

三陰三陽傳病證

龜曰。傷寒一日。巨陽受病。前所說膀胱詳矣。病源云。小腸雖則誤其標。本其手足陰陽。自有併病者。故素問云。六日三陰三陽五藏六府皆受病。榮衛不行。五藏不通。則死矣。是表裏次第傳。不必兩感。亦有至六日傳循五藏六府而死者也。素問云。諸浮不躁者。皆在陽。則爲熱。其有躁者。在手。假令第一日脈不躁。是足太陽膀胱脈先病。脈加躁者。又兼手太陽小腸也。又云。諸細而沉者。皆在陰。則爲骨痛。其有靜者。在足。假令第四日脈靜者。足太陰始傳病也。脈加數。又兼手太陰病也。故六日亦能傳循藏府也。躁謂脈數。靜謂脈不數。用藥則同。若用鍼。須取足與手之經也。

# 傷寒總病論卷二

可發汗證

四逆證

可下證血證附

可水不可水證

可灸不可灸證

可溫證

可發汗證

大法春宜發汗

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者自發熱。陰弱者自汗出。齎齎惡寒。浙浙惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

桂枝

芍藥

生薑

各三兩半

甘草

壹兩半

大棗

陸個

㕮咀。水參升半。微火煎取壹升七合半。生布絞去滓。溫服一盞。須臾啜熱粥一椀。令助藥力。周覆一

時汗獨身濺濺者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差止後服不必盡劑也若不汗如前法更服半日許令三服若病重者一日一夜可盡一劑病證猶存者更作服若汗未出乃至二三劑忌生冷黏滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈按風池是少陽之經陽維之會不針天柱而取風池者陽維維諸陽巨陽與諸陽主氣故也

龜曰凡桂枝湯證病者常自汗出小便不數手足溫和或手足指梢露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又增寒始可行之若病者身無汗小便數或手足逆冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脈緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之桂枝湯內加附子壹枚炮去皮尖切片

下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之桂枝湯內去芍藥只用四味也芍藥味酸脈促胸滿恐數不可誤認陽旦證也陽旦卽桂枝湯異名也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加白朮茯苓各一兩半主之桂枝加水成四升取二升

太陽病項背強几几汗出惡風者桂枝加葛根貳兩添水成四升煎取貳升通治柔痓

太陽下之微喘者。表未解也。桂枝加杏人厚朴湯主之。桂枝內加厚朴壹兩  
杏人肆拾枚此則中風自汗。用桂枝湯證也。龜曰。惡寒者。不當風而憎寒。惡風者。當風而憎寒。皆屬表證。太陽病頭痛發熱。身疼痛。骨節煩疼。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。

麻黃 壹兩 桂枝 壹兩 甘草 半兩 杏人 個 參拾伍

㕮咀水貳升半。煮麻黃數沸去上沫。內諸藥。煮取壹升貳合半。去滓。每飲一盞。續次服盡。不用粥投溫覆。如桂枝法將息。未汗可再作二三劑。

龜曰。傷寒之脈緊盛。而按之澀是也。脈浮而緊。浮爲風。緊爲寒。風傷衛。寒傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。外證必發熱。無汗或喘。其人但憎寒。手足指未必微厥。久而復溫。掌心不厥。此傷寒無汗用麻黃證。凡脈浮數或浮緊。無汗。小便不數。病雖十餘日。尙宜麻黃湯也。

太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。自汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。大青龍湯。

麻黃 壹兩 桂枝 半兩 甘草 半兩 石膏 各壹兩

杏人 肆拾

棗 伍枚

生薑 半兩

㕮咀水五升。煮麻黃數沸去上沫。內諸藥。煮取二升。每溫飲一盞。微汗爲度。若汗周身潤則止服。未

周身潤可停待少時服盡。不欲汗多亡陽故也。亡陽遂虛。惡風煩躁。不得眠也。

傷寒脈浮緩。身不疼但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。

少陰當言太陰。按太陰證內有脈浮緩。手足溫者。繁太陰。太陰當發。證屬青龍陽。似桂枝證反。汗出而脈緊。似麻黃證。反汗不出而脈浮緩。

太陽病項背凡凡無汗惡風。葛根湯主之。

葛根

三兩

麻黃

半兩

桂枝

三兩

甘草

三兩

生薑

三兩

大棗

四枚

半夏

半升

咬咀水四升。先煮麻黃葛根數沸。去沫下諸藥。煮取貳升半。去滓。每溫飲一盞。日三服。如桂枝湯將息。

太陽與陽明合病。必自下利者。葛根湯主之。

太陽與陽明合病。不利但嘔者。葛根加半夏湯主之。用前葛根湯內加半夏壹兩壹分。湯洗十箇。每個作四破。

虛日脈浮緊無汗。服湯未中病。其人發煩。目瞑極者必衄。小衄而脈尚浮者。宜麻黃湯。衄後脈已微者。不可再行也。凡脈浮自汗。服湯不中病。桂枝證尚在。必頭痛甚而致衄。小衄而脈尚浮者。再與桂枝湯。衄後脈已微者。不可再行也。

傷寒三日後。與諸湯不差。脈勢如數。陽氣猶在經絡。未入藏府。宜桂枝石膏湯。此方可夏至後代桂枝證用之。若加麻黃壹兩。可代麻黃青龍湯用之。

石膏大兩 桔子大者拾肆個 生薑壹兩 桂枝

黃芩兩 甘草各壹兩 升麻半 葛根各壹兩

咬咽水五升。煮取貳升半。去滓溫飲一盞。食頃再服。若得汗即止後服。

龜白。凡發汗以辛甘爲主。復用此苦藥者何也。然辛甘者折陰氣而助陽氣也。今熱盛於表。故加苦以發之。索問云。熱淫于內。以苦發之故也。

葛根龍膽湯。療病四五日不差。身體甚熱而赤。兼治陽毒風溫。

葛根生者或兩代 大青

生薑 升麻

大青

龍膽

桂枝 甘草 麻黃 茯苓各半 石膏壹兩

绞肌水四升半。下麻黃煮數沸。去上沫。內諸藥煎貳升。去滓溫飲一湯盞。日三夜二。

凡葛根須用家園味甘多白粉者爲佳。

者味苦甘多  
人轉病。

暎行熱病六七日未得汗。脈洪大或數。面目赤。身體大熱煩躁。狂語欲走。大渴甚。又五六日以上不解。熱在胃中。口禁不能言。爲壞傷寒醫所不能治。如死人或精魂已竭。心下纏緩。發開其口。嚙藥下咽即活。兼

治陽毒麥奴丸

麻黃 參分

蜜燒煤

黃芩

龍威墨

梁上塵

小麥奴

蜜中黃土 各壹分

芒消

大黃 各半兩

細末蜜丸彈子大，新汲水三合和一丸研服之。渴者但令冷水足意飲之。須臾當寒竟。汗出便差。若日移五尺不汗。依前法再服一丸。差即止。須微利。小麥奴乃小麥未熟時叢中黑麥。捻之成黑勃者是也。無卽以小麥炒黑焦地上出火毒用之亦得。此藥須是病人大渴倍常躁盛。若小渴者強與之爲禍耳。強人每服半雞子大。亦治溫瘡。

傷寒速服發汗湯七八劑。汗不出者死。如中風法蒸之。使溫熱之氣外迎。無不得汗也。古今用效薪火燒地良久去火掃地。以水洒之。取蠶沙、桃柏、荆葉糠及麥穀皆可。同和鋪燒地上。可側手厚上鋪席。令病人臥席上。溫覆之。熱月只可夾被覆。其汗立出。後周身至脚心皆汗濺。濺乃用溫粉撲止。移之上牀即愈。無蠶沙。卽用麩糠之類鋪燒地上亦得。溫粉法。白朮。葛根。白芷各兩。水之。入英粉拾兩。和勻用之。無英粉以蜂粉代之。

傷寒差後。有不了了證者。謂至十日或半月二十日終不惺惺。常昏沉以失精神。言語錯謬。或無寒熱。有似鬼祟。或朝夕潮熱頰赤。或有寒熱如癆狀。此乃發汗不盡。餘毒氣在心胞絡間所致也。宜知母麻黃湯。

知母 半兩

麻黃 半兩

芍藥

黃芩

甘草

桂枝各半  
兩

㕮咀水二升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥取壹升參合去滓每溫飲一大盞半日可相次三服溫  
覆令微汗若心煩欲水當稍與之令胃中和則愈未汗盡劑  
太陽病下之後氣上衝其脈必浮可依證發汗不與汗則成結胸也凡發汗脈浮大雖大便祕小便少者  
可發汗而解也合汗不汗諸毛孔閉塞悶絕而死

不可發汗證

脈浮緊法當身痛當以汗解假令尺中脈遲爲榮氣不足血少故也

前陽明病脈遲汗出多微惡寒宜桂枝湯  
不貴榮不足蓄尺脈長大而遲也此若

數緊而遲不可汗  
宜小建中湯

小建中湯

桂枝

參分

生薑

參分

芍藥

壹兩

甘草

半兩

棗

附一枚

飴糖

兩合

㕮咀水二升半煮取九合去滓方下飴糖煎令化每溫飲一湯盞日進二三服尺尚遲再作一劑入  
人參加半兩同煎最良舊有微溏或嘔者不用飴糖也兼治傷寒一二日胸中悸而煩及汗後身疼  
脈沉遲又治傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛先小建中湯不差與柴胡湯方在和表證中

龐曰、凡脈緊病必無汗。唯濡而緊病必自汗。勿誤行桂枝。宜建中湯也。脈濡弱不可發汗。汗則厥而煩躁。不得眠。

諸動氣在心腹上下左右不可發汗。

龐曰、諸脈動數微弱不可發汗。

以上並宜建中湯。若煩躁者宜竹葉湯。

竹葉湯治虛煩病似傷寒。身亦熱而煩躁頭不痛。身不疼。脈不數者。兼治中喝。渴吐逆而脈滑數者。及傷寒解後。虛羸少氣逆欲吐者。並宜服之。

淡竹葉半把

石膏肆兩

半夏參分

人參半兩

甘草半兩

麥門冬二兩

細柏參分

人參半兩

細剉以水伍升煎武升半米熟去滓溫飲一盞日進三服夜二服。嘔者加生薑一兩半不嘔不用。虛煩或嘔吐脈弦細芤遲手足微寒胸滿者橘皮湯主之兼治暴煩下利方在太陰證中。

四逆不可發汗。發汗則聲嘶舌萎不得前言亂睛眩者命將難全。

咽中閉塞不可發汗。發汗則吐血氣微絕手足不能自溫者乾薑甘草湯主之方在太陰證中。

淋家不可發汗。發汗必便血。

瘡家雖身痛不可發汗。汗出則瘻。以癰瘍多血過多。

動氣在右不可發汗。汗出則劇而渴心苦煩。飲則吐水。

動者謂心腹中虛氣動著誤汗有此證先宜五苓散三服方在可水證中次服竹葉湯方在前

動氣在左不可發汗。發汗則頭眩汗出則筋惕肉瞞此爲逆難治

但先服防風自北散次服建中湯方在前

動氣在左不可發汗。發汗則頭眩汗出則筋惕肉瞞此爲逆難治

但先服防風自北散次服建中湯方在前

防風 壹兩

牡蠣粉 半兩

白朮 六分

細末溫米飲調下二錢日二三服汗出續與建中湯。

動氣在上不可發汗。發汗則氣上衝正在心端李根湯主之。

半夏 半兩

桂枝

當歸

芍藥

黃芩

甘草

人參 各壹分

茯苓 叁分

麌末每五錢水兩蓋薑三片甘李根白皮一圍如雞子黃大煎八分通口日三五服。

動氣在下不可發汗。發汗則心中大煩骨節苦痛目連惡寒食則反吐穀不得前先服大橘皮湯得吐止後服建中湯。

大橘皮湯 亦主手足

生薑 貳兩

棗 貳拾肆

甘草 半兩

橘皮 壹兩

竹茹 半兩

咬咀水吞勝煎壹升半去滓溫服一盞食頃再服。

不當汗而強汗之，則津液枯槁而死。

四逆證

四逆湯治病發熱頭痛，脈反沉，若不差，身體疼痛者，脈浮遲，表熱裏寒，下利清穀者，汗出熱不去，內拘急，支節疼。四逆者下利厥逆，惡寒者下利腹脹滿，身疼脈浮者先用四逆溫裏，得利止，乃可隨證用藥攻表也。

甘草 壹兩 附子 半個 乾薑 參分

㕮咀以水壹升半，煮取陸合去滓，溫分作武服。

手足厥脈微欲絕者，當歸四逆湯主之。

當歸 桂枝 芍藥 細辛 各壹兩

棗 六枚 甘草 半兩 木通 各壹兩

㕮咀以水四升半，煮二升二合去滓，每溫一盞服。

和表證

傷寒表不解，心下有水氣，乾嘔發熱而欬，或渴或利，或噎或小便難，腹滿而喘者，小青龍湯主之。

麻黃

芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝各壹兩 半夏三分 五倍子半兩

㕮咀以水六升先煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮一升去滓每溫服一盞若渴者去半夏加括樓根壹兩半若微利去麻黃加蕘花一雞子大炒赤若噫者去麻黃加附子壹枚炮小便不利小腹滿者去麻黃加赤茯苓武兩若喘去麻黃加杏仁壹兩壹分無蕘花以桃花壹鴨子大不炒代之

太陽病得之八九日如癮狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒此陰陽俱虛不可更發汗吐下也面色反有熱色者未解也以其不能得小汗出其身必痙宜桂枝麻黃各半湯

桂枝湯末 麻黃湯末各三分

以水一升半聚三箇生薑三片煎減半去滓溫飲一盞未有小汗再服之

服桂枝湯大汗出脈洪證候不改者服桂枝湯如前法若形似癮狀日再發者宜桂枝二麻黃一湯

桂枝湯末壹兩 麻黃湯末半兩

以水一升半薑三片聚三箇煎減半去滓溫飲一盞未有小汗再服之

服桂枝湯大汗出後大煩渴脈洪大者白虎湯加人參主之方在厥陰證中

羸曰傷寒已得汗身和脈絃細讙語妄見此爲津液不和與小柴胡去仁參加桂枝湯服之津液和自愈

未差與調胃承氣湯下之。

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去柴胡桂枝湯主之兼治寒疝腹痛。

柴胡一兩

桂枝

黃芩

人參各半兩

半夏四錢

芍藥半兩

甘草一錢

大棗九枚

生薑半兩

㕮咀以水三升半煮取一升七合半去滓溫飲一盞。

小柴胡湯治傷寒五六日中風往來寒熱胸脇滿嚦嗰不欲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身微熱或歎者。

柴胡一兩

甘草

黃芩

人參各三分

半夏一兩

生薑三分

大棗一枚

㕮咀以水六升煮取三升去滓再煎取一升半溫作三服若胸中煩而不嘔者去半夏人參加括樓半箇若渴去半夏加人參成貳兩貳錢半括樓根貳兩若腹中痛去黃芩加芍藥壹兩半若脇下痞鞕去大棗加牡蠣貳兩若心下悸小便不利去黃芩加茯苓貳兩若不渴外有微熱去人參加桂枝壹兩半溫覆微汗愈若歎去人參大棗生薑加五味子壹兩壹分乾薑壹兩。

傷寒中風有柴胡證但見一證不必悉具凡以柴胡證而下之與柴胡湯必蒸蒸而振却復發熱汗出而

解也

病十日以上。脈浮細嗜臥者。爲已安候。小柴胡和之。細而遲者勿與。

婦人中風七八日。續自寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如癰狀。發作有時。小柴胡湯主之。

婦人得寒發熱。經水適來。盡日明了。暮則譫語。如見鬼狀。此爲熱入血室。無犯胃氣。必自愈。先宜小柴胡湯  
不愈可刺

期門

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲。身涼胸脇下滿。如結胸狀。譫語。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實取之。

陽明病潮熱。大便溏。小便自如。胸脇滿不去者。小柴胡湯主之。又不大便而嘔。舌上白苔者。亦宜服之上焦得通。津液得下。胃氣因和。身戰然汗出而解。

陽明中風。脈浮弦大而短氣。腹滿脇下及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時嘔。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。若不尿。腹滿加嘔者不治。

可下證血證附

大法秋宜下。

陽明病發熱不惡寒汗多者急下之。

凡脈沉細數爲熱在裏。又兼腹滿咽乾或口躁舌乾而渴者。或六七日不大便。小便自如。或目中瞼子不明。無外證者。或汗後脈沉實者。或下利三部脈皆平。心下堅者。或連發汗已不惡寒者。或已經下。其脈浮沉按之有力者。宜大承氣湯。

大黃半兩 厚朴壹兩 枳實一枚 朴消半兩

㕮咀以水四升先煮厚朴枳實至參升下大黃煮取壹升半去滓下朴消烊化每溫一盞服利即止後服如作糞散煎每服厚朴枳實末共參錢水兩盞煎壹盞絞去滓下朴消末壹錢烊化服之。

陽明與少陽合病而利脈不負者爲順也。負者失也。互相克爲負也。脈滑而數者有宿食當下之。宜大承氣湯。陽明利爲胃已固。若脈不弦爲土不負。強者爲土負必死。

脈雙弦而遲心下堅或脈大而緊者陽中有陰可下之病者煩熱汗出如瘡狀日晡則發潮熱者屬陽明其脈必實當下之而愈。

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎宜下之。傷寒若吐下後不解不大便五六日以上至十餘日日晡則發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則

不識人循衣妄撮常見有此最空候·故改之·惕而不安·微喘直視·脈弦者生·脈濶者死·微者但發熱譫語·可下之·一服利止後服

過經譫語者可下之·

病人不大便五六日·繞脅痛·煩躁·發作有時·此有燥屎·故不大便·可下之·以上並宜大承氣湯

太陽病未解·其脈陰陽俱停者·必先振慄·汗出而解·  
陽微者先汗之所解·陰實者先下之而解·下之宜大柴胡湯。

柴胡

珠研

黃芩

芍藥

各壹兩半

枳實

兩枚

生薑

貳兩

半夏

壹兩半

大棗

陸個

大黃

壹兩

㕮咀以水六升·煮取叁升·去滓再煎·每溫一盞服。

因下之後·潮熱而微利者·此醫以丸藥下之·非其治也·而有表證仍胸滿而嘔者·先服小柴胡湯·後服

大柴胡湯

小柴胡湯在和表證中

傷寒發熱·汗出不解·心中痞鞭·嘔吐下利者·大柴胡湯主之。

傷寒十餘日·結熱在裏·往來寒熱者·宜大柴胡湯。

陽明病譫語發熱·脈滑疾者·小承氣湯主之。

大黃

貳兩

厚朴

壹兩

枳實

兩枚

咬咀水貳升半煎至八合去滓放溫時飲一盞以利爲度凡大便祕悶恐有表證者但少少飲之微下爲度不可飲多恐大泄利也虛弱人可作煮散煎服  
太陽病若吐下發汗後微煩小便數大便難者與小承氣湯利之則愈此太陽陽明證也  
下利讝語者有燥屎也宜小承氣湯初一服讝詰止若更衣者停後服不爾盡與之古注漢書更衣之義集驗力再有更衣挺出頗妨於更衣更衣出清血故以知之

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯方在太陽證中

發汗後惡寒者虛也不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜調胃承氣湯  
傷寒十三日過經讐語者此有熱當以湯下之若小便利者大便當軟反下利而脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者爲內實也宜調胃承氣湯  
太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱勃微煩此時極吐下者與調胃承氣湯不爾可與之但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也屬調胃承氣湯  
傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯

茵陳湯治陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無汗剝頸而還小便不利渴而飲

水者以瘀熱在裏身必發黃。

茵陳蒿

九兩

大黃

三兩

梔子

貳拾個

大

㕮咀水二升半先煮茵陳至二升內二味煮取壹升去滓溫飲一盞日三服小便當利尿如

皂角沫一宿腹減黃從小便出

十棗湯治太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表和裏未和也。

芫花

甘遂

大戟

等分  
獨杵頭秤水合之  
入臼再杵二三百下

先以水壹升煮肥棗拾枚擘碎煮取半升去棗用煎湯少半調末一錢匕羸人半錢再單飲棗湯送之平旦服若下少而病不除明日加藥一錢半如前服之服之必利利後糜粥自養

欬而脇下痛此爲有飲宜十棗湯

調中湯治夏月及秋初忽有暴寒折於盛熱熱結四支則壯熱頭痛寒傷於胃下利或血或水或亦帶下壯熱且悶脈數宣下之久年腸風下之亦差

大黃

參分

葛根

黃芩

芍藥

桔梗

茯苓

蕤本

白朮

甘草

各半

咬咀水參升煎至貳升下大黃取壹升貳合去滓溫溫飲一盞移時勿爾食再服之得快下壯熱便歇其下利亦止凡秋夏早熱積日或有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃爲六府之表最易爲暴寒所折故也虛人亦不在壯熱但主利或霍亂不宜用此實人有服五石人喜壯熱與別藥下則加熱喜悶而死矣是以宜以此下和其胃氣調中湯又治陽病因下遂協熱利不止及傷寒不因成發兩煎服之殊勝也茵陳丸療瘴氣及黃病瘧疾

茵陳

梔子

鼈甲

芒消

大黃

豉半  
貳合

常山

杏仁

巴豆

半兩

半  
兩

半  
兩

各壹兩

半兩

貳兩

細末蜜丸梧桐子大初得時氣三日內平旦米飲服二丸如人行十里久或吐或利或汗出不爾更服一丸以熱粥投之老少以意加減丸數服若黃病瘧癬時氣傷食瘧疾小兒驚熱欲發癇服之無不瘥者療瘧神驗赤白痢服之亦效春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病有性殺寒利者非血證每眼

丸

七九五

抵蕪湯治太陽病六七日表證在脈微而沉反不結胸其人發狂者乃熱在下焦小腹當鞭滿小便反利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也小腹滿而小便不利者非血證

水蛭

蟲一枚

桃仁

一枚

大黃

半兩

哎咀以水貳升半煮至壹升貳合半去滓溫溫分四服未下再服虛人只可作半料服之如作煮散每五錢水壹蓋半煎壹蓋去滓服之

桃人承氣湯治太陽病不解熱結在膀胱其人如狂血自下者乃愈其外不解者尙未可攻當先隨證行湯解外外已解但小腹急結者乃可攻之不惡寒爲外解

桃人

大黃一錢半

甘草

桂枝

芒消

各一兩

哎咀以水參升半煎取壹升半去滓內芒消烊化溫服壹蓋虛人減作半料亦可作煮散每伍錢水壹蓋半煎至壹蓋去滓下芒消壹錢半烊化服之

桃人承氣湯又治產後惡露不下喘脹欲死服之十差十

龐曰脈朝夕馱者實辨也可下之朝平夕馱者非辨也不可下馱謂數脈六七至者也若脈數一息八九至憤不可下若下之則煩躁下利不止而死凡數脈與皮毛相得亦不可下也令下不下令病人腹脹滿通身浮腫而死

不可下證

脈軟而弱弱反在關關下三寸口瀉反在顴頭上三寸微反在上尺部瀉反在下也微則陽不足瀉則無血陽氣反微中風汗出而反煩躁瀉則無血厥而且寒宜建中湯方在汗證中不可

陽微不可下。下之則心下痞。

諸動氣在心腹上下左右俱不可下。

動氣在右不可下。下之則津液內竭。咽躁鼻乾。頭眩心悸。

宜竹葉湯。方有不可汗證中。

動氣在左不可下。下之則腹裏拘急不止。動氣反劇。身雖有熱。反欲勑。

先服乾薑甘草湯。方在太陽證中。後服建中湯。方在不可汗證中。

動氣在上不可下。下之則掌搘熱煩。身冷熱汗自泄。欲水自灌。

竹葉湯主之。方在不可汗證中。

動氣在下不可下。下之則腹滿。卒起頭眩。食則下清穀。心下痞堅。

半夏瀉心湯主之。方在痞中。

咽中閉塞不可下。

脈口諸脈滑弱微虛細相搏。俱不可下。

諸四逆不可下。虛家亦然。

脈口若下證悉具而見四逆者。是失下後。氣血不通使然。但手足微厥。掌心常溫。時復指稍溫便下之。不可拘忌也。

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻也。

脈口凡下證小便不利。或尙少。未可攻之也。

不當下而強下之。令病人腸胃洞泄不禁而死。

可水不可水證

龐曰、凡病非大渴不可與冷水。若小渴口咽乾，小小呷滋潤之。若大渴煩躁甚，能飲一斗者與五升，能飲一升者與半升。若乃不與則乾燥無由作汗，煩喘而死者多矣。但勿令足意飲也。若大汗將來，躁渴甚者，但足意飲之勿疑。常人見因渴飲水而得汗，見小渴遂強與之，致停飲心下，滿結喘而死者亦多矣。其有熱脈數，尚可作汗而解者，出於天幸也。

五苓散治病人水藥入口則吐，或渴而嘔者，或汗後脈尚浮而煩渴者，或下利渴而小便不利者，或因渴停水心下，短息者難治。嘔而小便不利者，皆主之。

豬苓

白朮

茯苓

桂枝

澤瀉各半兩

細末白飲調下貳錢。日參服數飲緩水，汗出效。

陽明病小便數者，大便即堅，不更衣，十日無所苦，欲得水但與之，當以法救渴者，五苓散主之。

霍亂頭痛發熱，身體疼，發熱欲飲水，五苓散主之。若得病無熱，但狂言煩躁不安，精采不與人相當，勿以火導之，但以豬苓散方寸匕服之，當逼飲新汲井水壹升，即令指刺喉中吐去之，病隨手愈。若不能吐者，勿強與水，水停則結心下也。當以藥吐之，不爾更致危病。若當吐不時，以豬苓散吐之，其死迨速矣。亦可針之尤佳。夫飲兩實難治，此皆三死一生也。太陽病發汗後，大汗出，胃中乾燥，煩不得眠，其人欲飲水者，

但與之當稍稍飲之令胃和則愈。

可吐不可吐證

龐曰、胸鬲痞悶、痰壅寒礙、脈得浮或滑、並宜瓜蒂散吐之。方在厥陰證中、產後六七日內下瀉、諸藥不効、得此脈與吐之瀉立止。

下利日數十行、其脈反遲、寸口微滑、吐之則止。

龐曰、虛家當吐而不敢吐之、宜以枳實散壓氣毒痰水過日毒入胃、乃可微下之也。

諸四逆脈微弱虛細、或弦遲、雖中滿悶不可吐、宜橘皮湯枳實散之類。橘皮湯在和表證中、枳實散在敍論中、

不可吐而強吐之、氣築心卽死矣。

可灸不可灸證

燒針令其汗、針處被寒、核起而赤者、必發貢豚氣從少腹上撞者、灸其核上一壯、與桂枝加桂湯。桂枝湯內加桂湯  
桂枝是成壹兩半分、如前法煎之。

少陰病其人吐利、手足不逆、反發熱不死、灸少陰七壯。  
下利手足厥無脈、灸之不緩、反微喘者死。  
傷寒脈促、手足厥逆、可灸之。

合灸不灸。令病人冷結。久而彌固。氣衝心而死。微數之脈。慎不可灸。因火爲邪。則爲煩逆。追虛逐實。血散脈中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。

脈浮當以汗解。而反灸之。邪無從去。因火而盛。病從腰以下必當重而痺。此爲火逆。若欲自解。當先煩煩。乃有汗。隨汗而解。何以知之。脈浮故以知汗出而解。脈浮熱甚而灸之。此爲實實以虛治。因火而動。咽躁必唾血。

不當灸而誤灸。令火邪入腹。干錯五藏。重加煩而死。

可火不可火證

下利穀道中痛。當以熬鹽末熨之。或炒枳實末溫熨。二味相兼益佳。若臍下冷結。不可便熨。冷氣攻心腹必死。須先用藥溫之。久而可熨。凡臍下冷結成關陰。大小便不通。服藥雖多。不見效。以炒鹽熨臍下。須臾即通。然開陰已服巴豆、甘遂、大黃、輕粉之類太多。卽暴通利而損人。尤宜詳之也。

可溫證

大法冬宜溫熱藥。

少陰病。其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脈弦遲。若鬲上有寒。飲乾嘔者。不可吐。宜四逆湯溫之。方在四逆  
證中。

下利其脈浮大此爲虛以強下之故也。設脈浮大因爾腹鳴宜當歸四逆湯溫之。方在四逆證中

火邪證

醫以火冰床下或烈身用火通印江以火熨之謂炎皆附火氣也。

傷寒脈浮醫以火迫切之亡陽爲此狂起臥不安者宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯。

桂枝

半兩

蜀漆

半兩

甘草

半兩

龍骨

一兩

牡蠣

半兩

生薑

半兩

大棗

四枚

以水隨升先煮蜀漆誠量升內諸藥煮取武升去滓溫服益無蜀漆以恆山代之火劫後脈浮當

汗出而愈。

火邪下之因燒針煩躁者桂枝甘草湯主之。

桂枝

半兩

甘草

半兩

牡蠣

各一兩

龍骨

各一兩

以水二升煮一升去滓溫取一盞可代救逆湯使之。

龜甲灸及燒針後證似火劫者並宜火劫治之煩躁驚反狂用六石風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯亦

通用。

病人因火劫至十五六日身黃下利狂欲走師脈之言當下清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脈陽浮而陰濡弱陽浮爲風濡弱爲虛浮虛受風少血發熱惡寒酒漸項強頭眩醫以火熏鬱令汗

出惡寒遂甚。客熱因火而發。怫鬱蒸於肌膚。口爲黃。小便微難。短氣。鼻中出血而復下之。胃無津液。利遂不止。熱瘀在膀胱。畜結成積。狀如豚肝。當下不下。心亂迷憤。狂走赴水。必不能自制。蓄血若去。目明心了。此皆醫所爲輕者得愈。極者不治。

# 傷寒總病論卷三

結胸證

陽毒證

狐惑證

癰濕喘證

發汗吐下後雜病證

傷寒勞復證

陰陽易證

結胸證

病發於陽而反下之。熱入內作結胸。其病心下堅滿。按之如石。鞭而痛。項強如柔猿狀。其脈寸口浮。關上尺中皆沉。或沉緊。名曰結胸也。下之則和。宜大陷胸湯。今作大承氣散  
煎之。

大黃

壹兩半

芒消

壹兩半

甘遂

末一錢

異木先以水壹升半煎大黃半升。絞去大黃滓。下消末更煮一二沸。內甘遂末和勻。溫分二服。一服快利止後服。如作羹散。即先以水一盞煎大黃末肆錢匕至捌分。下消末貳錢匕候化勻。下甘遂末

心下痞證

陰毒證

百合證

癰候

濕候

喘候

半錢匕沸勻溫服之移時未利再煎一服快利爲度。

藏結如結胸狀飲食如故時時下利寸口脈浮關上脈小細沉緊名曰藏結舌上白苔生者難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上苔滑不可攻也。

結胸證其脈尺寸浮大者不可下下之則死復宜發汗也

結胸證悉具煩躁甚者死。

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也。醫反下之動數變遲鬲內拒痛胃中空虛宿熱動鬲短氣煩躁心下懊憹陽氣內陷心下固鞕則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也。

結胸無大熱者此爲水結在胸脅也但頭微汗出者宜大陷胸湯。

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌躁而渴日晡則少有潮熱從心下至小腹滿而痛不可近者宜大陷胸湯。

虛弱家不耐大陷胸湯卽以大陷胸丸下之。

結胸者項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸。

大黃味甘

芩盤子味甘

朴消味甘

杏仁味甘

杵二味內杏仁、朴消合研如脂丸如彈子大。抄甘遂末壹錢。白蜜貳升。糲取壹升。溫頓服之。一宿乃下。不下更服。

小結胸正在心下。按之則痛。脈浮滑者。宜小陷胸湯。

半夏附錢半 黃連一分 桔梗壹錢。用

㕮咀水參升煮栝樓至貳升。下諸藥煮取壹升去滓。溫溫服一盞。食頃再服。一日盡劑。微解下黃涎即愈。

太陽病下之。脈促者不結胸。此爲欲解也。脈浮者必結胸。脈緊者必咽痛。脈弦者必兩臂拘急。脈細數者頭痛未止。脈沉緊者必欲嘔。脈沉滑者協熱而利。脈浮滑者必下血。

寒實結胸無熱證者。與三物白散方。小陷胸者非也。

桔梗奏分 巴豆壹分 貝母參分

細末內巴豆研勻。白飲調下壹錢。羸人減之。病在鬲上必吐。在鬲下必利。未利啜熱粥投之。利過不止。飲冷粥止之。

龜曰。近世治結胸多行針頭。丸用硫黃陽起石者。若病熱毒甚者必死。唯治冷結寒實耳。

心下痞證

病發於陰而反下之爲痞。發熱惡寒爲溫。誤下則爲結胸。無傷寒下之後。若發熱汗出者爲欲解。若心下滿而鞭痛者。此爲結胸也。但滿而不痛。此爲痞氣。宜半夏瀉心湯。

甘草

黃芩

乾薑

人參各壹兩半

黃連半兩

大棗陸枚

半夏壹兩壹分

溫。兼通心氣。又甘草力大。故乾薑黃連不能相惡也。

心下痞。按之濡。其脈關上浮者。宜大黃黃連瀉心湯。

大黃壹兩

黃連

黃芩各半兩

咬咀。以鰻眼沸湯壹升濱之。須臾絞去滓。溫溫分四服。得利止後服。寒濕迫心氣不行。初作熱也。

心下痞悶。而復惡寒。汗出者。大黃黃連瀉心湯內加附子主之。附子壹枚。炮。去皮尖。四破。以水參合煎。服之。與瀉心湯而痞不解。其人渴而口乾燥。小便不利者。五苓散主之。方在可水論中。

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞭。乾噫食臭。脅下有水氣。腹中雷鳴。下利。宜生薑瀉心湯。

生薑試兩

人參

甘草

黃芩各壹兩半

半夏壹兩壹分

大棗陸枚

黃連

乾薑各半兩

咬咀水五升，煮取叁升去滓，再煎取壹升半，溫作四服。

胃中不和，爲少陽木氣所制，故用二薑之辛味，

傷寒中風，醫反下之，其人下利日數十行，穀不化，腹中雷鳴，心下痞鞕而滿，乾嘔心煩不得安。醫見心下痞，謂病不盡，復下之，其痞益甚。此非結熱，但以胃中虛，客氣上逆，故使鞕也。甘草瀉心湯主之。

甘草

貳兩

黃芩

乾薑

人參

各半兩

半夏

壹兩壹分

大棗

陸枚

黃連

半兩

咬咀水伍升，煎至叁升去滓，再煎取壹升半，溫作四服。

胃虛故加甘味。

大下後復發汗，心下痞，惡寒者，表未解，不可攻痞。當先解表，表解乃可攻痞。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

附子，是汗出多而惡寒，表將解而裏結未除，故也。此證是發後無汗惡寒，故先須解表也。

傷寒發熱，汗出不解，心下痞鞕，吐嘔下利者，大柴胡湯主之。

汗出嘔吐下利，是胃中津液燥，裏有寒實，非胃虛也，故以大柴胡湯下之。

病人脅下素有痞，連臍傍引小腹入陰筋者，此爲藏結死。

陽毒證

初得病一二日，便成陽毒。或服藥吐下後，變成陽毒。其病腰背痛，煩悶不安，狂言欲走，或見鬼，或下利，其

脈浮大而數，面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，吐下膿血，五日可治，七日不可治。升麻湯主之。

不可作葛根

升麻

當歸

甘草

各貳分

雄黃

研一臺

桂枝 壹分

鼈甲 半兩

蜀椒 半分

咬咀水武升煎壹升去滓溫服一盞食頃再服溫覆手足出汗汗出則解未解重作之得吐尤佳。

陽毒宜葛根龍膽湯

方在雜發  
汗證中

陰毒證

初得病一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心堅強氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而緊仲景云陰毒之候如被杖喉咽痛五六日可治七日不可治甘草湯主之

不可作  
資散

甘草

鼈甲

升麻

當歸

桂枝

各貳

蜀椒 壹分

雄黃 壹分

咬咀水參升煎取壹升去滓溫溫每飲一盞食頃再服溫覆中毒當汗吐之汗吐則愈不吐再服之。

治陰毒反陰丹

硫黃 伍兩

太陰玄精石

味酸者  
研末

硝石 研末各

用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間下硫黃又以硝石蓋硫黃都以玄精石蓋之用蓋子合定令三斤炭火燒令得所勿以煙出多急取出以瓦盆令定地下四面灰掩勿令煙出直候冷

取細研。蒸餅心丸豌豆大。艾湯下十五丸。病重加至二三十九。此法甚驗。喘促吐逆者入口便安。服此藥三五服覺不退。便於臍下一寸半灸之。須是大炷百壯。未愈可至二百壯。若手足極冷。小便澀。小腹繃。疼痛囊縮。則須更於臍下四寸。如前灸之。乃與當歸四逆并反陰丹。頻頻與服。內外通逐方可解。若稍緩即死矣。當歸四逆乃加吳茱萸生薑者。是慎勿與。尋常利小便藥。此是陰毒氣結在小腹所致也。有見小便不通。使用炒鹽及裏熱藥熨臍下。欲望小便通利。其冷氣在小腹之間。被熱物所熨。無處通出。即奔上衝心。其死速矣。

### 又治陰毒硫黃丸

硫黃 一兩

水銀 一兩

同研入銚。洒少醋。慢火炒。欲似煙出。再用火酒潤。如此三四遍。地上放冷研之。蒸餅丸梧桐子大。每服二十三十九。艾湯吞下。日三服。食前。

陰毒脈沉微欲絕。四肢逆冷。大躁而渴不止。附子飲子。

附子 去皮尖。四破。

以水九升。煎至三升。去附子入瓶。油單緊封。沉井底。候極冷取飲之。仍下硫黃丸甚妙。

陰毒之爲病。因汗下藥性冷所變。多在四五日也。或素來陽氣虛冷。始得病便成陰毒。或始因傷風傷冷。

物便成陰毒。其病六日內可治。過六日不可治。

狐惑證

狐惑之爲狀如傷寒。或因傷寒變成斯疾。其候默默欲眠。目不得閉。臥起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面乍黑乍白。上部則聲啞。甘草瀉心湯主之。方在瘡證中。主下部則咽乾。蝕於肛門者燒雄黃煎之。雄黃生黃苔味。下部病者脈數則熱微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日則兩目四眴周皆黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。赤小豆生芽曝乾。當歸。桑白皮各兩。

細末漿水調下二錢。日三服。

百合證

龐曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病。意欲食復不能食。常默默欲臥復不能臥。欲出行復不能行。或有美食時。或惡聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則增劇吐利者。如有神祟者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或二十日或一月微見者。隨證治之。

治汗後百合病。百合知母湯。

百合 捺枚

知母 生  
半  
兩

百合先洗漬一宿。當白沫出去其漬水。別以清泉水壹升半煮百合。取壹升去滓。又別以泉水壹升煮知母。取半升去滓。同百合湯煎至壹升。溫分三服。

消下後百合病滑石代赭湯

百合拾枚 滑石壹兩 代赭半兩

先以水漬百合一宿。當白沫出則去其水。更以泉水壹升半煮取一升去滓。別以泉水一升煮滑石代赭。取半升去滓。合和重煎至一升。分溫三四服。

治吐後百合病百合雞子湯

百合拾枚 雞子黃一枚

先以水洗百合。漬一宿。當白沫出去其水。更以泉水一升煮取一升去滓。下雞子黃。攪勻分溫三服。治不經吐下發汗百合病。形如初者。百合地黃湯。

百合拾枚 地黃汁半升

先以百合水漬一宿。有白沫出去其水。更以泉水一升半煮取一升去滓。內地黃汁再煮取一升二合。溫溫分三服。中病勿更服。

治百合病一月不解。變成渴者。百合湯洗之。

百合一升，如蘆洗，先瀉一宿  
當自脫出，去其水。

更以水一斗煎數沸，洗周身，慎風，仍食白湯餅，但勿與鹽豉也。煮餅是切麵條湯，煮水淘過，熱湯潑食之。

渴不差，栝樓牡蠣散主之。

栝樓無黃脈者 · 牡蠣粉 · 等分

細末，水調方寸匕，日三服。

治百合病變發熱，百合滑石散。

百合心兩參兩 · 滑石參兩

細末，水調方寸匕，日三服。當微利，熱則除，已利勿服之。

百合病見於陰者，以陽法救之；見於陽者，以陰法救之。見陽攻陰，復發其汗，此爲逆。見陰攻陽，乃復下之。此亦爲逆。

癰濕喝證

傷寒所至，太陽病癰濕喝，此三種宜應別論。以爲傷寒相似，故此見之。

太陽病發熱無汗。反不惡寒。名曰剛瘧。

太陽病微熱汗出。不惡寒。名曰柔瘧。

病源云。  
恐寒。

其證身熱足寒。頭強項急。惡寒時頭熱。目赤目脈赤。獨頭搖。卒口噤。背反張者。瘧病。

太陽病發汗太過。因致瘧。

著問曰。太陽所至。爲長汗塗。又云。肺然移於腎。傳爲柔瘧。始太陽中風。發熱而故道

汗大少。因而恐寒。汗反爲冷溫。

之氣復齊。太陽經。故經瘧也。

瘧病臥不着席。小兒腰背去席二指。大人側掌爲難。治瘧病脈弦。直上下行。

仲景云。太陽病證其身熱几几然。脈反沉遲者。爲欲作瘧。宜桂枝加栝樓湯。

栝樓不主中風。強項几几。其益

內苦加桔梗。汗內加桂枝湯。桂枝湯內加

桂枝。

柔瘧宜葛根麻黃湯。

葛根四兩。

方在解表。

剛柔瘧加減葛根麻黃湯。

葛根

麻黃

生葛

各一錢。

防風

芍藥

白朮

人參

芎藭

黃芩

防己

桂枝 半夏 各半  
甘草 桔梗

附子 心枚

咬咀水六升先煎麻黃葛根數沸去上沫內諸藥煮取二升去滓飲服一盞食頃再服日四五夜二三柔痉自汗者去麻黃加葛根成壹兩半  
剛硬胸滿口噤臥不着席脚攀急其人必齦齒宜大承氣湯下之方在可下門中

濕證

太陽病關節疼痛而煩脈沉緩濕搏二候其人小便不利大便反快只當利其小便宜五苓散方在水證中

濕家之爲病一身疼發熱身如熏黃仍治風濕脈浮身汗出惡風宜黃耆湯

黃耆

武兩半

防已 武兩半

甘草 壓兩半

白朮

生薑

各壹兩半

棗 拾陸個

咬咀水四升煎至二升去滓溫飲一盞食久再服喘者加麻黃壹兩半胃中不和者加芍藥壹兩半氣上衝者加桂枝壹兩半下有陳寒者加細辛壹兩服後當如蟲行皮中從腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰以下令微汗出

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘯胸滿小便不利舌上如胎者此丹田有熱胸上有寒渴欲得水而不能飲口燥故也

濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止汗出已解身復痛何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈也若治風濕者發其汗但微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面更而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞細末瓜蒂含水半許鼻中則愈

濕家身煩痛可與麻黃湯內加白朮二兩

麻黃湯在可汗證中

病者一身盡疼發熱日晡則劇者此名風濕此病因傷於汗出當風或久傷於冷所致也可與杏仁薏苡湯

麻黃半兩

杏仁一枚

薏苡仁

甘草半兩

㕮咀以水二升

先煮麻黃二十沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫二三服

傷寒八九日風濕相搏身體煩痛不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濫者宜桂枝附子湯此治大便自利小便不利者

桂枝二兩

附子一枚

生薑半兩

大棗一枚

甘草半兩

㕮咀以水三升

煮取一升去滓分溫四服若大便堅小便自利者去桂枝加白朮二兩煎如前法初

一二服身如痺。半日許服之都盡。其人如冒狀勿怪。此乃尤附并走皮膚。逐水氣未得除。故使之耳。風濕相搏。骨節疼痛。掣痛不得屈伸。近之則極。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去被。或有微腫者。甘草附子湯主之。

附子 武兩

白虎 武兩

桂枝 參兩

甘草 武兩

㕮咀水三升。煮取一升。去滓分溫三服。身腫者加防己武兩。悸氣小便不利加茯苓壹兩半。溢水成四升。煎一升三分合。

喝證

太陽中熱者。暎是也。其人汗出惡寒。身熱而渴。白虎湯加人參主之。方在厥陰證中。

太陽中暎者。身熱疹重而脈微。此夏月傷冷水。水行皮中所致也。瓜蒂湯主之。

瓜蒂 試拾味

水半升煮取二合半。去滓溫服。

太陽中暎。發熱惡寒。身重而疼痛。其脈弦而細。芤而遲。小便已洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身卽熱。口前開板齒燥。若發其汗。則惡寒甚。加溫針。則反熱甚。下之則淋甚。宜大小橘皮湯。大橘皮湯在不汗證中。小橘皮湯。爭主。

橘皮  
• 二兩

生薑  
• 三兩

咬咀水三升煮取一升半去滓作四服稍熱呷之。

發汗吐下後雜病證

病人脈微而濡此乃醫所病大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其體所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃氣虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中躁熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濡故知亡血也。此皆可治陽微惡寒四逆陰弱勞熱爲內熱病宜苦酒艾之類

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈。

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚伏苓桂枝湯主之。

茯苓  
• 二兩

桂枝  
• 二兩

甘草  
• 二兩

大棗  
• 捋個

咬咀以廿爛水五升先煮茯苓減一升內下諸藥煮取一升半溫溫作三服。

作廿爛水法

取水忒升置大盆中以楊柏枝擗水上。有珠子五六千箇相逐取用之。

發汗或下後痞滿或成寒實結胸氣塞不通宜楂榔散。

檳榔 或個一粒

細末酒二盞煎二盞四分作兩服溫飲之兼治蛇厥心腹刺痛。南海本草治膀胱氣佳。鹿丹因發汗時汗出如水漏下還復汗少喘促不止脈促而按之濡者合當汗而解脈促而按之實者死。若脈浮手足微厥面垢脣青計憤而喘者陰陽未和尚阻升降宜服順陰陽五味子湯。

麻黃 半兩

人參

五味子

麥門冬

杏仁

橘皮

生薑 各一分

棗 一枚

㕮咀水二升煮七分去滓通口服一盞未差再作二三服手足厥甚者厚衣護其厥。

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者宜乾薑附子湯不可作  
葛根附子湯

乾薑 壹兩

附子 壹枚生

㕮咀水一升半煎至半升時飲一小盞食久再服。

傷寒若吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者宜茯苓白朮湯。

茯苓 貳兩

桂枝 半兩

白朮 廿兩

甘草 各壹兩

㕮咀水三升煮至一升半去滓分溫四服。

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛倒心中悶懨音鼓槌子湯主之少氣者加甘草嘔者加生薑。

梔子香豉湯

肥梔子 一枚

香豉 兩

水二升，煎梔子至一升三合，下豉取七合半，去滓，每進一盞，待吐止後服。  
梔子甘草湯，前湯內加甘草一兩，同梔子煮，後下豉，同前法，加水半升。  
梔子生薑湯，前方內加生薑二兩半，同梔子煮，後下豉，同前法，加水半升。  
傷寒五六日，大下之後，身熱不去，心中結痛者，欲解也，屬梔子香豉湯主之。  
下後腹煩滿，起臥不安者，梔子厚朴湯主之。

梔子 八個

厚朴 二兩

枳實 一枚

咬咀，水二升煮一升，去滓，溫飲一盞。

傷寒醫以丸藥下之，身熱不去，微煩，梔子乾薑湯主之。

肥梔子 八個

乾薑 一兩

以水一升七合，煮取八合，去滓，分溫三服。

凡用梔子湯得効，卽止後服。病人舊有微溏，不可與之。  
發汗若下之而煩熱，胸中窒塞者，梔子湯主之。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。煩者。此表未解。柴胡桂枝乾薑湯主之。

桂枝 黃芩各壹兩半 柴胡肆兩 桤樓根貳兩  
乾薑 甘草各壹兩半 牡蠣各壹兩半

㕮咀。水六升煎至三升。去滓。再煎一升半。溫溫時飲一盞。食頃再服。

傷寒發汗。若吐下解後。心下痞鞕。噫氣不除者。旋復花代赭湯主之。

旋復花 甘草各壹兩半 人參壹兩 生薑貳兩半

代赭水半兩 聚三枚 半夏壹兩半

㕮咀。水五升煎三升。去滓。再煎取一升半。溫分四服。

傷寒若吐下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴舌上乾燥而煩。飲水至數升者。白虎加人參主之。方在厥陰證中。

傷寒八九日。下之胸滿煩驚。小便不利。讝語身重。不可轉側者。柴胡龍骨牡蠣湯主之。

柴胡貳兩半 龍骨 黃芩 生薑 銻丹

人參

桂枝

伏苓

牡蠣各叁

半夏壹合

大黃 壹兩  
桂枝 二兩

棗 四個

咬咀水六升煎取三升下大黃切如葵子塊更煎取貳升去滓溫飲一盞。

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中治中焦此利在下焦以赤石脂禹餘糧湯主之復不止當以五苓散利小便五苓散方在可水證中

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧各八兩

水四升煮取二升去滓溫飲一盞。

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之。

桂枝 二兩 甘草 各二兩 白朮 一兩 人參 半兩 乾薑 各壹兩

咬咀水五升先煮四味取三升內桂更煮取一升去滓溫分三服。

發汗後腹脹滿者厚朴人參湯主之。

厚朴 四兩 甘草 壹兩 生薑 四兩 半夏 壹兩 人參 半兩

以水五升煮取一升半去滓溫分三服。

治頭痛壯熱心中煩黃芩梔子湯。

黃芩

梔子

石膏

乾葛

各兩

豉半兩

葱白

半斤

石膏

兩

咬咀水四升煮取一升半溫溫作三四服始得病便如前證亦可服治夏月傷暑毒殊驗。傷寒發汗後或未發汗頭痛如破宜葱白湯。

連鬚葱白寸切半斤

生薑二兩

水二升煮一升去滓溫溫作二三服。

服前湯頭痛未解宜葛根葱白湯。

葛根一兩

芍藥

芎藭

知母各半兩

葱白寸切

生薑一兩

咬咀水二升半煮取一升去滓溫溫分減服。

傷寒頭痛立効荆芥散

天南星

草烏頭

肉白者生用

荆芥穗各半兩

石膏一兩

細末每服二錢半陳茶一錢薑汁半呷薄荷三葉水兩盞煎至八分溫溫相次三服。

傷寒嘔吐不止惡寒脈細或浮遲宜理中丸兼治霍亂吐利及傷寒後發熱水停喜睡者。

人參

乾薑

甘草

白朮

各一兩

細末蜜丸雞子黃大。每服一丸。百沸湯一盞。化令細煎三五沸。溫服之。霍亂臍上築者不宜朮。可作湯去朮。加桂一兩半。水三升。煎取八合。稍熱服之。吐甚去朮。加生薑一兩半。作湯煎如前法。飲熱粥一椀。微溫覆之。勿發揭衣被。有寒腹滿痛。或四肢拘急。或下利轉筋。加生附子二枚。作湯服之。

治傷寒嘔吐欲死。生薑半夏湯。

半夏

半兩

生薑

各一兩

水三升半煮一升。去滓。溫溫分四服。

治嘔吐發熱。脈滑數或洪者。茅根湯。

茅根

半升

麥門冬

或合半兩

半夏

一兩

人參

半兩

伏苓

半兩

生薑

或兩

㕮咀。水五升。煎一升半。去滓。溫溫分減服。

霍亂腹痛發熱。身疼多飲水者。宜五苓散。方在水證中。

傷寒發熱自利。脈浮大數。及鼻血或嘔者。宜黃芩芍藥湯。

黃芩

一兩

芍藥

各一兩

甘草

各半兩

咬咀水五升煮取一升半去滓分四服。嘔者加半夏一兩一分生薑一兩半煎服。  
治傷寒熱痢或兼腹痛黃連當歸丸。

黃連

當歸

各二兩

乾薑

赤石脂

各一兩

細末蜜丸梧桐子大米飲吞下二十九日三夜二服。

傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之雍白梔子湯。

豉

半升  
梔子

雍白

一錢  
梔子

肥梔子

大者  
七個

水三升半先煮梔子十沸下雍白煎至二升去滓一升半溫溫分減服必解下惡積。

傷寒汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥伸吟錯誤不得臥此藥解熱毒除酷熱不必飲酒劇者療五日  
中神効黃連黃蘖湯。

黃連

半錢兩

黃芩

一錢

黃蘖

各一兩

肥梔子

拾貳個

咬咀水三升煎一升二合去滓溫溫分減服未差更作。

傷寒四日而大下熱利時作白通諸藥多不得止四順湯熱白通湯苦溫除熱止利莫若黃連熟艾湯。

黃連

黃蘖

各半錢兩

龍骨

一錢兩

熟艾

大根子

咬咀水四升煮一升二合去滓分減溫服。

龜曰。凡冷利皆宜四逆。冷利臍下必寒。水穀黃白色或青黑也。熱利臍下必熱。利黃赤色也。天行熱毒。下利赤白。久下膿血及下部毒氣。當下細蟲如布絲縷大。或長四五寸。黑頭銳尾。宜麝香丸。

麝香壹錢附子 雄黃 丹砂 乾薑 巴豆各貳分

搗下篩訖。煉蜜和丸。小豆大。米飲下二丸。未知增之。

此方本無巴豆。是古方脫去。服之不効。今增巴豆。試之甚驗。

傷寒後咳嗽。肉豆蔻湯。

肉豆蔻壹個 石蓮肉炒 茴香各壹分 丁香半分

生薑 人參各貳分 枇杷葉伍片。拭去毛。炙。

㕮咀。水三升煎至一升半。分四服。空心緩飲之。

龜曰。傷寒汗後。咳嗽不止。是陰陽氣升降欲作汗。升之不上。降之不下。故胃氣上逆而咳嗽無休止者。宜良薑方。

橘皮 良薑 桂枝 當歸各壹分 麻黃半兩

楂榔叁個 杏仁貳拾個 甘草壹分 生薑壹分 大棗拾個

㕮咀。水二升半煎至一升。去滓。下楂榔末。又煎三沸。去滓。通口服一盞。未已再一劑。

時行頭痛。心如醉狀。面愛向黑處。不欲見人。此爲壞熱不散。速行大青湯與服。不爾。狂走。趕人大青湯。

大青葉

秦艽

吳藍

升麻

薺草

桔梗根

各貳分

甘菊

壹分

石膏

參分

竹瀝

貳合

朴消

三分

咬咀分二貼，每服一貼，水二升半，煎至一升二合，去滓，下竹瀝，朴消分溫四服。肉色黃加茵陳六分，面似火加梔子十四枚，加水成三升，煮取一升半，溫飲一盞。

七八日熱盛不解，苦芩藤湯。

苦酒

壹升

苦芩藤

壹合

生艾汁

半升

同煎至七合作二服。此療內熱病，有牛黃一刀圭尤良。阮河南曰：今諸療疾，多用辛甜，蓋桂人參之屬，此皆貴價難得，常有必欲求之轉以失時。而苦參青葙苦芩藤子艾之屬，所在盡有之，除熱解毒，最勝向貴價藥也。前後數參並用之，得病內熱者不必按常藥次也。便以青葙苦參艾苦酒療之，但少促其開耳，無不解者。苦酒即米醋也。

龜曰：辛甜薑桂人參之屬，是發散寒氣之藥，其病未傳成內熱者，爲調治之大要藥也，決不可慮其酸苦之藥，正治內熱病急要之藥也。設當行辛甘而用酸苦，設當行酸苦而用辛甘，是昧於陰陽之用，如此醫殺之耳。其辛甘酸苦，自是調治通行之要藥，若論苦則忌甘，論甘則忌苦，雖有屢中，誠爲粗工矣。傷寒發黃者，先用瓜蒂末內鼻中，口含水搐鼻中，去黃水用五苓散最良。

時行一切。不知身上疼痛。不寒亦不熱。沉沉似有所思。順事多語。此藏正傳熱。麻人龍膽丸服此藥不死。  
大麻人      大黃各壹兩      柴胡      黃芩      白鮮皮  
秦艽      赤芍藥      龍膽草各貳分      黃連壹分      桔子肆貳拾個  
細末蜜丸如梧桐子大。食後煎淡竹葉湯下三十九日與三服。以大利爲度。十日小差。壹月平復。  
地黃湯療傷寒及溫病。應發汗而不與發汗。五內有瘀血者。及鼻衄吐血不盡。內熱瘀血。面黃大便黑者。  
此方主之。消化瘀血甚良。

生濕地黃肆兩      牡丹皮      芍無以升麻代      藥犀角屑各半兩  
咬咀水貳升煮取壹升去滓。溫溫飲一盞。喜忘如狂者。加地黃黃芩各三分。加水一升。脈大來遲。腹  
不滿自言滿者爲無熱。不用黃芩也。  
鼻衄或吐血。下血黃芩湯。

黃芩肆兩

咬咀水三升煮一升半。溫飲一盞。兼治婦人漏下血不止。黃棗更佳

吐血百治不差。此方療十差十。大黃散。

地黃汁半升      生大黃末壹方寸

煎地黃汁三沸。下大黃末調勻。空腹服之。每溫飲一小盞。日三服。血即止。  
熱病毒氣入眼。赤痛生翳。不見光明者。大黃梔子湯。

生大黃各兩 升麻半兩 罂麥 甘草各壹分

梔子柒個

咬咀水二升煎至一升去滓。溫作四服。以利爲度。難利者。煎藥畢。下朴消二分和服。先煮諸藥至一升半。乃下大黃。大黃先以水濬。相水下之。則折熱易利。

治毒病入眼。忽生赤翳。或白或腫。腐起或赤痛。不得視光明。入心肝或眼浮腫。如吹汁出。生膜覆珠子。或內障不見物。良由病後不慎。酒麯炙燙五辛所致。宜服此類利之秦皮大黃湯。

秦皮 柴胡 常山 黃芩 升麻

芍藥 白斂 枳實 甘草各半兩

大黃叁分

咬咀水三升煮。武升下大黃再煎一升半去滓。食後溫飲一盞。熱盛者加焰消半兩。湯成後下化匀。服未差更作。可至五七劑。

又方滴眼湯斑豆瘡不宜用。

秦皮 升麻 黃連各半兩

細剉水二升煎至一升。綿包筋頭搘湯。滴入眼中。頻頻用之。

下部臘瘡雄黃散

雄黃 青葙子 苦參 黃連 各分 桃仁 壓分

爲散。以艾汁和丸。棗核大。綿包內下部薦滿。更佳。冬月無艾。濃煎艾汁和爲丸。更以米飲調下。貳錢。溫飲之。日二服。

治臘瘡青黛丸

青黛 丁香 黃連 各分

細末。甘淀和丸。棗核大。口中含之。咽汁。若下部有瘡。含化五六十九差。

牽馬丸治天行四五日下部生瘡。醫所不能治。此方主之。

附子 各分 藜蘆 桂枝 巴豆 各半兩去皮心炒黑

細末。別研巴豆。加蜜杵丸。梧桐子大。空心熱水下二丸。未知加三丸。熱在鬲上不下。飲熱湯半升。投吐之下部瘡自差。神良。

天行口瘡黃藥升麻湯

黃藥 升麻 甘草 生一兩。各

咬咀。水一升半。煮半升。入地黃汁一合。煎半升。分二服。細呷之。

又方薔薇飲子

薔薇莖葉切一升冬用根皮

水三升煮半升溫溫漬之去涎喉咽有瘡者嚥汁少許爲佳。

又方黃蘆飲子

黃蘆薄切小片蜜漬一宿嚼蘆汁潰瘍、

又方五倍子散

五倍子炒爲末傅之涎出吐去以差爲度。

傷寒喉中痛閉塞不通射干煎。

生射干 豬脂各半斤

合煎令射干色微焦去滓取壹叢大綿裹含稍稍嚥之。

治喉咽痛寒鵝砂散。

鵝砂 犀蠶 牙消 白礬 甘草

雄黃各壹分

硝砂半分 草烏頭尖肆角

細末米飲調一錢細細呷之。

古方黑龍煎治咽喉腫痛九種疾。

人參半兩

甘草壹兩

無灰酒壹升

不艸皂角肆拾條

水三升浸皂角一宿淨鎬內煎令水減半次下人參甘草細切又同煎三分耗二布絞去滓下酒更入釜煤一七半攪煎如鵝稀入瓷合內埋地中一宿若用時取一丸如雞頭大蓋中以溫酒一呷化之先以水漱口以鵝毛點藥入喉中掃之有惡涎或自出或下腹可兩三度引藥方歇良久令吐候惡物出盡了令喫少許水浸蒸餅及軟飯粥壓之次含甘草一寸嚥汁忌炙燙胡餅豬肉淹藏等物如木舌難下藥以匙接舌用藥掃喉中

九般名

急喉閉  
癰喉風  
結喉  
爛喉  
重舌

木舌  
遁蟲  
艸踝  
飛系入喉

元祐五年自春至夏秋蘄黃二郡人患急喉閉十死八九速者半日一日而死黃州潘推官昌言親族中亦死數口後得黑龍膏救活者數十人

龜曰急切亦不候合此膏用古方以意處之但得不艸皂角一兩條搘碎水三升半浸少時揉汁去滓下草一分人參一分同煎作稀膏勿令太稠乃下後藥

霜梅上白鹽 硼砂 焰消

各等分

三味生研用前膏斟酌和勻可以捕得爲度每以鵝毛搘少許如前法掃喉中甚効其將息次第亦如前法此膏得力尤速若日久膏乾以甘草水化之病差後胸喉外生瘡勿疑無鹽梅以白鹽代天行手足腫痛欲脫者濃煎虎杖汁漬之

天行後毒氣手足腫痛欲脫必作癰膿升麻大黃湯

升麻

木通

白斂

黃芩

芍藥

甘草

大黃

分

各等分

㕮咀水盞升煮二升半下大黃煮一升半溫溫飲一盞利下爲度

傷寒勞復證

病新差後氣血津液衰耗慎勿爲諸勞動事凡言語思慮勞神梳沐澡類勞力則生熱而復病如初也又新差後精髓枯燥切不可爲房事犯房事勞復必死魏晉鄧願子獻病差後華敷囑之慎勿爲勞事餘勞尚可女勞卽死此是女勞復非陰陽易也素問云病熱而有所遺者是新差後腸胃尙弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差強人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

天行勞復頭痛四肢疼葱豉湯

葱白  
豉 半升

水二升半煎葱爛去滓入雄鼠屎三七枚末之和匀分再服未差更作

天行勞復作熱且至晚則腰背痛頭項強重葛根薑豉湯

芍藥  
生薑 各一兩  
豉  
葱白 各二合  
葛根 二兩

㕮咀水三升煎二升下豉煎一升半去滓溫飲一盞

大病差後勞復枳實梔子湯

枳實 壹分  
肥梔子 拾貳個  
香豉 半升

漿水三升煮枳實梔至二升下豉煮一升半去滓溫飲一盞溫覆微汗食復者加大黃茱子大七枚同煎服之愈

療傷寒已差勞復如初脈浮無汗者桂枝梔子湯

自汗者去麻黃  
梔子 拾貳個  
豉 半升  
桂枝  
麻黃 各壹兩

㕮咀水三升煎至二升下豉取一升半去滓溫飲一盞溫覆取小汗差

療傷寒勞復如初自汗出者脈浮滑煩躁甚宜此方

梔子石膏香豉湯

梔子 拾陸個 石膏 肆兩 香豉 壹兩

水三升先煮二味至二升半下豉煮取一升半去滓溫飲一盞一法湯成入雄鼠矢二七枚末良

病未平復後勞動致熱氣攻胸手足拘急搐搦如中風狀瓜蔞湯

瓜蔞根 肆兩無黃膿者 淡竹茹 半斤

水三升煮一升二合去滓日二三服溫與之

婦人病未平復因夫所動小腹篋中急痛腰胯疼四肢不任舉動無熱證者附子黃耆湯

白朮 各半兩 黃耆 壹分 生薑 壹兩

附子

甘草

芍藥

哎咀水四升煮至一升半去滓通口服一盞食久再服溫覆取小汗

男子勞房成復病鼠屎湯

薤根 壹升 細鼠屎 貳拾壹個爲末矢頭尖硬者是即牡鼠也

水三升半煮薤根至一升半去滓下鼠矢末再煎三沸溫飲一盞相次三服衣覆必有黏汗爲効未汗再作一劑兼治陰陽易神驗

男子房勞復發熱口噤臨死舌出數寸又始得病百節痛如被打渾身沉重恍惚失措脈促而絕不可治

或有吐涎不止。或有譫妄煩亂者。皆不可治。

大行差後。分復發熱。嘔吐食不下。蘆根湯。

蘆根

半升

生薑

威兩

橘皮

枇杷葉

各一錢

㕮咀水三升煮一升半去滓溫飲一盞。大故心煩躁加石膏貳兩。加水一升煮二升。

### 陰陽易證

陰陽易病者。陰陽相感動。其毒氣着人如換易也。男子病新差。女子與之交。女子得病名曰陽易。女子病新差。男子與之交。男子得病名曰陰易。若二男二女則不相易。然女犯男得病鮮有死者。男犯女得病救稍緩。則十無一人得生者。若女犯男。男自發勞復。則女不病。男犯女。女自發勞復。則男得病亦輕。富貴之家。雖知其事。後生輕於自恣。犯之多致不救。田野之人。蒙昧只知傷寒能死人。因此病死者十有三四矣。皆不知其所犯之由深可傷也。男子女人陰陽易病。其狀身體疼痛。熱上衝胸。頭重不能舉。眼內生眵。四肢拘急。小腹絞痛。手足拳則皆死。其亦有不即死者。若小腹裏急。熱上衝胸。頭重不欲舉。百節解離。經脈緩弱。血氣虛骨髓竭。便吸吸氣力轉少。着牀不得動。起止仰人引。歲月死。宜此方。足甲棍灰散。

取交接婦人手足甲二十枚。棍近隱處一尺同燒灰燒。或米飲調下二錢。日三服。陰頭微腫。小便利爲愈。若未愈。灸陰頭一百壯便差。陰頭在毛際間。提陰向上。當頭是穴。

女子陽易則取男子手足爪甲根近隱處。如前燒服之。可灸毛際橫空上。中央曲骨。一穴百壯。  
男子陰易如前法灸。若陰卵縮未下。灸足大拇指旋毛上。小炷七壯。是大敦二穴。男女初得陰陽易  
病。便服薤根鼠矢湯。出汗有驗。

傷寒口乾喜睡方

大棗肆拾枚。黃去皮尖。 烏梅肥者拾個。去核爲末。

右以棗肉和爲丸。含化自然汁。

