

醫方類聚卷之二百五十五

小兒門 十七

諸疳 三

御藥院方

史君子丸治小兒五疳或抓頭揉目或頭焦筋青下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦並皆治之

史君子 南北經方大成集成 丁香

木香 厚朴 姜製 南北經方大成集成 沒食子 蒼胡黃



連肉豆蔻已上各壹錢○集蘆薈○麝

香研各壹錢○  
成各一兩

右件為細末粟米餅為丸如黍米大每服壹十五丸大成集成經驗方米飲湯送下食前

得效方

諸疔

大安神圓治心疔面黃臉赤煩滿壯熱心燥

口瘡虛驚方見驚癇

益黃散治脾疔體黃肚大愛喫泥土脹滿氣

疔痢下酸臭方見

五疔化毒丹治熱疔肌肉黃瘦雀目夜不見

物陳粟米飲化下方見

銅青散治走馬疔口內生瘡牙根潰爛齒黑欲脫或出血臭氣丈夫婦人同

川白芷生馬牙硝錢一銅青分一麝香字一

右為末乾傅口角及擦齒上妙仍服蟾酥

白圓效

白朮散又名清寧散治疳渴煩燥引水乳食不進夜則渴甚加烏梅陳米疳瀉停積宿滯水穀不聚頻泄不效加肉豆蔻阿子方見疹

通治蟾酥圓治諸疳殺虫止腹痛退虛熱大效或因病後通泄太過成疳

蟾酥壹个酥油 胡黃連 宣連去龍膽草  
陳皮 川練子去核 小香 史君子去殼 蕪荑  
各一麝半錢或 巴豆二七粒 茴香壹兩  
兩不入 去油 炒

右為末猪膽汁圓或糊圓青黛為衣常服蘇湯下

五疹圓治疳傷肚大

青皮不去白 乾薑燒帶 北五靈脂 蓬莪  
木各一 炒焦黃 存洗

右為末搜和秤藥末壹兩用肥巴豆肉去油秤壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每三五圓米湯不飢飽時下洗方右用大腹皮苦參川白芷為剉散煎湯

淋洗妙

又方甘草黃柏馬鞭草帶鬚葱荊芥煎水洗後却用阿子連肉核燒灰入麝香輕粉少許和勻傅瘡上效

傅藥治疔後虛熱小便腫右以韭菜地龍糞煨爲末出火毒清油調傅

針法治無辜疔腦後項邊有核加彈按之轉動軟而不疼其間有虫如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體作

癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高皆因氣血虛憊所致用針刺破以膏藥貼則愈或因澣濯兒衣露於簷下爲雌鳥落羽所汚兒著此衣蟲入皮毛亦致斯疾凡曬兒衣須微火烘之

項軟

天柱圓治風氣頸起軟頭不得正或去前或去後

蛇含石

大壹塊煨七次用醋淬七次

川爵金末

少許

右碾細又入鉢內研極細和前藥末入少麝香和勻用雪白大米飯圓龍眼大每服壹圓荆芥湯化下或又入生姜汁壹二滴或用金銀薄荷湯早晨不拘時下風熱項軟合用涼肝圓方見驚癇

五加皮散治頸軟右用五加皮爲末酒調塗傅頸骨上  
健骨散治久患疔疾體虛不食及諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟白僵蠶爲末

三歲兒半錢薄荷酒調下後用生筋散貼生筋散治如前

木鱉子

六個去殼

草麻子

六十個去殼

右研細先抱起顛摩項上令熱津唾調貼之效又方用附子生用去皮臍天南星切各等分生姜自然汁調貼項軟處

澹軒方

走馬疔

芭蕉梗葉塊成塊箬裏錫餈或五倍二方俱

是火爲灰輕粉射香同付退

疳

兒疳鴨子著黃打合和煎膏與食良每服只  
教半錢末不踰三個自安康

肘後方

若患疳氣大腹瘦弱者生薤根搗以豬脂煎  
稍稍服之又熟炙鼠肉若伏翼肉哺之

一切疳牛筋木白皮少許搗取壹合或半合  
與服之

子毋祕錄治小兒疳椿白皮日乾三兩爲末  
淘粟米去疳研濃汁糊和丸如梧子大十  
歲三四丸量數如減一丸內竹筒中吹入  
鼻中三度差服丸以飲下

聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱  
不調以漏蘆一兩杵爲散每服以猪肝一  
兩散子壹錢匕煑少許以水煮熟空心頓  
服

又方治小兒疳瘡虫蝕鼻用熊膽半分湯化

調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件者熟即  
噴大如皮毬食之耐風寒衛生易簡方同

千金方治急疔蝕口鼻者沒石子爲末吹下  
部卽差

千金翼治急疔蝕鼻口數日欲死取藍澱傅  
之令遍日十度夜四度差

張文仲治小兒疔瘡胡粉熬八分猪脂和塗  
之差爲度油亦得

又外臺祕要栗子嚼傅之

崔知悌療小兒無辜閃癩癩瘰或頭乾黃聾  
或乍痢乍差諸狀多者皆大黃煎主之大  
黃九兩錦文新實者若微朽卽不中用削  
去蒼皮乃秤擣篩爲散以上好米醋三升  
和之置銅碗中於大鍋中浮湯上炭火煮  
之火不用猛又以竹木篦攪藥候任丸乃  
停於小瓷器中貯兒年三歲壹服七丸如  
梧子曰再服常以下青赤膿爲度若不下  
膿或下膿少者稍加丸下膿若多丸又須

減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母亦同忌法

澹寮方

治小兒疳疾喫頭髮喫衣線

羌蝦炙熟去頭足

右以霜梅肉裹令吞喫空心時六七枚便效

衛生寶鑑

疳瘦

丹砂北治小兒五疳八利

麝香一錢朱砂研青黛各二分丁香半錢肉豆

蔻一枚沒食子壹枚

右用乾大蝦蛛壹箇去頭足酥炙乾同為

末糊丸菜豆大每服三十九米飲下空心

服二三十丸

神效菴菴丸治小兒脾疳瘦弱或泄利無度

神麩炒麥蘖炒肉豆蔻麩裏煨黃連半兩

蔗薈

二錢半研

史君子

十介去皮

右為末，猪膽汁丸。如黍米大。或桐子大。每服二三十丸，米飲送下。空心食前。

蔗薈丸治小兒脾疳瘦弱，面色痿黃。

蔗薈

蟾酥

麝香

朱砂

黃連

同檳

榔

鶴虱

史君子

肉豆蔻

各等分

右為末，糊丸。如棗豆大。每服三十丸，溫水送下。空心食前。

肥兒丸治小兒蒸熱，腹脇脹滿，面色痿黃，飲

食遲化，大小便不調。

麥蘖

炒

川黃連

大蕪荑

神麴

炒

胡黃

連

各半兩

右為末，猪膽汁丸。如麻子大。米飲送下。

三十九丸，食前乳母忌酒麪生冷。

麝香散治小兒口疳唇齒皆蝕，損鼻爛。

硃砂

四錢

砥

三錢

麝香

少許

右各研細，和勻。先以帛抹口，每用少許。付之應是口齒疳瘡，皆可用。不可嚙了燕了。

只是吐人耳川之無有不效大人用壹字  
聖濟總錄

### 小兒疳蠶

小兒宿有疳氣加以腸胃虛弱寒邪乘之則  
變下痢痢久不止腸胃益虛寒濕相乘虫因  
虛動侵蝕府藏或口齒生瘡或肛門傷爛故  
名疳蠶

治小兒疳蠶下部開張痢有膿血爛痒赤腫  
麝香方

麝香

研

蟬殼

去足

豬牙皂莢

去皮

盧會

研

人中白

研

中白

研

青黛

半兩

研

右六味搗研爲細末先取五月五日蝦蟆  
壹枚以繩子雙繫後脚倒掛用胡黃連壹  
寸以絲繫內蝦蟆口中繫定將不津器承  
蝦蟆涎從午至戌解放蝦蟆只取胡黃連  
并涎川將六味藥末就涎和丸如粟米大  
每先暖漿水洗兒軟帛拭乾後扶坐取壹  
丸子以乳汁少許化下須臾如醉慎勿驚

之即虫自出若虫色白或身黃頭黑皆是  
病淺易差若虫于徧體乱出紛紛如碎剪  
馬尾此必死之候

治小兒疳蠱下痢不問赤白及五種疳氣痢  
疾麻子膏方

大麻人

二兩

黑豆黃

一兩

青黛

半兩

研蝦蟆

壹枚

研麝香

兩

研壹

右五味先研麻人次擣研黑豆等四味爲  
末與麻人同研如稠飴入少許竹瀝和勻

用瓷合收口鼻疳瘡者每服半匙匕米飲  
調下日三若腦脊疳每日塗口鼻三上若  
下部開以絲裹藥半匙匕內下部日三換  
量兒大小加減

治小兒疳虺蝕口鼻及下部赤爛方

大麻人

五合

乾蟾

一枚

地龍

去土

炒葶蘆

紙上

炒半

兩

亂髮

如鷄

子大

右五味除亂髮外並擣碎與髮和勻都入  
在甕枚新竹筒內置於瓦上以塘灰火燒

取瀝少少塗兒口鼻頂上及穀道中

治小兒疳痢下部開并生瘡吹藥麝香散方

射香研黃連去須擣末

右二味相和研勻取壹葦管吹少許於下部

治小兒蟻虫蝕下部雄黃散方

雄黃研胡粉熬各半兩

右二味細研如粉每服半錢匕以乳汁調內下部中日三上以差為度

又緋帛膏方取緋帛以鹽小指大內不勝

緋帛燒灰研倒棘刺四十九枚雄黃研磁

石搗射香研蚌蛇膽研各分槐枝壹條長猪

脂臘月者

右八味先研末味為劑末次鍊脂作油去

滓下槐枝煎令焦黃去槐枝下六味藥末

煎成膏以瓷器盛每用少許塗下部日三

治小兒疳蝕下部善參膏方取人二和

苦參兩艾葉兩清箱子兩甘草兩

右四味先以青箱甘草為細末次用水五升煎苦參艾葉成膏量多少去滓入二味藥末和作梃子長壹寸如筋許大暴乾塗豬脂內下部日再蟲出盡為度六洲藥末治小兒疳蟲蝕下部久痢膿血舉體疼痛面色虛腫苦參丸方

苦參

雌黃

雄黃

白礬

燒各半兩 黎蘆

頭壹分 麝香

右六味搗研為末以壹小棗詐大內下部

治疳蠱蟲食肛門治不以時多至殺人豬膽飲方

豬膽

苦酒

右二吐刺煎量力舉飲之蟲即死

治小兒宿疳氣或因腸虛下痢寒濕相乘

蟲因虛動侵食臟腑或口齒生瘡或肛門傷

爛疔疳疔金定命丸

胡黃連

連珠

盧會

青黛

白檳榔

壹分

為肉豆蔻去殼壹枚為末訶梨勒五枚去核為末木香為末

麝香研丹砂研蜜陀僧搗丁香為末各半兩紅

雪研鶴虱為末各一分

右壹十三味合研令勻用酒煎積豬膽膏

和丸如菉豆大每服五丸至七丸妳疳臘

茶下氣疳丁香湯下腦疳黃連湯下肺疳

橘皮湯下急疳乾笋湯下食疳生姜湯下

脾疳棗湯下肝疳煎湯下多至數人藥散

治小兒疳蠱口瘡齒斷露宣黃藥散方

黃藥根皮剉黃連去須黃芩去黑心升麻剉各三分

大青半兩乾蝦蟆酥炙一兩

右六味搗羅為散以絲裏貼齒斷上吐涎

治小兒疳蠱或口齒生瘡或肛門傷爛黃連

丸方用出氣背其蟲也黃日赤赤四散黃黑

黃連去鬚壹兩白燕黃去皮炒半兩麝香研壹錢

右三味搗研為末麵糊和丸如麻子大壹

二歲每服十九溫米飲下日三茶湯行時

治小兒疳出蟲用酒煎人參藥散

諸疳之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相榮養逢甘則中緩中緩則榮衛行遲故府藏之間化生諸蟲狀如絲髮或如馬尾蝕於府藏令兒病疳以藥治之其蟲自出或出頭項或出腹背其蟲色黃白赤者可治青黑者不可治

治小兒諸疳青黛丸方

青黛研 盧會研 乾浮萍草 蝦蟆燒 蟬蛻去土 菜豆去土 故皮子巾燒灰 鼓炒 白礬研

砂研 麝香研各一分

右一十壹味搗研為末和勻用粟米飯為丸如麻子大壹歲兒每服壹粒用溫熱水下先以桃柳湯浴兒後與藥服服藥後得睡覆而看脊骨間必有蟲出形狀不定甚者吐出或噎出即愈

治小兒疳定命夜明沙丸方

夜明沙炒 青黛研 蛇蛻炒 蟬蛻去土 射香研 地龍去土 乾蝦蟆燒灰 炸蟬炙四枚

右八味搗研為末和勻粟米飯丸如麻子  
大一二歲兒每服三丸三四歲兒五丸並  
用米飲下空心日午各壹服更水化壹丸  
滴兩鼻中又以桃柳湯浴兒以青布裹良  
久蟲出青布上

治小兒諸疳射香丸方

射香研熊膽研丹砂研牛黃研射香研蛇膽研  
瓜蒂各壹分赤小豆七粒蟾酥二片如柳葉大  
右八味搗研為末和勻麴糊和丸如麻子

大母服三丸至五丸米飲下空心日午近  
晚各壹更量兒大小加減服後以桃柳湯  
浴兒即以青衣蓋覆當有蟲出

治小兒疳出蟲瓜蒂丸方

瓜蒂燒射香研蟾酥各半烏蛇尾酒浸黃  
連各壹分蛇蛻燒熊膽各半  
右七味搗研為末用粟米飯丸如麻子大  
溫熱水化破二丸滴於鼻中蟲出為效  
治小兒諸疳氣麴香散方

麝香 研 白礬 从膽礬 燒過 皂莢 燒灰各一分 豬膽

壹枚去 膩粉 研半 膜熬乾 錢

右六味再同研令極細每服壹字匕米飲

調下服藥後以青衣蓋兒身上良久有蟲

出即差

治五疳吐蟲腹脹羸瘦除疳散方

丁香 生犀角 末各半錢 苦棟根 自子者良赤

未 為鶴蝮 各半 蜜陀僧 白檳榔 炮到各壹分

右六味擣羅為散每服壹錢匕米湯調下

日三蟲自出更量大小加減

治小兒五疳眼鼻多痒寒熱往來腹臃不調

或瀉膿血肌體瘦弱飲食不化多困少力眼

澀饒睡兼治驚風月蟾丸方

乾蟾 一枚大者 蛇蛻皮 大者 穀精草 二兩

同入壹瓶子內以 胡黃連 甜瓜蒂 丁

香 各壹 熊膽 研 盧會 研 天竺黃 研 牛黃 研

丹砂 研 竜腦 研 射香 研 雄黃 研 各二分 青黛 研

兩

右壹十五味搗研爲末再研勻用豮豬膽汁煮麵糊丸如棗豆大每服三五丸米泔下量兒大小加減服藥後以桃柳湯浴兒著青衣蓋疳虫出衣上

治小兒疳殺虫盧會丸方

盧會研 燕蕒炒 木香 鶴虱炒各半兩

右四味搗研爲末水浸炊餅丸如黃米大每服十九米飲下更量兒大小加減

治小兒疳蚘定粉丸方

定粉 豬膽各壹分

右二味研和爲丸如棗豆大每服二丸米飲下

治小兒疳殺虫雄黃散方

雄黃研 黃連去須 木香各壹分 麝香研半

右四味搗研爲散每服半錢七米飲調下量兒大小加減

小兒諸疳

小兒疳疾皆以肥甘而得之改名諸疳五藏

所受各各不同在肝爲風疔其狀搖頭揉目  
白膜遮睛色青黃毛焦髮立筋青腦熱覆面  
而卧腹有積聚時下痢身體自汗久不愈轉  
加羸瘦是爲肝疔若目睛帶青脉左脇下鞭  
吐涎眼角有黑氣者不可治在心爲驚疔其  
狀渾身壯熱吐痢無常頰赤面黃胃膈煩滿  
鼻乾心躁口舌生瘡時有盜汗或發虛驚久  
不愈則下痢膿血是爲心疔若驚啼多渴便  
食辛味耳邊有脉舌上有黑靨者不可治在

脾爲食疔其狀腹多筋脉啼促氣羸乳食不  
多心腹脹滿多啼咳逆面色萎黃骨立毛焦  
形枯力劣胃膈壅悶乳食難消腸胃不和下  
痢酸殘鼻乾口燥愛暗憎明情意不佳好喫  
泥土是爲脾疔若腹大脣無血色人中平滿  
下痢不禁皮枯骨露者不可治在肺爲氣疔  
其狀咳嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喚不  
利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡脣邊赤痒  
腹中氣脹食減下痢皮上粟起是爲肺疔若

咳逆氣促下痢白沫身有斑紋黑色如粟米者不可治在腎為急疔其狀肌骨消瘦齒斷生瘡逢寒遇熱則鼻乾口燥腦熱如火脚冷如冰食少吐逆時或下痢下部生瘡肛門脫出是為腎疔若嗜酸醃飲乳無度小便白濁牙齒青黑耳腦乾燥肩聳骨枯者不可治凡此五疔又有五絕之候壹掐着脚中指底不覺疼二抱著手足垂墮無力三病未退徧身不煖四藏府瀉青涎及沫不止五項筋舒展

無力如此皆不可治也五疔之外隨十二經脈血氣所受變狀不一故曰諸疔  
治小兒二十四種疔熊膽散方

熊膽 牛黃 雄黃 五靈脂 丹砂

麝香 各半 蚺蛇膽 已上 黃連 去鬚 乾蠍 去土

麻 蝸牛 炒 馬兜零根 乾 大黃 剉碎炒

右壹十三味熊膽等七味研令如粉黃連等六味擣羅為散再同研令極細每服一字至半錢上用米飲調下早晨午間臨臥

各壹服量兒大小加減服之或以蜜為丸  
如麻子大每服三丸至五丸

治小兒五疳無食子丸方

無食子 三枚大者 牛黃 研 射香 研 丁香

雄黃 研水 青黛 研 木香 研 丹砂 研水 飛蟾

酥 三片如柳葉 熊膽 半兩 蝸牛殼 乾者 十枚 大煨過研

右壹十壹味搗研為末更同研令細水浸  
蒸餅為丸如黍米大壹二歲兒臨卧乳汁

下壹丸三四歲二丸五六歲三丸七八歲

五丸米飲下亦得日再服之

治小兒五疳羸瘦腹脹下利可思飲食使君

子丸方

使君子 用水和生麩裏炮以麩 香

食子 熟為度只取使君子用 熊膽 研 胡黃連 夜明沙 青黛

研肉豆蔻人 黃連 去須 盧會 研各 蟾頭

乾者青 蟾酥 子大 射香 研 龍腦 半錢 小

右壹十四味搗研為細末挂金匱濕紙裹

粟米燒飯和丸如麻子每三歲服五丸至  
七丸用溫米飲下日三服不計時候大小  
以意加減人

治小兒疳氣盧會丸方

盧會研釣藤別搗末雄黃各一兩青黛各半蟾

酥研熊膽研射香研三味各壹分

右七味同研勻入猪膽汁和勻如菜豆次

每日空心臨臥煎荈湯下三丸至五丸

二歲以下兩丸三歲至六歲三丸七八歲

治小兒疳氣蝦蟆煎丸方

蝦蟆青枚用頭胡黃連地龍木香

各壹肉豆蔻壹枚射香研黃連去鬚各夜

明砂白燕各錢丹砂錢

右壹十味用蝦蟆燕黃末獾豬膽二枚法

酒壹蒸煎成膏和其餘藥末為丸如粟米

大每服五丸至七丸米飲下日三兩服

治小兒一切疳吹鼻青黛散方

青黛研細青去苗葉瓜蒂射香地竜

炒盧會研黃連去鬚各

右七味搗研為細散每用少許吹鼻中得

嚏噴多即易治嚏噴少難治不嚏噴不可

治治

治小兒五疳心藏驚疳肝藏風疳肺藏氣疳

脾藏滑疳腎藏急疳皆治之常服金蟾丸方

蟾酥字一胡黃連使君子黃熊膽研各木

香壹射香研少牛黃研半丹砂研二大黃

半虎睛對壹錢

右壹十味搗研為末燒粟米飯丸如麻子

大荆芥湯下三丸至五丸量兒大小加減

服之

治小兒一切疳腦悶昏沉宜先用吹鼻散方

青黛研躑躅花各壹黃連去瓜蒂肉地龍

微射香研各

右六味搗研為細散每用少許吹在鼻中

看嚏噴多少嚏噴多即病輕嚏噴少即病

重

治小兒疳氣面黃肌瘦發熱多因好喫泥土  
搗眉咳甲時好伏地香蟾丸方

乾蟾青枚焦麝香研半錢胡黃連兩半丹砂研牛

黃研蛇蛻燒灰雄黃研天竺黃研熊膽研蟬

蛻各壹分天仙子半合水浸出芽子為度焙乾為細末肉豆蔻

青枚夫殼

右壹十二味搗研為細末糯米飯和為丸

如黃米大每服七丸至十丸米飲下不拘

時候壹日三服

治小兒疳氣身體壯熱毛髮焦黃目常有淚

滿口生瘡脚手細弱腹脅脹滿好喫泥土使

君子丸方

使君子皮去夜明沙炒白蕪荑炒各半兩胡黃連

壹麝香研半錢細辛去苗葉盧會研雄黃研蟾

酥檳榔蟬蛻去翅足炒蝸牛拾枚乾蝦

蟆二枚用溫水洗去腸肚惡物并骨爪後

同熬成膏

右壹十三味除蝦蟆外搗研為細末入膏

子和為丸如麻子大每服五丸至七丸米  
飲下不拘時候壹日三服

治小兒腦脊疳口生白瘡齒疳并諸般疳疾  
悉生之熊膽膏方

熊膽 蚬蛇膽 盧會 牛黃 射香

龍腦

各壹分

布六味並研如粉用新汲水兩盞入藥末  
攪令勻以瓷器盛重湯煮之水只可及瓷  
器五分以來慢火煮旋添煖水煮至半日

更投三五粒粳米同煮米爛藥即成以篋  
子攪令勻勿令藥乾欲點鼻中時先七日  
孩子與乳母忌生冷醬豉五辛熱麵魚肉  
并少食推然後取藥少許漸漸吹鼻中及  
塗口瘡上頻使兩日即停壹日看兒髮變  
青即止至七度停藥後還須慎口

治小兒一切疳病鶴蟲丸方

鶴蟲 炒胡黃連 煨盧會 研丹砂 研各青黛

研三 分

右五味搗研為末更入乳鉢內研令細用  
 米泔煮豬膽令熟取汁和為丸如麻子大  
 每服三丸至五丸米飲下早晨午間日晚  
 各膏服量兒大小加減

治小兒五疳瘦弱不思乳食黃連豬膽丸方

黃連去鬚 盧會研 蕪荑 青黛研 檳榔剉各壹分  
 蟬蛻二十壹個去土 胡黃連半兩麝香研半錢  
 右八味搗研為末以豬膽丸如麻子大每  
 服五七丸量兒加減米飲下

治一切疳氣青金定命丸方

胡黃連膏兩為末 盧會研 青黛研各三分 肉豆蔻二枚  
去殼 訶梨勒五枚煨去核為末 檳榔壹枚 麝香研  
 丹砂研 蜜隨僧為末 木香為末 丁香為末各半兩 紅  
 雪研 鶴虱壹分  
 右一十三味每同研令勻用酒煎豬膽  
 膏丸如菉豆大每服五丸至七丸疔疳臘  
 疔茶下氣疳疔香湯下腦疳黃連湯下肺疳  
 橘皮湯下急疳乾筭湯下食疳生姜湯下

脾疳棗湯下肝疳塩湯下

治五疳殺蟲化食長肌肉退風熱青黛丸方

青黛別研留壹半為衣使君子肉檳榔到夜明砂

白燕蕒各半兩蛇蛻壹條肉豆蔻麩裏

設壹巴豆半分用麩炒令麝香壹錢黃連

去鬚炒蝦蟆青枚酒浸炙令

右壹十壹味先研巴豆令細次用豬膽壹

枚取汁同研令勻旋入其餘藥末攪和為

丸如未就更用少頓飯再研得所丸如麻

子大每三歲以下者壹丸五歲兩丸十歲

三丸食後用熟水下日三服如風熱大便

澀川葱湯下五丸至七丸以通利為度

治小兒常服殺疳蟲天漿子丸方

天漿子七枚青黛研烏蛇酒浸去丹砂研

麝香研各一分葶藶炒過龍腦研雄黃研膩粉

各半白附子炮獨角仙去翅足炙乾蠍五

炒蟬蛻十枚膽酥壹分

右一十四味各搗研為末用生豬膽為丸

如黃米大每服一粒早晨日晚各一服此  
治小兒疳積胡黃連丸方

胡黃連 蛤蚧酥炙 牛黃研 犀角屑 天麻

人參 肉豆蔻人 大黃研細炒 雄黃研

粉壹分 右九味搗研為末鍊蜜為丸如麻子大每

服五丸空心午後各一服溫水送下

治小兒諸疳壯熱黃連丸方

黃連去 黃蘗去 甘草炙 青橘皮去 白焙

右四味搗羅為細末研射香少許和勻入

豬膽內用線繫定於石器內漿水煮片

七沸取出當風掛一宿去膽皮研熟如

菘豆大每服五七丸米飲下漸加至十丸

治小兒諸疳諸痢食傷氣脹頭木體羸頭髮

作穗壯熱不食多因齒爛鼻瘡下痢潮熱

疾在黃煎方

蝦蟆壹枚去皮骨腸胃 魚青末以無灰

訶梨勒皮使君子 胡黃連 蟬蛻

煎汁同熬成膏

煎汁同熬成膏

煎汁同熬成膏

煎汁同熬成膏

煎汁同熬成膏

無食子 蘆會研 蕪荑人 熊膽研 夜明

沙 丹砂研 雄黃研 木香各一分 肉豆蔻去

春夏半分 秋冬壹分 牛黃研二錢 麝香研一錢 龍腦半錢

右壹十七味搗研十六味為末入前膏丸

如麻子大每服五七丸米飲下驚疳金銀

薄荷湯下乾疳腹脹桃仁蘆香湯下疳蟲

東引石榴苦棟根湯下此丸尤治疳痢若

挾熱而痢者不可服無心器內藥水送下

治小兒諸疳肢體羸弱藏腑虛滑可思乳食

三和丸方

胡黃連兩 木香兩 射香研壹錢

右三味搗研為細末麩糊和如麻子大

壹二歲每服十丸溫粥飲下日三次每服三

拔粹方

鼻疳

治法先用甘草白礬水洗淨後搽蘆會黃連

黃蘗末日三止水調敷之

瑞竹堂方治小兒驚風疳積

磨積丸專治小兒疳積泄瀉等疾

京三稜 蓬莪朮 陳皮去青皮白去神麩

炒麥芽子 炒川鬱金 胡黃連 香附子

炒去毛與三稜莪朮陳皮青皮五件一處用好米醋煮一晝夜焙乾 雷丸白者

史君子肉切 蘆薈已上各焙等分

右為細末米醋糊為丸如菟豆大每服三

十丸糯米湯送下茶湯亦可虛弱加木香

虛極加附子疳極加癩蚬蚶肉

治走馬牙疳汴梁大紅鞋李是領方 小遺盆內白屑取

下用磁罐內盛貯用泥固濟炭火煨紅取出將白屑細研入射香少許貼於患處

王氏集驗方

小兒鼻下兩道赤者名曰蟹又名赤鼻疳鼻

以米泔水洗淨用黃連末傅之

青黛散治小兒疳痢羸瘦毛髮焦枯青黛不

以多小為末量兒大小加減水調服

歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男

恰似脊傍多變動還如瘦疾困耽耽

又曰項熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱  
腹內時時更下利青黃赤白膏般般眼滯  
面黃鼻孔赤穀道開張不可看忽然瀉下  
瓜藍淀濃涕常流鼻裏酸唇焦嘔逆不乳  
哺吐熱憎寒卧不安腹中有病須醫藥不  
用祈禳信祟端此方便是青黛散專治孩  
兒痢助疳

小兒喫泥及臙肚方膩粉壹分沙糖和丸如  
麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥土

小兒好喫泥土以真黃土絞汁飲之

醫方大成

治五疳五軟

湯氏方蘆薈圓治脾胃積熱遂成疳疾宜服  
此藥

龍膽草

黃連

去蕪

蕪黃

各壹兩去皮先炒

處炒  
赤色

將右各件爲末別入蘆薈末壹分和勻飯飲

圓如黍米大隨大小加減空心米湯下

醫方

集成南北經驗方油珍方同

陳氏方蘆薈圓治小兒五疳

蘆薈 蕪荑去皮 青黛 宜連 檳榔各壹分

胡黃連兩半 獾猪膽二介 成袖珍方一個 蟬殼十二

真麝香少許

右為末猪膽圓如麻子大每服五七圓飯

飲吞下

湯氏方大胡黃連圓治驚疳腹脹虫動多睡

肌體黃瘦五心煩熱

胡黃連 黃連 苦練子各一兩 ○南北

白蕪荑去扇半 干蟾頭燒存性 麝香青錢

黛青兩半 蘆薈別研

右將前四味為末猪膽汁和為劑每壹胡

桃大入巴豆仁壹枚在內却用油單壹重

裹之蒸熟又入後四味麵糊圓如麻子大

每服十四圓清米飲下食後臨卧日進三

服醫方集成袖珍方類鈐方同

湯氏方驚用散治疳勞骨蒸

驚甲九肋者沸湯浸煮黃耆蜜炙白芍藥各

兩生熟地黃 地骨皮 當歸去蘆○經

三味各人參去蘆各

七錢半方同右咬阻每服二錢水半蒸煎服醫方集成

方神珍 ○經驗良方右咬阻每服二錢水

半蒸煎至三分去滓不拘時候大人加服

錢氏方史君子圓治臟腑虛滑及疝瘦下痢

腹脇脹滿不思乳食常服安蟲補胃消疝肥

肌

厚朴去皮姜製半兩史君子去殼一兩麩裏煨陳

皮去白壹分○承炙訶子半生半青

黛各半兩如是兼驚及滯熱渴即

右為末煉蜜圓如小鷄頭大每服壹圓米

飲化下兒生百日已上三歲已下服半圓

乳汁化下元方用青黛醫方集成

湯氏方猪肚圓治骨蒸疝勞肌體黃瘦出膿

木香兩半宣連 生地黃 青皮 蘇州柴

胡蘆去蘆驚甲九肋者沸湯浸洗令淨次用童

方酥

右為末猪肚壹枚入藥於肉麻繩纏定於

沙鉢內懸胎油珍方作泡經煮熱取出細

研猪肚為圓如麻子大米飲亦大小加減

不拘時醫方集成南三三三三三三三三三三

湯氏方清肺飲子治匿鼻涼膈

桑白皮 地骨皮 黃芩 生乾地黃各

分

右咬阻每服量大小加減水煎食後服醫方

集成南北經驗方袖珍方同

幼幼方治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名月蝕

疳瘡

黃丹壹錢煨 菉豆粉一錢 白礬壹錢

右研細乾傅瘡上唾調亦可醫方集成南

錢氏方地黃圓治小兒頭顱不合并體瘦骨

露有如鶴膝皆稟賦不足腎虛不生骨髓之

衛方壽域神方

衛方壽域神方

衛方壽域神方

故以致此疾宜服此藥補之疾自愈

熟乾地黃八錢洗焙干澤瀉洗壹錢集成二錢牡丹

皮去心各三錢山茱萸 牛膝 鹿

茸去心各三錢乾山藥各四

右為末煉蜜圓如梧桐子三歲以下三二

圓溫水空心任下方永類鈔

幼幼方小茸元治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸 菴蓉 川牛膝 木瓜 兔絲子

熟地黃 當歸 天麻 杜仲 青掠各

分

右為末用蜜圓掠湯溫酒化下皆可醫方集成

南北經驗方同

幼幼方羚羊角散治面紅唇白腸熱項軟

羚羊角可熟地黃浸酒白茯苓 酸棗仁炒

防風 虎脛骨酒炙肉桂 甘草各等分

右為末溫酒鹽湯化下皆可醫方集成

珍方衛生集 湯氏方貼項方治肝膽停熱致令筋軟用此

湯氏方貼項方治肝膽停熱致令筋軟用此

藥貼項

附子

生去皮臍○永類鈐方南星

切

右為末生姜自然汁調攤貼患處次服附

風圓及瀉青圓

醫方集成同

省翁活幼口議

疳疾證候方議

議曰五疳八痢本經所載詳明然究竟疳

在五臟五病故有五名及其順逆相傳變

動臟腑則病不循證候而作者豈可必五

疳為數八痢為拘疳者始自於疳痢者起

自於痢疳以飲食不節過傷脾胃痢即脾

胃虛弱而受積毒治疳之藥理脾胃温中

補氣消疳煞虫治痢之藥理腸胃去濕口

中滋血和氣為上

治嬰孩小兒食肉大早傷及脾胃水穀不分

積滯不化迭作疳氣等候宜服大效史君檳

榔圓良方

肉豆蔻

兩個檳榔壹个

宣連胡黃連

陳皮 青皮 川練子肉 炒 蕪荑 炒去皮 神

麴 麥蘖 並炒 木香 夜明砂 炒去土 盧會

川芎 各壹錢重 麝香 一字

右為末 獾猪膽汁薄 苛為圓如麻子大 每服三五十圓 溫飯飲下

議曰積是疳之母 所以有積不治乃成疳 候又有治積不下 其積存而臟虛成疳 尤重大抵小兒患疳泄瀉無時不作 風候者何惟疳瀉名熱瀉 其臟腑轉動有限 所以

不成風候 雖瀉不風 亦轉它證 作渴虛熱 煩躁下痢 腫滿喘急 皆疳候虛證 古云疳虛用補虛 是知疳之為疾 不可更利動臟腑 發作之初 名曰疳氣 腹大脹急 名曰疳虛 滿癩類併名曰疳積 五心虛癭 名曰疳熱 毛焦髮穗 肚大青筋 好喫異物 名曰疳極 受病極 熱發往來 形體枯槁 面無神彩 肉無血色 名曰疳勞 手足細小 項長骨露 尻髻無肉 肚脹臍突 名曰疳食 如嘔噦

頭骨分開作渴引飲虫從口出名曰哺露  
此皆疳候又因多食生冷疳粘肥膩積滯  
中脘不化久亦成疳治疳之法量候輕重  
理其臟腑和其中脘順其三焦使胃氣溫  
而納食益脾元壯以消化則臟腑自然調  
貼令氣脉與血脉相參壯筋力與骨力相  
力俱健神清氣爽疳消虫化漸次安愈若  
以藥攻之五臟踈却腸胃下去積毒取此  
良子雖曰醫療即非治法蓋小兒臟腑虛

則生虫虛則積滯虛則疳羸虛則脹滿何  
更利下若更轉動腸胃致虛由虛成疳疳  
虛證候乃作無辜無辜之孩難救矣

治嬰孩小兒一切疳候及一切虛痢他藥無

功此藥極效胡黃連圓方三四小兒

胡黃連 蘆會 草黃連 肉豆蔻 炮桂

人參 朱砂 麝香 史君子 木香 砂

藤 龍齒 白茯苓 以上各 錢重 廿五錢重

右各生用為細末取獾猪膽兩枚裂汁和

末令勻却入袋內盛之以繩札定湯煮半  
日取出切破袋子更入葇荳子二錢重微炒  
黃丹壹錢重二味別研如粉入前藥和勻  
搗五百杵爲圓如菜豆大但是疳與痢用  
此粥飲下五七圓子幼者三圓不喫粥飲乳  
前頭令吻能治壹十二種疳痢及無辜者功  
効非常

議曰疳之疾危候由於漸痢之後逆傳自  
於延延久爲逆初見其輕言之曰常後知其重

告之無門是以疳痢皆由積毒嬌恣口腹  
因虛以致虛用害而傷害醫工見有此等  
自是憂疑病家欲得便甦豈無性急更音耕  
遷取活展轉愈深或疳極而腹下痢或熱  
盛而加作渴或煩躁四體虛浮或飲食一  
時嘔吐常方不能安愈快劑恐越傷和唯  
宜服此  
治小兒一切疳氣肌瘦體弱神困力乏常服  
煞蟲消疳開胃進食肥肌圓方

黃連壹分川練子肉各半川芎兩半陳皮

香附子各壹分酒木香二錢

右為末水煮細麩糊為圓麻子大每服三

五十圓温飯飲下

議曰驚疳積痢各分證候用藥今有小兒

患疳虛困又作痢疾二候相加最為惡重

疳痢併行臟腑虛乏之極熱毒差重皆係

積之久滯雖曰係積無積可療乃虛受之

然謂其虛補之不及所見其證不得良方

以何對治雖獲其方不審其候亦難療也

良由脉與病同藥與證對醫工運巧扶而

起之必得安樂胡黃連圓無以加諸肥肌

良方亦佐勝

治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂出血齒

落者蘭香散方

輕粉壹錢蘭香子一錢蜜陀僧半兩醋

右研如粉傅齒及齦上立効

議曰嬰孩受病證候多疳良由氣鬱三焦

疳分五臟內有腎經常虛得疳名之曰急  
以馬走爲喻治療頗難此等證初作口  
氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齲  
爛名曰潰槽又盛血出各曰宣露重則齒  
自脫落名曰腐根其根既腐何由理之嗟  
吁豪家有子舖以甘肥腎堂受之虛熱或  
緣母在難月恣味珍羞令兒所招卽非偶  
然而作今將祕方述于後  
又方傳齒立效散

鴨嘴膽礬

一錢重匙射少  
上煨紅研射

右研勻每以少許傅牙齒齲上

又壹方用  
蟾酥壹字

加麝和  
勻傅之

議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也  
變蒸足後飲食之間深恐有傷於榮衛而  
作衆疾其或氣傷於毒血傷於熱熱毒攻  
之虛臟所奚何臟爲虛蓋小兒腎之膏臟  
常主虛不可冷受熱毒攻及腎臟傷乎筋  
骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬

非徐徐而作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立效散及射酥膏傳之切忌與食熱毒之物此疔不同常證乃係無辜有作醫宜深究保全爲上若用常方難擬愈活

獨活飲子治腎疔臭息候良方  
天麻 木香 獨活 防風 麝少許細爲末研

和入右各壹錢重爲末每服壹錢匕小者半錢

麥門冬熟水調取小者半錢煎入四苓三黃散治腎疔崩砂候良方

牛黃外大黃 川牛地黃 木香新青黛鼠右等分爲末每服壹錢匕熟水調服杏仁人參散治腎潰槽候良方

肉豆蔻炮 胡黃連 人參 杏仁炒 甘草炒右等分爲末每服壹錢匕小者半錢溫熟

水調服神效

續補散治腎疝宜露候良方

木香 公積 榔 人參 黃連 杏仁 葛 蘇 藜

右等分爲末每服一錢小者半錢熟水調

服 黃耆 散 治 腎 疝 腐 根 候 良 方

黃耆 散 治 腎 疝 腐 根 候 良 方

黃耆 蜜 牛 黃 人 參 天 麻 木 蟬 炒 杏 仁

炒 白 茯 苓 黃 川 當 歸 生 地 黃 洗 熟 乾 地

黃 洗 亦 得 亦 得

右等分爲末每服小者半錢片煎天門冬

熟水調服 麥門冬 亦得

地骨皮散治腎疝齧齦牙齒肉爛腐臭鮮血

常出其方 生乾地黃 兩 真地骨皮 細辛 各一 五倍

子 炒 令 焦 二 錢 重 右 爲 細 末 每 用 少 許 傅 之 頻 與 功 効 喫 不

妨 口 臭 止 午 胃 口 涼 息 臭 體 漸 並 服 煎 湯

議 曰 本 經 所 載 疝 證 有 五 謂 五 臟 所 受 故

得 其 名 今 述 腎 疝 一 臟 有 五 證 候 者 最 爲

要急不可同常此疾具陳有五種候傳迅疾可畏乃知走馬之號不誣初發之時兒孩口臭上千胃口氣息臭鬱漸進損筋斷肉生瘡或腫或爛其齒焦黑又進從牙槽內發作瘡疱破潰膿爛又進熱逼入脉時時血出其熱注久牙斷腐壞槽寬齒脫六七歲孩落盡不復更生豈可治療今以妙方宜速與隨其傳變而理不待疾作而後藥也

### 疳熱證候方議

議曰小兒疳患乃是五臟所受積氣相傳今議患疳有患熱者由其候虛之盛積者乃疳之母所有積不治遂傳成疳又有治積不下其積存而臟虛其疳傳而脉弱臟腑傳過經絡致受由此作熱證候尤重雖不發作風痰畢竟危困沉重經云疳熱證謂勞形作渴虛煩頻嘔不食下項良方適其輕重而與服之仍擇所當勿可縱恣誤

致乖違便計利害

治小兒疳熱虛煩作治不思飲食四體沉重  
服人參散良方

人參 蓬莪朮 川當歸 龍腦草根

甘草 炙 赤芍藥 白茯苓 枳殼 浸去瓢切作小

片用麩炒令赤色

右等分爲末每服半錢煎麥門冬湯調服

無時候

治小兒疳熱久蒸肌肉消瘦形容憔悴神情

不樂飲食雖多不生肌肉宜服此方大有功  
效神妙宜氣圓良方

蓬莪朮 炮 赤芍藥 川當歸 大黃 炮 鱉

甲 米醋炙去 裙焦爲度

右等分爲細末水煮熟麩糊爲圓麻子大一

歲二十圓熟水下大小加減

永類鈴方

諸疳證治

鄭氏射連元疳積勞熱黃瘦髮稀腹急氣喘

阻乳盜汗

黃連一兩酒浸一宿 史君子 鱉甲米醋炙 柴胡

陳皮淨 蕪荑 青皮各半兩

口上七味剉碎巴豆仁四十九粒炒黃

色去巴豆末水淘洗

檳榔 木香各一分 麝香半錢 秦艽兩

右為末酒糊元如小豆大三歲三十元米

湯下無時

牛黃煎諸疳諸痢食傷腹急骨蒸消瘦毛豎

面黃壯熱多困少力

乾蚬蚬二介酒一盞積猪膽六個 牛黃

射香一錢 龍膽草半錢 朱砂 蘆薈 熊膽

沒石子去殼 史君子肉 雄黃 蟬退 胡

黃連 訶子肉炮 蕪荑仁 木香 夜明

砂 肉豆蔻各壹分

右為末煉蜜元小豆大三歲三十元米湯

下無時

射沉膏治疳瀉白濁醒臭肥膩骨熱多渴腹

痛不食羸乏無力頸骨垂倒

乳香錢一木香炮二訶子炮肉四錢射香半沉香半

半錢蚶蚶酒浸取肉肉豆蔻半兩取孔子入

麩裏炮焦去麩

右為末蜜元雞頭大三歲壹元米湯下

沒石膏疳瀉白濁醒臭肥膩骨熱多渴

沒石子二香附子四人參錢訶子炮丁香肉

各壹錢白木炒二巴豆十粒針穿

右為末蜜元雞頭大三歲壹元米湯化下

金靈散久患疳疾體虛可食及諸病後天柱

骨倒醫者不識謂之五軟白殭蠶直者炒

為末三歲半錢薄荷酒調下後用生筋散

貼之用木別子六個去殼革麻子六十粒

去殼研細先急抱頭搽項上令熱津唾調

貼之

大黃元治無辜疳疔壯熱瘡瀝

大黃三兩木香兩半三歲二十次米飯下

右為末米醋壹升和置銅碗內用鐺煮重

湯浮湯上炭火煮竹篾攪候可圓即圓入  
糊和元小豆次三歲二十元米湯下加減  
服當下青膿為效

又方以漏蘆為末每服壹錢豬肝壹兩搥少  
許水煮空心

蟾酥散治走馬疳瘰潰侵蝕唇鼻干六十餘

乾蚶蚶黃泥裹黃連各壹青黛壹

右為末入射少許和研糝傅乾則油調亦

治身上肥瘡但疳瘡神效又南星入雄黃

麩煨入射為末傅之

清肺飲治肺疳熱蝕穿孔汁臭或生息肉

桑白皮炒半紫蘇比柴胡黃芩比當

歸天門冬去心連翹防風赤茯苓

桔梗生地黃甘草

右細剉每服二錢水煎食後却用前蟾酥

散傅之

全嬰疳疔保童元治五疳八痢面黃肌瘦頭

髮作縷好食泥土可思乳食

大乾蝦蟆一个燒存性皂角壹錢去皮蛤粉三錢

飛射一錢別研

右細末糊元粟米大每三四十元空心温

米飲下日二服

直指取癖元治脇傍血膜包水僻側作痛遂

發寒熱潮熱先服平肝清肺藥却服此

甘遂微炒芫花炒牽牛半生半炒取末粹桂人莪木

青皮淨桃人炒去皮木香五靈脂各二錢

右為末入巴霜壹錢研勻糊元麻子大風

乾每一二元姜蜜湯下

湯氏竭氣元治積水驚水飲水多停積於脾

肢腫而熱

赤小豆陳皮蘿白子甘草各半兩木

香煎壹分

右咬咀姜棗煎

御院勻氣散治脾肺氣逆喘嗽面浮胸膈痞

悶小便不利

桑白皮二兩陳皮淨兩桔梗炒甘草炙赤茯苓

苓各一兩藿香兩木通兩甘草兩右姜煎

經驗良方

諸疔積疔蟲疔瘡

五疔蕪黃圓治一切疔氣瘦弱食少大抵疔氣其狀多端雖輕重不同形證亦異然窮其根本皆由乳哺乖宜寒濕失節臟腑受病氣血不榮致成疔也一日疔疔其候搖頭揉目白膜遮睛汗流遍體肉色青黃腹中積聚此

是肝疔亦名風疔二日心疔其候身體壯熱吐利無時頰赤而黃胃膈煩滿鼻乾心燥口舌生瘡下利膿血有時盜汗此是心疔亦名驚疔三日脾疔其候心腹脹滿乳食不化喘促氣急咳逆多喘骨立毛焦好喫泥土痢多酸臭此名脾疔亦名食疔四日肺疔其候咳嗽氣逆咽喉不利揉鼻咬齒腹內氣脹大腸不調糞中未出此名肺疔亦名氣疔五日腎疔其候肌肉消瘦齒齦生瘡寒熱往來口臭

乾燥吐逆少食泄痢頻併肛門不收此是腎  
 疳亦急疳令以壹方同療之  
 黃連等分 蕪黃等分 麥蘖等分 神麩等分  
 右爲細末蜜丸粟米大量兒大小米飲下  
 如五疳陳皮湯下立寒熱往來薄荷湯下  
 虫咬心痛苦練子湯下乳癖氣結或下  
 痢赤白腹痛後重腸鳴泄瀉米穀不化並  
 陳倉米湯下  
 麝香金蟾圓治小兒一切疳疾三五服見效

連黃 黃蘗 青皮 陳皮 三稜 莪  
 木 檳榔 鶴虱 蕪荑 川練子 櫻苦  
 練根等分  
 右爲細末雄豬膽汁浸蒸餅爲丸如黍米  
 大疳瀉黃白紫蘇木瓜並米飲下 疳虫  
 蝕腹痛史君子湯下 傷食嘔吐不止養  
 下香湯下 小退疳熱參門各湯下 腹脹脾  
 虛木香陳皮湯下 不思乳食棗湯下  
 取小兒虫清油湯下 赤白痢乾薑甘草

湯下 赤痢甘草湯下 赤痢乾薑湯下  
常服磨積米飲湯下 不思飲食

千金圓治小兒五種疳氣面色痿黃肌瘦不  
食

疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒  
右為細末 獨活 膽汁 和老麻子 大空心食

前來飲下 三十九日進三服

香橘圓治小兒疳瘦泄瀉無時可服飲食

史史子 史史子 史史子 史史子 史史子  
神麩 麥蘖 芥

草 厚朴 姜汁製 陳皮 木香 各二錢半

右為細末 蜜丸 櫻桃 大米湯化下 壹丸

益容圓治小兒五疳羸瘦發熱面黃或脾虛

減食泄瀉無時大治腹痛

史君子 取肉剉 厚朴 去粗皮 川芎 橋紅

甘草 各二錢半 右為末 煉蜜丸 如皂角子 大二歲以上服

一丸以下服半丸 陳米湯化下 無時

胡黃連圓治小兒毛髮焦落腹大氣喘肌體

羸瘦喫食炭土生米寒熱往來下痢脫肛亦

治交妳不長肌肉情性不悅交妳者乳母又有孕也

陳皮去白川練肉炒宣連大神麩以青皮

去史君子煨去麥蘖龍膽草各半胡黃

連夜明砂白燕蕩炒乾姜烏梅各

錢錢

右為末麵糊丸黍米大米飲下三十丸

治小兒壹三歲面色痿黃不進飲食腹脹如

鼓或生青筋日漸羸瘦此是乳母未斷乳而

又注孕其乳汁名為交乳小兒服之有此疾

證

好豆豉三十粒揀巴豆三粒去

右研勻如爛泥丸如粟米每服十丸薑湯

送下無時服下如魚凍其病除矣

褐圓子治小兒傷食腹脹黃瘦軟弱

蘿蔔子炒莪木煨各胡椒兩

右為末麵糊丸粟米大蘿蔔湯下二十

丸

露星膏治小兒疳積黃瘦肚拍如鼓鳴脊骨  
如鋸乃積而生熱成疳

黃耆蜜水胡黃連 地骨皮 柴胡各等分

右為末煉蜜丸如圓眼大隔夜酒浸露星  
一宿次日澄去酒薄荷湯化服

五福化毒丹治匿鼻疳瘡清膈涼血

玄參壹兩桔梗去蘆八錢赤茯苓 人參 牙

硝 青黛各二錢甘草一錢射香少許

右除射香牙硝別研餘壹處為末次和青

黛煉蜜為丸如圓眼大煎金銀薄荷湯化

下瘡疹餘毒磨生犀水下如上焦熱口血

臭氣用生地黃自然汁化開食後服

青牛散治小兒走馬牙疳齒齲潰爛由臟腑

壅熱乳食不調內有疳蟲上蝕齒其候唇痒

痛牙齒消黑舌上生瘡腦中乾熱熱氣薰蒸

口多臭氣

蝸牛壹枚大者青黛半錢射香一字黃蘗二錢

右為細末先以菰水洗患處搵乾用鴨毛

點藥少許傅掃患處前參方係鄉中名醫  
王君祥用效之方

小兒走馬疳牙齦腐爛出惡血口臭牙脫右

用雞內金清油燈上燒存性為末搽瘡上

乾則清油調傅雞內金俗云即雞近內黃皮

桃葉湯治天行頭面鼻疳瘡右桃葉二兩搗

碎用水五升煎汁沸去滓洗五七次即安

麝香散治鼻疳肺氣通於鼻鼻者肺之候若

小兒乳食不調上焦壅滯則令疳蟲上蝕於

鼻其鼻中赤痒壯熱多啼皮毛乾焦肌膚瘦

削鼻下連唇生瘡赤爛

麝香半錢雄黃研升麻各二錢白礬枯半

右研勻為末每用少許人乳調勻傅於瘡

上仍服盧蒼朮等藥米大粒粥三十次米

肥兒圓消疳退黃肥肌殺虫

神麴半兩練子去核青皮陳皮史君

子去皮殼麥蘖兩黃連兩蕪荑三稜

莪朮各三錢巴豆十粒去

右先將三稜莪朮陳皮青皮神麩麥蘖同  
巴豆慢火炒少時急傾出將史君子川練  
肉黃連蕪荑都壹處以厚紙緊裹定半箇  
時辰候冷揀去巴豆八粒止留二粒研爲  
極細末麵糊丸如黍米大每服三十九米  
飲送下無時  
雄黃散治小兒牙斷生疳蝕瘡用雄黃壹錢  
銅綠二錢爲細末每用量瘡大小乾貼  
四香三米飲治小兒疳傷聚瀉遺糞帶餽酸

臭氣射至二三尺遠最有神效

木香 丁香

檀香

各等分

藿香葉

加兩早

米 晚米

或陳倉米尤妙

糯米

各等分炒熟

每服半米半藥三錢重水一大盞煎不拘

時候

治疳瘡

甘草 黃柏

馬鞭草

帶鬚葱

荆芥

各等分

若五味煎水洗壹遍後用訶子連肉核燒

爲灰末以射香加輕粉少許傅于患處立愈

治下疳瘡又治玉莖上生瘡

抱鷄卵殼 鷹爪黃連 輕粉各等分

右爲末煎過麻油調塗

小兒頭上生瘡及肥疳瘡右糯米飯燒灰入

輕粉清油調傅 又廬州鼓知錄海上方

以猪筒骨中髓調輕粉傅瘡上早傅晚愈

又漢陽章教授方以樹上乾桃燒存性灰

研爲末用清麻油調傅或暑毒頭塊瘡及面上軟癩亦可

小兒唇口疳瘡蝕爛唇頰膽礬香白芷等分爲末和之滲傅瘡上

小兒妳疳瘡明礬黃丹並飛過於地上出火毒研末用清油調搽濕則乾塗之 又獨

子肥株燒灰存性爲末加輕粉少許清油調塗及治頭上肥瘡

治項軟倒此病不在心脾或曾吐瀉或傷寒

無汗脉或無事卒成此疾若面脣臉皆赤因  
 肝膽受風熱致令筋軟不隨天柱倒宜除風  
 退熱附子生用法天南星切附子皮臍  
 小右為末生姜自然汁調貼項軟患處宜服  
 瀉青丸之

瀉青圓

又名瀉肝丸

當歸

去蘆

龍膽草

焙川芎

山梔子仁

羌活

木防風

去蘆川大黃

濕紙裏煨各等分壹方無大黃

右為末煉蜜和丸雞頭子大每服半丸至  
 一圓煎竹葉湯同沙糖溫水化下其  
 醫林方而瀉青丸小兒大則少不郊其史成  
 治瘧兒一切瘧疾瘧疾香朱砂之蘆薈之蝦蟇之蟬  
 殼青黛等分  
 右為細末陳米米湯為丸如菉豆大每服  
 賣丸米湯化開貼在病人鼻孔內須時頭  
 髮上虫出笑呵呵

至聖餅子

白米各等分蛤粉各等分黃臘與此四等分

木為細末鑄黃臘就作餅子重壹錢每服

壹餅子用白羊肝分開與藥在內清米泔

同煮熟肝和肝湯服之

大黃膏九小兒無辜疳者無辜虫者其虫而

晝寢而夜遊小兒衣服夜不收其虫氣遊

在上其氣感攝小兒腹中為疳其病頭耳

後如瘰癧結核硬者多久不治為瘡癩可

服川大黃不以多少醋煮熬成膏子每服十五

丸至二十丸食後煎皂子湯送下以大小

加減之

小兒急疳唇口臭爛齒宣腫者

乾蟾一個五月白龍骨并雄黃麝香

石膽各等分蘆薈各等分

右為細末少許貼在瘡上仲景云謂小兒

足陽明胃經有熱齒宣漏後可服黃連解

小毒湯

小兒疳瀉眼生雲翳

川烏頭壹兩 蛤粉二兩 粉內

右將蛤粉為末烏頭切作片子每服二錢

用獾猪肝壹兩切開藥在內用線子繫定

米泔煮熟肝湯並服食後服

治小兒脾疳瘦弱頭髮毛乾面色萎黃

黃藥子萬州者好

右為細末每用三二錢水調泥小兒顛門

上絹帛蓋之到來日用水調取下顛門上

有虫出為效

吳氏集驗方

黃連圓治疳

史君子五十 陳皮壹錢 黃連兩

右為末用蒸餅壹箇以猪膽同拌和為餅

子飯上蒸再為末別用蒸餅為圓如蘿蔔

子大每服四五圓如甚者以史君子殼煎

湯下

施圓端效方

小兒疳瘦 大胡黃連丸 膽礬丸 方並見小兒藥

錄直

神效名方 凡四正國城其香口史家干靈散

治小兒脾疳 再取木鼠以蒜博熟圓成藥散

蘆會末 史君子 巴上各等分 以酒釀同拌味為粉

右為細末米飲調下一二錢服之 衛生易簡方同

山居四要

治疳黃用鷄子剉小竅人巴豆淨壹粒紙糊

孔煨熟去巴豆食之隔一二日再喫壹二

簡 衛生易簡方同

新效方

取癖丹治小兒疳癖時發寒熱虛汗焦渴而

色黃瘦肚大青筋頭面四肢浮腫生瘡口臭

牙疳鼻齩 再取水重吞不酸三六丸

定粉 舶硫黃 蜜隨僧 火煨醋淬七次

木香 雷丸 不用紅者 黑牽牛 頭末半生半炒

輕粉 半錢 史君子 三錢 大黃 四兩兩者

右丸味末也壹歲兒服壹錢三歲兒半錢

臨睡米飲調下或隔日湯泡炊餅為丸粟  
米大米飲送下天明取下惡物為驗以粥  
補之忌葷腥一日忌牛馬驢兔等肉并血  
壹百日如下惡物未盡病未全除者七日  
後依前再服病重者不過三次服

小黑龍丸治疔病

大皂角去皮弦乾蝦蟆去腸肚史君子炒  
味各壹兩青黛三錢雄黃各四錢龍膽各四錢  
右六味末之糊丸粟米大每服十丸米飲

下一方加錄錄半兩

截疔丸治五疔

青皮 陳皮 蓬茂 三稜 茯苓 史  
君子 白朮 香附八味各四兩 黃連 蘆會  
各二兩 胡黃連 蕪荑 木香三味各壹兩 麝香另研  
右十三味咬咀入雄猪肚子內壹个入不  
盡則用兩個以線縫定同酒醋於沙鍋煮  
令糜爛取出切碎肚子和藥入臼杵細晒

乾研爲細末入麝香和勻以煮藥汁發爲  
丸粟米大每服二三十丸食前米飲下

胡黃連丸治疳積肚大

胡黃連半錢神麴半錢黃連炒各二錢阿魏壹錢半醋

浸麝香四粒

右五味末之猪膽汁丸粟米大每服二三

十丸白木湯下

治疳黃食積

白木 黃連 苦參 山查壹名棠 毬去核

右四味等分末之神麴糊丸麻子大十五

丸米飲湯下

治疳積

黃連 白木 山查三味各半兩 胡黃連 蘆

會各三錢 蕪荑二錢 神麴四錢

右七味末之猪膽汁丸粟米大二三十九

米飲下

治喫泥

軟石膏 黃芩 陳皮 茯苓 甘草

白朮

右六味等分咬咀水煎服

治牙疳并口鼻耳邊疳瘡柳絲散

人中白末文添無骨其粟米大二三十式

右壹味末之入銅青和令如柳色瘡濕則

乾摻乾則油調山香三和

追癆仙方

柴胡散治童稚骨蒸葱解傷寒後肌熱

柴胡川大黃乾漆炒秦艽甘草

常山各壹兩別甲三兩醋炙

右咬咀每服壹錢中用水壹盞入小麥壹

撮同煎七分冷服

外科精義

治小兒疳口瘡

天南星一个去皮

右為末好醋調攤在紙上男左女右貼在

脚心底以帛繫定三日外取可以溫水洗

盡脚下藥

玉機微義

錢氏木香丸

方見小兒藥證直訣

六味地黃丸治小兒疳瘦不行解頤骨熱見方

小兒藥證直訣

全嬰方蘆薈丸治小兒疳氣腹急骨熱

蘆薈

木香

檳榔

各壹分

黃連

青

蕪荑皮

青皮

陳皮

各半兩

巴豆

三七粒

同上一

四蝦

蟻

酒浸炙黃去骨壹兩

右為末猪膽丸小豆大三歲三十九米湯

下

按此手少陰手足太陰藥也

蒸雞丸治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹

急面黃食不生肌肉

黃連

二兩

柴胡

一兩

蕪荑

鵝虱

各半兩

秦艽

知母

紫葳

史君子

去殼炒各一兩

右為末黃雄雞一隻重壹斤籠之專以大

麻子飼之五日後去毛及腸肚淨入前末

子以線縫之取小籠子先以黑豆鋪籠底

三寸安鷄四旁及上黑豆煮之早蒸至晚  
取肉研和硬入酒糊在如小豆大二歲三  
十丸加減與之米飲下忌猪肉  
按此手少陰太陰足少陽藥也

肥兒丸截疳殺虫治腹脹消食

史均子肉蘿白子各二兩小紅棗兒肉一兩糖

求子未飛羅麵

各一兩

右取好黃土和作一爐墩子內底下蘿白  
片鋪壹層次將史君子肉鋪在當中次又

鋪蘿白膏層上安棗肉蓋於上以泥封固  
其外以炭火煨至內三物熟爛了取出以  
飛麩求子末和勻丸如麻子大量兒大小  
與服米飲下  
按此是陽明太陰藥也

五疳消食丸消疳殺虫退熱磨積進食

史均子肉炒麥蘖炒陳皮炒木麥麩炒蕪荑

草龍膽炒黃連炒糖球等

右爲細末陳皮飯爲丸如黍米大每十九

米飲下末刺以粥飲此散黍米大粒十枚  
按此手少陰太陰藥也然疳證自有虛實  
積熱等致不同已上諸方未能以盡其變  
正學者自宜推格治之  
壽域神方

治走馬疳用陳醬茄兒燒灰爲末入射香輕  
粉少許貼患處  
一方用黑貓兒頭壹箇燒灰爲末酒糊服妙  
治牙疳用白礬裝於五倍子內合燒過爲末

貼之

衛生易簡方

十五疳五軟

治脾胃積熱成疳用龍膽草黃連蕪荑去皮  
先炒黃各壹兩次人上二味一處炒赤爲  
末入蘆薈末壹分和勻飯飲丸如黍米大  
隨大小加減空心米湯下  
治疳瘦久服消食和氣長肌肉用陳皮壹兩  
黃連兩半米泔浸壹日爲末入麝香半錢

研勻用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候  
臨熟以針微刺破以熟爲度取出用粟米  
粥和丸如棗豆大每服十九至二十九米  
飲下量大小與服不拘時  
治疳渴用草龍膽定粉炒烏梅肉焙黃連各  
二分爲末煉蜜丸如麻子大米飲下一二  
十九不拘時

治疳瘦用端午日取蝦蟆以油單裹裂其眉  
酥出單上以朱砂麝香爲丸如麻子大空

心服一丸腦疳以乳汁調灌鼻中及拾  
切惡瘡

治小兒屍疰勞瘦或時寒熱用死蟹頭壹枚  
燒灰爲末新汲冰調半錢此下  
治小兒面黃肌瘦肚大筋青乳食入口卽吐  
用丁香七枚爲末以無病婦人生子乳汁  
取盞內和末勻蒸熟作三次服卽愈  
治小兒黃瘦腹脹用乾雞糞壹兩丁香末壹  
錢蒸餅爲丸如小豆大每服二十九米湯

送下  
治小兒疳瀉眼生暈用川烏壹兩炮裂蛤粉  
二兩炒爲末每服二錢用獾猪肉一兩生  
切開置藥在內麻皮繫定米泔煮熟食後  
與湯並服之  
治疳殺虫和胃止瀉用胡黃連黃連白蕪荑  
蘆會木香青皮雷丸被開白者佳赤者勿  
用鶴虱炒各半兩麝香壹錢別研爲末粟  
米飯丸如菜豆大米飲下壹百十九丸不拘

時

治小兒熱疳用胡黃連川黃連各半兩朱砂  
一錢半別研爲末入猪膽內繫定虛懸於  
銚中煮一飯久取出入蘆會青黛各二錢  
半麝香少許粳米飯丸如麻子大每服十  
丸米飲下  
治小兒走馬牙疳用蠶退紙燒灰存性入麝  
香少許研勻貼患處  
治牙疳用茴香桔梗燒灰存性爲末傅乾則

油調擦

治小兒鼻疳瘡并耳後瘡用黃連末傅之日

命三四度

治小兒五六歲骨氣虛筋脉弱不能行用

羊角白茯苓虎脛骨醋塗炙酸棗仁炒生

乾地黄各半兩苦者桂心防風當歸炒各

壹分爲末煉蜜凡如菜豆大食前温酒研

破三五丸服一月後漸能行走

治小兒食土炭黃瘦用青胡桃皮曝乾爲末

水糊丸如菜豆大每服五七丸温水送下

治小兒食土黃似金色用黃連水煎濃汁和

愛食之土日乾與食自不食也

命價鈎玄

疳病肚大

小胡黃連

半錢能去果子積 阿魏 半錢去肉神曲二錢

炒去食積 黃連 二錢炒射香少許

右丸如黍米大每服二三十丸白朮湯下  
小兒疳病腹大黃連丸白朮湯下二十粒

小諸疖鍼灸 人出髮八白木鬚二十餘

拔粹方 賊毒米大吐涎二三寸以白米齒下

灸疖瘦法 灸疖瘦法

小兒疖瘦於脊下鳩尾骨尖上灸三壯次於

脊下端尾翠骨尖上灸三壯

命門灸法

要灸法 灸法

小兒疖瘦 灸法

小兒疖瘦 灸法

驚癇 附驚悸 目錄

論

驚癇一

千金方

龍膽湯 大黃湯 白羊鮮湯 茵芋圓

鎮心圓 丹參赤膏 五物甘草生摩膏

千金翼方

小兒

礬石圓 雙丸

小兒藥證

小兒風癩驚章

下風癩驚弔歌

小兒邪忤驚殞章

邪忤驚殞歌

海上仙方

聖惠方一

治小兒驚悸諸方

茯神散 人參散 蚱蟬散 遠志煎

鐵粉煎 金泥煎 天竹黃丸 天牛黃丸

天竹黃丸 竹瀝磨犀角飲子

治小兒心熱夜卧多狂語諸方

犀角散 赤茯苓散 黃連散 犀角散

牛黃散 竜腦散 朱砂丸

治小兒驚熱諸方

犀角散 釣藤散 竜齒散 天竹黃散

竜齒散 龍腦散 虎睛丸 扶神散

朱砂散 牛黃散 延齡散 鐵粉丸

虎睛丸 大黃丸 半黃丸 鐵粉丸

鎮心丸 犀角丸 鈆霜丸 青黛丸

真珠丸 鈆霜丸 朱砂丸 真珠丸

保童丸 胡黃連散 牛黃丸 鐵粉丸

龍膽丸 川消散 土瓜丸

治小兒慢驚風諸方

白殭蠶散 龍腦散 牛黃丸 犀角散

牛黃丸 烏犀散 麝香散 天竹黃散

朱砂散 真珠丸 比金丸 天竹黃丸

天麻丸 青黛丸 牛黃丸 丁香丸

朱砂丸 保命丸 朱砂丸 如聖丸

七聖丹 水銀丸 保生丹 烏犀丸

延生丹 五靈脂丸 龍齒丸 萬靈丹

迴生丹 返魂丹 黃連丸 龍腦丸

玉液丹 天漿子丸 犀角丸 麝香丸

天南星煎丸

小兒門 十九

驚癇 三

聖惠方二

治小兒急驚風諸方

天麻丸 定生丸 救生丹 雄黃丸  
 蠍尾散 返魂丸子 定命丹 中黃丸  
 天漿子丸 牛黃丸 白附子丸 龍腦  
 丸 鶴壽丹 紅丸子 極聖丸 蟾酥  
 丸 朱砂丸 水銀丸 雄黃丸 百靈  
 丸 真珠丸 虎睛丸 追風丸 宣風  
 丸 乾蠍丸 青黛丸 天南星丸 青

黛丸 續隨子丸 朱砂丸 壞涎丸

水銀丸 碧霞丹 挫藥丸 疳積散

犀角在小天竹葉散 牛黃散 石朱砂散

朱黃散 犀角散 水銀丸 牛黃丸子

露蜂房丸 天竹葉丸 白蠟黃精 水銀

丸 天竹葉丸 水銀丸 犀角散 支參散 鎮

天麻散 天麻散 天麻散 天麻散 天麻散

天麻散 天麻散 天麻散 天麻散 天麻散

蚱蟬散 水銀丸 牛黃丸 保嬰丹  
 丹 保命丹 天鈎藤丸 天麻丸 蟬殼  
 丸 朱砂丸 托聖歸命丹 玄參丸  
 天南星丸 麻粉丸 白蘆薈散 條生  
 丸 備急塗頂膏 小兒疳積散 牛黃散  
 治小兒疳積發熱諸方 朱砂散  
 牛黃散 扶神散 鈎藤散 龍齒散  
 清涼散 紫黃丸 坐身汁 飲子 石膏  
 湯 蘇合散 小兒 未成 與  
 湯

治小兒一切癩諸方  
 朱砂散 天麻散 虎睛丸 虎睛丸  
 牛黃散 牛黃丸 蛇脫皮散 鈎藤散  
 蚱蟬散 小麻黃散 犀角散 石膏散  
 鈎藤散 太黃膏 雷丸膏 天竹黃散  
 水銀丸 白牛黃散 七寶鎮  
 心力 扶神散 犀角散 虎睛丸 蛇  
 蛻皮散 雄黃散 牛黃丸 黑金丹

牛黃散 水銀丸

治小兒熱癩諸方

鈎藤散 伏神散 白鮮皮散 子苓散

鈎藤散 小麥門冬散 犀角散 梔子散

升麻散 紫石英散 牛黃丸 虎睛丸

治小兒驚癩諸方

鈎藤散 牛黃散 蛇蛻皮散 紫石英

散 鈎藤散 白鮮皮散 牛黃散子

朱砂丸 犀角丸 鎮心丸 犀角丸

虎睛丸 至寶丸 龍腦丸 鈎霜丸

蛇黃丸 鈎藤煎 蚱蟬煎 犀角煎

寒水石散 麻黃拭體湯 天丹參摩膏

治小兒食癩諸方 正頭小兒

代赭丸 虎睛丸 朱砂丸 真珠丸

牛黃丸 雄黃丸 真珠丸 防葵丸

鈎霜丸 金薄丸 天熱平丸 鈎霜丸

治小兒癩癩諸方 鈎霜丸

鐵粉丸 雄黃丸 虎睛丸 地竜散

虎睛丸 雌黃丸 朱砂丸

治小兒患癩病差後復發諸方

紫金散 鈎丹丸 天漿子丸 鴟頭丸

和劑局方

定命丹 八珍丹 太一銀朱丹 軟金

丹 返魂丹 至聖丹 五福化毒丹

大天南星圓 虎睛圓 天麻防風圓

金箔鎮心圓 比金圓 水銀福圓子

牛黃膏 辰砂金箔散 朱砂圓 太一

丹 大驚圓 睡驚丹 至聖保命丹

鎮心至寶丹 蛇頭圓 辰砂茯神膏

防風導赤散 寧神膏

小兒門 三寸

驚癩 四

小兒藥證直訣

涼驚丸 粉紅丸 瀉青丸 安神丸

紫霜丸 牛黃丸 宣風散 麝香丸

大惺惺丸 小惺惺丸 銀砂丸 三聖

丸 小紅丸 小小黃丸 鐵粉丸 銀液  
丸 鎮心丸 金箔丸 辰砂丸 翦刀  
股丸 射蟾丸 軟金丹 蟬花散 鈞  
藤飲子 豆卷散 龍腦散 五福化毒  
丹 全蝎散 至寶丹 紫雪 青州白  
圓子

大全本草

三因方

急慢驚風證治

助道方

治小兒急慢驚風

治小兒中暑發搐證

人足齋醫方

全圖急慢驚風膏

奪命散 青金元 辰砂蝎梢膏 保生元

抱竜丸 萬金丹 百枝膏

瓊碎錄

鮮簡易方

抱龍圓 奪命金丹

直指小兒方

此方驚風方論代

發命驚風證治

全蝎散 羌活膏

人參散 至寶圓

消驚圓 小厘驚圓 安驚圓

定心圓

驚熱方論

百效膏

星香散

驅癩散

雌黃散

參砂膏

驚熱證治

犀角湯

銀棗湯

清心圓

菴神圓

瞻星圓

羚羊角湯

胎驚方論

胎驚證治

太一散

參蝎散

猪乳膏

全蝎散

朱射散

獨活湯

朱銀圓

通關定驚方論

通關定驚證治

開關散 開牙散 噫驚散 開關聖散

截風定搐治法

人參羌活散 截風圓 一字散 陽癩

散 擒風湯 定搐散 木通散 清寧

散 阿膠散

治驚輕下法

定命丹 利驚圓 防風湯 枳殼散

小柴胡湯

治驚稍重下法

揭風湯 朱砂膏 疎風散 小柴胡湯

治驚重下法

青金圓 天麻圓 合蘆會散 牛黃涼膈

圓 青金丹 京墨圓

和胃助氣治法

生氣散 銀白散 茯苓二陳湯 異功

散 一天麻蘇合香圓 參苓白朮散 和

中散 醒脾散

定志寧神治法 小圓 百林膏

定志圓 溫膽湯 定心圓 百枝膏

中州方傳慢驚證治

六一保生丹 聚寶丹 蟬蝎散 神保

既濟丹 來復丹 惺惺散 醒脾散

大醒脾散 溫白圓

已傳慢驚證治

星香全蝎散 定命散 四聖散 烏蝎

四君子湯 南星散 烏沉湯 沉香散

附風慢驚下痰證治

天南星圓 蘇合香圓 白元子 神保

既濟丹 礞石散 靈脂圓 七珍圓

慢脾風生胃回陽治法

黑附湯 川烏散 金液丹 生附四君

子湯 蝎附散 陰癇散 靈砂 震靈丹

慢脾風下痰證治

神保既濟丹 金白僵蚕圓 辰砂膏 七

寶妙砂丹 木香散 厚

急慢脾風證治

星蘇散 木通湯 神聖圓 虎蝎圓

南星醒神散 鎮心圓 木香湯 乳麝

圓 六一萬金丹 香餅子 至聖保命

丹 蟾蜍散 快脾湯 助胃膏 沉附

湯 鎮痰圓 利痰圓 靈砂 靈砂

驚積方論 金砂丸 止瀉丸

驚積證治

辰砂膏 青龍圓 朱銀圓

天南天癆方論 白公千

天癆證治

釣藤飲 保命丹

驚風內癆方論

附盤腸氣虫痛

驚風內癆證治

乳香圓 木香圓 白豆蔻散 蘿蔔子

散 化虫圓 安息香圓 茴香散 芎

歸散 養臟湯

風癩證治

散風丹 保安圓 獨活湯 細辛大黃

湯 牛黃圓

驚癇證治

比金膏 鎖驚圓 虎睛圓 七寶鎮心

圓 清神湯 蜜陀僧飲 茵陳酒 蘇合

丹 食癇證治 白豆蔻 蘇合

紫霜圓 妙聖丹 天麻圓

定癇治法

五癇圓 南星散 猪心湯 雌黃圓

蛇黃圓 斷癇圓 當歸大黃湯 蝎虎

散 代赭石散 日應丹 地龍散 定

癇圓 全蝎五癇圓 金朱丹 竜膽湯

星朱散 猪膽南星散 肥兒圓 肥兒

圓 朱氏集驗方

驚

辰砂丸 蜈蚣丸 龍齒散 羌活膏

羌活丸 防風天麻散

修月魯般經後錄

鎮驚圓

三法六門

碧雲散

保童秘要

驚

荆芥丸

水銀丸

朱砂丸

鎮心丸

黃散子

青金丸

虎睛丸

藿香散

黑神散子

鬱金散

宣明論

龍腦地黃膏

分肢散

珍珠丸

朱砂

九心鬱金散

澤瀉散

鎮庭散

定命

散風碧雲散

東垣試効方

正淋治驚各有所因用藥不同論三

益黃散辯

人參安胃散 梔子茯苓湯 茯苓滲濕

湯 升陽益血湯 厚腸丸 補陽湯

中滿分消丸 消痞丸 麻黃升麻湯

蘭室秘藏

附錄

治驚論

治驚論

治驚論

治驚論

黃芪湯

益黃散

益黃散

御藥院方

玉柱杖散 珍珠丸 麝香散 三味天

漿子散 五味天漿子散 通聖餅子

引風湯 聚寶膏

小兒門

小兒門

小兒門

驚癩

驚癩

驚癩

驚癩

驚癩

御藥院方

雙金散 烏犀丸 大小銀珠丹 菖蒲

湯 鎮心丸 虎睛膏 丹砂鎮心丸

五味麝香餅子 祛風墜涎丸 青芝散

乾蝎天麻散 安牛黃丸 太一散 斷癩

丸 人參茯神湯 寧眠散 安神散

醒風煎 八物定志丸 釣藤丸 牛黃

丸 丹砂虎睛丸 七味羌活膏 胡黃

連丸 薰陸香丸 雄黃丸 香扇角散

天麻散 安神丹 水味麝香餅子 全

蝎散 丹砂散 水末 養神膏 四黃

得效方 八神靈 志水 隨蒸水 半黃

水 驚候 蘇附天術 寧溫端 安神丹

天安神圓 州安神圓 式涼驚小驚圓 瀾通

心飲 潤火青膏 利驚蟬退散 利驚圓

人參湯 涼肝圓 乳瀾膏 丹砂散 小式

雙金急驚 烏丸水 大小建粒代 首龍

涼肝圓 利大青膏 加味壽星圓 芎活

湯州釣藤飲

慢驚

白朮散 益黃散 安神圓 冬瓜仁湯

南星飲 防風圓 觀音散 五苓散

南附湯 星丁附湯 蘇合香圓

小童慢脾 附湯 養神膏 養五散

金液丹 青州白圓子

截風

蛇頭元 大風膏 奪命散 防風溫膽

湯 人參羌活散

秘命散

調和散

諸癩

人參羌活散 牛黃清心圓 蛇頭圓

小驚圓 南附湯 紫霜圓 養正丹

猪膽南星散 肥兒圓 合香圓

澹軒方

截驚

驚搐

肘後方

蛇蛻湯 大黃湯 萬病湯

澹察方

一字散 蝎稍餅子

衛生寶鑑 蘇合散 青金丹

驚癇治驗 蘇合散 蘇合散

沉香天麻湯

急驚

地黃丸 妙香丸 小抱龍丸 鎮肝丸

天麻散

慢驚

史君子丸 羌活膏 小兒驚熱

聖濟總錄

小兒驚熱

釣藤飲 雄黃散 犀角散 鐵粉煎

命薄丸 丹砂虎睛丸 青金丹 紫霜

散 蠟梢丸 犀角餅子 金粟丸 牛

黃丸 丹砂丸 丹砂丸 天竺黃散

熊膽丸 小天南星丸 至聖青金丸

鎮心丸 丹砂餅子 鈎白霜丸 天竺

黃散 赤茯苓湯 鎮心散 大黃甘草

飲 凝水石散 丹砂丸 天竺黃丸

美小兒急驚 藥散 龍腦散 必勝散

剪刀股丸 水銀丸 青金丸 牛黃丸

龍齒散 丹砂散 聖紅散 必勝散

童腦水銀丸 巨聖散 銀朱丸 青黛

丸 中分散 白虎丸 鶴頂丹 佛手

散 碧霞丸 轉紅丸 黑神丸 轉金

丸 牛黃丸 小丹砂丸 黑蠟梢散 麝香  
 花蛇丸 小兒慢驚風 琥珀丸 乾蠟散  
 如聖青金丸 羌活丸 琥珀丸 回魂  
 煎 天南星煎丸 紫霜散 乾蠟散  
 羌活煎 歸魂丸 真珠丸 丁香丸  
 五靈脂丸 乳香丸 乾蠟天麻散 麻  
 黃散 罷插煎 萬靈丹 犀角丸 龍  
 腦丸 盧會散 再生丸 睡脾散 天鈞

藤煎 麝香餅子 天麻丸 桃紅散  
 天竺黃散 小兒驚悸 紫金散 人參湯  
 釣藤湯 牛黃散 大丹砂丸 丹砂丸  
 天竺黃散 麥門冬湯 扶神湯 真珠丸  
 大鎮心丸 金薄丸 拔粹方  
 安神丸 導赤散 豆蔻香連丸 涼驚丸

安瑞竹堂方

神效萬金丹 萬金丹

金醫方大成

胎驚風散

真珠散

急慢驚風

紅絲散 抱龍圓 金星圓 生珠膏

八仙散 釀乳法 醒脾散 蝎烏湯

木附湯

天弔

九龍控涎散 釣藤飲 細辛大黃湯

大聖一粒金丹

袖珍方

急慢驚風

牛黃膏 辰砂保命丹

省翁活幼口議

真珠天麻圓 却風散 揭風湯 青金

圓 截風丹 定搐散 煖金丹 益神

定志圓風牛黃清心涼膈元牛黃散

天竺黃散保命丹

小兒門二十二

驚癇

省翁活幼口議二

觀音全蝎散犀角散醒脾散神保

既濟丹定命飲子白殭蠶圓附硫

圓黑附湯辰砂膏七寶妙砂丹

化風丹比金丹奪魂散踈風散

小牛黃圓

永類鈴方

初有痰熱未有驚風先且解表

香蘇散參蘇飲惺惺散

急驚輕下法

牛黃清心元比金元命太白散防風

元全蝎散火府散金星元

急驚重下法

驅風膏睡安散蛇頭元醒脾散

驚風慢驚方傳證治

清脾飲 小續命湯 神寶丹 醒脾散

大醒脾散 烏蝎四君子湯 蘇合香元

八味青州白元子 奪命散 白朮 川芎

驚風內弔

乳香圓 桃符圓

經驗良方

小兒諸驚風癇搐等疾

延壽睡驚丹 芎蝎散 油珠膏 木通

散 順經散 千金湯 白丁香圓 當

歸散

蘇醫林方

麝香青餅子 銀白丹

施圓端效方

雞脛丸

吳氏集驗方

通關散 三烏圓 南星膏

山居四要

新效方

黑龍丸 奪命丹

急救仙方

秘傳外科

徐氏胎產方

增添

桃紅散 保命丹 保童丹

玉機微義

涼驚丸 天麻防風丸 睡紅散 朱砂

安神丸 奪命丹 比金丸 利驚丸

溫驚丸 羌活膏 保生錠子 麝香餅

全蝎散 奪命散 藥釣藤 飲子 寧心膏

天麻散 百喙驚開關散 探生散 吐風

散 聖碧雲散 命天霜散 利驚丸 驅風

膏 金珍珠丸 通關散

運仙玄樞

壽域神方

衛生易簡方

急慢驚風

天吊

風癇

音金圍鉤玄

補聖甲黃奪命散

天備預百要方

金澤精

食治

鍼灸

驚癇

巢氏病源

驚候

小兒驚者由血氣不和熱實在同心神不定所以發驚甚者掣縮變成癇又小兒變蒸亦微驚所以然者亦由熱氣所為但須微發驚以長而脉不欲大驚大驚乃灸驚脉若五六日灸者驚復更甚生百日後灸驚脉乃善耳

欲發癩候

夫小兒未發癩欲發之候或溫壯連滯或搖頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒如此是欲發癩之證也

發癩癢後身體頭面悉腫滿候

凡癩發之狀或口眼相引或目睛上搖或手足掣縱或背脊強直或頭項反折或屈指如數皆由以兒當風取涼乳哺失節之所爲也其癩癢後而腫滿者是風癩風癩因小兒厚

衣汗出因風取涼而得之初發之狀屈指如數然後掣縮是也其癩雖癢氣血尙虛指如未盡在皮膚與氣相搏致令氣不宣泄故停并成腫也

發癩癢後六七歲不能語候

凡癩發之狀口眼相引或目睛上搖或手足癱瘓或脊背強直或頭項反折屈指如數皆由以兒當風取涼乳哺失節之所爲也而癩發癢後不能語者是風癩風癩因兒衣厚汗

出以兒乘風取涼太過為風所傷得之其初發之狀屈指如數然後發癩瘥是也心之聲為言開竅於口其癩發雖止風冷之氣猶滯心之絡脉使心氣不和其聲不發故不能言也

千金方

驚癩

少小所以有癩病及瘥病者皆由臟氣不平故也新生即癩者是其五臟不收斂血氣不

聚五脉不流骨怯不成也多不全育其一月四十日已上至暮歲而癩者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣瘥驚啼叫喚而後發癩脉浮者為陽癩病在六腑外在那膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰癩病在五臟內在骨髓極難治也病發身軟時醒者謂之癩也身強直反張如弓不時醒者謂之瘥也諸反張大人脊平容側手小兒容三指者不可復治

也凡脉浮之與沉以判其病在陰陽表裏耳  
其浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸證各依  
脉形爲治神農本草經說小兒驚癇有壹百  
二十種其證候微異於常便是癇候也初出  
腹血脉不斂五臟未成和將養失宜卽爲病  
也時不成人其經變蒸之後有病餘證並實  
惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息  
小異欲作癇及變蒸日滿不解者並宜與  
膽湯凡小兒之癇有三種有風癇有驚癇有

食癇然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一  
二是風驚者凡是先寒後熱發者皆是食  
癇也驚癇皆按圖灸之風癇當與猪心湯食  
癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風癇者  
緣衣暖汗出風因入也風癇者初得之時先  
屈指如數乃發作者此風癇也驚癇者起於  
驚怖大啼乃發作者此驚癇也驚癇微者急  
持之勿復更驚之或自止也其先不哺乳此  
而變熱後發癇者此食癇早下則瘥四味紫

九逐癖飲最良去病速而不虛人赤丸赤丸無  
方諸醫方並無按世服四味紫丸不得下者  
當以赤丸赤丸差駛病重者當用之今大後  
癥結脹滿篇中第一方人味名紫丸者用  
朱砂色當赤用巴豆又用甘遂此紫丸當駛  
疑此即差駛病重者常用之凡小兒不能乳  
赤丸也 哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有  
 微惡則須下之必無所損及其愈病則致深  
 益若不時下則成大疾疾成則難治矣凡下  
 四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四  
 味紫丸不得下者當以赤丸下之赤丸不下

當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作齋  
 膳湯稍稍服之并摩赤膏方見風癩亦當下  
 之然當以猪心湯下之驚癩但按圖灸之及  
 摩生膏方見不可太下也何者驚癩心氣不  
 定一作下之內虛益令其兩驚癩甚者特為  
 難治故養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之  
 間當安徐勿令驚怖又天雷時當塞兒耳并  
 作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長  
 其血脈但不欲大驚大驚乃灸驚脈若五六

十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脈乃善  
兒有熱不欲哺乳卧不安又數驚此癩之初  
也服紫丸便愈不愈復與之兒眠時小驚者  
一月輒一以紫丸下之減其盛氣令兒不病  
癩也兒立夏後有病治之慎勿妄灸不欲吐  
下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱湯散見傷寒  
除熱赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處  
勿禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹  
中乳食不消不消則大便皆醋臭此欲爲癖

之漸也便將紫丸以微消之服法先從小起  
常令大便稀勿大下也稀後便漸減之不醋  
臭乃止藥也凡小兒冬月下無所畏夏月下  
難瘥然有病者不可不下下後腹中當小脹  
滿故當節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒  
當令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減  
少者此腹中已有小不調也便微服藥勿復  
哺之但當與乳甚者十許日微者五六日止  
哺自當如常若都不肯食哺而但欲乳者此

是有癖爲疾重要當下之不可不下不亦則  
致寒熱或吐而發癩或更致下痢此皆病重  
不早下之所爲也此卽難治矣但先治其輕  
時兒不耗損而病可速愈凡小兒屎黃而臭  
者肚腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白而  
醋臭者此挾宿寒不消也當服紫丸微者少  
與藥令內消甚者小增藥令小下皆復節乳  
哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復  
復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尙

可過則傷矣凡小兒有癖其脉大必發癩此  
爲食癩下之便愈當審候掌中與三指脉不  
可令起而不時下致於發癩則難療矣若早  
下之此脉終不起也脉在掌中尙可早療若  
至指則病增矣凡小兒腹中有疾生則身寒  
熱寒熱則血脉動動則心不定心不定則易  
驚驚則癩發速也

候癩法

夫癩小兒之惡病也或有不及求醫而致困

者也然氣發於內必先有候常宜審察其精神而採其候也 手白肉魚際脉黑者是癩候魚際脉赤者熱 脉青大者寒脉青細者爲平也鼻口乾燥大小便不利是癩候 眼不明上視喜陽是癩候 耳後完骨上有青絡盛卧不靜是癩候青脉刺之令血出也 小兒髮逆上啼笑而暗色不變是癩候 鼻口青時小驚是癩候目閉青時小驚是癩候 身熱頭常汗出是癩候 身熱吐沫而喘是

癩候 身熱目時直視是癩候 喜欠目上視是癩候 身熱目視不精是癩候 目瞳子卒大黑於常是癩候 卧惕惕而驚手足振搖是癩候 卧夢笑手足動搖是癩候 意氣下而妄怒是癩候 咽乳不利是癩候 身熱小便難是癩候 吐痢不止厥痛時起是癩候 弄舌搖頭是癩候 已上諸候二十餘條皆癩之初也見其候便爪其陽脉所應灸爪之背重手令兒驟啼及足絕脉亦依

方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口  
噤不得乳反張脊強汗出發熱爲胃不悟手  
足掣痙喜驚凡八條癰之極者也如有此非  
復湯爪所能救便當時灸之  
若病家始發便來請師師可診候所解爲法  
作次序治之以其節度首尾取瘥也病家已  
經雜治無次序不能制病病則變異其本候  
後師便不知其前證虛實直依其後證作治  
亦不得瘥也要應精問察之爲前師所配依

取其前蹤跡以爲治乃無逆耳前師處湯本  
應數劑乃瘥而病家服壹兩劑未效便謂不  
驗已後更問他師師不尋前人爲治寒溫次  
序而更爲治而不次前師治則弊也或前已  
下之後須平和療以接之而得瘥也或前人  
未下之或不去者或前治寒溫失度後人應  
調治之是爲治敗病皆須邀射之然後免耳  
不依次第及不審察必及重弊也  
和劑指南

論小兒急驚證

急驚者皆因風邪干於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定忽然驚搐渾身拘急筋脈抽掣若有此候須先問曾瀉不曾瀉曾吐不吐如不吐瀉忽然發熱手足抽搐目睛上視面赤口乾此急驚證也可與天麻防風圓蛇頭圓蝎梢散牛黃膏睡驚圓至寶丹金箔鎮心圓感風傷寒作熱氣急痰涎咳嗽或日間發搐或睡中發搐此乃夾驚證也當先發表可與

人參羌活散惺惺散少出汗如驚未退更服天麻防風圓墜痰傷食發急驚者其證作熱面赤煩渴亦當先發表可與惺惺散人參羌活散次服紫霜圓換積圓感應圓消散積氣次服前件防風圓之類

論小兒慢驚證

慢驚者皆因乳哺不調或食粘膩臟腑壅滯及積熱爲風邪所傳入於臟腑乍冷乍熱心神不定脾胃感冷或時嘔逆身體溫壯手足

不定睡中強亂頃目乍赤乍黃此乃慢驚或吐瀉俱作忽然發驚而手足不甚抽搐時瘳瘳及睡中露睛唇白手足冷口中氣亦冷切不可與急驚藥誤人多矣但可與金液丹四粒青州白圓子二粒同研粥飲灌之如稍惺惺減金液丹加白圓子更與粥飲服理中湯益黃散參苓白朮散乳食後可與鎮心至寶丹或與金箔圓兼服令乳母忌生冷動風毒物亦令乳母服理中圓喜禾散之類

論小兒胎驚證

胎驚風者因乳母觸冒寒暑邪氣傷人於胎中生兒之後洗浴當風冷觸於臍邪氣不除變成胎驚之候百日之內頻頻煩燥啼哭無時目睛上視睡中搐搦或身冷頭面赤糞如青黃水者可與保生散每服壹字薄荷乳汁調下更用琥珀圓調理乳母更用服和氣藥調理

小兒藥證直訣

驚癩發搐男發搐目左視無聲右視有聲女  
 發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有  
 發時證 凡此症皆因風邪內侵  
 早晨發搐因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視  
 手足動搖口内生熱涎項頸急此肝旺當補  
 腎治肝也補腎地黄丸治肝瀉青丸主之  
 日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸  
 目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖  
 此心旺也當補肝治心導赤散涼驚丸

補肝地黄丸主之 此藥無邪香代為風必游  
 日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目  
 微斜視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃  
 水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝  
 瀉青丸治心導赤散主之 凡此症皆因風邪內侵  
 夜間發搐因潮熱亥子丑時不甚搐而臥不  
 穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀  
 褐色乳食不消多睡不省 一本云不當補脾  
 治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸主

之... 傷風後發搐傷風後得之... 中氣出熱阿欠  
頓悶手足動搖當發散大青膏主之小兒生  
本怯者多此病也... 傷食後發搐傷食後得之身體溫多唾多睡  
或吐不思飲食而發搐當先定搐搐退白餅  
子下之後服安神丸... 百日內發搐真者不過三兩次必死假者發  
頻不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋

血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口  
中氣出熱也治之可發散大青膏主之及用  
塗額浴體法

急驚因聞大聲或大驚而發搐發過則如故  
此無陰也當下利驚丸主之小兒急驚者本  
因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小  
便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此  
陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不  
可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也

小兒熱痰客於心胃因聞聲非常則動而驚  
搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐  
慢驚因病後或吐瀉脾胃虛損瀝身冷口鼻  
氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡瞳露睛此無陽  
也括蕪湯主之 凡急慢驚陰陽異證切宜  
辨而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗  
方多不分別誤小兒甚多 又小兒傷於風  
冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼  
藥治之又不能已謂之本傷風醫亂攻之因

脾氣卽虛內不能散外不能解至十餘日其  
證多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而  
爲瀉當去脾間風風退則利止宣風散主之  
後用史君子丸補其胃亦有諸吐利久不差  
者脾虛生風而成慢驚

五癩凡治五癩皆隨藏治之每藏各有壹獸  
並五色丸治小病也 犬癩反折上竄大叫  
肝也 羊癩目瞪吐舌羊叫心也 牛癩目  
直視腹滿牛叫脾也 雞癩驚跳反折手縱

雞叫肺也 猪癩如尸吐沫猪叫腎也五癩  
重者死病後甚者亦死  
預說驚疾廣親宅七太尉方七歲潮熱數日  
欲愈錢謂其父二大王曰七使潮熱將安八  
使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使  
病錢曰八使過來日午間即無苦也次日午  
前果作急搐召錢治之三日而愈蓋預見日  
直視而顙赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲  
冷此熱甚也肌膚素肥盛脉又急促故必驚

搐所言午時者自寅至午皆心肝所用事時  
治之瀉心肝補腎自安矣

陰癩壞病東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之  
至虛變慢驚其候睡露睛手足痠痲而身冷  
錢曰此慢驚也與括糞湯其子胃氣實即開  
目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥  
利之醫留八正散等數服不利而身復冷令  
錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷  
王曰已身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中

虛若利大小便即死久即脾腎俱虛當身冷而閉日幸胎氣實而難衰也錢用益黃散史君子圓四服令微飲食至日午果能飲食所以然者謂利大小便脾胃虛寒常補脾不可別攻也後又不語諸鑿作失音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不噤而口不緊也諸鑿不能曉錢以地黃丸補腎所以然者用涼藥利小便致脾腎俱虛今脾已寔腎尚虛故補腎心安治之半月而能言一月而痊

也搐別真假李司戶孫病生百日發搐三五次請眾鑿治或作天弔或作胎驚或作驚癇皆無應者後錢氏用大青膏如小豆許作一服發之復與塗顛法封之及浴法三日而愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯被風傷之子不能任故發搐頻發者輕何者客風在內每遇不在即搐搐稀者是內臟發病不肯救也頻搐者宜散風冷故用大青膏不可多服盡兒至小易虛易實多即生熱止壹服而已更當

封浴無不效者  
 發搐逆順李寺丞子三歲病搐自卯至巳數  
 鑿不治後召錢氏視之搐自右視大叫哭李  
 曰何以搐右錢曰逆也李曰何以逆曰男為  
 陽而本發左女為陰而本發右若男目左視  
 發搐時无聲方發時右視無聲左視有聲所  
 以然者左用右肺肝木肺金男目右視肺勝  
 肝也金來刑木二臟相戰故有聲也治之瀉  
 其強而補其弱心實者亦當瀉之肺虛不可

瀉肺虛之候悶亂哽氣長出氣此病男反女  
 故男易治於女也假令女發搐目左視肺之  
 勝肝又病在秋即肺兼肚位肝不為任故叫  
 哭當大瀉其肺然後治心續肝所以俱言目  
 反右視者乃肝主目也凡搐者風熱相搏於  
 內風屬肝故引見之於目也錢用瀉肺湯瀉  
 之二日不悶亂當知肺病退後用地黃丸補  
 腎三服後用瀉青丸涼驚丸各二服凡用瀉  
 心肝藥五日方愈不妄治也又言肺虛不大

瀉者何也曰設令男目右視木反尅金肝旺  
勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故  
當補其肺慎勿瀉也  
小兒急慢驚古書無之惟曰陰陽癘所謂急  
慢驚者後世明之耳正如赤白痢之類是也  
陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病  
曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可悞  
也  
急驚由有熱熱即生風又或因驚而發則自

上目劄涎潮搐搦身體與口中氣皆熱及其  
發定或睡起即了了如故此急驚證也當其

搐勢漸減時與鎮心治熱藥一二服

直訣中  
鎮心丸抱龍丸辰砂丸

候驚勢已定須使以  
及至寶丹紫雪

藥下其痰熱丸之類或用大黃朴硝等藥利  
下痰熱心神安寧即愈

慢驚得於大病之餘吐瀉之後或誤取轉致

脾胃虛損風邪乘之凡小兒吐瀉不止必似

搐而不甚搐此名似睡而精神慢四肢與口

中氣皆冷睡露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也宜急治之驚風或洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之之多弥好之

凡小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐但扶持不可掙捉蓋風氣方盛恐流入筋脉或至手足拘攣治急慢驚世人多用一藥有性温性凉不可泛

用宜審別之又治慢驚藥宜去龍腦縱須合用以温藥為佐或少用之

簡易方以不詳之不可以如此

□□情中之一也古人於小兒論中不言

善怒□憂思恐而獨言驚者小兒初生氣脉

未定精神未全天之所稟者混然一真七情

雖具而未有愛著但念乳食餘無所知喜怒

悲憂思恐皆動於中惟驚從外來神氣無雜

一有所觸悸動不安啼叫搐搦嘗原喜怒哀

憂思恐字皆從心驚之爲字從馬古人因字命名亦寓意深蓋氣者善惡之馬也適於善則爲善適於惡則爲惡其機甚可畏也驚之爲病有急有慢留於陽則爲急伏於陰則爲慢亦猶馬之有善惡也馬以喻氣非啣轡則不能制驚之爲病非藥石則不能調信知馬之不可以不善猶驚之不可以或有也是以驚風有急慢二證而古方止曰陰陽二癇所謂陰陽者急慢之異名耳况嬰孩十歲以下

曰癇十歲以上曰癩陽癇屬腑爲陽證俗曰急驚其證身熱面赤驚發則搐搦兩目上視牙  
宜用涼藥陰癇屬  
慢驚其  
證  
或吐不瀉積日  
白脾虛  
不  
微上視手足振動宜用溫藥不  
可  
也嘗見後人不明乎此但知急驚  
用涼藥不知太過則反成慢驚至於慢驚但  
知用溫劑不知太過則反成急驚迄無定見  
用藥外逆縱能取效於目前而不知釀成癩

痛為終身之痼疾欲全嬰者幸加意焉

此用藥不似太微限又知針藥生其對發也

此亦藥不似太微限又知針藥生其對發也

此亦藥不似太微限又知針藥生其對發也