

大德車校聖濟總錄卷第一百八十二

小兒門

小兒諸丹

小兒遊腫

赤痛

小兒癰瘡

小兒疽瘡

小兒瘰癧結核

小兒惡瘡

小兒凍爛瘡

小兒疥

小兒癬

小兒風瘙癢疹

小兒癩疔



小兒諸丹

論曰風熱發丹古方謂小兒得之最忌以其氣血未定
肌膚柔脆無以勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定
處俗又謂之溜流走經絡散發肌表如塗丹之亦有法
可鎌洩去毒氣不爾則丹毒入腹近心即死但初發於
心頭者不可鎌爾

治小兒丹毒赤腫壯熱百治不差者藍青湯方

乾藍青貳兩

凝水石碎

石膏研

山梔子人兩

各壹兩半

茈胡去苗

犀角鎊

黃芩去黑心

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

甘草炙

赤芍藥

羚羊角劓

葛根劓各

知母兩

右一十三味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至四分下

蜜半錢竹瀝少許再煎至三分去滓空心日晚分溫

二服更量大小加減

治小兒丹毒偏身黃芩湯方

黃芩去黑心

麻黃劓

秦艽去黑心

升麻各壹分

大黃劓

防風劓各

右六味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴消

末半錢匕去滓空心分溫二服晚再服更量兒大小

加減

治小兒丹毒黃耆湯方

黃耆劓

茯苓劓

黃芩去黑心

大黃劓

甘草各壹分

右五味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴消

末半錢匕去滓食前分溫二服更量兒大小加減

治小兒丹毒入腹及下部陰卵百瘰不差麻黃散方

麻黃劓

升麻各半兩

消石研壹兩

右三味搗羅爲散每服半錢匕井華水調下空心日

晚各一

治丹入腹澤蘭湯方

澤蘭

芎藭

附子炮裂去皮臍去

莽草

藁本去苗土

細辛去苗葉

茵芋等分

右七味剉如麻豆每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心日晚各一

治小兒丹毒防入腹甘草散方

甘草炙剉末壹分 油麻升

右二味先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘草末半錢匕服日再

治小兒丹毒青藍汁方

青藍汁壹合 竹瀝貳合

右二味和勻空心溫服一合日晚再服以差為度

治小兒丹數十種大黃湯方

大黃 甘草炙 當歸切

芎藭 白芷 獨活去蘆頭

黃芩去黑心 芍藥 升麻

沉香剉 木香 木蘭皮各半兩

芒消參兩

右一十三味麤搗篩拌勻每用二兩以水六升煎至

四升去滓以綿二片蘸之更互溫搗丹上冷卽易日
五七度卽差

治小兒發丹毒熱痛吳藍湯搗方

吳藍

大黃

槐白皮

商陸

榆皮各貳兩

右五味細剉每用三兩以水五升煎至四升去滓入
朴消半兩攪勻以綿二片浸於湯中更互搗丹上日
三五度卽差

治小兒發丹苧麻根湯洗方

苧麻根剉參合

小豆貳合

右二味都用水七升煎至四升去滓溫洗丹上冷卽
再煖日三五度卽差

治丹毒徧身絳色鯽魚塗方

生鯽魚壹頭參兩 麻油貳兩

右二味搗魚令細入油研勻塗丹上日三五度卽差
治丹走行皮中浸廣者名丹火也入腹殺人蟻螬散塗
方

乾蟻螬

右一味碾末油調塗之以差爲度

治小兒野竈丹從膝起脅葉塗方

乾薺葉 末

香薷 末

赤小豆 末各半兩

生蒴藿葉莖 豈握細剉

右四味細研蒴藿入諸藥末和調如糊塗丹乾即易之以差為度

治小兒胡吹竈丹從陰下起泥醋塗方

右用磨刀水棚下泥和醋調膏塗之乾即更塗以差為度

治小兒胡漏竈丹從臍中起伏龍肝塗方

伏龍肝

右一味用屋漏水去清取淀和調如糊塗之乾即再

塗以差為度

治小兒神氣丹從項起犬骨灰塗方

犬枯骨

右一味為末以青羊脂調如糊塗之日三五次

治小兒飛竈丹從項起鐵槽水洗方

右取淬鐵槽中水日洗三五度

治小兒家火丹發如大指日長一寸徧著兩脇傍兩頰

上梓木灰塗方

梓木白皮

蓼葉 各壹分

右二味燒灰研末以雞子白調如糊塗之以差為度

治小兒煙火丹從身起豬槽泥塗方

豬槽下泥壹 生麻油兩壹

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒烟火丹從背上起或走兩臂足赤如火真珠塗

方

真珠細研如粉壹兩 慎火草研絞汁景天是也

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒神竈丹起兩額傍不出一日變為赤黑色慎火

草汁塗方

慎火草

右一味絞取汁先以刀子微鎌丹上令血出塗藥以

差為度

治小兒天竈火丹發尻間正赤流陰頭赤腫血出葱薺

薺塗方

葱伍莖和須切研 薺伍莖生者和梗切研 赤小豆末

竈門上灰研各壹合

右四味合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差為度

治小兒地竈丹從陰下起入踝骨上廢塼塗方

廢竈塼末 屋四角茅燒灰各壹兩

右二味和研勻細以新汲水調如糊塗丹乾卽易之
以差爲度

治小兒私竈丹從背上起竈土塗方

竈中黃土研

右一味取打鐵磨刀槽中水和調如糊塗丹乾卽易
以差爲度

治小兒廢竈丹從兩腳赤及從臂曲上起五加灰塗方

五加葉根燒灰

右一味研爲細末取打鐵磨刀槽中水調如糊塗丹
乾卽易之以差爲度

治小兒鬼火丹發兩臂赤起如李子及從面上起戎鹽

塗傳方

戎鹽壹分

附子壹枚

右二味燒過研細用雄雞血調塗丹上日五徧以差
爲度

治小兒野火丹發徧身斑如梅李狀雌黃塗方

雌黃研

戎鹽研各壹兩

右二味以雞子白調塗丹上日三五次以差爲度

治小兒茱萸丹初從背起徧身如細縷一宿成瘡者雞
子塗方

雞子白

赤小豆末

右二味和調如糊塗之以差為度一方云治水丹

治小兒螢火丹發灼灼在脇下正赤色而長初從額起而多痛伏龍肝塗方

伏龍肝

研細

生麻油

右二味和研如糊塗傅乾即易之以差為度

治小兒五色丹蒴藿塗方

蒴藿葉

右一味爛搗塗傅丹上乾即易之以差為度

治小兒白丹豬通灰塗方

豬屎灰

雞子白

右二味調和如糊塗之以差為度

治小兒火丹走皮中發赤如火燒狀須更燥漿起醋豉塗方

豉

右一味研細入醋調塗丹上以差為度

又芭蕉塗方

芭蕉葉根

右一味取搗汁塗之以差為度

治小兒火丹熱如火遶腰須急救之芸薹塗方

芸薹葉

右一味爛搗和汁塗傅之以差為度

又治火丹鍼挑方

右於兒男左女右大拇指面螺文上鍼挑有筋斷之

即差

治小兒伊火丹從兩脇下起青黑色羊脂塗方

煨鐵下槽中鐵屎

搗研為末半兩

羊脂貳兩

豬糞燒灰壹兩

右三味研勻如糊塗之以差為度

治小兒骨火丹初在臂起赤黑色二蒜塗方

大蒜

小蒜各壹兩

右二味爛搗厚塗傅之以差為度

治小兒尿竈火丹發膝下從兩股起及臍間走入陰頭

桑木根洗方

桑木根伍兩

右一味細剉以水五升煎至三升去滓溫洗日五七

度即差

治小兒尿竈丹從踝及脛起茅灰塗方

茅草

屋肆角者取燒灰研

雞子白

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒朱田火丹先發背徧身一日一夜而成瘡棘根湯洗方

棘根剉碎半斤

右一味以水五升煎至三升去滓溫洗丹上三五度

即差

治小兒赤丹色純赤為熱毒搏於氣血馬齒莧汁方

馬齒莧

右一味爛搗絞取汁三合空心溫服一合午晚再服

即差

治小兒丹毒赤腫壯熱百醫不差者藍青煎方

藍青切

竹瀝各壹升

生葛根汁澄清

蜜貳

寒水石研肆兩

石膏研參兩

山梔子人壹兩貳分

此胡去苗

犀角鎊

黃芩去黑心

杏仁去皮尖雙人炒

赤芍藥

羚羊角研

甘草炙剉各壹兩壹分

右一十五味除研藥并汁外咬咀以水五升并竹瀝先煎去滓取三升次內杏仁葛汁及蜜微火煎成煎每服半合至一合米飲化下日三

治小兒月內發丹升麻黃芩湯方

升麻

黃芩去黑心

犀角鎊

大黃炒

芫胡去苗

山梔子人各半

藍葉切

石膏分

甘草炙

分

右九味麤搗篩每二錢匕水一盞煎至半盞去滓食後分溫二服更量大小加減

小兒遊腫赤痛

論曰小兒遊腫由風熱客於經絡隨氣行移流走肌膚致赤腫疼痛治法當內服藥以滌其蘊熱外傳劑以散其焮痛則遊腫自消

治小兒風熱遊腫色赤犀角飲方

犀角鎊

黃芩去黑心

升麻

山梔子人

黃耆剉

牛黃研

防己各壹分

朴消分

右八味除牛黃外麤搗篩每二錢匕以水一盞煎取六分去滓下牛黃一大豆許分作二服早晨日晚各一隨兒大小以意加減

治小兒遊腫緒脂膏方

豬脂鍊過

附子生去皮

蜀椒生去目閉

食鹽研分

右四味搗研三味爲末入脂內熬過候冷塗之以差

爲度

治小兒頭及體赤遊毒腫痛升麻膏方

升麻貳兩

犀角錢

射干

黃芩去黑心

梔子人

玄參各壹兩壹分

芍藥

大黃

藍實

羚羊角各壹兩

大青半兩

生乾地黃貳兩參分

右一十二味細剉以豬脂二斤半入鍋中於慢火上

熬不住手攪煎成膏去滓菴器中盛取摩腫處差不

拘多少

治小兒風熱赤遊腫栝樓散方

栝樓剉

右一味搗羅為散以醎醋和塗之

治小兒赤遊腫行流於體若不急治入腹即死白豆散

塗方

右取白豆末水和塗之勿令乾差

治小兒赤遊腫漸漸長引不止塗傳方

牛膝剉

甘草剉各貳兩

右二味搗羅為散每用二錢匕以水一盞煎至六分

去滓調竈下黃土和塗之乾即易

治小兒風熱赤遊腫方

右以麥麩末水和塗之

又方

右取伏龍肝和雞子白塗之乾即易

小兒癰瘡

論曰經謂六府不和則留結為癰蓋小兒榮衛否澁不得通利逆於肉理致肌肉腫結皮薄而澤是癰之狀也癰既不得內消則膿潰穿穴而成瘡故謂癰瘡也

治小兒癰腫成瘡犀角湯方

犀角屑

萎蕤

升麻

甘草

麥門冬

去心焙

赤芍藥

薺芩

玄參

各半兩

右八味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎至四分更入消石末一字匕再煎鎔去滓溫服量兒大小加減
治小兒癰瘡藏府壅熱心神煩躁大小便不利大黃湯方

大黃

升麻

梔子人

朴消

枳殼

黃耆

別研
去麩炒
剉各半兩
右六味麤搗篩每服一錢匕水七分煎四分去滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡煩熱疼痛黃芩湯方

黃芩

梔子人

玄參

升麻

大黃炒

黃耆剉

連翹

藍葉

甘草

木香

芎藭

犀角屑各半兩

右一十二味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎三分去滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡腫痛益母草飲方

生益母草不拘多少洗到

右一味搗取汁每取三二分服之更量大小加減以滓傅癰上乾則易

治小兒一切癰腫毒諸風熱神驗黃蘗散方

黃蘗去麤皮蜜炙

鬱金各壹兩

陳橘皮湯浸去白炒

人參

葛根剉各半兩

石五味搗羅為散用溫水調下半錢匕量兒大小加減日三兩服

治小兒癰瘡腫痛方

右取豬腦塗紙上貼之乾即易日數徧

又方

右用芥子爛研水和塗紙上貼之

又方

右用馬齒莧搗傅之

又方

右以地龍糞新汲水調塗之

又方

右用薑石末和蒜搗封上

又方

右用馬鞭草搗傅之即消

又方

右以芸薹菜搗塗之

治小兒癰有膿令潰方

右取雞羽毛七枝燒末服之即潰

又方

右用人乳和麩封上至晚膿血出盡

小兒疔瘡

論曰小兒因五藏不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫結皮強上如牛領然疼焮堅韌深附筋骨既得膿後其疽可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封斂稍疾則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣

治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

連翹

白斂剉

芒消

甘草炙

升麻

麻黃

去根節湯煮掠去沫

枳實炒黃

大黃剉炒

右一十味麤擣篩每二錢匕水一盞煎至五分去滓分溫二服量大小加減

治小兒熱毒腫色白或惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走徧身中疹癢五香連翹湯方

木香

薰陸香

沉香剉

雞舌香

黃芩去黑心

麻黃去根節湯煮掠去沫

麝香研各壹分

連翹

海藻洗去鹹焙

射干

升麻

枳實去麩炒

大黃剉炒

右一十三味麤擣篩每二錢匕水七分煎至四分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸分溫二服量大小加減治小兒癰疽瘡癤腫毒黃者湯方

黃耆剉

連翹

升麻

惡實炒各半兩

玄參

丹參

露蜂房炙

枳殼去麩炒

甘草炙各壹分

右九味麤擣篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後臨臥溫服量大小加減

治小兒疳瘡藍葉湯方

吳藍葉

犀角鎊

升麻

黃耆剉

山梔子人

連翹

甘草炙各半兩

黃芩去黑心

大青

玄參各壹分

大黃剉分

右二十一味蠶搗篩每服一錢匕水七分煎至四分

去滓食後臨臥溫服量兒大小加減

治小兒疳瘡木通湯方

木通剉

升麻

赤芍藥

黃芩去黑心

山梔子人

麥門冬去心焙各貳分

犀角鎊

大黃剉炒各壹兩

枳殼去瓤各兩

右九味蠶搗篩每二錢匕水一盞入生地黃汁半合同煎至七分去滓分溫三服食後臨臥服量大小加減

治小兒瘡腫癰疽黃耆湯方

黃耆剉

葛根剉

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

犀角鎊

升麻

甘草炙各壹兩

木香半兩

右八味蠶搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後服量大小加減

治小兒癰疽犀角知母湯方

犀角鎊 知母鎊

黃耆鎊

黃芩去黑心

人參

丹參

葛根剉

大黃炒

甘草炙

玄參分

麥門冬去心

右一十一味麤搗篩每服一錢匕水半盞入生地黃

汁半合同煎至四分去滓食後臨臥溫服量大小加

減

治小兒癰疽瘡毒未破或膿未潰憎寒壯熱五香丸方

木香壹分

沉香剉

蘇合香研各

麝香研半

犀角鎊貳

大黃生剉壹

雞舌香研

吳藍葉

梔子人

熟乾地黄貳

白芍藥兩壹

人參壹兩去

白茯苓兩壹

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九煎黃耆湯下食前服

又方

乾蝦蟇壹

右一味燒灰細研以豬脂和傅之

又方

敗鼓皮不以多
少燒灰

右一味細研以豬脂和傅之

小兒瘰癧結核

論曰小兒身生熱瘡久不差者必生瘰癧其狀作結核在皮肉間三兩箇相連瘰也是風邪搏於血氣焮結所生也

治小兒瘰癧焮腫疼痛身體壯熱大腸壅滯小便赤澀

心神煩躁少得眠臥犀角散方

犀角鎔屑
壹兩

惡實壹兩

連翹貳兩

麝香研壹
兩

木通剉炒
壹兩

玄參貳兩

沉香剉壹
兩半

丁香壹兩

朴消壹兩

右九味燒搗篩每二錢匕以水一盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚後各一以利爲度更量兒大小以意加減

治小兒頸生瘰癧榆白皮傅方

右以榆白皮爛搗如泥封頸上頻易

治小兒瘰癧鉛丹塗方

鉛丹金兩

右以銚子熬當有脚如黑灰取脚不計多少更研如粉用面脂調塗以故帛貼數拭患處有惡汁出拭却

更貼半月差內消不作瘡極効

治小兒瘰癧連綴如梅李核狀硃砂丸方

硃砂

硃黃各壹分

右二味研如粉用糯米飯為劑搥如小麥粒人有患
者卽烙破內一九五日一換後用生肌膏

治小兒瘰癧生肌膏方

鉛丹半兩

杏人湯浸去皮尖
雙入炒壹兩

蛇蛻皮炙焦壹條

蠟半兩

頭髮如胡桃
大壹團

菜子油半斤

皂莢去黑皮并
子參寸

右七味先搗杏人蛇皮皂莢如粉與諸藥於銚子中

煎以柳篋子不佳手攪成膏但有瘡塗貼日換無小

差者

治小兒瘰癧結核久不差追毒斑貓膏方

斑貓

貳枚去翅
足及頭炒

巴豆

貳拾枚去皮
心藥水煮

松脂參分

右三味先研二味為粉次入松脂鎔化攪令勻更搗
一二百杵作餅熱貼在瘰癧上藥力盡別換以差為

度

治小兒腦熱結瘰癧連兩耳下腫痛身體寒熱坐臥不
安食飲不下玄參膏方

玄參

紫葛

黃藥子

大黃剉炒

木香

卷柏

芒消

紫檀香各壹兩

右八味搗羅爲細末以雞子白調和稀稠得所塗於瘡上瘡腫破時則去芒消塗之

治小兒濕癩結核寒熱防風丸方

防風去蘆

連翹

桑根白皮炙

牡丹皮

白頭翁

黃藥去蘆皮

豉炒

獨活去蘆

秦艽去蘆土

海藻洗去鹹

右一十味搗羅爲細末鍊蜜丸如麻子大每服三九

米飲下早晨日晚各一服更量兒大小加減

治小兒瘰癧麝香散方

麝香研壹分

鴿糞炒壹兩

右二味再同研如粉每服半錢匕酒調下日二服早

晨晚後各一更量兒大小加減

治小兒熱毒風腫瘰癧內消赤小豆散方

赤小豆炒

豬牙皂莢炙去黑皮并子

黃藥子

消石

大黃剉

木鼈子去殼各壹兩

右六味搗為散每用量瘡大小以不語津唾調塗乾
即易以差為度

小兒惡瘡

論曰小兒氣血純陽肌肉柔脆風毒邪熱易以致傷若
榮氣不從逆於肉理結成悍毒疼痛腫焮非常故名惡
瘡其候或痒或痛或赤根隱肉鞭不作膿或穿穴作膿
久不得差治法隨內外證瘵之則瘡可愈

治小兒惡瘡鉛丹膏方

鉛丹兩拾

風化石灰

豬脂各壹斤

右三味將二味同研細以豬脂按作餅火燒通赤如

此五度藥成搗羅為末濕瘡乾貼如乾瘡即作膏用

豬脂調紙上貼

治小兒惡瘡大黃湯洗方

大黃生

黃連去須

黃芩去黑心

澤蘭

白礬枯

石南各壹兩

戎鹽壹分

蛇牀子妙參合

右八味麤搗篩每以二兩用水三升煮取二升去滓
適寒溫以綿絮內湯中蘸洗之日三

治小兒惡瘡茵芋湯浴方

茵芋壹兩

甘草剉

苦參各壹兩

細辛去苗

黃連去須各

蕤人去皮

右六味麤搗篩每以三兩用水五升浸汁煮取三升

去滓浴兒逐日用

治小兒惡瘡遍身如麻豆狀包裹膿汁乍痛乍痒甘草

散方

甘草剉生

芍藥

黃芩去黑

白欬剉

黃連去須

黃蘗去蘗皮剉

右六味搗羅為細散用白蜜和塗於瘡上日再亦可

作湯浴之

治小兒惡瘡人所不能識者胡粉散方

胡粉妙令黃

黃連去須

黃蘗去蘗皮剉

右三味搗羅二味為散與胡粉相和一處研勻傳瘡

上口再立驗

入方

豆豉炒黃

右一味搗羅為末傳瘡上

又方

蝦蟇壹枚

右一味搗羅為細散入麝香一分一處同研勻乾傳

瘡上

又方

柳枝葉金握

右一味用水五升煮至三升去滓入鹽少許淋洗瘡

上

治小兒頭上惡瘡黃粉膏方

胡粉

黃連末各壹兩 水銀參

糯米貳拾貳粒

赤小豆拾肆粒和黃連肆

右五味先將水銀於手掌中唾研化後卽以麻油調藥入水銀和勻塗瘡上

小兒凍爛瘡

論曰小兒肌肉柔脆外邪易侵故風寒搏於肌肉凝於氣血則致皴裂久而生瘡或痒或痛其狀焮腫破出膿汁多在兩耳或手足間故謂之凍爛瘡

治小兒凍瘡蜀椒湯方

蜀椒去目并閉口炒出汗

鹽各貳兩

右二味以清酒五升煎至二升數數煎之其藥可五六日用

治小兒凍足爛瘡附子散方

附子生剉

乾薑炮貳兩

右二味搗羅爲散入綿中裝鞵如有瘡屢卽調臘月

豬脂塗之

治小兒凍耳成瘡或痒或痛黃蘗散塗方

黃蘗去麤皮 白欵各半

右二味搗羅爲散先用湯洗瘡後以生麻油調塗之

治小兒凍脚或痒或痛小麥湯方

小麥半 穰草參握

右二味用醋一升水二升同煮至三升去滓放溫洗

足

治小兒凍手皴拆痛白欵散方

白欵貳分 白及兩半 生麻油貳合 生

右三味將白欵白及同搗羅爲散與油同研勻更入

炊萊蕪一枚爛研以酒調如糊先以童子小便洗手

後塗手上

治小兒凍耳并手面皴痛積豬脰膏方

積豬脰壹

右一味研如膏入漿水少許候稀稠得所先用童子

小便洗手面後以匙抄少許勻塗手面上

治小兒凍瘡手足指欲墮及耳欲落柏葉膏方

柏葉炙乾爲末 杏仁貳拾枚湯浸去皮尖別搗如膏

麻油參兩 頭髮參團如雞子大 鹽研分

乳香研半

蠟半

右七味先煎油蠟沸卽下諸藥以髮消爲度攪勻貯
瓷器中每用先以小便洗瘡綿纏手指裹乾厚塗膏
卽以軟帛裹之如脚指相淹處尤須多用膏裹帛紗
厚以綿裹勿令寒氣得入每兩日一洗瘡換藥粉愈
後三四日一換

小兒疥

論曰小兒瘡疥率因於蟻蟲變化而生小兒多此疾仍
喜生於手足指縫間浸淫徧體近煖及衣服過厚則痒
悶不任搔之黃汁出疼痛不止蓋由風熱客於脾肺散

於肌肉熏發皮膚使然也

治小兒風熱肺疖皮膚生疥鼻內瘡痒苦參丸方

苦參末

肆兩以酒參
升熬成膏

胡黃連貳分

黃連壹兩

棟實去皮

蕪荑炒

蛻蝦去皮

木香各貳

右七味搗羅六味爲末入苦參膏內和搗千杵如粳
入蜜少許和丸如麻子大一二歲兒每服五丸食後
溫水下更量兒大小加減

治小兒瘡疥三黃散塗方

黃連去

黃蘗去

臭黃牙

赤小豆

各貳兩

水銀

半兩

右五味將黃連黃蘗赤小豆三味搗羅爲散與水銀臭黃同研勻細旋取油調塗瘡上

治小兒瘡疥體熱黃連散塗方

黃連

去須

黃蘗

去蠶

秫米

壹兩

赤小豆

膩粉

壹分

右五味搗研爲散油調塗舊帛上先洗去瘡痂封之

又方

黃連

去須

糯米粉

各貳兩

水銀

壹兩

胡粉

炒研壹兩

吳茱萸

湯浸炒

赤小豆

爲末各壹分

右六味先以水銀和津於手中研如泥次以豬脂四兩入瓷器內慢火化去滓下五味藥末攪勻成膏先

洗瘡拭乾塗之

治小兒瘡疥蛇牀子散方

蛇牀子

吳茱萸

湯浸炒

硫黃

研

蕪荑

各壹分

膩粉

少許

右五味搗研爲散用油一合入葱一莖同煎候葱黃色停冷調藥塗之

治小兒頭面瘡疥癬大麻子塗方

大麻子

伍

右一味搗末水和絞汁塗癬上

小兒癬

論曰小兒體有風熱脾肺不利或濕邪搏於皮膚壅滯血氣皮膚頑厚則變諸癬或斜或圓漸漸長大得寒則稍減暖則痒悶搔之卽黃汁出又或在面上皮如甲錯乾燥謂之爛癬此由飲乳乳汁漬著乃生復以乳汁洗之卽差

治小兒痲癬風痒雌黃膏方

雌黃研

黃連去須

莽草

蛇牀子炒

黃蘗去鹽皮炙

苦參

蕪荑炒各半兩

藜蘆

消石研各壹分

松脂貳兩半

杏仁湯浸去皮尖雙仁別研如膏壹兩

右一十一味除雌黃松脂杏人外搗羅爲末取臘月豬脂半斤和松脂入鑪中煎令沸下杏人次下諸藥末攪勻凝爲膏每用先以醋泔洗拭乾塗之日三治小兒癬疥赤腫及濕癬久不差黃連膏方

黃連去須

黃蘗去鹽皮炙

蛇牀子炒

藜蘆

礬石火煨別研

水銀手掌內唾研如泥入膏中

各壹兩

右六味搗羅前四味爲末以臘月豬脂四兩同入銚

子內煎四五沸下礬石末又煎三兩沸取下良久下
水銀攪如稀泥候冷先以清泔皂莢湯洗拭乾以火
炙痒塗之日三

治小兒一切瘡癬痒痛不止桑螵蛸散方

桑螵蛸 拾枚燒存
貳分性

膩粉 壹錢

麝香 半錢

右三味研為細散生油脚調雞翎掃候乾有裂處再

掃

治小兒濕癬附子散方

附子 生去
皮臍

雄黃 研

白礬 燒灰

吳茱萸 湯浸炒
各壹分

米粉 兩半

右五味搗研羅為散每日三次用綿搥撲之

治小兒諸癬及搔痒蛇牀子散方

蛇牀子 炒貳
兩

右一味搗羅為散以豬白膏和傅之

又方

羊蹄根 搗取
汁

右一味以蜜和勻先刮瘡四邊以藥塗之半日許拭

去更以陳米醋和羊蹄根津傅癬上

又方

槐白皮伍兩

右一味以水一升煎三五沸候冷數洗之

治小兒乾濕癬雄黃散方

雄黃各壹分 麝香各壹分

右二味細研為散甲煎油調塗之乾再上

治小兒濕癬枸杞根散方

枸杞根壹兩

右一味搗羅為散和臘月豬脂傅之

又方

桃枝青皮貳兩

右一味搗羅為散醋和傅之

小兒風瘙癩疹

論曰小兒風瘙癩疹者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌肉溢於皮膚變生癩疹狀如痞癩乍差乍發痒瘙不時搔之血出其痒不已故名風瘙癩疹赤疹者熱白疹者寒治法不可不察

治小兒肺風瘙痒癩疹疥癬五參散方

人參 紫參 白附子炮裂各貳分

栝樓根剉 天麻各半兩 玄參剉

沙麻剉各壹兩 丹參剉

右八味同搗為散五十日至百日兒每服一字二百日全一歲兒每服一字半爛汁調下二歲至三歲每服半錢匕煎薄荷金銀湯或棗湯調下空心午後各一服如乳母服每服一錢匕溫酒調下

治小兒風疹壯熱心躁黃者湯方

黃耆剉

白鮮皮剉

防風去叉各

枳殼去瓤麩炒青升

黃芩去黑心

甘草炙各

右六味蠶搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓溫服食後臨臥各一

治小兒癩疹風痒防風湯方

防風去叉

白茯苓去黑版

升麻

貝母去心

蒺藜子炒去角

大黃剉

甘草炙剉各

右七味蠶搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服食後日二

治小兒風疹皮膚腫根實湯方

枳實去瓤炒

芍藥炙

右二味蠶搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓入清酒半合更煎三五沸分溫二服空心午間晚後

各一更量大小加減

治小兒風疹石南湯方

石南葉

壹把

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右二味以水二盞煎取一盞半去滓下消石白礬各半兩攪令消以綿搵塗於疹處乾卽易

治小兒癩疹莽草湯方

莽草

防風去

附子炮裂去皮臍

牡蠣

煨過各壹兩

右四味麤搗篩以水一斗煮取七升去滓通寒溫浴

避風

治小兒風疹出不止塗傳方

白礬

熬令枯

右一味研爲末酒調用雞翎掃塗疹上

又方

景天

壹兩壹分慎水草是也

藍

疹

右二味同搗研絞取汁以熱手摩塗之日再

治小兒風疹壯熱心躁犀角湯方

犀角

鎊

升麻

麥門冬

去心

蒺藜子

炒去角

甘草

炙

白芍

去

右五味咬咀如麻豆大每服二錢匕水一盞煎至五分去滓食後溫服更量歲數加減

小兒癩疔

論曰小兒陰核氣結腫大者癩疔也由稟受之初肝經虛弱因啼怒軀氣氣脉下墜擊於陰器則筋脉緩縱結聚不散是為癩疔也若氣偏虛則其腫亦偏蓋足厥陰肝之經環陰器抵少腹是動則為癩疔少腹痛之疾治小兒氣癩土瓜根湯方

土瓜根

當歸切焙

芍藥各半兩

右三味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服空心日晚再服量兒大小加減治小兒癩疔意苴人散方

薏以人

芍藥

土瓜根

蛇床子微炒

黃芩去黑心

桔梗炒

蛇含各參

右七味搗羅為散一二歲兒每服半錢匕空心溫酒調下日午晚後再服量大小加減

治小兒陰癩狐陰丸方

狐陰薑具炙黃

蜚生蠶絲肆校微炙 桂去盡皮

附子炮裂去皮噴

乾薑炮

茯苓子炒去角

細辛去苗香分

桃人湯浸去皮尖雙入炒別研

卷柏各壹兩半

石九味攪研為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒米飲下五九空心日晚各一服量大小加減

治小兒陰癩氣疝發作有時芍藥丸方

芍藥

大黃剉炒各半兩

赤茯苓去黑皮

半夏湯洗去滑燥

桂去塵

蜀椒去日及閉口炒出汗各壹分

分

石六味攪羅為末鍊蜜和丸如菽豆大三四歲兒食

前米飲下五九日三服量兒大小加減

治小兒陰疝偏腫牡丹丸方

牡丹皮

豉炒

防風去

黃蘗去麩皮微炙

滑石別研

桂去麩皮各壹分

石六味攪羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五九米飲下早晨日晚各一服量兒大小加減

治小兒陰癩韭子丸方

韭子炒參兩半

附子炮裂去皮麩參分 狐陰壹具黃

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五九米飲下早晨夜臥各一服量兒大小加減

治小兒陰癩腫硬桂心散方

桂心兩半

地膚子壹兩

白朮壹兩

石三味搗羅為細末三歲兒每服以溫酒調下半錢

七日三服量兒大小以意加減

治小兒癩疔攻注連腎外囊腫脹或疼痛偏墜昆布丸方

昆布分洗 藜香子半兩 木香

甘草炙 黃蘗剉 丁香

爛牡蠣生用 銅青以上各

右八味搗羅爲末用熟棗肉爲丸如麻子大每一二歲兒煎甘草湯下三九量兒大小以意加減

治小兒癩疔腫痛方

枳殼半兩

右一味搗爲散每用柏枝煎濃汁調厚塗兒囊腫處

妙

治小兒陰癩不消白瘡藥散方

白蒺藜半兩 香鼓半兩 鼠婦

麝香微 川大黃剉 桂心

細辛以上各

右七味搗羅爲細散一二歲兒每服以溫酒調下半錢匕早晨晚後各一服量兒大小以意加減

治小兒陰癩日夜疼痛桃人丸方

桃人參分 湯浸去皮 川大黃半兩

尖雙 人微 妙

三十一

赤芍藥兩

防葵兩

半夏壹分浸洗

桂心壹兩

川椒壹分去目閉口者微炒去汗

赤茯苓兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每三歲兒食前以溫酒下五丸看兒大小虛實以意加減

又方

蝟皮壹箇燒存性

右一味研細臨臥熱酒調下一錢匕

治小兒癩疔及少陰受邪冷氣滯正氣散方

京三稜壹枚緊小者猛火炮令中心存參分性納裏壹重淨土埋壹宿

右一味搗羅為散每服一字匕煨葱米飲調下不拘

時候

治小兒癩疔蓖麻丸方

蓖麻人參拾枚棘剛子去皮貳拾枚石燕子燒壹枚

滑石末貳錢匕麝香研半錢匕

右五味搗研勻稀麩糊和丸如菉豆大每服十五丸

空心煎燈心湯下一服即消

治小兒癩疔發作疼痛木通散方

木通剉膽礬研各壹分

右二味搗研為散每服半錢匕米飲調下

治小兒癩疔腫鞭疼痛滑石丸方

滑石

碎

澤蘭

各取

粉霜

等

續隨子

去皮
半兩

右四味搗研爲末白麩糊和丸如菽豆大五歲以下
每服五九五歲以上七九百菴酒下空心臨臥服

治小兒陰癩偏大白頭翁根傳方

右取生白頭翁根搗隨偏腫處傳一宿當作瘡二十

日愈

治小兒陰癩莧菜根傳方

右取莧菜根搗碎傳之立差馬鞭草傳亦佳

治小兒陰核氣結腫大或偏腫疼痛漆燕散方

漆燕

壹枚入瓦瓶子內用鹽泥固濟陰乾炭
火燒令通赤爲度放冷取出研令細

續隨子

壹分
皮

右二味搗研爲細散每服半錢匕米飲調下

治小兒肝經虛弱筋脉緩縱氣脉下墜陰器腫大久成
癩疔三應散方

麋香

壹枚
研汁

膩粉

貳錢

胡黃連

末壹
分

右三味同研令乾每服一字匕陳米飲調下不拘時

大德重校聖濟總錄卷第一百八十二

大德重校聖濟總錄卷第一百八十三

乳石發動門

乳石將適失度

乳石發動寒熱

乳石發渴

乳石發動上衝頭面及身體壯熱

乳石發動吐血衄血

乳石發目昏赤痛

乳石發癰疽發背瘡腫

乳石發身體生瘡

乳石發口舌瘡爛

乳石發動統論

論曰內經謂石藥性悍非緩心和人不可服夫聖人垂訓深矣世之服乳石者至於輕生傷性恃毫髮所得不戒夫毒烈之過天於中道十有七八夫豈知大治範形精全神固和理均足初無加損也能者養以取福則全生盡年若乃情實一開嗜慾滋甚方且資剛暴勇猛之劑以蘄補養積之賦滄洩之尾闕果何所賴耶說者乃以益氣補精安五藏通百節利九竅延年益壽利人如此其多謂不可不食其食也乃分少稗強壯之先後又以石精石滓分上士下士所服之優劣夫以其有益於

人必欲資是以祛沉痾痼疾可也當氣體調和營衛流通亦何必區區於鍊餌哉胡不考服食之後將護多端一失其度發作異態飲食之細則有或熱或溫之過衣服坐臥則有溫衣厚衣久坐久停之患其它六反七急八不可三無疑又欲謹畏而力行儻有不慎疾不旋踵與其服食失度自詒伊戚曷若清靜恬懽克保冲和今叙疾痰之由庶幾無輕餌

乳石將適失度

論曰服餌藥劑皆有常式戒慎將適每務周至矧乳石慄悍尤當謹畏鍊食之後宜如何哉飲食衣服居處勞佚溫熱寒涼之度所當究圖者無慮數十一失其度疾痰之孽速於影響蓋精明非挈佗審治非仲景輕信服食棄是從非動發急難不知解救則有能消息節度專意候察者亦庶幾免於困斃也

治乳石發動咽痛鼻塞清涕出者此爲衣溫近火方

右宜速脫衣當風取冷以冷石熨咽鼻即差

治乳石發動輒安臥不與人語者此爲熱盛食少失其

性方

右宜與熱酒冷洗冷食自勞即差

治乳石發動耳鳴如風聲又有汗出者此爲自勞過度

陽事不節氣上方

右宜數飲食補之節禁陽事卽差

治乳石發動關節強直不可屈伸者此爲久停息不自勞曳藥氣不散漸侵筋血方

右宜出力使溫冷水洗之卽差

治乳石發動身體痛楚無常處如遊風者此爲犯熱所

作方

右宜冷洗以冷石熨之卽差

治乳石發動服藥心悶亂者此爲服溫藥與疾爭力方
右富大吐或不吐病當困斃若吐不絕者可冷食飲

卽差若絕不識人口不開者亦當琢齒以熱酒灌之入咽吐出者更當與之但得酒氣下通不半日卽蘇

治乳石發動臂脚偏急痛苦者此爲久坐臥溫熱不自移轉氣入肺脾胃方

右勤以布巾浸冷水搦之覺溫則易三日卽差

治乳石發動似傷寒溫瘡者此爲犯熱方

右宜以常治傷寒溫瘡藥救之但勿服熱藥耳其傷寒藥等皆除熱破癖不與寒食相妨故通服也凡服寒食雖已熱解而更病者要先以寒食救之終不中

冷

治乳石發動脫衣便寒着衣便熱此爲脫着失度方

右小寒自可着衣小溫便可脫衣及冷洗之卽爽應洗勿疑若忍之則病成矣

治乳石發動脈洪實或斷絕不足似死脈或細數弦駢其所犯非一熱多則弦駢有瘳則洪實急痛方

右宜寒食自無所苦蓋熱藥發動率常如此

治乳石發動夜不得睡者此爲食少熱在內方

右當服大黃黃芩梔子三黃湯數進冷食自得睡也

治乳石發動眩冒欲倒者此爲衣厚犯熱方

右宜冷水淋頭并洗之卽差

治乳石發動脚疼欲折者此爲久坐溫處方

右當單牀薄衣勿怠行役并以冷水洗浴卽差

治乳石發動食患令不下者此爲久冷食口中不知味

方

右當作白酒麋多着酥熱食一兩頓若小悶者還令

冷飲食卽差

治乳石發動下部癰爛者此爲所坐薦蒲厚熱方

右當坐冷水中卽差

治乳石發動自暈痠疼者此爲臥處太厚又蓋覆被衣

溫厚不時脫去方

右當單牀薄被衣或以冷水洗勿着故垢爰雖冬寒亦須散髮受風仍以冷石熨其衣衣勿繫帶若犯此煩悶者急人冷水浴勿忍病而畏冷也

治乳石發動遺失大便不自覺者此爲熱氣入胃大腸不禁方

右當冷水洗之卽差

乳石發動寒熱

論曰乳石發動寒熱者以石熱壅積將適失度陰陽之氣不得和平也蓋陽病發熱陰病發寒一於熱則偏於陽一於寒則偏於陰時寒時熱則榮衛交爭陰陽相勝

若傷寒諸瘡之狀是也

治諸石發動口乾時作寒熱似鬼神病麥門冬丸方

麥門冬

去心焙

大黃

苦參

萎蕤

梔子人

五加皮

黃芩

去黑心

犀角

芍藥

升麻

大青

甘草

右一十二味搗羅爲末鍊蜜搜和更搗勻熟丸如梧

桐子大每食後以蜜水下十五丸漸加至二十丸

治乳石發動口乾寒熱似鬼神爲病犀角丸方

犀角屑

五加皮

黃芩

去黑心

苦參

大黃剉碎 微炒

芍藥各壹兩半

大青

甘草各參分

麥門冬去心 煨

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食後以蜜水下十五丸漸加至二十九早晨日午晚後各一服

治乳石發如傷寒熱狀兼似瘡前胡湯方

前胡去蘆 頭

黃芩去黑 心

甘草炙

知母各貳兩

牡蠣熬

石膏各參兩

右六味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半入生薑一棗大切棗二枚擘破煎至八分去滓溫服

治乳石毒經二三十年發動為寒熱或慄慄似寒中者

或欲食或不欲食若服紫石英發熱者熱悶昏昏喜臥起便無力皆府氣所生藏氣不知暑石熱燥如戰石硫黃熱鬱如熱極者身並破裂華佗芍藥湯方

芍藥

赤茯苓去黑 皮

人參

藍實

黃芩去黑 心

甘草炙亦各壹兩

薺苫貳兩

蔓菁子壹兩

右八味除蔓菁子外搗為麤末每五錢匕用水四盞

先煮蔓菁子一合至三盞去滓次下藥末煎至一盞

半去滓分溫三服早晨日午晚後各一服

治乳石發動戰惡寒或發熱如溫瘧此為失食恐飢

失洗所致宜此方

右宜急食冷食及冷水洗數徧卽愈

治乳石瘖若得時氣冷熱不調動乳者皆是寒熱所致其狀似瘡久不療損人性命縱服湯藥必是難差宜作生熟湯浴之方

右以溫湯半浴盆如過熱投少冷水解之卽於湯中坐須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯卽定久乃出湯以衣被覆蓋睡豁然平復如患太重者不過三兩度也

乳石發濕

論曰石性沉下服之歸腎若發動則府藏生執津液枯燥蓋腎惡燥腎燥則渴而引飲不可爲量久則變爲三消之證

治乳石發動虛熱大渴生地黃湯方

生地黃

剉碎兩

竹葉

切搗

小麥

半升

黃耆

剉

黃芩

去黑心

木通

剉

前胡

去蘆頭

栝樓根

大黃

剉炒各半

芍藥

升麻

甘草

剉

知母

焙

赤茯苓

去黑皮

人參

當歸

切焙各壹兩

石一十六味到如麻豆每服五錢匕水二盞同煎至一盞去滓不拘時溫服

治乳石發動熱渴口乾黃者湯方

黃耆剉

麥門冬去心焙

芍藥

栝樓根各參兩

生乾地黄焙貳兩半 梔子人枚參拾

升麻貳兩

黃芩去黑心壹兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

治乳石發虛熱上衝口乾頭面熱赤大渴葛根煎方

生葛根搗汁

白蜜

生地黄搗汁各壹兩

生薑汁參分壹兩

棗肉研壹兩

生麥門冬去心研壹兩

右六味同於微火上以銀石器煎成如饒用瓷合盛每服半匙頭不拘時含化

治乳石發熱渴葱白飲方

葱白切肆兩

胡葉切

薺芎剉

枸杞碎各壹兩

右四味麤搗篩每取二兩以水二椀煎至一椀去滓分溫二服空心日午近晚各一

治乳石發熱渴竹葉湯方

淡竹葉切半斤

赤茯苓去黑皮

石膏研各壹兩

栝樓根壹兩 小麥兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓不拘時溫服

治服乳石將適失度飲食冷熱不消虛脹吐清水渴悶

人參湯方

人參

枳殼去瓤

甘草炙

栝樓根剉

白朮各壹兩

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞半棗三枚擘破

同煎至一盞去滓溫服不拘時

治乳石發熱盛口乾茯苓湯方

白茯苓去黑皮 澤瀉兩

白朮

乾薑炮

桂去皮

甘草炙 剉各壹兩半

小麥兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治乳石發熱壅熱煩悶渴躁枳實湯方

枳實去瓤

赤茯苓去黑皮

石膏碎各半兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治乳石發熱盛煩躁口乾桃人粥丸方

桃人去皮尖并雙
研貳兩

白米半升

右二味以水一斗煎取五升渴即不拘多少飲之

治乳石發渴黃連丸方

黃連去須半斤

麥門冬去心焙貳兩

生地黃取汁貳合

羊乳貳合

栝樓根取汁貳合

右五味先以黃連麥門冬二味搗羅爲末次以三味汁和衆手丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時

治乳石發動大渴方

生田螺參升以水洗壹貳福

右一味又以新汲水一斗浸一復時澄取清汁不拘時飲之其田螺經宿放却不用更取新者如前法浸之

治乳石發渴方

竹根洗剉伍兩

右一味以水五椀濃煮取汁渴即飲之

治乳石發渴方

青梁米合參

右一味以水煮取汁飲之

治乳石發渴方

大麻人研壹升

右一味每取三合以水三升煎取汁三升時時飲之

治乳石發渴方

黃蘗半斤去皮剝

右一味每服二兩水五盞煎至三盞渴即飲之

乳石發動上衝頭面及身體壯熱

論曰乳石發動上衝頭面及身體壯熱者由將適過度藏府否塞氣不得宣通也夫服乳石者以能捍風寒逐冷濕導經脉益飲食也然在陰則補其不足在陽則能益其慄悍若陰盛陽虛則石氣發露此所以熱衝頭面

身體也

治乳石發胸背頭中遊熱黃耆湯方

黃耆剉

芍藥

甘草炙

赤茯苓去黑皮

人參

石膏碎

生地黃切焙

生薑切炒

麻黃去根節湯煮掠去沫

麥門冬去心焙兩柱壹兩

右一十一味蠱擣篩每服四錢匕水二盞入竹葉十片棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服早晨日午夜

臥各一

治乳石發動身熱如火黃芩湯方

黃芩去黑心 枳實去穢炒 梔子人枚

栝樓根 厚朴去蟲皮生 芍藥

甘草炙各

右七味麤搗篩每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服早晨日午食前各一

治乳石發熱如火頭痛煩悶寒熱嘔逆升麻湯方

升麻 前胡去蘆 甘草炙各

黃芩去黑心 生地黃切焙各 枳殼去穢炒

黃連去 栝樓根剉焙各 梔子人枚

右九味麤搗篩每服四錢匕水二盞入豉一合綿裹

同煎至一盞去滓溫服早晨日午各一心煩加麥門

冬一兩稍冷加生薑一兩

治桃花石發即心噤身熱頭痛宜溫清酒隨多少服之

酒行即差亦可服大麥麩并此麥奴湯方

大麥奴乾 麥門冬去心焙桂去麤皮

人參 甘草炙各

右五味麤搗篩每服四錢匕水二盞入葱白四寸同

煎至一盞去滓溫服早晚食前各一

治乳石發食訖心煩悶寒熱頭眩胸中不安者茵陳蒿

湯方

茵陳蒿兩肆

梔子人貳拾枚

大黃貳兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心早晚食前各一

治乳石發動忽大熱多欲就臥冷地又不得食諸熱麩

熱酒方

五加木根葉皮剉暴兩

石一味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治乳石發熱除熱蜂房湯方

露蜂房壹兩

右一味剉碎以水三盞煎至一盞去滓頓服若不定

隔三五日再服

治金石發熱及諸熱暴赤目方

冬葵子貳合 朴消壹合

右二味以水二升同煮至一升去滓分三服空心早

晚食前各一

治金石發熱及諸熱朴消丸方

朴消鍊成半斤

右一味研成粉鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九食後蜜水下服金石經年覺身中少熱即以此丸壓之

每夜臥時服三十至四十丸取胸膈涼爲度若有時
患及發者卽取朴消粉一匙空心水調服之以利爲
度凡朴消取色白而不着風者佳色黃者傷人
治乳石心下煩悶內熱不安冷石湯方

凝水石兩半

右一味以水半盞磨汁服之不差再作

治乳石發麻黃湯方

麻黃去根節湯煮

石膏碎壹兩

黃芩去黑心壹兩半

右三味麤搗篩分作兩貼每貼以水三盞煎至二盞

去滓內雞子白二枚芒消末一錢熱攪令沫出以塗

摩瘡上卽差

治石藥發動上衝頭面疼痛浮腫心神恍惚防風湯方

防風去土

當歸切

澤瀉

威靈仙去土

甘草炙

黃連去須

虎杖各壹兩半

石韋去毛

天門冬去心焙

白石脂研

槐實炒

地榆各貳兩

石膏推碎參兩

生地黃切焙陸兩

大黃剉炒

黃芩去黑心

犀角鑿

消石研各壹兩

右一十八味咬咀每服五錢匕以水一盞半入生薑

一分拍碎同煎取八分去滓溫服

乳石發動吐血衄血

論曰乳石發吐血或衄血者以石氣壅遏於心肺生熱故也心主血而血得熱則湧溢復因胃氣之逆故吐血也肺主氣開竅於鼻氣血調和相爲榮衛及爲熱所乘則血妄行故爲鼻衄也

治乳石發動心悶吐血麥門冬湯方

麥門冬

壹兩 焙心

生地黃

貳兩

甘草

炙

薺萐

茅根

乾薑

壹兩 炮

右六味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入豉二七

粒煎至七分去滓溫服空心日午各一合

治因餌乳石發心肺中熱鼻中衄血連翹飲方

連翹莖葉

新者 壹兩

生地黃

貳兩

蒼耳莖葉

新者

陳橘皮

湯浸 去白

鷄蘇莖葉

新者

右五味剉碎以水少許都搗令爛生絹絞取汁每服

三合不拘時未止再服

治乳石發動鼻衄頭痛壯熱徧身疼痛煩悶小薺湯方

小薺

剉貳兩

鷄蘇

剉壹兩

青竹筍

新竹取 會兩半

麥門冬

去心 焙

生地黃

切碎各 貳兩

右五味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑三

片煎至七分去滓不拘時溫服日三

治乳石發動心肺熱甚鼻中衄血不止吹鼻散方

胡粉研

墨研

乾薑末

髮灰研

鑛墨研

伏龍肝搗末

右六味同研以一字許吹鼻中一法穴味中但得一

味末用一字吹兩鼻中亦止

治乳石發卒吐血一二升口鼻俱出者麥門冬飲方

麥門冬去心絞汁

生地黃絞汁

小蘗切碎絞汁

伏龍肝末

右四味前三味各入少水絞取汁相和勻每服二合

入伏龍肝末二錢匕調下每日空心一服日午再服

治乳石發熱盛吐血衄血生地黃湯方

生地黃切碎

梔子人散

小蘗根切

黃芩去黑心

右四味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入豉二

七粒煎至一盞去滓溫服空心日晚各一服

治乳石發衄血生地黃飲方

生地黃切絞汁

小蘗根切絞汁

右二味合和令勻分溫作三服早晨日晚各一

乳石發目昏赤痛

論曰乳石發目昏赤痛者由石勢乘虛而上亦矚內有痰熱也石性歸腎若將適失宜飲食失度則其氣騰湧與痰熱并穢熏蒸於肝故令目昏赤痛也

治乳石發目昏赤痛不覩物大黃湯方

大黃剉

黃連須

石膏研各

黃芩去黑

甘草炙

細辛去苗

半夏湯洗去滑

山梔子人

枚

右八味麤搗篩每五錢匕水三盞入生薑一分拍碎煎至一盞半去滓分溫三服早晚服

治乳石發目赤閉目不開煩悶熱氣胸中澹澹瀉肝前

胡湯方

前胡去蘆

山梔子人

乾薑炮

車前葉

淡竹葉各貳

大青

秦皮剉

決明子碎

細辛去苗

黃芩去黑心

石膏研

右一十一味麤搗篩每五錢匕水三盞煎五六沸下芒消一錢匕煎至一盞半去滓分溫三服得利卽差

湯方
治乳石發目赤痛小便赤大便難逆衝胸中口燥黃芩

黃芩去黑

大黃剉炒各

山梔子人

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分入豉
一合更煎三五沸去滓溫服取利三兩行以漿水粥
止之

治乳石發腰痛欲折兩目欲脫者爲熱上肝膈腰腎冷
極故也黃連飲方

黃連去須

萎蕤各壹兩

甘草炙別兩

右三味麤搗篩以水三盞煎至一盞去滓內朴消一
錢匕更煎二三沸分溫二服取微利差

治乳石發目痛如刺者爲熱氣衝肝上目小便洗方

右數冷食清朝溫小便洗三日卽差

治乳石發目生赤脉息肉礮痛不開棗肉黃連點方

棗棗核

黃連去須碎壹兩綿裹

淡竹葉切壹握

右三味先以水二盞煎竹葉至一盞半去竹葉澄清
內棗黃連煎至三合綿濾去滓每日臨臥點目大眦
卽差

治乳石發目赤痒丁香黃連點方

丁香貳棗枚碎

黃連壹兩

黃蘗皮半兩切各

蕤人研棗枚

五銖錢壹拾文

右五味以水二盞煎至六分綿濾去滓點目大眦頻

點取差

治乳石發久風目赤青鹽點方

青鹽研壹兩

杏人去皮尖貳兩微炒研爛以少湯同研勻帛裹壓油出用半

雞子殼

右二味用銅盆一隻面闊一尺者內油鹽取青柳枝如筋大者一握緊束之截頭令齊用研之候如稠墨卽先剉地作坑置瓦於坑底上取熟艾一鵝卵大安瓦上燒之卽安前藥盆合在坑口上以煙熏之火盡藥成收於不津器中每夜點目大背卽臥頻點取差

治乳石發目瞽雄黃散點方

雄黃研

乾藍各半兩

右二味搗研爲散每用一米大醫上點之三五度卽差

治乳石發眼腫痛不開豬肉貼方

右取精豬肉薄切貼眼上熱卽易之一方用子肝以井華水浸貼之

乳石發癰疽發背瘡腫

論曰乳石性本炎悍服者苟將適失度食飲不時致熱毒發泄不擇所出或癰疽發背或腸癰瘦骨不可勝治間雖有未嘗服乳石而毒氣潰漏如是者亦以府藏久蓄熱毒或以胞胎之初稟受石氣其來有自治法當先

以疎利之劑敗其毒而外施傅貼之術

治乳石發動癰疽發背諸腫毒五香連翹湯方

連翹去梗 木香 沉香

薰陸香研 麝香研 射干

升麻 獨活去蘆 桑寄生剉

木通剉各兩 大黃剉參兩 丁香兩

右一十二味除麝香外麝搗篩和勻每服五錢匕水

二盞煎至一盞半去滓入竹瀝二分再煎沸溫服不

拘時

治乳石發動癰疽發背熱渴麥門冬湯方

麥門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 生乾地黄焙

石膏碎 升麻 人參

知母焙 芎藭 山梔子人各參分

小麥半斤 黃耆炙剉 甘草炙

枳實炒麩 芍藥各宜兩 黃芩去黑心

前胡去蘆頭各兩半

右一十六味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞入生

薑五片棗二枚擘破竹葉十片同煎至一盞去滓溫

服不拘時

治乳石發動初覺皮膚有癢毒恐成癰疽及府藏壅滯

寒熱口乾心煩犀角湯方

犀角 鎊

知母 半兩

木通 剉

芍藥

升麻

薺芎

麥門冬

去心焙

黃芩 去黑心

甘草 剉

萎蕤 各 分

右一十味麤搗篩每服五錢匕用水二盞煎至一盞

下竹瀝半合馬牙消一錢更煎數沸濾去滓空心溫

服快利為度未利再服

治乳石發動癰疽內熱大渴黃耆湯方

黃耆 剉

前胡 去蘆頭

大黃 剉炒各 壹兩半

栝樓根 甌

木通 剉

黃芩 去黑心

芍藥

赤茯苓 去黑皮

甘草 剉

知母 焙

人參

當歸 切焙

升麻

小麥 各 壹兩

生地黄 研取

右一十五味除地黃外曝搗篩每服五錢匕以水二

盞竹葉二七片切碎煎至一盞去滓入地黃汁半合

再煎沸空心日晚各一服

治乳石發動癰疽虛熱人參湯方

人參

甘草 剉

黃耆 剉

芍藥 各 壹兩半

赤茯苓 去黑皮

當歸 切焙

芎藭

黃芩去黑心

木通剉各壹兩

石九味麤搗篩每服五錢匕以水二盞竹葉一十片切碎生地黃汁少許煎至一盞瀉去滓溫服空心日午各

治乳石發爲癰疽五味子湯方

五味子炒

前胡去蘆頭

當歸切焙

黃耆剉炙

生乾地黃焙

人參各壹兩

小麥壹合

黃芩去黑心

麥門冬去心焙各壹兩半

甘草炙剉分

桂去麤皮

升麻各半兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎一椀

擘破生薑三片煎至一盞去滓溫服空心日午各一

治乳石發爲癰疽腫痛煩熱增損當歸湯方

當歸切焙

赤茯苓去黑皮

人參

前胡去蘆頭

黃芩去黑心各壹兩

桂去麤皮半兩

芍藥

甘草炙剉各壹兩

麥門冬去心焙貳兩

小麥壹合

竹葉半兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎二椀

擘破煎至一盞去滓溫服空心日午各一

治乳石發動癰疽發背漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

白欬剉

黃芩去黑心

枳殼去麩炒

芍藥

甘草炙

麻黃節去根

升麻剉各

大黃兩半剉炒壹

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服空心日午各一

治乳石發動癰疽發背疎利毒氣大黃湯方

大黃剉兩

梔子人

犀角屑各半兩

栝樓根兩貳

升麻

黃芩去黑心

甘草炙剉各參分

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞濾去滓空心日午溫服

治乳石發動癰疽發背一切毒氣止痛化膿犀角丸方

犀角屑兩壹

大黃炒

黃芩去黑心

升麻

防風又法

當歸切

人參

黃耆炙

梔子人

黃連去須

乾藍

甘草炙各半兩

巴豆拾枚去皮心炒研細

右一十三味除巴豆外搗羅爲末入巴豆和令勻鍊

蜜丸如梧桐子大每服五丸米飲下快利爲効

治乳石發動癰疽發背一切熱毒及惡瘡黃耆丸方

黃耆炙

犀角屑各壹兩半

黃連去須

茯神去木

當歸切

防風又去

芍藥

升麻

赤茯苓去墨皮

黃芩去黑心

甘草炙各半兩

木通剉豐

麝香研半分

右一十三味除麝香外搗羅爲末入麝香研和勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下未効加

至三十丸

治乳石發動癰腫發背及戴府澁滯麻人丸方

大麻人研貳兩

木香參分

枳殼去麩炒

大黃剉炒

惡實炒各兩

甘草炙半兩

右六味除麻人外搗羅爲末入麻人研勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十九溫水下未効加至三十丸治乳石藥氣發熱風熱相并致癰腫瘡痍經年不愈生地黃煎方

生地黃伍斤洗切以木杵臼搗絞汁

黃精拾貳斤洗切以木杵臼搗

汁絞

白蜜伍斤

右三昧汁相和於銀石器中慢火煎如膏爲度以瓷

合盛每服生薑湯調下半匙至一匙日二夜一

治乳石癰毒發背無名異膏方

無名異研

沒藥研

麝香研

檀香剉

丹砂研

沉香剉

騏驎竭研

乳香研

突厥白剉

白欽剉

白及剉

白芷剉

雞舌香研

雞骨香研

當歸切

芎藭剉

大黃炒

牛膝剉酒

防風剉

槐枝剉

柳枝剉

桑枝剉各

蠟兩

鉛丹拾貳

青油貳

右二十五味除油蠟丹及前八味研末外並剉碎先熬油令沸下檀香等一十四味剉藥煎候白芷赤黑

色絞去滓再煎入蠟鉛丹以柳篋攪候變黑色滴於水中成珠子輒輒得所後下無名異八味研末攪令勻以瓷合盛用故帛塗帖瘡上每日一次換以差為度

治乳石發癰疽瘡止痛生肌甜菜膏方

甜菜兩

生地黃

豬脂各貳

大戟炒壹

當歸切

續斷

白芷

莽草

芎藭

防風去叉各

甘草炙

芍藥各參

蜀椒去目并合口

細辛去苗

大黃炒

杜仲去鹽皮

黃耆炙

黃芩

去黑心
各壹分

右一十八味除豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸剉藥

煎候白芷赤色絞去滓瓷合盛每日三五次塗傳瘡

上

治乳石癰疽發背瘡毒止痛吮膿必効膏方

油壹

鉛丹研陸

麝香研壹

膩粉研

蠟各參

楓香脂壹兩

丹砂細研

鹽半兩

白芷剉

乳香研

當歸炙

桂去麝

芍藥剉

藥本去苗

細辛去苗

蜜陀僧研各

壹兩

右一十六味先將油煎令沸次下白芷等六味剉藥

煎候白芷赤色漉出下蠟楓香脂候鑿盡以綿濾

去滓下鉛丹蜜陀僧乳香以柳篋攪煎候變黑色滴

水中成珠子卽下鹽丹砂麝香粉等攪勻傾於瓷盆

內安淨地上一宿除火毒用故帛上攤貼日二以差

爲度

治癰疽發背熱毒氣結腫痛堅靛止疼痛神効膏方

木通剉

甘草炙

當歸炙

白芷

防風

細辛

去苗葉

梔子人

黃連

黃芩

去黑心各壹分

垂柳枝

剉貳兩

鉛丹

蠟

半兩

清油

壹斤

右一十三味除丹蠟油外剉碎先以油內浸藥一宿於火上煎候白芷赤黑色絞去滓再煎卽下丹蠟柳篋攪候變黑色滴水中成珠子軟硬得所瓷合盛故帛上攤貼日二次以差爲度

治發背癰疽疼痛熱毒焮腫赤鞭有膿卽撮令頭潰蛇皮塗貼方

蛇皮

長伍尺細切炒黑色

芸薑子

壹兩

雞子

貳枚取白

蔓菁葉

切貳兩

馬齒莧

切參兩

密窰中黃埽

參兩爲末

不着水者

右六味先細搗蛇皮芸薑子次下蔓菁莧埽末細研令勻次入雞子白和以瓷合盛塗故帛上貼之每日三五度換或瘡毒發熱卽研生地薑汁三五合飲之治黑瘡腫焮因乳石發動龍葵散方

右取龍葵根一握淨洗細切乳香研三兩杏人去皮尖雙人六十枚黃連去須三兩同搗羅爲細末其瘡作頭未傍攻者卽須作餅厚如三四錢許可瘡大小

傳之瘡若覺冷微痒者卽易之痒不可忍切勿不得搔動直候一炊久卽看瘡中似石榴子戩戩著然後去藥時時以甘草湯微溫洗之洗了卽以蠟帛貼之瘡若傍攻作穴卽內藥於穴中以滿爲度瘡若赤色者卽是熱肉麩所爲不用龍葵根以蔓菁根代之黑瘡愈後只得食豬魚葱蒜終身更不得食羊血食卽再

發

又方

右取甘草一斤二兩剉大麥三升黃連去須二兩同搗篩以沸湯和作餅貼瘡上乾卽易不過四五度差

又方

凡發背多於背兩胛間起如粟米或痛或痒不過數日遂至於死臨困之時已闊三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔皆膿出初有此候宜急取淨土水和爲泥捏作餅厚二分闊一寸半大作艾炷灸泥上百壯乾卽易餅仍服五香連翹湯及鐵漿攻之又發背未作大膿可水箭射之浸石令冷熨之差

乳石發身體生瘡

論曰服石之法覺飢則食坐臥衣服如之則將適有度而石勢不作儻將適失度則其熱壅滯血氣澁結此身

體所以生瘡且屢戰至微一過乎溫則足指生瘡况身體覆幕周密之至鮮有不為患者

治乳石發熱體生細瘡并熱不已黃連湯方

黃連去

芒消各

右二味以水七盞先煎黃連至四盞去滓內芒消末攪勻停溫以手中蘸藥搗瘡上

治乳石發熱徧體生瘡兼氣力弱大黃湯方

大黃剉炒

梔子人

黃芩去黑

麥門冬去心

甘草炙

右五味麤搗篩每五錢匕水二盞煎至一盞去滓內

芒消末一錢匕更煎三兩沸分溫二服早晨夜臥各

一服

治乳石發熱身體微腫生瘡升麻湯方

升麻

萎蕤各

黃芩去黑

犀角鎔

甘草炙

梔子人

右六味麤搗篩每五錢匕水三盞煎至一盞半去滓

下紫雪一錢匕分溫二服以利下三兩行為度仍用

前黃連湯塗瘡腫上

治乳石發熱體生瘡麥門冬湯方

麥門冬

法心焙甘草炙

桂去麤皮

人參壹兩

右四味麤搗篩每五錢匕水三盞入葱白二莖煎至一盞半去滓內豉二合更煎三兩沸去滓分溫二服早晨午時至晚各一

治乳石發動表裏俱熱身體生瘡或發癰痛大小便不利知母芒消湯方

知母焙

甘草炙剉各

梔子人貳棗

大黃剉少

黃芩去黑心

右五味麤搗篩每五錢匕水一盞煎至一盞半去滓入芒消末一錢匕更煎三兩沸分溫一服

治乳石發兩股生瘡熱痒兼頭痛麥門冬湯方

麥門冬去心

知母焙

澤瀉

甘草炙剉各

粳米伍合

右五味麤搗篩每五錢匕先以水五盞煎小麥二合竹葉二十片至三盞去滓下藥末重煎至一盞半去滓分溫二服空心日晚各一

治乳石發動體上生瘡結氣腫痛香豉飲方

豉分

葱白壹握

右二味以水二盞半煎至一盞去滓溫服至三四劑治乳石發動煩熱脹滿身體生瘡甘草湯方

甘草

炙

麻黃

去根節
各壹兩

右二味以水二盞酒半盞煎取一盞半先以火徧炙背令熱欲汗出卽熱服之以衣覆臥須臾大汗出卽差

治乳石發動生瘡熱氣衝胸葱白湯方

葱白

參莖切

梔子人

拾肆枚
欸合

右三味以水三盞煎至二盞去滓分作三服早晨午

時至晚服之

治服乳石患瘡腫方

右無間大小或如粟米則加意癩之或井水淋或鹽

湯洗或以指撻破卽以指甲細指旁邊又以唾敷塗之或以蒼耳湯浸洗之或以冷石忒意熨之以差爲度

治乳石發動脚指生瘡者爲履襪太溫方

右當以脚踐冷地以冷水洗之卽差

乳石發口舌瘡爛

論曰乳石發口舌瘡爛者以食飲不時穀氣不足石性暴烈其熱乘於心脾也脾主口心主舌熱積而瘡發甚而爛復不得食則熱極可知解之之劑不可緩也
治乳石發體熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛不能食梳

子人湯方

柘子入枚

黃芩去黑心

人黃剉炒各兩

豉合

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入香豉一合

煎至八分去滓食前溫服

治乳石發動口中傷爛舌強而燥不得食味者爲食少

穀氣不足藥氣積在胃脘故也宜香豉湯方

豉升

萎蕤

甘草剉各半兩

黃蘗

去蘊皮炙剉

麥門冬

去心焙各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

治乳石發頭項煩痛胸脇脹滿寒熱手足逆冷或口生瘡爛或乾嘔惡聞食氣上氣欲絕前胡湯方

前胡去蘊頭

芍藥

大黃炒

甘草炙

黃芩去黑心各貳兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗五枚擘破

煎至八分去滓溫服日再若氣實者加茯苓去黑皮

二兩胸滿塞者加枳殼去蘊麩炒一兩吐逆胸中冷

者加乾薑炮二兩口燥者加麥門冬去心焙二兩增

減以意量之

治乳石發食飲失度口中發瘡漱黃芩湯方

黃芩

去黑心
參兩

石膏

研五兩

甘草

炙

升麻

各二兩

右四味廬搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓放冷用漱口一日十徧喉咽有瘡稍稍嚥之

治乳石發動口中生瘡鉛霜散方

鉛霜

研

白礬

燒

黃藥

去廬皮蜜
炙各壹兩

麝香

研壹錢

右四味搗研爲散每用半錢匕搽瘡上有涎卽吐之

治乳石發口中瘡黃藥湯方

黃藥

去廬皮蜜
炙貳兩

龍膽

壹兩

黃連

去須

升麻

各壹兩

右四味廬搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓時時含嚥

治乳石發動口中生瘡龍腦散方

龍腦

半錢

鉛霜

滑石

各壹分

右三味各研爲細末和勻每用一字搽瘡上吐涎差

治乳石發腹內胸中悉有瘡升麻湯方

升麻

壹兩

烏梅

拾枚去
核炒

黃芩

去黑
心

黃連

去須

栝樓根

甘草

炙各
兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓細細含嚙日三四服

治乳石發動口舌生瘡連頰腫痛升麻散方

升麻

防風又法

甘草各一分

雞腸草分

芎藭

大青各一分

右六味搗羅爲散每先於瘡腫處針出惡血鹽湯漱後用藥半錢匕貼瘡上日三

治乳石發動口舌生瘡浮萍丸方

乾浮萍草

升麻

黃藥

鉛丹炒研各半兩

右四味搗研爲末鍊蜜丸如雞頭實大每服一九會化藥津

大德重校聖濟總錄卷第一百八十三

大德重校聖濟總錄卷第一百八十四

乳石發動門

乳石發身體腫

乳石發上氣喘嗽

乳石發嘔逆

乳石發霍亂轉筋

乳石發痞結羸瘦

乳石發心腹脹滿

乳石發下利

乳石發淋瀝

乳石發大小便不通

服乳石備飲食常法

乳石發諸藥不治者

乳石發身體腫

論曰石發而身體腫者以食飲過溫不能勞動致熱氣
稽滯於肌肉不得宣散故也亦有外感風濕內有停水
與石勢相薄其氣滯塞致浮腫者然食飲過溫不自勞
動其爲腫也但體熱虛腫而已若風濕停水而發腫則
必心中煩滿小便澀不可不辨也

治乳石發熱腫初覺壅宜服升麻湯方

升麻

大黃剉碎

黃芩去黑心

枳實去穢

芍藥各貳

甘草炙

當歸切焙各

右七味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服

治乳石熱腫茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

淡竹葉

壹握切碎

白朮

甘草

炙

枳實

去穢炒

人參

梔子人

各壹兩

大黃

剉炒

黃芩

去黑心參兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治連乳發寒熱胸中壅塞面腫手足煩疼生麥門冬湯

方

生麥門冬

去心焙壹兩

豉

微炒壹合

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞蒸白三莖拍碎同煎至六分去滓空心溫服

治乳石發熱堅腫芍藥湯方

芍藥

枳實

去穢炒

大黃

剉炒

升麻

各貳兩

當歸

切焙壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七分去

滓溫服空心食前日午各一服

治服石人水氣內積面目黧腫腹硬小便澀本通湯方

木通

桑根白皮

炙剉各半兩

桔梗劉

炒

赤芍藥各參

葶藶子隔紙炒

白茅根微炒各

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓空腹溫服日再

治服石人風濕外搏水飲內停身面微腫小便澀紫蘇

子丸方

紫蘇子

微炒壹合半

陳橘皮去白炒

杏仁去皮尖

赤茯苓

去黑皮

防己各壹兩

葶藶隔紙炒參分

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十五丸加

至三十九空心用桑白皮赤小豆煎湯下日再

治服石人水氣內積面腫赤茯苓散方

赤茯苓

去黑皮

牽牛子炒各壹兩半

枳殼去麤炒

陳橘皮去白炒

甘草炙各參分

右五味搗羅爲散每服一錢匕如茶點服不拘時

治乳石發動上攻頭面浮腫消石湯方

消石

葶藶

防風去

黃連去須炒

大黃炒

甘草炙

枳殼去麤炒

地榆劉

羌活去蘆頭

龍骨

代赭煨

桑根白皮剉焙各壹兩半

桂皮去麤

黃芩去黑心各半兩

石葦去毛

石一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑
三片同煎至八分去滓溫服

治乳石發熱初欲作腫石鷺子淋洗方

石鷺子

柴
一枚

石一味麤搗篩以水三升煮取二升頻淋洗癰腫處
以差爲度

治乳石發動周體患腫不能回轉者爲久坐不行又飲
酒藥氣滯在皮膚之內血脉不通也

右宜飲酒冷水洗自勞卽差若不能行者遣人扶持
強行使支節調暢乃止亦不得過度使反發熱儻反

熱者還當洗之

治乳石發動四肢面目浮腫者爲飲食溫久不自勞力
藥與正氣相隔也

右但飲熱酒冷食自勞及洗浴卽差

治乳石發動腹背熱如手如杯如盤許大者方

右但以冷石隨熱處熨之

乳石發上氣喘嗽

論曰乳石之發如火炎上熱氣騰湧熏蒸胸膈入於肺
中氣壅不散使人胸滿短氣上喘欬嗽不得安臥
治乳石發肺脹氣急呀嗽喘塵不得安臥紫苑湯方

紫苑去苗土壹兩半

甘草炙半兩

赤茯苓去黑皮壹兩半

檳榔剉伍枚

葶藶子紙上炒壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治乳石發熱衝頭面目乾喘嗽麥門冬湯方

生麥門冬去心焙 葶藶去根

石膏碎各兩

葛根剉叁兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白三莖

切同煎至一盞去滓入生地黄汁二合更煎三兩沸

食後分溫二服日再

治乳石發上氣肺熱呀嗽多涕唾貝母湯方

貝母去心壹兩

麥門冬去心焙叁兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒貳拾

枚

生薑切

石膏碎各壹兩

黃芩去黑心半兩

甘草炙兩

五味子

白朮剉各半兩

淡竹葉壹握

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓下蜜二錢攪勻空心溫服若取利入芒消一字

湯成下

治乳石上氣呀嗽不得臥臥即氣絕葶藶丸方

葶藶子紙上微炒半兩 芸薹子煉淨

馬兜零剉

紫苑去苗

人參各壹兩

杏仁

湯去皮尖雙仁炒貳拾枚

皂莢

酥炙去黑皮并子半兩

白前

甘草

炙

防己各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗令熟丸如梧桐子大

空心米飲下二十九

石發定肺氣止喘嗽天門冬煎方

天門冬

去心絞汁貳兩生地黃絞汁肆兩

生薑

去皮絞汁貳兩

杏仁

湯去皮尖雙仁如膏貳兩

白蜜

貳兩

牛酥

兩

百部

款冬花

紫苑

去苗

麻黃

去根節別升麻參

甘草

炙貳兩

右一十二味將後六味各攪為末先以水五盞煎麻

黃末三錢匕去沫下五藥水五錢匕煎至四盞絞去

滓澄濾於銅器中以微火煎至三盞次下天門冬汁

地黃汁各二合更煎減至二盞下薑汁二合更煎減

至一盞下杏仁膏酥蜜等各半合攪合勻稠置不津

器中每服取半雞子殼許含化嚥津日四五服

治乳石發熱喘嗽方

鼓試

右以水三盞漬取汁分溫三服早晨日午晡時各一

服服訖臥少時

乳石發嘔逆

論曰石性勇悍凡服食過度將適失宜而又脾胃不和穀不能勝則其氣上攻所以發嘔逆也

治乳石發動熱氣上攻脾胃不和嘔逆食不下伏苓湯

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

黃耆

剉

枇杷葉

拭去毛

參

各分

前胡

去苗頭

枳殼

去瓤炒

大黃

剉

蘆根

剉各

麥門冬

去心

甘草

半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片青竹筍一分煎至八分去滓食後臨臥溫服

治乳石發結熱癖心下腫胸中痞塞嘔逆不止鴈肪湯

方

鴈肪

壹具先煮過

當歸

切

大黃

剉

桂

去諸皮

芍藥

半兩

人參

石膏

研

甘草

剉各壹兩

桃人

去皮尖

研

右九味除鴈肪外麤搗篩先將鴈肪以水七盞煎取汁五盞去鴈肪每服用汁二盞藥末四錢匕更入桃

人七枚棗一枚拍碎煎至一盞去滓入芒消少許更煎三兩沸空心溫服日午再服若熱盛者日四服如無鴈以白鴨代之如無白鴨以烏雞代之

治乳石發動嘔服藥不効三黃湯方

豉參合新綿裹梔子人兩

穉穉作袋子

枳實去殼貳兩

甘草炙

前胡去蘆

大黃剉炒各

右六味除豉外麤搗篩每服四錢匕水二盞和豉袋了同煮至一盞後入芒消一錢匕再煎一二沸去滓空心溫服

治乳石發動虛熱痰飲嘔逆飲食不下栝樓根湯方

栝樓根

麥門冬去心

人參

甘草炙

黃芩去黑心

半夏湯洗

蘆根剉各

前胡去蘆

右八味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參

白朮

栝樓根

甘草炙剉各

黃芩去黑心

右五味麤搗篩每四錢匕水二盞煎至一盞去滓分溫二服早晚食前各一

治乳石發熱乾嘔煩熱半夏湯方

半夏湯洗去滑如焙壹兩 白薇炒貳兩

乾薑炮

甘草炙到各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕苦酒一盞煎至五分去

滓溫服

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參

甘草炙到

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

蘆根去土到焙

栝樓剉炒各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治乳石發嘔不止食不下薤白飲方

豉微炒肆合

陳橘皮湯浸去白壹兩

麥門冬去心焙貳兩 粟米半合

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞入薤白二莖拍

碎煎至一盞去滓溫服早晚各一

治乳石發動乾嘔枳殼湯方

枳殼去麩炒伍兩

梔子人染

豉微炒貳合

大黃剉兩貳兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服空心晚後各一強壯者加大黃一兩

治乳石發嘔不息方

薤白壹握

右一味碎切以水三盞煎至一盞去滓溫服

治乳石發嘔逆咽喉中傷清血出者此因臥溫及食熱所致方

右以冷水飲之或以冷石熨咽喉卽差

治乳石發胸脇滿氣上逆此因失飢不食藥氣上衝所致方

右速與冷水洗之或以冷飯食之卽差

治石發霍亂轉筋

論曰乳石發霍亂轉筋者以服食失度陰陽不和清濁相干也蓋服石之人府藏多熱熱卽引飲及其飢飽食又過多水穀旣傷腸胃不納下爲泄利上爲吐逆又爲膜脹吐利不止寒氣益甚則爲轉筋食飲藥劑當調以溫和使石熱平息氣道下降則病可愈

治乳石發霍亂轉筋不止香薷湯方

香薷分

木瓜乾者去瓤

人參

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去蘊皮生薑汁炙難各壹兩

桂去蘊皮半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切煎取八分去滓溫服不計時候

治乳石發霍亂吐利轉筋木瓜湯方

木瓜大者壹枚
去麁薄切

倉粳米壹合

右二味以水二盞煎取一盞去滓時時溫服一合

治乳石發霍亂吐利不止及轉筋糯米飲方

糯米海淨
壹合

右一味細研以少許清水攪如乳狀頓服立止

治乳石發霍亂轉筋及心腹痛高良薑湯方

高良薑剉半
兩

桂去麁皮
壹兩

木瓜乾者去
麁兩

右三味廔搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服不計時

治乳石發霍亂吐利轉筋棠梨木瓜湯方

棠梨枝壹握

木瓜大者壹
枚去麁

右二味細剉分四服每服以水一盞入生薑五片煎
取七分去滓熱服不計時

治乳石發轉筋不吐不下氣急桑葉飲方

桑葉切貳
兩

右一味以水五盞煎至一盞半去滓分溫二服早晚
各一

治乳石發吐利轉筋氣急高良薑飲方

高良薑劉伍兩

右一味麤搗篩每服三錢匕以酒一盞煎至六分去滓溫服早晚食前各一亦療暴腹痛惡血氣急

治乳石發霍亂轉筋氣急木瓜飲方

木瓜壹枚去皮子切焙乾

右一味剉如麻豆大每服三錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服飲盡更作無木瓜只以枝葉并根代之

治乳石吐利不止轉筋入腹欲死方

生薑半兩切

右一味以酒一盞煎五七沸去滓頓服之

治乳石發動霍亂疔痛不可忍方

食茱萸淘淨炒香貳兩

右一味以酒三盞煎至一盞半分為二服得下利即差空腹食前各一

治乳石發霍亂轉筋入腹方

雞屎白兩半

右一味搗羅為末每服二錢匕空腹以溫水半盞調頓服之良

乳石發痞結羸瘦

論曰陰氣積於下陽氣盛於上升降不時則成痞結羸瘦况服乳石者飲食不節將適失度熱氣熾於上陰陽隔而不通水穀之氣不能潤養肌體則肌肉枯燥胸膈痞塞腸胃脹滿久則正氣衰微日益羸瘦固其宜也治法當升降痞隔調適陰陽如此則痞者通石勢息也治乳石熱盛虛弱痞結羸瘦調順陰陽去熱益氣黃耆湯方

黃耆

人參

生乾地黄

甘草

白芍藥

桂皮

黃芩

赤茯苓

升麻

右九味蠶絲篩每服五錢匕水一盞半棗三枚擘破生薑三片同煎數沸次下竹葉七片更煎三二沸去滓取一盞空心溫服日再

治乳石發後虛熱羸之胸膈痞滯心腹脹滿或腰脚痛腎歷膏歸湯方

當歸

甘草

芎藭

遠志

麥門冬

芍藥

赤茯苓

生乾地黄

黃芩

桂枝

五味子

右一十一味蠶絲篩每五錢匕先以水五盞入白羊

人七枚棗一枚拍碎煎至一盞去滓入芒消少許更煎三兩沸空心溫服日午再服若熱盛者日四服如無鴈以白鴨代之如無白鴨以烏雞代之

治乳石發動嘔服藥不効三黃湯方

鼓

參合新綿裹線纏作袋子

梔子人兩

半兩

枳實

炒去瓢兩

甘草

炙

前胡

去蘆頭

大黃

剉炒各兩

右六味除鼓外麤搗篩每服四錢匕水二盞和鼓袋了同煮至一盞後入芒消一錢匕再煎一二沸去滓空心溫服

治乳石發動虛熱痰飲嘔逆飲食不下栝樓根湯方

栝樓根

麥門冬

去心焙

人參

甘草

炙

黃芩

去黑心各半兩

半夏

湯洗滑

蘆根

剉各兩

前胡

去蘆頭各分

右八味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參

白朮

栝樓根

甘草

炙剉各兩

黃芩

去黑心兩

右五味麤搗篩每四錢匕水二盞煎至一盞去滓分溫三服早晚食前各一

治乳石發熱乾嘔煩熱半夏湯方

半夏湯洗去滑

白薇炒

乾薑炮

甘草炙

右四味麤搗篩每服三錢匕苦酒一盞煎至五分去

滓溫服

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參

甘草炙

麥門冬去心

黃芩去黑心

蘆根去土

栝樓剉炒

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治乳石發嘔不止食不下薤白飲方

豉微炒

陳橘皮湯浸去白

麥門冬去心

粟米合

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞入薤白二莖拍

碎煎至一盞去滓溫服早晚各一

治乳石發動乾嘔枳殼湯方

枳殼去瓤

梔子人

豉微炒

大黃剉

兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服空心晚後各一強壯者加大黃一兩

治乳石發嘔不息方

薤白壹握

右一味碎切以水三盞煎至一盞去滓溫服

治乳石發嘔逆咽喉中傷清血出者此因臥溫及食熱所致方

右以冷水飲之或以冷石熨咽喉卽差

治乳石發胸脇滿氣上逆此因失飢不食藥氣上衝所致方

右速與冷水洗之或以冷飯食之卽差

治石發霍亂轉筋

論曰乳石發霍亂轉筋者以服食失度陰陽不和清濁相干也蓋服石之人府藏多熱熱卽引飲及其飢飽食又過多水穀旣傷腸胃不納下爲泄利上爲吐逆又爲膜脹吐利不止塞氣益甚則爲轉筋食飲藥劑當調以溫和使石熱平息氣道下降則病可愈

治乳石發霍亂轉筋不止香薷湯方

香薷分

木瓜乾者去鹽

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去蘖皮生薑汁炙各壹兩

桂半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切煎取八分去滓溫服不計時候

治乳石發霍亂吐利轉筋木瓜湯方

木瓜

大者壹枚
去瓤薄切

倉稷米壹合

右二味以水二盞煎取一盞去滓時時溫服一合

治乳石發霍亂吐利不止及轉筋糯米飲方

糯米

淘淨
叁合

右一味細研以少許清水攪如乳狀頓服立止

治乳石發霍亂轉筋及心腹痛高良薑湯方

高良薑

剉半
兩

桂

去麤皮
壹兩

木瓜

乾者去
瓤貳兩

右三味處搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服不計時

治乳石發霍亂吐利轉筋棠梨木瓜湯方

棠梨枝

壹握

木瓜

大者壹
枚去瓤

右二味細剉分四服每服以水一盞入生薑五片煎

取七分去滓熱服不計時

治乳石發轉筋不吐不下氣急桑葉飲方

桑葉

切貳
兩

右一味以水五盞煎至一盞半去滓分溫二服早晚

各一

治乳石發吐利轉筋氣急高良薑飲方

高良薑劉伍兩

右一味麻搗篩每服三錢匕以酒一盞煎至六分去滓溫服早晚食前各一亦療暴腹痛惡血氣急

治乳石發霍亂轉筋氣急木瓜飲方

木瓜壹枚去皮子切焙乾

右一味剉如麻豆大每服三錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服飲盡更作無木瓜只以枝葉并根代之

治乳石吐利不止轉筋入腹欲死方

生薑半兩切

右一味以酒一盞煎五七沸去滓頓服之

治乳石發動霍亂疔痛不可忍方

食茱萸淘淨炒香貳兩

右一味以酒三盞煎至一盞半分爲二服得下利卽差空腹食前各一

治乳石發霍亂轉筋入腹方

雞屎白半兩

右一味搗雜爲末每服二錢匕空腹以溫水半盞調頓服之良

乳石發痞結羸瘦

論曰陰氣積於下陽氣盛於上升降不時則成痞結羸瘦况服乳石者飲食不節將適失度熱氣熾於上陰陽隔而不通水穀之氣不能潤養肌體則肌肉枯燥胸膈痞塞腸胃脹滿久則正氣衰微日益羸瘦固其宜也治法當升降痞膈調適陰陽如此則痞者通石勢息也治乳石熱盛虛弱痞痞結羸瘦調順陰陽去熱益氣黃耆湯方

黃耆剉

人參

生乾地黄焙

甘草剉炙

白芍藥各貳兩

桂去麩皮

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮各壹兩升麻兩參

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗三枚擘破生薑五片同煎數沸次下竹葉七片更煎三沸去滓取一盞空心溫服日再

治乳石發後虛熱羸乏胸膈痞滯心腹脹滿或腰脚痛

腎瀝膏歸湯方

當歸切

甘草炙

芎藭

遠志心

黃耆不麥門冬

芍藥

赤茯苓

去黑皮各貳兩

生乾地黄焙

黃芩去黑心

大桂去麩皮

三好五味子

右一十二味麤搗篩每五錢匕先以水五盞入白羊

腎一隻去筋膜切煎至三盞去腎下藥入生薑一棗
大拍碎大棗三枚擘破更煎至二盞去滓分溫二服
空心食前

治乳石發動體黃瘦不能飲食心膈痞結起居腰背急痛

嗜臥半夏湯方

半夏

湯浸洗

黃芩

去黑心

土瓜根

各貳兩

赤茯苓

去黑皮桂去麤皮

枳殼

去麤皮炒

白朮

各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑二棗大拍
碎煎至一盞去滓空心溫服日再

治乳石發動因服冷藥太過致心膈痞滿腹內疼痛不
思飲食日漸羸瘦枳實湯方

枳實

麤炒

赤芍藥

青橘皮

湯浸去白焙

當歸

炒切

大腹皮

各參分

前胡

去蘆頭壹兩

白朮

兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑一棗大拍
碎棗二枚擘煎至八分去滓溫服不拘時

治乳石發動心膈痞滿喘息微促腹脇妨悶疼痛大腹
湯方

大腹皮

壹兩

木香

枳殼

去麤皮炒

赤芍藥

甘草炙別各半兩

前胡去蘆

陳橘皮湯浸去白皴 赤茯苓去黑皮各參分

右八味搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治乳石發動心膈痞滿腹內妨痛不思飲食桔梗湯方

桔梗剉炒

枳實麩炒

白朮各貳兩

梔子人兩

甘草炙別各半兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

乳石發心腹脹滿

論曰乳石發心腹脹滿者以飲食居處皆犯溫煥石勢壅遏不得宣通故府臧之間熱氣相搏而心腹脹滿也又有腹脹欲斷衣帶者亦以寢處之溫失食失洗不時動役之過但能冷食冷洗當風而立則脹滿自消

牽牛兩

右一味搗羅爲末用生薑自然汁煮麩糊和丸梧桐子大每服五十九生薑湯下

治乳石發大熱心腹滿脹石膏湯方

石膏

大青各參兩

黃芩去黑心

升麻 芍藥各各兩

右五味蠶搗篩每用五錢匕水一盞半煎至一盞去滓分溫二服如腹痛加續斷二兩

治乳石發腹脹頭痛先有癖實不消或飲酒食肉所致時苦心急痛者黃芩湯方

黃芩去黑心 甘草炙 大黃剉炒各

麥門冬去心焙 梔子人 枳殼炒

右五味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓下芒消一錢匕再煎三兩沸溫服早晨晚後各一服

治乳石發動上氣熱實心腹滿小便赤大便不利痞逆衝胸口焦燥目赤痛大黃湯方

大黃剉炒 黃芩去黑心 黃連去須

甘草炙 麥門冬去心焙

右五味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓內芒消一錢匕再煎三兩沸溫服早晨近晚各一服通利即愈

治乳石發動心胸痞脹毒萎蕤湯方

萎蕤 黃芩去黑心 升麻

乾薑炮 芫胡去苗各 芍藥

黃連去須各兩

石膏肆兩

梔子人棗

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一分拍碎并豉少許同煎至六分去滓下芒消半字令沸溫服如人行十里許再服日二快利卽止

治乳石發內有虛熱胸腹痞滿外風濕不解肌肉拘急香豉湯方

豉貳合

梔子人拾肆

葱白壹握

黃芩去黑心參兩

右四味除葱豉外麤搗篩每服先以水三盞煮葱豉至一盞半下藥四錢匕更煎至八分去滓溫服

治乳石發內熱結不除或已飲酒冷食澡洗猶不解或腹脹頭痛眼目疼或先有癰實小消或連飲不食或時作心痛甘草湯方

甘草貳

黃芩去黑心

大黃剉炒各兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服早晨晚後各一服

治乳石發心腹脹痛冷熱相搏桔梗湯方

桔梗剉炒參兩

甘草貳

白朮

枳實去穢炒

梔子人各貳

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

萍溫服早晨晚後各一服

治乳石發心痛脹滿飲熱酒不解葱豉酒方

葱壹握

豉伍合

右二味以水三盞煎至一盞去滓分三服熱飲之早晨日午近晚各一

治乳石發動腹脹欲裂者爲久坐下熱及衣溫失食所

致

右宜數冷食冷飲洗當風取冷須臾卽愈

乳石發下利

論曰乳石之性剛猛氣多炎上理之傷溫則火轉爲熾

內煎脾肺苦熱遂成其渴飲水過多則渡腸胃胃得水則吐腸得水則寒而腸雖寒火炎不滅水漸流下而爲行潦遂變下痢胃氣虛冷水穀不消在陽則益熱不食在陰則腸鳴而洩也

治乳石發動煩熱腹痛變爲下痢不欲飲食地榆散方

地榆壹兩

木香半兩

姜黃參分

當歸

參分 剉

黃芩參分

右五味搗篩爲散每服四錢匕水一中盞煎至六分

去滓溫服不計時候

治乳石發動解散已經快利熱尚不退兼痢不斷黃連

湯方

黃連壹升

白梁米貳合

右二味水五升煮取二升分三服一日盡

治乳石發下痢梔子人湯方

梔子人貳拾枚

甘草貳兩 炙令赤色 人參貳兩

黃連貳兩

右四味麤搗篩每服四錢匕用水二盞煎至一盞去

滓溫服早晨日午晚後食前各一

治乳石發下痢香鼓飲方

鼓伍合

葱白壹握

乾薑

炮裂搗末壹兩

甘草

微炙剉搗末壹兩

右四味先以水三盞入甘草乾薑二味末各二錢匕

煎水至二盞去滓下碎葱一合鼓一合更煎至一盞

去滓分爲三服早晨午時日晚各一

治乳石發下痢黃連湯方

黃連壹兩

鼓伍合

烏梅取肉拾枚

右三味剉碎以水三盞入童子小便一盞薤白三莖

拍碎同煎至二盞去滓分溫三服空心日午晚後各

一
治乳石發夾時行兼有客熱下血痢止血破棺起死黃

藥湯方

黃蘗

微炙剉 研貳兩

黃連

去須 研兩

乾薑

炮裂 壹兩

石榴皮

炙剉碎 貳兩

阿膠

炙令燥 半兩

芍藥

兩

梔子人

拾伍枚

右七味麤搗篩每服四錢匕以水二盞煎至一盞去滓溫服日再

治乳石發散已經快利熱尚不退兼痢不斷梁米湯方

梁米

壹合

黃連

去須剉 研參兩

右二味麤搗篩以水四盞煎至一盞半分三服去滓食前溫服一日令盡

治乳石發白痢黃連湯方

黃連

去須剉 裹骨兩

蜜

壹合

童子小便

壹盞

右三味以水二盞與小便漬藥一宿煎至一盞半去滓分為二服病人三服早晨日午晚後溫服

治乳石發赤白痢兼熱煩渴梔子湯方

梔子人

拾伍枚

薤白

切壹握

豉

壹合

右三味以水三盞煎至一盞半去滓分溫二服病人即分為三服食前服

治乳石下痢及常服壓石方

豉

兩

右一味炒令黃香候冷搗篩爲末每服二錢匕以冷水調下

解乳石痢方

紫筆茶兩

右一味搗羅爲末每服三錢匕以水一盞煎至七分和滓服之早晨日午晚後食前各一

解石痢方

右淡煮真好芥濃汁服二三盞重者三服輕者一二服差

乳石發淋瀝

論白乳石發動小便淋瀝者石勢歸腎熱氣所致也蓋腎主水而惡燥水行小腸入胞爲溲便腎氣和平則溲便順流腎氣宿虛復因石熱將溫過度虛熱相搏則溲便數而澁且痛也數爲虛澁爲熱澁甚而痛故爲淋瀝治乳石發動患淋積年或數日輒發滑石散方

滑石兩

冬葵子兩

赤茯苓兩

芍藥

黃芩兩

蒲黃兩

芒消兩

瞿麥兩

石韋兩

陳橘皮兩

湯浸去白

右一十味搗羅爲散每服二錢匕煎後方桑白皮飲

調服空心食前日二服漸加至三服取利爲度
下前藥桑白皮飲方

桑根白皮剉壹兩半木通剉貳兩白茅根剉貳兩半

百合貳兩甘草炙滑石各壹兩

右六味細剉如麻豆大每服五錢匕水三盞煎至二盞去滓每用半盞調前散如口乾卽食前更服此飲

治乳石發動淋瀝滑石木通湯方

滑石伍兩木通剉參兩石韋剉貳兩

瞿麥總各貳兩冬葵子伍兩

右五味麝搗篩每五錢匕水三盞入菝葜少許剉碎

同煎至一盞半去滓更下芒消少許煎三兩沸分溫

二服空心一服如兩食久再服微利爲度

治乳石發動熱結小便淋瀝小腹脹大黃湯方

大黃剉芍藥 赤茯苓去黑皮各壹兩

大麻人半升別研每服旋入膏合

右四味除麻人外麤搗篩每服五錢匕水三盞入麻人一合同煎至一盞半去滓分溫二服空心一服日

午再服

治乳石發動熱結小便淋瀝小腹痛蠪蛸湯方

桑蠪蛸炙黃貳拾枚黃芩去黑心壹兩

右二味細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓分作二服空心溫服日午再服

治乳石發動熱淋澀痛車前湯方

車前草

去根剉

葵根剉洗令淨切片暴乾各貳兩

木通

剉半壹

右三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎一兩沸溫服日再取利爲度

治乳石發動血淋不止雞蘇湯方

雞蘇

剉去根到暴

石膏碎貳兩

竹葉

壹握切

蜀葵子

別爲末

葵子

爲末每服放入壹錢

右五味除葵子外麤搗篩每服二錢匕水一盞半煎至一盞去滓下葵子末一錢匕更煎至八分溫服日二

治乳石發卒患淋方

缸底青苔

壹塊如鴨子大

右一味以水三盞煎至一盞半去滓分溫二服空心日午各一

治乳石發熱淋茅根湯方

白茅根

淨洗剉暴乾半斤

右一味蠟搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓
溫服食前日二

治乳石石淋狀如碎砂石下者方

車前子壹升霜

右一味以水五盞煎至二盞經宿勿食頓服之須臾

砂石自下

治乳石發熱小便數少如淋葵子湯方

冬葵子

棟伍合如無子切
陳根壹兩亦得

右一味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日三

乳石發大小便不通

論曰乳石發大小便不通以石勢乘於大小腸故也蓋
石氣慄悍方其將適得宜飲食有節則慄悍之氣沉潛
而不作將適失宜食飲不節沉潛者於是騰躍而四達
乘於腸間則津液內燥而爲結澁此大小便所以不通
也

治乳石發熱四體煩滿脉至急數大小便不通升麻湯
方

升麻參兩

黃蘗微炙

黃連去須

芍藥各壹兩

甘草炙令赤

黃芩去黑心

白鴨屎

淡竹葉切各

梔子人拾肆

右九味除竹葉鴨屎外麤搗篩先以水三升煮竹葉鴨屎去滓至一升半每服取一盞入藥四錢匕煎至七分去滓溫服早晨日午晚後各一若上氣加杏仁五合石膏三兩

治乳石發動氣上不得食嘔逆大小便不通氣滿煩悶

折熱下氣前胡湯方

前胡去蘆

黃芩去黑心

甘草炙令微赤

赤茯苓去黑皮各貳兩杏仁湯浸去皮尖炒

枳殼去瓤炒兩大黃剉炒兩

梔子人拾

右八味麤搗篩每服五錢匕水三盞入生薑一分拍碎同煎至一盞半去滓分溫三服早晨日午晚食前各一服訖如利多喫酢飯止之不可頻服隔三兩日卽更服

治乳石發動煩熱身體微腫不能食飲小便利茯苓

飲方

赤茯苓去黑皮貳兩白朮炒令香

甘草炙令赤

栝樓根碎人參

桂去麤皮

黃芩去黑心貳兩枳殼去瓤炒兩

右八味麤搗篩每五錢匕水三盞煎至一盞半去滓
分溫二服空心日晚食前各一

治乳石發動上氣熱實不解心腹滿悶大小便不通口
燥目赤者芒消湯方

芒消

黃連主

黃芩去黑心

甘草炙令黃

梔子人

大黃剉炒各

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服日二早晨日晚各一

治乳石發動大小腸壅滯臍腹妨悶亦茯苓散方

赤茯苓去黑皮

木通剉各

葵子牛

惡實炒

枳殼去心

大黃剉碎微炒

右六味搗羅爲散每服二錢匕煎紫蘇湯調下如人
行十里再服以利爲度

治乳石發動致人虛勞下焦有熱骨節煩疼肌急內痞
小便不利大便澁難口乾舌燥氣乏少力折石敗熱大
麻人飲方

大麻人伍合研爛

豉金合以綿裹作袋子

右二味以水四盞將麻人研爛絞取汁并豉袋子與
水同煎至二盞去滓分爲四服早晨日午晚食前各
一夜更一服

治乳石發動大小腸壅滯不通枳實湯方

枳實

去瓢燒炒令黃

前胡去蘆

檳榔剉

木通

剉各壹兩

甘草炙半兩

大黃壹兩半剉炒

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分煎

取六分去滓不計時候溫服

治乳石發熱口乾小便澀方

萎黎兩伍

右一味搗碎每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服但得微利卽差

治乳石發熱口乾小便澀方

甘蕉剉去皮寸截

右一味嚼嚙汁如口痛不能嚼者取汁飲之先會利卽勿服

治乳石發熱體氣昏濁不痛不痒小便赤澀方

生茅根斤貳

右一味搗令爛以新布絞汁細細飲之

治乳石發虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少吸吸少氣折石敗熱方

大麻子合

右一味研令極爛以水三盞煮至一盞半分二服早

晨日午各一

治乳石發動大便難腹中堅脹者爲積久腹中有乾糞
不去方

右宜銷酥及蜜并石膏末和服令滋潤腹中卽下若
不下更服大黃朴消等下之便差

服乳石備飲食常法

論曰服乳石者莫急於將適將適之法莫先於飲食有
所宜者有所當忌慎者有不可不預備而防其疾之將
然者今特叙之服乳石之人所宜飲食方

右取豬脂并豬肉可一月三五度食之伴以水牛頭

蹄及白羊頭蹄豬肉作薑豉隨意食之果實宜食梨
柿等凡欲服熱羊肉麪食之類宜先食三五匙冷飯
卽不妨熱食訖仍速以冷飯壓之行走釋故乃善服
石人有性喜麪嗜酢不能禁慎者宜食冷淡糠酢白
沸紫麪及水模餅卽無妨冷非羹大補時時宜食之
又服石人雖可飲酒而不宜多飲酒多則失食味失
食味則不能食不能食則令人虛熱虛熱則令石數
發惡寒况又損石力謂酒能壓石令人風虛腰脚弱
若能飲又能食大佳

又服石忌慎方

晨日午各一

治乳石發動大便難腹中堅脹者爲積久腹中有乾糞
不去方

右宜銷酥及蜜并石膏末和服令滋潤腹中卽下若
不下更服大黃朴消等下之便差

服乳石備飲食常法

論曰服乳石者莫急於將適將適之法莫先於飲食有
所宜者有所當忌慎者有不可不預備而防其疾之將
然者今特叙之服乳石之人所宜飲食方

右取豬脂并豬肉可一月三五度食之住以水牛頭

蹄及白羊頭蹄豬肉作薑豉隨意食之果實宜食梨

柿等凡欲服熱羊肉麪食之類宜先食三五匙冷飯

卽不妨熱食訖仍速以冷飯壓之行步釋散乃善服

石人有性喜麪嗜酢不能禁慎者宜食冷淡糠酢白

沸紫麪及水模餅卽無妨冷非羹大補時時宜食之

又服石人雖可飲酒而不宜多飲酒多則失食味失

食味則不能食不能食則令人虛熱虛熱則令石數

發惡寒况又損石力謂酒能壓石令人風虛腰脚弱

若能飲又能食大佳

又服石忌慎方

右凡服石飲食切忌熱麪白酒陳臭酢醬雞犬殺羊
牛肉鮑魚鮑臭魚脯血羹冷酒有灰酒蕎麥小豆胡
麻動作切忌乘飢灸灼熱湯沐浴夏月空腹念恚及
過市廛入喪家并哭泣衝熱忍飢登甚穢廁親不潔
婦人蔬菜忌芸薹胡荽荏菹枸杞芥菜大蒜果實忌
梅杏桃李藥物忌烏頭附子天雄蒼耳等悉宜消息
以取安平且服石將慎至難不能將息不若勿服蓋
背脊腦裂發乳體腫之疾往往因此得之故耳
服乳石後將慎紫麪食方

右取烏豆不拘多少煮取濃汁代水和麪依常法作

麪食還向此豆汁中熬煮乾則添豆汁勿加水候熟
入豬羊藹豆等臠食之和山芋作麪尤佳
又水摸餅方

右作餅欲上鍤時以水塗摸生餅上表裏燂之切勿
食胡餅燒餅等大壅熱故也

又宜食麵餅方

右取麵拌如常餅法細切如小豆大以麪於簸中拌
令如丸煮極熟乾漉出置冷水中又漉出置盤中以
粉再拌麪圓內鑊中煮令極熟乘熱任以五味汁及
諸肉臠食之大涼補腰脚於藥無犯

又方

右取新大麥爲麩和肉汁及作餅食甚良又大麥熟
蒸爲餅和黑豆相拌食良憂日昏熱遠行食晚失飢
右必發動宜作大麥餅將行飢卽食之壓石藥飢甚
妙

治乳石發動寒慄顫掉不自支持者爲食少藥氣溢於
肌膚五藏失序百脉搖動與正氣相競方

右宜強飲熱酒以和其脉藥食以定其藏強行以調
其關節強洗以宜其壅滯

乳石發諸藥不治者

論曰乳石發動各有方劑以對病證固有疾勢異常諸
藥所不能治者廼別叙備用之法
治乳石發動諸藥不効宜服萎蕤酒方

萎蕤

升麻

薺苳

入參各參

犬黃剉炒 貳兩

黃芩去黑心

葛根剉

紫草去蘆頭

犀角鎔各 肆兩

梔子人

芒消各貳 兩

銀屑貳兩

豬脂臘月者

露蜂房伍 兩

甘草炙剉 貳兩

大豆最壹宿暴乾
妙去皮壹合

右一十六味除豬脂銀屑外搗羅爲細末以無灰酒

二升密封清經一宿次將豬脂用好酒一升鍊開以銀屑相和研入前藥酒內更浸一宿每服取酒一二盞飲之

治乳石發動諸藥不治單服豆豉酒方

醇酒壹升

豉伍合

右二味同煮沸熱澄清旋飲一盞

治乳石發諸藥瘳不差方

消石

明白者壹兩加杏子大

右一味不拘時逐旋含化嚥津

治一切石發胡豆汁方

胡豆半升

右一味以水五盞與胡豆同研生絹絞取汁每服半盞不拘時服

治乳石發大麥麩方

大麥

搗去皮淨以水淘染徧漉出蒸令香熟焙乾令更炒香壹升

右一味搗羅爲細麩每服三錢匕化蜜水調服早晨

日午晚後各一

治乳石熱氣結滯經年數發胡荽飲方

胡荽

五月五日採預收陰乾半斤春夏採葉秋冬採根

右一味以水七升煮取一升半去滓每服一盞不計

時候日三

治乳石發動口乾寒熱似鬼為病諸藥不治者麥門冬

丸方

麥門冬別分

五加皮

犀角屑

黃芩各肆分

萎蕤兩

梔子肆分

升麻兩

大黃伍分

芍藥肆分

大青

甘草炙各參分

苦參陸分

右一十二味搗為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十

五丸至二十九食後蜜水送下日三以意加減

治乳石發熱因諸藥不効者方

豬脂伍合

芒消肆分

葱白伍合

豉心合

右四味以水三升煮葱豉取一升半濾去滓下豬脂

芒消三味再煎一沸分五服以差為度

治丹石發方

河中石壹兩

右一味燒合通赤投於童子小便一盞內候溫去石

飲之

治一切丹石發方

寒水石壹塊

右一味如杏子許大含之以差為度

治一切丹石發方

黃連去須
黃連

右一味搗羅為細末以水三盞浸經一宿漉去滓每

服半盞時時飲之

治一切石發方

生冬瓜去皮研
爛碎兩

右一味以水五升煮至三升去滓分溫三服早晨日

午近晚各一

治乳石發拘攣煮汁方

枸杞白皮半斤
剉研

右一味以水五升煮取三升空心任意飲之

治乳石發煮薺芫汁方

薺芫半斤
細剉

右一味以水五升煮取三升空心飲之

治諸乳石散發不可忍欲下之方

肥豬肉貳斤

葱白

薤白各肆兩

右三味切一處蒸令熟空心食盡良未少頃再食