

玉 穢 辨 志

四



欬逆

辨
欬逆云歲金太過欬逆金鬱之發欬逆少陰二之
氣欬逆用誠曰內經所言欬逆者止此他書增傷

寒論欬逆脈散者死又金匱治欬逆上氣諸方而已似皆指肺金及火為病也活人書謂欬逆證為極惡仲景所不載孫真人云偏尋方論無此名遂斷欬逆為噦證難知云欬逆證活人斷為噦逆其說似是而非蓋穢者乾嘔也若有物直出則為吐也嘔物旋出則為嘔也嘔無物出則為噦也欬逆者或水漬於肺而心痞或連續不已而氣逆或喜笑過多而氣噎

或嘔飲錯喉而氣捨或急食乾物而氣塞皆能作欬
逆之聲連續不絕俗謂之吃忒是也大抵欬逆者不
順之義吃忒者差錯之義二者皆氣不得下為火熱
托之而使上至咽喉中噎而止也人或以紙撫鼻嘔
而止或許冤盜賊因恐而止或鼻熱聞食香調氣而
止皆抑之駭之而使氣下也千金以欬逆上氣為病
肺脰散者死是心火刑於肺金也是以李氏稱易老
云欬逆者大熱奔急上行而肺金不內何其當哉故
便祕者大承氣湯下之便軟者瀉心湯主之朱氏斷
為胃寒并陽證二法用藥治噦雖勝大抵其噦之意

止是氣逆上行似欬逆耳即非仲景所謂欬逆之本証也蓋噦者出聲也噦出其氣噦聲盡然後吸欬逆者入聲也抑氣不出逆聲盡然後呼也出入呼吸其大不同兼嘔噦者本於胃欬逆者本於肺何其難辨哉又云活人以欬逆為噦謂若可下之宜調胃承氣湯是邪氣在胃故斷之為噦是則然矣抑不思欬逆者是足陽明失下傳手太陰活人但言其火之本不言其大之標炎上至極高之分而欬逆也合而觀之噦與欬逆同一熱也分而言之噦為本為膽為胃為中欬逆為標為心為肺為上若標病應見止當治

標不必名噦若言作噦使後人只見膽胃本而不見心肺標也此一說又足經甲戌而傳乎經丁辛也用誠曰海藏論欬逆與噦二者不同謂其聲有出入之異藏府有肺胃標本之殊其說尤長但欬逆與噦其氣皆自下而上嘔噦則直出于口欬逆則至咽喉吃咸而中止然後出也實非有出入之異又曰活人以欬逆為噦故今從而以仲景言噦者入欬逆門縱使仲景言噦非此証而活人論證用藥則是咳逆而非嘔噦也

欬逆虛補有溫補三法

活人云咳逆者仲景所謂噦是也

者

胃寒所生傷寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛後極汗出者因得噦所以然者胃中寒冷故也橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散主之不差者灸乳下必愈畧例云陰証者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已病丁火又消所有遊行相火寒邪迫而萃集於胸中亦欲盡也故令人發熱火渴引飲并去蓋覆病人獨覺熱也他人按之身體肌肉骨髓血脉皆寒此火即無根之火也故用丁香乾薑之類熱藥溫胃其火自下欬逆乃止用誠曰陰證欬逆蓋以陰氣先消陽火亦竭浮於胸

中亦散也故不宜用寒而反以溫藥養胃留其陽
氣胃氣一和陽生則陰長之說也而此畧例以陰証
為陰氣太甚腎水擅權寒邪迫火而上愚謂腎陰若
盛則火自不妄動矣其所謂寒邪者未審其指受外
寒耶內寒耶還只是虛耶姑俟明哲又曰大抵放
逆者多由汗下後胃虛而作活人以虛作寒治故用
諸溫熱之藥三因云放逆之病古人以為噦耳多
因吐利之後胃中虛寒遂成此疾亦有胃中虛膈上
熱噦至八九聲相連收氣不回者丹溪治趙立道
年近五十質弱而多怒七月炎暑大飢索飯其家不能

急具因大怒兩日後得滯下病口渴自以冷水調生
蜜飲之甚快滯下亦漸緩和如此者五七日召予視
脈稍大不數遂令止蜜水渴時且令以人參白朮煎
湯調益元散與之滯下亦漸收七八日後覺倦甚發
吃子知其因下久而陰虛也令其守前藥然滯下尚
未止又以煉蜜飲之如此者三日吃尤未止衆皆尤
藥之未當將以薑附飲之予曰補藥無速效附子非
補陰者服之必死衆曰冷水飲多得無寒乎予曰炎
暑如此陰涼非寒勿多疑待以日數力到當自止又
四日而吃止滯下亦安又陳澤仁年近七十厚味之

人也有久喘病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃作召予視脈皆大豁衆以為難予曰形瘦者尚可為以人參白朮湯下大補丸以補血至七日而安此二人者虛之為也

效逆實熱或清丹溪治一女子年踰笄性躁味厚暑月因大怒而吃作每作則掣身跳動神昏不知問之乃知暴病視其形氣俱實遂以人參蘆湯飲一碗大吐頑痰數碗大汗昏睡一日而安人參入手太陰補陽中之陰者也蘆則反耳大瀉手太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆氣因怒逆肝脈

乘火侮肺故吃大作而神昏參蘆善吐痰蓋氣降而
火衰金氣復位胃氣得和而解矣 素例云陽証欬
逆者胃熱失下也陰氣先絕陽氣後亦將竭火獨炎
上逆出陰氣而為欬逆少陰渴逆者失下也陰消將
盡陽逆上行使陰不內也為之惡候或兼以舌癥語
言不正而反脣冒與咽痛者少陰也速下之宜大承
氣湯若陽極脈微將盡者不宜下宜瀉心湯養陰退
陽而已涼膈芒硝清肺亦可 又云以涼膈瀉心湯
以治陽證自上而下瀉退心火陰氣乃生

活人書云陽證欬逆者有潮熱時時噦小柴胡湯橘

皮竹茹湯又云傷寒噦而腹滿視其前後何部不利
利之愈用誠曰欬逆本由陰氣已虛陽火暴甚直
衝而上出于胃入於肺而作聲東垣用涼藥者所以
瀉熱降火也略例以陽證為失下用承氣瀉心二藥
分便祕便軟用之

又曰傷寒失下地道不通因而欬逆當以寒下之如
痰飲停蓄心下或暴怒氣逆痰厥此等必形氣俱實
別無惡候皆當隨其邪之所在而涌之泄之清之利
之也

欬逆總論丹溪云吃病者氣逆也氣自腑下直衝上出于

口而作聲之名也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆
屬於火古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿
蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛人
之陰氣依胃為養胃土傷損則木氣侮之矣此土敗
木賊也陰為火所乘不得內守木挾相火乘之故直
衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此
似為危證然亦有實者不可不知用誠曰按欬逆
一證古方悉作胃寒所致俱用丁香柿蒂薑附等藥
然此證有虛有實有火不可專作寒論蓋傷寒發汗
吐下之後與滯下日久及婦人產後而有此者皆陰

證

大虛之為也若平人食入大速而氣噎或飲水喜笑錯喉而氣捨或因痰水停膈心下或因暴怒氣逆痰厥或傷寒熱病失下而有此者則皆屬實也夫水性潤下火氣炎上今其氣自下衝上而作聲非火而何欲逆證
有輕重三因云大抵傷寒久病後老人虛人及婦人產後多有此症者皆病深之候也亦有嘔而心下痞悸者是痰水所為別無惡候者也

治熱活人橘皮竹茹湯治噦逆嚴氏治吐利後胃虛之癥

開熱而放逆

橘皮升 竹茹升 甘草一兩 人參五錢

棗子箇

三十

生薑

五錢

水一斗煮服取三升去滓

溫服一升日二服

用誠曰

按此出太陰嘔噦例藥

也薑棗參橘亦是溫藥故三因云此治胃中虛冷但

以此藥比之薑桂丁香則性平故從嚴氏入治熱之

劑又曰欬逆有虛而有熱者有實而有熱者所引

橘皮竹茹湯未能詳盡也

小柴胡湯治陽證欬逆

寒門

難知大承氣湯治欬大便秘者瀉心湯治欬逆大

便軟利者方見心下痞

寒之劑

半夏生薑湯治渴欲死

半夏洗一兩生薑切二兩

水煎分服 橘皮乾薑湯治噦

橘皮 通草 乾薑 桂心 甘草各

二兩各

人參一兩 每服四錢水煎溫服日三次

用誠曰按以上二方並太陰嘔噦例藥也

三因丁香散治欬逆

丁香 柿蒂各一 甘草炙 良薑各五分

為末熱湯點二錢乘熱服不拘時

嚴氏柿蒂湯治胸滿欬逆不止

柿蒂 丁香各一 每四錢薑五片煎家珍有人
參一味寶鑑有青皮陳皮二味並各等分為末水煎

服

用誠曰按以上二方並太陰陽明經藥也 又曰世醫凡遇此疾首以丁香柿蒂為言殊不知此藥不能補虛不能降火不能清氣利惟有溫暖助火而已豈宜總治斯疾

活人羌活附子散治欬送嚴氏治吐利後胃寒欬逆
羌活 附子 炙 苗香 微炒各五錢 木香 乾薑各一
大棗許 細末每服一錢水一盞鹽一捻同煎熱服
三因方木香作丁香 用誠曰按此太陽少陰太陰

經藥也

本事方治陰毒欬逆

川烏頭 乾薑炮 附子炮 肉桂 苓藥

甘草炙 半夏 吳茱萸 陳皮 大黃

等分爲細末每服一錢薑五片煎去濁渣取清熱服
用誠曰此按三陰經藥也

補虛寶鑑炙甘草湯治許伯威中氣本弱偶病傷寒
之癥八九日醫見其熱其以涼藥下之又食梨三枚痛傷
脾胃四肢冷時發昏憒其脈動而中止有時自還乃
結脉也心亦悸動吃逆不絕色變青黃精神減少目
不欲開瞤卧惡人語以此藥治之

甘草炙

生薑

桂枝

人參

生地黃

阿膠

麥門冬

麻子仁

大棗

成無己云補可以去

弱人參大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以

益正氣五臟痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之麻仁阿

膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心也加以人

參桂枝急扶正氣生地黃減半恐傷陽氣剉一兩服
之其証減半再服而安 用誠曰按此心肺藥也又

曰謹按放逐諸方古方唯有治寒之劑至於補虛降
大養陰之藥及治痰氣厥逆之法皆未詳也學者自

宜隨證用之

灸嚴氏云咳逆治法婦人屈乳頭向下盡處骨間是
穴丈夫及乳小者以一指為率正男左女右與乳相
直間陷中動脈處是穴艾炷如小豆計灸三壯

瘡

外因風經曰諸瘡項強皆屬於濕王註太陽傷濕又
云諸暴強直皆屬於風王註陽內鬱而陰行於外

用誠曰內經言瘡肺腎太陽督脈與夫六氣皆為之
大抵專主於濕故原病式云諸瘡強直筋勁強直而
不柔和也土主安靜故也濕過極反兼風化制之然
兼化者虛象實非風也又云諸暴強直皆屬於風謂
筋勁強有力不柔和也風木為病反見燥金之化由
亢則害承乃迺制也愚謂土性安靜木性動搖瘡病
強直而安靜故主於濕風病強直而搞搦故屬於風

况土氣之下木氣乘之故痙之強直有似於風又木氣之下金氣乘之金之緊斂勁切與土相近故風之強直有似於濕二者有本化有虛象不可不察也

仲景云太陽病發熱無汗而反惡寒名曰剛痙太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔痙病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘡病也若發其汗寒濕相搏其表益虛即惡寒甚用誠曰按活人云太陽經先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之痙又作痙痙者強直也

內風烟子和云呂君王妻年三十病風搐目眩角弓反

同

張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以南星
雄黃烏附用之不效或人曰諸風掉眩皆屬肝木陽
主動陰主靜由火盛制金不能平木肝木茂而自病
先涌風痰二三升次以寒剗下之又以銻針刺百會
穴出血二盃立愈用誠曰風搐本與痓證不同而
痓證屬濕土極必兼風木動搖之化風搐屬木木極
必見金燥緊皴之形要之亦可用論故取此條以證
痓病不專於風寒濕之外至亦有風火熱之內作者
也

汗下誤
致產

仲景云太陽病發汗太多因致產風病下

王機辨症

上集

痓

土

之則痙復發汗必拘急 瘡家雖身疼痛不可發汗
汗出則痙 用誠曰按此謂發汗下之而致痙則不
專於風寒濕之外傳矣是又因壞証而成也發汗下
之太過皆亡津液損血之所由也

血氣內虛發痙 三因云夫人之筋各隨經絡結束於身血氣
內虛外為風寒濕熱之所中則痙以風散氣故有汗
而不惡寒曰柔痙寒注血故無汗而惡寒曰剛痙原
其所因多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷
寒汗下過多與夫病瘡人反產後致斯疾者際可見
矣診其脈皆沉伏弦緊但陽緩陰急則久久拘摩陰

搏

緩陽急則反張強直二證各異不可不別　用誠曰
按傷寒言痘專指外邪為病陳無擇發明血氣內虛
一節實與仲景所言汗下過多者相合可謂善矣惜
乎用藥未能詳明也又言陰緩陽急則太陽痘也陽
緩陰急則陽明痘也　郭稽中云產後汗出多而變
痘者由產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之
則變痘宜灌小續命湯　用誠曰產後汗多縱有風
邪乘之小續命其可服乎况有虛象兩實非風者哉
無擇雖嘗論其失所用大豆紫湯大聖散亦未盡善
也

總論治用誠曰傷寒痘病活人以太陽中風又感塞濕而致則專於外邪所傷然仲景亦有汗下過多之戒則又出於壞證所成矣蓋外邪所傷者通宜解散仲景言剛柔活人分陰陽難知論經絡等諸方詳矣至於治壞証補虛救失之法諸方則亡也又千金謂溫病熱入腎中亦為痘小兒病癟熱盛亦為痘若此治法俱未見之也况此二者之外又有血氣本虛之人如產後汗出多而變痘者或因七情怒氣而發者或因濕熱內感痰涎壅遏經絡而作痘者治各不同也大抵傷寒有外邪之可解宜用風藥發散風寒又風

藥亦能勝濕耳至於邪熱入腎亦非風藥之所能療也其內証作痘本無外邪前人豈可仍用風藥處治惟宜補虛降火敦土平木清痰去濕隨證而用不可不察也

風濕治分內外因 用誠曰按病機云諸痘項強皆屬於濕寒濕同性水火同居故足太陽屬水而位下所以濕可傷也其腋下項故主項強太陽表中風加以濕客於經中內挾寒濕則筋脈抽急故症項強而不柔和當詳有汗無汗次以流濕祛風緩發表而愈也強直屬風乃厥陰風木勢甚而成千全以強直為風治以瀉

大補全木能自平矣愚謂此言痓病項強以外感風寒濕氣者言之也風病強直以風木自病者言也

傷寒二痓治分三陽

用誠曰古人以強直為痓外證與傷寒相

似但其脈沉遲弦細而項背反張強硬如發癩狀為

黑耳察其有汗無汗以分剛柔二痓無汗葛根湯主

之有汗桂枝加瓜萎湯主之剛柔胸滿口噤脚攣急

咬齒當行大承氣湯愚謂剛痓柔痓并屬太陽至於

項強口噤一証例太陽兼陽明也因有陽明故不宜

發汗而有用大承氣湯法者難知云傷寒痓証五種

皆屬太陽餘經不言聖人之大意也若頭低視下手

足牽引肘膝相搆陽明痙也若一目或左或右邪視
并一手一足搐搦者少陽痙也汗之止之和之下之
各隨其經可使必已蓋謂此也 又曰仲景論剛柔
二痙並屬太陽活人論陰陽二痙既以陽痙屬剛痙
陰痙屬柔痙而乃以朮附薑桂諸熱藥治陰痙則是
以陰專為寒治矣恐非至當之論姑伺明哲其方茲
不載詳見本論

脈脈經云太陽病發熱脈沉而細者名曰痙為難治
夫痙脈按之緊如弦直上下行 痙家其脈伏堅直
上下 痙病其發汗已其脈洽洽如蛇 用誠曰按

緩

痓證屬風寒濕所傷有汗者脈必浮無汗者脈必浮
緊若其脈沉細者濕所傷也堅直上下行皆緊之象
也發汗已如蛇亡津液而無習氣之象也

解散金匱括薑桂枝湯治太陽病其證備身體強几
凡然脈反沉遲此為痓

括薑根

甘草炙各二兩

桂枝

芍藥

生薑各三兩

大棗十二枚

水煎分溫三服取微汗汗不出不食

頃啜熱粥發之用誠曰按此出太陽例藥也

葛根湯治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤

不得語欲作劂痓

方見傷寒門

海藏神术湯剛產

加羌活 獨活 麻黃

白朮湯治柔症

加桂心 黃芪 白朮

活人舉卿舉敗散治新產血虛症者汗後中風發搐亦然 荆芥穗不以多少微炒為末大豆黃卷熱以酒沃之去黃卷取汁調細末三五錢和渣飲之其效如神 一方則以好酒調服 用誠曰按太下此陽厥陰經藥也按本草荆芥能發汗破結氣下瘀血除風濕痺亦是攻邪之藥若血氣果虛之人亦非所宜也

攻下金匱大承氣湯治痘為心腹滿口噤卧不着席
脚摩急必斷齒可與本方見用誠曰按此陽明經藥

也陽明總宗筋以風寒濕熱之邪入於胃津液不行
宗筋無所養故急直用此湯下濕熱行津液宣明云
痘病目直口噤背強如弓卧搖動手足搐搦通宜三
一承氣湯下之亦此意也然非察證之明的有內實
熱者不可輕用

去風養血之禱難知防風當歸散治發汗過多發熱頭面搖
卒口噤背反張者宜去風養血

防風

當歸

川芎

地黃

葛根

每二兩水煎服

瘡

用誠曰謹按瘡證發汗過多與夫血氣內虛之人自當隨證用藥古方於此等處多缺略姑叙此方以見意爾至於發散風寒行經之藥甚多及活人治陰瘡諸濕藥難知分經絡用藥茲并不載用究本書

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

THE JOURNAL OF CLIMATE

THE JOURNAL OF CLIMATE

100

泄瀉

瀉分寒熱

原病式曰大抵瀉利小便清白不瀉為寒赤瀉

者為熱又完穀不化而色不變吐利腥穢澄澈清冷
小便清白不瀉身涼不渴脈遲細而微者寒也穀雖
不化而色變非白煩渴小便赤澁者熱証也凡穀消
化無問色及他證便為熱也寒泄而穀消化者未之
有也或火性急速傳化失常穀雖不化而飧泄者亦
有之矣仲景云邪熱不穀然熱得濕則飧泄也

機要云瀉利大抵從風濕熱論是知寒少熱多寒則
不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰大便完穀不化

有寒有熱熱者脈疾身多動音聲響亮暴注下迫此
陽也寒者脈沉而細身不動作目睛不了了飲食不
下鼻準氣息者蓋附湯主之若身重四肢不舉尤附
湯主之

用誠曰按此以瀉之久暴分陰陽正如傷寒之病
始為寒而終則傳變而為熱也然亦必以脈証參訂

焉

濕機要云太陰經受濕而為水泄虛滑身重微滿不
知穀味久則防變而為膿血

風機要云有厥陰經下利其脈沉而逕手足厥逆涕

唾膿血此難治宜麻黃湯小續命汗之此有表邪縮
於內當瀉表邪而愈 良方云經云春傷於風夏必
飧泄蓋風喜傷肝春時木旺不受邪反移氣尅於脾
土脾既受尅不能運化因成積滯夏秋之間再感暑
濕風冷之氣發動而成利也 子和云飧泄不止完
穀不化發汗可也桂枝麻黃湯主之此證以風為根
蓋風隨汗出也 用誠曰子和謂風隨汗解此論固
是然亦須隨其傳變而治不可執此一法也

寒機要云有暴下無聲身冷自汗小便自利大便不
禁氣難布息脈微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也

大子和云夫暴注瀉水不已內經曰注下也暴速甚者屬火宜桂苓甘露飲五苓益元散

胃氣下降機要云飲食一傷起居不時損其胃氣則上升

精華之氣反下降是為飧泄久則太陰傳少陰而為

腸澼

序三因云飲食不節過食生冷而成泄瀉者乃脾胃有傷也但停滯泄瀉一證直須積滯已消然後用斷下藥今人往往便固止之多成痢疾者矣

臍氣平治不三因云七情感動臍氣不利亦致溏泄

泄瀉治法總論用誠曰泄瀉一證古方率以為腸為胃虛寒

於

與風冷乘之為論故多行滯熱之劑彼瀉利者豈無
積滯豈無熱證乎今觀機要所論有屬風濕屬寒屬火
之證此因於外而傷者也又云厥陰經動並胃氣下
降為瀉利三因所言七情感動臟氣不平亦致痞泄
此則因於內而傷者也外則當調六氣內則當平五
臟况又有飲食所傷腸胃停滯所致者治法各不同
也然更有因胃氣下流而泄者在法則當升舉因風
而成飧泄者則當解散因痰積上焦以致大腸之于
不因而泄者又當去上焦之痰而不治其泄因脾胃
氣虛而泄者又當補中益氣使胃氣升騰而泄自止

蓋各求其本而治可也

虛經曰脈細皮寒少氣泄利前後飲食不入是謂五虛死其據粥入胃泄注則虛者活

之治濕機要云白朮芍藥湯治太陽脾經受濕水泄注下體重微滿困弱無力不欲飲食暴注無數水穀不化宜此湯和之身重暴下是大勢來亦宜和也

白朮 芍藥 酸一 甘草 鐘五 每服一兩水煎

治濕濁痰冷湯又治食瀉濕熱

白朮 茯苓 破七錢 每服一兩水煎食前服一

方有芍藥三味等分名白朮散 用誠曰按以上二方

方和中除濕足太陰陽明經藥也白朮之甘入胃而除脾胃之濕芍藥之酸澀除胃中之濕熱四肢困倦利水道而除濕此三味泄利須用之藥也

蒼朮芍藥湯治證如前

蒼朮二兩 芍藥一兩 黃芩五錢 每服一兩加淡味桂五分煎服 用誠曰此解散濕熱上中二焦之劑太陰經的藥也

良方胃苓湯治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止 用誠曰按此乃表裏除濕之劑東垣所謂上下分消其濕是也太陽太陰經藥也出陽明飲痞例

治風機要防風芍藥湯治泄利飧泄身熱脈弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩

各一兩

每服五錢水煎

用誠曰按此治風辛涼之劑太陰太陽經藥也

蒼朮防風湯治泄利腹絃頭微痛

蒼朮

二兩

防風

一兩

一方蒼朮

四兩

麻黃

一兩

防風

五錢

薑七片

煎

用誠曰按此足太陰陽明經藥也

良方神朮散治春傷於風夏必飧泄

蒼朮

藁本

川芎

各六兩

羌活

四兩

粉草

細辛各一錢 丙

每服三錢薑三片煎要出汗加葱白 用誠曰按以
上三方治風勝濕辛溫之劑此則太陽經藥也

治熱之劑局方戊己丸治脾胃濕泄利不止方見滯下門

用誠曰按泄瀉局方多以為寒至劉張始言有屬熱
屬火之証故諸方中治熱瀉之方甚少然仲景治傷
寒挾熱下利用葛根黃芩黃連湯但人未之思耳

治暑之劑局方來復丹治伏暑泄瀉如水暑門 易簡云

硝石性寒佐以陳皮其性疎快疏黃且能利人若作
暖藥以止瀉誤矣蓋由啖食生冷或冒暑熱之氣中

脫閉結揮霍亂此藥通利三焦分理陰陽服之甚癒
驗

用誠曰按此出厥陰疏黃例藥也

香薷飲治伏暑吐瀉方見暑門用誠曰按此治暑之表藥也脾肺經藥也出太陰厚朴例

治寒機要漿水散治暴瀉如水周身汗出一身盡冷脈微而弱氣少不能語甚者加吐此為急病

半夏湯洗一兩附子炮五錢乾薑桂甘草炙各五錢

良薑二錢

每服三五錢漿水二盞煎至半盞和滓熱服

白朮湯

白朮 茯苓 甘草 炙鉗 乾薑 炙錢

如前服甚者去乾薑加附子三錢謂辛能發散也
局方理中湯治臟腑停寒泄瀉不已

方門

用誠曰按此出太陰已寒例藥也以上用薑附之藥
皆為暴瀉氣脫如五虛等證救急之劑所謂暴瀉非
陽者也然有屬火者亦當求責

去瀉本事溫脾湯治痼冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先
之藥攻去然後調治不可畏虛以養病丸

厚朴 乾薑 甘草 桂心 各二
兩 大黃 破四錢
切湯

一 益瀆半日 摶去

附子 附子 水 二 升半煎八

下

合後下大黃汁再煎六合去滓服 用誠曰按泄利
腹痛其證多種有積滯者固宜攻去豈但痼冷一端
而已須詳證虛實寒熱隨其所宜以調之

升麻 東垣升陽除濕湯白下而上者引而竭之

升麻 柴胡 防風 神曲 藤鴻 猪苓 鎔五

蒼朮 附子 甘草 大麥葉麵 鎔三

如胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分薑棗煎非腸鳴
不得用之水煎早飯後熱服

升陽除濕防風湯如大便閉塞或裏急後重數至圊

而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必致重
病及鬱結而不通也以此湯舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮

泔浸去皮乾淨四兩

防風

錢

白朮

白茯苓

白芍藥

一錢

除蒼朮另作片子水一碗半煎至

二盞內諸藥同煎至一大盞食前熱服用誠曰按
飲食入胃氣上升輸精心肺然後下降脾胃有傷不
能上升反下流腎肝而成泄利者法宜填補中氣升
之舉之不可疎下此東垣發前人所未論也

調補脾
膏錢氏白朮散治小兒泄瀉胃熱煩渴不閑陰

陽並宜服之

人參 白茯苓 白朮 木香 甘草 蕃香錢

葛根

兩

每服五錢水煎

用誠曰按此太陰經

四君子例藥也治小兒陽明本虛陰陽不和吐瀉亡津液煩熱口乾以參朮甘草甘溫補胃和中木香藿香辛溫芳香可以助脾茯苓甘平分陰陽導水濕葛根甘平倍於眾藥其氣輕浮鼓舞胃氣上行津液又解風肌熱治脾胃虛弱泄瀉之勝藥也易簡白朮湯治証如前前方藿香改黃芪是也

祕藏黃芪補胃湯治一月大便三四行溏而不有時泄腹中鳴

黃芪 當歸 柴胡 益智 陳皮 鎏三

甘草

炙三錢

升麻

六分

紅花

謝

水煎食前服

補腎之劑 機要肉豆蔻丸治腎泄久不愈 腰沉細無力者

效

補骨脂

炒

肉豆蔻

等分
錢裹

棗肉 丸 桐子大飲

湯下空心 本事方 补骨脂四兩 肉豆蔻二兩 名二神

丸 治脾腎虛弱

本事五味子散 治腎泄

五味子

二兩

吳茱萸

五錢
綠色者

細粒 二味炒香熟為

度細末 每服二錢 陳米飲下 有一親戚 五更初曉時

必溏泄一次此名腎泄服此而愈

局方金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數虛冷之証

五倍子

茯苓

各二兩

龍骨

煅

硃砂

另研各三兩

紫巴戟

去心一斤

補骨脂

酒浸炒十兩

肉蓯蓉

洗焙一斤

葫蘿巴

焙各一斤

為末入研藥令勻酒丸桐子大每

服三十九粒心溫酒鹽湯任下

損傷

墮陰肝本論治

惡血從厥

靈樞云有所墮墮惡血留於內若有

所大怒氣上而不下積於脇下則傷肝用誠曰從

高墮下惡血留於內不分十二經絡聖人俱作風中

肝經留於脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血

必歸於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故

也痛甚則必有自汗但人汗出皆為風證諸痛皆屬

於肝木况敗血凝滯從其所屬入於肝也從高墮下

逆其所行之血氣非肝而何以破血行經藥治之

惡血下之脹內經云人有所墮墮惡血留內腹中脹滿不

得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡
刺足內踝下然骨之前出血刺足肘上動脈不已刺
三毛各一病見血立已左刺右右刺左子和云諸
落馬墜井打撲傷損閃肭損折杖瘡腫發焮痛不止
者可峻下二三十行痛止腫消宜以通經散導水丸
等藥或加湯劑瀉之後服和消腫散毒之藥

驚涎

堵

用誠曰子和於墮車落馬杖瘡閃肭者俱用

峻下其有心恚牙闊禁急者云是驚涎堵塞於上俱
用三聖散光吐後下其法雖峻然果有驚涎瘀血停
留於內煥痛腫脹發於外者亦奏捷功但於血出過之

多老弱之人脈虛大者亦當求責

瘀血停積與亡

用誠曰打撲金刃損傷是不因氣動

而病生於外外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病

非如六淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷

一證專從血論但須具有瘀血停積而亡血過多之

證蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃

傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀

血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其所傷

有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先

逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣

擣

無不效也頃見圍城中軍士被傷不問頭面手足胸
背輕重醫者例以大黃等藥利之後大黃缺少甚者
遂以巴豆代之以為不於初時瀉去毒氣後則多致
危殆至於累傷手指亦悉以藥利之殊不知大黃之
薦惟與有瘀血者相宜其有亡血過多元氣胃氣虛
弱之人不可服也其巴豆大熱有毒止能破堅逐積
用於此疾尤非切當所以有服下藥過後其脈愈見
堅大醫者不察又以為瘀血未盡而復下之因而大
折人命可不慎歟

脈內經云肝脈搏堅而長色不青當病墮若搏因血之

在肠下令人嘔逆。金匱云寸口脈浮微而澁然當亡血。若汗出設不出汗者當身有瘡被刀斧所傷亡血故也。脈經云金瘡血出太多其脈虛細者生數大者死。全瘡出血脈沉小者生浮大者死。用誠曰按破傷有瘀血在在內脈堅強實則生虛小弱者死。若亡血過多脈虛細小者生浮大數實者死皆為脈病不相應故也。

攻下瘀

之藥

全匱治馬墜及一切筋骨損方

大黃成湯

兩切浸

大黃成湯

兩切浸

大黃成湯

兩切浸

緋帛燒灰

如手大

亂髮燒灰

如雞

亂髮燒灰

如雞

欑單布燒灰

一尺

敗蒲一把

三十

桃仁四十

九

桃仁去皮大煮

筒

甘草
如節中指

以童便量多少煎湯成內酒一大

盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯
浴衣被處斯須通利數行痛楚立瘥

發明復元活血湯治從高墮下惡血留於脇下瘀痛
不可忍

柴胡
錢六

當歸
錢六

甘草
錢二

川山甲
錢二

大黃
酒浸一兩

桃仁
去皮尖五十箇

紅花
一錢

瓜蔞根
錢二

桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩水二盞半

酒半盞煎至七分去滓食前大溫服以利為度得利

後痛或不盡服乳香神應散靈樞云墮墮惡血留於

脇下則傷肝肝膽之經行於脇下屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也以甘草緩其急亦能新血陽生陰長故也為臣川山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為佐大黃酒制以蕩滌敗血為之使當歸導氣散治損傷瘀血大便不通紅腫暗青疼痛昏悶蓄血內壅欲死

大黃一兩
當歸錢三
麝訥
除麝另研外為極細末入麝合勻每服三錢熱酒一盞調下食前內瘀血去或骨節傷折疼痛接骨紫金丹治之

三因雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是損傷瘀

血凝滯疼痛欲死兼以此藥推陳致新神妙

大黃一兩

酒杏仁去皮七粒

研細酒一碗煎至六分去滓雞鳴時服至晚取下瘀血即愈若便覺氣絕取藥不及急擘開口以熱小便灌之用誠曰按已上四方雖皆蕩逐瘀血之藥前三方所以治血在肝經血分者也後一方所以治血在肺經氣分者也當以脈之浮沉表裏別之又海藏云若墜高墜下撞打及傷心腹胸中積血不敢以上中下三焦部分分之以易老屏角地黃湯桃仁承氣抵當湯丸之類下之亦有以小便同煎治之者更有內

之有

加生地黃當歸煎服者亦加加大黃者惟智者能擇
破血止痛祕藏破血散治乘馬損傷跌其脊骨惡血
行經之處秘藏破血散治乘馬損傷跌其脊骨惡血
流於脇下其痛苦楚不能轉側

羌活 防風 桂心 鐘一 柴胡 連翹 歸梢

水蛭炒烟盡研 一方有蘇木一錢
谷二錢 研

麝少許 作二服每服二大盞酒水一盞除水蛭麝外另研
如泥煎餘藥一大盞去滓上火合稍熱調味飮服之
用誠曰按此太陽陽明少陽經藥也

地龍散治腰脊痛或打撲損傷從高墮下惡血留在
太陽經中令人腰脊或脰背脇腰中痛不可忍

中桂 地黃絡四 黃柏 甘草 鐘一 羌活 錢二

蘇木 分六 麻黃分 桃仁分 兩 归梢分 五每服五

錢水煎溫服 用誠曰按此足太陽經藥也

發明乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中
疼痛

乳香 沉香 雄黃豆 白桑白皮 獨科栗子各二

破故紙兩炒二為末每服五錢醋一盞砂石器內

煎至六分入麝少許溫服寶鑑有當歸一兩少輕炒

五錢

聖靈丹治一切撲折傷疼痛不可忍者

打

乳香 錢五

烏梅五

去核

白米一
藏作
秘

萬年子

一 盖炒黃
二 兩八錢

蜜丸彈子大每服一丸細嚼

熱酒送下一伏時痛不止再服 用誠曰按此二方

少陰經藥也

三因加味芎菊湯治打傷敗血入胃嘔吐黑血

川芎 當歸

白芍藥

百合 没半

荆芥穗各等

每服四錢水酒各半煎

元戎加味四物湯治虛人損傷不禁下之者 四物

湯加川山甲煎服 用誠曰按以上二方厥陰例藥

通前六方皆平之劑

溫

局方花藥石散治全刃傷及打撲損傷貓狗咬傷或至死者急於傷處擦藥其血化為黃水如內損血入臍腑煎童便入酒少許調一錢服之立效并治婦人產後惡血奔心胎衣不下以小便調一錢取下惡物效

硫黃明淨者四兩 花藥石一斤 為粗末拌令勻用紙筋和膠泥固濟瓦罐子一個入薦在內密泥封口了焙乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭一秤圍燒自己午時從下生火直至經宿火盡又經宿已冷取研極細磁器內盛 用誠曰按此厥陰硫黃例之

藥也海藏云有用此藥以童便煎服或酒調服之者
與寒藥正分陰陽不可不辨也

補損當歸散療墜馬落車傷腕折臂疼痛服此藥疼
痛即止筋骨即當相連

澤蘭炒附子炮各二錢當歸炒蜀椒炒

甘草炙桂心各三分芎藭炒六分為末每服二

錢溫酒調服日三忌生葱豬肉冷水生菜用誠曰
按此少陰厥陰經藥也以上二方皆溫熱之劑
接骨發明紫金丹定痛接骨

之劑

接骨泡草烏泡各五分

靈脂去土五分

木鳖殼去

川烏泡草烏泡各一兩

靈脂去土五分

木鳖殼去

黑牽牛 生 骨碎補 咸靈仙 金毛狗脊

防風 自然銅 漬火燄次 地龍 去 土
烏藥 青皮

陳皮 苗香 各五 分 烏餘根 漬火燄醋
兩

紅藥子 膜硝 各五 分 錢 醋糊為丸 桔子大 每服十

丸至二十九溫酒送下 痘上食後病下食前

元戎接骨丹 沒藥 乳香 當歸 川椒

自然銅 漬 赤芍藥 骨碎補 多敗龜多

虎骨 紗 白芷 分等 千金藤 嫩李子等分

又方加龍骨川芎 化蠟五錢丸如彈子大 每服

一丸好酒半升化開煎用東南柳枝攬散熱服

經驗方治打撲折骨損斷服此藥自頂心尋病至下
遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈

沒藥 蘇木 川烏 炙皮 松明節 乳香

血竭 鐘三 龍骨 五錢 地龍土 炒去 水蛭 炒五

降真香 鐘五 士狗 浸十箇油 茄 自然銅 煉醋淬火

為末每服五錢無灰酒調下病在上食後病在下
食前服 用誠曰按以上三方並出少陰折傷例藥

也其用毒藥以行諸經亦是瘀血已去者方可用

丹溪曰世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵
迎在補氣補血補土俗工惟在速效因利迺合病人之

意而銅非嫩不可服若新出火者其火毒金毒相扇
挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍
戒之

方雜機要刀箭散止血定痛沒藥散

定粉 風化灰

各一

乳香

五分

枯礬

另研三錢

沒藥

另研

各研為細末同和勻再研摻用之

經驗方治打撲損筋傷骨折呂顯謨傳

黃柏

一兩

半夏

五錢

為細末

每用五錢

生薑

自然

汁調如稀粥敷用紙花貼如乾再敷骨折先以絹帛
封縛次用沙木扎定良久痛止即痒覺熱乃是活血

活血筋骨復舊輕者三五日重者不過旬月矣

又方治打撲損腫痛不止 生薑自然汁米醋牛皮
膠同熬溶入馬屁勃末不以多少調和膏以紙攤敷
腫處

治刀傷斧斫 五倍子一味為末乾貼神妙 桑葉
陰乾為末乾貼如無旋廻乾末貼之妙