

非賣品

集成良方三百種

上

歡迎翻印



目錄

誘有云。濟人以財。不如濟人以言。濟人以言。不如濟人以書。謂財與言。僅及當時而有盡。惟書可傳世。且能流諸久遠而無窮。竊謂醫道亦然。施藥不如傳方。良以行諸永久而不可湮沒也。余潛心醫學以來。每見危危險證。投以經驗成方。莫不霍然而瘳。苟為庸工診治失當。竟致危殆者。不知凡幾。斯方藥之功效尚矣。又見有人。治三折肱。配以良劑。百投不一失。乃以褊心故。其方藏諸笥篋。秘不示人。迨至人往風微。遂致銷失者。亦復不少。良方傳世。豈不重歟。際茲世

道昌明。人多好善。石室秘錄。咸欲公世。每於公暇。悉心搜索。集得良方數百。皆係青囊奧旨。並又採錄淺顯醫論。揭明病源。以為準繩。彙纂成篇。付之剞劂。名之曰集成良方三百種。凡十萬八千言。公諸國內。無獲此編者。得以病狀。察及病因。按病投藥。不致盲從。甚且窮鄉僻壤。求醫不得。或染病未能延治者。探病投方。如獲良醫。茲亦不無小補云耳。

歲次庚辰榴月中浣蓬萊山樵序於漢中客次



(一) 觀音救苦膏 內服外貼 能治百病。

(二) 玉樞丹 解諸毒 療諸瘡 利關節 醫百病。

(三) 濟生立效靈丹 救百病 救急。

(四) 靈寶如意丹 百病救急。

(五) 濟世仙丹 聚陽禦陰 百病救急。

(六) 萬應救急散 百病救急。

(七) 草還丹 健脾益精 補腎固陽。

(八) 百歲酒 卻病延年。

(九) 麥味地黃丸 老年卻病。

(十) 養老丹 老年卻病。

(十一) 回生丹 婦女調經 產後百病。

(十二) 神仙膏 婦女百病。

(十三) 種子良方

(十四) 調經奇方

(十五) 奪命丹 胎衣不下。

(十六) 造化散 產後肢腫。

(十七) 奪魂散 產後腫喘。

(十八) 血竭散 產後行血 免生百病。

(十九) 清魂散 產後氣血上冲。

(二十) 保產無憂散 安胎聖藥。



(二) 生化湯 化惡露。生新血。產後必服之藥。

(三) 下疳丸

(三) 保坤丹 調經種子。

(四) 佛手散 胎前產後一切血症。

(五) 安胎丸

(六) 子癇方 孕婦僵仆。

(七) 舉胎四物湯 胎壓胞系。小使不通。

(六) 達生散 臨產良藥。

(元) 甘麥大棗湯 孕婦臟燥。

(辛) 通乳散

(二) 乳擠效方 乳房擠壓痛。

(三) 圓乳飲

(三) 經水逆行方

(四) 血崩方

(五) 白帶秘方

(六) 胎動急救方

(七) 孕婦痢疾秘方

(六) 加味芎歸湯 難產催生。

(元) 產後陰翻方

(罕) 翻氣丸



(四) 子懸方 胎氣上逼。

(四) 子煩方 孕婦煩躁。

(四) 子鳴方 孕婦腹內聞  
小兒啼哭聲。

(四) 臨產箴言

(五) 調經飲 婦女經來  
小便不通。

(四) 取小兒口中血塊法

(四) 小兒開口方

(四) 馬牙治法

(四) 臍帶不乾

(五) 小兒肚臍突出

(五) 臍風神效方

(五) 花火膏 小兒夜啼。

(五) 皮硝膏 小兒積食。

(五) 外熱內熱辨

(五) 非驚論

(五) 痰大閉症治法 急驚風。

(五) 木梅土症治法 慢驚風。

(五) 大驚猝恐治法

(五) 小兒夜啼治法

(五) 小兒吐瀉治法



(空) 小兒傷暑治法

(空) 小兒諸積治法

食痞蟲  
痰水積

(空) 小兒疳症治法

(畜) 小兒咳嗽治法

(空) 解顛龜胸龜背治法

(空) 清大散驚湯

小兒內  
熱生風

(空) 止疳湯

(空) 定吐湯

(空) 降火止瀉湯

小兒大瀉

(半) 散寒止瀉湯

小兒寒瀉

(七) 論驚證

(三) 論吐瀉

(三) 小兒不乳方

(畜) 陽癇證

俗稱急驚風

(畜) 陰癇證

俗稱慢驚風

(六) 小兒感冒風寒方

(七) 小兒痢疾方

(六) 小兒瘧疾方

(七) 小兒咳嗽方

(半) 小兒口疳流水口爛方



(一) 小兒便蟲方

(二) 小兒蟲積方

(三) 神效稀痘方

(四) 論痘證

(五) 治痘法

(六) 痘瘡神方

(七) 痘瘡壞證方

(八) 必全湯痘瘡壞證

(九) 回毒即消丹痘證回毒

(十) 治水痘方

(一) 四時疹方

(二) 夏日發疹方

(三) 消斑神效方

(四) 猩紅熱治法

(五) 清火消丹湯赤白遊風

(六) 丹毒論治

(七) 火丹神效方

(八) 小兒急驚風外治方

(九) 小兒慢驚風外治方

(十) 萬全湯小兒脾胃諸病



北京中醫藥大學圖書館版權所有



〔三〕治慢驚風心得神方

〔三〕沆瀣丹 小兒一切熱證

〔三〕清暑固陰湯 小兒傷暑

〔三〕小兒解顛煎 頭大面小

〔三〕三豆湯 預防天行痘證

〔三〕治痘後翻疤

〔三〕象牙散 眼中出痘

〔三〕小兒肌瘦不思飲食

〔三〕預防驚風方

〔三〕急慢驚風內外治法

〔三〕保赤卻病良方

〔三〕軍中一捻金

小兒傷食積食

〔三〕小孩頭部暑痛方

〔三〕小兒疾厥方

〔三〕小兒初生無皮治法

〔三〕小兒螻螂子方

腮腫

〔三〕小兒胎毒下導方

〔三〕小兒黃水瘡

〔三〕小兒口瘡方

〔三〕小兒頭上生癩方



〔三〕小兒初生小便不通

〔三〕小兒初生脫肛方

〔三〕小兒耳後生瘡

〔高〕小兒疝氣方

〔五〕小兒赤目方

〔三〕回生丹 中風中暑

〔三〕換骨丹 預防中風

〔三〕大活絡丹 中風癱瘓

〔三〕真中風類中風辨治

〔三〕白喉證治

〔三〕養陰清肺湯解白喉

〔三〕白喉證辨

〔三〕異功散 喉疔貼藥

〔高〕喉痛吹藥方

〔三〕紅白喉症驗方

〔三〕喉痛順證方

〔三〕喉生雙蛾方

〔三〕錫類散吹喉聖藥

〔三〕捷妙丹 喉症外治

〔四〕各種喉症嗽方



〔四〕呂雪丹 孕婦喉症已破

〔四〕真功丹 孕婦喉症未破

〔四〕喉症蓬萊雪 各種喉症

〔四〕治單隻蛾喉方

〔五〕鎖喉風閉急救良方

〔五〕小兒鎖喉經驗方

〔五〕喉痛吐痰方

〔五〕喉症通閉散 點冰不下

〔五〕喉症噤口方

〔五〕喉藥萬應散

〔五〕治腦充血方

〔五〕腦膜炎治療法

〔五〕腦膜炎之新治療

〔五〕預防腦膜炎方

〔五〕預防喉痧方

〔五〕春溫證治

〔五〕瘟疫證治

〔五〕惡核厲疫 鼠疫

〔五〕蝦蟆瘟疔瘡瘟治法

〔五〕神效枳殼丸 瘟疫



〔六〕雷擊散 瘟疫痧證

〔三〕大頭瘟證治

〔三〕養正丹 陰霍亂

〔五〕防疫法

〔三〕觀音救急丹 霍亂癘螺痧

〔六〕霍亂證治

〔三〕霍亂靈方 寒熱通治

〔六〕急救霍亂經驗良方

〔五〕鼠疫論治

〔五〕防疫法

〔五〕吊脚痧神效方

〔三〕辟瘟丹

〔三〕霍亂拔毛法

〔五〕霍亂辨證

〔三〕霍亂刮法

〔三〕武侯行軍散 一切痧疫

〔三〕羊毛疔救急方

〔三〕五汁飲 預防溫症

〔三〕桑菊蔥豉飲 溫症初起

〔六〕除溫化毒湯 溫症喉症



〔二〕預防瘟疫三豆飲

〔三〕蠲穢散

山嵐瘴氣  
瘟疫煤毒

〔四〕防毒氣防瘟疫靈藥

〔五〕辟瘴癘方

〔六〕霍亂簡便方

〔七〕霍亂轉筋方

〔八〕防疫簡便法

〔九〕瘟疫流行救急良方

〔十〕治口流清水奇症方

〔十一〕救疫藥茶

〔一〕仙傳黃金丹

時疫霍亂  
痧瀉痢

〔二〕純陽正氣丸

霍亂吐瀉

〔三〕十滴水第一方

霍亂腹痛

〔四〕國藥配製十滴水方

霍亂腹痛

〔五〕痢疾立效飲

老幼虛弱  
產婦皆宜

〔六〕治紅白痢驗方

〔七〕治白痢方

〔八〕治紅痢方

〔九〕噤口痢方

〔十〕紅白痢通治法



〔三〕援絕神丹紅白痢疾

〔二〕血痢腹痛方火因也

〔三〕痢疾腹不痛方寒因也

〔高〕治痢靈效方

〔五〕紅白痢靈方

〔六〕痢疾良方

〔五〕痢疾簡便方

〔六〕治腸紅良方紅痢便血

〔六〕痢疾水瀉通治方

〔六〕寒證水瀉方

〔三〕火證水瀉方

〔三〕久瀉不已方

〔三〕寒火大瀉證辨

〔高〕寒證大瀉治法

〔三〕火證大瀉治法

〔三〕瘧疾治法

〔三〕瘧疾經驗方

〔六〕雷公治瘧方

〔二〕久瘧不已治法

〔三〕瘧疾變痢治法



〔三〕瘧疾外治法

〔三〕大汗不止方

〔三〕大汗亡陽治法

〔高〕陰寒大吐方

〔高〕大邪大吐方

〔高〕嘔吐治法

〔高〕大渴飲水汗如雨治法

〔完〕大渴飲水無汗治法

〔完〕吐血良方

〔高〕治肺結核驗方

〔三〕治吐血靈方

〔三〕猝然吐血急此方

〔高〕虛癆嗽血方

〔高〕吐血奇方

〔高〕吐血咯血治法

〔高〕肺癰肺痿治法

〔高〕治鼻衄方

〔完〕胃病與脾病辨

〔完〕反胃嘔吐治法

〔高〕反胃變噎膈證治



〔五〕心胃氣痛良方

〔五〕寒熱心痛辨治

〔五〕治水臌脹方

〔五〕治氣臌脹方

〔五〕治一切臌脹方

〔五〕怔忡證治

〔五〕腹痛驗方寒熱痛皆治

〔五〕絞腸腹痛方

〔五〕腹痛證治

〔五〕止嗽散一切咳嗽

〔五〕陳氏咳喘膏多年咳喘

〔五〕久咳不已方

〔五〕寒熱咳嗽簡便方

〔五〕大便閉結治法

〔五〕大便閉結簡便方

〔五〕小便閉塞治法

〔五〕小便不通簡便方

〔五〕牙痛神方

〔五〕擦牙洗眼神效方

〔五〕瞽目重明方





〔三〕眼疾要方

〔三〕耳疾急救方

〔三〕鼻症奇方

〔三〕口舌病良方

〔三〕頭痛腦痛效方

〔三〕金傷鐵扇散

〔三〕跌打損傷奇方

〔三〕接骨驗方

〔三〕跌傷神效方

〔三〕止血補傷丹

〔三〕跌打傷驗方

〔三〕跌打萬應散

〔三〕跌打萬金丸

〔三〕跌打散

〔三〕年大將軍洗痛方

〔三〕跌打神方

〔三〕跌打損傷妙方

〔三〕七釐散跌打損傷

〔三〕傷科回生第一仙丹

〔三〕跌打靈方



〔六〕白糖飲 跌打損傷

〔六〕金鎗救急神效方

〔六〕經驗刀傷止血散

〔六〕筋骨損傷驗方

〔六〕破傷風方

〔六〕治傷口潰爛方

〔六〕血證治法 吐血便血等

〔六〕大便下血治法

〔六〕小便尿血方

〔六〕脫肛治法

〔六〕疝氣治法

〔六〕腎囊脹大如斗奇方

〔六〕奔豚神效方

〔六〕舉丸縮入效方

〔六〕小便不通足腫氣喘

〔六〕木腎神效方

〔六〕糖尿症驗方

〔六〕精滑夢遺治法

〔六〕瘡啞證治

〔六〕虛損與癆瘵辨治



〔三〕筋病治方

〔三〕黃疸病治

〔三〕痿證治法

〔三〕痺證概治

〔三〕陰陽脫方

〔三〕水鼓證治

〔三〕氣蟲血鼓證治

〔三〕消渴證治 上中下消

〔三〕癩癩證治

〔三〕大麻風治法

〔三〕盲腸炎治療法

〔三〕瘋狗咬傷療毒法

〔三〕治湯火傷方

〔三〕治毒蛇毒蟲咬傷驗方

〔三〕急救諸毒驗方

〔三〕誤吞五金等物急救方

〔三〕誤食水銀桐油錘水方

〔三〕蜈蚣咬蜂蝎蜇方

〔三〕諸骨梗喉方

〔三〕補遺各種證治良方



〔三〕五福膏 陽症各瘡

〔四〕八仙膏 陰症各瘡

〔五〕陽和飲 陰疽初起

〔高〕觀音救苦丹 瘡症初起

〔壹〕便消散 瘡瘍

〔完〕中久丸 外科聖藥

〔完〕秋霜白 瘡潰無膿

〔完〕霜葉紅 發背久不瘡

〔完〕神藥拔 發背拔膿

〔言〕回生飲 疔瘡起黃

〔三〕陰陽起死膏 不論陰陽

〔五〕無上仙丹 陰陽癰疽

〔壹〕六合丹 花柳瘡毒

〔高〕仙傳救命丹 不論陰陽

〔壹〕偷刀散 陰疽發背

〔壹〕洗瘡方法

〔三〕夾紙膏藥 癰疽發背

〔完〕九龍神火灸方 疔瘡

〔完〕救急散 心經疔

〔高〕乳癰良方



〔畫〕橫痃驗方

〔畫〕諸瘡百效方

〔畫〕癰疽腫毒驗方

〔畫〕疔瘡外治神效方

〔畫〕立消疔毒簡便方

〔真〕癰疽論辨

〔真〕中九丸癰疽陰症聖藥

〔真〕癰疽丸散膏丹驗方

〔免〕各種癰疽治法

〔善〕疔毒辨治

〔五〕各種疔瘡治法

〔五〕各種疔瘡良方

〔五〕自縊水蜀凍死急救法

〔善〕許真君濟生大丹療飢

〔善〕普濟丹療飢活人



(一) 觀音救苦膏 治內外諸疾。或服或貼。詳後。

大黃 壹兩 甘遂 貳兩 羌活 捌錢 細辛 柒錢

杏仁 柒錢 研 蛇脫 伍錢 大戟 捌錢 厚樸 柒錢

枳實 捌錢 芫花 柒錢 獨活 柒錢 蜈蚣 拾條

麻黃 捌錢 檳榔 柒錢 黃柏 捌錢 巴豆 捌錢

桃仁 柒錢 研 莪朮 壹兩 白芷 捌錢 元參 柒錢

防風 柒錢 全蠍 柒錢 川烏 壹兩 花粉 柒錢

肉桂 捌錢 甲片 柒錢 草烏 柒錢 黃連 伍錢

當歸 壹兩伍錢 皂角刺 捌錢 大生地 壹兩

京三稜 壹兩 五倍子 柒錢 木鱉子 壹兩



香附子

桑錢

草麻子

礪雨

蜜陀僧

後入

淨黃丹

參拾陸雨  
水飛後入

右藥用麻油壹百貳拾捌兩。淨浸缸內。

春五夏

三。秋七。冬十日。然後入鍋。以桑柴火煎至藥枯。

用麻布濾去渣。再熬至滴水成珠。加入蜜陀僧

黃丹二味。攪極勻。傾入冷水中。隨時攤貼。

一偏正頭風。左患貼左。右患貼右。正患貼印堂間。

兼捲條塞鼻孔中。

一眼科七十二症。腫病。將耳上邊角。針刺出血。貼

之。星障翳膜。驗毛倒睫。迎風流淚等症。捲條左



患塞左鼻孔。右患塞右鼻孔。

一咽喉三十六症。單蛾雙蛾。喉閉。喉風。貼喉上。若

要速效。將膏口含化下。

一牙痛。貼上即止。

一諸般腸痛。胃口痛。丹田痛。俱貼痛處。

一中風癱瘓。左患貼左。右患貼右。倘不省人事。痰

聲如鋸。作丸清湯送下。其痰立止。若牙關緊閉。

用鐵筋掘開。將藥化水灌下。或再捲條塞入鼻

孔中。真有起死回生之功。

一癆瘵。貼夾脊穴。尾閭穴。肚臍口。七日癆虫盡死。





咳嗽吐痰。貼前後心。仍服清降補藥。此膏能救病。不能補虛。不可吞服膏滋。

一 膨脹。水膨。氣膨。血膨。俱貼臍下丹田。

一 噎膈。氣膈。食膈。痛膈。俱貼胃口。肚臍。如氣塞在

喉。口咽不下。即貼喉外。如要速好。作丸吞之。

一 哮喘咳嗽諸症。皆貼前後心。如氣塞不通。或作條塞鼻孔。或作丸吞服。

一 大小便閉。俱貼肚臍。自通。如數日不通。危在旦夕。作丸送下。小腹用葱汁甘草汁調敷。立下。

一 傷寒時疫。貼肚臍。飲酒一盞。汗出即愈。如大便



五六日不下。作丸吞服。便解即愈矣。

一瘧疾。一日、二日、三日。皆貼肚臍。如發四

五次者。

作丸。早一時服。並飲熱酒數杯。即止。

一婦人赤白帶下。貼肚臍下丹田。

一各種痢疾。俱貼胃口。肚臍。如四五日不愈。紅者。

用圓眼殼核七個。打碎煎湯。送丸下。白者。用荔

枝殼核七個。打碎煎湯。送丸下。紅白兼者。用圓

眼殼核七個。荔枝殼核七個。煎湯送丸下。

一婦人難產。逆生。胞衣不下。作丸。熱酒送下。產門。

小腹煎甘草水頻洗。立刻產下。



一小兒驚風。目翻上。氣喘。痰塞不通。作條塞鼻孔。貼一膏於肚臍間。如危急。作丸服之。

一小兒諸疳疾。貼肚臍上。

一婦人經閉不通。貼丹田下。如病久。作丸服之。

腹上用甘草湯調葱汁塗之。

一血塊痞積。貼肚臍上。並貼痞上。人健壯者。作丸

日服。便泄即愈。

一疔瘡。內服外貼。背疽。各癰。癩毒。貼患處。腸癰。作

丸服。兼貼肺俞穴。

一瘰癧。脚氣。攤膏反貼。針刺多孔。使藥性得入。外



蓋以紙。用帶縛定。一日洗換至十次。即愈。

一大便腸風下血。夢遺白濁。俱貼肚臍。

一痔漏。內痔。捲條插入。外痔。用膏藥貼之。

一跌打損傷。貼患處。即愈。

注意。凡外貼此膏者。須服生甘草湯。內服此膏者。不可飲甘草湯。萬弗自誤。

(二) 玉樞丹 又名紫金錠

專治暴中雜氣。昏暈欲倒。霍亂吐瀉。攪腸痧。青筋脹。心腹痛脹。諸般危症。並一切山嵐瘴氣。水土不服。解諸毒。療諸瘡。利關竅。醫百病。奇效不



可彈述。

山茨菇 貳兩 洗去毛皮焙

五倍子 貳兩 製淨搗破焙

麝香 叁錢 抹淨皮毛

紅芽大戟 壹兩半 去淨骨焙

明雄黃 叁錢

淨硃砂 叁錢

千金子 又名續隨子壹兩 用鮮者去殼去油

右七味稱準。合研勻於石臼內。漸加糯米濃

湯。調和得宜。杵千餘下。以光潤為度。每錠重

壹錢。每服壹錠。病重者。連服貳錠。取通利後。

以溫粥補之。

一治一切飲食藥毒。蠱毒。及喫自死牛馬猪羊等

肉。或食菌中毒。並受山嵐瘴氣。烟霧惡毒等症。



昏亂猝倒。或生異形之狀。悉用涼水磨服。

一治陰陽二毒。瘟疫痧脹。或狂言亂語。或胸腹腫痛。並喉痺咽腫。俱用薄荷湯。待冷磨服。

一治癰疽發背。對口天泡。無名腫毒。蛀節紅絲等

疔。諸惡毒瘡。諸風癩疹。久痔紅腫。及楊梅結毒。

俱用無灰酒磨服。外用涼水磨塗。日夜數次。覺癢即消。潰爛者亦易愈。

一治男女急病癡邪。奔走叫號。失心狂亂。羊癲。猪癲等瘋。俱用石菖蒲湯磨服。

一治心胃痛。及諸般氣痛。諸般血痛。並治赤白痢。

泄瀉急痛。霍亂絞腸之類。俱用薑湯磨服。

一治中氣。中風。中痰。口眼歪邪。牙關緊急。語言蹇澀。筋脈攣縮。骨節風腫。遍身疼痛。行步艱難等症。用酒磨。燉熱服之。

一治瘋犬。毒蛇。澗溪諸蟲傷人。及注徧身。毒氣入裏。命在旦夕。俱用酒磨服。外以水磨塗之。再服葱湯。汗出即愈。

一治年深日久。頭脹頭痛。偏正頭風。及溫病後。毒氣攻注。腦門作脹者。俱用葱酒磨服。並磨塗太陽穴上。



一治小兒急驚風。五疳。五痢。黃疸。用薄荷湯磨。加蜜調服。

一治小兒遺毒。生下百日內。皮塌肉爛。殺道眼。取損者。用涼水磨服。並磨塗。

(三) 濟生立效靈丹

茅山蒼朮

有硃砂點者叁兩  
米汁水浸軟切片晒乾

錦紋蜀大黃

陸兩  
切片晒乾

明腰黃

叁兩陸錢  
研細水飛

明天麻

叁兩陸錢  
切片晒乾

西麻黃

叁兩陸錢  
去節細剉

西月石

貳兩肆錢

西牛黃

壹錢伍分

馬牙硝

叁錢

丁香

陸錢  
不拘公母

沉香

叁錢

麝香

叁錢

梅片

叁錢





蟾酥 壹兩

甘草

壹兩肆錢  
去皮

煨金星礞石

用青色者壹兩肆錢  
煨七次如金色

以上共為細末。用淮山藥肆錢煮漿。合汾酒

為丸。如菜子大。硃砂為衣。磁瓶裝貯。以蠟封

口。不可洩氣。每服七丸。日久味薄。倍用。

一瀉痢。開水送服七丸。

一受寒。受暑。惡心嘔吐。頭目暈眩。胸腹飽脹。及

風痰等症。用三丸放舌上。候舌微麻。閉口咽

下。重者。倍之。

一受寒。受暑。痧脹。絞腸腹痛。上嘔下瀉。手足厥

冷。或吐瀉不出。心口閉悶。不省人事。以七丸

研細吹入鼻孔。再以數丸放舌上。候微麻咽下。如昏迷不能下咽。即研末。溫水灌下。  
一山嵐瘴氣。夏月旅行。口含三丸。可避一切邪穢之氣。

一癰疽疔毒。蛇蝎諸虫咬傷。俱用數丸研末。好酒調敷。

一蠱脹噎膈。以數丸放舌上。候微麻咽下。

一小兒急驚風。牙關緊閉。不能服藥。以數丸研末。吹入鼻孔。即醒。再用數丸溫水調灌。如係慢驚風。萬不可用。慎之。

一跌打至死。或驚死。熱死。魔魅氣悶至死。及痰厥等症。凡有微氣。急以數丸研末。吹入鼻內。俟入口中。可望復醒。

一自縊之人。勿割斷繩。輕輕解下。急以數丸研末。吹入鼻內。凡胸口略有微氣者。皆可活。

注意。孕婦忌服。小兒減半。

(四) 靈寶如意丹

夫天地之屬氣。即四時不正之氣也。或春夏應暖熱而反寒。或秋冬應寒涼而反熱。發為厲氣。中人即死。蓋邪從口鼻而入。故傳染之



迅速如此。當其暴病。無藥救治。貽害匪輕。方屢試屢驗。無不即愈。

一感受寒暑。發痧肚痛。頭眩眼黑。受病輕者。用  
參丸放舌上。閉口。俟舌見微麻。用冷水或涼  
茶送下。即愈。

一中暑中寒。觸犯瘴穢。驟然腹痛。頭眩眼黑。飽  
脹惡心。霍亂吐瀉。手足厥冷。或嘔吐不出。絞  
腸腹痛。猝然昏倒。不省人事。指甲青黑。刺無  
血出。其受病甚重者。用六丸研細末。吹入鼻  
中。用六丸放舌上。少頃。用冷水或涼茶送下。



即愈。若未愈。再用參丸。研碎服之。倘昏迷難服。用冷茶化開。灌下。即愈。

一夏月途次。口含參兩丸。能消山嵐瘴氣。並暑氣不侵。攜帶在旅店闈場時。用爐火焚燒數丸。能辟一切穢氣。

一感冒風寒。惡心頭痛。胸腹飽脹。及風痰等症。以參丸放舌上。俟舌微麻。吞下。即愈。

一胃口疼痛。心腹膨脹。噎食。膈食各症。每次用參丸放舌上。候舌微麻。吞下。即愈。

一小兒偶患驚風。牙關緊閉。不能服藥者。以六



九研細。吹入鼻中。取嚏。得汗。隨以參九研細。  
溫水調灌。即愈。小兒三歲者。服貳九。或將九  
研細。搽在乳上。隨乳送下。亦妙。

一遇自縊之人。勿割斷繩。輕輕解下。即以數九  
研細。吹入鼻內。並急以手裹衣物。塞緊穀道。  
掀髮向上。揉其項痕。捻圓喉管。頻頻搖動其  
手足。倘心口尚溫者。可冀復生。

一凡跌死。打死。驚死。魘魅死。氣閉死。及痰厥。冷  
厥等症。尚有微氣者。以數九研細。灌下即可  
復活。



茅朮

陸雨  
未泔浸透。切片焙乾。

丁香

陸錢

明天麻

陸雨  
切片焙乾

生大黃

陸雨  
切片焙乾

麝香

陸錢

雄黃

陸雨  
水飛

麻黃

陸雨  
去節細剉

真蟾酥

陸錢

硃砂

陸雨  
水飛研

甘草

陸雨  
去皮微炒

右藥共研細末。水疊為丸。如蘿蔔子大。再

硃砂為衣。磁餅收貯。勿使洩氣。

(五)濟世仙丹

明雄

伍錢  
水飛淨

火硝

肆錢  
淨

白芷

壹錢

枯礬

壹兩

牙皂

伍錢

菖蒲

伍錢

丁香

叁錢

華撥

叁錢

北細辛

肆錢

蒼朮

伍錢

麝香

叁分

冰片

柒分



地胡椒

卷錢  
即鵝不食草

右藥共研細末。過篩。用磁瓶裝好。切勿泄氣。

能聚真陽不散。禦真陰不亡。有起死回生之功。

遇痧證暴死。陰陽脫縮。陰寒證。胸腹積滯。

羊毛寒疹。惡心翻胃。霍亂吐瀉。氣痛。血痛。藥

塞頭痛。中風中痰。風疔痢疾。山嵐瘴氣。天行

瘟疫。牙關緊閉。人事不知。以及四時不正之

氣。一切急病。不分男女老幼。用此丹。法以男

左女右。點入太眼角內。藥到眼角。性至命門。

病重者可多點。壹貳次。用薑湯送下。壹貳分





更佳。或吹入鼻孔內。或以壹錢分裝入肚臍  
眼內。外用膏藥一張貼住。其功不可盡述。  
效如神也。

(六) 萬應救急散

一治四時感冒。傷寒傷暑。發熱頭疼。傷風咳嗽  
嘔吐氣痛。四肢厥冷。昏迷不省。以生薑汁開  
水連渣吞服。

一治感受四時不正之氣。天行瘟疫。山嵐瘴氣。  
解盡祛邪。霍亂氣痛。以開水沖服。

一治內傷飲食。腹痛。肚脹墜飽滿。用米燒焦者



水加蘇梗七節煨薑數片煎水沖服。

一治陰陽瘧疾。於未之先。以大塊煨薑。大  
薑。紅棗十個。煎水沖服。

一治紅白痢疾。紅痢加白糖。白痢加紅  
糖。開水沖服。

一治肚腹水泄。用清米泔水沖服。

一治諸種痧症。用陰陽水沖服。

凡治以上諸病。先以少許入鼻取嚏。每服五  
分。小兒減半。孕婦忌服。輕者壹服。重者叁服。  
即愈。



羌活 壹兩  
桔梗 捌錢  
陳皮 陸錢  
皂角 肆錢  
去皮

防風 壹兩  
薄荷 肆錢  
草菓 肆錢  
葛粉 壹兩

厚樸 捌錢  
薑炒  
粉草 肆錢  
檳榔 肆錢  
砂仁 捌錢  
薑炒

藿香 捌錢  
木香 陸錢  
枯礬 伍錢  
明雄 叁錢

白芷 壹兩  
法夏 陸錢  
薑炒  
細辛 肆錢  
硃砂 叁錢  
鹽水飛淨

荳蔻 叁錢  
薑汁鹽水炒

以上共為細末。淨瓶收貯。

(七) 草還丹

夫草還丹者。不用金石。不加燥熱。不傷五臟。只以草藥為用。全在製度之妙。得水火既濟之術。



奪丹砂燒煉之功。大壯脾胃。能進飲食。且脾屬  
中央之土。乃五臟之主。一失調養。則五臟俱虛。  
百病由此而生。此藥益精髓。補腎經。固元陽。輕  
腰脚。安五臟。通九竅。令人耳目聰明。曾見一老  
人。年七十餘。常服此藥。容顏煥發。鬚髮不白。能  
夜書細字。此丹乃平補之良劑。衛生之妙藥也。  
按此方自前明中葉。僧人某。因窩藏強盜。刑部  
議死。刑部令史王國寶。拯其死罪。出之後。僧人  
以此為謝。並囑此方為西平章有之。不可輕傳。  
當珍秘之云耳。

蒼朮 肆兩。壹兩酒浸。壹兩醋浸。壹兩米泔浸。壹兩鹽水浸。各浸壹宿。

葫蘆芭 壹兩 酒浸壹宿 破故紙 壹兩 酒浸壹宿 覆盆子 貳錢

茴香 壹錢 川棟子 壹兩 木香 伍錢

淮山藥 穿山甲 酥炙 地龍

茯苓 枸杞子 牛膝 各叁錢 酒浸壹宿

右藥晒乾為細末。無灰酒糊為丸。如梧子大。

每服叁拾丸。溫酒或淡鹽湯送下。空心服之。

服後須少食乾物。食畢。須行百步。使藥力達

於週身。日服二次。

(八) 百歲酒 治虛損勞傷。癱瘓。諸風。失精亡血。陽衰氣弱。等症。



黃耆 貳兩

當歸 壹兩貳錢

人復 壹兩

雲茯苓 貳兩

麥冬 壹兩

熟地 壹兩貳錢

於朮 壹兩

雲茯苓 壹兩

川芎 壹兩

生地 壹兩貳錢

龜膠 壹兩

肉桂 貳錢

羌活 捌錢

山茱萸 壹兩

防風 壹兩

枸杞子 壹兩

陳皮 壹兩

北五味 捌錢

紅棗 貳斤

冰糖末 貳斤

右共為粗末。裝入夏布袋內。浸好高粱酒貳

拾斤。隔水煮一炷香時。或埋土中七日更妙。

每日隨量飲之。半月之後。必有奇效。久久服

之。卻病延年。

人復野產者價昂。可以西黨參代之。



山茱萸江浙省俗稱棗皮。

(九) 麥味地黄丸

治腎氣虛損。腰痛。耳鳴。盜汗。遺精。瘦弱無力等症。

老人之氣血既衰。腎水亦涸。不可仍照

壯年人

治法。故食多則飽悶。食少則困餒。食寒則腹痛。

食熱則腸燥。此老人最難調治。而醫者不可不

知其方也。丸方莫妙用六味地黄丸。加麥冬五

味子。與之膏服。則腸無燥結之苦。胃有能食之

歡。此方之妙。竟可由六十服至百年。終歲常服。

蓋六味丸極補腎水。又能健脾胃之氣。去腎中

之邪火。而生腎中之真陽。故老人最宜也。



熟地黄 肆斤 淮山藥 肆兩 山萸肉 肆兩 去核

雲茯苓 叁兩 粉丹皮 叁兩 監澤瀉 叁兩

麥冬 叁兩 北五味子 壹兩

共研末。蜜為小丸。

(十) 養老丹

雷公曰。老人氣血已衰。飲食入胃不生精而生痰。蓋人生腎氣有餘而後脾胃之氣行。脾胃氣行而後分精徧布於各臟腑。俱得相輸以傳化。此生精之所以為要也。

熟地 捌兩 巴戟天 肆兩 薏仁 叁兩 山茱萸 肆兩





芡實肆兩

北五味壹兩

牛膝叁兩

車前子壹兩

淮山藥

肆兩

各為細末。合勻。蜜為丸。每日用白滾水送服。伍錢。常服自能生精壯氣。開胃健脾。又何慮飲食之難化乎。

(十一) 回生丹

回生丹。保產之仙方也。前有修合送人者。臨產服一九。坦然快便。不覺其功。但聞製藥齋戒。虔心發願普濟。然後擇一靜室。如法遵行。吳門馬同學製此丸。蒙以十九丸見贈。余知其丹之好。不



知其丹之神也。歸即隨便送人。癸丑冬。有一難產者。子死腹中。余聞而急檢筭。尚有一丸。與服之。死胎立下。母命獲全。人咸驚歎。余遂發願修製送人。迄今已數十年。屢試屢驗。而艱難諸證之獲救者。不下數萬人。但不知此方起於何人。記云。長葛孫奎臺得之。異人傳授。然製法湯引。尚有缺處。不若余得者之詳且明也。今列於左。

方劑忌鐵器要緊。

綿紋大黃

壹斤 蘇木

參兩 打碎。河水伍盞。煎汁叁盞。聽用。

大黑豆

叁升 計重叁斤拾貳兩。水浸取殼。用絹袋盛殼。同豆煎熟。去豆不用。將殼晒乾。其汁留用。

紅花

叁兩 炒黃

入黃酒肆伍盃煎三五滾去渣存汁聽用。

米醋

玖斤 陳者佳

先將大黃末壹斤。入淨沙鍋。下米醋叁斤。文火熬之。以長木筯不住手攪之成膏。再加米醋叁斤熬之。又加醋叁斤。次第加畢。然後加黑豆汁叁盃再熬。次下蘇木汁。次下紅花汁。熬成大黃膏。取入瓦盆盛之。大黃錫靶。亦剗下入藥。凡收合時。務要虔心。並忌婦人。孝服。雞犬。生人。不見之處。方妙。

土白黨

貳兩

當歸

壹兩 酒洗

川芎

壹兩 酒洗

香附

壹兩 醋炒

元胡索

壹兩 醋炒

蒼朮

壹兩 米汁浸炒

蒲黃

壹兩 隔紙炒



茯苓 壹兩

桃仁 壹兩  
去皮尖

川牛膝 伍錢  
酒洗

炙甘草 伍錢

地榆 伍錢  
酒洗

川羌活 伍錢  
酒洗

化橘紅 伍錢

白芍 伍錢  
酒洗

木瓜 叁錢

青皮 貳錢  
炒

白朮 叁錢  
米汁浸炒

烏藥 壹兩伍錢  
去皮

良薑 肆錢

木香 肆錢

製乳香 貳錢

製沒藥 貳錢

益母草 貳兩

馬鞭草 伍錢

秋葵子 叁錢

熟地 壹兩

三稜 伍錢  
醋浸紙包炒

五靈脂 伍錢  
醋煮化培研末

山萸肉 伍錢  
酒蒸搗爛入藥

右藥三十味。並前黑豆殼。共晒乾為末。入石臼

內。下大黃膏拌勻。再下煉蜜壹斤。共搗千杵。取



起為丸。每丸重貳錢。捌分。陰乾。須二十日。不可  
日晒。不可火烘。乾後重貳錢。有零。以蠟護之。因  
時去蠟殼。按證查用湯引調服之。湯引列左。  
一臨產用參湯服壹丸。分娩全不費力。如無參。淡  
炒鹽湯亦可。論曰。凡胎已成。子食母血。月足血  
成塊。謂之兒枕。將產。兒枕先破。血裏孩兒。故難  
產。服此逐去敗血。新血頓生。橫生。逆生。同治。亦  
有因氣虛損。宜多服人參為引。

二子死腹中。因產母染病所致。用車前子壹錢煎  
湯服壹丸。或貳丸。叁丸。無不下者。若因血下太

早子死。用人參車前煎湯服。如無參。用陳酒  
許煎車前服。亦可。

三胎衣不下。用炒鹽少許泡湯。服壹丸。或  
下。

四產後血暈。用薄荷湯服壹丸。即醒。

以上四條危證。乃臨產緊要關頭。一時即有名  
醫。措手不及。起死回生。此丹必須預備。

五產後三日。血氣未定。還走五臟。奔充於肝。血暈  
起止不得。眼見黑花。滾水服壹丸。立愈。

六產後七日。氣血未定。因食物與血結於胸中。口



乾。心悶。煩渴。滾水服壹丸。立愈。

七產後虛羸。血入於心肺。熱入於脾胃。寒熱似瘧。實非瘧也。滾水服壹丸。愈。

八產後敗血走注。五臟轉滿。四肢留停。化為浮腫。

口渴。而四肢覺寒。乃血腫。非水腫也。服此丹。愈。  
九產後敗血熱極。心中煩燥。言語顛狂。非風邪也。滾水服壹丸。愈。

十產後敗血流入心竅。閉塞失音。用甘菊花桔梗各叁分。煎湯服壹丸。愈。

十一產未滿月。誤食酸寒堅硬之物。與物相搏。流入



大腸不得克化。泄痢膿血。用山查湯服此丹。愈。  
十二生產時。百節開張。血入經絡。停留日久。虛脹酸  
疼。非濕症也。蘇梗煎湯服此丹。愈。

十三產後月中飲食不調。兼致怒氣。餘血流入小腸。  
悶塞水道。小便溢結。溺血似雞肝。用木通肆分  
煎服。又或流入大腸。閉卻肚門。大便溢難。有瘀  
血成塊如雞肝者。陳皮湯服此丹。愈。

十四產後惡露未淨。飲食寒熱不得調和。以致崩漏  
形如豬肝色。潮熱煩悶。背膊拘急。用白朮叁分  
廣皮貳分煎湯服此丹。愈。





十五產後敗血入五臟六腑。並走肌膚四肢。面黃口乾。鼻中流血。遍身斑點。危症也。陳酒化服此丹。可愈。

十六產後小便澁。大便閉。乍寒乍熱。如醉如痴。滾水送服此丹。立愈。

十七產後血崩。糯米湯下。

十八產後赤白帶下。煎阿膠艾葉湯下。

十九產後嘔吐。陳皮生薑湯下。

二十產後瀉血。大棗湯下。

二十一產後咳嗽不止。五味子伍粒。蘇葉壹錢。煎湯下。



三產後傷寒頭疼。身熱無汗。加麻黃叁分。葱薑湯下。

三產後傷風頭疼。身熱自汗。冬加桂枝。春加防風。白朮末各叁分。葱薑湯下。

四產後喉中似蟾鳴。敗血沖過於心。轉入肺。肺氣。氣與血俱結成一塊於喉中。聲似蟾鳴。人以為怪。得此證者十不救一。服此丹可愈。

五產後便澁。腰痛似角弓。姪婦百日之外。氣血方滿。今在月中七日之外。食油麩爽口之物。以致煩躁不得安寧。因循不肯服藥。兼傷房事。或坐

卧當風。取其一時之快。不肯房事將息。宜乎有  
此證也。急服此丹。即愈。

六治經脈不通。婦人經脈猶溝渠也。溝渠壅塞。則  
水道不行。婦人氣閉。則經水不通。切勿因循養  
病而喪軀。要急服此丹以流通之。保其天和。遂  
其化工。美哉妙哉。

七治室女經痛不通。室女經脈與婦人不同。隱匿  
於胞絡。漸入子宮。至十三四歲出現。始知人事。  
苟或喜怒寒濕溫熱失宜。致經脈不通。痛乾涸  
也。宮中癸水不行。猶地之水瘀而乾涸也。室女



身中亦猶是也。易曰。天一生水。地六成之。先服  
四物湯三五帖。使癸水生於宮中。然後服此丹。  
引導流通。不可聽庸醫作癆瘵治也。

四物湯方

當歸 貳錢

川芎 捌分

生地 叁錢

柴胡 柒分

白朮 壹錢半  
炒焦

元胡 壹錢半  
醋炒

香附 壹錢半

黃芩 壹錢  
酒炒

三稜 壹錢

白芍 壹錢貳分  
酒炒

水煎臨卧服

六治室女經痛不通。加蓬朮叁分。薑黃末伍分。赤  
為貳分。天花粉肆分。俱為末。同酒化開。不拘時  
服。經自然通矣。



元治婦人月信前後不一。空心酒化服。即準。

以上危證。皆產後破血及瘀血為害也。故此丹有奇功。至產後一切異證。醫人不識。人所未經。但服此丹。無不立安。倘一丸未應。二丸三丸必效無疑。胎前常服此丹。壯氣養胎。滋陰順產。調和臟腑。平理陰陽。更為神妙。室女閉經。月水不調。眾疾彙聚。服此丹者。諸病悉除。無不神效。各地近來此等病症最多。予甚憫焉。故製丸送人。並刊此方廣布。使世之善人君子。或製丸。或印送。俾四海之閨中。免此難症。幸甚矣。



(十二) 神仙膏 孕婦忌用

專治婦人一切雜症。血積成塊。或因氣積。或因寒積。經行不準。經行腰腹疼痛。五色帶下。癸水或多或少。遺尿失禁。經來不止。血膈癥瘕。心腹脹滿。嘔噦嘈雜。以致久不生育。貼於患處。或貼肚臍。功效異常。病輕者七天見效。貼後或吐或瀉。或暈或痛。皆是藥力行動之效驗。切勿驚疑。病重者一月見效。不孕者久貼能以受孕。此膏功效甚大。不可思議。諺云有了神仙膏。醫生用不着。針也不用打。藥也不用熬。婦女貼百病。男

貼五種癆。大哉神仙膏。功德與天高。

青風藤 藜苳 羌活 獨活

防風 川牛膝 千年見 葳靈仙

桂枝 赤芍 生地各貳兩 香白芷

紅花 川椒 杜仲 續斷

五加皮 當歸 香附 防己

白芨 海風藤 血餘 三稜

木香 海藻 土木別 吳茱萸

乾薑 川窮 天麻 肉桂

莪朮各壹兩 生薑肆兩 大蔥伍條 山羊血



硼砂 硃砂各捌錢 山甲 鱉甲各兩半

香油拾斤。先將山甲鱉甲並桃柳桑槐榆枝各半斤。入油熬枯去渣。再入右藥熬枯去渣。再熬油至滴水成珠。加黃丹陸拾兩。乳香沒藥血結各壹兩。阿魏貳兩。均研細加入。攪冷。放入冷水中。內浸七日。貼時加麝香少許。或用薑擦肉皮。

(三)種子良方 此方極驗。用時不可多服。受孕後更不可再服。否則必生雙胎。臨產危險。未可輕試。忌食牛羊肉。

海沉香 川烏 檀香 紫菀 細辛

枳殼 甘草 各壹錢

右藥共研細末。煉蜜為叁拾玖丸。每早空心





服壹丸。如向未生育者。男女各服壹料。男用  
良薑女用厚樸湯送下。用時男女各服壹丸。  
二小時後同房。自能受孕。受孕後不可再服。

(高)調經奇方

百試百效。不可妄為加減。倘兼有外感他症。宜  
緩服。慎之。

當歸

壹錢半  
酒洗

陳皮

柒分

白芍

壹錢  
酒炒

香附

壹錢半  
酒炒

元胡索

柒分  
醋炒

大熟地

壹錢半

丹皮

柒分

白茯苓

捌分

川芎

捌分

吳茱萸

貳分  
滾水泡去黑水。去蒂梗。酒炒。



經行先期色紫者。加條芩壹錢半。酒炒。

經行後期色淡者。加官桂伍分。炮黑薑伍分。

葉伍分。醋炒。

引用生薑壹片。水壹碗。煎至捌分。空心溫服。

再煎臨卧服。每月經行日服起。連服肆劑。次月

再服肆劑。則經調受孕矣。

(十五)奪命丹

附子

伍錢  
泡去皮臍

牡丹皮

壹兩

乾漆

壹分  
搗碎炒烟盡

右為細末。釀醋拾兩。大黃末壹兩。熬成膏。

和藥為丸。如桐子大。溫酒下伍丸。或茶九。



專治胎衣不下。因母生兒後。血流入衣中。衣為  
血脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝。  
心腹疼痛。喘急難治。速服此丹。逐去衣中之血。  
血散脹消。胎衣自下。

(十六)造化散

專治產後四肢浮腫。因產後敗血乘虛停積五  
臟。循經流入四肢。留淫日深。不得還復。腐壞如  
水。致令四肢浮腫。醫者不識。往往作水氣治之。  
凡治水腫。多利用水之藥。極能虛人。况產後既  
虛。而又以藥虛之。是為重虛。多致夭枉。但服此



藥。血行腫消而立愈矣。

沒藥

另研

琥珀

另研

桂心

赤芍

當歸

各貳錢

細辛

壹錢

麝香

另研 壹錢

右為細末。每服伍分。生薑汁黃酒各少許調勻。

服之。

(十七) 奪魂散

專治產後虛腫喘促。服藥後小便得利為效。

生薑

取汁

白芨

各卷兩

清半夏

半個

右以薑汁和麵。裹半夏為餅七個。炙焦熟為末。

每服壹錢。開水調服。



(六) 血竭散

血竭

沒藥 各等分

右藥輕手研細。頻篩頻研。取盡藥末為度。每

服貳錢。用童便合陳酒半碗。煎壹沸。溫調服。

纔產下服壹服。上床後貳小時再服壹服。其惡

血自然下行。更不上衝。免生百病。誠產後要藥

良丹也。

(九) 清魂散

澤蘭葉

貳錢半

人參

貳錢半  
或用黨參伍錢

炒荊芥

壹兩

川芎

伍分



右為末。溫酒開水各半杯。調壹錢。急灌之。茶  
咽即眼開氣定省人事。

專治產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。逆亂  
心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕。不知人事。

口噤神昏。氣冷。醫者不識。往往認為產後風。  
按產後風。四肢抽搦。咬牙握拳。目瞪寒戰。往往  
誤認風症。多數不起。總之清魂散施之風症。亦  
可獲愈。惟多服一二次。亦可得安。每壹小時服  
一次。

(二十) 保產無憂散

一名補母壽子安胎散。又名十二宮方。

專治婦人受孕之後。兩三月五七月胎動不安。或見紅將小產。及橫生逆產。服之神效。孕婦每月服三劑。或五日一服。胎安無病。臨產順利。但產後萬不可服。

當歸

戴錢  
酒洗

川芎

壹錢

川貝母

壹錢  
去心

羌活

伍分

甘草

伍分

厚樸

柒分  
薑製

荊芥穗

捌分

蘄艾

柒分  
醋炒

枳殼

陸分  
炒

白芍

壹錢

兔絲子

壹錢

黃芪

壹錢

水煎服。冬加生薑貳片。

(二) 生化湯

當歸 叁錢

川芎 壹錢

炮薑 伍分



桃仁

杀粒研  
滾水泡去皮尖。雙仁者不用。

炙甘草 伍分

治婦人產後諸症。敗血不行。惡露不盡。血暈不省。瘀血作痛等症。無不神效。

服時用水壹碗。急煎捌分。稍熱服。或加黃酒五  
六匙同煎更妙。並要在產後一二小時之內。乘  
進食之先。服貳劑。因惡露在下焦。故即服之。使  
惡露速化。而新血易生。自免血暈等症。產後三  
日內。日服兩服。以後日服壹服。如惡血已行。腹  
痛已止。則減去桃仁可也。

(三) 下疔丸



專治婦人陰中生物。如蛇如茄。名曰陰挺。痛癢難忍。切忌刀割。割之立斃。宜用此丸放入陰內。以除小腸濕熱。則愈矣。

枯礬

陸兩

銅綠

伍錢

桃仁

壹兩

雄黃

壹兩

五味子

伍錢

右為細末。煉蜜為丸。每九重壹錢。雄黃為衣。

(三)保坤丹

專治婦女經水不調。起前錯後。百病叢生。難以孕育。常服此藥。月經按期。生子肥健。功難盡述。

常歸

肆兩

川芎

壹兩

熟地

肆斤

赤芍

肆兩



桃仁 貳兩

紅花 貳兩

香附 壹斤

茯苓 肆兩

丹皮 肆兩

吳萸 壹兩

陳皮 肆兩

甘草 肆兩

酒苓 貳兩

坤草 肆兩

元胡索 貳兩

鹿角霜 貳兩

右研細末。煉蜜為丸。每丸重叁錢。開水送服。

(二)佛手散 一名芎歸湯

專治婦女月經不調。血瘀血虛。血閉血枯。胎前胎漏胎動。產後惡露不下。一切血症。神效。

當歸 伍錢

川芎 貳錢

水煎服

(二五)安胎九



專治胎動不安。腹中作痛。下血胎漏。勢將墮胎。  
或閃跌誤傷。天癸復來。或慣好小產。不能到期。  
急服此丸。胎即安矣。

川續斷

杜仲

炒黑

山藥

炒

當歸

真阿膠

炒

白芍

熟地

砂仁

黃芩

酒炒

甘草

各肆兩

川芎

艾葉

各貳兩

白朮

伍兩炒

共研細末。糯米糊為丸。如梧子大。每服叁錢。

(六)子癇方

治孕婦忽然僵仆。痰涎壅盛。口噤搐掣。症名子



痼。急服此藥。極有效驗。

羚羊角

貳錢

杏仁

苡米

防風

獨活

川芎

當歸

茯神

棗仁

炒各壹錢

木香

甘草

各捌分

引用生薑叁片。水煎服。

(七)舉胎四物湯

治孕婦胎壓胞系。小便不通。煩悶難忍。急服此方。探吐之。吐後。再服一劑。其胎自舉。小便自通。

當歸

川芎

熟地

白芍

炒陳皮各貳錢

人參

升麻

各壹錢

水煎服



(六) 連生散

凡婦人難產所用方劑。類多難以理解。惟此藥  
和平合理。且奏效甚大。臨月宜服。令子易生。

紫蘇 壹錢

人參 壹錢

白朮 壹錢

陳皮 貳錢

當歸 壹錢

白芍 壹錢

甘草 壹錢

大腹皮 貳錢

水煎服

(元) 甘麥大棗湯

治孕婦無故悲傷。或癲狂罵人。若神鬼憑依者。  
名曰臟燥症。宜服此金匱方。其效非常。

甘草 壹兩

小麥 壹升

大棗 拾枚



右以水六升。煮取三升。分三次溫服。

(三) 通乳散

婦人乳汁。乃氣血所化。產後無乳。或有而甚少。有因經絡閉塞者。有因氣血不足者。此藥通絡生血。屢試屢驗。或用大孩吮之。亦可不藥而通。

當歸 叁錢

川芎 壹錢

熟地 貳錢

瞿麥 壹錢

花粉 壹錢

通草 壹錢

山甲 壹錢  
土炒

生麥芽 壹錢

王不留行 壹錢  
炒

右為末。滾水加黃酒沖服。每服貳錢。

(三) 乳擠效方



治婦人乳房擠壓。結成硬核。或腫脹疼痛。乳  
不下。久之變為乳癰難治。速服此藥托  
木梳梳患處。即愈。

鹿角霜

參錢  
研細末

熱黃酒壹杯。沖服。

或用蒲公英參錢。水酒各半煎服。亦效。

(三)回乳飲

婦人產後正下乳時。倘不幸無兒吮乳。乳汁脹  
滿。疼痛難忍者。宜服此藥回之。

炒麥芽

貳錢

炒神柚

壹錢

水煎飲之。

(三)經水逆行方



經水逆行。上出口鼻。用韭菜汁壹盞。童便溫服。

(三) 血崩方

陳棕燒灰存性 百草霜各壹兩

共為末。每服壹錢。黃酒送下。

(五) 白帶秘方

白朮伍錢 土炒 山藥伍錢 炒 黨參貳錢 白芍伍錢 酒炒

蒼朮叁錢 甘草壹錢 陳皮叁錢 車前子貳錢 酒炒

柴胡叁錢 黑芥穗伍錢 水煎服。極效。

(六) 胎動急救方

專治撲跌動胎。腹痛下血。勢將墜胎。奇效。





砂仁壹兩。放熨斗內。慢火炒熟。去筋膜。研末。每服貳錢。熱黃酒送下。功效甚速。

又方生地貳兩。

酒拌微炒

砂仁末壹兩。水酒各壹器。

同煎。分三次溫服。即愈。

(三) 孕婦痢疾秘方

雞蛋壹個。破一孔。如指頂大。加入黃丹伍分。以銀箸攪勻。用紙封口。在飯鍋內蒸熟。食之。即愈。

(六) 加味芎歸湯

專治難產及陰氣虛弱。交骨不開。血枯胎澁。等症。此湯催生神效。



當歸 壹兩

川芎 柒錢

龜板 捌錢 醋炙

婦人亂髮 壹團如雞蛋大 瓦焙存性

水貳碗。煎壹碗。服後一小時即生。死胎亦下。

(完) 產後陰翻方

澤蘭葉壹兩。煎濃湯薰洗。即效。

單) 翻氣丸

專治婦人陰內生瘡。作癢。身發寒熱。頭目眩暈。四肢無力。心慌心跳。如不速治。久必目盲致死。

雄黃

白礬

枯礬

大黃

黃土

麩粉 各叁錢



附

三一

共為細末。用花椒伍錢煎水。加生脂油叁錢。合丸如彈子大。曬乾。用時先將患處洗淨。將藥丸放入陰內。重者二三日病與藥同下。再換新藥丸。九一二次。痊愈。忌烟酒及煎炒大食物。

(四)子懸方

胎氣上逼。症名子懸。更有氣逆而厥暈者。其症甚危。急服紫蘇飲。可愈。

當歸 壹錢  
川芎 壹錢  
紫蘇 壹錢  
炙草 伍分

人參 伍分  
白芍 伍分  
大腹皮 捌分

生薑壹片。葱白壹寸。為引。水煎服。



(四)子煩方

治孕婦心中煩悶。因火盛而煩者。宜服淡竹葉湯。如係氣滯而悶者。宜服二陳湯。如木

淡竹葉湯

淡竹葉 茶片

黃芩 壹錢

知母 壹錢

麥冬 壹錢

茯苓 貳錢

水煎服

二陳湯

製半夏 壹錢半

陳皮 壹錢半

茯苓 壹錢半

炙草 捌分

白朮 壹錢半

黃芩 壹錢

蘇梗 壹錢

枳殼 捌分

水煎服

(三)子鳴方

孕婦腹內聞有小兒啼聲。是胎兒口中脫出胞



乳。孕婦可緩緩曲腰向地。如拾物狀。片時。胞氣  
仍入兒口。即止。再服(二)(十)保產無憂散壹劑。以  
安胎氣。

(四)臨產箴言

大生要旨有六字真言。曰睡曰忍痛曰慢臨。小  
按六字中最要者。為忍痛二字。因臨產之時。小  
兒轉身。產母腹內不免痛楚。但小兒轉身。是時  
轉時歇。而腹痛亦是時痛時止。名謂試產。並非  
真產。此時孕婦必須忍痛。萬不可用力下逼。雖  
小兒頭頂已對正產門。仍然不可努力。小兒有



中醫藥大學圖書館

因轉身力疲。每每頭抵產門。不即奔生。稍息候  
至小兒向外奔生。產母稍用力送。即產。房內切  
忌人多喧鬧。小怪大驚。產母更應知道。在此要  
緊關頭。順其自然。萬無一失。切不可任性哭叫。  
自尋煩惱。其凡倒生。偏生。盤腸生。種種逆產。皆  
是不肯忍痛。努力太早之所致也。現在西法接  
生。極為穩妥。其無產科醫院處。須選請老練穩  
婆。並用老婦二人扶持。但只准其等候小兒產  
下收生。未產之前。不許其稱能動手推搦。蓋人  
生人。乃自然之造化。不假人力強為。瓜熟蒂落。

母子平安。

(四) 調經飲

治婦女經水適來。偶阻溺竅。小便不通。腹脹難忍。急通其經。而便自利。

當歸 叁錢

牛膝 貳錢

山查 貳錢

香附 貳錢

青皮 壹錢半

茯苓 壹錢半

水煎服

(四) 取小兒口中血塊法

小兒初生之際。在未開聲而口微動時。將口中所含血塊掏出。幼時不生疾病。並於痘疹亦無危險。且終身無惡疾。其人聰明而多壽。惟此事



頗不易為。粗率不可。遲緩不及。宜於事前專用  
一細心人任之。

(四) 小兒開口方

小兒初生後。不可驟與乳汁。免種病根。法以核  
桃肉。用熱水泡後。去皮搗爛。用新絹或新白布  
洗淨。將核桃肉放入。作一小包如鈕大。外用甘  
草。紅糖煎濃汁。取出少許溫熱。以所做小包浸  
入。隨以包納小兒口中。使之吮吸。小時取出。再  
浸再與。日數十次。至一二日後。俟其黑色大便  
下盡。再與乳食。



(四) 馬牙治法

小兒初生。二三日內。在牙齦上發生小白點。以致啼哭不乳。此白點乃臟腑之熱所化。胎中感受熱毒而成。急用小銀挖耳。用火酒或白酒擦淨。將白點刮下。再用糯米泡水。以新青布一塊。裏食指蘸米水洗之。時時勤洗。則毒自除。惟青布以本國靛染者為宜。洋靛染者不用。且宜用綿軟細布。如本國靛染藍布不易得。可改用細白布洗淨。加真青黛少許。入糯米水內。洗之。

(四) 臍帶不乾

UNIVERSITY OF CHINA  
164  
中國醫藥大學圖書館版權所有

小兒初生。臍汁不乾。用車前子炒焦。研為細末。敷之即乾。神效。或用當歸研細末敷之亦效。  
(五)小兒肚臍突出

小兒初生。肚臍突出半寸許。此為氣旺不收也。若不急治。往往變為角弓反張。

茯苓 壹錢  
車前子 壹錢  
甘草 貳分  
陳皮 叁分

通草 叁分

煎湯灌之。一劑即安。神方也。

(五)臍風神效方

小兒初生月內。如發臍風。臍上定起青筋一條。

自臍而上。若已至心口。難治。如未至心口。特用  
艾葉撚成小團。如麥粒大。在青筋頭上灸之。此  
筋即縮下寸許。再從縮下之筋頭上灸之。青筋  
即消。病瘉。屢試屢驗。

(五)花火膏治小兒夜啼立效

小兒夜啼。用燈芯草燃燈所結之燈花一顆。塗  
乳上。令兒吮之。即瘉。

以燃芝蔴香油。或菜子油。所結之燈花。為宜。  
其用棉花燈心。及燃桐油。或棉花子油。燃燈  
所結之燈花。不用。



(五)皮硝膏 治小兒食積外治妙方

小兒食積。面黃肌瘦。如藥物投之不當。反致傷生。不若外治。較為穩妥。其法用皮硝貳錢。用布包好。安放臍上。外用布帶束緊。如有食積。則化而為水。即可內消。如無食積。則硝仍存在。於人毫無傷損。誠良法也。

(五)外熱內熱辨

小兒燒熱。有外熱內熱之不同。必須細心辨別。方免藥味誤投。致生他症。

外熱者。身上終日發熱。或拘束肢冷。外有清涕。



咳嗽頸痛鼻塞之象。內則脈浮而不口渴。此解之症也。宜表散之。得汗自愈。不可用涼藥。內熱者。如夜熱潮熱。晝輕夜重。病最纏綿。或口渴。或腹脹。或盜汗。其症有因傷食停痞。伏燥伏火。陰虛陽虛等異。宜分別而治。此內解之症也。不可用表藥。

此等燒熱。熱久傷陰。能令小兒日漸削瘦。成為疳癆。慎勿忽視。

(五) 非驚論

方脈中。有中寒中暑諸症。特醫每混以為中風。



東垣景岳以非風別之。善矣。

兒科有急驚風慢驚風二症。不惟驚字全無干涉。即風字亦未可混稱。乃自有驚風之名。而濫以丸丹相投。從此小兒之遭其劫者。不知萬萬矣。試分辨之。

一驚者駭也。其凡受嚇者皆謂之驚。嚇則神魂失守。心神恍惚。惕惕悸動。唯心虛者易犯此。在方脈中亦有之。兒科中大驚猝恐一症。即此候也。是真驚也。治宜安神定魂為主。斷無有攻痰散風。而能治驚症者也。


二風字亦有二意。在外感則為風邪。治宜表散。在內病則為肝風。治宜鎮息。如混言之曰風。究竟外風乎。內風乎。治外風之藥。不可以治肝。治肝風之藥。不可以解表。甚矣哉。其混也。

三時俗所謂急驚風者。痰火閉也。小兒受暑熱則生火。乳積則生痰。痰火相搏。則血虛而肝失所養。肝主筋。筋脈乾熱。則抽搐。故外作拘攣。面現青色。是肝燥而風內動。非外風也。是痰火閉其竅。而目竅牙緊發厥。非駭驚也。但利其竅。清其火。降其痰。則神醒矣。而漫以驚風名之。可乎。



四世俗所為慢驚風者脾虛生風也。小兒或吐瀉。久則脾虛。肝木乘之。手足微搐。是內風侮土。非外風也。陽衰神怠。氣息短促。是中氣虛。非驚嚇也。宜補其脾。回其陽。則土振而木靜矣。此症不補必死。而謬以驚風名之。可乎。

五、總之急驚為實火症。慢驚為虛寒症。如水火然。治急驚藥不可以治慢。治慢驚藥不可以治急。而世俗竟有以一粒丸丹。名之曰治急慢驚風。未免欺人太甚。茲特並揭之。曰非驚。而分為痰火閉症。木侮土症。則為實為虛。當各求其病源。





而治之。庶小兒不至誤於醫藥。易長而易成也。  
(五)痰火閉症治法

痰火閉症。即俗謂急驚風也。小兒或感風寒。或積乳食。皆能生痰。痰積則化火。或受暑熱。亦能生火。失於清解。則火升而痰亦升。痰火上壅。則其肺竅。則諸竅皆閉。症現目直氣喘。昏悶不醒。且火甚。則肝燥筋急。為搐搦掣顫。反弓竄視。而八候生焉。總因痰火鬱結。肝風內動而成。當其拘攣弓仰之時。但以手扶。不可用力抱緊。傷其筋絡。致成廢疾。初起。以(三)濟生立效靈丹貳粒



研細吹入鼻內取嚏。得嚏即醒。並以叁肆粒研碎灌之。即醒。醒後再服清熱養血湯。以養其陰。如無濟生立效靈丹。可用卧龍丹。或通關散取嚏。並以黃連叁分。黃芩叁分。山梔伍分。連翹壹錢。白芍壹錢。枳實伍分。白芥子伍分。柴胡肆分。甘草叁分。煎湯灌之。火清而痰自降也。

清熱養血湯  
細生地 貳錢  
丹參 壹錢

青蒿 壹錢  
黑山梔 伍分  
赤芍 捌分

丹皮 捌分  
生甘草 伍分  
水煎服

(五)木侮土症治法

木侮土症。即俗為慢驚風也。小兒受暑受寒。或傷乳食。皆能作吐作瀉。或吐瀉交作。久則脾土虛弱。肝木乘之。其瀉漸見青色。面部痿白帶青。手足微搐無力。神氣懨懨不振。而慢脾成矣。初起宜服異功散。吐則加藿香。煨薑。若病已數日。糞見青色。即加木香。或肉桂。若手足皆冷。脈息微細。唇舌痿白。此將脫之症。宜急用附子理中湯。以溫中回陽。尚有可救。諸臟之症皆緩。獨脾病之變甚速。竟有吐瀉一晝夜而即脫者。甚勿緩視。為要。

異功散

人參壹錢

茯苓壹錢

白朮壹錢半

陳皮壹錢

大棗叁枚

炙甘草伍分

附子理中湯

人參貳錢

白朮貳錢

附子壹錢

乾薑壹錢

炙甘草壹錢

以上二方均用水煎服

(五)大驚猝恐治法

大驚猝恐。真驚也。小兒血氣未充。心神怯弱。一

遇驚嚇。則神魂震佈。舉動失常。夜則跳醒。晝則

驚惕。治宜安神魂。斂心氣。然亦有因心有蘊熱

而驚悸者。總以安神為主。神定後。氣虛者補其



陽。血虛者補其陰。若妄投以硃砂鎮驚等藥。耗其心血。則愈發愈盛。肝風乘虛而亢。其勢不可復制矣。慎之。

安神丸

人參

壹錢

茯神

壹錢

棗仁

壹錢半

遠志

伍分

歸身

壹錢

白朮

壹錢半

白芍

壹錢

炙草

伍分

水煎服

(五) 小兒夜啼治法

夜啼之症有二。一曰脾寒。一曰心熱。若僅胃停乳食。則不能安寐而已。不啼也。脾寒者。溫其脾而啼止。心熱者。清其心而啼亦止。切勿亂投消



痰破氣之藥。致損真元。

藿香和中湯治小兒脾寒夜啼

藿香 捌分

厚朴

砂仁

陳皮

炙甘草

各伍分

生薑 貳片

水煎服

導赤散

治小兒心熱夜啼

生地 壹錢

麥冬

車前子

木通

竹葉

各伍分

甘草 叁分

水煎服

或服(五)花火膏亦可。

(六)小兒吐瀉治法

小兒吐瀉之症最多。或專吐。或專瀉。或吐瀉交作。致病之因不一。須慎辨而分別治之。



一、因傷食而吐瀉者。腹必硬。所吐所瀉必有酸臭氣。保和丸消之。

山查炭 茯苓 萊蕪子 各壹錢半

神糶

半夏

陳皮

連翹

各壹錢

水煎服

二、因伏暑而吐瀉者。小便必不利。必兼煩渴。吐瀉香薷飲。瀉則四苓散加六一散。或導赤散加黃連叁分。清之。

香薷飲 香薷 扁豆 厚樸 各壹錢半

炙草 伍分

水煎服

四苓散 白朮 壹錢 赤苓 貳錢 豬苓 壹錢



澤瀉 壹錢

木通 壹錢

車前子 壹錢  
布色

六一散 壹錢

水煎服

導赤散見五

三因受寒而吐瀉者。唇舌面色必痿白。口不渴。四肢或冷。此症易成慢脾。始則平胃散。二陳湯。加煨薑。以溫其中。繼則六君子湯。以補其脾。若虛寒甚者。則附子理中湯。不可稍緩。

平胃散 藿香 厚樸 陳皮 各壹錢 蒼朮 陸分

二陳湯 製半夏 茯苓 各壹錢半 陳皮 壹錢

炙草 伍分 煨薑 貳片





六君子湯

人參

茯苓 各壹錢

白朮 壹錢半

製半夏

壹錢半

陳皮

壹錢

炙甘草 伍分

紅棗 叁枚

水煎服

附子理中湯見(五)

四因伏火而吐瀉者。身必熱。唇舌必赤。清中飲導

之。火退後。宜服四君子湯。以養其脾。

清中飲

川連

叁分

酒苓

叁分

藿香

捌分

赤苓

壹錢

車前

捌分

釵石斛

壹錢

生穀芽

壹錢

水煎服

四君子湯

人參

壹錢

茯苓

壹錢

白朮

壹錢半



紅棗棗枚

炙甘草伍分

水煎服

注意：火吐則乳飲不得入。一入即出。寒吐則

乳飲受而後出。此其辨也。然吐瀉久則

脾胃必虛。肝木乘虛而侮。無論因何而

起。凡大吐大瀉之後。有火亦清。有食亦

出。速宜培補脾陽。勿使氣脫。若專事清

火消食。不知補脾。流弊滋多。

(六) 小兒傷暑治法

小兒性秉純陽。不受火迫。一染邪暑。熱焰沸漲。

其症肌熱。煩躁。口渴唇紅。溺濇。急宜香薷飲調

服六一散以解之。且暑中有溼。溼易傷脾。故每  
作瀉利。甚則兼吐。治法已詳<sub>(六)</sub>。若受暑風而瀉  
涕頭痛者。用香薷飲佐以藜朮、荊芥、各伍分。主  
之。若熱動肝風而發搐厥。宜用清熱湯。利其暑  
熱。而風自息。昏悶者。啟其嚏。即醒。切勿輕用  
驚化痰之品。戕其正氣。變生他症。

一二歲小兒。尚不能言語。凡有痛癢。不能以  
語言告人。端賴為父母者細心體察。如小兒  
眉頭時縐。或縐緊而啼。或用手打頭。皆是頭

痛表示



香薷飲見字

六一散

滑石粉 陸錢

生甘草 壹錢

共研細末。用時壹錢貳錢或叁錢。聽便。

清熱湯

川連 叁分

山梔 伍分

連翹 壹錢

勾藤 壹錢

柴胡 伍分

青蒿 壹錢

香薷 伍分  
赤芍 壹錢

僵蠶 伍分

滑石 壹錢

水煎服

〔叁〕小兒諸積治法

諸積皆屬於脾。脾土果旺。則何物不化。至於成積。脾力之弱可知矣。然積既已成勢。不能不用



藥消之。夫欲消困脾之積。必更傷受困之脾。願  
治積者。必時時顧及脾土。而後可。

一食積者。肚腹必硬。膨脹拒按。吞酸噯腐。不思飲  
食。保和丸。大和中飲。等消之。脾虛者。六君子湯  
參用。六君子湯 保和丸均見(字)

大和中飲 厚朴伍分 砂仁叁分 陳皮伍分

枳實叁分 澤瀉伍分 炒麥芽壹錢半

山查炭壹錢半 水煎服

二、痞積者。或瘧後痰結。或血裏肝氣。伏於脇下。時  
痛時止。和中丸消之。氣虛者。六君子湯參用。



和中丸

白朮 貳兩

扁豆 壹兩

茯苓 壹兩

砂仁 壹兩

半夏 壹兩

枳實 壹兩半

神曲 壹兩半

香附 壹兩半

麥芽 壹兩半

丹參 壹兩半

陳皮 壹兩

查炭 壹兩半

五穀蟲 壹兩

共研細末。為丸。每服叁錢。開水送下

三。蟲積者。溼熱所化也。蟲有九。而血蠶最狠。虵蟲

最馴。寸白蟲。上能食肺。柳葉蟲。下能食肝。凡患

蟲症。則唇內起白點。若蟲長一尺。貫胃則危。沖

心則死。其人日漸消瘦。蟲則吸血而肥。當以化

蟲丸下之。下後仍以(五)異功散養脾。



化蟲丸 蕪荑 雷丸各伍錢 檳榔

木香 白朮 陳皮 神袖 各叁錢

雄黃 壹錢半

共研末。糊為丸。每服叁錢。用史君子肉卷

錢煎湯送下。

四、痰積者，飲食所積，脾不能化，則釀而為痰。其症初起時，兩脈皆弦，腹漸脹大而軟，急宜六君子湯加厚樸伍分，麥芽壹錢半，萊菔子壹錢，等藥以消之。若遷延日久，則痰積愈多，一旦上湧，發為厥逆，則吐之不能，下之不得，無藥可治也。



五水積者胃經蓄水也。蓄久不化發為水腫。症覲

目胞與足先腫。此症最難收功。慎勿謬治。

四肢腫而腹不腫者表也。腹亦腫者裏也。

腰以上腫病在表也。宜汗。五皮飲加蘇葉秦艽。

防風荆芥散之。

腰以下腫病在裏也。宜利小便。五皮飲加赤小

豆赤苓澤瀉車前子草薢防已利之。

煩渴便閉者陽水熱也。五皮飲加連翹黃柏黃

苓清之。

不煩渴者陰水寒也。五皮飲加乾薑附子肉桂。





温之。

五皮飲

大腹皮

茯苓皮

陳皮

桑白皮

各壹錢

生薑皮

伍分

(三)小兒疳症治法

疳者乾也。久熱傷陰。津液乾涸之症。俗名童子

癆。其症總因飲食不節。積滯化火。漸或生瘡。生

蟲。致成骨蒸內熱。銷灼其陰。其症腹大青筋。髮

直毛焦。肌膚枯燥。唇舌絳紅。而疳症成矣。此症

陰血既槁。勢已難回。况又有熱未清。積未去乎。

善治者。必乘其陰血未槁之時。清其火。消其積。



育其陰。調其脾胃。尚克有濟。初治宜清熱導滯湯。有蟲者。唇內起白點。以(三)化蟲丸間服。若陰分已虛。則用理陰和中煎。胃口不開。則並用(五)異功散。調其脾胃。得陽生陰長。庶幾有救也。總之此症。腹軟者。雖虛可治。為其能受補也。腹硬者。難治。為其不可消也。

清熱導滯湯  
 胡黃連 伍分  
 地骨皮 貳錢

山查炭 貳錢  
 炒麥芽 貳錢  
 大腹皮 壹錢半

青蒿 壹錢半  
 山梔 炒 壹錢半  
 檳榔 壹錢

厚樸 捌分  
 粉丹皮 壹錢  
 生甘草 壹錢



紅棗 卷枚

水煎服

理陰和中煎

生地 貳錢

北沙參 貳錢

生穀芽 貳錢

白芍 壹錢半

地骨皮 壹錢

何首烏 壹錢

厚樸 壹錢

青蒿子 壹錢

檮豆皮 壹錢

丹皮 壹錢

牡礪 壹錢

山查炭 壹錢半

麥芽 壹錢

水煎服

(高)小兒咳嗽治法

小兒咳嗽。半由於風寒。初起。以杏蘇煎散之。節乳食。得微汗。即愈。

杏蘇煎

杏仁 貳錢

蘇梗 壹錢

前胡 壹錢



赤芍 壹錢

陳皮 捌分

桔梗

伍分

甘草 伍分

水煎服

疾薄者加製半夏

壹錢

生薑 貳小片

疾濃者加川貝母花粉瓜蒌仁

各壹錢

若於秋冬燥令肺受火刑則咳而無痰甚者咳血宜以貝母瓜蒌散潤其肺清肅之氣下行則咳自止。

貝母瓜蒌散

川貝母

貳錢

瓜蒌仁

壹錢半

黑山梔

壹錢

黃芩

壹錢

橘紅

壹錢

生甘草

伍分

水煎服



熱甚者加川連五分。痰多者加膽南星海分。

(五) 解顛龜胸龜背治法

解顛者腦蓋未滿。頭顛未合。中陷而四角起。如

古錢之形。此先天不足所致。暑月服六味地黃

湯。冬春之月。補天大造丸。俟氣血漸充。自

六味地黃湯 大熟地叁錢 山黃肉壹錢

山藥壹錢 丹皮壹錢半 澤瀉壹錢半

茯苓壹錢半 水煎服。亦可為丸。

補天大造丸 人參貳兩 蜜黃耆叁兩

白朮叁兩 當歸壹兩半 棗仁壹兩半



山藥 壹兩半 茯苓 壹兩半 大熟地 肆兩

枸杞子 肆兩 河車 壹具 共為細末

用鹿角 壹斤 龜板 捌兩 共熬膏。和藥煉蜜

為丸。如菉豆大。每服貳叁錢。

龜胸者肺熱作脹。胸骨高起。用白虎湯加瀉白散以涼肺氣。若喘急者難治。

白虎湯 生石膏 肆錢 知母 壹錢半 粳米 一撮  
糯米不用

生甘草 伍分 水煎服

注意：石膏必須用生石膏煨。石膏不用。

瀉白散 桑白皮 壹錢半 地骨皮 貳錢



龜背者背骨高突如龜。此先天不足。督脈為病。補天大造丸加金毛狗脊治之。

按(高)至(空)是選錄浙江江涵暎先生所著之筆花醫鏡內兒科證治。因其論理簡明。立方穩妥。庶未讀醫書者。讀之亦可稍知醫理。不為庸醫所誤。且鄉僻間不便延醫者。亦可對症自醫。取其便利。於病家不無少補也。

編者謹識

(空)清火散驚湯專治小兒內熱生風。症現抽搐。

博公曰小兒病。驚疳吐瀉四證。盡之矣。然而驚

疳吐瀉。不可不分別言之。分別治之也。世人不  
辨。一見抽搐。甚至抽搐之象。皆無。動曰驚風。不  
知小兒驚則有之。而風則無。小兒純陽之體。不  
宜有風之入。而狀若有風者。蓋小兒陽旺則內  
熱。熱極則生風。是風非外來之風。乃內出之風  
也。內風何可作外風治。故治風則死矣。法當內  
清其火。外治其驚。萬不可用風藥表散。

白朮

叁分

茯苓

貳錢

陳皮

壹分

甘草

壹分

梔子

叁分

白芍

壹錢

半夏

壹分

柴胡

叁分

右藥水煎三分服。此方乃健脾平肝之聖藥。肝



平則火散。脾健則驚止。又佐以去火消痰之品。自然藥下而驚風定也。

(空)止疳散

專治小兒口疳流涎。

疳證乃脾熱也。然亦因心熱而脾火旺極。迨至口中流涎。若不平其心火。則脾火更旺。而溼熱上蒸。口涎正不能遽止。治法不可徒清脾火。而當先散心火。自能應手奏效。

蘆薈

壹錢

黃連

叁分

薄荷

叁分

茯苓

貳錢

甘草

壹分

半夏

叁分

桑白皮

壹錢

右藥水煎三分服。此方乃心脾兩清之聖藥。不



專清脾。並能引水下行。則溼熱自去。溼熱去。病自瘳。

(六)定吐湯專治小兒脾胃虛弱。食乳不化。作吐。

吐證雖胃氣之弱。亦因脾氣之虛。蓋小兒飽餐。遂至食而不化。久而停積於胃中。又久而上沖於胃口作吐。故治吐必先治胃。而治胃尤先治脾。本標兼顧。庶免戕伐正氣之弊。

人參 壹錢

砂仁 壹粒

白朮 伍分

茯苓 貳錢

陳皮 貳分

半夏 壹分

乾薑 壹分

麥芽 伍分

山查 叁粒

水煎服

夏月加黃連參分。冬月乾薑加為參分。立瘡。  
此方即六君子之變方。乃治脾胃之聖藥。脾胃  
安而化導速。自然下行。不至上吐。况方中加減  
得宜。消積有法。有不奏功如神乎。

(完) 降火止瀉湯專治小兒身熱口渴煩躁而泄瀉。

瀉證責專在脾。用前定吐湯。可以取效。然而瀉  
有大瀉寒瀉之不同。豈可不分。大瀉者小兒必  
然身如火熱。口渴舌燥。喜冷飲而不喜熱湯。若  
亦以前方投之。則益苦矣。

茯苓

壹錢

白芍

壹錢

黃連

參分

車前子

貳錢



澤瀉伍分

豬苓叁分

麥芽壹錢

枳殼貳分

右藥水煎服。一劑即止瀉。車前、茯苓、澤瀉、豬苓、皆止瀉分水之聖藥。以白芍平肝，使不來剋脾。黃連清心火，不來助脾之熱。而麥芽枳殼消滯氣以通水道，不必止瀉，瀉自止也。

洋散寒止瀉湯專治小兒寒瀉

寒瀉者腹痛而喜手按摩，口不乾，而古苔水滑。喜熱湯，不喜冷飲，不可投以瀉火之湯。五苓散雖能利水止瀉，尚欠補氣之藥。蓋小兒致於寒瀉，未有不傷脾氣者。脾氣既傷，非人參不能

救。五苓散無人參。元氣何由頓復也。

人參 壹錢

白朮 壹錢

茯苓 貳錢

肉桂 貳分

甘草 壹分

乾薑 貳分

砂仁 壹粒

神麴 伍分

右藥水煎服。此方參苓白朮乃健脾補氣神品。分溼利水之聖藥也。又加肉桂乾薑以卻寒。砂仁甘草神朮以調和之。則寒氣自然越出而洩瀉立止矣。

七、論驚證

雷公曰。小兒驚證。皆本於氣虛。一作風治。未有不死者。或治風而兼補虛。尚可苟全性命。要之



断断不可作風治。我今特傳奇方。名壓驚湯。

人參 伍分

白朮 伍分

甘草 叁分

茯神 壹錢

半夏 叁分

神麴 伍分

砂仁 壹粒

陳皮 壹分

硃砂 叁分

水煎服

此方即六君子之變方也。小兒只有脾病。治脾而驚自定。故用六君子湯以健脾。少加壓驚藥。奏效如神。

(七) 論吐瀉

小兒吐瀉。傷食之故也。蓋飲食飽餐。自難一時消化。不上吐。必下瀉。用六君子湯。即效。但吐者



去甘草。加砂仁。瀉者加車前子治之。自能奏功於俄頃。倘不知補脾。而惟圖消剋。必更傷脾氣。未有不敗者也。慎之。

(七) 小兒不乳方

小兒生下不肯食乳者。乃心熱也。葱煎乳汁。小兒服之。甚妙。但不若用黃連叁分。煎湯壹分。灌之。即食乳矣。

(八) 陽癇證

俗稱急驚風。即痰火閉證。

小兒先期發熱。忽然怪叫一聲。不省人事。牙關緊閉。壯熱涎湧。眼睛翻白。手足抽搐。面赤氣熱。



或兼角弓反張。逾時乃已。數日復發。俗稱急驚風。世醫輒用抱龍丸。追風散。保赤散等藥投之。流弊滋多。此證未發之前數日。兒體熱度必增。蓋小兒脾胃虛弱。飲食不節。食而不化。積滯生痰。遂致如此。實脾胃證也。治以(六)清火散驚湯。(七)壓驚湯。或照(五)痰火閉症治法治之。皆可奏效。並須飲食有節。勿恣兒嗽。以養脾胃為要。

(五)陰癇證 俗稱慢驚風。即木侮土症。又名慢脾證。

小兒髮黃。血虧也。氣短。氣虛也。腹脹。脾胃寒也。面色淡白或青黃。氣血兩虛也。



身熱。

夜重晝輕者陰虛也。晝重夜輕者陽虛也。晝夜無間者陰陽兩虛也。

喉有疾聲。脾敗則枯涎無統。凝滯喉間。

兩目無神。虛極則脾失元氣。故兩目無神而昏黯欲暈。

四肢厥冷。脾胃敗而火力衰。口鼻氣涼。內寒也。

昏睡露睛。眼皮屬脾。脾敗。故睡時眼皮不能緊合而露睛。

便溺綠利。

大便色綠。小便清利。逾時色變未泔。火衰而虛寒也。

手足瘰癧。血不足以養筋也。

又或口脣焦裂出血。身雖發熱。卻不喜於冷飲。

是血虛而陰火上炎也。

或吐或瀉。而吐瀉之物。皆未甚消化。脾胃虛寒。



以上各證。不一定全現。但見一二種。即可知為慢脾證。倘因循失治。或誤服涼藥。則病必加重。而證現。現顙門下陷。虛至極也。

鼻孔搐動。真陰失守。虛火鑠肺也。

汗出如洗。陽虛而表不固也。

頭低不能抬。口噤無聲。不能裹乳。及至角弓反張。血虛筋急也。

手足抽掣。血虛不行達於四肢也。

證至此。陰癘已成。而危殆矣。此乃胃寒脾敗。陰虛陽絕之證。俗稱驚風。謬誤殊甚。實是肝剋脾。



胃之土。而土氣將絕耳。此時萬不可作風治。獨  
治風以定驚。則立刻亡矣。宜急救脾胃之土。兼  
補命門心色之火。方用續氣湯。庶可起死回生。

黨參 壹兩

白朮 壹兩

巴戟天 伍錢

遠志 貳錢

茯苓 伍錢

紫肉桂 壹錢

乾薑 叁分

附子 叁分

生棗仁 叁錢

半夏 壹錢

水煎服

右服一劑安。三劑全瘳。此方以十歲為準。每少  
一歲。遞減十分之一。無論慢脾證如何危險。服  
之皆立效。蓋慢脾證乃虛證也。



(六)小兒感冒風寒方張仲景傳

柴胡 伍分

白朮 壹錢

茯苓 叁分

陳皮 貳分

當歸 捌分

白芍 壹錢

半夏 叁分

炙甘草 叁分

右藥用水一鍾煎半鍾稍熱服一劑即瘳。

(七)小兒痢疾方

當歸 壹錢

黃連 貳分

白芍 壹錢半

枳殼 伍分

檳榔 伍分

甘草 叁分

右藥用水一鍾煎半鍾稍熱服一劑輕二劑瘳。

紅痢加黃連壹倍。白痢加澤瀉叁分。

腹痛倍加甘草多加白芍藥。



小便赤，加水通叁分。氣虛，加人參叁分。

下如豆汁，加白朮壹錢。

傷食，加山查炭、炒麥芽，各叁分。

此方通治小兒痢疾。照加減法治之。神效。

(六) 小兒瘧疾方

柴胡 陸分  
白朮 壹錢  
茯苓 壹錢  
白芍 壹錢半

歸身 壹錢  
半夏 伍分  
青皮 伍分  
厚樸 伍分

右藥用水一鍾。煎半鍾。露一宿。再溫之。與服。

熱多，加人參、黃耆，各伍分。

寒多，加乾薑叁分。痰多，加白芥子壹錢。



夜發熱。加何首烏、熟地、各貳錢。

日間發熱，不加。腹痛加檳榔叁分。

(九)小兒咳嗽方

蘇葉 伍分  
桔梗 壹錢  
甘草 壹錢

右藥用水一小鍾煎五分。稍熱服。二劑全瘳。

痰多加白芥子伍分。

(十)小兒口疳流水口爛方

黃柏 貳錢  
人參 壹錢

右藥共為細末。每次用叁肆分敷口內。日敷三

次。二日即瘳。



按小兒口疳。皆虛熱也。用黃柏以去火。人參以健脾土。神效。大人亦可用。

(二)小兒便蟲方 諸虫皆可治

樞子 伍個 去殼 甘草 叁分

右藥共為細末。米飯為丸。如芥子大。分次服。服完。蟲盡化為水。大人亦可用此藥去蟲。蓋樞子最能殺蟲。又不耗氣。然食多亦能傷脾。

(三)小兒蟲積方

史君子 拾個 去殼炒香 檳榔 壹錢 樞子 拾箇 去殼

甘草 壹錢



(八)神效稀痘方

右藥各為細末。合研極勻。未飯為丸。如桐子大。分次與小兒拾丸服之。二日即便蟲。五日全瘡。

凡小兒痘殤驚風等證。皆由先天胎毒蘊結之故。初生三日以內。至遲七日以內。自尾閭至腦後風門骨。用生雞蛋清。加生薑汁少許。逐節輕輕研擦。男孩向左旋揉。女孩向右旋揉。週而復始。有毛出如髮。尾閭須多研。愈研毛愈出。將黑毛輕輕拔出。終身不出痘。即出亦只有數顆。且無驚風等證。如六日九日再研。更好。

(八)神效

無驚風等證。如六日九日再研。更好。



(八)論痘證

天師曰。今人看痘為難治。不知得其法。則無難也。初起之時。不論身弱身強。先以補氣補血之藥為君。加以發散之藥。則重者必輕。而輕者必少。無如世人皆以寒涼之品為主。又助以劫散之味。此所以輕變重。重至死也。吾今傳五方。朝夕服之。至七日無不結靨。永無回毒之證。十人十活。不殺一小兒也。

第一日方

見小兒身熱。眼如醉眼者。此出痘兆也。若不是

醉眼。則非出痘。不可用此方。用治外感方治之。  
若見醉眼。急投此方。則痘點即現。必不待二日  
而痘自出也。方用

黃芪

叁錢

白朮

壹錢

甘草

壹錢

當歸

貳錢

川芎

貳錢

茯苓

叁錢

升麻

伍分

柴胡

壹錢

麥冬

貳錢

玄參

叁錢

陳皮

伍分

荆芥

壹錢

先用金銀花伍分。水三盃。煎湯二盃。再煎藥至  
一盃。與小兒飲之。

此方五歲以上。俱照此分兩。五歲以下減半。週  
歲內者。遞減之。服此藥。自然心神清爽。定可速



瘡不必疑猜。服後見點。再用第二日方。

第二日方

白朮 貳錢 麥冬 叁錢 甘草 壹錢 桔梗 貳錢

當歸 伍錢 生地 伍錢 玄參 叁錢 柴胡 壹錢

升麻 叁分 荊芥 壹錢 茯苓 貳錢 白芥子 貳錢

白芍 叁錢 金銀花 叁錢

右藥水煎服。服此藥後。一身盡現點矣。其色必紅。而無色白色黑之虞。

第三日方

人參 伍分 白芍 叁錢 白朮 貳錢 茯苓 叁錢



玄參 貳錢  
神麴 叁分  
丹皮 壹錢

右藥水煎服。此方服後。盡皆灌漿。無不氣血充足。決無退證危險矣。再服第四日方。

第四日方

人參 壹錢  
當歸 貳錢  
熟地 伍錢  
茯苓 叁錢

陳皮 伍分  
甘草 壹錢  
玄參 叁錢  
白朮 叁錢

白芍 貳錢  
神麴 伍分  
金銀花 叁錢

右藥水煎服。小兒服此藥後。必然口健多食。不妨少少頻與。但亦不可過多。如此第五方可不必用矣。然更傳之者。恐小兒多食停滯。致生他



病。故又傳第五方。

第五日方

人參 壹錢

茯苓

叁錢

白朮

貳錢

甘草

壹錢

右藥水煎服。傷食加麥芽伍分。山楂伍粒。若不傷食。止加金銀花叁錢。即可。

服此五方。七日以前。定期回春也。

以上五方。小兒年歲小者。俱照第一方減法減之。如小兒已身熱三日。則用第三日方。四日者。則用第四日方。

(八) 治痘法

張仲景傳



痘瘡初起方

白芍 貳錢

柴胡 壹錢

當歸 壹錢

陳皮 伍分

荆芥 捌分

防風 叁分

生地 貳錢

甘草 壹錢

桔梗 壹錢

麥冬 壹錢

乾葛 壹錢

右藥水煎服。服二劑。痘瘡惡者必變為良。痘瘡  
良者更保平安。

預防痘瘡入眼。加蟬退。柒箇。去足。

預防痘瘡入喉。加桔梗壹錢。

痘瘡出齊方

人參 壹錢

黃芪 壹錢

甘草 壹錢

白芍 貳錢



生地 貳錢 麥冬 貳錢 柴胡 捌分 紅花 伍分

右藥水煎服。

有熱加黃連伍分。或黃芩壹錢。梔子壹錢。亦可。

有驚加蟬退叁分。去翅足。

色黑加肉桂伍分。

大便閉結不通加大黃叁分。

腹痛加芍藥壹錢。甘草壹錢。

泄瀉加茯苓壹錢。

有汗倍加黃芪。

有痰加白芥子壹錢。



癢加荆芥子陸分。

身痛加廣木香叁分。

色白者寒也。加肉桂壹錢。人參黃芪俱多加。

痘瘡頭不突者氣虛也。倍加黃芪。

腰不滿者血虛也。加當歸壹錢。熟地貳錢。

痘瘡將回方  
人參壹錢 白朮壹錢 茯苓壹錢 甘草伍分

桔梗叁分 水煎服

此藥升提其氣。而又益肺金。使皮毛得諸補藥之益也。





紅紫、乾燥黑、陷者、熱未退也。本方加黃芩壹錢。  
如痘色白、或黑灰、或黑色而陷者、寒且虛也。加

肉桂叁分。人參壹錢。

灌膿、倍加人參。再加黃芪貳錢。當歸貳錢。

泄瀉、加乾薑伍分。茯苓再加壹錢。

心慌、悶亂、多加人參。

嘔吐、亦加人參、乾薑。

身癢、加廣木香叁分。

當靨不靨、多加人參。

大便閉、加大黃叁分。



口渴熱也。加麥冬貳錢。玄參壹錢。

失音。加石菖蒲叁分。桔梗再加壹錢。

痘瘡入眼成翳者。加蟬退伍分。

在初起方中即加蟬退七箇。則痘不入耳。

咽喉中有痘。桔梗再加壹錢。

在初起方中即加桔梗壹錢。則無此證。

小兒痘證。有此三方。保可回春。可稱神醫矣。

壞證。亦以此方治之。無不生者。

總之。小兒痘證。宜補不宜散。一言盡之矣。

(六)痘瘡神方 錢真人傳

此方不論初起。灌漿。收靨。俱用之。神效無比。

人參 壹兩  
白朮 捌錢  
茯苓 伍錢  
陳皮 叁錢



白芍 壹兩  
玄參 捌錢  
蟬退 壹錢  
生甘草 叁錢

黃連 伍分  
柴胡 貳錢  
神麴 叁錢  
山查肉 貳錢

右各為細末。合研極勻。打水成丸。如綠豆大。每服壹錢。未起者。即起。已起者。即灌漿。不收醫者。收醫。神奇之極。毋視為尋常也。

(七)痘瘡壞證方 秦真人傳

專治痘瘡壞證已黑者。人將棄之。服此藥即活。

人參 叁錢  
陳皮 壹錢  
蟬脫 伍分  
玄參 貳錢

當歸 貳錢  
荆芥穗 壹錢

右藥用水二鍾。煎八分。灌下即活。



按痘瘡壞證。皆由元氣虛。而火不能發也。我用人參。以助元氣。用玄參。以去浮游之火。用陳皮。去痰開胃。則參無所礙。而相得益彰。荆芥。以發之。又能引火歸經。當歸。以生新去舊。而消滯氣。蟬脫。解毒去斑。世人如何知此妙法。初起者。不可服。必壞證乃可。一劑即可回春。不必再劑也。

(六)必全湯

天醫雷公傳。專治痘瘡壞證。

痘瘡壞證。最為可憐。身如黑團之氣。口不能言。食不能下。世人到此。盡棄之溝中。醫者到此。亦置而不顧。誰知盡人皆可生之乎。吾有奇方。名

必全湯

人參

叁錢

玄參

壹兩

荊芥

壹錢

陳皮

叁分

金銀花

壹兩

右藥水煎五分灌之。下喉眼開。少頃身熱。神氣回。口能言而食能下矣。不必再服他藥。瘡自自然生全。至奇至神之方也。

痘瘡壞證。皆因氣虛而大不能發也。火毒留於中而不得洩。故形如死狀。其實臟腑未壞。我用人參以固元氣。用玄參以去火。用金銀花以解毒氣。用陳皮以化痰。用荊芥以引經而發出於



外。內中原有生機。所以一劑即回春也。

(九)回毒即消丹

岐天師傳。專治痘瘡回毒。

金銀花 伍錢

生甘草 壹錢

人參 貳錢

玄參 叁錢

右藥用水二碗。煎三分。與小兒服之。一劑即復。

二劑全瘡。不須三劑也。

(九)治水痘方

岐天師傳。亦治熱證而有水氣者。

柴胡 壹錢

茯苓 貳錢

桔梗 壹錢

黃芩 伍分

竹葉 拾片

燈草 壹團

生甘草 伍分

水煎服

有痰加天花粉叁分。有食加山查叁粒。麥芽叁分。有火加黃連壹分。有此一方。水痘無難治矣。



四時疹方 張仲景傳

疹乃熱證。不可用人參白朮。當用補血而不可散血。俱宜切記。方用

當歸 貳錢 玄參 叁錢

升麻 叁分 甘草 叁分

乾葛 壹錢

水煎服

此乃治疹奇方也。有此奇方為骨。又出入加減。神奇之極矣。

心火熱極。加黃連叁分。肝火。加梔子陸分。

肺火。加黃芩壹錢。麥冬壹錢。

雷公傳四時疹方



凡疹初起。小兒必發熱。口必大渴。呼水。其發疹之狀。如紅雲一片。大約如發斑相同。但斑無頭粒。而疹有頭粒。頭如蚤咬之狀。無他別也。

玄參

叁錢

麥冬

貳錢

蘇葉

壹錢

天花粉

壹錢

升麻

伍分

陳皮

叁分

甘草

壹錢

金銀花

壹錢

生地

叁錢

黃芩

捌分

桂枝

貳錢

右藥用水鍾半。煎五分。稍熱服。凡有疹子。無不神效。惟夏天加青蒿叁錢可也。小兒初生數月。分兩減半。一週外。俱照此方分兩。不必再傳方也。服吾方一劑。即瘡。何至三嘆。



(九) 夏日發疹方 岐大師傳

蘇葉 壹錢

麥冬 貳錢

桔梗 壹錢

生甘草 壹錢

升麻 伍分

生地 貳錢

玄參 叁錢

青蒿 叁錢

右藥水煎服

(九) 消斑神效方

雷公曰人有一時身熱。即便身冷。而滿體生斑。如疹者。乃火從外泄。而不得盡泄於皮膚。故鬱而生斑。人盡以為熱也。用寒涼瀉火之藥不效。有斑不得消而死者。亦可傷也。速用此方治之。

玄參 壹兩

麥冬 壹兩

升麻 叁錢

白芷 壹錢



沙參 卷錢

丹皮 伍錢


白芥子 卷錢

右藥水煎服。一劑斑勢減。再劑斑紋散。三劑斑影盡消矣。此方妙在用玄參、麥冬以消斑。尤妙在升麻多用。引玄參、麥冬以入於皮膚。使羣藥易於奏功。而斑無不消也。

(九四) 猩紅熱治法

夫猩紅熱非他。即痧疹而兼溫病也。

如痧疹不兼溫病。其將出未出之先。不過微有寒熱。或頭微疼。或眼胞微腫。或肢體微痠懶。或食慾不振。迨疹既出之後。其表裏雖俱覺發熱。



而實無熾盛之劇熱。治之者。始終投以清表解

毒之劑。無不愈者。

痧疹始終宜用表藥。然宜表必平涼。不宜表以溫熱。

即或始終不服藥。聽其自出自靨。在一星期間。

亦可自愈。此以其但有疹毒之熱。而無溫病之

熱相助為虐。故其病易愈耳。

至於疹而兼溫者。則與斯迥異。其初病之時。疹

猶未出。即表裏壯熱。因疹毒之熱尚不萌芽。而

溫病之熱已熾盛也。治之者。宜將薄荷、連翹、蟬

退、諸托表之藥。與玄參、沙參、天花粉、諸清裏之

藥並用。再少加金銀花、甘草解毒。若慮其痧疹



不能透達。可用鮮茅根貳兩。如無可代水煮數沸。取清湯數鍾。以之代水煎藥一大鍾。溫服。其疹必完全透出矣。或以外更用鮮茅根數兩。煎四五沸。以其湯代茶。更佳。方用

連翹

叁錢

薄荷葉

壹錢半

蟬退

壹錢半

玄參

伍錢

天花粉

伍錢

金銀花

叁錢

沙參

伍錢

甘草

壹錢

鮮茅根貳兩。煎取清湯代水煎藥一大鍾。溫服。再用鮮茅根伍兩。煎湯代茶飲。

若其痧疹雖皆透發於外。而火猶熾盛。且深入

陽明之腑。其舌苔從前白者。至此則漸黃。心中  
煩熱異常。或氣粗微喘。鼻翅煽動。或神昏譫語。  
腦膜生炎。其大便乾燥。小便赤澀。此乃陽明胃  
腑大實之候。而欲治陽明胃腑之實熱。傷寒論  
中之白虎湯。原為千古不易之良方。為其兼有  
疹毒。可於方中加連翹貳錢。羚羊角壹錢。羚羊  
角另煎免服。或磋細末送服。無力。再用鮮茅根或鮮  
之家。可以金銀花伍錢代之。再用鮮茅根或鮮  
蘆根煮湯。以之代水煎藥。方中若用生石膏貳  
兩。可煎湯兩鍾。分兩次溫服。若用生石膏叁兩。  
可煎湯三鍾。分三次溫服。一劑熱未清者。可服

至數劑。以服後熱退。大便仍不滑瀉為度。

二、白虎湯加連翹羚羊角方。此是照白虎湯原方分量十分之一。用者酌之。

知母 陸錢 生石膏 壹兩半 生甘草 貳錢

粳米 陸錢 羚羊角 壹錢 連翹 貳錢

注意：石膏用生的。萬不可煨用。粳米不可

糯米代之。粳米硬。尋常煮飯用者。糯米黏。是用作糕粉者。

若其胃腑雖有大熱。因小便不利而大復滑瀉者。白虎湯又不可驟服。宜先用滋陰宣解之劑。其滑瀉當即止。方用

三、滑石 壹兩 生山藥 壹兩 生白芍 捌錢



連翹 壹錢半

蟬退 壹錢半  
去足

生甘草 叁錢

煎湯一大鍾。溫服。

如瀉止之後。熱猶不退者。宜於第一方中加滑石六錢服之。以退其熱。仍宜煎湯數鍾。徐徐溫服。至於大熱已退。疹已見靨。而其餘熱猶盛者。宜再治以滋陰清熱解毒之劑。而仍少加托表之藥佐之。方用

四

玄參

捌錢

沙參 伍錢

花粉

伍錢

金銀花

叁錢

連翹

叁錢

甘草

貳錢

鮮蘆根

叁錢

水煎服

此方可連服數劑。其熱遞減。藥劑亦隨之遞減。



迨服至其熱全消。停服。

以上諸方。若遇證兼喉痧者。宜於方中加射干、生蒲黃各叁錢。惟治大便滑瀉方中。不宜加此二藥。可外用吹藥。方用

五、  
硼砂貳錢 生寒水石貳錢 上梅片壹分

薄荷冰壹分 共研細。吹喉中。

如頸部咽喉兩旁。起有疙瘩。大如桃核。撫之則疼。此是疹毒未透之所致也。俟疹出齊。可以自消。若疹已出齊。表裏之熱已退。而疙瘩仍不見消。可用金銀花陸錢。甘草叁錢。煎湯一大杯。分



三次溫服。每次送服梅花點舌丹壹粒。或磨服  
(二) 玉樞丹。並可磨濃汁外塗。即消。

按猩紅熱本非危險之證。其所以多危險者。以  
其證現白虎湯證時。醫者不敢放胆用白虎湯  
治之也。以致多不奏效。殊為憾事。治之者祇要  
診得病至胃腑大實之候。而大便實者。儘可放  
胆投以大劑白虎湯。有可應手回春。但不可以  
生石膏太涼。改用煨石膏。蓋生石膏質重氣輕。  
煮水毫無汁漿。雖胃腑之熱未實。而亦可用。煨  
石膏性最凝結。多用殺人甚於砒霜也。慎之。

(九五)清火消丹湯岐天師傳專治赤白遊風。

赤白遊風往來不定。小兒最多。此證有似發斑。但發斑有一定之根。而赤白遊風無一定之包。此胃火鬱熱不解。故亦結瘡而不瘡。治之法。必須清熱。而清熱又必須涼血。蓋血寒則凝滯。血行。雖火得血而可止。終不能散火。此清火消丹所以妙也。

生地 壹兩

丹皮 叁錢

玄參 叁錢

生甘草 壹錢

牛膝 貳錢

赤芍 叁錢

天花粉 壹錢

右藥水煎服。二劑消半。四劑全消。小兒減半。



(九六) 丹毒論治 洞天奧旨

丹毒之證。多在小兒出胎後五六日至兩三月之間發生。係父母胎毒所成。凡在百日以內發生者。不論何種。皆胎毒也。須於三日以內治之。遲則無及矣。兒生百日之外。始發丹毒者。稍遲數日。尚不至於死亡。然亦必須急治。不可令其入腹。一入腹即難救。故腹脹不能飲乳者。必死無疑。以其胃氣絕也。凡能飲乳者。是胃氣未絕。皆可治療。丹毒證分十種。各附治法。列載於後。臨證辨明種類。依法用藥。治之宜早。俾免燎原。

倘或施治稍遲。攻入腸胃。十無一生。可不慎乎。

一飛竈丹

證從頭頂上紅腫起。此大毒在泥丸也。本是難救。然急用芫柏散塗之。即消。

芫柏散

白芫 參錢

黃柏 參錢  
炒

右藥各為細末。另用葱白搗爛。取自然汁。調和極勻。塗頭頂泥丸上。一晝夜即消。

二吉竈丹

證從頭上向腦後紅腫。亦有腫而作痛者。更有



渾身發熱者。內宜服防風通聖散加減治之。外宜用紫荊散調塗。即瘡。

防風通聖散 世傳方內治吉竈丹

防風 荊芥 連翹 麻黃 薄荷

當歸 白芍 白朮 大黃 芒硝 黃芩

桔梗 山梔子 生甘草 生石膏

滑石 各等分 水煎服。加減及分量。用者酌之。

紫荊散 外治吉竈丹

紫荊皮 赤小豆 荊芥 生地榆 各壹錢

右藥共為細末。鷄蛋清調塗。神效。



三鬼火丹

證狀面上先赤腫。漸漸由頭而下。漫延至身亦

赤腫也。是手足陽明

與大腸

經內風熱。治法宜用

白虎湯以瀉胃熱。加防風、荆芥、薄荷、桑白皮、葛

根以散其風。引其從皮毛而外散也。然大腸亦

熱。何故不散。大腸之火。不知胃之火甚於大腸。

胃火散而大腸火亦散。不必又治之也。但外用

伏龍散末。以鷄蛋清調擦之。尤妙。

白虎加味湯世傳內治鬼火丹

生石膏

貳錢

知母


壹錢

麥冬

叁錢

半夏

壹錢



生甘草壹錢 防風伍分 荆芥貳錢 薄荷壹錢

桑白皮貳錢 葛根壹錢 竹葉叁拾片

右藥水煎服二劑。

伏龍散 家傳外治鬼火丹

伏龍肝末叁錢 炒黃柏叁錢

右藥共為細末。鷄蛋清調擦。神效。

四天火丹

證狀先從脊背起赤點。後漸漸赤腫成一片。是腎督脈中熱毒。兼足太陽膀胱經風熱。宜治腎而兼治膀胱為是。不可純用防風通聖散也。外



用桑榆散敷之。則得之矣。

解苦散 岐天師傳內治天火丹

一參 伍錢 生地 伍錢 羌活 壹錢 黃柏 貳錢

升麻 伍分 丹皮 叁錢 白茯苓 叁錢

右藥水煎服。四劑自散。

桑榆散 家傳外治天火丹

地榆 貳錢 生用 桑白皮 貳錢 羌活 壹錢 玄參 叁錢

右藥共為細末。羊脂溶化調塗。

五天竈丹

證狀從兩臂起赤腫。少黃色。或止於一臂見之。





胥手陽明大腸經風熱。內服解毒之藥。外敷柳  
灰散。亦易瘡也。蓋天竈丹乃丹毒之最輕者。故  
亦可輕治之耳。

輕解散

岐天師內治天竈丹

防風

伍分

麥冬

叁錢

生地

叁錢

桑白皮

壹錢

黃芩

壹錢

柴胡

捌分

白芍

叁錢

天花粉

伍分

右藥水煎服二劑。

柳灰散

外治天竈丹

柳枝炭

伍錢

荆芥

炒 貳錢

滑石

叁錢

生甘草

貳錢

右藥共為細末。水調塗之。即瘡。



六水激丹

證狀初生於兩脅。虛腫紅熱。乃足少陽膽經風火也。此丹亦熱之輕者。治膽經之火而去其風。可計日而全也。方用加味小柴胡湯最神。外更以敷藥塗擦。又何慮乎。

加味小柴胡湯 內治水激丹

柴胡 壹錢

半夏 伍分

甘草 伍分

黃芩 壹錢

陳皮 叁分

白芍 貳錢

防風 伍分

荊芥 壹錢

右藥水煎服。數劑丹消。

鐵屑散

外治水激丹



生鐵屑 貳錢。臘雪水調塗妙。一方有母豬糞燒灰 貳錢為末同調塗。

七胡次丹

證狀先從臍上起黃腫。是任脈溼熱也。去其溼熱。丹毒自散。古人用三黃解毒湯。未免過峻。恐小兒氣虛難受。岐天師傳授化溼飲方。治之尤覺安穩。更用檳榔散外治。萬無一失。

化溼飲 岐天師傳內治胡次丹

白菓 拾箇 白朮 壹錢 黃柏 貳錢 山藥 貳錢

茯苓 叁錢 澤瀉 壹錢 木通 壹錢 赤芍 貳錢

荊芥 壹錢 天花粉 壹錢 水煎服



檳榔散 外治胡次丹

檳榔貳錢 生甘草 壹錢

右藥共研末。和極勻。米醋調擦。自瘡。

八野火丹

證狀從兩腿上起。赤腫痛甚。如火之燒。乃足陽  
明胃經風熱也。內服涼膈散。外以羊脂調消腫  
散塗之。自易瘡也。此證雖火盛極。不可信是胃  
經熱熾。而竟用石膏湯與瀉黃散也。蓋小兒脾  
胃欠實。不禁大瀉。恐胃氣損傷。轉難救耳。

涼膈散

世傳內治野火丹



連翹 貳錢 大黃 壹錢 芒硝 伍分 甘草 壹錢

梔子 貳錢 黃芩 貳錢 薄荷 壹錢 茯苓 壹錢

右藥水煎服二劑。

消腫散 岐天師傳外治野火丹

乳香 壹錢 白芨 壹錢 火丹草 壹錢

右藥共為細末。羊脂調塗妙。

九煙火丹

證狀有從兩足跗起。赤色腫痛。乃足三陽膽膀胱

經風熱也。亦有從足底心起者。乃足少陰腎經

大熱也。治法內服滋陰抑火之藥。使水旺足以



制火。更兼用末藥外治為妙。

抑火制陽丹 岐天師傳內治煙火丹

玄參 伍錢  
黃柏 壹錢  
晞蒼草 貳錢  
生地 叁錢

熟地 壹兩  
丹皮 叁錢  
細甘草 壹錢  
沙參 貳錢

芩膝 壹錢  
金釵石斛 貳錢  
水煎服

黃柏散 家傳外治煙火丹

黃柏末蜜調塗之自癒 一方有猪槽下土。同調塗。

十胡漏丹

證狀從陰上起黃腫。乃厥陰肝經虛火發於外也。治法宜內服補陰清火散風之藥。外用屋土



散調塗可瘡。倘用當歸龍薈丸與瀉青散皆不能成功也。

清散湯 岐天師傳內治胡漏丹

白朮 壹錢 茯苓 壹錢 甘草 伍分 當歸 貳錢

梔子 炒壹錢 黃柏 壹錢 防風 叁分 生地 貳錢

麥冬 貳錢 蔓荊子 壹錢 水煎服

屋土散 岐天師傳外治胡漏丹

屋瓦上陳土 炒黃柏 生甘草

右共為細末。蜜與醋同調塗。即消。

以上十種丹證之外。更有一種紅線痛者。難以



救援。蓋以父服熱藥。遺傳在胎。非藥所能解也。  
(九) 火丹神效方 孫真人傳

絲瓜子 壹兩 柴胡 壹錢 玄參 壹兩 升

當歸 伍錢 水煎服。一劑即消。

(六) 小兒急驚風外治方 此方沒治小孩。已難數計。起死回生。確有神效。

僵蠶 叁條 藤黃 柒分 青黛 柒分 川連 壹錢

全蝎 叁箇

右藥五味。打成細末。天泉水煎熟為糊。再用追風膏藥壹張。將藥放在追風膏藥中間。其上留一小孔。另用梅冰片壹分。頂好麝香壹分。作為





藥心趁熱貼在小兒臍上。用綢紮住。不滿半時

兒腹響動。大便隨下。驚風立退。其膏藥須

二週後(即一日夜)方可揭去。如係慢驚方不可用

(元)小兒慢驚風外治方 此方救活小兒已難數計。起死回生確有神效。

全蝎 玖箇 頂好麝香 壹分半 真正硃砂 叁分

鹽蠶 玖條 大梅冰片 叁分

右藥五味。研極細末。用蜜糖少許。拌成藥餅。再

用鷄蛋壹箇。放在鑊內。不用油煎成荷色蛋式。

乘蛋溫熱。先將藥餅放在小兒肚臍上。再將荷

包蛋放在藥餅上面。用布紮住。隔兩小時解去



倘小孩腹內有響聲。或有大便解下。即是效驗。  
如貼此藥餅。依時解下後。仍不見動靜。可再貼  
一雞蛋。照前煎成荷色蛋式。再將原藥餅仍照  
前法貼紮臍上。隔兩小時解下。無不立獲奇效。  
倘症過重。宜再買藥末一服。如法貼紮。仍隔兩  
小時解下。定可回春。

二百萬全湯 岐伯天師傳留神效。

小兒飲食無節。則食積不消而生痰。身體不爽。  
則焦躁啼哭而肝火動。肝熱至甚。則驚搐病發  
矣。此方主治小兒脾胃諸病。兩目之間。皮現黃



色。而身發燒熱者。是也。或飲食不消。或食積生  
痰。或急驚抽搐。或驚悸。或吐瀉。或氣短。或喉有  
痰聲。或昏睡無神。等證。奇效。

柴胡

伍分

白芍

壹錢

當歸

伍分

白朮

叁分

茯苓

貳分

甘草

壹分

山查

叁粒

黃芩

叁分

蘇葉

壹分

麥冬

壹錢

神麴

叁分

黨參

伍分

右藥用水一鍾。煎至半酒鍾服。

春天加青蒿叁分。

夏天加生石膏叁分。

秋天加桔梗叁分。

冬天加麻黃壹分。

有食加枳殼叁分。

有痰加白芥子叁分。



瀉加磁石壹錢。

吐加白薑壹粒。

有驚再加黨參伍分。

〔三〕治慢驚風心得神方

小兒慢驚之症。緣吐瀉得之為最多。或久瘧。或  
痢。或疹後。痘後。或因風寒。飲食積滯。過用攻伐  
傷脾。或東賦本虛。或誤服涼藥。或因急驚而用  
藥攻降太甚。或失於調理。皆可致此症也。  
症見神昏。氣喘。或大熱不退。眼開。驚搐。或乍寒  
乍熱。或三陽晦暗。或面色淡白青黃。或大小便  
清白。或口脣雖開裂出血。而口中氣冷。或瀉利



冷汗。或完穀不化。或四肢冰冷。並至腹中氣響。喉內痰鳴。角弓反張。目光昏暗。此虛症也。亦危症也。俗名謂之天吊風。虛風。慢驚風。慢脾風。皆此症也。若再用寒涼。再行消導。或用膽星。抱龍以除痰。或用天麻。全蝎。以驅風。或用知柏。苓連以清火。或用巴豆。大黃。以去積。殺人如反掌。實可畏也。若治風而風無可治。治驚而驚亦無可治。此實因脾腎虛寒。孤陽外越。元氣無根。陰寒至極。風之所由動也。

治宜先用辛熱。再加溫補。蓋補土所以敵水。治



本即所以治標。凡小兒一經吐瀉交作。即是最危症。若其屢作不止。無論痘後、疹後、病後、不拘何因。皆當急用參朮以救胃氣。薑桂歸熟等藥以救腎氣。不惟傷食當急救之。即傷寒、傷暑亦當急救。蓋其先雖有傷寒、暑、實邪。一經吐瀉。業已全除。脾胃空虛。倉廩空乏。若不急救。恐虛疾上湧。命亦頃刻矣。若誤指為熱為食。投以清火去積涼藥。立時告變。挽救不及。與其失之寒涼。斷難生活。不若失之溫補。猶可救療。此語發明吐瀉驚風之理。最為明透。醫者病家。幸勿忽諸。

今將慢驚辨症。臚陳於後。

吐瀉脾胃虛寒也。身冷陽氣抑遏不出也。

服藥後

致此往鼻孔煽動真陰失守。虛火燄肺也。面色青

黃及白。氣血兩虛也。口鼻中氣冷。中寒也。大小

便清白。腎與大腸全無火也。昏睡露睛。神氣不

足也。手足抽掣。血不行於四肢也。角弓反張。血

虛筋急也。乍熱乍涼。陰血虛少。陰陽錯亂也。汗

出如洗。陽虛而表不固也。手足瘈瘲。血不足以

養筋也。顛門下陷。虛至極也。身雖發熱。口脣焦

裂出血。卻不喜飲冷茶水。以及所吐之乳。所瀉



之物皆不甚消化。脾胃無火可知。脣之焦黑。乃真陰之不足也。明矣。

總之。因發熱不退。及吐瀉而成者。皆屬陰虛陽越。必成慢驚。並非感冒風寒發熱可比。故不宜發散。治宜培元救本。加薑桂以引火歸原。必先用辛熱沖開寒痰。再進溫補。方為得法。經驗二方列後。

一 逐寒蕩驚湯

此方藥性溫煖。常治小兒氣體

本虛。或久病不愈。或痘後疹後。或誤服寒涼。泄瀉嘔吐。轉為慢驚。如清熱散風。愈治愈危。急服



此方能開寒痰。寬胸膈。止嘔吐。蕩驚邪。所謂回元氣於無有之鄉。一二劑後。嘔吐漸止。即其驗也。祇要認明症是虛寒。即宜服之。不必疑畏也。

胡椒 壹錢

炮薑 壹錢

肉桂 壹錢

丁香 拾粒

右藥研為細末。以竈心土參兩。煮水澄極清。煎藥大半茶杯。頻頻灌之。接服後方。定獲奇效。

二加味理中地黃湯 此方助氣補血。却病回陽。端治小兒精神已虧。血氣大敗。形狀狼狽。瘦弱至極。皆可挽回。如法濃煎。頻頻與服。參天救本之功。有難以盡述者。

熟地 伍錢  
當歸 貳錢  
白朮 叁錢  
山萸肉 壹錢

枸杞 貳錢  
炮薑 壹錢  
黨參 貳錢  
炙甘草 壹錢

棗仁 貳錢  
炒研  
肉桂 壹錢  
故紙 貳錢  
炙黃芪 貳錢

生薑 叁片  
紅棗 叁枚  
胡桃 貳箇  
為引

右藥仍用竈心土貳兩。煮水澄清。煎取濃汁。置

茶盃。另加附子五分。煮水攪入。量兒大小。分數

次灌之。

如咳嗽不止者。加荷殼壹錢。金櫻子壹錢。

如大熱不退。加白芍壹錢。

如泄瀉不止。加丁香陸分。



右藥服一劑。即將附子減去。丁香改用茱粒。隔  
二三日。再加用附子。每次貳分或叁分。即可。蓋  
因附子太熱。病見輕。即宜去之也。如用附子太  
多。則小便閉塞不出。如不用附子。則沉寒臍臍。  
固結不開。如不用丁香。則泄瀉不止。若小兒虛  
寒至極。附子又不妨用至壹貳錢。此所謂神而  
明之。存乎其人。用者審之。

此方乃救陰固本之要藥。治小兒慢驚。稱為神  
劑。若小兒吐瀉。不至已甚。或微見驚搐。胃中尚  
可受藥。吃乳便利者。並不必服逐寒蕩驚湯。止

服此藥一劑。而風定神清矣。

如小兒尚未成驚。不過昏睡。發熱不退。或時熱時止。日間安靜。夜間發熱。以及午後發熱等症。總屬陰虛。均宜服之。

若新病壯實之小兒。眼紅口渴者。乃實火之症。治宜清解。不宜服此熱藥。但果係實火。必大便閉結。氣壯聲洪。且喜多飲冷茶水。此其辨也。若是吐瀉交作。則非實火可知矣。然亦有因傷食而吐者。但所吐必酸腐。亦有熱極旁流而瀉者。所瀉必惡臭。是實火。是虛寒。醫者須細心辨之。

(一三) 沆瀣丹

治小兒一切胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。鵝口。口  
瘡。重舌。木舌。喉閉。乳蛾。渾身壯熱。小便黃赤。大  
便閉結。麻疹。癰瘰。遊風。癰疥。流丹。癰疹。痰食。風  
熱。疔腮。面腫。十種火丹。諸般風搐。神效無比。為  
幼科有一無二之神方。

此方作三焦之主治。蓋大臟氣通流者。必不鬱  
滯。或受毒於胎前。或感邪於誕後。遂爾中抑鬱  
則見以上諸症。

杭州翦

錢  
洗

川錦黃

錢  
洗

黃芩

錢  
洗



黃柏 以錢酒洗

薄荷葉 肆錢

黑牽牛 陸錢炒取頭末

飛滑石 陸錢

連翹殼 陸錢

夫檳榔 柒錢半童便洗

赤芍 陸錢炒

陳枳殼 肆錢半炒

右味依法炮製。和勻焙燥。研極細。煉蜜為丸。如

芡實大。月內之兒。每服壹丸。稍大者貳丸。俱用

茶湯化服。乳母切忌油膩。服後微瀉。則藥力行。

病即減也。如不瀉。再服之。重病者。每日叁次。以

愈為度。此方斷不峻厲。可勿疑畏。惟胎寒者。面

目現青色。忌之。

方內黃芩。清上焦之熱。大黃。清中焦之熱。又有



推陳致新之功。黃柏清下焦之熱。能活血除煩。力能導三焦之火從魄門而出。猶恐苦寒凝膩。故加檳榔枳殼之辛散。為行氣利痰之佐使。川芎薄荷引頭面風熱從高而下趨。連翹解毒除煩。赤芍調榮活血。牽牛利水走氣分而舒鬱。石膏清潤而抑陽火扶陰。又能引邪熱從小便而出。用治以前諸証。應如桴鼓。小兒病最忌攻伐。惟此方用之最久。功效莫能殫述。真濟世良方。

〔三〕清暑固陰湯

此方專治小兒傷暑。初起下瀉上渴。身熱額與

胸腹更甚。有時熱退。旋又發熱。心中煩躁。坐臥不安。小便短赤。糞色時黃。時黑。時紅。不定。口喜冷飲。闕紋紅。舌苔白之症。

白扁豆

炒 叁錢

茯苓

貳錢

滑石

壹錢半

香薷

川厚樸

伍分

葛根

肆分

木瓜

壹錢

薑炭

右藥八味。略煎數開。冷服。熱服。反增腹瀉。嘔吐者。加藿香壹錢。竹茹肆分。

不嘔吐者。加甘草叁分。有嘔吐。不可加。慎之。

二歲小兒。照本方服之。未及兩歲者。兩服分作

三服。過兩歲者。三服作二服。無論體之強弱。皆





照此服。大人兩服。作一服。此方絕不寒中。故體弱者亦可服之。

按各種泄洩。初起之時。心不煩躁。惟受暑傷心。故煩。坐卧不安。以此分辨。此症非不治之症。惟不可稍延。凡病入腑者吉。入臟者凶。有胃氣生。無胃氣死。今暑邪既中心經。有干神明。胃受暑逼。復傷水谷之海。母疾及子。邪有出路。故可治。但胃受暑逼而瀉。津液瀉盡。生氣奚存。况又傷神明之臟。治之不急。何能有生。更况暑月之中。陽在外而陰在內。故平人身涼則無病。只是內

陰足濟外陽。若暑氣內擾。津液日泄。則中如火。焚若不速為固陰。何以圖存。陰非陰血之陰。乃手少陰心。足太陰脾也。脾屬裏。胃屬表。故由胃及脾。既傷心經。復傷脾經。故死期可以時計也。方中用扁豆者。取其清暑和脾。茯苓滲濕補脾。木瓜利濕驅暑。又酸能瀉肝。以防侮脾。黑薑厚樸。溫以養脾。苦以養心。且濕熱內蘊。黑薑足為諸藥響導。則香薷葛根。滑石。自無扞格不入之患。兼六一散。能止泄瀉而利小便。解肌熱。生津液。分之為清暑之方。合之為養脾養心之助也。

此藥服之。十治十全。若誤服藥餌。或病日甚。後則十救一二。初起病重者。不能一服即效。而神氣必為安靜。未有三劑不收效者。此方治愈多人。無論大人小兒。患此疾。服此藥。奏效捷如影響也。

〔高〕小兒解顱煎 即頭大面小

龜板 生地黄

右藥按兒大小酌用。如一年內者。用龜板伍分。地黄壹錢。每日按早午夜飯後。三次煎服。年大者照加。此症不治。縱至十五六歲。亦難長成。



〔五〕三豆湯

治天行痘症。預解熱毒。簡易而便。童穉服之。極為神效。如鄉鄰有痘症流行。預與兒食。可免不出。即出亦稀。

大黑豆壹盞 赤小豆壹盞 萊豆壹盞

生甘草壹兩

右藥水煮極爛熟。連豆帶湯。與小兒食之。連食七日。可免傳染。

〔六〕治痘後翻疤 治膿水潰蔓延

赤石脂壹兩 寒水石壹兩 大貝母 桑錢



右藥共為極細末。乾摻。

又方 新象牙 叁錢 兒茶 壹錢半

殭蠶 貳錢  
炒斷絲

珍珠 叁錢  
腐製

右藥共為極細末。用油胭脂調塗。毒水如注。漸

漸收口。

〔五〕象牙散 治天花開在眼中

新象牙磨水。滴入眼中。其花即退。

〔六〕小兒飢瘦不思飲食

雞肫皮揩淨。陰陽瓦焙乾至黃色。研末。每日

用一茶匙。調粥食之。



〔一〕預防驚風方 初生小孩須在三日內用之

杏仁 桂仁 梔子 白胡椒 各壹粒

右藥研末。調黑骨鷄蛋清。敷小兒足心。男左女右。經一晝夜取下。敷藥處現青黑色。永無驚風。

〔二〕急慢驚風內外治法

急驚。即古人所謂陽癇。其主因為痰熱。肝風內煽。治法以平肝。滌痰。清熱。為當。方用

白芍 壹錢 隻鉤 柒分 川貝 柒分 麥冬 柒分

胆草 伍分 甘菊 柒分 竹黃 伍分 秦艽 伍分

鬱金 叁分 茯神 柒分 水煎服



如小兒忽然不省人事。牙關緊閉。壯熱痰湧。手足抽搐。病發倉卒。不及煎藥。可用一人將兒倒懸抱持。使兒頭向下。口向地。另一人撐開兒口。用其母頭髮梢。蘸香油。探兒喉。令其作嘔。吐出頑痰。即醒。或用細葱一根。剝淨葱皮。探喉。痰去。兒即醒矣。此是急驚外治法。

慢驚。即古人所謂陰癇。其主因為脾虛泄瀉。肝木侮土。治法以理中湯為主。

泡附子 伍分  
白朮 壹錢  
升麻 貳分  
茯苓 壹錢

肉桂心 壹分  
黨參 壹錢  
炙草 伍分  
破骨脂 伍分

急慢二症。最易錯認。一熱一寒。情同水火。兩症均有泄瀉。口渴。但急驚必見抽搐。大便黃。小便赤短。煩躁。若慢驚則大小便白。精神疲倦。辨法已詳前。必須詳辨。萬勿錯認。

(三)保赤却病良方 家傳秘方。輕而易舉。

黃梔子 研末 鷄蛋青

以上兩種。與白麩攪和調勻。形如漿糊狀。搽敷嬰孩兩脚心。用布包紮。每日一換。敷後數日。脚心必現青紫色。此乃胎毒引外。不庸疑惑。

凡初生嬰孩。三朝之後。彌月之前。宜日日搽敷



不但可免驚風。且可減却百病。幸勿忽視。

〔三〕軍中一捻金

治小兒腹中脹悶。咽喉瘡。傷食積食等症。

錦軍 枳實 檳榔 黑白丑

人參 各等分

共為極細末。蜜水調服。每服壹錢。

若咽喉瘡痰多。口眼喎斜。加青礞石倍分。

〔三〕小孩頭部暑癩方 亦治痘後餘毒。如法調敷。即愈。

法以蠶豆

新採未將外殼留存晒乾用新瓦焙

存性研細末

隔年用

芝蔴香油調敷立效。

〔四〕小兒痰厥方



以明礬煎水洗腹部及兩足。洗後用明礬灰。麩各半。醋調燉熟。敷兩足心。用布包好。乾則再換。痰由大便解出。即愈。

〔五〕小兒初生無皮治法

小兒初生無皮。色赤筋紅。乃受胎未足也。法用早稻白米。研為極細末。頻頻撲之。皮膚自生。

〔六〕小兒螻螂子方

嬰孩有痰火者。吃乳數日。腮間必腫。總名妬乳。俗名螻螂子。方用

元明粉 壹分  
硼砂 伍釐  
薄荷尖 貳釐

真青黛伍釐

冰片肆釐

右藥共研細末。以手蘸藥末。搽口中腫處。三四次即愈。此方功效如神。屢試屢驗。

〔三〕小兒胎毒下導方

生地 生大黃 各等分

右二味搗融。黃酒調和。敷小兒兩足心。一晝夜取去。則胎毒從大便而下。

〔三〕小兒黃水瘡 旋覆花燒灰存性。香油調敷。即愈。

〔三〕小兒口瘡方

老黃瓜一根。於端午午時。將瓜開口。裝入冰片



壹錢。稍久瓜上起霜。即黃瓜霜。以霜塗瘡。即愈。

〔一〇〕小兒頭上生癩方

鹽西瓜皮。炙灰研末。麻油調敷患處。結痂而愈。

〔三〕小兒初生小便不通

用生葱汁少許。和乳灌下。即解。切忌蜂蜜。

〔三〕小兒初生脫肛方

百草霜 梅片 雄黃 各等分

右藥加灶心土。研細末。麻油調搽。即愈。

〔三〕小兒耳後生瘡

此乃腎疔。用地骨皮為末。粗者煎湯洗患處。細

者香油調搽即愈。

〔三〕小兒疝氣方

荔枝核 柒箇 橄欖核 叁箇 橘核 貳拾肆箇

大小茴香 各壹錢半 共研細末 每服壹錢 立效

〔三〕小兒赤目方 胡黃連研末 茶調塗手足心 即愈

〔三〕回生丹 又名神仙活命丹

專治中風不語 半身不遂 肢節頑麻 痰涎上湧

咽嗑不利 飲食不下 牙關緊閉 及一切酒毒藥

毒 緊急霍亂 中暑 等等急症 用藥壹分 開水送

下 如不開口 搥開牙齒灌下 立即起死回生

貫衆壹錢 甘草壹錢 乾葛壹錢 板藍根壹錢

甜硝壹錢 牛黃伍錢 薄荷伍錢 川軍壹兩半

硃砂肆錢 麝香叁錢 肉桂叁錢 生犀角伍錢

珠粉伍錢 龍腦研 全箔叁拾片 真青黛叁錢

右藥共研極細。收貯瓶內。封口。不可洩氣。

一解百毒新汲水下。

一汗後熱勞病。及小兒驚風熱症。用薄荷湯下。

(三)換骨丹

此丹專防遺傳中風。或體肥痰多年高之人。恐患中風者。連服兩料。終身不染中風。



麻黃膏煎思仙米 川芎 白芷 桑皮另研末

野參 歲靈仙 防風 首烏 蔓荊子

槐角子各壹兩 苦參 木香 五味各伍錢

麝香壹分 冰片叁分

右藥共研極細。用麻黃膏和勻。杵搗一萬五千下。硃砂少許為衣。加煉蜜為丸。每丸伍分。每月

初二日、十二日、廿二日、及二十四節氣日、臨卧

時用黃酒或開水。送服壹丸。其立春、立夏、立秋

立冬、春分、秋分、夏至、冬至、八節、節前、節後、兩天

各加服壹丸。

