


病
院
經
驗
方
府

卷之一

ヤ 5

1032

1



高橋正純先生輯

病院 經驗方府

日新亭藏

病院經驗方府

九例

一皇安政年中。聘和蘭海軍醫朋百氏。創建病院。爾來醫術隆盛。日甚于一日。然而世之庸醫。唯聞知洋藥効驗。而莫詳悉藥性分量。或失處方定量。或過久持重。以蹈危險者。亦不少矣。甚則至妄用劇藥。以毀損天壽。豈可不嘆哉。予嚮在哥陽病院。受業于蘭醫勳兒印氏。及滿私歇兒篤氏。其配劑中。親經驗者。隨而筆之。積成數冊。因採拔東校之英醫。亨利斯氏之処方。及近日此院所施之方。而參考之。更倣烏私的兒連氏藥劑書。各分部門。各藥下。記用量及用法。示配合式。以頒之于同志云。



西本此書同圖書

91-2071

此篇所載之方皆於各病院既經實驗者而毫無襲用他書者是書名之所由而出也故各方下記配劑家名符即滿斯敦兒篤尾刺答麻字字里斯越

者用本邦之時分時者洋之密細者設昆度也秤量者隨書來洋醫其例如左

			廿		
		弓	十二		
	弓	八	九十六		
		廿四	百文		
	又	三	垂翠		
		六十	九十八		
又	二十	我	八		
		我	二		
		我	四		
		我	五		
		我	七		
		我	毛		

一滴者一八。一M者大抵同水一滴耐精之M

者為一滴半茶匙卵匙皆容一匙匙布匙容二匙匙食匙共容四匙。孟容二弓。碗容四弓。

一篇中所用柏來藥劑有遠難得者故將著其製法以附錄焉。

明治五年壬申九月

正七位高橋正純誌

病院經驗方府目錄

變質劑之部

水銀

一丁

單沃實汞

二丁

重沃實汞

三丁

甘汞

四丁

昇汞

六丁

赤降汞

十丁

硝酸銀

十丁

鉛糖

十二丁

金公水

十三丁

膽礬

十四丁

砒銅礬

十五丁

亞鉛華

十五丁

皓礬 十六丁

纈草酸亞鉛 十七丁

硝酸昆私繆篤 十七丁

金硫黃 十九丁

吐酒石 二十丁

安貞沒扭酒 二十三丁

白砒石 二十三丁

砒石液 二十三丁

沃度砒 二十四丁

炭酸刺篤亞斯 二十四丁

重炭酸刺篤亞斯 二十五丁

硝石 二十五丁

孕礬酒石 二十七丁

格羅兒酸加里 二十七丁

醋酸加里 二十八丁

酒石英 二十九丁

重炭酸曹達 二十九丁

芒硝 三十丁

食鹽 三十一丁

蓬砂 三十一丁

石鹼 三十二丁

阿波的兒克弗 三十二丁

石炭水 三十三丁

炭酸加爾基 三十三丁

炭酸麻屈涅失亞 三十四丁

浮利益 三十四丁

明礬 三十五丁

硫黃華 三十六丁

硫灰水 三十六丁

肝色礦黃 三十七丁

病經方寸目錄

沃實丁幾 三十七丁

沃度利馬亞斯 三十八丁

蒲羅謨利篤亞斯 四十丁

格羅兒水 四十一丁

格羅兒加爾基 四十一丁

格羅兒加爾基水 四十二丁

稀硫酸 四十三丁

稀硝酸 四十四丁

稀王水 四十五丁

稀鹽酸 四十六丁

稀磷酸 四十六丁

醋 四十七丁

屋施茂兒 四十八丁

酒石酸 四十八丁

保固強壯藥之部

括失亞 四十八丁

健質亞那 四十九丁

葛私加栗刺皮 五十丁

橙皮 五十丁

牛膽 五十一丁

大黃 五十一丁

大黃舍利別 五十二丁

大黃丁幾 五十二丁

蘆會 五十二丁

格綸僕根 五十三丁

依蘭苦 五十四丁

幾那 五十五丁

規屈涅 五十八丁

單寧酸 六十三丁

刺苔尼根 六十四丁

烏白烏爾失 六十四丁

阿仙藥 六十五丁

鐵粉 六十六丁

格碌屈私末兒扶斯 六十六丁

枸橼酸鐵 六十六丁

枸橼酸鐵規尼涅 六十七丁

硫酸鐵 六十八丁

硫酸鐵液 六十九丁

塩酸鐵丁樂 六十九丁

沃實鐵 七十丁

沃實鐵舍利別 七十丁

鐵酒 七十一丁

剛鐵酒 七十一丁

神經鐵液 七十一丁

揮發衝動劑之部

病院經驗方府卷之一



文部少教授高橋正純 輯

第一綱 變質劑

第一 金屬

水銀 日下ラルギル

○第一方(字) 名水銀丸

水銀 二錢 甘草末 一錢

蜂蜜 三錢

右丁寧研磨至不見水銀為丸每服一丸至二丸下劑三丸至十丸小兒一丸至五丸

○第二方(字) 名水銀散

水銀 一兩 炭酸加爾基 二兩

右丁寧研磨至不見水銀為度服量同前

○第三方湯越名水銀軟膏

水銀 二分

家猪脂 二分

羊脂或單膏一分

右研磨至不見水銀為度日取半錢至一錢為擦劑

○第四方湯滿名水銀擦入法主治全身梅毒

水銀軟膏一錢至二錢

右朝夕各取其半擦入兩股之內面或初日擦兩膊之內面次日擦入股側第三日擦兩股內面如斯數日矣以至見吐涎之候

○第五方朋主治微毒性骨痛

水銀軟膏 二錢

舍電阿芙蓉液 一錢

單膏 四錢

右混和朝夕塗擦患部

○第六方朋主治打撲

水銀軟膏

舍電阿芙蓉液各二錢

阿列布油 一馬

右混和塗擦患部日二三次

○第七方朋主治眼內部焮衝兼疼痛者

水銀軟膏 二錢

莫爾非 三錢

右混和取豆大摩擦眼圍日一二次

○第八方湯主治虹彩焮衝及微毒諸腫

水銀軟膏 二錢

莫若越哉斯 半錢

右混和攤綿布貼眼圍或腫上

○第九方字主治硬結腫

水銀軟膏 一馬

竜腦 二十錢

沃度剥篤亞斯 五錢

右研和塗擦患部

單沃實承プロトヨロ 每服自四分

氏之一若半氏始至一氏半若二氏日數次

小兒自六分氏之一至三分氏之一為散若丸。外用軟膏取一錢和脂一弓若二弓。

○第一方滿主治梅毒性皮膚病骨病及膿腫

單沃實汞 十錢 甘草膏 二錢

右研和為六十九丸朝夕二丸至三九或朝午夕各服二丸或初日服二丸每日增加一丸至十九

○第二方朋主治同前

單沃實汞 十錢 甘草末 一錢半

蘆根越幾適宜

右研和為百丸初日自二丸始每日增加二丸至十九而後漸準初降至四丸

○第三方朋滿主治同前

單沃實汞 十錢 阿芙蓉 二錢至四錢

甘草末 一錢半 蘆根越幾或蒲公英 越幾適宜

右研和為八十九丸初日自二丸若四丸始每日增加一丸若二丸至十二丸而後準前漸降至三丸若二丸

○第四方朋主治梅毒

單沃實汞 十五錢 阿芙蓉 三錢至五錢

大黃末 半錢至一錢 甘草末 半錢

蘆根越幾適宜

右研和為百丸初日取四丸朝夕各服二丸每日增加一丸若二丸至十二丸而後準前漸減丸數終至二丸

○第六方滿主治梅毒

單沃實汞 二十錢 阿芙蓉 四錢

甘草末 一錢 蘆根越幾適宜

右研和為百丸初日服四丸每日增加一丸至十二丸而後每日減一丸終復四丸

○第七方瓦主治第二期梅毒

單沃實汞

阿芙蓉 各四片

菖蒲根末

菖蒲根越幾 各適宜

右研和為二十九朝夕各服一九至二九

重沃實汞 印ウトヨダレ五心

自十二分片之一至六分片之一徐徐增加

雖多不過四分片之三溶解燒酒或湯的兒

○外用要緩効者取一尺和脂半錢若一錢

要峻効者取一分和脂五分若十分

○第一方朋主治頑固梅毒

重沃實汞 六片

湯的兒 或亞爾箇兒 或燒酒一瓦

右研和令溶解至脫紅色硝子蠟貯每服自

五滴始徐徐增加至三十滴日二次冷水和

服或每服加舍電阿芙蓉液五滴殊良○此

液二十滴中含重沃實汞四分片之一六十滴

中含四分片之三

用例表

第一日第二日 朝夕各服五滴

第三日第四日 朝夕各服七滴

第五日 朝夕各服九滴

第六日第七日 朝夕各服十一滴

第八日第九日 朝夕各服十三滴

第十日第十一日 朝夕各服十五滴

第十二日第十三日 朝夕各服十七滴

第十四日第十五日 朝夕各服十五滴

第十七日第十八日第十九日 朝夕各服十三滴

第二十日第二十一日 朝夕各服十一滴

第二十二日 朝夕各服九滴

第二十三日 朝夕各服七滴

第二十四日第二十五日 朝夕各服五滴

第二十六日第二十七日第二十八日 朝夕各服五滴

第二十九日第三十日第三十一日 朝夕各服五滴

第三十二日 朝夕各服五滴

○第二方_朋

重沃實承 六分

亞爾箇兒 六分

舍電阿芙蓉液 半分

右研和、一日自八滴、若十滴始、徐々増加、至十五滴、若二十滴、

外用

○方_朋

重沃實承 十分

單膏 半分

右研和朝夕塗擦患部

甘承 コロレムム ヒドラルギロシム

變質劑、每服半分以至一分、日數次、下劑六分、十分至二十分、頓服、

○第一方_朋

主治梅毒淋疾及第扶斯

甘承 八分至十分

白糖 二分或甘草末一分

右研和、分十六服、朝夕各一服、

○第二方_朋

主治肺嗽衝及間歇熱

甘承 二分至三分

吐根末 二分至三分

右研和、分六服、每一時一服、

○第三方_朋

主治痘瘡驚風及萎黃病

甘承 三分

大黃末 十分

右分八服、每一時一服、或日四服、

○第四方_朋

主治第扶私、腸粘液膜嗽衝、痢疾、吃逆、

甘承 二分至六分

莫爾非 四分、之一、半、四分、

右丁寧研和、分六服、每一時若半時、一服、

○第五方_朋

主治腸粘液膜嗽衝

甘承 三分

阿芙蓉

吐根末各四錢 甘草末二錢

右研和分十二服日四服

○第六方明主治赤痢

甘草三錢至五錢 莫爾非半錢

規尼八錢 甘草末一錢

右研和分六服每一時一服或加芦根越幾
適宜為二十九每半時服二九

○第七方湯主治咽喉燥衝

甘草 硝石各十二錢

菲沃斯越幾一刃 甘草膏二錢

右研和為六十九每服三九日三次

○第八方瓦主治第二期梅毒

甘草九錢 阿芙蓉一錢至二錢

遏爾托末 失鳩荅越幾各半錢

右研和為四十九每晚服四九每日增加一

九至發吐涎而止

○第九方明主治頑固下利兼下血者及梅毒

甘草四錢 阿芙蓉二錢

乳糖二錢

右研和分十二服日四服

○第十方明主治間歇熱

甘草八錢 大黃末十二錢

右調和頓服

○第十一方湯主治局處諸燥衝

甘草六錢至八錢 藥刺巴末十五錢至二十錢

右調和為散頓服或分三服每一時一服

○第十二方瓦主治同前

甘草十五錢 藥刺巴末一刃

右研和為丸頓服

外用

○第一方為主治角膜翳、結膜血管膨脹、結膜慢性嫩然、衝及瘡瘡

甘汞細末適宜

右取少許裝細管吹入眼中或搽布瘡上

○第二方朋主治角膜翳

甘汞半勺

阿芙蓉 十八

白糖半勺

右丁寧研磨為極末取少許入眼中日二次

○第三方瓦主治下疳

甘汞半匙

右炭水 四勺或十勺

右濕和為黑色液洗患部日數次

○第四方越主治梅毒性瘰肉及下疳

甘汞一錢

單膏一勺

右濕和雜綿布貼患部

昇汞 コロレ、エ、ミ、ヒ、ド、ラ、ル、ギ、リ、キ、シ、シ、フ、リ、エ、シ

每服十分之一至四分之二或一日自

六分之二始每二日增加十二分之二

漸加至一尺若一尺半為丸最佳或溶解水

燒酒若越的兒。外用洗劑注射劑眼水及

含劑劑取半尺至三尺溶解水一勺軟膏取

一刃和脂一勺浴湯中取二錢漸次增加至

半勺若一勺先溶解燒酒後和浴湯

○第一方朋主治梅毒諸症

昇汞 二尺以温湯過の兒或

阿芙蓉末 二尺

甘草末 二十尺

甘草膏適宜

右研和為二十九丸中會昇汞十分之二

一。初三日間、晡時服一丸次三日間、朝夕

各服一丸又三日間、朝服一丸夕服二丸又

三日間、朝夕各服二丸又三日間、朝服二丸

夕服三丸如斯每三日增一丸遂一日之量至一以而后準初漸減丸數

○第二方明主治梅毒

昇汞三以忽弗滿鎮痛液十五滴溶解者

阿芙蓉四以 大黃末一以

蘆根越戔斯適宜

右研和為五十九丸初日取二丸朝夕各服一丸每日增加一丸遂至十二丸

○第三方靈主治梅毒

昇汞十二以 甘草膏半以

右研和為百二十九丸初日服二丸每日增加一丸遂至十九丸而后漸減丸數準初

○第四方靈主治梅毒初期

昇汞十以 甘草膏二以或甘草末一以

右研和為六十九丸初日取二丸朝夕各服一

丸每日若每二三日增加一丸至六丸若患者服後發胃痛或嘔吐者劑中加阿芙蓉或別兼用舍電發護阿芙蓉液

○第五方靈主治梅毒

昇汞四以之一漸加至半以 木類煎八以至十六以

右調勻每半時服二食匕一日服量

○第六方元主治梅毒

昇汞一以以蒸餾水少許溶解 菖蒲根末或菖蒲根越戔適宜

右研和為十六丸衣石松子末初日取二丸朝夕各服一丸二三日之後取三丸朝午夕各服一丸又二三日之後取四丸夕服加一丸

○第七方瓦主治梅毒

昇汞一以 蕪鉛水八以

右溶和每日服一匕至二匕或此劑中加

爾箇兒二變

○第八方_{〔單〕}主治梅毒諸症

昇汞十二分 健腎亞那水一馬

沃實刺篤亞斯五又至

右調勻日服三劑

外用

○第一方_{〔越〕}名昇汞皮下注入法主治梅毒性

潰瘍發背要部臨危險者

昇汞一又 黃鮑水二變

右溶和取十滴至十二滴注入背部日一次

若二次此液十滴中含昇汞十二分之二

十二滴中含十分之二

○第二方_{〔朋〕}名黃金水主治下疳梅毒性發疹

及頑固潰瘍

昇汞五又 石灰水一馬至

右混和為洗劑

○第三方_{〔朋〕}主治梅毒性諸疹

昇汞五又至 硫化越的兒或忍布

液三 清水或温湯

右混和掌擦日二次

○第四方_{〔朋〕}主治下疳及梅毒性發疹

昇汞十又 含電阿芙蓉液一又

淨水十二馬

右混和為洗滌劑

○第五方_{〔朋〕}主治橫痃或下疳

昇汞四又 亞刺比亞護護末六

淨水十滴

右研和為毳布之調塗捻紙挿入瘡中

○第六方_{〔病〕}主治梅毒咽喉傷及梅毒諸瘍

昇汞二又五又 淨水或過蘭托根煎

病

九

右濕和為嗽劑或洗滌劑

○第七方_朋 主治梅毒性骨瘍

昇汞 五八至 燒酒 一錢至

加密列浸劑 一廿 石灰水 四号

右微溫蘸布片覆患部

○第八方_字 主治發疹諸症

昇汞 一八 礮砂 六八

清水 八号

右濕和為洗劑

○第九方_朋 主治環癬及頑癬

昇汞 二五至十五八 家猪脂 二号

右研和取少許擦入患部日二次

○第十方_朋 主治皮膚諸病

昇汞 二錢至

右先以越的兒溶解注浴湯

赤降汞 トキシゲム、ヒドソルトリキ、
トルケリユス、バシヒタ云

一日八分氏之一至四分氏之一漸次增加

至一氏為散若丸。外用眼軟膏隨症取一

氏至二十氏和脂一錢

○第一方_朋 主治頑固蠶蝕下疳及頑固梅毒

性皮膚病或潛伏梅毒諸患

赤降汞 二八 阿芙蓉 三八

白糖 三錢

○第二方_朋 主治同前

赤降汞 二八 阿芙蓉 二八

甘草末 一刃 甘草膏 適宜

右研和為二十九朝夕各服一丸

○第三方_馬 主治梅毒及列布羅

赤降汞 六八 甘草末 或甘草膏

右研和為六十九丸初日取四丸朝夕各服二丸漸加至十九

外用

○第一方 明 主治腺病性眼瞼喉衝及其剝爛或下疳及肛門潰瘍楊梅瘡

赤降汞 二又四又至五又 家猪脂 二錢

右研和塗擦患部日一二次

○第二方 明 主治梅毒諸瘍或眼瞼潰瘍

赤降汞 八又至 家猪脂 半勺

舍電阿芙蓉液二十滴

右研和貼患部

硝酸銀具 ニトラス アルゲンチキス

每服六分氏之一若半氏漸加至三氏日數

次先以蒸餾水少許溶解為丸或為溶劑

外用取二氏至三氏以蒸餾水一氏溶解

灌腸劑一氏至六氏蒸餾水一氏溶解軟膏

一氏至十氏和脂一氏

○第一方 明 主治癩癩及胃粘液膜潰瘍

硝酸銀具 三氏以蒸餾水適宜溶解

甘草末 半錢 甘草膏 適宜

右研和為三十九丸每服二丸日三次

○第二方 滿 主治同前

硝酸銀具 二氏 蒸餾水 一氏

右調勻每服二十滴日二次

○第三方 宇 慢性下痢

硝酸銀具 半氏 阿芙蓉 半氏

吐根末 一氏

右為丸製劑三個每服一劑日三次

○第四方 冠 主治同前

硝酸銀具 半錢 甘草末

病經餘方行

蘆根越炭 各適宜

右研和為六十九、每日三回、服一丸、

○第五方越 主治腸粘液膜潰瘍

硝酸銀具 一八半 麻俣涅夫 一刃

右研和分六服每一時一服

外用

○第一方朋 主治眼焮衝諸症、下疳、淋疾、腫

粘液漏、痘瘡、及諸潰瘍、

硝酸銀具 一八至 蒸餾水 一勺

右溶和、納硝子躑、以黑紙覆之、以毛筆、点眼中、日一二次、或為洗劑、及射注劑、

○第二方越 主治結膜焮衝、眼瞼潰瘍、瞼內

粗糙、角膜翳、或舌瘍、齒齦潰爛、下疳、便毒、及諸潰瘍、

硝酸銀具 五八十五至 二十八

蒸餾水 一勺

右溶和入硝子躑、以黑紙被之、點眼法先翻轉上下瞼之結膜、以毛筆點此液、後急注水洗去、日一次、若隔日一次、他部諸症、以筆直貼患部、

○第三方越 主治義膜性及蠶蝕性咽喉焮衝

硝酸銀具 一八至 蒸餾水 一勺

右調勻以毛筆或長柄海綿、深貼咽喉後急以冷水令含嗽、

鉛糖 ワセタス カリユム ビ

每服一瓦至二瓦、日數次、稀有至五瓦者、為散若丸、或為溶劑。外用眼水及灌腸劑、取一瓦至六瓦、溶解水一瓦、

○第一方越 主治肺勞及慢性氣管支焮衝

鉛糖 三 八 至 菲沃斯越炭 五 八 至 二

十

甘草末 適宜

石研和為十二丸、每一時服二丸、

○第二方 主治泄瀉及赤痢

鉛糖 四錢

阿芙蓉 二錢

白糖 一錢

石研和分六服、日三服、

○第三方 主治肺癆及諸出血

鉛糖 十錢

阿芙蓉 六錢

實芙蓉利末 十錢

甘草末 一錢

芦根越戔 適宜

石研和為六十九丸、每一時服二丸、

○第三方 主治氣管支炎、衝及肺癆咯血

鉛糖 二十錢

菲沃斯越戔 半錢

甘草末 一錢

石研和分十六服、日三次、

外用

○第一方 主治慢性結膜炎

鉛糖 二錢至五錢

蒸餾水 一錢

右溶和以毛筆點結膜、日一二次、

○第二方 主治同前

鉛糖 十錢

甘汞末 三錢

亞刺比亞護膜末 十錢

右研和為極末、朝夕取一小刀尖入眼中、

○第三方 主治慢性結膜炎、衝及眼瞼炎

鉛糖 半錢

亞刺比亞護膜末

十錢

白糖 半錢

右丁寧研和取一小刀尖入眼中、日二次、

○第四方 主治眼粘膜炎

鉛糖 三錢

舍電阿芙蓉液 一

至二

蒸餾水 一錢

右調勻以毛筆、点眼中、日二三次、

○第五方滿明 主治羅斯、痘瘡、疥癬、或下疳、淋疾、後麻、血尿、

鉛糖半錢至一錢 清水十二馬

右調勻為洗劑、若注射劑、

○第六方明 主治淋疾、或頑癬、

鉛糖一錢 舍電阿芙蓉液半錢至一錢

受 清水十二馬

右調勻注射尿道、日三次、或為洗劑、

○第七方明 主治梅毒、性骨瘍、

鉛糖二十馬至三十馬 單膏一馬

右研和貼患部、

金公水「ア」クワ、五ゲト、ミ子、ラリス、ゴ

唯供外用

○第一方滿 主治皮疹、及皮膚局處、焮衝、

金公水十二馬

右為洗劑

○第二方滿 主治梅毒、性潰瘍、

金公水一馬 清水八馬

右蘸撒、貼患部、一日六回、交換

○第三方滿 主治膿腫、

金公水十馬 阿芙蓉液一錢

右蘸綿布、貼患部

膽礬「キ」プリム、シル、フリス、ト、リ、オ、ヒ、ヒ

吐劑、每服三馬至四馬、病危險者、至十馬、若

十五馬、日數次、小兒半馬、至二馬、收斂劑、及

鎮痙劑、每服四分馬之一、至一馬、日數次、為

散、若丸、要速効者、為溶劑、○外用、取一馬、至

十馬、溶解水一馬、又取一馬、至四馬、和脂一

馬、

○第一方湯 主治義膜咽喉焮衝

膽蓉 三錢至六錢 蜂蜜 一錢

清水 一錢

右每四分時服一卯匕至得吐、四歲兒服量

○第二方越 主治同前

膽蓉 十錢 亞刺比亞護謨 一錢

水 一錢

右每八分時服一卯匕至得吐、八歲兒服量

外用

○第一方越 主治慢性結膜焮衝及淋疾

膽蓉 一錢 蒸餾水 一錢

右以毛筆點結膜或注射尿道、日二次

○第二方湯 主治結膜焮衝及肉丘

膽蓉 五錢至十錢 蒸餾水 一錢

右溶和先翻轉上下眼瞼以毛筆點瞼結膜

上、後急灌水洗去、日一次若隔日一次

○第三方湯 主治下疳及淋疾

膽蓉 二十錢 清水 十二錢

右溶和為洗劑若射注劑、日一二次

○第四方朋 主治睫毛根焮衝

膽蓉 五錢至八錢 亞鉛華 六錢

龍腦 二錢 家猪脂 新鮮者半錢

右研和取豆大插眼瞼

硝銅礬 シルフラス キシリコアムモニキ
ニキプリム シルシリキムアムモ
ニアカ
五ム

每服八分之二至一錢日數次為丸最良

○方湯 主治癩癩及舞蹈病

硝銅礬 六錢以蒸餾水
二三滴溶

黃餅心 一錢 流動炭酸諸莫尼 適

右研和為三十九硝子鑿貯每服二九至四

凡日三次

亞鉛華

シソキム オキシダ云々

每服一以至四以、日二次、若三次漸次增加、小兒四分以之一至半以、為散凡若錠、外用取一分、和脂十分、若二十分、

○第一方 主治癩癩

亞鉛華 八以

甘草末 二十以

右研和分六服、每一時一服、

○第二方 主治同前

亞鉛華 半以

甘草末

大黃末 各二以

右研和分三十六服、日三服、

○第三方 主治癩癩及半身不遂

亞鉛華 一以半

規尼涅 半以

大黃末 一以

牛膽適宜

右為百二十九丸、每服五丸至八丸、日四次、

○第四方 主治喘息

亞鉛華末

菲沃斯越哉 各半以

右研和為三十九丸、發作時、每半時服一丸、

○第五方 主治瘧疾

亞鉛華 十以

麝香 二以

大黃末

麻偃涅失亞 各十以

右研和分十服、日五服、

外用

○第一方 主治諸種發疹及潰瘍

亞鉛華 一以

單膏 或家楮脂

右研和攤綿布貼患部、若兼疼痛者、加舍電

阿芙蓉液 一以

○第二方 主治眼瞼結膜及迷色模腺腺衝

亞鉛華 二十以

赤降汞 二以

病歷會方府

新鮮家猪脂 二勺

右丁寧研和貯白磁器塗擦患部日二次

皓礬 「シロハス」
「イトリオロム」
「アルビム」

吐劑五勺至十五勺為溶劑頓服次飲劑及
鎮痙劑半勺至二勺日數次為散若丸。外
用取一勺至十五勺以水一勺溶解又取一
勺至四勺和脂一匙

○第一方 專 主治癩癩

皓礬 三勺 規尼涅 一勺

右為丸製劑三個每服一劑日三次

○第二方 專 主治同前

皓礬 二勺 規尼涅 一勺 蘆會 三勺

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第三方 用 吐劑

皓礬 半勺 蒸餾水 三勺

白糖 三勺

右調勻每八分時服一二食匕至得吐

外用

○第一方 專 主治結膜及角膜焮衝或角膜

潰瘍及白翳

皓礬 一勺至二勺 蒸餾水 一勺

右溶和以毛筆点眼中或時々蘸布片貼眼

○第二方 專 主治橫痃下疳淋疾及腔粘液漏

皓礬 五勺至十勺 清水 二勺

右調勻為洗劑若射注劑

○第三方 專 主治眼焮衝淋疾白帶下

皓礬 二十勺 舍電阿芙蓉液 一刃至半

清水 十六勺

右調勻点眼中或射注患部日二三次

顯草酸重鉍 「フアレリアナス」
「シンキキ」

每服一匁至二匁一日之量五匁至十匁為散丸若溶劑。外用取二匁至四匁溶解水二三

○第一方毒主治子宮衝逆

續草酸亞鉛 一匁 續草末 一匁

蒲公英越歲適宜

右研和為六十九丸每服二九日三次

○第二方守主治脊髓神經軟化

續草酸亞鉛 一匁 規尼涅 一匁

蘆會 三匁

右研和為九製劑三個每服一劑日三次

硝酸毘私膠篤 ビスニテム シュブニトリ キヒ シュブニトラス ビス

每服二匁至六匁日數次一日之量十匁至三十匁為散丸若錠

○第一方滿主治胃瘕嘔吐及肺勞

毘私膠篤 二十匁至三十匁 甘草末 二匁

右研和分十二服日三服

○第二方朋主治樓麻質痛

毘私膠篤 十二匁 阿芙蓉 二匁

甘草末 二匁

右研和分十二服每一時一服

○第三方毒主治胃瘕

毘私膠篤 半匁 麻伍涅失亞 二匁

重碳酸曹達 一匁 薄荷油 六滴

右調勻為散每服一卯匕日二三次

○第四方朋主治胃瘕肺勞

毘私膠篤 亞鉛華 各十五匁

莫爾非 半匁

右研和分六服每一時一服

○第五方治主治胃症

毘私膠篤

亞鉛華

菲沃斯越哉各半錢

右研和為三十九每服一丸發作時用

○第六方治主治疝痛肺勞

毘私膠篤二十錢

規尼涅十二錢

莫爾非半錢

甘草膏二錢

右研和為六十九每服四丸日二次

○第七方治主治虎狼痢

毘私膠篤十五錢

規尼涅十二錢

甘汞二錢

甘草末

蘆根越哉各適宜

右研和為二十四丸每一時服四丸

○第八方治主治胃痛因酸敗液者

毘私膠篤二十錢

大黃末

麻俚涅失亞各半錢

石調勻分六服每一時一服

○第九方治主治胃腑神經叢痛及下膜充血

毘私膠篤十錢

大黃末一錢

阿魏六錢

蘆根越哉適宜

右研和為三十九每一時服五丸

○第十方治主治神經性腹痛

毘私膠篤半錢

大黃末四十錢

孕卷酒石二十錢

牛膽適宜

右研和為六十九每一時服三丸

○第十一方治主治胃病

毘私膠篤二十錢

番木鱉越哉六錢

白糖三錢

右調勻分二十四服每一時一服

○第十二方治主治胃病

昆私膠篤 二十瓦 番木鱉越炭 六瓦

薄荷油 六滴 甘草膏 二瓦

右研和為六十九丸每服三九日二次

○第十三方 主治胃痛

昆私膠篤 二十瓦 莫尔非 四分瓦

大黃末 三十瓦 甘草末 二十瓦

右研和分六服日三服

外用

○方 主治火傷

昆私膠篤 亞麻仁油 或扁桃油 各適宜

右混和為泥貼患部

金硫黃 ビヨル、シリ、云ム、ス、ラ、ビ、キ、ム、ア、ウ、ラン

每服一瓦至四瓦日數次為散若丸

○第一方 主治呼吸器諸症

金硫黃 菲沃私越炭 各二瓦

甘草末 四瓦 蘆根越炭 適宜

右研和為三百六十九丸每一時服二丸

○第二方 主治麻疹声頃

金硫黃 六瓦 菲沃私越炭 六瓦至八瓦

甘草末 一瓦

右調和分十二服日三服或每一時一服

○第三方 主治氣管支炎

金硫黃 吐根末 各八瓦 白糖 三瓦

右調勻分二十四服日四服

○第四方 主治氣管支及胸腹初乙膜炎

金硫黃 六瓦至 菲沃私越炭 四瓦

吐根末 三瓦 白糖 一瓦或甘草 半瓦

右調勻分六服每一時一服

○第五方 主治慢性氣管支炎及癆瘵

金硫黃

吐根末 各二十瓦

菲沃私越哉

甘草膏 各一瓦

右研和為六十九每服二九日三次

○第六方越主治喘息及氣管支炎

金硫黃 二十瓦

菲沃私越哉 一瓦

莫爾非 一瓦

甘草末 一瓦

右調勻分十六服日三服

吐酒石

カルクリス
カビオカリタル
カリス

防燥降鎮劑每一時若一時半半瓦至一瓦病

輕者一日之量五瓦至六瓦最重者至十五瓦

催嘔祛痰發汗劑一日一瓦至二瓦為溶劑

吐劑每八分時半瓦至二瓦為散若溶劑

○外用取一瓦至五瓦溶解水一刃若一瓦

軟膏取一分和十分之脂

○第一方朋主治麻疹瘰癧質

吐酒石 二瓦

硝石 二瓦

清水 十二瓦

右調勻每半時若每一時服一匙

○第二方朋主治瘰癧質

吐酒石 一瓦

吐根末

阿芙蓉 各二瓦

甘草末 半瓦

右調和分六服每一時一服

○第三方朋主治第扶私

吐酒石

龍腦 各二瓦

阿芙蓉 一瓦

硫酸加里 二十瓦

右研和分六服每一時一服

○第四方朋主治腦水腫

吐酒石 一瓦

竜腦 二瓦

規尼涅 四瓦

甘草末 十瓦

右研和分六服每一時一服四歲兒服量

○第五方（湯） 主治氣管支嫩衝

吐酒石 二錢

吐根 十二錢

甘草末 一錢

蘆根越幾 適耳

右研和為六十九丸，每服三丸，日三次。

○第六方（湯） 主治咯血

吐酒石 一錢

老利兒水 二錢

菲沃私越幾 六錢

清水 十二錢

右調勻，每一時服二食匕。

○第七方（湯） 主治肺病

吐酒石 半錢

亞刺比亞護謨 二錢

舍電阿芙蓉液 十滴

水 十錢

蜂蜜 一錢

右調勻，每半時服一匙。

○第八方（朋） 主治肺嫩衝

吐酒石 十二錢

水 十二錢

屋施茂兒 一錢

右調勻，每一時服二食匕。

○第九方（朋） 越催嘔劑，主治腦病發狂。

吐酒石 二錢

清水 八錢

右調勻，每十五分時服一食匕，保持嘔噦。

○第十方（朋） 吐劑

吐酒石 三錢至四錢

清水 四錢

右調勻，每十五分時服一食匕，至得吐。

○第十一方（朋） 吐劑

吐酒石 三錢

吐根末 六錢

右分六服，每二十分時一服，至得吐。

○第十二方（朋） 主治第扶私及肺病。

吐酒石 二錢

吐根末 十錢

右以熱湯六錢浸漬，每八分時服一食匕。

○第十三方等 主治義膜咽喉焮衝

吐酒石 一匁 大黃舍利別

苗香水 各一匁

右調勻每四分時服一卵匕二歲兒服量

外用

○第一方湯 主治聖京偏性咽喉焮衝声嘎倭

麻質伊極篤

吐酒石 一匁 家措脂 一匁

右研和塗擦患部日二次至發疹

○第二方湯 主治瘰癧

吐酒石 六匁 家措脂 半匁

右研和貼患部

○第三方煎

吐酒石 一匁半 蒸餾水 四匁

右溶和為洗劑

安質沒扭酒

イライム スライビア

催嘔祛痰發汗劑每服十滴至十五滴一日

一匁至四匁小兒每日二十滴至四十滴吐

劑二匁至一匁小兒一匁至二匁

○第一方湯 主治百日咳

安質沒酒 二十滴 大黃舍利別

蜂蜜 清水 各一匁

右調勻每時服一茶匕一歲兒服量

○第二方湯 主治百日咳

安質沒酒 半匁 大黃舍利別 半匁

清水 二匁

右調勻每時服一卵匕四歲兒服量

白砒石 即砒酸

アシラム アルセニカム アル

每服二十分之二至十五分之二一日二

三次謹慎漸加至四分之一。外用腐蝕劑取四氏至四氏和脂若油一變注射劑取半氏至一氏溶鮮水一氏。

外用

○方朋 主治髓樣癌腫

白砒石 六氏至八氏

甘汞末 一氏半

亞利比亞護膜 二氏 蒸餾水 適宜

右研和為泥敷貼患部厚一列即令結痂八日若十日之後痂脫乃更敷貼如初宜反復五六回。

砒石液

シリチオ、アルセニカリス、リキール、ホツタスセ、アルセニ

每服四滴

即砒石二十至八滴 砒石十二分氏之一

二次漸之增加至十滴

砒石十分氏之一 若二十滴

砒石六分十四歲以下之兒用此量之三分

之一、水糖水若粘滑飲劑和服、

○第一方 朋 主治頑固間歇熱神經性喘息

及頑癬列布羅頑固皮疹

砒石液 一氏

右朝夕各取五滴六滴至八滴若十滴水一

食匕和服或每服加舍電阿芙蓉液一二滴

○第二方 守 主治癩病

砒石液

三滴四滴至六滴 健質亞那水 一氏

右製劑三個每服一劑日三次

○第三方 越 主治同前

砒石液 半氏

苗香水 二氏

右調勻每服二十滴至三十滴日三次冷水

和服

沃度砒

アルセニキム、ヨダニ

每服十分氏之一至六分氏之一日數次以

病 瘰癧 疥癬

廿四

越幾斯劑為丸。外用取二瓦至四瓦和脂一瓦。

○方 主治癩病及乳痛

沃度砒 六瓦

甘草末 一瓦

蘆根越幾 適宜

右研和為六十九丸每服一九日三次至四次

外用

○方 主治麻痺

沃度砒 三瓦

亞爾箇兒 半瓦

水 十瓦

的列並油 一瓦

右調勻塗擦患部日二次

第二固性亞爾加里土質及其製劑

炭酸利多私

カルボナス カリキ区
サル タルタ

取十瓦至一瓦混和水若飲劑一日數次分

服外用取六瓦至十瓦溶解水一瓦○一浴

湯中一廿至二廿勺處浴一瓦至三瓦○軟

膏一瓦至二瓦和脂一瓦

○第一方 主治腺病性骨疽

炭酸利多私 五瓦

健質亞那水 一瓦

右調勻製劑三個每服一個日三次

○第二方 主治肺勞

炭酸利多私 十瓦

苗香丁幾 半瓦

甘硝石精 半瓦

清水 一瓦

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第三方 主治膝關節強直

炭酸利多私

沃度加里 各五瓦

硝石 三瓦

清水 一瓦

右調勻製劑三個每服一劑日三次

重炭酸利多私

ヒカルボナス カリキ

每服十氏至二十氏、日數次為散、若溶劑、

○沸騰劑、以此塩十氏配酸八氏、

○方字

重炭酸利多私 十氏 酒石酸 八氏

右各別以水一弓溶解、臨用混和、乘沸騰嚥

硝石 ニトラス カリキヒ

每服六氏至二十氏、日數次、一日之量三氏、至六氏為溶劑尤良、或為散、

○第一方 明 主治痿麻質性關節焮衝、膀胱

焮衝、或淋疾、脚氣、水腫、

硝石 一氏 熱湯 十弓

蘆根 越幾 或屋施茂兒

右調勻、每一時服二食匕、

○第二方 急 主治水腫



硝石 一氏 湯爾托根煎 十二弓

蜂蜜 一弓

右調勻、每一時服二食匕、

○第三方 急 主治水腫

硝石 二氏 大黃 一氏

麻屈涅失亞 半氏 甘草末 半弓

右調勻為散、每服一卵匕、日三次、

○第四方 急 主治水腫

硝石 二氏 民埕列里精 一弓

海葱醋蜜 一弓 清水 二十弓

右調勻、每半時服一小盃、

○第五方 明 主治腦盪搖

硝石 一氏 吐酒石 一氏

老利兒水 二氏 水 十二弓

右調勻、每一時服二食匕、

○第六方明 主治頭痛心悸及膀胱嗽衝

硝石 一錢至二錢 老利兒水 一錢

清水 二十弓

右調勻每時服二食匕、

○第七方病 主治心臟病

硝石 二錢 菲沃斯越幾 十二瓜

渴爾托末 白糖 各半弓

右調勻為散每服一小匕、日四次、

○第八方病 主治脚氣

硝石 二錢 實芟荅利私葉 十五瓜

右以熱湯一廿浸出、每一時服二食匕、

○第九方病 主治痿麻質

硝石 一錢 木類煎 十六弓

右調勻每時服二食匕、

○第十方病 主治脾回嗽衝

硝石 二錢 吐酒石 一瓜

清水 十弓 甘硝石精 一錢

蒲公英越幾 一弓

右調勻、每一時服一小杯、

○第十一方病 主治水腫

硝石 半錢 甘硝石精 二錢

蘆根越幾 蒲公英越幾 各半弓

水 十弓

右調勻、每服一食匕、日三次、

外用

○方通 名硝石董法、主治喘息、

硝石 一弓

右以熱湯少許溶解、蘸厚紙乾之、臨發作時

取一片投炭火薰室內、

孕婦酒石 「シルヲス カリキス」
タルタルス トリオラニ

病歷入行

下劑日二錢至一弓為丸若溶劑。解凝劑。每服一刃至一錢為散丸若溶劑。

○方(朋)主治腹神經痛

孕岩酒石 昆私膠篤各半錢
大黃末 四十八 牛胆適宜

右研和為六十九每一時服三丸

格羅兒酸加里 コロラス カリト

一日之量一錢至二錢為溶劑若散。外用以一分溶解二十五分若三十分之水。

○第一方(朋)主治肺勞

格羅兒酸加里 一錢 清水 十二弓

右調勻每一時服二食匕。

○第二方(字)主治乳癌

格羅兒酸加里 五弓 稀塩酸 八滴至十五滴

鏡丁幾 八滴至十五滴

水 一弓

右調勻製劑三個每服一劑日三次。

○第三方(扇)主治咽喉癆

格羅兒酸加里 半錢至一錢

遇尔托根煎 十二弓 蜂蜜 一弓

右調勻每一時若每二時取二食匕含口內暫時間後嚥下。

外用

○第一方(扇)主治梅毒性咽喉癆

格羅兒酸加里 一錢至一錢半

淨水 十弓若十二弓

右調勻含嗽十五分時日六回

○第二方(字)主治子宮癆及梅毒性咽喉癆。

格羅兒酸加里 半錢至一錢

鐵丁幾 一錢 稀塩酸 一錢至三錢

病 經 檢 方 所

廿

日 新 亭 藏

水二十号

右調勻為注射劑若含嗽劑日三次

醋酸加里 アセタス カリキ

日服一錢至半号為溶劑小兒半錢至一錢

○第一方 透 主治水腫

醋酸加里 一錢 甘硝石精 二錢

水 八号 屋施茂兒 一号

右調勻每一時服二食匕

○第二方 守 主治倭麻質伊偃篤

醋酸加里 二十号 硝石 十号

沃度加里 五号 格兒失屈謨酒 十号

水 一号

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第三方 透 主治水腫

醋酸加里 一錢至 清水 八号

海葱醋蜜 一号 甘硝石精 一号

右調勻每一時服二食匕

酒石英 カリタルタリキム アシエ

每服一乃至一錢日數次為散九若溶劑

○第一方 透 主治股靜脈膨脹及水腫

酒石英 一錢 清水 一号

右製劑三個每服一劑日三次

○第二方 透 主治皮膚光血

酒石英 一号 大黃末 半錢

右調和為散每服一卵匕日三次

○第三方 守 主治腹水

酒石英 一錢 硝石 十号

右研和製劑三個每服一劑日三次

重碳酸曹達 トールホルホナス

每服六次至十二次一日之量一錢至二錢
為散若溶劑或為丸

○第一方朋越主治胃不化及第扶私

重碳酸曹達 一錢

右分四服每一時半一服

○第二方朋主治第扶私及胃病

重碳酸曹達 一錢 清水 十二馬

右調勻每一時服二食匕

○第三方朋越名沸騰散主治第扶私嘔吐吃

逆胃痛

重碳酸曹達 半錢 酒石酸 一刃

白糖 半錢

右研和分二服若三服取一服投冷水一盞

乘沸騰下

○第四方朋主治慢性痿麻

重碳酸曹達

亞刺比亞護護各一

酒石酸 十馬

清水 八馬

白糖 半馬

右調勻每一時服二食匕

○第五方朋主治胃痛及疝痛

重碳酸曹達 二錢 酒石酸 一錢

薄荷油 五滴 清水 十二馬

右調勻每一時服二食匕

○第六方越主治胃病及下腹充血

重碳酸曹達 半馬 健質亞那末 一錢

白糖 一馬

右調和為散每服一卵匕日三次

○第七方守主治胃弱

重碳酸曹達 十馬 格論僕丁幾 十滴至二十滴

健質亞那水 或格論僕 水一馬

右調勻製劑三個每服一劑、日三次、

○第八方越

重碳酸曹達 二錢 稀磷酸 一錢

水 十二馬 蜜 一馬

右調勻每一時服二食匕、

○第九方朋 主治下腹充血

重碳酸曹達 酒石酸 各半錢

過泥子油糖 四錢 番木鱉越幾 一錢至二錢

清水 十二馬

右調勻每一時服二食匕、

芒硝 チナトリウム シロース ホルミク スルフィ テ

下劑半馬至一馬、日數次為溶劑、○解凝劑

一日一錢至四錢、

○第一方滿 下劑

芒硝 一馬至一馬半

右以熱湯六馬溶解、二回若三四分服、

○第二方滿

芒硝 一馬 硝石 二錢

清水 十馬 蘆根越幾 一馬

右調勻每一時服二食匕、

○第三方朋 主治腦盪搖

芒硝 半馬 旃那葉 二錢

右以熱湯四馬浸漬瀘過、頓服、

○第四方滿 主治氣管支嫩衝

芒硝 半馬 過爾托根煎 十二馬

吐酒石 一馬 蜂蜜 一馬

右調勻每一時服二食匕、

外用

○方滿 名刺戟灌腸方

芒硝 亞麻仁油

蜂蜜 各一弓

水 十弓

右調勻

食鹽

ナトリウムコロラチム

唯供外用

○方湯

食塩

亞麻仁油

蜂蜜 各一弓

水 十弓

右調勻為灌腸劑

蓬砂

ナトリウムボラキチム

每服十氏至二十氏、日數次、為散若溶劑。

外用取一分溶解水十五分

○第一方湯 主治經閉

蓬砂 一弓

硫黃華 一弓

右研和為散、每服一卵匕、日三次、

○第二方湯 主治同前

蓬砂

硝石 各二弓

清水 十弓

蜂蜜 一弓

右調勻每服一匙、日六次、

○第三方湯 主治子宮堅塊

蓬砂 二弓

酒石英 二弓

右研和為散、每服一卵匙、日二三次、

外用

○第一方朋 主治小兒驚口瘡

蓬砂 半弓

蜂蜜 一弓

右混和、時々塗口内、後令嚥下、

○第二方朋 主治麻疹、及梅毒性咽瘍、

蓬砂 二弓

水 三弓

蜂蜜 一弓

右調勻頻々含嗽、

石鹼

ナトリウムペロソル

病經驗方府

卅二

每服十丸至二十丸為丸。外用一浴中取八羅度至十二羅度灌腸劑半羅度至一羅度。

○第一方 明 主治下腹充血
石鹼 大黃末 各一錢

牛胆適宜

右研和為六十九丸每服三九日三次。

○第二方 湯 主治歇以私的里
石鹼 格碌屈私

大黃末 阿魏 各半錢

右研和為六十九丸每服二九日三次。

外用

○方 湯 主治耳漏
石鹼 一錢 水 八錢

右調勻微溫注射耳內。

阿波的兒兒弗 サホ アロマ 年七又

外用

○第一方 湯 主治痿麻質痛
阿波的兒兒弗 一錢

右以毛布塗擦患部日一二次。

○第二方 明 主治梅毒性骨瘍
阿波的兒兒弗 半錢至一錢

常水 六錢

右調勻注射患部日三次。

○第三方 湯 主治痿麻質痛
阿波的兒兒弗 加耶普的油 各二錢

燒酒 三錢

右調勻塗擦患部日三次。

石炭水 アクワ カルキ

一日之量一馬半至二馬半漸加至四馬乳

汁和服

○方^(湯)主治血尿

石灰水

新鮮牛乳 各半瓶

右調勻每半時服一杯

外用

○方^(湯)主治湯火傷

石灰水

阿列布油 各等分

右以木棍攪和塗布患部

炭酸加爾基

蜘蛛石 カルホナスアルバ

每服十片至三十片、日數次為散若丸或飲

液和服

○第一方^(湯)主治骨軟化

炭酸加爾基 半片 格碌私 一匙

白糖 各半片

右為散每服一卵匕、日三次

○第二方^(湯)主治佝僂病

炭酸加爾基

磷酸加爾基 各半片

乳酸鉄 二匙

白糖 二片

右研和為散每服一卵匕、日四次

炭酸麻偃涅失亞

マダ子シアヒドリコ カルホニカ

每服十片至三十片、日數次為散最佳、小兒

取二三片乳汁一匙和服

○第一方^(湯)主治小兒酸敗液嘔吐吐乳

麻偃涅失亞 二十片 大黃末 十片至

右為散每服一小刀尖、日數次

○第二方^(湯)主治胃病

麻偃涅失亞 二匙 重碳酸曹達 二片

葯刺巴末 二匙

右為散每服一卵匕、日三四次

○第三方^(守)主治胃病

麻偃涅失亞 十片 硝酸毘私膠篤 五片

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

泻利塩 「シ」ル「フ」ス「マ」グ「チ」シ「」

三變至六變、日數次、為溶劑最佳、

○第一方 「瀉」 名苦水、主治便秘

泻利塩 一弓 清水 八弓

右調勻三回分服

○第二方 「下」 劑

泻利塩 一弓至 旃那浸 十弓

右調勻頓服、或二三回分服、

○第三方 「字」 主治精神錯乱

泻利塩 二變 稀硫酸 十滴

健質並那水 一弓

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第四方 「字」 主治半身不遂

泻利塩 一變半 稀硫酸 五滴

規尼 一弓 水 一弓

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第五方 「劑」 主治腸胃汚物

泻利塩 水 八弓 蘆根越幾 各一弓

右調勻、每一時服二食匕、

外用

○第一方 「字」

泻利塩 一弓 熱湯 十六弓

右為灌腸劑

○第二方 「字」

泻利塩 一弓 蓖麻油 一弓

右為灌腸劑

的列並油 半弓 石鹼水 十六弓

明答 「シ」ル「フ」ス「カ」リ「ユ」 ア「シ」ニ「キ」

病歴檢方 世五

每服六分至十二分一日之量半錢至一錢
為散丸若溶劑

○方_用主治慢性腸粘膜炎、潰瘍、遷延下痢

明卷_{一錢至二錢} 淨水_{十二分}

右調勻為含嗽劑、若注射劑

○第二方_用主治同前

明卷_{一錢} 沒藥_{一錢}

水_{十二分}

右調勻為含嗽劑

○第三方_用主治同前

明卷_{一錢} 屋施茂兒_{二錢}

水_{十二分}

右調勻為含嗽劑

○第四方_用主治同前

明卷_{一錢} 含電阿芙蓉液_{一錢}

水_{十二分}

右調勻為含嗽劑

第三半金屬成塩茶

硫黄華 シトル五ル デビコラ五ム

每服五分至十五分、下劑一錢至三錢、日數

次為散若紙劑。外用取一錢、和脂三錢若六錢、

○第一方_用主治皮疹、骨節痛、及痔疾

硫黄華 酒石英_{各半分}

大黃末_{一錢}

右研和為散、每服一卵匕、日三次

○第二方_用主治痔血閉塞、少腹充血

硫黄華 酒石英

大黃末_{各半分} 白糖_{一分}

蘆根越發斯_{半分}

右混和為紙劑、每服一茶匕、日三次

○第三方越主治痔疾下腹充血

硫黃華半

癒瘡木脂半

葯刺巴末二

蜂蜜三

右混和為皴劑每服一卵匕日三次

外用

○第一方局主治皮疹

硫黃華一至二

家猪脂一

右研和塗擦患部

○第二方朋主治疥癬

硫黃華一

炭酸剥多私半

家猪脂四

右混和

硫灰水 唯供外用

○第一方湯越主治疥癬及頑固諸皮疹

硫灰水適宜

右先施温浴後取此菜蘸粗糙毛布摩擦患部再入浴湯以石鹼洗去日一次

○第二方湯越主治同前

硫灰水一至一

水三

右混和用法同前

肝色硫黃

カビハ、シル、ニラ、ヒラ、ス、カリ、キ、ヒ

唯供外用以水十倍若二十倍溶解。軟膏以一錢和脂一錢若二錢。一浴中取三錢至五錢。

○方越主治皮疹

肝色硫黃一至二

石先以熱湯適宜煮而注浴湯。

沃寶下

カ、リ、コ、ト、オ、ヨ、ダ、ア、ル、コ、リ、カ、イ、ン、グ、エ、ラ、ヨ、ダ

每服五滴至十滴日三次葡萄酒若糖水服。此液十六滴中含沃寶一錢。

○第一方_朋 主治腺病及梅毒

沃實丁幾 一錢 燒酒 一勺

右調勻每服十滴至二十滴日三次

○第二方_朋 主治列布羅

沃實丁幾 一錢 水 二七

牛胆 二錢

右調勻每一時服二食匕

○第三方_朋 主治梅毒

沃實丁幾 一錢 癒瘡不煎 十二勺

右調勻每服二食匕日三四次

外用

○第一方_朋 越 主治水脉腺腫打撲後腫脹關節腫及腔內滲出液

沃實丁幾 一勺

右以毛筆塗擦患部

○第二方_朋 主治梅毒性諸腫

沃實丁幾 二錢 阿芙蓉液 一錢

右為塗擦劑

○第三方_朋 主治痿麻質及腺腫

沃實丁幾 硃砂精 各一勺

右調勻塗擦患部

○第四方_朋 主治骨瘍

沃實丁幾 一錢至二錢 沃度加里 一刃

清水 十二勺

右調勻注射患部

○第五方_朋 主治便毒

沃實丁幾 一刃 單膏 半勺

右混和貼患部

○第六方_朋 主治梅毒骨瘍

沃實丁幾 半錢 沃度加里 十勺

單膏一弓

右混和貼患部、日二次、

沃度利多斯 ヨドレム カリモシ ヨドロヨードス ホツタスシ

每服二氏若四氏漸加其量其法一日自十氏始每日增加二氏若三氏漸加至三十氏為溶劑小兒一日五氏至二十氏。外用取一及和脂半弓若一弓、

○第一方 明病 主治煤毒性骨病或佝僂質性關節病或腺病性諸患、瘰癧膿腫、

沃度利多斯 一弓 淨水 六弓

右調勻日服三食匕漸加至六食匕兒童日服二食匕漸加至四食匕、

○第二方 明 主治同前

沃度利多私 一弓 舍電阿芙蓉液 十五滴

淨水 六弓

右調勻用法同前、

○第三方 字 主治梅毒骨痛

沃度利多斯 五氏十五氏

健質亞那水 一弓

右調勻製劑三個每服一劑日三次、

○第四方 明 主治頑固佝僂質、

沃度利多斯 一弓 格爾失屈護丁 幾半

淨水 六弓

右調勻四日之量、

○第五方 毒 主治梅毒

沃度利多斯 一弓 淨水 六弓

白糖 半弓 薄荷油 四滴

右調勻朝夕各服一食匕、

○第六方 字

沃度利多斯 五氏 硝石 五氏

病 經 驗 方 詩

廿九

百新亭

淨水一弓

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第七方用主治梅毒

沃度利多斯六分

昇汞十二分

薩兒撒根煎一弓

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第八方用主治梅毒及佝麻質

沃度利多斯一刃一毫

梅毒煎二十弓

右調勻每服一茶碗日四次

○第九方用主治同前

沃度利多斯二毫

蒸餾水二弓

右調勻每服十五滴至二十滴日三次或朝

夕各服二十五滴至三十滴

○第十方用主治第二期梅毒

沃度利多斯五分至

格綸僕丁幾半毫

健膚亞那水一弓

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第十一方用主治膝關節強直

沃度利多斯五分

挖布兒散五分

蒲公英越藥適宜

右為丸製劑三個每服一劑日三次

外用

○第一方用主治梅毒性眼疾衝

沃度利多斯四分至蒸餾水一弓

右調勻以毛筆點眼中

○第二方用主治梅毒性眼疾衝角膜醫

沃度利多斯三分至蒸餾水一弓

全電阿芙蓉液十五滴半毫

右調勻以毛筆點眼中日二三次

○第三方痛 主治瘰癧及腺病性諸腫、

沃度利多私一刃至 家猪脂一弓

右混和塗擦或攤布片貼患部、

○第四方明 主治同前

沃度利多私十五至 沃實二五至

家猪脂一弓

右混和

○第五方明 主治眼焮衝湧乙溢、兼腫孔縮

小者、

沃度利多斯十五至 沃實二五至 蒸

荻若越幾一刃 家猪脂二弓

右研和、每夕取豆大塗擦眼圍、

蒲羅謨利篤亞斯カハロキヨムカリモシ

每服三反至十反、日數次為溶劑尤佳。○外

用取一刃至一匙、和脂一弓、

○第一方越 主治癩癧及肺勞

蒲羅謨利篤亞斯半弓一弓

清水十二弓

右調勻每服一食匕、日二次、

○第二方痛 主治同前

蒲羅謨利篤亞斯半弓

蒸餾水四弓

右調勻每服二十滴、日三次、

○第三方守 主治同前

蒲羅謨利篤亞斯五反新加

健負亞那水一弓

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第四方越 主治喘息

蒲羅謨利篤亞斯一弓

老利兒水二匙 水十二弓

病

星

右調勻每服一匕、日三次、

格羅兒水 アクリ コロラ

每服半錢至一錢一日之量一弓至二弓清

水溶解。外用以二倍若十倍之水溶解。

軟膏取一錢至二錢和脂一弓、

○方治主治第扶私

格羅兒水一弓 清水十二弓

右調勻納硝子壘、以黑紙覆之、每一時服二

食匕、

外用

○方治主治初生兒眼焮衝

格羅兒水十滴 苺苔莖十

蒸餾水四弓

格羅兒加爾基 ゴボコロリス カルキ

每服一匕至五匕、日數次、為溶劑例之、每

日取半錢至一錢溶解水六弓、加砂糖若舍

利別少許、每一時服二食匕、外用取一錢

以水一弓若五弓溶解、軟膏取半錢至二錢、

和脂一弓、

○方治主治慢性氣管支焮衝、及呼吸惡臭、

格羅兒加爾基一錢 白糖一弓

護護漿適宜

右調勻為錠分四十丸、每服二三丸、日三四

次、

外用

○第一方治主治結膜焮衝

格羅兒加爾基十五至

蒸餾水一弓

右溶和以紙瀘過、貯黑硝子壘、以毛筆點結

膜、

○第二方^朋 主治齒齦及口粘液膜潰瘍

格羅兒加爾基 十五至三十

蜂蜜 一

右混和貼患部

格羅兒加爾基水 シモオニ
ロラ子 ナトリ

每服四十滴至二錢尋常多供外用

○第一方^朋^越 主治下疳

格羅兒加爾基水 適宜

右洗患部或蘸撒系貼患部

○第二方^朋 主治痘瘡潰爛梅毒性潰瘍及下疳骨瘍

瘡骨瘍

格羅兒加爾基水 一三至六

淨水 十二

右調勻為洗劑若注射劑

○第三方^朋^越 主治下疳便毒

格羅兒加爾基水 四至六

幾那皮煎 十二

右調勻洗患部日五六次

第四 酸

稀硫酸 アソガム
シル
シリキ
ダイ

每服五滴至十滴或每日取一錢和飲液數

次分服

○第一方^越 主治頭部充血及咯血

稀硫酸 一

右每服十五滴至二十滴日三次糖水和服

○第二方^越 主治頭重頭痛眩暈

稀硫酸 半 水 二

蜂蜜 一

右調勻每服一茶匕日三次冷水和服

○第三方湯 主治心病及肺病咯血、
稀硫酸

老利兒水 各一弓

右調勻每服三十滴日數次

○第四方湯 主治心病

稀硫酸

甘硝石精 各一弓

右調勻每服二十滴至三十滴糖水和服

○第五方湯 各硫酸里沒奈堙主治第扶私咯

血

稀硫酸 半弓至一變

淨水 十二弓

舍利別 或蜂蜜 一弓

右調勻每時服二食匕、

○第六方湯 主治第扶私及脚氣

稀硫酸

亞刺比亞護謨末 各一

白糖 一弓

清水 十二弓

右調勻每時若每半時服一小盃、

○第七方湯 主治第扶私、肺勞及氣管支嫩衝、

稀硫酸 一變至二變

沙列布根煎 十二弓

蜂蜜 一弓或白糖 半弓

右調勻每時若每半時服一小杯、

外用

○第一方湯 主治結膜贅肉

純硫酸 半變

右以火頭毛筆點結膜之腫上、

○第二方湯 主治眼臉及結膜上海綿狀贅肉、

純硫酸 一弓

雜腹蘭末 十弓

右為泥硝子罨貯貼患部、

病經方所

四

新亭

○第三方^用主治扁桃腺炎

稀硫酸 二錢 清水 二廿

右調勻為含嗽劑

稀硝酸 「アシロム」 二錢 「トリキ」 二錢 「イロ」 二錢

每服十滴至十五滴或每日取一錢至二錢、粘滑飲劑若芳香飲劑和服

○第一方^湯主治萎黃病

稀硝酸 二錢

石每服二十滴日三次糖水和服

○第二方^湯主治頑固梅毒諸症及水銀毒

稀硝酸 半錢 清水 四錢

白糖 半錢

右調勻每服一茶匙冷水和服日三次

○第三方^守主治胃弱及肺結核

稀硝酸 十滴至十五滴 格綸僕水 或健貞亞那水 一錢

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第四方^守主治乳癌及肺癆

稀硝酸 十滴 格綸僕丁幾 半錢

健貞亞那水 一錢

右調勻製劑三個每服一劑日三次

外用

○第一方^越主治蝨蝕性下疳疼痛甚者

純硝酸 適宜

右以毛筆貼患部後置撒糸以潤布覆之

○第二方^湯主治梅毒性舌咽喉癆及齒齦潰爛

稀硝酸 二錢 遇尔托根煎 二十錢

右調勻為含嗽劑

○第三方^湯主治同前

稀硝酸 一錢 清水 二十錢

蜂蜜 一勺

石調勻為含嗽劑、

稀王水

アアシエム、レコロ、ニトロヒ

一日之量一刃半至一錢、○外用脚湯中
和三勺四勺至六勺、

○第一方越主治胃不和

稀王水 一勺

右每服十滴至十五滴、日三次、糖水和服、

○第二方越名王水里没奈埜、主治胃病不食、

稀王水 十五滴至
二刃

清水 十勺

蜂蜜 一勺

右調勻、每服一小杯、日三四次、

外用

○第一方滿主治煤毒性咽喉瘍

稀王水 三勺

清水 二十勺

右調勻為含嗽劑、

○第二方字主治同前

稀王水 三錢至
四錢

格羅尼酸加里 一錢

清水 二十勺

右調勻為含嗽劑、

稀鹽酸

アシエム、ヒトコロリキム、
ム、ヒ

每服十滴至十五滴、一日之量一錢至一錢
半粘滑飲劑若糖水和服

○第一方滿主治胃病或頑固梅毒性骨瘍及

膿腫、

稀鹽酸 一勺至
二勺

右每服二十滴二十五滴至三十滴、日三四
次、糖水和服、

○第二方越名塩酸里没奈埜、主治第扶私、

稀鹽酸 一錢

淨水 十二勺

病 經 方 所

吳

日新亭

舍利別或蜂蜜
一弓

右調勻、每一時服二食匕、

外用

○第一方湯 主治梅毒性咽喉癆、及舌疽、齒齦癆、

稀鹽酸一錢至二錢 蜂蜜一弓

右混和、貼患部、日四次、

○第二方湯 主治梅毒性咽喉癆、

稀鹽酸一錢至二錢 清水十二弓

蜂蜜一弓

右調勻為含嗽劑

○第三方湯 主治咽喉潰瘍

稀鹽酸三錢 格羅兒酸加里

銹丁幾各一錢 清水二十弓

右調勻為含嗽劑、

稀燐酸 アシダム アツヒ アツヒ アツヒ アツヒ アツヒ アツヒ アツヒ アツヒ アツヒ

每服十滴至二十滴、或每日取一錢至二錢、

清水苦味飲劑、若芳香飲劑和服、

○第一方湯 主治腦萎縮、及上肢麻痺、

稀燐酸一弓

右每服二十滴至二十五滴、日三次、

○第二方湯 主治腦病、精神錯亂、頭部充血、

稀燐酸半弓 茴香水二弓

蜂蜜或舍利別
一弓

右調勻、每服一茶匕、日三次、冷水和服、

○第三方明 石燐酸里沒奈煙、主治第扶私、及

腦蓋搖

稀燐酸一錢至二錢 清水十二弓

舍利別或蜂蜜
一弓

右調勻、每一時若半時、服二食匕、

○第四方湯 主治第扶私

稀燐酸 一匁至二匁
白糖 一匁

亞刺比亞護護末 二匁
清水 十二匁

右調勻每時若半時服二食匕

醋 アシロム アセチル

每服一匁至半匁以水稀釋或取一匁至二匁和水一廿加蜜。外用洗劑及蒸湯劑取一匁至二匁。純粹醋酸每服一滴至三滴一日之量半匁至一匁以水滴宜稀釋。

○方 主治熱性諸病

醋 半匁至一匁

蜂蜜 二匁

淨水 或米粥汁 十二匁

右調勻時々服一盃

外用

○方 主治第扶私

醋 二匁

水 十二匁

右蘸綿布若海綿擦全身日數次

屋施茂兒

オキシメル シムカレキ

一日之量二匁至四匁和水為飲劑

○方 主治諸熱症煩渴

屋施茂兒 二匁至四匁 清水 二十匁

右調勻時々服一盃

酒石酸

アシロム タルタリキ

每服十匁至二十匁日數次為散若溶劑

○第一方 主治第扶斯

酒石酸 一匁

白糖 一匁

右研和分四服每時取一服冷水和服

○第二方

名酸味里没奈埕 主治熱性諸症

及煩渴

酒石酸 一匁至二匁

清水 十二匁

舍利別或蜂蜜

右調勻每一時若每半時服一盃

○第三方明主治胃病

酒石酸

重碳酸曹達各半盃

清水十二勺

右調勻每一時服二食匕

第二綱 保固強壯藥

第一 純若味菜

括夫亞

リグニユ
コルテキス クワスシア

浸劑以一錢至二錢浸漬取五勺若八勺之液。酒劑以一錢至四錢浸漬斯巴尼酒一廿。越幾斯每服五勺至八勺一日之量一刃為丸若溶劑或紙劑

○方守主治胃弱

括夫亞

細判者

熱湯十二勺

右浸漬一時瀘過每服二食匕日三次

外用

○方越主治蟻虫

括夫亞

右水煎取三勺為灌腸劑

健質亞那

ラヂクス
ゲノライナ

末每服六勺至二十勺。煎劑每日取一錢至二錢。越幾斯每服五勺至十勺日數次為丸若溶劑。丁幾劑每服二十滴至半盃日數次

○第一方越主治胃不化不食

健質亞那末

重碳酸曹達

橙皮油

白糖

右研和為散每服一茶匕日三次

○第二方越 名健質亞那煎，主治胃病。

健質亞那一錢二分至三錢

右水煎取十二勺之液，每一時服二食匕，或每服一小盃，日三四次。

○第三方越 主治胃之諸症

健質亞那煎十二勺 重碳酸曹達一錢

右調勻，每一時服二食匕。

○第四方越 主治併私的里

健質亞那煎八勺 甘硝石精一錢至一錢半

舍利別一勺

右調勻，每一時服二食匕。

○第五方越 主治同前

健質亞那煎八勺 纈草丁一錢

右調勻，用法同前。

○第六方越 主治半身不遂。

健質亞那越幾斯半錢至一錢

水十二勺 舍電阿芙蓉液十六滴

甘硝石精一錢

右調勻，每一時服二食匕。

○第七方越 主治胃病

健質亞那越幾斯半勺

苗香水三勺

右調勻，每服二十滴，日三次，冷水和服。

○第八方越 主治胃痛

健質亞那越幾斯二錢 老利兒水半勺

舍電阿芙蓉液一錢 蒸餾水若苗香水一勺半

右調勻，每服二十滴，日三次，冷水和服。

○第九方越 主治胃病

健質亞那丁幾半勺

苗香水二勺

石混和每服一小卵匕日三次

第二 苦味含香罌油質菜

葛私加栗刺皮 コルテキス カスカリル

末每服十匕至二十匕。煎劑以三錢至六

錢煮取六勺若八勺之液。越幾刺每服五

匕一日之量半錢至一錢為溶劑若凡。丁

幾劑每服十滴至二十滴一日之量一錢至

二錢

○方 越 主治胃弱

葛斯加栗刺 半勺

石水煎取十勺加後味

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯 各半

石調勻每服一小盃日三次

橙皮 コルテキス アウラン テオリエ

浸劑及煎劑每日半勺至一勺。散末每服

半錢日三四次。越幾斯每服十匕至二十

匕一日之量一錢至二錢。丁幾劑十五滴

至二十滴

○方 圃 主治第扶私肺勞

幾那皮 六錢 橙皮 二錢

石水煎取十二勺加後味

苦酒二錢

石調勻每一時服二食匕

第三 苦味解凝菜

牛膽 五 夕ウリ

新鮮胆汁日一錢至三錢蒲萄酒骨喜若芳

香飲劑和服。煎熬者一日半錢至一錢為

丸料

○方 圃 主治胃不和

煎熬牛胆 一錢 大黃末 二錢

病 經 驗 方 詩 至 甲 新 書 載

右研和為六十九丸、每服六丸、日三四次、
大黃 引牙キヌ レ レ

下劑一刃至半、健胃劑每服二、三、三、
六、日數次、為散若丸。浸劑以二、至半
弓浸漬。取六弓之液、

○第一方 冊 主治眼炊衝

大黃 半

蘆會 二十

牛胆煎熬 適宜

右研和為三十九丸、隔日取十九丸頓服、

○第二方 冊 主治下腹充血

大黃末 半

吐根末 三

蘆會 十

煎熬牛胆

甘草末 各一

右研和為八十九丸、每服六丸、日三四次、

○第三方 字 名大黃丸

大黃末 三

蘆會 二

沒某 一

白石鱗 一

薄詩油 一

右研和為丸料

大黃舍利別

小兒每服一茶匕、大人半弓至一弓

○第一方 湯 小兒下痢

大黃舍利別 半

右每一時若一時半、服一茶匕、至得下、

○第二方 湯 主治皮疹

大黃舍利別 一 蒸餾水 二

安質沒扭酒 三十

右調勻、每服五滴、日三次、一歲兒服量、

○第三方 湯 主治腦水腫

大黃舍利別

苗香水 各一

薄苛油 三滴

右調勻每服一茶匕日三次一歲兒服量

○第六方滿主治疫咳

大黃舍利別

蘆根越戩斯 各半弓

清水 四弓

右調勻每三時服一匙布匕

大黃丁幾

每服二十滴至三十滴

○方選主治腹痛下血

大黃丁幾 一幾

舍電阿芙蓉液 半幾

鐵丁幾 二幾

清水 四弓

右調勻每時服一茶匕

蘆會 八口

強壯劑每服一匕至三匕日數次下劑六匕

至十匕數回連用為九最良。丁幾劑每服

十滴至十五滴日數次

○第一方朋主治常僻便秘

蘆會

大黃末

孕者酒石 各一幾

煎熬牛胆 適宜

右研和為百四十九每一時服六丸至得下

○第二方為主治下腹充血

蘆會

大黃末

石鹼 各一幾

右研和為六十九朝夕各服二丸

○第三方朋主治眼嫩衝及便秘

蘆會

藥刺巴末

大黃末 各一幾

煎熬牛胆 適耳

右研和為百二十九臨時取十五丸頓服

○第四方朋名下腹丸

蘆會

藥刺巴末

大黃末

孕養酒石

甘草末

煎熬牛胆 各二錢

右研和為五百丸、每服五九十九丸、至十五丸、尋常以十五丸、得滑便一二行、

〔第四〕 苦味含護謨及澱粉藥、

格綸僕根

コダキス コルムボ

煎劑取半勺、煮取五勺、若六勺之液。散劑每服十勺至二十勺。越幾劑每服六勺至十勺為丸。丁幾劑每服半錢至二錢

○第一方 越 主治胃病

格綸僕 一錢至二錢

右水煎取十勺、加稀塩酸半錢、每一時服二食勺、

○第二方 越 主治腸粘膜炎、衝及下痢、

格綸僕 二錢煎取十勺之液 老利兒水 一錢

橙皮舍利別 一勺

右調勻用法同前、

○第五方 越 主治同前

格綸僕 一錢水煎取八勺 舍電阿芙蓉液 三十滴

老利兒水 一錢

右調勻用法同前、

○第六方 守 主治胃病

格綸僕根末 重炭酸曹達 各十勺

大黃末 六錢至十錢

右為散製劑三個、每服一劑、日三次、

○第七方 守 主治同前

格綸僕根末 重炭酸曹達 各十勺

毘私繆馬 五勺

右為散製劑三個、每服一劑、日三次、

依蘭苔 一ヘン イスラン デイキ

以半至一馬煎取六馬若十二馬之液

○第一方朋名依蘭苦煎主治肺癆

依蘭苦半至一馬

右以水二十馬煮瀘過取十二馬之夜加白糖半馬或舍利別一馬或甘單膏半馬至二馬或蜂蜜一馬每一時服二食已

○第二方朋主治麻疹及氣管支喉衝

依蘭苦煎十二馬 硃砂一馬

苗香油五滴

右調勻用法同前

○第三方朋主治喉頭及氣管粘膜喉衝肺癆

咯血

依蘭苦煎十二馬 老利兒水一馬至二馬

菲沃斯戴幾六馬

右調勻用法同前

○第四方朋主治氣管支喉衝

依蘭苦煎十二馬 吐酒石一馬

老利兒水一馬

右調勻用法同前

○第五方朋主治肺癆

依蘭苦煎十二馬 稀硫酸三十滴

右調勻用法同前

○第六方朋主治同前

依蘭苦煎十二馬 老利兒水

硃砂各二馬

右調勻每服一小盃日三四次

○第七方朋主治同前

依蘭苦一馬 實芟荅利斯葉十馬

右水煎取十六馬每一時服二食已

第五 亞爾加里樣含韃素藥

院然馬... 幾那皮 「ルテキヌ ペルマアニ」

散劑每服十八至二十日數次配香竈
菜。煎劑以半弓至一弓煎取八弓若十二
弓之液。酒浸劑以末一弓浸漬葡萄酒一
廿每服一茶匕日二三次。越幾劑日半
至一錢強壯飲劑和服。丁幾劑十滴至二
十滴日數次。

○第一方 朋 名幾那皮煎主治第扶秘虎
狼痢脚氣咯血胃腸粘膜之慢性嫩衝及下
痢赤痢痘瘡

幾那皮 半弓六錢
至一弓

右水煎瀘過取十二弓之液每一時若每半
時服二食匕

○第二方 朋 主治同前

幾那皮煎 十二弓 幾那十錢 一錢

右調勻每一時服二食匕

○第三方 朋 主治同前

幾那皮煎 十二弓 苦酒 一錢或葡
萄酒四弓

右調勻用法同前

○第四方 朋 主治同前

幾那皮煎 十二弓 香竈酸丁幾 一錢或
香竈酒

二錢

右調勻用法如前

○第五方 朋 主治同前

幾那皮煎 十二弓 稀磷酸 一錢

右調勻用法如前

○第六方 朋 主治瘰癧及肺癆

幾那皮煎 十二弓 稀硫酸 一錢

蜂蜜 一弓 亞刺比亞末 二錢

右調勻用法如前

○第七方湯主治痘及第扶斯後膿腫、

幾那皮煎十弓 稀硫酸一錢

規尼十錢 蜂蜜一弓

右調勻用法如前、

○第八方湯主治梅毒性舌瘍及口內潰爛、

幾那皮煎十二弓 稀硝酸三十滴

蜂蜜一弓

右調勻用法同前、

○第九方朋主治肺勞

幾那皮煎十二弓 老利兒水二錢

右調勻用法如前、

○第十方朋主治遷延下痢及赤痢、

幾那皮煎十二弓 舍電阿芙蓉液十五滴

右調勻用法如前、

○第十一方朋主治虎狼痢

幾那皮煎十二弓 忽布滿鎮痛液二十

半錢 香竈酒或苦酒

右調勻用法如前、

○第十二方朋主治腸第扶私

幾那皮 速志根各半弓

右水煎取十二弓、每一時服二食匕、

○第十三方湯主治同前

幾那皮半弓至一弓 速志根半弓

右水煎取十二弓、加稀磷酸一錢、若甘硝石精二錢、每一時服二食匕、

○第十四方湯主治第扶斯末期、

幾那皮一弓 纈草根半弓

亞刺比亞末 甘硝石精各一錢

甘草膏半弓

右先取幾那皮煮之、次加纈草浸漬、瀘過取

十号之液加後三味每半時服一食匕

○第十五方朋 主治第扶私

幾那丁幾二号

清水十二号

右調勻每時服二食匕

外用

○第一方滿 主治下疳及梅毒性潰瘍

幾那皮細末適宜

右取少許撒敷患部日數次

○第二方滿 主治梅毒性潰瘍

幾那皮煎十二号

右為洗劑

○第三方滿 主治橫痃下疳

幾那皮煎十二号

格羅兒加爾基水六号

右調勻洗患部日五六次

○第四方朋 主治壞疽

幾那皮煎十号

沒菜丁幾一号

山萸菜精二号

右調勻為蒸湯劑

規尼涅

保固劑日三匕至六匕解熱劑尋常間歇熱

免熱時中每服一匕若三匕全日之量自六

匕至二十匕惡性間歇熱每服六匕若十二

匕全日至一匁為散丸若溶劑。外用皮下

抹菜法每次二匕至六匕加水丁寧研和。

皮下注入法每次取二匕

○第一方朋滿 主治第扶斯及諸熱症

規尼涅

六号十二号
及至廿号

甘草末或白糖
一匁

右研和分六服每時一服

○第二方滿 主治間歇性諸熱

規尼涅

六号八号
至十二号

白糖半匁

散

病經檢方符

五八

百新亭藏

右為一服方發熱前半時頓服

○第三方禹朋主治第扶斯虎狼痢及局処燠

衝

規尼涅六分至十二分

甘草二分至三分

甘草末十分

右研和分六服每一時一服或加蘆根越幾

斯適宜為二十四丸每一時服四丸

○第四方朋主治同前及脚氣肺勞下痢赤痢

規尼涅六分至十二分

莫爾非四分至一分至半分

甘草末十分

吐根二分

右研和分六服每一時一服或加蘆根越幾

斯適宜為二十四丸每一時服四丸

○第五方朋主治第扶斯

規尼涅十二分

龍腦二分至三分

莫爾非半分

甘草末十分

右研和分六服每一時一服

○第六方朋主治樓麻質

規尼涅十分

吐酒石

阿芙蓉各一分

吐根末二分

甘草末半錢

右研和分六服每一時一服

○第七方朋主治麻疹

規尼涅八分至十二分

菲沃斯越幾四分至六分

甘草二分至三分

甘草末十分

右研和分六服每一時一服或加蘆根越幾

適宜為十八丸每一時服三丸

○第八方朋主治虎狼痢第扶斯下痢赤痢

規尼涅十分至二十分

阿芙蓉末一分

甘草二分

甘草末十分

右研和分六服每一時一服或加蘆根越幾

適宜為二十四丸，每一時服四丸。

○第九方明主治重病後衰弱，謀毒骨節痛，骨傷間歇性腹痛。

規尼涅 三十八
格碌私 半錢至一錢

甘草末 半錢

右研和分十八服，日三服，或加蘆根越幾，若牛胆適宜為百二十九丸，每服五丸，日四次。

○第十方明主治頭痛

規尼涅 六分
孕卷酒石 十錢

大黃末 半錢

右研和分六服，每一時一服。

○第十一方明規尼丸，主治第扶斯、脚氣。

規尼涅
大黃末 各四錢

蘆根越幾 適宜

右研和為二百四十丸，一丸中含規尼一分。

丸

○用法日取十二丸至十八丸，每一時服二丸至三丸。

○第十二方明越氏規尼丸，主治諸熱病。

規尼涅 一錢
甘草末 半錢

蘆根越幾 適宜

右研和為六十九丸，每服二丸，日五次，或每服三丸，日四次，或每服四丸，日四次，五次至六次，熱發作前，盡之。

○第十三方明名規鐵加黃丸，主治第扶斯。

脚氣、腺病、萎黃病。

規尼涅 二十丸
格碌私

大黃末 各半錢至一錢
煎熬牛胆 或蒲公英 越幾 適宜

右研和為六十九丸，每服一丸至四丸，日四次。

○第十四方明主治第扶斯間歇熱，古列刺。

規尼涅 十二丸至十六丸
吐根末 二錢

病經驗方府

六十

臣新亭

甘汞 一分至二分

甘草末 十分

蘆根越幾 適宜

右研和為二十四丸、每一時服四丸、

○第十五方 明 主治第扶斯及肺勞

規尼涅 八分至十二分

金硫黃 三分至四分

菲沃斯越幾 六分

甘草末 十分

蘆根越幾 適宜

右研和為二十四丸、每一時服四丸、

○第十六方 明 主治第扶斯兼蛔虫者、

規尼涅

珊篤尼 各十二分

甘草末 十分

蘆根越幾 適宜

右研和為二十四丸、每一時服四丸、

○第十七方 明 主治第扶斯兼下利者、

規尼涅 八分

百菜煎 三十分

莫爾非 四分至一分

右研和為二十九丸、每半時服二丸、

○第十八方 明 主治肺勞

規尼涅 二十分

菲沃斯越幾 二十分

吐根 六分

甘草膏 一分

石研和為六十九丸、每服二丸、日三次、

○第十九方 明 主治肺勞、虎狼痢、

規尼 十分至十二分

莫爾非 四分至八分之一

昆斯繆篤 十五分至三十分

甘草末 十五分

蘆根越幾 適宜

右研和為二十四丸、每一時服四丸、

○第二十方 明 主治虎狼痢

規尼涅 十分

龍腦

吐根末 各二分

莫爾非 四分至一分

甘草末 十分

蘆根越幾 適宜

石研和為二十四丸、每一時服四丸、

○第二十一方明 主治裏急後重

規尼涅 大黃末

甘草末各十瓦 莫爾非半瓦

右研和為二十四丸，每一時服三丸。

○第廿二方明 主治下腹充血

規尼十二瓦 吐根末一瓦

甘草末十瓦 番木鱉越幾二瓦

右以蘆根越幾為十八丸，每一時服三丸。

○第廿三方明 主治脚氣

規尼涅二十瓦 格碌屈私

甘草末各十二瓦 番木鱉越幾三瓦

右以蘆根越幾為三十九丸，每一時服三丸。

○第廿四方守 主治肺勞

規尼涅一瓦 皓荅一瓦

大黃丸料二瓦

右為丸製劑三個，每服一劑，日三次。

○第廿五方明 名治虎狼痢水

規尼涅 忽布滿鎮痛液

舍電阿芙蓉液各一瓦

薄苛油十滴 清水二廿

右調勻，隨症每四分時或每半時或每一時服二食匕。

○第廿六方無題

名規尼水，主治第扶斯間歇熱、痢疾及諸熱症、梅毒性骨痛。

規尼涅十二瓦至二十瓦 稀硫酸二十滴至一瓦

亞刺比亞末二瓦 蜂蜜或白糖一瓦

淨水十瓦

右調勻，每半時或每一時或每二時服二食匕。

○第廿八方明 主治第扶斯

病經食方守

規尼涅 十五

稀硫酸 二十滴

水 八勺

右調勻用法同前

○第廿八方 明 主治肺勞

規尼涅 十五

稀硫酸 一錢

亞刺比亞末

老利兒水 各二錢

清水 十二勺

右調勻每半時服二食匕

○第廿九方 盛 主治下腹充血

規尼涅 十五

硃砂 一錢

稀硫酸 二十滴

甘草膏 半勺

清水 八勺

右調勻每時服二食匕

○第三十方 宜 主治脊髓神經軟化

規尼涅 十五

稀硫酸 八滴至十滴

鉄丁幾 十五至十五M

健膚亞那水 或常水

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第卅一方 滿 主治間歇熱

規尼涅 二十二至二十二M

稀硫酸 十二滴

橙皮舍利別 二勺

清水 四勺

右調勻免熱時間三回分服

第六 含鞣素植性收瀉菜

單寧酸 アシダハ タンニキハ

每服二氏至六氏或至二十氏日數次以舍利別若粘滑劑為溶劑或以白糖為散若丸

○外用軟膏取五氏至一十氏和脂一勺点

眼水及含嗽劑取三氏至二十氏溶鮮水一

勺

○第一方 通 主治崩漏

單寧酸 十五氏

乳糖 二錢

至半錢

右研和分十二服、每一時半一服、

○第二方選 主治下血

單寧酸 一錢

甘草末 半錢

右研和為六十九丸、每服二丸、日四次、

○第三方選 主治咯血

單寧酸 半錢

莫爾非 一錢

乳糖 半錢

右研和分十六服、日四服、

○第四方選 主治下利

單寧酸 半錢至一錢

阿芙蓉 三錢至四錢

甘草末 半錢

右研和分十六服、日四服、或為三十九丸、每服二丸、日三次、

外用

○第一方選 主治結膜弛緩、

單寧酸 二錢四錢至六錢

蒸餾水 半馬

右溶和瀝過、點眼中、日二三次、

○第二方選 主治痔漏

單寧酸 二十錢至半錢

蒸餾水 二馬

右溶和蘸撒、系掉入肛內

○第三方選 主治淋疾、白帶下、脫肛、及耳漏、

單寧酸 十五錢至一錢

清水 六馬

右調勻注射患處、

○第四方選 主治鼻痔、及白帶下、

單寧酸 一錢

亞爾笛兒 一錢

清水 二十馬

右調勻注射患部、

○第五方選 主治痔疾、脫肛、及煤毒性潰瘍、

單寧酸 一錢半至一錢

家猪脂 一馬

右混和塗擦患部、

○第六方通主治皮膚疹

單寧酸 二十分 舍電阿芙蓉液 半分

家猪脂 半分

右混和塗擦患部

刺荅尼根 ラヂキス ラタニ

煎劑以半勺煎取八勺液。越幾劑每服十

勺至二十勺一日之量一匙至二匙為丸若

溶劑。丁幾劑每服二十滴至四十滴一日

用一匙至三匙芳香浸劑和服。

○方通主治失巧兒陪苦性齒齲瘍

刺荅尼根一匙 山萸菜精

沒菜丁幾 各半分 清水 十勺

右調勻為含嗽劑

烏白烏爾失 「ハルバ カラ カル」

煎劑以半勺至一勺煎取八勺之液。散劑

每服十勺至二十勺。越幾劑每服十勺至

二十勺

○方通主治淋疾膀胱淋衝及肺勞

烏白烏爾失葉 實阿斯末葉 各半分

石水煎取十勺加舍利別一勺每一時若一

時半服二食匕

阿仙菜 カテヒ ヲルラ ヤポニ

每服十勺至二十勺日數次為散若丸或溶

解水若燒酒。丁幾劑每服二十滴至三十

滴

○第一方朋主治第扶斯下利

阿仙菜 半分 規尼涅 八勺

莫爾非 四分

右研和為二十九每半時服二丸

○第二方朋主治腸粘膜弛緩慢性下利

病經餘方符

阿仙菜 一錢 大黃末 十五分

規尼涅 二十分 番木鱉越幾 五分

甘草末 適宜

右研和為丸十九丸每服四丸至六丸日四次

○第三方 主治遷延下利

阿仙菜 一錢至二錢 亞刺比亞末 二錢

水 十二分 舍電阿芙蓉液 一兩至半

舍利別 一錢

右調勻每一時服二食匕

○第四方 主治同前

阿仙菜 一錢 亞刺比亞末 一錢

水 八分 舍電阿芙蓉液 半錢

薄荷油 三滴

右調勻每一時服二食匕

第七 鑛性保固菜

鐵粉 五ルルハ 五ルルヲ云ハ

每服一匕至三匕或至一刃日數次為散最

佳或為丸錠若紙劑

○方守

鐵粉 五分 桂皮末

幾那末 苗香末 各八分

右加牛胆適宜研和為丸

格碌私末兒秩斯 五ルルハ オキシダ云

每服五匕至十匕日數次為散若丸

○第一方 主治痿麻質毒骨痛白帶下胃

腸粘膜慢性灼衝

格碌私 一錢 白糖或山慈姑末

右研和為散每服一卵匕日三四次

○第二方 主治間歇熱及腹水

格碌私末 孕岩酒石 各一錢

甘草末 半勺 白糖 一勺

右研和為散每時服一卵匕

○第三方 通 主治同前及腺病、瘰癧、白帶下

格碌私末 一錢 規尼 十二錢至二十錢

白糖 或甘草末 一三

右研和為散每服一卵匕日四次

○第四方 明 主治蒼身病

格碌私末 葛私加栗刺末

大黃末 各一錢 蘆根 越幾 適宜

石研和為百丸每時服三九

○第五方 越 主治萎黃病

格碌私末 幾那皮末 各半勺

炭酸曹達 二錢 白糖 一三

右研和為散每服一茶匕日三次

拘椽酸鐵 シートラス 五ルリキ

每服二錢至六錢余為溶劑丸若塊

○第一方 越 主治脚氣

拘椽酸鐵 八錢十錢十五錢至二十錢 甘草末 一刃

右研和分六服每時一服

○第二方 越 主治貧血

拘椽酸鐵 十錢 健質亞那末 十五錢

白糖 適宜

右研和分六服每時一服

○第三方 越 主治間歇熱

拘椽酸鐵 二刃 規尼 二十錢

甘草末 半錢

右研和分十二服日六服

拘椽酸鐵規尼 シートラス キニキ 五ルリコ

每服五錢至六錢餘為丸若溶劑

○第一方 守 主治腺病

枸橼酸鐵規尼 四分 水一馬

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第二方 守

枸橼酸鐵規尼 二分

格綸僕丁幾 半馬 健質亞那水 一馬

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第三方 守 半身不遂

枸橼酸鐵規尼 四分

番木鱉越幾 半分 清水 一馬

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第四方 守

枸橼酸鐵規尼 三分 格綸僕末 三分

右研和為丸製劑三個、日服三劑、

○第五方 守 主治麻痺病、視力之弱、

枸橼酸鐵規尼 四分

番木鱉越幾 半分

右為丸製劑三個、每服一劑、日三次、

○第六方 守 主治半身不遂

枸橼酸鐵規尼 二分 至 三分

規尼 一分 至 二分

右為丸製劑三個、每服一劑、日三次、

○第七方 守 主治勞瘵

枸橼酸鐵規尼 三分 至 四分

規尼 一分 至 二分 菲沃斯越幾 六分

右為丸製劑三個、每服一劑、日三次、

硫酸鐵 五分 至 五分 至 五分

每服二分至六分、為散、紙劑若丸、軟膏取

一錢至三錢和脂一馬、

○第一方 守 主治精神錯亂及列布羅、

硫酸鐵 一分 規尼涅

蘆會各二錢

右為丸製劑三個、每服一劑、日三次、

○第二方（越）主治氣管支炎衝

硫酸鐵 一錢

苋蓉越幾 六錢

甘草末 十錢

右研和為六十九丸、每服二丸、日五次、

○第三方（宇）主治乳癌

硫酸鐵

規尼涅

皓荅各一錢

右為丸製劑三個、每服一劑、日三次、

○第四方（宇）主治神經痛、及內障眼、

硫酸鐵 一錢

泻利塩 一錢

稀硫酸 十滴

清水 一錢

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

○第五方（宇）主治癱瘓

硫酸鐵

規尼 各一錢

稀硫酸 十滴

泻利塩 二錢

清水 二錢

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

塩酸鉄液

コロレチ 五ルリキ ヲロムチ

每服十滴至二十滴、粘滑液和服、○外用含

嗽劑、取半錢和水一錢、若二錢止血注射方、

取半錢至一錢、和水一匕、

○第一方（湯）主治梅毒經久症、

塩酸鉄液 半錢

忽布滿鎮痛液 半錢

亜刺比亜水 十二

蜂蜜 一錢

右調勻、每一時服一匕、

○第二方（越）主治腸粘液膜炎衝、

格綸僕 一錢

右水煎取八錢、加後味、

鹽酸鐵液 二十滴
舍電阿芙蓉液 三十滴

右調勻每一時服二食匕

○第三方選 主治勞瘵下利

鹽酸鐵液 一匙
清水 十匙

右調勻

鹽酸鐵丁幾 「スヒリニス
ルリエーテレウス」

每服十滴至三十滴日數次葡萄酒若芳香
水和服

○第一方字

鐵丁幾 十五滴
健貞亞那水 一匙

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第二方字 主治心病

鐵丁幾 十滴
實艾答利丁幾 十滴

健貞亞那水 一匙

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第三方字 主治惡液瘡膿腫及膝關強直

鐵丁幾 十滴
稀鹽酸 十滴

規尼涅 一匙
清水 一匙或健貞亞那水

右調勻製劑三個每服一劑日三次

○第四方字

鐵丁幾
格輪僕丁幾

規尼涅 各二匙
稀鹽酸 一匙

右調勻每服四十滴日三次冷水和服

○第五方字 主治半身不遂

鐵丁幾 十M
稀鹽酸 十五M

清水 一匙

右調勻製劑三個每服一劑日三次

沃實鐵 「ゴロン
エム」

每服二氏至六氏溶解水若燒酎或為散若
丸○外用軟膏以一匙和指一匙若二匙

○方^第 主治腺病、瘰癧、癰腫及第二期梅毒。

沃實鐵 一錢 甘草末 一錢

亞刺比亞末 十錢

右研和為六十九丸、每服二丸、日三次、

沃實鐵舍利別 シリ、リ、ロ、ニ、ス、ヨ、テ、ヲ、

每服二十滴至一錢、冷水和服、

○第一方^湯 主治頑固梅毒諸症、腺病及瘰癧、麻痺、腦水腫、

沃鐵舍利別 二錢

右每服二十滴、日三次、小兒每服五滴、至十滴、日二三次、冷水和服、

○第二方^鐵 主治腦水腫

沃鐵舍利別 一錢 大黃舍利別 二錢

右調勻每服一卵匕、日三次

○第三方^鐵 主治鬱憂病

沃鐵舍利別 一錢 阿魏丁幾 一錢

老利兒水 半馬

右調勻每服二十滴、日三次、

鐵酒 「并ニム」 五ルラ五ム

每服一錢至四錢、

○方^第

鐵酒 半錢至一錢 清水 一馬

右調勻製劑三個、每服一劑、日三次、

剛鐵酒 「并ニム」 カレイベアムム

每服二十滴至一錢、日三次、水若飲劑和服

○第一方^湯 主治肺癆、脚氣、萎黃病及盆血諸症、

剛鐵酒 二馬

右每服二十滴、至二十五滴、日三次、

○第二方^湯 主治神經病

病 亞食方 七十一

剛鐵酒 二勺

甘硝石精 一勺

右調勻每服二十滴至三十滴、日三次、

○第三方越 主治列布羅

剛鐵酒 一勺

砒石液 一錢

右調勻每服二十滴、日三次、

○第四方越 主治肺勞

剛鐵酒

老利兒水 各半勺

舍電阿芙蓉液 二十滴

右調勻每服二十滴、日三次、

○第五方越 主治鬱憂病

剛鐵酒 一勺

續草丁幾 半勺

阿魏丁幾 二錢

右調勻每服二十滴、日三次、

神經鉄液

「イレクエラ 子ル舞」

每服二十滴至三十滴、日數次、

○方越 主治少腹神經叢知覺過敏、

神經鉄液

甘硝石精 各半勺

右調勻每服二十滴、日三次、

院總馬方庫

日新亭

本朝日新亭二十餘日三六

西江書局

