

卷
三十四
三十五



浙江圖書館

卷之二十四
婦人部



浙江圖書館

浙江圖書館

醫學綱目卷之三十四

婦人部

婦人通治法論

保婦人童女天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸既絕迺屬太陰經也治胎產之病從厥陰者是祖生化之原也厥陰與少陽相為表裡故治法無犯胃氣及上二焦為三焦也禁不可汗不可下不可利小便發汗同傷寒下早之証利大便則脈數而已動脾利小便則亡津液胃中枯燥制藥不犯此三禁則榮衛自和榮衛和則寒熱止外則和於榮衛內則調於清便先將此法為之初治次後評而論之見消息同壞証傷寒為之緩治或小便不利或大便秘結或積熱於腸胃之間或以成痿或散血氣



四物六合
婦人常用藥

而為浮腫蓋產理多門故同傷寒壞証如發渴而用白虎
氣弱而用黃芪血利而用川歸腹痛加之芍藥已上例証
不犯三禁不可拘也如產後熱入血室桃仁承氣抵當湯
之類是也胃堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人
多用烏金四物湯是不分四時之寒熱不分血氣之虛實
盲然一槩用藥如此而愈加增劇是醫誤之也大抵產病
天行則增損柴胡雜証則加減四物春夏從柴胡秋冬從
四物藥性寒熱病証虛實不可不察也四物湯常服餌四
時增損法具于后

四物湯加減治婦人雜病
四物湯方見治虛實法

春倍川芎 一曰春 二曰脉弦 三曰頭痛

夏倍芍藥 一曰夏 二曰脉洪 三曰泄

秋倍地黄 一曰秋 二曰脉瀼 三曰血虛

冬倍當歸 一曰冬 二曰脉沉 三曰寒不食

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合小腹痛

亦用 四物湯 四刀 玄胡 苦棟 各一刀 碎炒焦

若氣充經脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合

四物湯 四刀 芍藥 一刀

若腹中刺痛惡物不下加當歸 芍藥

若血虛心腹疔痛不可忍者去地黄加乾姜名四神湯

若血崩者加生地黄 蒲黃

若血藏虛冷崩中去血過多加膠 艾

若赤白帶宜香桂六合湯

四物湯四升

桂

香附各五升

若以四物湯為末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四

十九治高年婦人白帶良驗

若以四物湯四兩加甘少半兩蜜丸每兩分作八丸酒

醋共半盞溫湯同化下名當歸並去敗血生好血

若血積者四物湯內治加

廣茂

京三稜

桂

干漆各一升

若筋骨肢節痛及頭痛脈弦增寒如瘡宜治風六合

四物湯四升

羌活

防風各一升

若因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物

加二連湯

四物湯用生地

黃連

胡黃連

真者

溫飲清

若骨蒸加地骨皮

牡丹皮

若傷寒汗下後飲食減少虛者宜八物湯

四物湯

黃芪

甘草

茯苓

白朮各一兩

婦人百疾只四物湯加吳茱萸若陽虛少使茱萸賦
歲多使茱萸無不効者

右加減治雜証

若保胎氣令人有子四物典編四君子湯各半名八珍湯

若妊娘胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片又

加蒼白黃芪四物湯加減治妊娘傷寒名六合湯方

一十五道方見傷寒部

四物湯加減調經湯方七道見調經

右加減治胎前証

若產後一月內惡物積滯敗血作病或脹或疼胸膈脹
悶或苦寒熱四肢疼痛加玄胡沒藥白芷與四物等
分為細末淡醋湯或童便調下

若血風於產後乘虛苦作或產後傷風頭疼苦熱百節
骨痛加荆芥穗天麻香附石膏霍香各二分半四物
科共一兩中加之水煎服

若產後虛勞日久而脈浮疾宜柴胡四物湯

四物共四升 柴胡一分 人參 黃芩 甘草

四物共四升 柴胡八分 人參 黃芩 廿少
半夏 各三分 同煎

若產後諸証各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚效

右加減治產後諸証

官

海藏芎歸湯治一切去血過多眩暈悶絕傷胎去血產後
去血崩中去血接牙去血金瘡去血不止者舉頭欲倒
悉能治之

當歸 川芎 各等分 每服五升水煎服不拘時

若產後眩暈加芍藥 產後腹疼不可忍加官桂酒便合

若妊娘子死或不死胎動酒水合煎即下未死者即
若虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉一两生薑十

片水煎

若臨月服之則縮胎易生

若室女婦人心腹疼痛經水不調水薑服

若妊娠胎氣不安產後諸疾酒薑服

若難生倒橫子死腹中先用黑薑一大合炒熱水與小便合煎

若難產用百少霜香白芷童便好醋各一合沸湯浸服

甚者再服已分免矣

若腸風藏毒每服加槐花末半分三日取下血塊即愈

若吐血亦服此

若血氣上喘下腫空心薑艾湯調下

若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加薑汁

若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加薑汁

煎服

若產後頭痛加荊芥

若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘少一糸

沸湯點服

若有白帶者加芍藥半兩干姜等分米飲調下

虛勞

多執者大

聖地黃

有執者牡

丹參芥

保諸六合治婦人常病及產後常用之藥也治婦人虛勞

局中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無虛勞專

其養也中導藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨卧

食後是治有熱虛勞也

大聖散熟地黃丸人參荊芥散牡丹煎丸
並見局方然亦當參考藥味用之

丹媚人以血為主血屬陰陽於虛欠非善調攝者不能保

全也

禁忌

忌常服聚

寶丹

神仙聚寶丹治血海虛寒虛熱盜汗理宜補養琥珀之
煇射香散可以用乎而色痿黃肢體浮腫理宜導濕乳
香沒藥固可治血可以用乎胎前產後虛實不同逐敗
養新收補雜並積塊堅癥赤白崩漏宜於彼者必妨於
此而欲一方通治乎世人以其品貴名雅又喜其常服
可以安神去邪令人有子殊不知久服者无不弓禡自
非藏府能言鑿者終不知覺及至變生他病何嘗歸咎
此丹子姪女形色俱實遲於得子久得此丹癰潰於背
証候甚危脉散大而瀋急以四物湯加減百餘帖而愈

調經 經閉 血崩

丹經水或紫或黑論。經水者陰血也陰必從陽故其色

大法

經水或紫或黑論。經水者陰血也。陰必從陽故其色

紫黑為執

紅稟火色也。血為氣之配。氣執則熱。氣寒則寒。氣赤則
赤。氣降則降。氣凝則凝。氣滯則滯。氣清則清。氣濁則濁。
往、見之成塊者。氣之凝也。將行而痛者。氣之滯也。未
後作痛者。氣血俱虛也。色淡者亦虛也。錯經妄行者。氣
之亂也。紫者氣之執也。黑者執之甚也。人但見其紫者。
黑者作痛者。成塊者。率指為風冷而行。溫執之劑。禍不
旋踵矣。良由病原論。月水諸病。皆曰冷冷乘之。宜其相
習而成俗也。或曰黑北方水色也。紫淡於黑。非冷而何。
予曰。亢則害。承迺一制。執甚必薰化。所以執則紫甚。
則黑也。况婦人性執而見。鄙嗜欲加倍。藏府厥陽之火。
无日不起。非執而何。若夫冷風。必須外得。設或有之。

蓋千百而一二

海四物加黃芩黃連湯治經水如黑豆汁

四物四升黃芩三升黃連各一升

丹月經黑口渴倦怠形短色黑脉不勻似數

炒栝三升黃芩三升甘少二升赤芍二升香附二升

右為丸

永康胡八娘二十歲兩月經事不來忽然小腹痛有塊

血紫色

白芍藥二升白朮二升陳皮各半升黃芩二升川芎二升

木通各二升灸少升

何孺人氣滯血澁脉不清經不調或前或後紫色口苦

何孺人氣滯血凝脈不清經不調或前或後紫色口苦

兩大腿外廉麻木有時痒生瘡大便秘澀

麻子仁 桃仁皮尖 芍藥 二月 生枳殼

白朮 川芎頭 藏靈仙 訶子肉

生地黃 陳皮五分 大黃煨七分

各為末粥為丸

色淡為虛

丹溪云經水色淡者氣血俱虛也蓋八物湯之類八

物者四物四君子如兼他証隨証加減

兼脹者補

萎孺人年四十八日有白帶口渴月經多利者血黑色

中有通

復來血淡倦怠食少臍上急

白朮 五分 紅花 豆大 陳皮 系 木通 五分

苓 三分 砂仁 三分 灸少 三分 枳殼 五分

多為虛損

白芍 一斤

右煎湯下保和丸三十丸柳青丸二十丸

治四物加黃芩白朮湯治經水過多

用四物四兩黃芩白朮各二兩

丹經水過多

炒芩 一斤

炒芍 一斤

炒相 三斤

炒板 一斤

椿皮 七斤半

香附 二斤半

右為末酒糊丸

丹婦人十五脈弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來時

多稟此受弱氣不足攝血故行多

白朮 一斤半

生芪

陳皮 各一斤

人參 五斤

炙少三斤

少為虛澁

海四物加葵花湯治經水澁少

混少為血汚
色和為血虛

將行而痛
為滯

四物 四升 葵花 一升 一方加血見愁紅花

四物加熟地黄當歸湯治經水少而色和

四物 四升 熟芩 川歸 各二升

脈師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰
曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰止其津液
故令經水少設經下反多於前者當所苦困當言恐大
便難身無復汗也

海四物加玄棟 香柳湯治經事將行暗腹絞痛臨經痛
者血澁也

四物 四升 玄胡 苦棟 枳榔 木香 各一升

丹柳氣臨經之事時腹痛以四物加玄胡陳皮牡丹皮甘

草痛甚以豆淋酒痛少以童便者荜根入條苓為丸
經水將來而痛者桃仁香附黃連

周壁水煩人四十餘月經不調行時腹痛行後又有三
四日淋瀝皆穢水口渴面黃倦怠無力

白木二斤 歸身尾六斤 陳皮七斤 黃連三斤

木通二斤 生芪各一斤 黃芩各一斤 炙少一斤

分八貼五靈脂丸四十粒食前

仁十三孺人月經不勻血氣色紫束作痛倦怠要寒為
人性急

青皮五斤 川芎 黃芩 牡丹皮 茯苓各三斤

生薑一斤 炙少五斤

一婦人二十歲月經不勻來時先呵欠腹痛隱疼血紫色

食少無力

白朮一兩

黃連一分

陳皮一分

牡丹皮一分

木通一分

黃芩

人參

茱萸五分

炙甘草五分

分四貼水二盞煎取一盞食前

此桂枝桃仁湯治經候前腹痛不可忍

桂枝

芍藥

生芩各二兩

桃仁五十个

甘草一兩

右為粗末每服五合水二盞姜三片棗一枚同煎去

滓溫服

垣柴胡丁香湯治婦人年三十歲臨經預先臍腰痛甚則

腹中亦痛經宿三二日

柴胡 五分

羌活 五分

丁香 四分

燭 一斤

歸身 五分

生地 五分

生地 五分

丁香 四分

燭 一斤

右都作一服水四盞宜急一棧去查稍煎服會前

一婦人三十餘歲每目洗俗必用冷水淋通身又嘗

大驚遂患經來時必先少腹大痛口吐涎水然後經

行又吐水二日其病又直至六七日經止時方住百

藥不効予診其脈寸脈滑大而弦關及皆弦大急尺

小於關、小於寸所謂前大後小也遂用香附三兩

^{半夏} 蒼朮 黃芩 各一兩 枳實 延胡 牡丹皮 人參 川芎 枳 二兩

仁 各一兩 黃連 七錢 川棟 遠志 甘草 各半兩 白朮 一

仁各一升黃連七升川棟遠志甘草各半升白朮一

升桂三升茱萸升半分十五貼水煎入姜汁兩碗洗熱
服之後用熱湯洗浴得微汗西已忌當臥坐臥手足見
水并吃生冷服三十貼後全愈半年後目驚憂其病復
舉腰腹時痛小便淋疼心惕一跳驚悸予意其表已解
獨在裡先與灸少冲勞宮崑崙三陰交止悸定痛次用
批仁承氣大下之後用醋香附三升醋蓬朮當歸各
一升半醋三稜延胡枳醋大黃醋青皮青朮香薷滑
石木通悅仁各一升烏藥甘中蝮砂揆榔川芎揀用各
半升木香茱萸各二升分作二十貼入新取牛膝濕者
二分生薑五片用荷葉湯煎服漸安

丹經候過而作痛者延慮中有熱兩以作痛

行後高痛

怪成塊為帶

○新荷姐頭痛口乾任行後身痛腰尤甚

生地一分 川芎半分 白朮 芍藥各一分

犀身尾半分 炒柏 館炙出各三分

此治婦人月經壅滯每發心腹臍疼痛不可忍及此產後

惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死 琥珀散

三稜 義木 赤芍 牡丹 劉寄奴

乾熟地 官桂 菊花 蒲黃 當歸已上各一分淨

右前朱用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮

三爛為度焙乾入後五味同為末每服二分溫酒調

下空心食前服一升不用菊花蒲黃用烏藥玄胡亦

佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血

佳予家之秘方也 是尋常血氣痛只一服產後血

冲心二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此

藥易合宜多合以濟金 帶血者不宜

全大交加 治帶衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛血經諸

疾 聖皆治之 港都 令切

生薑 土西 生芩 一斤二 合製 白芍 當歸

延胡 醋昏裏煨 令熟布擦 桂心 各一西 紅花 凡惡血不用炒

沒藥 另研各半西 蒲黃 一西隔布炒

右將地黃汁炒生薑澤姜汁炒地黃澤冬精乾焙同

諸藥為細末每服三錢溫酒調下 若月經不依

常蘇木煎酒調下 若腰疼糖煎酒調下

丹治瘀血

香附醋炒

桃仁

丹皮

瓦龍子

二兩煨醋

大黃蒸熟

當歸一兩

川芎

紅花

右炊餅為丸

○交加地黄丸治婦人經不調血塊氣痞腰痛

生芩一斤

老姜一斤

延胡

當歸

川芎

芍藥各二兩

沒藥剉者

木香二兩

桃仁去皮尖

人參一兩半

香附半斤

右為末以生薑汁浸地黄查日乾以地黃汁浸生薑

查日乾皆以汁盡為度共十一味作一處日乾研為

末醋糊丸空心用姜湯下

大交加散始婦人葉衛來通經脈不調腹中掃痛氣多血

全交加散始婦人藥續經通絡不調腹中掃痛氣多血

少結聚為瘕產後中

生地 王西研取汁 生姜 王西研取汁

右交互用汁浸一宿各炒黃漬為度未之尋常腹

痛酒調下三升產後尤不可缺

丹益母中一名天結未結時采一椀以水五斗煎半乾去

渣再熬成膏每用少半盞和酒并姜汁放開服之大沒

汚血及月經不調

○經不及期者血熱四物加黃連主之

○肥人不及日數而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黃

連香附川芎作丸

婦人患經血紫黑一月兩次行不思食口乾苦時發熱

不及期者血熱

挾寒

過期者為

血虛

麥門冬 歸身 白芍 陳皮 白朮 冬兩 人參

地黃 茯苓 各半兩 木通 炙草 五分 生山 一兩

右分作十三貼食前熱飲下柳青共點各十五丸

仲帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散

主之 亦主陰癰腫疾

土瓜根 芍藥 桂枝 麋虫 各三分

右四味杵為散酒服方寸匕日三服

○ 經水過期血少川芎當歸人參白朮 共痰藥

○ 過期淡色多二陳皮湯加川芎當歸

○ 過期色紫有塊血熱必作痛四物加香附黃連

脈師曰寸口脈微而澀則衛氣不足澀則血氣無餘衛

三月一來為
氣血俱虛也
曰居怪

不足其息短其形燁血不足其形逆榮衛俱虛言語謬
誤跌陽脈浮而墻，則胃氣虛，則短氣咽燥而口苦
胃氣墻則失液少陰脈微而遲微則精無遲則陰中寒
墻則血不來此為居怪三月一來

師曰脈微血氣俱虛年少者已血也乳子下利為可否
則居怪三月一來此章當在前章之上

問曰婦人妊娠三月矣師脈之言此婦人非驅今月經
當下其脈何類何以別之師曰寸口脈衛厚而大榮又
而腸厚大而氣弱反弱則少血孤陽獨暍陰不能吸二
氣不停衛榮竭陰為積定陽為聚熱陽盛不開經絡
不足陰虛傷往一作實故令少血時發洒浙咽燥汗出

暴下為虛
熱

東斷有寒
執宜和

不調有寒
執宜和

或皮稠數多唾涎沫此今重虛津液世偏故知非軀

畜頰喘血月稟一任三月一來冷感則酒名曰唇任

謂石脈厚大左脈反弱也

海四物加黃芩湯治經水暴下

四物 四升 黃芩 一升

如服痛加黃連一升

○經水適來適斷或月往來寒熱者先服小柴胡以去其

寒熱然後以四物和之

本治血脈不調往來寒熱伏似勞倦

川芎

川芎

甘少

黃芪

桂

去粗皮已上各一升

熟地乾者

白朮半升

白芍二升

柴胡

阿膠

各半升

虛執不調
脈按空舉
強為陽脫

右為細末每服五分素二枚水一盞半煎至一盞宜
心溫服白湯服然亦可常服不生帶下調血脈養子
宮終身無病

恒升陽舉經陽 治經水不調右尺脈按之空虛是血虛

保脫大寒証輕手其脈數疾舉指弦緊或清皆陽脫之
証陰火亦已見越証於口鼻眼或渴或皆陰燥陽欲去
也當溫之降之升之燥之此法當大升氣血補命門之
下脫也諸言根近苗處去苗便是皮之下是下不至指也

柴胡根 桑寄生根 系 獨本 系 白朮 三升

紅花 半升 當歸根 系 桃仁 十升 去 川芎 一升

肉桂 五升 皮秋冬用 辛夏不用 細辛 六升 熟地 一升 人參 三升

白朮 半升 白芍 二升 柴胡 阿膠 各半升

白芍 半斤 防風 枳實 獨活 枳實 半斤 黃芪 五斤

黑附 炮製去皮 炙少 稍 不用稍細切

右為粗末每服二升水三盞煎法如常若病順當漸

漸加之至半又止空心稍熱服

^本婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛

者一類呼為經痛不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服

藥少得有效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行

經亦謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽

氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱作水沸溢故令

乍多在月前當則其陰陽調其血氣使無相乘以平為

期 紫石英丸

乍少乍多 或前或後為 相末

紫石英

禹餘糧

並燒醋淬

人參

龍骨

川烏炮

桑寄生

桂心

杜仲

遠志

澤瀉

五味子

當歸

石斛

乾姜

各四

由後容

川椒

牡蠣

甘草

各半升

為末煉蜜丸如桐子大每服三十九至五十九空心

食前下

圖

天癸過多

時為有餘

竹心丸 治婦人四十九歲以後天癸當住每月却行

或過多不止

黃芩心

枚條者二升用米醋浸七日乾又浸又炙如此九七度

為末醋糊丸如桐子大每服七十九温酒日下三次

食前下

本治煩人天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一月

再至腰腹疼痛素問云七損八益謂女子七數盡而經

不依時者血有餘也不可止之但令得依期不腰痛為

善宜此 當歸散

當歸

川芎

白芍

黃芩

枳殼一升

白朮半升

山茱萸

五升

為末每服二升酒調下空心食前日三服如冷去苓

加桂枝一升

脈問曰煩人年五十所以朝而清血二三日不止何以治

之師曰此婦人前絕生經水不下今反清血此為居經

不須治當自止經水不常五日下黃五日止愈

針灸

心術治月經不調

陰獨定三今此穴大効頃待經

東陽又法

肉蹠下白肉際青脈上灸隨年壯

集成又法

中極 三陰交 腎俞 氣海

心術經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者

興隆

六分止血也

石門五分斷之

婦人五旬經斷後復再行或多或少或頭或癢或紅並下腹

中氣喘如孕

天樞

中脘

氣海各五分愈

不須治當自止... 五日下... 愈

甲婦人漏下者血閉不通逆氣脹血海主之

女子胞中痛月以時休止千金作腹脹腸鳴氣上冲胃

小腹脹滿痛引陰中引月至則腰脊痛胞中瘕子門有

寒引臏解

水道主之千金云引臏解作大小便不通

經閉

丹血枯經閉四物湯加桃仁紅花陰虛經脈久不通小

便短澁身疼者四物加蒼朮牛膝陳皮生甘州作湯又

又用蒼朮丸加蒼朮酒芍藥為丸就前藥吞下

右母溪治血枯大法

經閉不行有三補前人之闕口婦人脾胃以虛形體羸

枯在中書

魚臏痛痞
嘔為血枯

經閉不行有三補前人之闕口婦人脾胃以虛刑體益

食消渴

枯在下大

小便秘澀

枯在上得

於勞心

弱氣血俱衰而致經血斷絕不行或病中消胃耗善食

而漸瘦弱有時而渴胃絕津液不生夫經者血脈津

液化而有笑津液既絕善食而瘦為耗所燥肌肉漸消

而瘦時見渴笑故血海枯竭病名曰血枯經絕宜鴻胃

之燥補益氣血經自行矣此証或通行有子不安為胎

病也此中焦胃或包脈使數躁作時見大便秘瀕小便

雖清不利而絕經水閉絕不行此延血海枯乾宜潤血

脈除胞絡中火邪而經自行矣此下焦胞或曰勞心

火上行月事不來者胞脈閉也胞脈者屬於心而絡包

中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補

血鴻火經自行矣此上焦心悲澤之夫人病寒耗月事

此上焦心

悲澤之夫人病寒耗月事

先降心火
後補血氣

不至者數年已加端軟鑿者卒以蛤蚧桂附投之曰石
然夫人病陰為陽所搏溫劑太過故無益反害投以涼
劑涼血和血藥則行矣已而果然

女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之
病當心脾有不得隱曲故女子不月其得為風消王註
云大腸胃熱也心脾受之心主血心病則血不流
脾主味脾病則谷不化味不化則精不足故其病不能
已虧則風邪勝而氣益消也又經曰月事不來者包
脉閉也包脉屬於心絡於心胞中令氣上迫肺心氣不
得下通故月事不來先服降火心之劑後服局方中五
補丸後以衛生湯治脾養血氣也

補丸後以衛生湯治解養血氣也

方局五補丸 補諸虛安五藏堅骨髓養精神

熟苜 人參 牛膝 白茯苓 地骨皮等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五丸温酒送

心下

衛生湯

當歸 白芍 各二兩 黃芪 三兩 甘草 一兩

右為粗末每服半兩水二盞煎至一盞空心温服虛

者加參一升右東垣潔古治血枯之法皆主於補血

瀉火也補血者四物之類瀉火者東垣公上中下故

火在中則善食消渴治盖調胃承氣之類火在下則

大小便秘澁冷盖玉燭之類玉燭者四物與調胃承

氣等分也。火在上則得於勞心，治蓋苓連及三和之類。三和者，四物、涼膈、當歸、等分也。紫石英、先服降心火之劑者，蓋亦苓連三和玉燭之類也。後服五補衛生者，亦補血氣之劑也。三公之志，合道同後世，孰可

素帝曰：有病眩脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭出。

清夜先唾血，四肢清目眩時，前後血病各何，何以得

之。岐伯曰：病各血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉

入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？

復以何術？岐伯曰：以四烏鯁一蘆茹二物併合之丸，以

雀卵大如小豆，以五丸為飯後飲，以鮑魚汁利腸中，腹

中論。○王註云：烏鯁，魚骨主血。閉。芦茹，主散。罌血，雀卵。主陰痿。鮑魚，主瘕。血。本草云：鮑魚，即鹽醃之魚。河間宣

下利經斷
者利止自
來

明論方身欬骨芩各等分雀卵不拘數丸和少豆大
每用服五丸至十丸鮑魚湯下食後日三服食壓之

右岐伯河間血枯之法

脈問曰煩人病下利而經水反斷者何也師曰但當止利
經自當下勿恠所以利不止而血斷者但下利止津液
故經斷利止津液復經當自下
問曰婦人病經水斷後一三月而反經來今脈反微濡
何也師曰此前月中若當下利故令好經利止月經當
自下此非軀也

婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自微寒
故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其必復下
仲婦人之病曰虛積冷陰氣為諸經水斷絕必有歷年血

有腹痛者

嘔為活血

老痰

寒積結胞門寒傷經絡疑結在上嘔吐涎唾久成肺癰
形体摸分在中盤結繞臍寒疝或及脇疼痛與臍相連
或結熱中痛在閔元脈數無瘡肌若魚鱗時着男子非
止女身在下未多經候不勻冷陰掣痛少腹惡寒或引
腰脊下根氣衝氣冲急痛膝胫痛頓奄忽眩胃伏如厥
癰或有憂慘傷悲多嗔山皆帶下非有鬼神久則羸瘦
脉虛多寒三十六病千變萬端審脉陰陽虛實緊弦行
其針藥以危得安其雜同病脉各異原于雷辯記也謂
不然

丹徑候過期不行杜生膝搗汁大半種以玄胡末了香
附枳壳末半冬早調服

腹腰疼痛

汚血在下
微者輕劑
重者重劑

全大 萬病丸 治婦人月經瘀閉月候不來繞臍痛及產後

血氣不調

乾凍

碎炒令一時火

牛膝

去苗酒浸一兩宿焙各一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥浸銀磁器內慢

火熬可丸即丸如梧桐子大每服二十九空心米飲

或溫酒下

療月木不刑臍下慙逆氣脹滿欲嘔不得睡慙伴列切

當歸四分 乾凍三分炒令烟尽

右為末煉蜜丸如桐子大空心溫酒下十五丸

治月經壅滯臍腹疼痛

當歸 玄胡索等分

右為粗末每服三分姜三片水一大盞煎至七分去

寧稍熱服

素云小腸移熱於大腸為伏瘕為沉王全註云凡血虧病傳不利則

月事沉帶
而不行

聖治婦人月水滯瀆不快通結成瘕硬筋脹大欲死用馬

鞭草苗根五斤鈞細小五斗並至一斗去查別於淨器

中熬成膏每食前溫酒調下半匙本草云馬鞭草味辛涼破血瘕

羅血極膏 治婦人乾血上榮

川大黃為末用醱醋熬成膏子丸如雞頭大每服

一丸熱酒化開臨卧溫服大便利一二行紅脈自

下血婦人仙藥也 加當歸尤妙

仲婦人經水不利下抵當湯主之亦以男子膀胱滿急有於血者方見傷寒

有熱者寒消

之

有寒者執
消之

右經一節方三首皆治汚血有熱而經閉前一方便輕
劑後二方重劑也

雲
紅花當歸散 治婦人不行或積瘀血腰腹痛及室
牛經候 月經不通

紅花 當歸 紫葳 牛膝 甘草

白芷 桂心 各二兩半 赤芍 九兩 劉寄奴 五兩 蘇木 剉細三兩

右為細末空心熱酒調三升服之午前臨卧再服

若久血不行濃煎紅花酒調下驗有孕者禁之

牛膝散 治婦人月水不利臍腹痛

牛膝 一兩 桂心 赤芍 桃仁 延胡

當歸 牡丹皮 川芎 木香 各七分半

右每服方寸七為極細末酒調下食前

溫經湯 若經過不通繞臍寒痛脈沉緊宜此及桂枝

桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

莪朮

各半兩

人參

甘草

牛膝

各一兩

右每服五升小並服

桂枝桃仁湯方見調經各注

牡丹皮湯

治婦人月小

不調臍腹疼痛

牡丹皮

大黃

各一兩

赤茯苓

生地

桃仁

當歸

桂心

赤芍藥

白朮

各七

石常

去毛

木香

各半兩

右每服五片姜三片空心水煎服

本治婦人室女月候不通或疼痛或成血瘕宜通經丸

桂心 青皮去白 大黃炮 干姜 川芎 枳

莪朮 川烏 干漆 當歸 桃仁 各等分

右為末取末一升分四丸用米醋熬成膏和餘下六

錢乾末成劑曰中杵柔膩丸如桐子大眼乾每服二

十九丸用淡醋湯下至三十九丸止温酒亦得空心食前

服

右方六首皆治汚血寒而經閉前四方輕劑後二方

重劑

全大治月水不通屢試有驗厚朴不以多少姜汁炙香細切

居嘔效寒

批者痰結

在上

舟後輕利消

痰降火

懷煎去滓空心服不過三四劑瘕形實氣盛者宜之

丹積痰傷經不行夜則長語

瓜蒌仁 五
黃連 半升
吳茱 一粒
批仁 五斤

紅曲 半升
砂仁 三升
書麻 查末

右生姜研炒餅為丸

軀脂滿經閉

二陳湯加芎藭連不可服地黃如用生姜汁炒內二陳

加並枳實黃連
各導痰湯

楊村婦人廿餘歲二年經閉食少乏力

黃連 二升
白朮 一升
陳皮 一升
滑石 一升
黃芩 半升

木通 三分
批仁 十二斤
炙廿升

右丹溪治痰結胸腹而經閉之法皆用輕劑導痰降
火也經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來
今用連朴之類導痰降火使不上迫於肺故心氣不
通而月事未來也又丹溪治一婦人久瘡食少經閉
兩手魚脈每日與三衣神佑丸二十餘粒津咽之月
餘食進脈出又半月瘡愈又一月經行亦此意也詳
見久瘡予嘗体丹溪之意治陳氏婦二十餘歲形肥
痞塞不食每日臥至未牌吃一盞薄粥後必吐水半
椀仍復臥經不通三月矣前番通時黑色脈亦牌寸
滑有力午後閉滑寸不滑詢之曰乘怒飲食而然遂
以白朮一兩半厚朴黃連枳實各一兩半夏在卷陳

子和重劑
歸度下積

皮山查人參活石各一分砂仁香附桃仁各半丹紅
花二分分作十帖每日服一帖各入姜汁丹規壳間
三日以神佑丸神祕沉香丸微下之至十二日吐出
食漸進四十日平復如故又汪氏婦人五十餘形
瘦亦痞不食吐水經不通以前藥方參朮歸為君煎
熱入竹瀝半盞姜汁服但不用神佑丸下之亦平復
或咳嗽寒熱而經閉者當於欬則濕痰條求之

子凡婦人月事不行可用茶調散吐之次用玉燭散芎歸
湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食
分陰陽利水道之藥是也

一婦人月事不行寒熱往來口乾頰赤喜飲旦暮間欬

一婦人月事不行寒熱往來心乾煩赤喜飲且暮間欲
一二声諸醫皆用虫虫水經乾涸芫青紅娘子沒藥血
竭之類戴人不然曰古方多有此法柰病人服之必臍
腹若痛飲食不進運命止藥飲食稍進內經曰二陽之
病若心脾心受之則血不流故女子不月既心受積熱
宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食運滂出一二升下世
水五六行濕水上下皆去血氣自然端流月事不為水
濕所隔自依期而至矣亦不用虫虫水經之類有毒之
藥如用之則月經從來小溲反閉他証生矣凡精血不
足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而成天閼一婦
人年三十四歲

赤時欵三四声向者所服之藥里神散烏金丸四物湯

頰

歲府肺

心胃

雜方

燒肝散 薑甲散 建中湯 寧肺散 針灸百千轉 劇家人意
 倦不欲求 治戴人憫之 先湧痰五六升 午前涌畢 午後
 食進 餘症悉除 後三日復輕 涌之又去痰一二升 食益
 進不數日 又不通 經散 瀉乾一二升 後數日去死皮數
 重小者如麩皮片 大者如蒂膜 不一月經水行 神氣大
 康矣

月事不來者 胞脉閉也 胞脉者 屬心而絡於胞中 令
 氣上迫肺 心氣不得下通 故月事不來也 腫文見水
 見診傳息奔条中

大
 治室女月水不通

雄鼠屎一丸 燒存性 為細末 空心溫酒調下 子神効

桂鼠屎一升燒存性為細末空心溫酒調下及神効

^口海
藏掌中金丸 治婦人乾血氣

川山甲炮 甘少 苦丁香 川椒 苦葶藶

白附子 草烏 猪牙皂角 各三分 巴豆一分全用研

右通為細末 生姜絞汁和丸 彈子大 每用一丸 新綿

包之內 陰中一日即白 三日即赤 三日即血 神効

神婦人經小閉不利 藏堅癰不止 中有乾血下白物 礬石

丸主之

礬石 燒三分 杏仁一分

右二味末之 煉蜜和丸 黍核大 內臟中 剔者再納之

心絡脈不通 已有寒熱 此穴大効

陰交 三分 立有神効 如瘕時乃經脈要通也

針灸

摘英 經脈不通 心術同

曲池 支溝 三里 三陰交

此四穴漏瀆不通則
瀉之如虛耗不行則補之

集成 或月經斷絕

中極 三陰交 腎俞 合谷

東陽 又法

四滿 在丹田旁一寸半

心術 經脈不通 變成癭症 飲食如常 腹漸大如盤

氣海 其用通管去
陰交 其法亦如上

甲月 水不通 奔氣上下 引腰脊痛 氣穴主之

女子 不下月水 照海主之

婦人 少腹堅痛 月水不通 帶脈主之

診

辟年徑閉

傳為息奔
若死

大法

月水不利見血而有身則敗及乳腫臨泣主之

脈師曰有一婦人特一女子年十五所來向診言女子十

四時徑水自下今經及斷其母言恐怖師曰若是夫人

親女必夫人年十四時亦以徑水下所以斷此為辟年

勿怪後當自下

右腎脈微瀼為不月沉痔全文見虛實法

二陽之病若心脾有不得隱曲女子不月其傳為息

奔者死不治全文見診病不更条

血崩如血崩並心痛者見心痛門

丹紫色成塊者血熱四物加黃連之類

氣虛血虛者皆於四物加參芪

虛實

或腹滿或腹痛或臍上痛者痰氣汚血宜行之

○急則治其標白芷湯調百草霜甚者搜櫚灰用四物加炒乾姜調理曰勞者用人參帶升補藥曰熱者用黃芩曰寒者用乾姜

○丹溪云涎鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非開足不立以行氣非氣升則血不能歸隧道此說論血泄之義甚明蓋開胸膈促則清氣升清氣升則血歸隧道不崩矣故其症或腹滿如孕或臍腹疼痛或血結成片或血出則快止則悶或臍上動其治法開結痰行滯氣消汚血是也

○丹丘氏婦年三十五六歲墮胎後血不止食少中滿倦怠不起躁煩六脈沉大而數重取微弦予作怒氣傷肝感

不越躁煩六脈沉大而數重下微強予作急氣傷肝感
勸胃益遂於二陳湯加川芎白朮縮砂二十帖而安

仲旋復花湯 治婦人半產漏下脉弦而大

旋復花 三所本草云主留飲結氣 芫十四莖 新絳少許

右三味以小三升煮取一升頓服之

千金治婦人崩中下血不止以衣中白魚疆蚕等分為末

以井花水服之日三服差

右三方開疾

羅備金散 治婦人血崩不止

香附子 四兩炒 當歸尾 二兩 五靈脂 一兩炒

右為末極細每服秤五升醋調空心服立效

本事治下血不止或成五色崩漏方

用香附子春去皮毛中斷之畧炒為末每服二分用
清米飲調下此方徐朝奉傳其內人有五疝服偏藥
不効後獲此方遂愈頃以服為佳亦心產後腹痛大
是婦人仙藥常服益氣調血

○女醋附丸 治崩漏帶下積聚癥瘕疔瘕疝痛

用香附子不以多少擦去毛用好醋煮出焙乾碾為末
醋煮糊為丸梧子大每服三十丸米飲送下無時婦人
數隨胎者此藥尤妙一方用香附子白芷為丸

縮砂散 治血崩

砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米飲調下三分

○右四方行帶氣

傳世治血崩用乾荷葉濃煎湯一碗空心服之立愈或調醋

炒香附炭末尤妙

雲治血崩不止用五灵脂二外炒熟加當歸酒同煎或水

酒童便各半盞同煎服一方五灵脂半生半熟為末酒

調服一方以煎五灵脂半乾去滓澄清再煎成膏入神

曲末為丸桐子大空心酒下二三十丸便止

又方 鹿茸 酥炙 當歸 各二錢 蒲黃 炒半兩

右三味為末酒調下五錢七日三服

仲桂枝茯苓丸 治婦人有瘕在臍上動血不止 方見胎動下血

右四方消瘀活血

垣當歸芍藥湯 治婦人經脈漏下不止其色鮮紅值六

氣短自汗必食
無力者脾虛
宜補之

七月處暑之間先因勞後脾胃虛弱氣短汗不止
身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食况因懶倦四
肢無力大便時瀉後復心氣不足其經脈再下不止惟
覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短
則不辨言是無功言水懶語也

黃芪

白朮

蒼朮

當歸身

白芍藥各五

炙甘草

熟地

柴胡

陳皮

乾生地

右十味為粗末作二服水二盞半煎至一盞去滓

服空心服後漸減次日諸症悉去頓喜飲食所以者
何蓋天氣通而開飲食之香得平康故也

仲婦人陷經漏下黑不解膠姜湯主之
林隱云即芎歸膠

芎歸膠艾湯

芎藭 阿膠 甘草 各二兩 艾葉 當歸 各二兩

芍藥 四兩 乾地黄

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去渣內膠
令消盡溫服一升日三服不差更作一云加干姜二兩胡冷燈婦人胞動無干姜

海四物膠艾湯 方見婦人部大法條中

~~厚~~益胃升陽湯 治婦血脫去益氣 古人之法也先補胃

氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先務世皆以
為補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故埋胃
氣人之月兩穀為實

黃芪三分 人參去尾五分 炙甘草 升麻五分

柴胡半分 白朮五分 當歸五分 芍藥五分 麩子半分 炒黃

陳皮五分 生薑一分 芎藭五分 一方用地黃

右為粗末每服秤三分或五分如食添再加之食減

已定二分重更加之不可多服每服二分水二錢煎

至一盞去渣熱服如腹痛每服加白芍藥二分去皮

中桂少許如渴口乾加乾葛二分如嗽去人參不計

時候盡先此益胃升陽 人參不止却那

○宣德侯經歷家人病崩漏瘵莫能効切脈之後且以紙

書其証至四十餘種為劑調經升陽陽除濕湯療之明

日十減其八前後六七日良愈侯謝而去調經升陽除

或脈沉細或沉
生或久偏者氣
隨宜升舉之

日十歲廿八前後六七日良愈候謝而去調經升陽除

濕陽治女子漏下惡血月事不調或暴崩多下亦漿之
物皆內飲食不節勞傷形体或素心氣不足目飲食勞
倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜料四肢不收困倦乏
力無氣已動氣短上氣逆急上中其脈緩而弦急按之
洪大者皆中指下得之此但有之皆脾受邪也脾主滋
榮周身者也心主血、主脈上者受邪皆病在脈、者
血之府也脈者人之神也心不主令胞絡代之故曰心
之脈主屬心系者包絡命門之脈也至月事生孕皆由
脾胃虛而心乘之故漏下月事不調也既脾胃為陰陽
之根蒂也當除濕去熱益冷氣氣上伸以勝其濕又云大
熱則萎之

柴胡根子 羌活根子 防风子 獨活子

募荆子七 炙甘草子 蒼朮子 藁本子

當歸子 黃芪子 升麻子

右吹咀如麻豆大勿令作末都作一服淨漿新水五

大盞立去一盞去滓稍熱服宜心腹中無宿食服藥

畢待少時以早饑壓之可一服而已如矣於之太陰

脾經中血海穴二七壯或三七壯立已此藥延得權

衡之藥法用冷勝濕為胃氣下陷而退迫於下以故

其血之暴也崩漏含血惡之物主經病雖除後必須

以黃芪甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升

陽陽中加之以和血藥是也若經血氣惡物下之不

陽陽中加之以和血藥是也若修血氣惡物下之不
絕尤宜究其根原只益脾胃過心火之亢迺治其增
流根蒂也若遇夏月白帶下寒漏不止宜調經升陽
湯以止之

柴胡調經湯 治經水不止鮮紅頰赤急眩痛脊骨強
痛不思飲食

羌活 枳 一分 独活 半份 葉本 半份 蒼朮 一分

柴胡 七分 升麻 半份 葛根 三分 當歸 三分

炙草 三分 紅花 少許

右以咀作一服小四大盞並至一瓊去渣拭熱空心
服取微汗立止 一婦人經候黑血凝結成塊左麻
有血痕由嗎不止穀有時化有時不化至今歲四月

血塊暴下并水注俱作是前後二陰有形血脫竭於
目下今終候猶不調水瀉日見三兩行食罷心煩不
快飲食減少至甚瘦弱東垣先生曰夫聖人之治病
必本四時升降浮沉之理權變之宜若不本四時以
順為逆且治之大法必先歲氣無伐天味無盛一無
虛、而遺人天殃無致邪無失正絕人長命故聖人
曰陰盛陽虛汗之則愈下之則死陰虛陽盛下之則
愈汗之則死大抵聖人治法且如升陽或發汗之劑
量助春夏之陽言令其上升通瀉秋冬之收藏須殺
寒涼之氣也此病是也當用此法治之升降浮沉之
至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治冬病

逆之則殺人故經曰順天理之氣則昌逆之則已可

逆之則殺人故經曰順天理之氣則昌違之則已可
不畏哉夫人之身亦稟天地四時之氣不可止思在
外人体亦同天地也今經瀉是前陰之氣血已下脫
笑取瀉又數年不愈是後之氣血下陷已脫笑後陰
者主有形之物也前氣陰陽之戶俱下脫竭是病人
周身之氣常行秋冬之令豈不知陰主殺此等收藏
之病是也又不知陽生陰長春夏是也在人身之中
令氣升浮者穀氣上行是也既病人周身血氣皆不
生長穀氣又不勝者肌肉消少是兩儀之氣俱將絕
矣既下元二陰俱脫血氣當竭假令當日元是熱証
今下焦多脫化為寒矣此病久沉久降寒濕大勝當

急救之瀉寒以熱除濕以燥大升大舉以助長生補
養血氣不致偏枯聖治之法既濕氣大勝以勝治之
助甲風木上升是也故經云風濕是以勝相欺也當
先調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如
其不止故後用風藥故以風勝濕此之謂也此藥助
大舉大勝以助春夏而勝濕久隔下之至治也又一
本云次用四物隨證加減

鈇獨聖散

治婦人血崩不止

用防風去叉茅不以多少為細末酒煮白麩清調下二
分空心食前日二服更以麩作糊酒投之極驗
治血崩夏枯草為細末每服二分米飲調下無時候

治血崩夏枯草為細末每服二升米飲調下無時候

千金治崩中晝夜不止芎藭八升清酒五升半分三服不耐

者徐一進之衍義云芎不可久服多之然又不可察

右大升大舉之劑治崩脈沉弦而洪或沉細而數者

皆胃氣下陷也或崩而又瀉者亦胃氣下陷也故舉

之升之其病愈也

垣經水漏不止有三補前人之關

婦人脾胃虛損致命心脈沉細而數疾或沉緊弦而洪

大有力寸澗亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火合

濕熱下迫經漏不止其色紫黑其臭腐如夏月腐肉之

臭中有白帶者脈必弦細寒作於中有赤帶者是脈洪

數疾之熱見矣必腰痛或臍下痛臨經欲行而先發寒

東垣補前

缺有三

脾胃虛補

心虛宜戒宜
勸

熱往來兩脇急縮云云。蓋脾胃症出見或四肢困熱心
煩夜臥不安不得卧心下急宜大補脾胃而升降血氣
可一服而愈或先責而後賤或勢虧人事疎遠或先富
後貧心氣不足其火熾太旺於血脉之中又致脾胃飲
食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病也
不行於脉故脾胃飲食不調其証顯矣而徑水不時而
下或過來遠斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令
拒死而心下不動以大補氣血之藥奉養脾胃微加鎮
墜心火之藥治其心可一服而徑止矣一說大補氣血
治其心補陰馮陽徑自止矣宜黃芪當歸人參 丁朱
年十一月間郭大方來訪說其妻經水暴崩先曾損身

年十一月間郭大方來訪說其妻經水暴崩先曾損身
失血自然一次經數十日而來今次不止其人性窄性
急多驚以予料之必曰心氣不足飲食失節得之大方
曰無到彼診得掌中寒脈沉細而緩間而沉數九竅微
有不利四支無力上喘氣短氣促口鼻氣皆不調果有
心氣不足飲食失節脾胃虛弱之証胃脘當心而痛兩
脇下急縮有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難諸虛
証極多不能悉錄擬以先治本餘証可以皆去其安心
定遂其驚調和脾胃大益元氣補其血脈令養心神以
大熱之劑去冬寒之疑在皮膚內少加生地黃去命門
相火不令四支痿弱

黃芪人參湯

黃芪 人參 各五分 當歸 五分 陳皮 半分

草豆蔻 七各 炒麴 半外消食 去脾胃寒 黃連 一分 鎮心驚

杏仁 五片 研如泥 麻黃 表開 不吉節 桂枝 半外 必先煎三

生苾 三分 去腎下火 及冬日相火氣旺

右為粗末 以三大盞 煮麻黃 數沸 去滓 入前藥 同

煎 至一大盞 於巳午之前 食消 尽服之 則止 其胃脘

痛 及胃上 客寒 與大熱 藜蘆 草豆蔻 丸一十五丸 迺消

其痛 立止 再作 再合 與脾之 積藥 除其積之 根源 其

瘕 如此

右虛挾積帶而崩 常治一老婦人 血崩不止 流瀝

不絕 滿床 比日 血起 床不得者 三月 矣 腹滿如孕 予

作虛挾積帶流瀝血崩之用四物易四又人參白朮

虛挾濕者補
加伏龍肝燥之

作虛挾痰積汚血治之用四物湯四又人參白朮

各一又甘草半又以治虛香附三又半夏半又

苓陳皮枳實砂仁玄胡各一又以破痰積汚血分

二十帖每帖並乾荷側柏葉湯再並服之服盡今

不再發神效

云柏黃散療月經不止

黃芩

一又二分半
少則五分

當歸

柏葉

蒲黃

各一又少
則四分

生姜

五分少則
二分

艾葉

二分半少
則一分

生地

六分少則
二分四分

伏龍

肝一又七分少則
一分二分

右咬咀水二升並取八合分為二服此少合之數

又方治患崩中不止倍作血片如雞肝色碎爛

芍藥 十二分

阿膠

青竹茹 各八分 續斷

地榆

小蘗根 各十二分

當歸 六分

生地黄

伏龍肝 各十二分

右用水九盞煮取三盞去渣分作三服

行

義作婦人血露蚕以一分炒伏龍肝半又阿膠一又同為

未濕以調空心服二三外以知為度文全各無比散

羅伏龍肝散 治氣血勞傷冲任脈虛經日非時忽然崩

下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼脘腹

冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛

煩驚悸

伏龍肝 一兩 廿四分 赤石脂 一兩 芍藥 三兩

伏龍肝一升 廿七半升 赤石脂一升 廿七半升 三又

桂半兩 熟地黄二兩 當歸七升 乾姜七升

艾葉三兩 麥冬去心一兩

右件為粗末每服四升棗一枚水同煎

右四方伏龍肝例蓋燥可去濕也前二方去濕熱

後二方去寒濕按伏龍肝為止血之聖藥先賢治

崩用旋覆花半夏等治胎間濕痰而崩止者亦此

意也

全崩中下血不止小腹滿

芍藥炒兩半 柏葉六兩微炒多煖

古中一升煎取六合入酒五合再煎取七合空心分

為兩服一方為細末酒調二升又一方有鹿角膠等

之 虛脫者混

分酒調治白帶臍腹痛

世牡礪散治月水不止衆藥不愈牡礪火煨研細用醋調

成丸再煨過通紅候冷研細出火毒却用醋調艾末熬

成膏和丸如拘子大每服五十丸醋艾湯下

素陰虛陽搏謂之崩陰陽別論

垣涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包

絡相火故血走而崩之

生芩半斤黃連二斤黃柏二斤黃芩一斤

羌活三斤柴胡二斤知母二斤升麻二斤

防風三斤藜蘆二斤甘草一斤紅花以許

歸身半斤細辛一分荆芥穗葛荆子一分

寒執
脈數有執
為執

右吹咀都作一服小三大盞並至一錢去查稍熱服

空心更取足太陰脾經中血海二穴在膝臑上廉白

肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹

其脉弦是也灸三壯少陰腎之經中陰谷二穴在膝

內轉骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之如

不得屈伸舌縱涎流頓逆溺難以少腹急引陰痛股

內痛婦人漏下不止腹脹滿不得息小便黃如蠶女

子如孕婦可灸三壯

全小薊湯治崩漏不止色明如小得温則煩悶者此陽傷

於陰令人下血當補其陰脉數疾小者順大者逆

小薊莖葉 研取汁 生地黃 汁一盞 白朮 半升

右三件入水一椀煎至一半去渣溫服

芎藭酒治崩中晝夜不止醫不能治

芎藭一升 生地黄汁一盞

右用酒五盞煮芎藭至一盞去渣下地黄汁再煎二

三沸分為三服

治崩中去血不止

大小薊根五升 白茅根二升

右二味細切用酒五升煮取四升去渣分四服

丹漏下延熱而虛四物加黃連

岐雲金華散 治血室有熱崩下不止服溫藥不効者

延胡 瞿麥穗 當歸 乾葛

延胡 瞿麥穗 當歸 乾草

牡丹皮各二兩 石膏二兩 桂心 另研為末 七兩半 蒲黃半兩

戴灵仙 七兩半

右為細末每服三錢水一錢半空心溫服日二

全大治崩中下血黃芩不以多少為細末每服一錢燒秤錘

通赤投酒中令沸却用其酒調服 許學士云崩中多用酒治血補血藥以陽

乘於陰前所謂天暑地熱經水沸 益是也金華散亦妙

丹經水去多不能住以三補丸加苧根龜板金毛狗脊 補

者岑連柏也

兩子 孟官人母年五十餘血崩漸載僉用澤蘭丸星神散保

安丸白薇散補之不効戴人見之曰天癸已尽本不當

下血盖血得熱而流散非寒也夫女子血崩多曰大悲

脈弦無力
冷為寒

哭悲甚則肺葉布心系為之急血不禁而下崩內經曰
陰虛陽搏之為崩陰脈不足陽脈有餘數則內崩血延
下流舉世以虛損治之莫如知其非者可服火劑、
者黃連解毒湯是也次以棟香附子二五炒白芍藥二
兩焙當歸一五焙三以同為細言水調下又服枳朮丸
不旬而好

垣丁香膠艾湯治崩屢走不止蓋心氣不足勞後飲食不
節所得徑鬲少時其脈寸尺俱急弦時洪按之無力其
証自覺臍下如水求孕衣服以禦其寒氣白帶白帶之
物雖多間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脈微洪
屋水暴下者是弦急脈寒多而洪脈時見迺熱少合而

屋水暴下者是強急脈寒多而共脈時見逆也少合而

朋之為弦北方寒水多也洪命門色絡之火也黑物多

赤物少合成屋水之伏也

川芎四分 歸身二分 生艾葉一分 白芍藥

阿膠各三分 熟地三分 以酒火脈烘

右為細末作一服水二盞去渣入膠再上火煎至

一大盞帶熱服之因心宿食消盡三脈決動

全大治血崩

熟艾如熟子大 阿膠半兩 乾姜二分

右為粗末先用水五盞煮艾姜至二盞半入膠消淨

溫分二服空心一日盡

又方治崩中不止用下香二兩為細末酒三升煮取一

血見黑則止

氣帶者行
帶炭止之

升空心頓服必效一方以丁香百顆酒煎服

又方益智炒為細末鹽米飲調下

傳香礬散 治血崩香附不拘多少極酸醋浸一宿炒佳

為炭存性每炭一兩入白礬二分米飲調空心服之法

月奇藥湯調左選

全大用香附子去毛炒焦黑存性為細末極熱酒調下二冬

放溫服不過兩服立愈昏建為者三分也如血崩不可

禁者亦能解之未飲調亦可許學士云治下血不止或

成五色崩漏皆可治

世治婦人血不止用換柳燒炭存性碾末下以溫酒調下

葛砂

血汚者行
炭止之

欽五灵脂散 治婦人血崩諸藥不効者妙

好五灵脂以令烟尽

右為末每服一水溫酒調下一法每服三杯水酒童

便者半盞煎服各抽刀散

琥珀散 治暴崩下血

赤芍藥 香附子

當歸

棕攔

炒焦存性

烏攸帽

是旧康頭巾取陽氣氣出故也

枯荷葉

男子髮

皂莢水洗

右等分除棕攔外其餘並切粗片新瓦上煨成黑炭

存性三分為細末每服五水空心童子十便調下如

人行十里再服七八服即止

若產後去血多加米醋京墨麝少許

一法宜先以五積散加醋煎投一二服次服五靈脂散
療往血不止歌

婦人經血正淋漓 舊瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字 自然安樂更無疑

行 牛角腮即黃牛角腮用尖燒灰散存性治婦人血崩大

便血及冷痢白痢

大 治漏下不止者用鹿角燒灰細研食前溫調下二分

又方桃仁燒灰細研食前溫酒調下二分

又方亂髮皂角水洗燒為細末空心溫酒調下一分

世 傳 治血久崩夏枯草燒存性末之米飲調空心服

大 全 荆芥散 治婦人崩中不止

氣隔者山疾芝

全刺芥散 治婦人山崩中不止

荆芥穗炒灯盏多省油心好麻油點灯乾上燒荆

芥焦色為細末每服三升童便調下

蒲治婦人漏下血不絕槐花不以多少燒作灰細研食前

溫酒調二升又

鐘治崩中不止不問年月速取方槐耳燒作灰為末酒調

服方寸匕

全神鷹散治血崩不止挂心不以多少鍋內炒成炭存性

為末每服一二升米飲調下

如聖散 治血山崩

撥攔 烏梅各一兩

乾姜一兩五分並燒過存性

為末每服二升烏梅酒調下室心食前服以患不過

血並者厚炭止之

寒者厚炭止之

三服愈

治血崩屢効方

當歸

白芍

搜瀾

乾姜冬等分

右各煨存性碾為末秤過醋湯調以有節朱筋左攪

四二九轉食前服

又方用棕櫚白礬煨為末酒調二服

治暴崩下血百草霜二分狗膽汁一盞拌勻作二服

當歸酒調下

又方東星為末二分七若燒露蜂房末五三指撮酒調服佳

世治血崩用葫蘆去子裏實荆芥穗燒存性飲湯服

脫者混空
之
星炭雜方

也治血崩用葫蘆子子裏實劑木藹燒存性飲湯服

右二十一方皆燒炭黑藥經云北方黑色入通於腎

皆腎經之藥也夫血者心之色也血見黑則止者由

腎水能制火心故也

運氣血崩皆屬風火經云以陽司天五政初之氣冷

勝乃搖候乃火溫其病血崩王註云崩當作崩是也

海治崩不定或淋瀝經年者

白礬以開兩成 沒藥不 硃砂半分 黃丹半分

右件將礬開下餘藥末一處攪勻乾成丸子如彈

子大每用一丸新綿定內陰中立効

癩經水過多不止并崩中心術同

三陰交 行間各針三 通里足少指上二寸刺二分灸二十七壯

運氣

魯崩皆屬風

火

雜方

針灸

稟 漏下不止 心術摘莫並同

陰交

三心術摘英皆作

太冲

乘 胞門不開漏下惡血不禁

氣門在關元旁三寸刺入五分

集 血崩并漏下

中極

子宮

二寸半

敗血不止

三陰交百勞風門中極腎俞膏肓曲池 絕骨並主之

甲 婦人不字陰暴出經漏然谷主之

婦人漏血腹脹滿不得息小便黃陰谷主之 血千金方 腹痛

脹滿如阻体寒故腫偏腫

女子血下痛會陰主之 女子崩漏太冲主之

脉問曰五崩漏何等類師曰白者形如涕赤崩者形如絳

津黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如血

血也

寸口脉弦而大弦則為減大則為氣減則為寒氣則為

虛究虛相搏此名曰革婦人則半產漏下又見諸見血

仲寸口脉微而後微者衛氣疎則其膚空後者胃弱不

實則穀消而水化也穀入於胃脉道乃行水入於經其

血乃成榮盛則其膚必疎通焦絕怪曰血崩

脉診婦人漏血下赤白下血數升脉急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大急實數者死

赤白帶

丹赤白帶羅先生法或十牽湯或神佑丸或玉燭散皆可

用虛者不可峻攻實者可行

血虛加減四物湯

氣虛以參朮陳皮間勻之

未屬血白屬氣主治燥濕為先濕甚者固腸丸

○相火動者諸藥中加炒黃柏滑者加龍骨赤石脂

帶者加黃葵花

性燥者加黃連

寒月火加姜附

臨機應變先須斷厚味

帶下與變

遺同法

○肥人有帶多是濕痰每石半夏南星炒柏青黛蒼朮青黛

瘦人帶病少有者多是熱用炒柏蛤粉活石川芎雲皮

帶官濕疾

帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱出于大腸小腸宜
并提甚者上必用吐以提其氣下用二陳加白朮蒼朮
仍用丸子

結痰白帶以小胃丹半飢半飽津液下數丸候鬱積行
却宜補藥

白朮 一兩 黃芩 半兩 紅白葵花 半兩 白芍 七錢半

右蒸餅為丸空心煎白湯下二十九

陶遵道外姑年七十形瘦善笑患白帶食前姜湯吞大

補丸五十九一二次午膳後及臨卧時各與小胃丹十五丸

全乳香散治赤白帶下

草菓

一个去皮入乳香二小塊用麩餅
裹火炮焦黃雷性取出和麩用之

少腹热厥数
者宜温热

右為細末每服二勺陳米調下重者三勺

丹帶下不止耕目白並又方用耕目為末米飲調下

樗月皮凡治赤白帶有濕熱者

日芍芍藥

黃芩芍藥

黃柏芍藥

樗皮末一升半

右為末粥丸每服二十九或五十丸米飲吞下宜腹

赤白帶曰熱勝而下者

蒼朮一升

良姜三升

白芍一升

枳殼三升

樗皮炒二升

干姜三升

地榆半升

甘草三升

石一升

右為末粥丸米飲下

治帶下

檗皮 二斤 神曲 炒 黃柏 炒各 芍藥 一斤半

滑石 枳壳 各半斤 蒼朮 一斤

右為末 糊丸 桐子大 每服 五十丸 空心下

固腸丸 治濕熱下利大便血白帶去脾胃陳積之後

用此以燥下亦不曾單用者病作湯使用 檗皮炒

為末 粥糊為丸 此藥涼而燥 一方加滑石 一半

○治白帶 因七情所傷者及脈數者

黃連 炒 側柏 酒蒸 黃柏 炒各 香附 醋炒

檗皮 炒 白芍 白木 各一斤 白 燒存性

木香 各三斤

右為末 飯粥丸 米飲湯送下

右五方治帶摺皮例涼燥之劑濕熱盛者宜之後一
方有黃連香附木香故七情所傷

大地榆膏治赤白帶下骨立者用地榆一斤水三升煮至
一半去滓再煎如稠飴仗臆空心服三合日二服

治漏下五色地榆三升用醋一升煮十餘沸去滓食
前稍熱服一合

針治婦人赤白帶下用三葉酸漿草陰乾為末空心溫酒
下三合

右三方治帶地榆例寒瀉之劑亦濕熱盛而膀胱者宜
之按三葉酸漿草本中各酢漿草葉如細萍叢生莖端
有三葉俗又名布谷飯布谷者鳩也蓋鳩常食之物故

有三葉份又名布谷穀布谷者鳩也蓋鳩帶食之物故

又名鳩嘔草衍義誤入苦耽酸漿條即曰三葉酸漿草

豈昔耽酸漿歟

丹治白帶

菟耳 杞子二兩 炒柏一兩 白芍七分半

干姜炒二分半 香附半兩 山茱萸 苦參

檳皮半兩 貝母

右為末酒糊氣

又方 炒黑枝三兩 炒柏一兩 炒姜一斤 杞子二分半

為末酒糊丸

浙

全沒帶下脉數者用 枸杞根一斤 生地五斤

酒一斗煮五升分三服

少腹疼痛者

為疝瘕

右三方治帶薨板黃柏地黃例腎小真陰虛者宜之

脾胃傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱而痛出白一名曰

蠱當以此時可按可禁文見生死蓋便弱白帶之

類戴人三遺溺閉陰痿厚腫滑白濁皆男子之

疝也血因不月有塊或定或不或移之前陰突出之後陰疝核皆女子之疝也

保論曰赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本也濕熱結

于脉故津液湧溢是為赤白帶下本不病結緣五經脉

虛結熱属于帶故女子臍下痛陰中綿、而下也故經

曰任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚王註云任

脉自胞上過帶脉過于臍上故男子內結七疝女子帶

下帶脉起于季脇章門以束帶狀今濕熱寬結不散故

為病也經曰脾傳之腎病名曰疰瘕小腸寬結而痛出
白一名曰蠱所以為帶下寬屈結也屈滯而病不散先
以十棗湯下之後服苦練丸大玄胡散調之下熱者濕
病自愈也 十棗湯方見傷寒

苦練丸 治婦人赤白帶書

苦棟 研酒浸

茴香 炒

當歸

右等分為末酒糊丸每服三五丸空心溫酒下如
腰腿疼四物湯四兩加羌活防風各一兩煎湯送下
丹治赤白帶下腰痛少腹痛有熱者

樗皮 二兩

玄胡

桃仁

側柏葉

各半兩

川練肉

茴香

當歸 各五

香附 五

桂 三分

烏藥 三分

炒麩皮麩 一兩

右為末酒糊丸每服五六十丸神効

新義 治帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更

增冷痛此蓋為敗膿血所絞卒無已期須以此排膿白

芷一兩單葉紅蜀葵花根二兩白芍白礬各半兩礬各

剔研為末同以蠟丸如桐子大空肚及飯前米飲下十

丸或十五丸俟膿尽仍別以補藥佐之

恒固真丸 治白帶不止臍下冷痛喜乾食惡湯飲者見

寒疝帶

少腹冷脈微

為寒濕

惡飲及滑脫者

濕以枯之

本 治婦人赤白帶下用 龍骨半兩 舶上硫黃三兩分

為末每服半分無灰酒調空心服一日三服不問遠年

近日悉令痊効

伏龍肝散 治婦人赤白帶下久不瘥肌瘦瘁黃

樓櫚燒存性

伏龍肝

屋梁上塵

醫長者妙烟尽出

右等分研和入龍腦射香各少許每服三錢酒調醋

亦可患十年者半月可安有人經年不止崩漏甚多

諸藥不効脈濡微與此伏龍肝散並白礬丸服之愈

白礬丸用白礬四兩及附子二兩黃狗頭骨
灰四兩為末粥丸如桐子大每服三十丸

恒補經固真湯 白文舉之妻白帶常漏久矣諸藥不効

診得心包尺脈極微其白帶尋服而不止并和八裡

微脈經云崩中日久為白帶漏下時多骨木枯言崩中

者始病血崩不止久下則血少復止其陽故白滑之物

下流不止是本經血海將枯津液復已枯乾不能滋養
 筋骨以本部行經為引用為使以大甘坤賦之藥潤其
 枯燥而滋益津液以大辛熱之氣味補其陽道生其血
 以苦寒之藥世其肺而收其上熱傷氣以人參補之以
 散若溫之藥為佐而益元氣各曰補經固真湯

柴胡根 炙草 干姜 細末 橘皮 晉白

人參 杏 研如泥 白芍 去皮尖另 白葵花 七个

生薑 芩 細切另入

右件除黃芩外以水二大盞 薑至一盞 七分 再入黃
 芩同煎至一盞 去滓 空心無宿食 熱服之 候少時 早

饑 壓之一服 遂食

調經補真湯 冬後一月 散有地 泥以伴 并白帶 并有

調經補真湯 冬後一月做有地泥水并白帶再有

陰戶中寒一服立止大便飲食

麻黃 半斤 杏仁 三个 桂枝 半斤 炙甘草 半斤

良姜 一斤 黃芪 七合 人參 半斤 歸身 半斤

白朮 半斤 蒼朮 二斤 澤瀉 半斤 羌活 根

防風 根 柴胡 根 獨活 根 藁本 二斤

升麻 根 五斤 黃芩 五斤 乾姜 炮 二斤 白葵花 七个

右除麻黃、芩外都為粗末先將二味水三盞煎麻

黃一味令沸掠去沫入餘外藥目煎至二盞又再入

黃芩煎至一盞去渣稍熱服空心宿食消日高服之

候一時許可食早飯

事治婦女月經不調每行數日不止面有白帶漸瘦瘵
飲食少味累年無子地黃丸

熟地

一兩一分
干者

山茱萸

白燕蕒

乾姜

白芍

微炒

代赭石

醋研各

厚朴

白通草

右為末煉蜜丸如桐子大每服四五丸空心酒下
日三服此藥老婦人有白帶是第一等病令人不
產育宜速治之此扁鵲過却郭聞貴婦人所以專為
帶下藥也

恒桂枝湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂二分

附子二分

黃柏半斤

知母半斤

如少時常飽有時以腰脹加白芩半斤如不思食加五

如以時常飽有時以腰脹加白芨半斤如不思食加五

味子二十個如煩惱面上麻木如虫行乃胃中元氣極

虛加黃芪一斤人參七分炙草二分升麻子半斤為粗

末作一服常法煎熱服

海香附六合湯治赤白帶下方見婦人大法條即四物加回香桂

全大治赤白帶下年深久不差者

白芨二兩 乾姜半兩

右各炒黃色同為末空心米飲調下二外日二服

垣生榮龍益膏

丁香一斤 全蝎五个 木香一斤 良姜一斤 川烏一斤

枯凡半斤 鼈骨二斤 茴香一斤 煨梢二斤 玄胡五斤

厚朴二斤 木通 防已酒冬浸 炒鹽 紅豆

肉桂各二分

右為末蜜丸如彈子大綿裹番帛外納藥陰戶內

又方即勝陰丹為上藥力小再取三分內加行性熱藥

下項

三奈

川烏

木林

各半斤

炒藍

蒜

各一斤

全蝎 三个

紫胡根

羌活根

升麻根

甘松

白朮 已上各二分

射香 少許

破故布 二斤

右為末依前同制

又方勝陰丹為上藥此即生藥回陽丹

全蝎

升麻

破故布

甘松

白朮

已上各二分

羌活根

草烏 各二分

水蛭 三个

蜜虫 不

川烏

羌活 獨活 草烏 烏頭 附子 干姜 肉桂 鹿茸 狗寶 三奈 畢攷 各半斤

柴胡 各七斤 大枳 三奈 畢攷 各半斤

蒜 炒鹽 各五斤 必用之藥如去之則不効也

右為極細末依前同制用臍下覺暖為効如指夫大
綿包用酒煮當歸丸

少腹寒痛
為寒疝

酒煮當歸丸治癰疔白帶下痺脚氣腰已下如在冰雪
中之煖乾重、厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也
面艱白如枯魚之象肌如刀削消瘦峻之速也小便不
止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜
色目瞢、無所見身重如山行步欹側不能安地腿脚
細大便閉結不能言無力之極食不下心下痞煩心懊
懷不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下

三陽真氣耗竭故嘔噦不止胃寒之極也其脈沉厥緊而眩按之空虛若脈洪大而混猶為中寒之証以按之虛空者乎按之不毅是為陰寒之極也其空虛乃氣血俱虛之極也

當歸根一五

茴香半斤

黑附子

各半

皮臍去

右四味制碎以上等乾酒一升半同煮之酒盡為度

炭火上煨乾同為細末入

炒鹽

丁香

各半

全蠲五斤

柴胡根一斤

玄胡索一斤

升麻根

木香各一斤

炙甘草半斤

右前四味藥末與此一處為細末酒糊丸如桐子大

每服二十丸宜心宿食消尽淡醋湯下忌油膩冷物

酒濕麩

當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

柴胡七分 良姜 干姜 附子各五分

升麻五分 炙甘草五分 當歸二分 獨活半斤

炒鹽三分 黃柏少許

右為粗末用五升水二盞煎至一盞去滓搗服為丸

亦可右炒鹽例東垣回陽丹必用炒鹽無則不効蓋

寒亦之要藥也 出回陽丹註

固真丸治白帶久下不止臍下冷痛捫之如冰陰中亦

然目中流火上壅視物朦、無所見齒皆惡熱飲痛時

頃得以細黃連為末擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯
飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾惡濕肝經陰火上溢
走於標故上壅而目中為火腎水侵肝而上溢故目中
瞖、無所見齒惡熱飲者三陽明經中伏火也當大瀉
寒濕以丸藥故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散以酒
制白芍脂白龍骨以枯其濕炮乾姜大辛熱瀉寒水以
黃柏之大寒為日用又為鄉導治法云古者雖有重罪
不絕人之後又為之伏其所主先其所回此之謂也又
瀉蓄中惡熱飲以柴胡為本經之使以芍藥半以導
之又恐辛熱之藥大甚損其肝溫微瀉之以當歸之辛
溫大和其血脈此用藥之法具矣

區大和共血脈此用藥之法具矣

白石脂

一乃燒赤小兒研細目中晒干

干姜炮

黃柏

酒洗半

柴胡一

白龍骨

一乃如煮

白芍藥

當歸亦洗

右為末水煮稀糊為丸如雞頭子大每服三十丸空

心宿食消尽煎白沸湯攷冷帶溫多用湯送下母令

胃中停住待少時以早饑壓之是不令熱藥犯胃忌

生冷硬物酒其濕麪

右石脂龍骨之濕以枯濕多滑脫者宜之

補真潤腸湯治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮

復身如重山前陰中如冰正月丙耶律夫人千戶服此

得効

防風根

柴胡根

良姜

干姜

腰痛而下者

宜摩腰丹

唐安

徑而有積者

攻補並施

陳皮 半斤

白葵花 七兩

生黃芩 半斤

郁李仁 二斤

甘草 根一斤

右為末，剉散，只作一服，以二盞煎至一盞，去滓，稍執食前服。葵花郁李仁之潤燥，蓋枯固帶者宜之。

丹摩腰丹治白帶腰痛甚，効方見腰痛門。

潔古治帶下，少腹寬結而痛者，先以十棗湯下之，次服當練丸，文玄胡散調之，是先攻後補之藥也。

丹虞岩結痰白帶，每先於半飽時，嘔下小胃丹十餘粒，服至鬱結積行，却用白朮四兩，等藥補之，亦先攻後補之法也。

丹糊安人白帶，下月經甚多，食少倦怠，面黃，往來，如有血

脈微無力言

會少倦急為

虛

塊者有如筋脈者與參朮等補氣血調脾後諸証皆退
惟帶未止以槲皮丸主之方見濕熱條

右法治帶下虛而有熱者芩虛而有寒脈微面黃白
不澤無力以言者東垣補經固真湯丁香膠艾湯香

桂六合湯是也

和頃頃立一婦人病帶下連綿不絕白物或赤已白三載

矣命予脈之診其及手脈但滑大而有力得六七至當

上熱口乾眩暈時嘔酢水予知其真有寒痰在胸中以

瓜蒂散吐之冷痰三二升皆酢水也間如黃涎狀如爛

膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然

後微以淡劑後世之藥利其水道不數日而愈

汚血
下利夜熱
腹滿口燥
為汚血

息城李左衛之妻病白帶如水窟漏中綿、不絕穢臭
之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷起石
礪黃姜附之藥重、燥補汚水轉多戴人斬之曰此帶
渴水本熱乘太陰經其寒水不禁固故如此也夫水自
高而趨下宜先絕其上源是通痛疾水二三升次日下沃
水十餘行三遍汗出週身至明旦病人云汚已不下矣
次用寒涼之劑服半載產一子

仲問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少
腹急痛腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶
下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其証
唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

吳茱萸 三枚 當歸 川芎 芍藥 人參

桂枝 阿膠 牡丹 去心 生薑 甘草 冬二五

半夏 半升 麥門冬 一升

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服口亦主婦

人少腹寒久不受胎無治崩中去血或月水來過多

及至期不來

丹赤白帶用五靈脂半生半熟為末酒調服

全大治白帶下

芫花 一握炒 棕櫚炭 三寸 嫩蓮葉 三張 甘草節 一尺

右為細末空心酒調方寸匕

益母散治帶下赤白惡露不止用益母草開花時採搗

雜方

為細末空心温酒調二分日三服

世香礬散神効方見崩中血見黑止条。醋炒香附炭也

丹赤白帶皆屬於血有虫於大小腸之令黃荊子炒焦為

末米飲調服

又方治帶用白芷以石灰炒去皮苗草少許以粥丸服

全大白芷散治赤白帶下

白芷一升 海螵蛸二升燒 胎髮一團煨

右為細末空心温酒調二分

居山治帶下用芍藥炒黑為末每三分七酒調下

又方舊蓮房為末入射香空心米飲下

丹赤白帶用狗頭骨燒炭存性或酒調服或入藥服

針灸

丹赤白帶用狗頭骨燒炭存性或酒調服或入藥服

千金溫水調下雲母末三方寸匕大治帶下立見神効

崔氏四花穴治赤白帶如神取穴法見勞瘵門

玉龍治赤白帶 中極 二寸半赤瀉白補 白環俞 寸半瀉六吸補一字

撮要中極 白環俞 各五十壯 腎俞 二寸半補灸隨年壯

集成氣海 中極 白環俞 腎俞 陽交 補多瀉少灸七壯

三陰交

東陽榮池 三分灸三十壯在內踝前後兩邊地中脈一名跌穴 又陰陽 在足大母指下屈裏表頭白肉際是穴

又法 三陰交 五分灸 交儀 二寸灸 漏卮 在足內踝下五分微有動脈是穴刺入一分灸三十壯

乘君治赤白帶 心術如干赤帶不已漸、如蠶亦用此法

氣海六分 中極 委中 各五分

又治白帶 心術如下白帶不已漸、如蠶亦用此法

太阴

替任穴

腎膀胱穴

失寫赤淫大

蒜主之

曲骨 承阴各七分 中极两旁柱骨下六分心術作中极

心術婦人得子多变成白水淋漓而下經久身面虚腫

陰谷 二寸半 絕骨 二寸半 如喘滿魚際透太渊 左右共四

及治水氣極妙

海帶病太陰主灸章門麥柱大各三壯効

甲婦人下赤白沃後阴干痛惡谷阴少腹堅小便閉曲

骨主之 惡谷用考

女子赤白腰俞主之 女子絕子陰挺出白瀝上穴主之

女子赤白瀝心下積脹次窅主之 千金腰痛不可說 取尾翹

女子赤淫時白氣癢用事少中窅主之

女子下蒼汁不禁赤瀝阴中痒痛引少腹控眇不可說

女子下蒼汁不禁赤瀝尿中痒痛引少腹控眇不可悅

仰下窈主之

女子疝小腹腫赤白淫時多時少蟲溝主之

目事不利見赤白而有身反則陰寒行間主之

女子疝及少腹腫澹泄癰遺溺尿痛面塵黑目下背痛

太冲主之

女子夾脊臍疝中封主之

女子疝瘕按之如有湯沃兩股中小腹腫尿挺出痛經

水来下尿中腫或痒澹清汁若葵羹血閉曲泉主之

婦人下赤白裡急瘕瘕五樞主之

素腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆為瘕註大部論急

為寒甚不鼓則血不流而寒薄故血内凝而為瘕

執濕

三陽急為痲三少急為疝
王註云太陽受寒氣凝為疝

脈急者為疝痲少腹痛
平人氣象論

脈師曰婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿緊則為

腹中痛數則為冰中痒痛則生疮弦則冰疼制衣痛

婦人帶下脈浮惡寒漏下者不治

胎前白帶

丹婦人有孕白帶

蒼朮三分白芷三分炒茶各三分炒連三分炒柏三分

炒檮皮各五分白芍五分山茱萸各二分半

醫學綱目卷之三十四終

醫學綱目卷之三十五

醫學綱目卷之三十五

胎前

求子法

受胎

惡阻

妊經未

下黃汁

漏胎下血

胎動不安

胎上逼心

跌撲毒藥傷胎

書妊病可下

胎斷胎

胎自墮

月未足欲產過期不產

縮胎法

臨產生草法

催生法

求子法

大法調

經為先

胎前之道始於求子求子之法莫先調經每見嬾人之
無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行
後作痛或赤或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能

成孕也詳文不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛多者氣虛其將行作痛及凝塊不散者滯也其紫黑色者凝而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香枳榔桃仁玄胡索滯久而沉澗者吐之下之脈証熱者加黃芩脈証寒者加桂附及紫石英之類是也直至積去滯行虛回然後血氣和平能孕子也予每施之於經不調者只一味香附末醋丸服之亦百費百中也

次分虛字
肥人脂閉子
宮者燥之

再婦人無孕肥盛人多不能孕其身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人亦不能孕以其子宮無血精氣不聚

精氣不聚

肥人無子先服調理藥

當歸洗一酒 川芎七各半 白芍 白朮 半夏湯泡七次

香附 陳皮各一兩 茯苓 甘草各三兩

右作十帖每帖姜三片水煎吞後丸子

白朮二兩 半夏二兩 橘經一兩 羅 茯苓 川芎

香附 神曲炒各半及 甘草二兩

粥丸每服八十九丸如熱多者加黃連枳實各一兩服

前藥訖却服蠶斯丸

厚朴 杜仲 桂心 秦艽各三兩 附子

茯苓各六兩 白薇 半夏 干姜 牛膝

沙參各二兩 人參四兩 細辛半兩

○瘦人血虛攝
精者潤之

右五生為末煉蜜為丸小莖大每服五丸空心酒下
加至十丸不妨十餘日後覺娘三日不可更服忌食
馬肉則難當出月

○按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人
無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸
數十減其九只服五丸故無妨也已上三方得之
於丹溪之子朱茂誠者累試効

海藏火五補丸同三才例

天門冬 麥門冬 菖蒲 茯苓 人參

益智 枸杞 地骨皮 遠志 熟苳

右為末煉蜜丸如梧子大空心酒下三十九丸服本方

殺以七宣丸世之

穀以七宣丸泄之

增損三才丸

一名嗣續丸

一名說、丸

天門湯浸

熟地

酒蒸

人參

去芦

遠志

去心

五味子

茯苓

去皮酒浸

鹿角

酥炙

一法加白馬莖

一法加麥門冬令人有力

一法加附子補相火不足

一法加續斷以續筋骨

一法加沉香煖下元虛冷

右木杵臼碓皆可搗細稀縮羅則可如密恐不下煉蜜

丸杵干下然後可丸梧子大每服五十丸空心好酒下

年老欲補加混元衣全箇一藥

混元衣者胎衣也頭生男兒者堪用酒浸晒干

細判為末用

紫石英丸 治婦人絕子

紫石英 研水 天冬 酒浸去心 當歸 切焙 川芎

紫葳 卷柏 熟地 禹餘糧 醋煅七次

牡 石斛 辛夷仁 各二兩 人參

桑寄生 續斷 辛夷根 食茱萸

牡丹皮 厚朴 姜制 干姜泡 牛膝 酒浸各半

栢子仁 輕炒 山藟 烏賊魚骨 燒灰各一兩

炙甘草

右二十四味為極細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸酒米飲下空心食前日二服

和子戴人過誰郡營中飲會隣席有一卒說出喜事戴人問

其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如

子戴人過進郡營中飲會隣席有一卒說出妻事戴人問

其故荅曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如
聲水以熱手慰之如冰娶來已十五年矣恐斷我身是
以去之戴人曰公勿黠也如用吾藥病可除孕可得卒
從之戴人診其脉沉而遲尺脉洪大而有力非無子之
候也可不逾年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐
涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物
和之不再月血氣合度數月而娠二子戴人常曰吾用
此法無不子之婦此言不誣

一婦人年三十歲餘夢鬼神交驚怕異常及見神堂陔
府舟楫橋梁如此十五年竟無姙娘巫祈覘禱無所不
至鑿凡灸回孔穴萬千黃瘦骨熱引飲中滿足腫委命

汚血積冷

于天一日苦請戴人、曰陽火盛于上陰水盛於下
鬼神者冰之灵神堂者冰之所舟楫橋梁冰之用兩手
脉皆沉而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三汗不旬
且而無夢一月而有娠戴人曰余治婦人使有娠此法
不誣也

大^紅全盪胞湯治婦人立身已來全不產育及續斷三十年者

朴硝 牡丹皮 當歸 大黃蒸一 桃人各三升

細辛 厚朴 苦楸 赤芍 人參

茯苓 桂心 甘草 川牛膝 陳皮各一升

附子炮一升半 蜜 翅妙佳吉 水蛭 炒各十六枚

右吹咀每服四大錢酒水各盞半煎至六合去滓温

服空心目三夜一温覆得少汗必下積血及冷赤膿

右吹咀每服四大錢酒水各盞半宜至六分去滓溫
服空心日三夜一溫覆得少汗必下積血及冷赤膿
如小豆汁斟酌下尽若力弱大困不堪者只一二服
止然恐惡物不尽不得服力能尽服俟好不爾自坐
尊藥如

坐尊藥治全不產及斷緒服前邊胞湯惡物不尽用此方

皂角 去皮

吳茱萸

當歸 各一

細辛 去苗

五味

干姜

炮各二斤

大黃蒸

枯凡

戎鹽

蜀椒

右為細末以絹袋盛大如指長三寸餘盛藥令滿縛
定納臍中坐卧任意勿行走小便時去之更如亦一
日一度易新者必下清黃冷汁、尽止若未見病出
可十日如之本為子宮有冷惡物故令無子值天寒

冷胎則返疼痛須候病出盡方已不可輟每日早晚
用苦益菜煎湯薰洗

丹秦桂丸論○無子之曰者多起於婦人鑿者不察其目
起於何處過閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用藥溫
執近乎人情欣然受之銳然服之甘受熾灼之禍猶懜
然不悔何者陽精之施水血能攝之精成其子血成其
胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精
也血之少也固非一端然欲得子者必須調補水血使
無虧欠乃可以其有餘能成胎孕何乃輕用執藥煎熬
藏府血氣沸騰禍不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物叢
生冬氣寒凜則萬物消殞非秦桂丸之溫熱何以得子

生於氣寒凜則萬物消殞非秦桂丸之溫熱何以得子

針灸

素脊脈生病女子不孕

多病而不壽以秦桂丸之耗天真之冰也戒之慎之秦桂丸施於肥人而少其丸數無服調理補藥亦無妨但忌施於瘦人太多者不宜服

世治男子無子者用熟艾一團滿手指闊一團用鹽填臍滿却於鹽上隨鹽大小佐艾圓灸之如痛即換鹽直灸至艾盡為度如一日灸不盡二三日盡之曾効

東陽治婦人無子

胞門在關門左邊三寸灸五十壯

又法關元二十壯三

又江

氣門

在関元旁各用三寸灸五十壯

集成又治法

子宮

在中極旁各用三寸針入二寸灸三七壯

中極

甲絕子灸臍中令人有孕女子手脚拘挛腹滿赤月水不

下乳餘疾絕子尿痺尿交主之

腹滿疝積聚餘疾絕子尿痺刺石門

千金云脉上小腹堅痛下补尿中不得小便

女子絕子衄血在內不下関元主之

千金云轉胞不得滿小腹痛名石髓痛

乳餘疾絕子血不足中極主之 婦人無子涌泉主之

大產絕子築賓主之 絕子商丘主之

在內踝前宛中

婦人絕產若未曾產尿魚主之

刺入分半在羊矢下一寸也

仲男子脉浮弱而溢為無子精氣清冷

脉婦人少腹冷久年少者得之此為無子年大者得之絕產

大法

精成其子
血成其胞

脉微弱而澁年少者得此為無子中年得此為絕產
○肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者胸中上有寒
師曰少脉脉浮而緊、則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則
亡血絕產惡寒

受胎

丹成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚竊惑焉
後園東垣方有曰經水斷後一二日血海始淨精勝其
血感者成男四五日後血脉已旺精不勝血感者成女
此論亦為未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫
乾坤陰陽之挂情也左右脉跌之道路也男女陰陽之
儀象也父精母血回感而會精之寫陽之施也血能攝

分左右

男受胎左子宮

女受胎右子宮

男女兼形者

受胎左右之

間

之陰也之化也精成其子此萬物之所資始於乾元也
血成其胞此萬物資生於坤元也既既交媾胎孕乃凝
胎之所居名曰子宮一系在下上有兩岐一達於左一
達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽為主受氣於
左子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰為
主受氣於右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣
其有雙胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血亦分而
攝之故也若夫男女同孕者剛日昧時柔日陽時感則
陰陽混雜不屬左不屬右受氣於兩岐之間者也亦有
三胎四胎者猶是而已或曰其有男不可為父女不可
為母與男女兼形者又若何而分之耶予曰男不可為

父得陽氣之虧者也女不可為母得陰氣之塞者也氣

為母與男女魚形者又若何而分之耶予曰男不可為
父得陽氣之虧者也女不可為母得陰氣之塞者也兼
形者由陰為駁氣所乘而為狀不一以女函男形者有
二一則遇男為妻遇女為夫一則可妻而不可夫又有
下為女体上具男之全形者也此又駁氣之甚者也或
曰駁氣所乘獨見於陰而所成之形者又若是之不同
耶予曰陰体虛駁氣易於乘也駁氣所乘陰氣相混無
所為主不可為屬左不可為屬右受氣於兩岐之間隨所
得駁氣之輕重而成形故所兼之形不可得而同也

右丹溪此論極造精微發前人之所未發是知男女
之分已定於資始乾元之際陰陽交媾之時昧者不
寤是理女有轉男女為男之法夫萬物皆資始於乾

雜方

元氣男女之分又豈不資始於乾元乎

胎前當清熱養血 產前安胎白朮黃芩妙藥也

胎熱將臨月以三補丸加炒香附炒白芍餅丸

又柳熱以三補用生地黄膏丸芩連柏為末地黄膏丸之

有孕八九個月必順氣枳殼蘇莖

前至八九月目火動送作喘急可用芩香附為末調下

海神方驗胎散婦人三兩個月經水不行疑似双身却宜

血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外以身有病

無邪脈以素問脈法推之十得八九矣

真雀腦芎一又當歸如重一又者只用七外宜全用

右二味為細末分作二服濃煎艾湯一盞調下或好

值調服亦得可待三十分時長聞覺腹微動仍頻即

隨調服亦得可待三升時夜間覺腹微動仍頻即
有胎也動罷即愈安穩而無虞如不是胎即不動滯
惡物行過母亦安也如服藥不効荆紅花湯調下必
有神効

是苑方治婦人經脈住經三月驗胎法真川芎為細末濃煎
艾湯下一人頭腹內漸動是有胎也

又試胎有無

甘草 于炙

吳角 于炙

黃連 少許

右為末酒調服有則吐無則不吐每服一匙

脈婦人懷胎七月而不可知時、衄血而轉筋者此為軀
也血待寢而動非軀也

衄血而轉筋者為奴

診

太庠脈甚動

為孕

尺脈鼓搏寸

脈殊別為孕

右天疾大為

男

右天疾大為

女

素婦人足少陰脈動甚者娠子也

平入氣象論曰謂太陰脈也全元起本謂少

陰王水上一作手少陰當候元起本也王註云動脈頂厥

陰搏陽別謂之有子

陰陽別論曰主註云陰謂尺中也

有胎孕之別也

脈妊娠初時寸微小呼吸五至三月而冬數也脈骨疾以

重手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不

滑者五月也此即陰搏陽別之義言尺脈骨數寸脈而

又脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子文者

如實狀亦陰搏陽別之義謂尺脈實大

婦人妊娠中月欲如男女法左疾為男右疾為女俱疾

為生二子王子身云脈之節與尚

呼之

左回首為男

右回首為女

道姓婦面南行還復呼之左回首者是男右回首是女
者上圖時夫從後急呼之右回首者是男右回首是女
右按丹溪云男受胎在左子宮女受胎右子宮斯言
大契是說也蓋男胎在左則右重故回首時慎護重
處而就左也女胎在右則右重故回首慎護重處而
就右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎盛
於左故脈亦從之而左疾為男左大為男也胎在右
則血氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾為女右
大為女也亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處
在臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脈鼓
動有力而與陽之寸脈別也又如癰癧者上則血氣

診妊病

診產難易

從上而寸、盛者下則血氣從下而尺盛者左則血氣
從左而右脈盛者右則血氣從右而左脈盛也丹溪
左大順男右大順女為醫人之左右手蓋智者之一
失也

丹婦人懷孕受物乃一藏之虛假如肝藏虛其血氣止能
養胎不能榮肝、虛則受酸物吃

大全胎動不安或曰僵卧或曰毒藥重者便致傷墮當以

母形色察之母面赤舌青者子死母面青舌青者子活也

出者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也

脈婦人妊娠八月脈實大強弦緊者生况細者死

丹脈細勻易產大浮後大氣散難產

禁忌

每月各忌條

刺胎之養經

脈婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三

月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陽脈養六

月足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九

月足少陰脈養十月足太陽脈養諸陰陽各養三十之

日活兒手太陽少陰不養者下至月水上為乳汁亦是

活兒養母懷妊者不可灸刺其經犯之必墮胎陳氏大

足厥陰肝脈也足少陽膽脈也四時之今起於春木故

十二經之胎養始於肝膽而在一月二月手心主胞絡

脈也手太陽三焦脈也屬大而夏旺所以養胎在三月

四月足太陰脾脈也足陽明胃脈也屬土而旺長夏所

入養胎在五月六月手太陰肺脈也手陽明大腸脈也

屬金又旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脈也足

太陽膀胱脈也屬水而旺冬所以養胎在九月十月

禁忌

...

...

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也

素帝曰何以知懷子之旦子岐伯曰身有病而無邪脈也

腹中論

大舍妊婦稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順
但覺脈体沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸醎甚
者或作寒熱心中煩悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏
謂之惡阻但疾有輕重耳

禁忌

治阻病惡吐下

者止藥休服

仲景人得平脈陰脈少弱其人腸不能食無寒熱各妊娠
桂枝湯主之於法六十日當有此証設有鑿治逆者却
一月加吐下者則絕之

右絕之者謂絕止鑿治俟其自安也予嘗治一二婦

阻病吐逆金胎金送司思此仲景絕之旨遂停藥

痰

阻病吐逆愈治愈逆目思此仲景危之旨遂停藥

月餘自安大哉聖賢之言也

丹雲阻即從痰治多用二陳湯

羅半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐惡心頭目眩暈惡聞食

氣好食酸醎多臥不起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏

炮七次一
二分半

茯苓

熟芩各七分

橘紅

旋覆花

干金大比有
個辛出少饒

人參

芍藥

半川芎

桔梗

甘草 各半

右以咀每服五分姜七片水煎空心服在苓丸

若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加全胡知母七分半

若腹冷下利去熟地加炒桂心半

寒痰

若胃中虛逆大便秘小便赤澀加大黃七分半去地黃
加黃芩二分半

茯苓丸治妊婦阻病心中煩悶痰吐暈重先服半夏茯苓
湯兩劑後服此藥

赤茯苓 人參

桂心

乾姜

半夏 炮七次炒黃

橘皮各半 白朮 葛根

甘草

枳殼各一丸

右為細末煉蜜為末丸如桐子大每服五十丸米飲

下日三次一方加麥門冬肘後加五味子

仲妊婦嘔吐不止者乾姜人參半夏丸主之

干姜 人參各一丸 半夏二丸炮七次炒黃

右三味末之以生姜汁糊丸如桐子大未飲服十丸

日三服大全

方論半夏動胎而不敢用今仲景豈知此而用半夏於此乎予治妊娠阻病

無用半夏未嘗動胎經云有故無殞故也况復制乎

大全消患阻吐清小甚害十餘日粥漿不入者

白朮一兩 人參半兩 丁香二兩半 甘草一兩

右為細末每服二分以酒送下薑五片煎至七分溫服

歸原散治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥

無効者

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 白朮

丁香各半 白茯苓 白朮 陳皮各一 桔梗炒

枳壳炒各二 半夏炒七次切

右收咀每服三分生薑五片棗一枚煎

批痰

人參糖皮湯治阻病嘔吐痰水

人參

橘紅

白朮

麥冬

去心各一兩

甘中三分

厚朴制

茯苓各半及

右為粗末每服四錢淡竹葉彈子大生姜三片水煎

空心食前

治妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮各二兩

生姜

茯苓各四兩

半夏五兩制

右細切以水六升煮取二升半去滓分三服

治妊娠嘔吐不食無吐痰水

生芎藭

橘紅

生薑

枳榔

右切以水二盞煮七合空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬各三兩 全胡二兩 搗皮二兩

芦根一握

右切水一升煮至半升去滓分兩服食前

安胎飲治妊娠惡阻心中憤悶頭重目眩嘔逆不食或

胎動不安腰腹疼痛

甘草 茯苓 當歸 熟地

地榆 白朮 黃芪 白芍 半夏炮七次炒

阿膠 炒各半斤

右以咀安服三分生薑四片水同煎

一婦人孕三月吐痰水并飲食每日宜卯作時少腹
覺有氣冲上此後高喘而吐面赤微燥頭眩卧不安床
肢疼微渴盖肝火挾冲脉上火上冲也一日甚一日輕
脉和右寸高有藥不効者將二月餘余男偏用沉香以
磨化抱龍丸一服膈寬氣不上冲二三服吐止眩減食
進而安

又應氏婦得孕七月嗜睡吐食眩聾心下滿塞氣攻肩
背兩肘背痛要人不住手以熱物摩慰得吐稍疎脉弦

大 炒芩 各半 白朮 半夏 各二分 茯苓 人參 各五分

當歸 炒枳 陳皮 炒壳 香附

蒼朮 各一分 炙草 縮砂 各半分 生薑 七片 炒連 子

服二帖後嘔吐止心滿塞退但於夜間皆肘之痛用

服二帖後嘔吐止心端塞退但於夜間背肘之痛用
摩尉遂与抱龍丸服之其疾如矢皆痊

丹 一婦人年近三十懷孕五月病嘔吐頭眩自覺不可禁

持以人參白朮川芎陳莖荏荃等藥五七日多愈覺

重名予脉之丑手脉弦左為甚而且弱予曰此是惡阻

病必怒氣之激聞之果然肝氣既逆又挟胎氣參朮之

補大非所宜教以荏荃陽下柳青丸二十四粒五服自

覺稍安冷其脉畧有數丈自言中嘗稍食粥些少則口

酸予急其為暈間席氣未盡行教以用芎陳皮山梔子

生薑荏荃煎湯下柳青丸十五粒十餘帖餘証皆平則

食及常時之中食後覺口酸不食覺易飢予謂肝熱未

蒼朮各一兩 炙甘草 縮砂各半兩 生薑七片 炒連不

平則以熱湯下抑青丸二十粒至二十日而安予後可
遇其家又脈之見其右手脈雖平和而左手弱甚此胎
必墮以時解氣飢平參朮可用矣遂用初始之方參朮
等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮却得
平穩無事神青丸一味黃連為丸

妊婦經來

脈婦人徑月下但為微少師脈之反言有軀其後審然其
脈何類仲以引之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按
之滑浮之則輕陽明少陰各如徑法身反洒淅不欲飲
食頭痛心氣嘔噦欲吐呼則微穀吸則不驚陽多氣溢
陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁

大法。虛

凝胞散者損墮設復陽盛双妊二胎今陽不足故令激
經也 滑脉主血有餘今經反少故知孕也

胎漏血下

丹胎漏 曰氣虛 曰血虛 曰血熱

仲師曰婦人有漏下者有半產後曰續下血都不絕者有

妊娘下血者假令妊娘腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主

之方見血崩

梅師治胎動下血心腹痛死生不知服此湯活即安死即

下此即催生佛手散方是跌撲傷胎

即當歸川芎等分為散也

妊娘無故卒下血不止取何膠三兩炙搏末酒一升半

煎令消一服全

血 執
血 執

虛 執

羅立聖散治妊婦下血不止用雞肝二個用酒一升煮熟

食之効

保治胎漏二黃散用生地熟地等分小三盞煎半乾去渣

服日一三次乾地黃為末酒調三分

梅師治胎下血阿膠二兩搗末生地半斤搗取汁以清酒

三升絞汁分三服

大全治漏胎下血不止胞乾即短宜急治之以生地黃汁

一升酒五合同煎三五沸分溫三服以止為度

保治婦人胎漏下血及回事下血和壳湯

枳壳 黃芩各半兩 白朮二兩

右為粗末每服七分小一盞五分食前服用藥七分小三盞煎八分服

丹婦人年二十餘三個月孕散墮胎後淡血水小腹滿口渴

右為粗末每服七分小一盞並分食前服

丹婦人年二十餘三個月孕設癰疾後淡血水小腹滿口渴

白芍 白朮 茯苓 各半
黃芩 歸尾

川芎 陳皮 各半
炙草 二分

虛熱有帶

東陽婦人三十五歲孕八九個月胎漏不止胎比時前稍
覺收小血紫色微紫有塊食減平時三之一腹微疼無

情緒

人參 白朮 炒 白芍 各一
陳皮 川芎

茯苓 縮砂 腹皮 各三分
水蓮藤 七葉

右水煎食前下三勝丸五十粒

仲婦人宿有癥病經斷未及三月而漏下不止胎動在臍

上者為癥痼害又妊娠六月動者前三月經水利時胎

汚血 胎動臍上宜
者為癥

下血者後斷三月無也所以血不止者其瘕不去故也

當下其瘕桂枝茯苓丸主之凡胎動多在當脛今動在脛上故知是瘕也

桂枝 茯苓 牡丹 芍藥 桃仁去皮 芫花各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一丸

不止加至三丸

本草治胎下血不能止取桃樹上乾不落桃子燒作灰和

水服差本草云菴如破血又治伏梁積氣

胎漏黃汁下或如豆汁

大[○]全治妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

粳米五升 黃芪六兩

右以水七升煎取二升分為四服

虛 氣虛

血虛

梅師銀葶酒治妊娠下黃汁或如赤豆汁

血虛

梅師 銀芎酒 治妊娠下黃汁或如赤豆汁

芎藭

二升去黑皮切

銀一斤

右以九升煎取四升每服入酒半升或二升煎取一升分二服

診

暴下斗餘為

胎墮

脉婦人懷軀六月七月暴下血斗餘其胎必倚而墮此

那時孤將以預山下故也

胎漏則銜下而多故知胎下也今暴

胎動不安

大法

大 全 婦人妊娠胎動不安者衝由任經虛受胎不實也亦

有飲酒房室過度損動不安者有候擊觸而胎動者有

喜怒氣宗不舒暢於心肝觸動血脉者有信鑿宮服補

煖莫反為所害者有因母病而胎動者但治母病其胎

虛 固孕常服

母固孕散
自安有胎不堅固動其母疾但當安胎其母自愈

地黃一升 川芎白芍作

黃芩各半升

歸身尾

人參

白芍

陳皮各一升

白朮一升半

甘少

三升

黃柏少

糯米十四粒

桑上羊食藤七葉圓者

右吹咀煎服

考得金匱句云痛者加宿砂行氣血虛加阿膠有昔蓮

仲妊娠宜常服當歸散主之

當歸

黃芩

芍藥 芎藭各一斤

白朮半斤

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服即
易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮

芍藥

黃芩

芎藭

妊娠養胎白朮散主之

白朮 芎藭 蜀椒 牡蠣 三合 煨

右四味杵為散服一升七日三服夜一服但苦痛加
芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩吐痛不能食飲加細
辛一兩半夏大者二十枚服後更以酸漿服之若嘔
亦以酸漿服之復不解者小麥汁飲之已後渴者大
麥粥服之病雖愈服之勿置

或動或痛

者安之

胎後胎動不安取芎根如足指大者一天吹咀以水五升

煮取三升去滓服一方有生姜五片并煨云

大生銀芎酒治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍

芎根二兩 銀五兩 清酒一盞

右以水一大盞同煎至一盞去滓分溫二服

治胎動不安用好銀者取水省葱白作羹啜之佳

治妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所下方

艾葉 阿膠 當歸 川芎 各三兩 甘草 一兩

右細切以水八升者取三升去渣內膠令烊分三服

日三

立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰即佛子

散方見眩門

全縮砂散治胎動不安墮在頃更者神効方見毒物傷胎

胎上逼

本事 治妊娠胎氣不和懷胎近上腹滿脹疼痛謂之子懸

魚治臨產驚恐氣結連日不下紫蘇飲

顛沛隨土在頃更者縮砂散

上中

逼心滿悶者下氣通陽

紫蘇蘇莖蘇葉 大腹皮 人參 川芎 陳皮

通心帶過者

金泊胎產驚恐氣結連日不下

紫蘇莖葉

兩

大腹皮

人參

川芎

陳皮

白芍藥各半兩

當歸三分

甘草一分

右細剉分作三服每服用水一盞半生姜四片葱白

七寸煎至七分去滓空心服

曾有婦人累日產不下服通催生藥不驗予曰此必生

草太早心俱懷下一點氣結而不行然那順不順也素

問云恐則氣下蓋恐則精神卻、則上焦閉、則氣還

還則下焦脹氣乃下行笑得此藥一服便產及婦人亦

七月子懸者子用此數、有驗不一服胎便返下陳良甫云

治一婦人有孕七個月遠隔忽然胎上冲心而痛坐臥不安西醫治之無效遂說胎已死矣已用葶麻子研爛

加射香調貼臍中以下之命在垂已召陳診視兩尺脈平加陳問二豎作何証治之答曰死胎也陳曰

絕古脈平加陳問二豎作何証治之答曰死胎也陳曰

二者亦

大凡

跌撲傷者

逐后卷新

白朮 五升 黃芩 三升 為藥 四升

右小六升 煮取一升半 分三服 緣胎有小 致痛易產

跌撲傷胎 毒藥傷胎

本佛手散治婦人娠孕六七月 目多柔 磕有胎或子死腹

中雲露下 疼痛不已 口禁不絕 用此探之 若不損則痛

止 子母俱安 若胎損立便逐下 又治血上冲 心腹痞悶

者如湯沃雪 以藥催生 神效 為散 口禁 嚥之

全治胎忽目倒地 急舉動 擊重促損 腹中不安 及子死腹

中以芎藭 羌活 調服 方寸匕 須臾 一二服 出

治妊娘 從高墜下 腹中下血 煩悶

生地黃 益母草 各一 當歸 黃芪 各半升

解毒傷胎者
解毒和中

右咬咀每服四升一盞姜四片煎至六分去渣無

時服

丹婦人因悶挫傷胎肚疼血崩

歸尾

陳皮

白朮

書人

參

花

苓

白芍

烏

炙草

半

右分四帖水三盞煎取一盞下煖砂末外半五靈脂

全大治婦人服草藥隨胎腹痛用白蘆豆生去皮為末半飲

調服方寸七或懷並服亦可

阿膠散治妊娠或目傾仆或目毒藥胎動不安腹痛腹

喘或有所下或胎上搶心短氣

熟地二升

白芍

艾葉

當歸

甘少

阿膠

黃芪各一升

一方有川芎

痛不可忍命在
頃刻者備以桂
苓

阿膠

黃芪各一兩

一方有川芎

右以咀每服半兩姜三片棗一個水煎溫服無時

治妊婦偶有所傷疼痛不可忍

縮砂不以多

右和皮炒黑色一方用右對斗內畧炒為末煎調

下二分不飲酒者光飲調下覺腹中熱則胎已安矣

此極効

奪命丸婦人小度下血子死腹中其人憎寒手指唇口

爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則飽飽欲死冷汗自

出成食毒物或誤服草藥傷動胎氣下血不止尚未損

者服之可安已死者服之可下若胎腐爛腹中危甚者

大成

立可取出此方的係其人傳授至妙此即仲景桂枝湯

爵下不同且方見動胎干血門廢糸下即牡丹花冬

娘病可下胎斷胎

大金治妊娠母目疾病可下胎能安者安之不能安者宜

下之

取七月七日法麵四升水二太盞煎取一盞三分俾

慮去渣分溫三服立下

○又方用麩五升清酒一斗煮二沸去渣分五服隔宿勿

食但再服其子如糜母肥盛無疾者千金不傳以

○又方用麥蘖一升為末和米煮二熟服之如神神效

又方用附子二枚為末以醇苦酒和之老之良

又方用附子二枚... 又方用雞子一枚以三指搗鹽在雞子中服之立出

丹 斷子法用白麵麩一斤無灰酒五升打作糊煮至二升

半用絹帛濾過去查分作三服候前月徑將來日子晚

下吃一服次早五更吃一服天明吃一服月經即行終

身絕子

丹 全斷產驗方取故蚕紙方圓一尺燒為末酒飯調服終

身無孕

又方以神並水銀一日方息空心服如棗核大一丸永

斷不損人

胎自墮

丹陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足榮養其胎自墮或

虛實

勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火
 能消物造化自然病原延謂以冷傷於子歲而墮此未
 得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診
 其脈右手大而無力重取則虛知其血少也以其妙年
 三補中氣使血自榮時正夏初教以懷煎白朮湯下黃
 芩末一分服三四帖遂得保全其生日時鬼之墮於
 內熱而虛者為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正
 屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎
 妙藥耶好生者幸無輕視

大全治妊娠懷胎數落而不結實

甘少 黃芪 人參 白朮 川芎 熟地 三葉

右等分為末空心溫酒調二服忌葱菜桃李雀肉醋

帶氣
針灸

熱
先期欲產
涼血安胎

右等分為末空心溫酒調二服忌葱菜桃李雀肉醋

物按丹溪論胎皆是虛熱而無寒也今好

醋附丸治數墮胎方見血崩

姙子不成時、墮胎隨胎後漏下五色疼痛灸法

胞門關門左邊二寸名胞門右邊二寸名子宮

十月未足欲產過期不產

大婦人懷孕有七月八月而產者有至九月十月而產者

有經年二年延至三年四年而後產者

知母丸治日月未足而痛如欲產無治產難及子煩用

知母一味為細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服

一方丸如桐子大米飲下二十九

治妊婦月數未足而但欲產腹痛者

梔子

蒲黃等分

右為末蜜丸如桐子大溫酒下二十九丸以痛止為度

又方蒲黃如棗核篩過以井花水調服

千金日月未足而欲產者搗菖蒲根汁一二升灌喉中草

云菖蒲治胎動不安下血者

帶

過期不產者
補血行帶

虛實

羅先生治妊婦過月不產者方

四物

香附

桃人

浙枳壳

縮砂

紫蘇

難產縮胎法

丹世之難產者佳、見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家

若貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其

方為胡陽公主作也實非極至之言何者見其有用此

以貧賤辛者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其

方為胡陽公主作也實非極至之言何者見其有用此
方其難自若予族妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之
予甚憫焉視其形肥勤於針指予措思旬日忽自悟曰
此正與胡陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣
使平和故易產今形肥知其氣虛以坐知上不運而氣
愈弱兒在胞胎曰母氣不能自運耳當補其母之氣則
兒健易產矣令其有孕至五六月來告遂於大全方
紫蘇飲加補氣藥與數十帖曰得男而甚快後遂以此
方隨母形色性稟參時令加減與之無不應者曰名其
方曰大達生散

氣虛者補
氣行滯

縮胎飲 即大達生散

大腹皮 三分 人參 紫蘇 陳皮 各半分

歸身尾 白芍藥 白朮各五 炙草 二分

黃楊樹頭七个

或加枳壳縮砂青菴書

左作一帖吞下益母丸臨月得二十服易生產後無

病帶丹溪云雞產死胎此血氣帶病也蓋此方補中行

陳皮血虛加川芎 黃連熱急加黃連 枳殼形實倍常蘇 食積加

山查食後易飽 黃芩人牙 腹痛加木香 炒官桂炒

黑神丸一名催生丸 一名益母丸

丹益母草研末粥丸治婦人臨月一日三次服之用

縮砂飲送下能催生易產、後服之能生新血去舊

血此只以白湯送下

重者煎人參白朮湯陳皮湯下

縮胎丸八箇月用之

炒黃柏

夏一兩 秋七兩 冬半兩

白朮二兩

茯苓七分半

陳皮

三件是見火

右為末粥丸桐子大每服三十九空口熱湯送下

縮胎丸九箇月用之

黃芩

一兩 宜煎藥不單 涼藥性人當減半

枳殼

七分半

白朮一兩

滑石

七分半 身十日 前小便多時 加此一味

右為末粥丸如桐子大每服三十九空口熱湯下

保縮胎丸用白朮枳殼炒等分為末燒飯丸如桐子大每

日食前五十九水服之至產則已

氣實者耗
氣抑揚

本事滑胎積壳散

商州枳壳二兩

甘草一兩

右為細末每服二分百沸湯點服空心日食前三服
凡懷胎六七月以上即服令塊易生初生胎小黑百
日後肉漸變白此雖孫真人滑胎易產方抑揚降氣
為諸方之冠

治妊娘衝任脉虛補血安胎內補丸

熟乾地黄二兩

當歸一兩微炒

右為細末煉蜜和丸桐子大每服三四十九溫酒下
已上三方諸集皆載之在人用之何如爾大率婦
人妊娘唯在抑揚助陰素問云陰搏陽別謂之有

子蓋閱前為陽閱後為陰尺中之脈按之搏手不
絕者姪子也婦人平居陽氣微盛無害及其姪子
則方閉經隨以養胎若陽氣盛搏之則經脈妄行
胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑揚助
陽之方甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交雜別
生他病唯是枳殼散所忌抑陽四物所以助陰故
爾枳殼差寒若早服之恐有胎寒腹痛之疾以內
補丸仿之則陽不至強陰不致弱陰陽調勻有益
胎孕此前人未嘗論及

本事
榆白皮焙乾為末婦人臨月姪娠日三服方寸匕令

產極易產下兒身皆塗之信其驗

未正產候

宜養

痛或作或止

者未腹痛腰不

甚著未胎高不

兩者未

穀道不逆者未

漿血不出者未

漿出不痛者未

宜產女寬心養

心

宜任意行生養

力

穀道逆進佳之將破血出見子遂生此各正產

二曰傷產者婦人懷胎未產一月已前忽然臍腹疼痛

有如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母

未有正產之候即不可令人抱腰亦不可令產母妄亂

用力若兒身未順終方轉動便教產母虛亂用力遂使

兒子錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力於未當

用力之所致也立待待兒身順身臨逼門戶方始用力

一送令兒下生此名傷產

右傷產一法最為切要慎勿輕忽也凡十月未足臨

產腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之

候或腹雖甚痛而腰不甚非正產之候胎高未臨下

者非正產之候穀道未逆進者非正產之候未將破

宜安胎補藥

養氣

忌愴惶到產

母志

忌抱腰妄亂

用力

忌妄服催生

藥

血出者非正產之候得血雖出而腹不痛者非正產
 之候凡未有正產之候血合技行熟忍如行不得或
 凭物坐之或安卧之或服安胎藥一二服得安即止
 慎勿妄服催生藥餌亦不得揮霍大小倉惶致令產
 母憂恐而到其志務要產母寬心停養亦令坐婆善
 言誘說解諭之如覺心中頓悶可取白蜜一匙用新
 汲水調下切勿妄亂用力困危其母宜待子逼門戶
 腰重痛極眼中如火穀道挺逆時延是正產之候方
 可用力每服催生藥也斗男婦於未產一月已前腰
 腹俱痛全似將產其痛至甚但遇已解稍止如此者
 十餘計無所出回閱此條遂與安胎藥加參朮數服

與肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一

見正產候

宜催

冬產宜常

溫煖

夏產宜適
溫涼

間與肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一
男是時忌妄亂用力并服催生等藥必見危亡矣

三曰催產者言妊婦欲產漿破血下已見是正產之候
但兒却未坐即可服催生藥以催之忽有經及數日產
母曰若亦可服藥助產母之正氣令兒速生此名催產
四曰凍產者冬月天寒產母經血得冷則凝以致兒子
不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣
并不可坐卧寒處當滿房有大常有煖氣常令產母背
身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生
此名凍產

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取

橫產倒產

偏產宜正

涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼氣產婦使血沸而有
發熱煩疼面赤昏、如醉延至不知人事此名橫產
六曰橫產者兒先露手或先露臂此曰產母未當用力
而用力之過也兒身未順用力一遍遂致身橫不能生
下當令產母安然仰臥令看生之人先推其手令直上
漸、通手以中指摩其肩推上而正之順是產母仰臥
漸以指攀其耳而正之然後推兒徐、正之候其身正
並催生藥一盞服下方可用力令兒下生此名橫產
七曰倒產者產母胎氣不足閔健不牢用力太早致令
兒身不能回轉便直下先露其足也當令產母仰臥令
看生之人推其足入去不得令產母用力分毫力亦不得

驚恐使兒自順、

八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏挂
左腿或右腿故頭雖露偏挂一畔不能生下當令產母
仰卧令看生之人輕、推兒近上以手正其頭令兒頭
頂端正然後令產母送日書送即便生下者是小兒頭
之後骨偏挂穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙
溫裹手於穀道外房輕、推兒令正便令產母用力送
兒生也

礙產宜扱

九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身
四轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰
卧令看生之人輕推兒近上徐、別手以中指按兒肩

下其肚帶也仍順候兒身正順方令產母用力一送便
兒生下

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非精良妙
手不可依用此法恐其愚反傷人命也按倒產者
今世雖隨其側而生下並無後患子母俱全不必
依推是上之法亦可又礙產者往有肚帶纏在兒
頂上者而兒頭不能自出在產門外看生之人以手
按其肚帶從兒頭頂過而下者又有肚帶纏在頂上
一匝而兒子胞衣自然同下者皆無妨不必依此礙
產洗入產門裡撥下之也

十日坐產者言欲臨產時高處繫一手中令產母以手

盤腸產宜

喫

攀之輕、屈足坐身令兒生下那生在物上也

十一曰盤腸產者趙都運恭人每產則子腸先出然後
產子產子之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產鑿不
能療偶在建昌得一坐婆施之一法而收之其法以醋
半盞新汲冷水七分攪調停喫產母面每喫一縮三喫
收盡此良法也

丹產後腸不收香油五斤煎熱盆盛待溫坐香油盆中約
一頓食時以皂角末吹鼻中嚏作立上妙斗門
大全 半夏為末搗鼻中則腸上矣

又方以大布摺以香油潤了點灯吹滅以炮薑產母鼻
中腸即上

又子以草蘇子十四粒去壳研如膏貼產母項心中腸

上即減去

催生法

大全大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生藥

骨位爭藥誠勢不得已則服之又云切不可坐草太早

及坐淩亂下手

凡催生藥必俟腰痛甚胎陷下驚血破方可服

丹溪催生只用佛手散又穩當又効捷

方見婦人通論即苦麻湯

滑胎通帶

催生如聖散黃蜀葵子小半合

一重方二

研爛以酒噀去

查溫過慎服神妙或漏血胎乾難產痛劇者併進三服

良久腹中氣寬胎滑即時產下

候病見正產候可用之

歌曰

黃藥子炒七十粒 細研酒調吞服急

塞
世以難逐閉

黃葵子炒七十粒

細研酒調濟君急

若也臨危難產時

免得全家俱哭泣

丹又方以香油蜜調小便和勻各半盞調益母草

一方止用細蜜小便打極勻融以難產

秘錄母以橫產不得出車前子末酒服二升

大令催生柞木飲子以產難橫逆或胎爛脹於腹中屢用

神効

生大柞木枝

一大握長一尺
先淨去剝為用

甘草

大者五寸
剝作五段

右用新汲水三升半同煎新以鞣肉以帛三重緊封

之文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐草

時溫飲一小盞腰未重痛休服

香以開胃
竅逐活血

便覺心下開豁如覺耳鳴又飲一盞至三四盞覺下
重便生

悔師以難產礙胎在腹如已見兒并胎衣不出胎死黃蒸

貝母各四兩為末米飲下一匙相去四五里不下再服

又方用通明乳香一梘如皂角子大為末腰痛時以新

汲水一小盞入醋少許同調令產母兩手提兩石熱

坐安飼藥飲之頃更坐草便生更無痛楚神驗

又方開骨膏取浮香研細五月五日午時滴小丸如雞

頭大每服一粒無灰酒吞下

又方催生神妙乳珠丹以乳香研細猪心血為丸桐

子大朱砂為衣日乾每飲一粒冷酒化下良久未下

再服一粒如大段難產以蓮葉心葉七介水二盞煎

再服一粒如大便難產以蓮葉心蒂七个水二盞煎
至一盞效温化下一粒良久未下亦可再服此藥靈
驗如神無有不下者合藥時要五月五日午時或七
月七日三月三日
又方乳香朱砂等分為細末麝香酒調下

又方乳香人參各一炙及砂半炙同研細用雞子清一
人調之生姜自然汁效開冷服如穢生倒生即時喘
順子母平安

大金勝金散問曰難產何答曰胎側有成形硯為兒枕子
欲生時枕破與敗血裹其子放難產但服此藥逐其
敗血即自生橫逆皆治

麝香 一分

藍鼓

一丹以舊青布裹燒令紅
急以乳搥研細

右為末取秤錘燒紅以酒淬之調下一分

催生丹治產婦生理不順產音難或撲或逆並皆治之

十二月兔腦髓

去皮膜
研如泥

乳香

另研極細
二分半

母丁香末 一分

麝香 另研細 一分

右三味拌勻以兔腦髓和丸如雞頭大陰乾油帛裹

每服一丸溫水下即產兒握藥出

勝金丹催產治難產聖妙寸金產方敗兔毫葉頭一枚

燒為灰研細生藕汁一盞下立產母若虛弱及素有

冷疾者認藕冷動氣即於銀器內重湯燻過後服

本方 主難產搗益母草取汁七合煎半頃服之下無新者

以乾者一丈握水七合温服

丹易產天麻丸 而天麻即益母草六月間為細末不拘

多少煉蜜丸圓眼大臨產時嚙化一丸能除產後百病

難產方

縮砂 醋香附 枳壳 甘草 滑石

右湯調下

催生用蒲黃、地龍、陳橘等地龍洗去土於新丸上焙令微黃、各為末、三處貯如經日不產、各炒一丸、七新水

調服甚妙

大金丹 催生神效七聖散 臨產腰痛方 可用之

玄胡 沒藥 白朮 白芷 薑黃

當歸 杜心

右為細末臨產陣痛時燒犁頭鉄通赤煑酒調三

服一二粒

山難產吞槐子十四粒逆產燒銅錢通紅放酒中飲之

全治胞漿破先惡水來多胎乾不得下時頂先與四物湯

補養血氣次更煎濃葱湯放冷如令坐墜洗產戶頂

是欵曲洗令氣上下通暢仍更用酥調滑石末塗產裏

次服神妙乳珠丹 葵白乾 如腫散 胎治漏

催生如神散治逆產橫生瘦胎

百草霜 香白芷 紅 見 紅 未

右二味等分研停每服二大分於臨產時以童便

并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用酒童便各半蓋
同煎熬沸即想服不過再服丹溪用芎歸湯調血血得
得乾生

又方以橫倒生者

明阿膠炒 滑石末各一兩 葵子二兩

右水一盞半煎至二盞去渣分二服

治雞產五六日不得食免疲困虛乏者

光明水膠二兩

右用好酒一升半微火搭膠入新雞子一個鹽一分
七攪溫令星毋坐倚上伸腰大口作二伸次服覺小
便生緣坐草大早驚動故也

潔半夏湯治胎乾而不能產

半夏 麩 一兩半
大黃 五分
桂 七分
桃仁 三十粒 微炒

右為粗末先服四物湯二服次服半夏湯生姜三

片小並

又方當歸為末酒調方寸七服之

如聖散膏治難產兼治胞衣不下及死胎

草麻子七粒去壳細研成膏塗脚心包即下速洗去

如不洗腸即推出却仍用此膏塗頂心腸自縮入方

用草麻子百粒 確黃一分
同研用如上法

催坐萬金不傳遇仙丹

草麻 十四个 去壳
朱砂
雄黃 五分
蛇蛻 一尺燒

右為細末漿水飯為丸如彈子大臨產時先用枳湯

淋洗臍下次安藥一丸於臍中用蠟帛數重覆臍上

以闊繫之須臾生下急取去藥一丸可用三次一方

麻子
三粒

世三麻四豆脫衣裳研碎將末入麝香若有婦人虛產難

貼於臍下內兩分張

用草麻子三粒
麝香研細貼臍中妙

治產危者五聖散丹取寒水石四兩內二兩生研細

二兩炭火五斤煨通赤取出同生者研細入朱砂同研

如深挑花色每用三分井花水調如薄糊用帛花剪如

杏葉大攤藥貼臍上候乾再易不過三上便產橫逆惡

候死胎不下並治神驗寒水石非方解石即令人謂軟

雜方

石膏也此方延國初異人傳之妙

圖經今人催生令產婦而手各握石燕一枚頃臯子則下

枚產經月不生

雲母粉半兩温酒調服入口當產萬不失一

陸氏

云已收三
之十八矣

治橫逆理不順

伏龍肝細研每服一分細研酒調服之其土省兒

頭上戴出妙

世神妙散治催生累効灵妙於理固難通於事實殊効始

選入以為濟人之一端儒而鑿者幸毋見斥也臨產時

令人路上尋草鞋一隻取耳燒灰温酒調下三升得左

足者生男得右足者生女愛者見死則者有散焉此藥莫

針灸

足者生男得右足者生女覆者見死側者有驚此藥等
是神奇用此送下催生丸化俗言左右震側者蓋必謂尋時路上初所得者也
東陽婦人將產在即預先胎破忽以長流至坐草時無血
可養姑竭

獨陰小五指三問

承陰一寸五分

三龍治橫生難養死胎

太冲八分神百息

合谷補

三陰交五辨瀉上時

足小指節三壯曰術多此一穴

產子上冲連心

巨關

今正坐用花頭極腰微候針入六分垂七呼

辰子項母口是說通於理姑鍾以俟智者用難其

合谷 三兮晉二

三陰 五兮馮十吸

張仲文

以橫難產

孫巨卿亦稱其效選入救急方

右腳小指尖頭

灸三壯之產扎脚者先以

集成又法

獨陰

在足第二指節下

合谷補

三陰交馮

右陰獨穴東陽集成所載各異未詳孰是然考諸甲

乙資生循經所穴十四經考揮釋義等書皆無是穴

誤能者正之

辛君治難產獨取三陰交

死胎

大全下死胎方

寒三批

○ 熱以行之

○ 寒以下之

桂枝二斤 麝香當門子一個 同研 煖酒服 須臾如手推
下比之 用水銀等此藥 不損血氣 麩和并一方 無麝香
單用桂末二斤 痛密時 童便調下 名救苦散

鄧知縣傳療死胎不出

朴硝細研半兩 以童子小便溫調下 屢効

○ 治死胎不出 指甲青舌青 脹悶口中 作糞臭 先以平胃

散一帖 作兩服 每服酒水各一盞 却投朴硝半兩 研細

再煮三五沸 溫服 其胎化血水下

治死胎腹中不出 其母氣絕 水銀二兩 吞之 立出 水也氣絕不用

本草治子死腹中不出 用辰砂一兩 以水煮數沸 未之然

後取酒服之 立出

燥
滑可去帶

外臺療子死腹中方真珠二兩為末酒調服盡立出

雲岐治妊娠三五月胎死腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮冬三 當歸一兩炒

滑石末七分 瞿麥 葵子 茯苓 粉草

子苓各半兩

右為粗末每服四升水煎

子母小兒死腹中或母疾欲下胎榆白皮煮汁服二升

千金胎死腹中葵子末酒服方寸匕忌口禁不閑格口灌

之藥下即活附後方固

大全治子死腹中或半生不下或半省脊骨在草不產血

氣上邊心口面無顏色氣欲絕

猪脂一升
白蜜一升
醪酒二升

雜方

猪脂一升並 白蜜一升 醇酒二升

右三味合煎取二升分濕二服不能飲隨能服之

世以生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急炒

蛇蛻一條全者香油炒 燕窩窠一个須用盛

右一處為末作一服酒半盞調服即生產効

揚氏療有孕月數未足子死腹中母欲問絕取大豆三升

醋煮濃汁三升頓服立產

本事治姙娘熱病胎死腹中鹿角湯

鹿角屑一兩水一碗葱五莖豉半合同煎至六

分去滓二服

大全取死胎用烏雞一隻去毛細剉以水三升煮取二升

考雞通手用衣帛薙摩暗上下其胎自出

方取死胎總是一味炸樹連枝葉又捷人易權方見

条大金方下

浙江圖書館

產後

胞衣不下 產後血暈 產後血不下

產後血不止 產後虛弱 產後無乳

乳汁自出 產後陰脫 產後血塊痛

大凡生產畢且令飲童子小便一盞不得便卧且宜閉自

而坐須更上床仰卧不宜側宜立膝床可伸足高倚床

頭厚鋪相禱遮圍而餘使無空隙免被賊風垂時令

人以物從心揜至脐使惡露不滯更三日內令產婦常

聞醋炭氣或燒乾屎烟如無乾屎以破舊屎器燒之以

防血運不問腹痛不痛有痛無病以童子小便和酒半

大金方

產後必用

襍方

熱在夏反

春夏者情之

蓋服溫五七次

陳藏云積年汁與產婦服之特芋麻
共產婦枕頭止血暈產婦腹痛芋安腹

上止痛

丹產後當太補血氣為先雖有雜証以未治之

大生地黃丸治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或

服衣不下失音不語心胸脹滿以穀不化口乾煩渴寒

熱往來口内生瘡咽喉腫痛心中怔忡夜不得睡產後

中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如脈肝膈腹痛

痛煩燥恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑

生地黃

研取汁

生姜

各二斤研取汁

蒲黃

當歸各四兩

右於銀石器內取生地黃汁炒生姜滓以生姜汁炒

地黃澤各令乾回味焙干為細末醋煮麵糊丸如
彈子大每服一九食前當歸酒化下一方只用生姜
地黃依文加法製之為末每服二小溫酒調下其曰
味者為神效

丹黑神丸產後脹之能生新血去舊血用白湯送下虛者
參朮陳皮湯送下方見催生條下

益母膏治產婦一切傷損一切血閉方見調經條下

大金丹產婦因暑月生產而涼大多得風冷腹中積聚百
病競起迄至於死者百方不差桃仁莖主之出尋後服

桃仁一千二百粒去皮尖及雙仁者盡令黃色

右一味搗令極細熟以上尋酒一斗五升研三四遍

寒症多及秋
冬者溫之

如作麥粥法以極細為佳細小長項甕瓶中密塞以
麵封之納傷中煮一復時不停火亦勿令火猛使餅
口常出在湯上勿令沒之熟訖溫酒服一合日再服
○里神散治婦人產後惡露不尽胞衣不下攻冲心胸痞
悶或濟復堅脹掃痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血
諸疾

熟乾地黄

蒲黃炒

當歸

乾姜炮

桂心

芍藥

甘草各四兩

黑豆

炒去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服

此里神散寒多及秋冬宜用之若性急形瘦夏日宜

審之

禁忌

丹胎前母帶 產後母虛

產後一切病皆不可發表

產後不可用芍藥以酸寒能伐生發之氣故也

全大不可吃物過多恐成積滯若朱滿月不宜多語喜笑驚

恐憂快哭泣思慮急怒強起離床行動久坐或作針工

忍食生冷粘硬肥膩魚肉之物及不避風寒當時未覺

滿月之後漸成勞九產後滿有日方可交合不痛至

死慮羸百病滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不

由早行房也

丹或曰初產之婦好血已虧汚血或畜彼黑神散非要藥

乎答曰至哉坤元萬物資生理之常也初產之產婦好

論海制星
神散例令
常服非是

言明非是
較諸問全
論引法星

持護之法禁

例服熱藥及

內汁雞子火

塩

血未必虧，虧血未必積，藏府未必寒，何以藥為？飲食起居勤加調護，何病之有？誠有虧血、體寒而怯，與之教，恬亦自問便，或有它病，當求病起何日，病在何經，氣病、血病、胎血、河用，悔制此方，例令服餌，設有性急者，形瘦者，本有怒火者，夏月坐導者，時有冷火，姜桂皆多禁藥，至於持護之法，尤為悖理，肉汁、葭陰、任之火，易成內傷之病也。先哲其其訓，戒胡為以羊糞、穢汁作糜，而又常服當歸，又當屏建中湯，四順理中丸，雖是補劑，亦是偏熱，藏府無寒，何處消受？若夫兒之初生，母腹頓寬，便嚼雞子且吃，火鹽不思，雞子雖化，火鹽發熱，履轉生証，不知所自，率尔用是藥，寧不誤人乎？每見產婦之無疾

者必教以命去星神散與夫雞子人塩諸品，而自食且與

者必教以卻去里神散與夫雞子火鹽諸品肉食且與
 白粥間以此少石者蓋者令甘淡食之半月後才與少
 肉若雞子亦須豁開淡煮大能養胃却疾彼富貴之家
 驕恣之嬾率有白帶風氣痛高喘痰逆口乾經事不調
 髮禿体倦皆是陽盛陰虛之病天生血氣本自和平白
 勝曰虛又烏知非此等繆述有此此之也耶

脈診婦人生產之後寸口弦疾不調者死况微附骨不絕
 者生

診婦人新生乳子脈沉小滑者生實大弦急者死

胞衣不下

大全奪命丹治血入胞衣衣為血脹不得下

附子半斤

牡丹皮一斤

乾棗一斤 碎之炒相尽

右為末以醪醋一升大黃末一斤熬成膏和藥丸如梧子大溫酒吞下五七丸不拘時此藥逐去胞中之血血散脹消胎衣自下矣

卷蕊石散治產後氣欲絕者緣敗血不尽血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心須煖急以童子小便調一斗取下惡物如猪肝終身無血風血氣疾鬲上有血化為黃水即吐出或小便出也方見跌撲傷換

黑龍丹治胎衣不下神効方見產後血不下
黑神散治惡露不快胞衣不下方見產通用

牛膝湯治胞衣不出臍腹堅脹急痛即殺人服此藥下胞

牛膝

瞿麥

各四兩

當歸

三兩

通草

六兩

滑石八兩

葵子五兩

右切以水九升煮三升分三服若衣不下腹滿即殺

推其原皆胞衣有血奔心是以不出服此藥衣即出

治胞衣不出牛膝一兩葵子一合以水一升煎取半升

合三服

日華子難產及胞衣不下即取尿一升用姜葱各一分煎

兩服沸乘熱飲便下

千金備急丹治產後惡露血冲心胎衣不下腹中血塊以

錦紋大黃一兩為細末用醞醋半升同煎如膏丸如

桐子大者用醋七分盞化五丸或七丸服之更

血下即愈

保胎衣不下或子死腹中或血冲上悶昏或血暴下及

胞乾不能生宜半夏湯主之

半夏 一兩

桂 七錢半

大黃 五分

桃仁 炒 三枚

右與先四物湯三兩服次與半夏湯三兩美三片水

一盞並至三合食後服未効再與下胎丸

下胎丸 卵生半夏白蘆各半兩為細末如丸桐子大

食後半夏湯下三十九漸加至五十九如未効者更

廣大其藥榆白皮散主之又不効大聖散主之有宿

積者宜服人參芥散

大全治胞衣不下惟老薑石散一件最為緊要若無老薑石散

此方宜服人參 芥散

大全治胞衣不下惟老薑石散一件最為緊要若鄉居藥

局局遠者倉卒無之今採得胡氏方一妙法若產訖胞

衣不下稍久則血流胞中為血兩脹上冲心胞喘危疼

痛必致危甚若有此証宜急斷臍帶以少物繫帶必用

心牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中則胞

衣自當痿縮而不縱淹涎數日亦不害人只要產母心

懷安奉終自下矣累試有驗 一法急來產母神腹効

治胎衣不下以蛇蛻炒焦細末酒下

如聖膏最捷効 方見胎前催生條 即用草麻子法也

若胎衣不出腹脹則殺人以黑豆一合炒熟入醋一盞

煎去豆分三服

大法

胞衣不出取灶內黃土一寸研碎用好醋調令得和內

於脬中續煎甘草湯三四令服之即下

山胎衣不下用取初生時洗兒湯服下一盞休令知

集成胎衣不下三陰交中極各瀉之

標出又法照海內關

曰女子字難若胞不出岷始主之

產後血暈

仲問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱胃三者大

便難何謂也師曰新者產血虛多汗出喜中冷故令病

瘧曰血復汗寒多故令鬱胃曰津液胃燥故大便難

鬱胃即今世

所謂血暈也

全大產後血暈者氣血暴虛未得安靜氣隨血上迷亂心神
致眼前生花極甚者令人悶絕不知人口禁神昏氣冷
但服清寃散即省

澤蘭葉

人參各二分

荆芥一兩

川芎半兩

甘草二分元方無甘草

右為末溫酒熟湯各半盞調一盞急灌之下咽即開

眼氣定

保治產後血虛血暈精神昏悶荆芥散

荆芥

一兩三分

桃仁

五分炒

衍義治產後血暈用荆芥穗為末童便調下二三分極効

產後血暈身痺直帶眼口角與目外眦向上啼急不知

陰血

下血少而暈者
宜破血

取雞子一枚去壳取清以荊芥末二分調服遂仍依

次調治若無他疾則不須治甚為敏捷效先

右荊芥例氣虛人不宜服

大

下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血下血少而暈

者之鬼露不上下搶於心、下滿急神昏口禁絕不知人

當破血行血

丹婦人產後血暈此延虛火載血漸一運時上未用鹿角

燒灰出血火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒

此物行血極効

雲岐獨行散治產後血暈昏迷不省冲心悶絕

五灵脂二兩半生半炒

右細末之量酒調下二分禁者初開灌之入後助

五灵脂二兩炒

右細末之溫酒調下二分口禁者拗開罐之入喉即

愈一个加荆芥等分为末童便調下

世傳治下或胎產後血上冲心死者陳效

右用鬱金燒存性為末二分釀醋一合調灌立活

簡要產後血暈心悶氣絕紅卷一子搗為末分作二服酒

二鍾煎取一盞併服如口禁幹閉灌之近効一方用紅

花三又新者無灰酒童便各半升者取一盞服之

肘後治血暈蘇方三又細剉水五升煮取二升分再服差

如無蘇方取排衣煮汁服亦得蘇方即蘇木也

聖惠產後血暈不知人及狂語麒麟竭一兩細研為末非

時濕以調下二分七分字差

保紅苓數治產後血昏血暈血崩月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川芎 紅苓 蒲黃 炒各等分

右為細末每半又酒煎和查溫服胎衣不下加榆白

皮湯半又

右破血輕劑

陳擇牡丹散治產後血暈悶絕若口禁批開灌之

牡丹皮 大黃 芒硝 各一分 冬瓜子 半合

桃仁 三七粒 去皮尖

右剉每服五分水三盞煎盡半去滓入硝又煎分二

服下

產書治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及

產後心悶手脚厥冷熱氣力欲絕血暈連心頭硬及

寒熱不禁接骨木破之如美子一握以水一升煎取半
升分溫兩服小便頻數惡血不止服之即差此木煮三
遍其力一般此是起死人方
梅骨木即跌打木是也

右重劑血点痛不出昔宜用

大金荳蔻散治產後氣欲絕惡血奔心至死者但以童

便調一分取下惡物極妙方見跌撲傷損

黑神散治產後血暈用細酒調服佳方具齊通用

右二方寒多人用之

芎藭加芍藥湯治產後去血過多而暈方見生後血不止

保嬰同治產後血暈危困

生地黄汁一夫

當歸二分半

芍藥二分半

下血多而暈者宜補血

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童便半盞
能之

梅師治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲
絕新羊血一盞飲之五兩服妙

大產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也破雞子三枚
吞之便醒若未醒可與童便一升甚騷大人小便亦得
切不得用病人者若產後去血多者又增此瘦與雞子
不醒者可急作竹瀝汁一服五合頃更不定再與五合
頗與三五服著

丹婦人年三十餘面白形長心中常有不平事急夜半談
子方今老侵晨暈厥不知人遂急於氣每灼火五十壯

陽氣
面白形長者
陽虛

面白而長者
陽虛

嘔而頭汗者
陽盛

雜方

而蘇後以參朮等藥兩月而安

仲一產婦鬱胃其脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所

以然者血虛而厥，而必胃家欲解必大汗出以血

虛下厥孤陽上出故頭出汗所以產婦喜汗出者已陰

血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能出

食小柴胡湯主之 鬱胃即暈

全治產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入在右

嘴瓶內煎熱醋沃之便密縛瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣

透入須先扶起

又方如覺暈即以醋灑面甦未即與醋細飲之又以

醋塗口鼻并置醋於傍使聞其氣

針灸

又法治血暈者急取乾凍大燒取烟以白鼻即醒如
無乾凍舊凍亦可

又方治產後血暈用半夏末之少許吹入鼻中

本草治胎後血上冲心生姜五兩切以水八升煮三升分

三服

丹醋墨治防產時血暈好墨半定火燒赤投醋中如此三

遍出火毒研細每服半匙淡醋湯下

摘英產後血暈不省人事

三里 支溝 三陰交 心術無此一穴

標出 又法陰交 陽別

世傳又法神門 內關 不應 取後穴 關元

汚血

產後血不下

保治婦人惡血不下川芎芫花各等分為細末每服三

酒炒下

又好墨醋碎為末小便酒炒下炒

大全產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈痛

如錐刺

當歸一兩

桂心

芍藥各半兩

桃仁

去皮尖炒研

沒藥

研各一分

蜚蠊

去足炒

水蛭

炒各三十枚

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下

石峻劑

治產後惡露不下

乾荷葉 二兩
鬼箭羽
批仁
劉寄奴

蒲黃 各一兩

右為粗末每服三大匙以童子小便一大盞姜二片
生地黃一分搥碎同煎至六分去滓無時熱服

梅師治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

本草治產後血不下益母草搥汁後每服一小盞酒一合

溫攪勻服

千金產後血不出去麻子五升酒一升浸一宿明旦去滓

溫服一升不差再服一升不吐不下不得與男子通

一月好養如初差

大全 里龍丹治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾

寒帶

垂死者但灌藥得下無不効即全活神驗不可言

當歸 五灵脂 川芎 良姜 熟地黃各一兩

右剉以水合盛者石脂泯縫筋鹽泥固濟炭火十斤
煨令通赤去火候冷取開看或糟里色取出細研却
入後藥

百草霜 麝香 乳香 荅菴石 琥珀各半

右五味並細研與前五味再研如法脩製和勻以米
醋煮麴糊丸如彈子大每服一丸炭火煨令通赤投
於生姜自然汁內和童便無灰酒研開搗服立効

產後血不止

芎歸加芍藥湯治產後血崩

眩暈不
知人事

虛中冒寒

虛中有滯

障者舉之

川芎

當歸

芍藥等分

右以咀每服四升水盪半煮七分去查無時熱服

岐產後血崩如豆汁甚黑過多者曰物湯加蒲黃生地汁

阿膠 蜀椒 艾 白芷

丹七 二孺人產後冒寒哭多血再下身腫肌沉

當歸 白朮 三升 陳皮 芍藥 川芎

生乾姜 黃芩 炙甘草 分二貼

王孺人曰憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛此係虛氣

滯惡物不尽

炙草 分 作湯下五之丸六十粒食前

千金翼 治產後惡血不盡或經月半歲升麻三升清酒五

通者舉之
千金翼
治產後惡血不盡或經月半歲并麻三及青酒五

溫可去脫

升者取二升半分溫再服

雲岐 牡蛎散治產後惡露淋漓不絕心悶短氣四肢之弱

頭目昏重煩熱

保三元湯治產後日久虛弱勞而脈厚疾者方見婦人部

小胡合曰物也

治產後日久虛勞針灸不効者三分散此曰君子曰物

和之也

白朮 川芎 芍藥 黃芪 茯苓 熟地各一及

柴胡 人參各一 黃芩各一 半夏 甘草各六分

右為粗末每服一及水一盞半煎服溫酒日三

全當歸羊肉湯治產後雜無疾苦但覺虛弱兼心腹痛者

虛寒

大

肥羊肉

一斤去脂水一斗

當歸五斤

黃芪四斤

生薑六斤

右以肉汁煮三味取二升五合分爲四服若覺惡露

不尽加桂三斤惡露下多加芎三斤有寒加茱萸一

斤有氣加細辛二斤有熱加生地黄汁二合

保胎產婦虛勞不能食十全散方見治虛實

羅當歸建中湯治婦人一切血氣俱損及產後勞傷虛羸

不足腹中疔痛吸少氣小腹拘急引腰自汗不思飲

食方見腹痛門

雲岐治產後虛損飲食不下回物加建中人參白朮茯苓

主之

產後無乳

產後無乳

虛實

全大 累經產而無乳者已津液故也頃服滋溢之藥以動之
 若雖有乳又却不甚多者頃服通紅之藥以動之仍以
 羨懼飲之蓋婦人之乳資於冲脉與胃經通故也大抵
 婦人素有疾在冲任經者乳汁少時甚色帶紅所生之
 子怯弱而多疾



無擇乳汁不行有血氣盛而壅閉不行者有血氣弱瀆而
 不行者虛當補之實當疎之疎用通草漏芦土瓜葶補
 用鍾乳粉猪蹄鯽魚之屬漸
 大全治乳無汁

- 牡蛎
- 川芎
- 熟地
- 白茯苓
- 龍骨各一兩

實當疎之

續斷 當歸炒 艾葉 酒炒 五味子 人參

地榆各半兩 甘草二兩半

右為末每服三分生薑三片棗一枚水同煎食前

產書產後猶有餘血水氣者宜服豆淋酒兩黑豆五升熬

令爛絕出於糞器之以酒一斗淬之

右豆淋酒汚血又缺發表也

大全治產後血不止虛羸危死用蒲黃二兩水二升煎取

八合頓服

治產後惡血不絕腹中絞痛氣息急

亂髮燒兩 阿膠二兩 代赭石 乾姜各三兩

馬蹄不燒 乾地黄四兩 牛角腮 五兩酥炙

馬蹄 不燒 乾地黃 四兩 牛角腮 五兩 酥炙

寒

雜方

右為細末煉蜜丸如桐子大空心半飲下三四十九

日二服

千金治產後崩中下血不止萸蒲一兩半剉酒二盞煎取

一盞去滓分三服食前

丹產後血崩取木月成片燒灰為末用麝香一分 和壳

去穢內用濕紙包慢火煨令香熟研細入藥每用一分

烏梅湯調下

右木月蓋木耳之類乃俗稱木疊屑也按木耳治崩

中帶下

本草產後血不止灸桑皮煑水飲之

子母秘錄治落胎下血不止以桑木中蝎虫燒末酒服方寸匕

虛 虛 虛 執

日二服

產後虛弱

丹產後補虛

人參 白芷 同上

黃芩 當歸 身尾

川芎 各半斤

陳皮 三分

右水煎服如有寒加乾姜三分茯苓一分

瓜 漏芦 各三兩 甘草 二兩 通草 四兩

右水八升煎取二升分溫三服

產室治產後乳無汁括萸末并卷水服方寸匕日二服夜

流出

集驗下乳汁瓜萸子淘洗控乾令香熟瓦上掬令白色為

集驗下乳汁瓜菓子淘洗控乾令香熟一匙上掬令白色為

末酒調下一七合臥少時

產言下乳汁五爪為末酒服一分日三

本草下乳汁以京三稜三箇水二椀煎取一椀洗好取汁

為度驗

丹婦人乳不行葛苴子糯米各一合細研水一椀攪勻入

甘少末一字並之溫呷頻與効

岐立効方下乳汁

粳米 糯米 各半合 葛苴 各並淘淨 生甘草半又

右煎汁一升研藥令細去滓分作三服立下

又方猪蹄二隻 通草四升 右以水一斗煮作羹食之

羅涌泉散治婦人乳汁日氣絕少

虛當補之

瞿麥稜 麥門冬 緊龍骨 川山甲 炮黃

王不留行

右為細末每服一分熱酒調下後吃猪蹄羹少許

又用木梳左右乳上梳三二十梳日三服依前法

又方治奶汁少 瓜蒞根 薄荷幹身等分為粗末

先吃羊骨汁一碗次服藥後再吃葱蒜羊羹少汁妣

釵有人乳脉不行已七十日諸藥無効偶有人送赤豆一

斗遂如常煮赤豆粥食之當夜乳脉通行

乳汁自出

大產後乳汁自出者謂之乳泣生子多不育產後乳汁自

出蓋是身虛宜服補藥以止之若乳多忌痛而出者溫

虛實

不痛為虛

不痛為虛

出益是身虛宜服補藥以止之若氣足身痛而出者溫

虛

帛熨之漏芦散亦可

漏芦

二斤半

蛇蛻一条

瓜蒌十个

為末酒調服無時

產後陰脫

丹辯婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕下有

二帕尖約重一斤余思之此胎前因勞乏傷氣成肝痿

所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐凍乾損壞急與

黃芪半斤人參一斤白朮半斤當歸一斤升麻二斤三

帖連與服之即收上得汗通身迺安但下齋沾席如乾

者落一片約五六兩重蓋脂膜也乃食進得眠診其

脉皆瀼左畧弦視其形却實與白朮芍藥當歸各一斤

半陳皮一斤生薑一片黃二三帖養之而愈

一婦人產子後冰戶中下一物如合鉢狀有二歧其夫
來求治予思之曰此子宮也必氣血弱而墜下用升麻
當歸黃芪大料二帖與之信日後其夫復來曰服二次
後覺響一聲視之已收入陰戶訖但目經宿乾省席上
破一片如掌心大在席上其妻在室恐腸破不可復生
予思之曰此非腸胃行糟粕者也肌肉破尚復完若氣
血充滿必可生足遂用四物加人參服百帖三年後生
一子治子宮下用黃芪一升半人參一升歸七分升麻
三分甘少二分作一帖水一中盞取五分去滓食前服
却用五倍子末湯泡洗又用末付之如此數次宜多藥
永不下

雜方

治脫胎蓋產時努力太過以致脫胎若脫肛狀尺水投
出逼迫腫痛舉重房勞皆能費作清冰續小便淋露
用硫黃烏賊魚骨各半兩五味子一分為末付患處服
參芪歸草升麻等補藥

治產後脫下脫人屎燒酒調下方寸七日三千金魚擇

蟹頭灰亦治方見脫肛條

火全治產後水腫下脫內出玉門不開

石灰一升炒能令燒草自則可

右熱湯二升投灰中適溫冷澄清出水中以浸玉門

斯須平復

又方以鉄精粉上推內之又灸臍下橫紋二七壯

針灸

一法用鉄精草羊脂二味攪令稠布裹灸熱推內之
鉄精是鍛鉄灶中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅
鉄者

又方單炒蛇床子一升乘熱以帛裹熨患處亦治產後

冰口痛

子母療產後冰下脫燒兔頭為末付之

東陽女人胞門落頓類不收常濕 神闕灸 玉泉五十壯

身交膈下橫紋中灸五十壯三振

又法

玉泉傍各開三寸 灸隨年壯三振

女人胞門極冷腫 飯來三十壯

甲婦人胎挺出四肢浮燥身悶少海主之一作照海

醫學綱目卷之三十五 終

浙江圖書館

女人胎門極冷腫

飯來三十壯

浙江圖書館藏

浙江圖書館藏



浙江圖書館



浙江圖書館


浙江圖書館善本

甲登記號：010776

一九 年 月 日



浙江圖書館



卷
三十四
三十五



浙江圖書館



浙江圖書館

