

T 7903/1383(19)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

卷卅二十九

外科

景岳全書

四十六



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, appearing as ghostly characters in vertical columns.

景岳

景岳全書外科鈐目錄聖集

外科上

卷之四十六

經義 一

論證 三

虛實 五

總論治法 七

托裏 九

論灸法 十一

脈候 二

善惡逆順 四

淺深辨 六

敗毒 八

論汗下 十

膿針辨 十二



景岳全書外科鈐目錄

論針法 十三

用針勿忌鬼神 十四

圍藥 十五

腐肉 十六

含時從證 十七

陽氣脫陷 十八

溫補按則 十九

定痛 二十

生肌收口 二十一附

用香散藥 二十二

槐花酒 二十三

忍冬酒 二十四

腫瘍 二十五

腫瘍不足 二十六

潰瘍 二十七

潰瘍有餘 二十八

潰瘍作痛 二十九

潰瘍發熱 三十

發熱煩躁 三十一

作嘔 三十二

作渴 三十三

瀉痢 三十四

大便秘結 三十五

小便淋澁不利 三十六

發瘧 三十七

無寐 三十八

瘡瘍出血 三十九

戒忌調護 四十

陰陽證變 四十一

論列方 外科上

卷之四十七

外科下

發背 四十二

腦疽 四十三

全書卷四十七

外科上目

耳瘡 四十四

鬚疽 四十五

疥腮 四十六

癩癧 四十七

疔瘡 四十八

時毒 四十九

肺癰肺痿 五十

乳癰乳巖 五十一

胃脘癰 五十二

腹癰 五十三

腸癰 五十四

附骨疽 五十五

臀癰 五十六

流注 五十七

鶴膝風 五十八

多骨疽 五十九

下疳瘡 六十

便毒 六十一

景岳人楊梅瘡 六十二

囊癰 六十三

懸癰 六十四

脫疽 六十五

腳發 六十六

足跟瘡 六十七

腎臟風瘡 六十八

廉瘡 六十九

天泡瘡 七十

赤白遊風 七十一

翻花瘡 七十二

痔漏 七十三

跌打損傷 七十四

杖瘡 七十五

破傷風 七十六

類破傷風 七十七

斑疹丹毒 七十八

癰贅 七十九

全書卷四十一
疔 八十

論列方 外科下

景岳全書卷之四十六聖集

外科鈐上

會稽 張介賓 會卿著

會稽 管 超 謙菴訂

外科鈐上

經義

癰疽篇黃帝曰血氣已調形氣乃持余已知血氣之平與不平
未知癰疽之所從生成敗之時死生之期有遠近何以度之
可得聞乎岐伯曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天

宿失度，日月薄蝕，地經失紀，水道流溢，草壹不成，五穀不殖，
徑路不通，民不往來，巷聚邑居，則別離異處，血氣猶然，請言
其故。夫血脈營衛周流不休，上應星宿，下應經數，寒邪客於
經絡之中，則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，
故癰腫。寒氣化爲熱，熱勝則腐肉，肉腐則爲膿，膿不瀉則爛，
筋筋爛則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，不得泄寫，血枯空虛，
則筋骨肌肉不相榮，經脈敗漏，薰於五藏，藏傷故死矣。○黃
帝曰：願盡聞癰疽之形與忌，曰：名岐伯曰：癰發於嗑中，名曰
猛疽，猛疽不治，化爲膿，膿不寫，塞咽，半日死，其化爲膿者，寫

則合豕膏冷食三日已。○發於頸，名曰天疽，其癰大以赤黑，
不急治，則熱氣下入淵腋，前傷任脈，內薰肝肺，薰肝肺十餘
日而死矣。○陽氣大發，消腦留項，名曰腦燂，其色不樂，項痛
而如刺，以針煩心者，死不可治。○發於肩及臑，名曰疵癰，其
狀赤黑，急治之，此令人汗出至足，不害五藏，癰發四五日，送
熨之。○發於腋，下赤堅者，名曰米疽，治之以砭石，欲細而長，
踈砭之，塗以豕膏六日已，勿裹之。○其癰堅而不潰者，爲馬
刀挾纓，急治之。○發於胸，名曰井疽，其狀如大豆，三四日起，
不早治，下入腹，不治七日死矣。○發於膺，名曰耳疽，色青，其

狀如穀實蕪蕪常苦寒熱急治之去其寒熱十歲死死後出
 膿○發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其病大癰
 膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉陵薹草根各一升以
 水一斗六升煮之竭為取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗
 出至足已○發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏
 骨不急治二十日死矣○發於屍名曰銳疽其赤堅大急治
 之不治三十日死矣○發於股陰名曰赤施不急治六十日
 死在兩股之內不治十日而當死○發於膝名曰疵癰其狀
 大癰色不變寒熱如堅石勿石石之者死須其柔乃石之者

生○諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日
 死發於陰者三十日死○發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急
 治之不治害人也○發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變
 數石其輪而止其寒熱不死○發於足上下名曰四淫其狀
 大癰急治之百日死○發於足傍名曰厲癰其狀不大初如
 小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足
 指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則
 死矣○黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留於
 經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而

不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐腐則爲膿然不能陷骨
髓不爲焦枯五藏不爲傷故名曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰
熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣竭當其癰下筋
骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之
皮癰者其皮上薄以澤此其候也

玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽
氣有餘營氣不行乃發爲癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲
膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者
多害故其已成膿血者其唯砭石鍼鍼之所取也黃帝曰多

害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉以爲傷者其白眼青
黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是三逆
也肩項中不便是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五者爲
順矣

寒熱病篇曰五藏身有五部伏兕一腓二腓者膈也背三五藏
之膺四項五此五部有癰疽者死○凡刺之害中而不去則
精泄不中而去則致氣精泄則病甚而悞致氣則生爲癰疽
也

生氣通天論曰高粱之變足生大疔受如持虛○汗出見濕乃

生痿痺○勞汗當風寒薄爲皴鬱乃瘞○營氣不從逆於肉
理乃生癰腫○陷脉爲瘻留連肉腠○因而飽食筋脉橫解
腸澼爲痔

陰陽別論曰三陽爲病發寒熱下爲癰腫

脉度篇曰六腑不和則留結爲癰

異法方宜論曰東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆爲癰瘍其
治宜砭石故砭石者亦從東方來

氣穴論曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會
以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉執肉敗榮衛不行必將爲

膿內消骨髓外破大腠留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛
不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不足
大寒留於谿谷也

刺節真邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其
入深內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋攣搏於脉中則爲
血閉不通則爲癰○虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留
而內著寒勝其熱則骨疼內枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿
內傷骨內傷骨爲骨蝕○有所疾前筋筋屈而不得伸邪氣
居其間而不反發爲筋澀○有所結氣歸之衛氣歸之不得

反津液久一留合而爲腸溜○久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液溜之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔癰○以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則爲骨疽○有所結中於肉宗氣歸之邪留而不失有熱則化爲膿無熱則爲肉疽○凡此數氣者其發無常處而有常名也

病能論黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰珍此者當候胃脉其脉當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲

癰也○帝曰有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆愈其真安在岐伯曰此同名異等者也夫癰氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異治也

脉要精微論帝曰諸癰腫筋孿骨痛此病安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也

厥論曰少陽厥逆机関不利机関不利者腰不可以行項不可以顛發腸癰不可治驚者死

寒熱篇帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆

鼠痿寒熱之毒氣也。留於脉而不去者也。鼠痿之本皆在於藏其末上出於頸腋之間。其浮於脉中而未內著於肌肉而外爲膿血者易去也。黃帝曰：去之柰何？岐伯曰：請從其本引其末，可使衰去而絕其寒熱。宜按其道以予之。徐往徐來以去之。其小如麥者一刺，知三刺而已。黃帝曰：決其死生柰何？岐伯曰：反其目視之。其中有赤脉，上下貫瞳子，見一脉一歲死，見二脉半一歲死，見三脉二歲死，見四脉半三歲死，見五脉半三歲死，見六脉半三歲死，見七脉半三歲死，見八脉半三歲死，見九脉半三歲死，見十脉半三歲死。見三脉三歲死，見赤脉不下貫瞳子可治也。

通評虛實論曰：所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時

回

氣交變大論曰：歲火太過，民病身熱骨痛，而爲浸淫。○歲金太

過，民病兩脇下少腹痛，目赤痛背瘍，耳無所聞。○歲木不及

復則炎暑流火，濕性燥病，寒熱瘡瘍，疥癩癰疽。○歲金不及

復則寒雨暴至，民病口瘡。○歲水不及，民病寒瘍流冰。

五常政大論曰：委和之紀，其病支廢癰腫瘡瘍。○卑監之紀，其

動蕩痛分潰癰腫。○赫羲之紀，其病笑瘡瘡瘍。○堅成之紀，

其動暴折，湯注。○少陽司天，火氣下臨，鼻塞瘡瘍，太陽司天

寒氣下臨，甚則肘腫，身後癱。少陰司天，熱氣下臨，甚則瘡瘍。

○地有高下，氣有溫涼。高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者，脹之溫熱者，瘡下之則脹已。汗之則瘡已。

脈候二

浮數之脈，應發熱。其不發熱而反惡寒者，若有痛處，瘡疽之謂也。

洪大之脈，其主血實積熱瘡腫。凡洪大者，瘡疽之病進也。膿未成者，宜下之。膿潰之後，脈見洪大，則難治。若兼自利，尤爲凶候。

數脈主熱，浮而數者爲表熱，沉而數者爲裏熱。諸緊數之脈，應發熱而反惡寒者，癰疽也。仲景曰：數脈不時見，則生惡瘡也。又曰：肺脈數者，生瘡也。凡諸瘡脈至洪數，其內必有膿也。實脈主邪盛，邪氣盛則實也。瘡疽得此，可下之。若久病虛人，則最忌之，以正不勝邪也。

滑脈多陽，或爲熱，或爲虛瘡疽。得此膿未成者，可內消。膿已潰者，宜托裏。所謂始爲熱，終爲虛也。散脈爲血虛，有表無裏也。凡瘡毒膿潰之後，脈見洪滑粗散而煩痛不除者，難治。以其正氣虛，邪氣實也。又曰：肢體沉重，肺脈大則斃，謂其浮散無根也。

長脈主陽氣克實傷寒得之將欲汗解也長而緩者胃脈也百病得之皆愈故曰長則氣治也

脈主陰虛血虛膿潰後得之爲宜以脈病相應也

弦脈主肝邪瘡疽論曰弦洪相搏內寒外熱欲發瘡疽也

緊脈主切痛積癖凡瘡疽得此則氣血畱滯邪結不散多爲痛也

短脈主虛經曰短則氣病以其乏胃氣也瘡瘍脈短真氣虛也諸病見之皆爲難治尤不可攻也

澁脈主血虛氣澁瘡瘍潰後得之無妨

沉脈爲陰瘡瘍得之邪氣深也

遲脈主陽氣不足瘡瘍得之潰後自愈

緩脈無邪長而緩者百病皆宜瘡瘍得此則易愈以其有胃氣也

弱脈主氣血俱虛形精不足大抵瘡家之脈凡沉遲濡弱者皆宜托裏

微脈主虛真氣復則生邪氣勝則死瘡瘍潰後微而和者將愈也

細脈主陽衰瘡腫脈細而沉者裏虛而欲變證也

虛脈空而無力，脈虛則血虛，血虛生寒，陽氣不足也。瘡瘍得之，止宜托裏養血補氣也。

軟脈少神，元氣弱也。凡瘡瘍之脈，但見虛遲軟弱者，悉宜補虛排膿托裏。○牢脈堅強，陰之虧也。凡癰癧結腫之類，診得牢脈者，皆不可內消也。

結促之脈，凡陰衰則促，陽衰則結。大抵結促之脈，由氣血俱虛而斷續者居多。瘡瘍得之多宜托裏。然有素稟結促者，又當以有力無力辨其虛實。實者可下，虛者不可不補。

右癰疽脈二十二種，大都微弱虛細遲緩短澁者，必氣血皆虛。形精不足，俱當用補用托，不可妄攻無待言也。卽如浮滑弦洪結促等脈，此中最有疑似，亦不得以全實論治，必須詳審形證，或攻或補，庶無誤也。

齊氏曰：瘡瘍之證，若不診候，何以知陰陽勇怯，血氣聚散。又曰：脈洪大而數者實也，細微而數者虛也。

河間曰：脈沉實者，其邪在臟；浮大者，其邪在表。立齋曰：癰疽未潰而脈先弱者，何以收斂。

論證三

凡瘡瘍之患，所因雖多，其要惟內外二字。證候雖多，其要惟陰

陽二字知此四者則盡之矣然內有由臟者有由腑者外有在皮膚者有在筋骨者此又其淺深之辨也至其爲病則無非血氣壅滯營衛稽留之所致蓋凡以鬱怒憂思或淫慾丹毒之逆者其逆在肝脾肺腎此出於臟而爲內病之最甚者也凡以飲食厚味醇酒炙博之壅者其壅在胃此出於腑而爲內病之稍次者也又如以六氣之外襲寒暑之不調侵人經絡傷人營衛則凡寒滯之毒其來徐來徐者其入深多犯於筋骨之間此表病之深者也風熱之毒其來暴來暴者其人淺多犯於皮肉之間此表病之淺者也何也蓋在臟在骨

者多陰毒陰毒其甚也在腑在膚者多陽毒陽毒其淺也所以凡察瘡瘍者當識癰疽之辨癰者熱壅於外陽毒之氣也其腫高其色赤其痛甚其皮薄而澤其膿易化其口易斂其來速者其愈亦速此與臟腑無涉故易治而易愈也疽者結陷於內陰毒之氣也其腫不高其痛不甚其色沉黑或如牛領之皮其來不驟其愈最難或全不知痛痒甚有瘡毒未形而精神先困七惡叠見者此其毒將發而內先敗大危之候也知此陰陽內外則癰瘍之槩可類見矣然此以外見者言之但癰瘍之發原無定所或在經絡或在臟腑無不有陰陽

之辨若元氣強則正勝邪正勝邪則毒在腑在腑者便是陽毒故易發易收而易治元氣弱則邪勝正邪勝正則毒在臟在臟者便是陰毒故難起難收而難治此之難易全在虛實實者易而虛者難也速者易而遲者難也所以凡察癰疽者當先察元氣以辨吉凶故無論腫瘍潰瘍但覺元氣不足必當先慮其何以收局而不得不預爲之地萬物見病治病且願目前則鮮不致害也其有元氣本虧而邪盛不能容補者是必敗逆之證其有邪毒熾盛而脈證俱實者但當直攻其毒則不得誤補助邪所當詳辨也

華元化曰癰疽瘡腫之作皆五臟六腑蓄毒不流非獨因營衛閉塞而發也其行也有處其主也有歸假合發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於筋膜者肝之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒發於外者六腑之毒發於內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑則易治感於五臟則難瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血虫近膚者久不愈則傳氣成漏成虫則多痒少痛或先痒後痛或漏則多痛少痒或不

全書卷四十一
外科
三
一
痒不痛內虛外實者多痛少痒血不止則多死潰膿則多生
證候多端要當詳治

伍氏云癰疽之疾有二十餘證曰慄發痼發石發岩發峯窠發
蓮子發椒眼發連珠發竟體發腸癰內發腦背發眉發腮頰
發肺癰瓜瓠發大率隨病淺深內外施治不可遲緩初發如
傷寒脉浮而緊是其候也

又曰五臟六腑俞穴皆在背凡患瘡證有傷臟膜者多致不
救腑氣浮行於表故癰腫浮高爲易治臟血沉寒主裏故疽
腫內陷爲難治

又曰癰者節也癰者壅也疽者沮也一寸至二寸爲癰二寸
至五寸爲癰一尺爲疽一尺至二尺爲竟體疽若脉洪數者
難治脉微瀦者易治初覺宜清熱拔毒已潰則排膿止痛膿
盡則長肌敷痂當酌輕重順逆而審治之

馬益卿癰疽論曰人有四肢五臟一覺一寐呼吸吐納精氣往
來流而爲營衛暢而爲氣色發而爲聲音陽用其形陰用其
精此人之常數所同也至其失也蒸則生熱否則生寒結則
爲癰贅陷則爲癰疽疑則爲瘡癰憤則結癭怒則結疽又五
臟不和則九竅不通六氣不和則畱結爲癰皆經絡澁滯氣

血不流風毒乘之而致然也

薛立齋曰瘡瘍之作皆由膏梁厚味醇酒炙燻房勞過度七情鬱火陰虛陽痿精虛氣節命門火衰不能生土營衛虛弱外邪所襲氣血受傷而爲患當審其經絡受證標本緩急以治之

陳良甫曰外如麻裏如瓜又曰外小如錢內可容拳

善惡逆順 四

癰疽證有五善七惡不可不辨凡飲食如常動息自寧一善也便利調勻或微見乾澁二善也膿潰腫消水漿不臭內外相

應三善也神彩精明語聲清亮肌肉好惡分明四善也體氣

和平病藥相應五善也○七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚眼前

向鼻瀉利無度小便如淋一惡也氣息綿綿脈病相反膿血

既泄腫焮尤甚膿色臭敗痛不可近二惡也目視不正黑睛

緊小白睛青赤瞳子上視睛明內陷三惡也喘粗短氣恍惚

嗜臥面青唇黑便污未潰肉黑而陷四惡也肩背不便四肢

沉重已潰青黑筋腐骨黑五惡也不能下食服藥而嘔食不

知味發痰嘔吐氣噎痞塞身冷自汗耳聾驚悸語言顛倒六

惡也聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫七惡也五善者病

悸

在腑在腑者輕七惡者病在臟在臟者危也

齊氏曰病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是豈淺識之所知哉然五善并至則善無加矣七惡并至則惡之極矣凡五善之中乍見一二善證瘡可治也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵瘡疽之發虛中見惡證者不可救實證無惡候者自愈又凡膿潰之後而煩疼不除診其脈洪數粗散者難痊微澁遲緩者易愈此善惡之證於診候中亦可知也若發背腦疽及諸惡瘡別有五逆之證者白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是爲五逆其餘熱渴利嘔益毒氣入裏臟腑之傷也可隨證以治之

出外科精義
宋齊德之著

陳氏曰病有甚而致生有微而致死病證難辨死生何從決乎

若曰發背潰透內膜者死未潰內陷面赤唇黑便汚者死煩悶者不治潰喉者不治陰患入腹者不治入囊者不治鬢深寸許者不治顛後一寸三分名銑毒亦不治無此者生流注

雖多療之必愈

出外科精要宋
臨江陳自明著

發揮曰大抵發背腦疽脫疽腫痛色赤者乃水衰火旺之色多可治若黑若紫則火極似水之象乃其腎水已竭精氣枯涸

也。決不治。又骨髓不枯，臟腑不敗者，可治。若老弱患此，瘡頭不起，或腫硬色天，堅如牛領之皮，脈更瀯，此精氣已絕矣，不可治。或不待潰而死，有潰後氣血不能培養者，亦死。

立齋曰：瘡瘍之證，有五善七惡。善者勿藥自愈，惡者乃五臟虧損之證。多因元氣虛弱，或因膿水出多，氣血虧損，或因汗下失宜，營衛消鑠，或因寒涼剋伐，血氣不足，或因峻厲之治，胃氣受傷，以致真氣虛而邪氣實，外似有餘而內實不足。法當純補胃氣，多有可生，不可因其證惡遂棄而不治。○若大渴發熱，或泄瀉淋閉者，邪入內淫一惡也。竹葉黃芪湯，血氣俱

虛，八珍湯加黃芪、麥冬、五味、山茱萸，如不應，佐以加減八味

丸煎服。○膿血既洩，腫痛尤甚，膿色敗臭者，胃氣虛而火盛

二惡也。人參黃芪湯，如不應，用十全大補湯加麥冬、五味。○

目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上視者，肝腎陰虛，而目

系急三惡也。六味丸料，如或陰中有火，加炒山梔、麥冬、五味，

如不應用，八珍湯加炒山梔、麥冬、五味，喘粗短，氣恍惚，嗜臥

者，脾肺虛火四惡也。六君加大棗、生薑，如不應用，補中益氣

湯加麥冬、五味，心火刑剋肺金，人參平肺散，陰火傷肺六味

丸加五味子煎服。○肩背不便，四肢沉重者，脾腎虧損五惡

也補中益氣湯加熟地山藥山茱萸五味如不應用十全大補湯加山茱萸山藥五味○不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁如不應急加附子○聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加大棗生薑如不應用六君子湯加炮薑更不應急加附子或用十全大補湯加附子炮薑○腹痛泄瀉欬逆昏憤者陽氣虛寒氣內滯之惡證也急用托裏溫中湯後用六君子湯加附子或加薑桂溫補此七惡之治法也○此外更有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不寧牙關

緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲投於水其脈浮大按之微細衣厚仍寒此血氣虛極傳變之惡證也○若手足逆冷肚腹疼痛泄利腸鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡證也○若有汗而不惡寒或無汗而惡寒口緊足冷腰背反張頸項強勁此血氣虛極變瘵之惡證也俱急用參芪歸朮熟地附桂之屬按之間有可生者宋時齊院令雖嘗纂其狀而未具其因皇明陶節菴雖各立一方亦簡而未悉予故補其缺云

又曰前證善者乃五臟未傷病微邪淺使能慎起居節飲食則勿藥自愈惡者乃五藏虧損之證前哲雖云不治若能補其脾胃固其根本多有可生者豈可以其惡而遂棄之耶

虛實 五

齊氏曰瘡疽之證有臟腑氣血上下真邪虛實不同也不可
辨如腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽
之虛也○大便硬小便瀉飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢
節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神悶塞者悉臟腑
之實也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足厥冷脉弱皮寒

小便自利或小便短少大便滑利聲音不振精神困倦悉臟
腑之虛也○凡瘡疽腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠
粘頭目昏重者血氣之實也凡膿水清稀瘡口不合聚腫不
赤不堪熱痛肌寒肉冷自汗色天者氣血之虛也○頭痛鼻
塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上
實也精滑不禁大便自利腰腳沉重睡臥不寧者下虛也○
腫焮尤甚痛不可近寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩
悶恍惚不寧者邪氣之實也肩項不便四肢沉重目視不正
睛不瞭瞭食不知味音嘶色敗四肢浮腫多日不潰者真氣

之虛也。○又曰邪氣勝則實真氣奪則虛。○又曰諸痛爲實諸痒爲虛也。○又曰診其脈洪大而數者實也細微而軟者虛也。虛則補之和其氣以托裏也實則瀉之疎利而導其滯也。內經曰血實則決之氣虛則掣引之。○又曰形傷痛氣傷腫先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也。

精要曰凡瘡疽腫高痛甚煩渴飲冷此病氣元氣俱有餘宜用清熱消毒散仙方活命飲爲主若腫高痛甚口乾飲熱此病氣有餘元氣不足宜用托裏消毒散爲主若漫腫微痛食少體倦此病氣元氣俱不足宜用六君補中二湯壯其脾胃則未成者消已成者潰已潰者斂矣。

心法曰凡瘡口不合膿水清稀氣血俱虛也飲食少而難化脾胃虛寒也肌體瘦弱面色痿黃膽氣不行也非參芪歸朮之類不能補非附子不能助其功今飲食進少且難消化屬脾胃虛寒蓋脾胃屬土乃命門火虛不能生土而然不宜直補脾胃當服八味丸補火以生土也。

正齋曰瘡瘍之作當審其標本虛實邪正緩急而治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣又虛者必先於治本而兼以治標大要腫高焮痛膿

水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫黯黑不潰者元氣虛甚治之尤難也○主治之法若腫高焮痛者先用仙方活命飲解之後用托裏消毒散○漫腫微痛者用托裏散如不應加薑桂○若膿出而反痛者氣血虛也八珍湯○不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂○不生肌不收斂脾氣虛也四君加地黃木香○惡寒憎寒陽氣虛也十全大補加薑附○晡熱內熱陰血虛也四物加參朮○欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑○自汗盜汗五臟虛也六味九料加五味子

○食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏○喘促欬嗽脾肺虛也前湯加交門五味○欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯○腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯○小腹痞足脛腫脾腎虛也十全大補湯加山茱山藥肉桂○泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附○熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸○喘嗽淋秘肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸又曰大凡虛怯之人不必分其腫潰惟當先補胃氣或疑參芪滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又有泥於氣質素實或有痰不服補劑者多致有誤殊不知瘡瘍之作

緣陰陽虧損其膿既泄則氣血愈虛豈有不宜補者哉故丹
溪曰但見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終
言旨哉斯言

又曰氣無補法俗論也以其爲病痞滿壅塞似難於補不知
正氣虛而不能運行則邪氣滯而爲病經云壯者氣行則愈
怯者弱者則著而爲病苟不用補氣何由而行乎

淺深辨六

齊氏精義曰瘡候多端欲辨淺深直須得法簡而論之則瘡疽
粟舉有三腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋骨皮

肉之色不變者發於骨髓○又曰凡療瘡疽以手按搖瘡腫
根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時
便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其瘡疽必
深也若人雖患瘡疽而起居平和飲食如故者其瘡浮淺也
惡瘡初生其頭如米粟微似有痛痒誤觸破之卽焮展覺有
深意速服犀角升麻湯及漏蘆湯通氣等藥取通利踈暢兼
用浴毒湯湯潰之類若浮淺者貼膏紙求差以此推之則深
淺之辨始終之次也○又曰憎寒壯熱所患必深肉色不變
發於內也

會氏曰凡癰疽其脉浮數洪緊腫焮作痛身熱煩渴飲食如常此六府不和毒發於外而爲癰其勢雖急投以涼劑多保全生其脉沉細伏緊初發甚微或無瘡頭身不熱而內躁體重煩疼情緒不樂胸膈痞悶飲食無味此五臟不和毒畜於內而爲疽急投五香連翹湯或神仙截法蠟礬丸製甘草湯防托毒氣免致變證內攻尤宜當頭隔蒜灸若塗毒藥迷其腠理投涼藥虛其真氣故善惡之證在乎醫之工拙耳或氣噫痞塞欬逆身冷自汗目暈耳聾恍惚驚悸諛言顛倒皆深惡證也五善見三則瘥七惡見四則危五善并至則善無以加七惡並臻則惡之極矣

李氏曰疽初發一粒如麻豆發熱腫高熱痛色赤此爲外發勢雖熾盛治得其法可保其生若初時不發熱體倦怠患處如故數日不腫痛內臟已壞雖有虛扁之藥亦未如之何矣立齋曰前證有因元氣虛而不能發出者有因敷貼寒藥而不發出者有因攻伐過傷氣血而不能發出者有因熱毒內蘊而失疎托者審而治之多有生者

總論治法 七

瘡瘍之治有宜瀉者有宜補者有宜發散者有宜調營解毒者

因證用藥各有所主經曰形氣有餘病氣有餘當瀉不當補形氣不足病氣不足當補不當瀉此其大綱也故凡察病之法若其脉見滑實洪數而焮腫痛甚煩熱痞結內外俱壅者方是大實之證此其毒在臟腑非用硝黃猛峻等劑蕩而逐之則毒終不解故不得不下然非有真實真滯者不可下此下之不可輕用也其有脉見微細血氣素弱或腫而不潰潰而不斂或飲食不加精神疲倦或嘔吐泄瀉手足常冷膿水清稀是皆大虛之候此當全用溫補固無疑矣然不獨此也卽凡見脉無洪數外無煩熱內無壅滯而毒有可慮者此雖

非大虛之證然察其但無實邪便當托裏養營預顧元氣何也蓋恐困苦日久或膿潰之後不待損而自虛矣及其危敗臨期能及哉故丹溪云癰疽因積毒在臟腑宜先助胃壯氣以固其本夫然則氣血凝結者自散膿瘀已成者自潰肌肉欲死者自生脫肉已死者自腐肌肉已潰者自斂若獨攻其瘡則脾胃一虛七惡蜂起其不死者幸矣卽此謂也其有脉見緊數發熱憎寒或頭痛或身痛或四肢拘急無汗是必時氣之不正外閉皮毛風熱壅盛而爲癰腫此表邪之宜散者也如無表證則不宜妄用發散以致亡陽損衛故仲景曰瘡

家不可汗此之謂也其有營衛失調氣血留滯而偶生癰腫
但元氣無損飲食如常脈無凶候證無七惡此其在腑不在
臟在表不在裏有熱者清其熱有毒者解其毒有滯者行其
氣所當調營和衛而從平治者也大都瘡瘍一證得陽證而
病氣形氣俱有餘者輕得陰證而形氣病氣俱不足者重若
正氣不足而邪毒有餘補之不可攻之又不可者危若毒雖
盡去而脾胃已敗血氣難復者總皆不治之證故臨證者當
詳察虛實審邪正辨表裏明權衡倘舉措畧乖必遺人大害
斯任非輕不可苟也

王海藏元戎曰若人氣血壅盛營衛克滿抑遏不行腐化而爲
癰者當泄之以奪其盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱營
衛短濇寒搏而爲癰者當補之以接其虛怯之氣丹溪亦曰
腫瘍內外皆虛宜以補接行散爲主

東垣曰瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒熱之異受之
外者法當托裏以溫劑及用寒藥則使皮毛始受之邪引入
骨髓受之內者法當疎利以寒劑及用溫藥托裏則使骨髓
之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒若楚百倍輕
則危殆重則死矣○病機機要云內之外者其脈沉實發熱

苦

煩躁外無焮赤痛深於內其邪氣深故宜疎通臟腑以絕其源外之內者其脈浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先宜托裏也內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宜通知其在經當和營衛也用此三法之後雖未卽瘥必無變證亦可使邪氣峻減而易愈故治瘡大要須明此托裏疎通和營衛之三法

陳良甫曰諸痛痒癩癧皆屬心火前輩云癰疽多生於丹石房勞之人凡人年四十以上宜先用內托散次用五香連翹湯更以騎竹馬法或隔蒜灸足三里以發泄其毒蓋邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實故癰疽未潰則一毫熱藥斷不可用癰疽已潰臟腑既虧一毫冷藥亦不可用猶忌敷貼之藥閉其毫孔若熱渴便閉脈沉實洪數者宜用大黃等藥以泄其毒後以國老膏萬金散黃礬丸遠志酒之類選而用之

立齋曰按前證若熱毒蘊於內大便秘結元氣無虧者宜用大黃等藥泄其熱毒若陰虛陽萎精虛氣怯脾胃虛弱者宜用并溫之劑培其本源若瘡不焮腫不作膿者雖其未潰仍須溫補若瘡已潰而腫不退痛不止者仍宜清涼之劑治之若

病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或
病急而元氣更虛者必先治本而兼以治標大抵腫高焮痛
膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者
元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫色黯不潰者發於
陰也元氣虛甚理所不治若腫高焮痛者先用仙方活命飲
後用托裏消毒散漫腫微痛者宜托裏散如不應加薑桂若
膿出而反痛氣血虛也八珍湯不作膿不腐潰陽氣虛也四
君加歸芪肉桂不生肌不收斂脾氣虛也十全大補加薑桂
脯熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君

加炮薑自汗盜汗五臟虛也六味丸加五味子食少體倦脾
氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促欬嗽脾肺虛也前湯加
麥門五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃
虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛弱也十全大補
加山茱山藥肉桂泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附熱渴
淋閉腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋閉肺腎虛火也補中
益氣湯加減八味丸凡此變證皆因元氣虧損失於預補所
致○又曰凡瘡瘍用藥當審其經絡受證標本虛實以治之
不可泥於熱毒內攻專用寒涼剋伐之劑虧損脾胃氣血多

致有誤且以虛弱之人用峻利之藥則藥力未到胃氣先傷
虛虛之禍有所不免故凡元氣不足者即治其初患更當內
用參芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨接補陽氣使自消散
又曰凡癰疽腫痛初生便覺脉沉細而煩悶臟腑弱而皮寒
邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦當即用托裏散及溫熱
之劑以從治之○又曰前證若發熱煩渴大便秘結者由邪
蓄於內宜內疎黃連湯以泄內毒若頭痛拘急發熱惡寒者
由邪客於外宜人參敗毒散以散表邪若腫痛焮赤發熱作
渴此毒氣凝於肉裏宜仙方活命飲解散其毒若食少體倦

發熱惡寒此中氣虛弱宜六君子湯以補脾胃○又曰大抵
證有本末治有權宜治其主則末病自退用其權則不拘於
時泥於守常必致病勢危甚况雜用攻劑動損各經乎羅謙
甫云守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變因
細事而取敗者多矣

凡癰疽實證不可溫補虛證不可涼瀉此大法也觀前條陳良
甫曰凡瘡瘍未潰一毫熱藥斷不可用癰疽已潰臟腑已虧
一毫冷藥亦不可用又立齋云若腫焮痛甚煩躁脉大寒熱
往來大便秘結小便澀痛心神憤悶皆邪熱之證凡辛熱之

劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也此固然矣然二公已道其半猶未盡也余讀之曰凡癰疽陰盛陽衰者但見體虛脈弱陽氣無權等證則凡苦寒之劑非惟潰瘍不可用卽腫瘍亦不可用也又若陰邪凝結之毒非用溫熱何以運行而陳氏謂腫瘍不可用熱藥恐不可以槩言也

敗毒八

外科樞要曰瘡瘍之證當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱渴大便秘結者邪在內也疎通之焮腫作痛寒熱頭疼者邪在表也發散之焮腫痛甚者邪在經絡

也和解之微腫微痛而不作膿者氣血虛也補托之漫腫不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補之色黯而微腫微痛或膿成不出或腐肉不潰陽氣虛寒也溫補之若泥其未潰而槩用敗毒復損脾胃不惟腫者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之證蜂起多致不救馬益卿曰腫瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主如欲用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以托裏補接爲主如欲用香散未免虛虛之失治者審之

托裏九

齊德之曰凡瘡疽丹腫結核癰癧初覺有之卽用內消之法經久不除血氣漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證凡爲瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

馬益卿曰癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固次以行經結血藥爲佐參以經絡時令務使毒氣外泄治之早者可以內消此托裏之旨也

立齋曰大凡瘡瘍之作由胃氣不從瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣營養余嘗治初結未成膿者托而散之已成欲作膿者托而癰之膿成未潰者托而開之膿已潰者托而斂之東垣云脾爲倉廩之官胃爲水穀之海主養四旁以生血氣故胃氣乃生發之源爲人身之本厥有旨哉

論汗下

仲景治傷寒有汗吐下三法東垣治瘡瘍有疎通托裏和營衛之三法用之得宜厥疾瘳矣假如瘡瘍腫硬木悶煩熱便秘

脉沉而實其邪在內當先疎其內以下之。焮腫作痛便利調和。脉浮而洪其邪在表當先托其裏以汗之。仲景曰瘡家雖身體疼痛不可發汗汗之則發瘵苟不詳審而妄爲汗下以致血氣虧損毒反延陷少壯者難以潰斂老弱者多致不救。

見外科

樞要

羅謙甫云丁巳歲冬月予從軍曹州有牛經歷者病頭目赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫於腫上砭刺四五百鍼腫亦不減其痛益甚莫知所由予往診視其脉浮緊按之洪緩此證乃

寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得散聚而爲腫經云天寒則地凍水冰人氣在身中皮膚緻密腠理閉汗不出氣血強肉堅澹當是之時善行水者不能往冰善穿地者不能鑿凍善用鍼者亦不能取四厥必待天溫凍解而後水可行也可穿人脉亦猶是也又云冬月閉藏用藥多而少鍼石也宜以苦溫之劑溫經散寒其病自已所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之也遂用托裏溫經湯依方餌之以薄衣覆其首以厚被覆其身臥於煖處使經血溫腠理開寒氣散陽氣升大汗出後腫減八九再服則去麻黃防風加連翹鼠粘子腫痛悉愈經言

汗之則瘡已信哉斯言或云仲景言瘡家雖身痛不可發汗其理何也余曰此說乃營氣不從逆於肉理而生瘡腫作身疼痛非外感寒邪之病故戒之以不可發汗汗之則成痙也又問仲景言鼻衄者不可發汗復言脈浮緊者當以麻黃湯發之衄血自止所說不同其故何也予曰此正與瘡家槩同夫人身血之與汗異名而同類奪汗者無血奪血者無汗今衄血妄行爲熱所逼更發其汗是反助熱邪重竭津液必變內證故不可汗若脈浮則在表脈緊則在寒寒邪鬱遏陽不得伸熱伏營中迫血妄行上出於鼻故當用麻黃湯散其寒邪使陽氣得舒其血自止又何疑焉或者嘆曰知其要者一言而終不知其要流散無窮潔古之學可謂知其要者矣

東垣云瘡瘍有因風熱外鬱其人多怒其色赤其腫高結硬而痛其脈洪緊而弦是邪客於血脉之上皮膚之間故發其汗而通其營衛則邪氣去矣○又曰瘡瘍諸病凡面赤者雖伏大熱禁不得攻裏攻裏則下利此以陽邪怫鬱在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥之藥以潤之如見風脈風證只宜用風藥發表風邪解則大便自通也若只乾燥閉澀止宜潤之切

不可下也。但瘡瘍鬱胃，俗呼昏迷是也。宜汗之則愈。

初虞世云：凡癰疽始作，須以大黃等藥，亟轉利之，勿以困苦為念。與其潰爛而死，不若利之而死。况有生道哉！古人立法，率用五香連翹、漏蘆等藥，貧乏者單煮大黃湯以利之。至於膿潰，乃服黃芪等藥以排膿。千金外臺備矣。世以瘡發於外，不行轉利而死者多矣。○立齋曰：按前證，若腫高、焮痛、臟腑閉結，屬內外俱實者，當用前藥瀉之。若漫腫微痛，臟腑不實，屬內外俱虛者，當用內托補之。若患腫無頭，肉色不變，當助胃壯氣，令其內消。若疼痛不止，焮腫不消，當用人參黃芪湯以托裏排膿。若飲食少思，肌肉不生，當用參芪托裏散以補養脾胃。

脾胃

立齋曰：王德之患發背，脈浮數，按之則澀，大便五六日不行，腹不加脹。余曰：邪在表不在裏，但因氣血虛，飲食少，故大便不行，非熱結也。宜生氣血為主。彼不信，以為積毒在內，仍用大黃遂連瀉不止，更加發熱，呃逆，飲食不進而死。其子曰：瀉亦能為害乎？余曰：服利藥而利不止者死，不當瀉而強瀉，令人洞瘍不禁者死，下多亡陰者死。曰：瘡瘍乃積毒在臟，若不驅逐，何以得解？余曰：瘡瘍雖積毒在臟腑，治法先當助胃氣，使

根本堅固，參以行經活血時宜之藥，非宜妄用大黃也。今其病在表而反以峻利之劑重奪其陰，其可乎哉？故曰：表病裏和而反下之，則中氣虛，表邪乘虛而入，由是變證百出。雖云脈浮數者邪在表，當用托裏復煎散，然其間黃芩、蒼朮亦不敢妄用，脈沉實者邪在裏，當用內疎黃連湯，然其中大黃、檳榔亦不敢妄用。況浮數瀉主氣血皆虛，且邪既在表而反用峻劑，重傷其裏，誅伐無過，不死何俟。

愚謂瘡腫之屬表邪者，惟時毒、丹毒、斑疹及頭面頸項上焦之證多有之。察其果有外邪而驟見緊數證，有熱者方宜表

散，然散之之法又必辨其陰陽盛衰，故或宜溫散，或宜涼散，或宜平散，或宜兼補而散，或宜解毒而散。此散中自有權宜也。○又如裏證用下之法，則毒盛勢劇者大下之，滯毒稍輕者微下之，營虛便結而毒不解者養血滋陰而下之，中氣不足而便結壅滯者潤導而出之。凡此皆通下之法，但宜酌緩急，輕重而用，得其當耳。故必察其毒果有餘及元氣壯實下之必無害者，方可用下。否則不但目前且尤畏將來難結之患，是以表證不真者不可汗，汗之則亡陽，裏證不實者不可下，下之則亡陰，亡陰亦死。醫固可以孟浪乎。

論灸法 十一

王海藏曰瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經曰陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也

李氏云治疽之法灼艾之功勝於用藥蓋使毒氣外泄譬諸盜入人家當開門逐之不然則入室爲害矣凡瘡初發一二日須用大顆獨蒜切片三分厚貼疽頂以艾隔蒜灸之每三壯

易蒜瘡潰則貼神異膏如此則瘡不崩大肉不壞瘡口易斂

一舉三得此法之妙人所罕知若頭頂見疽則不可用此法

五府極
觀碑載

又曰凡患背疽漫腫無頭者用濕紙貼腫處但一點先乾處乃是瘡頭可用大蒜十顆淡豆豉半合乳香錢許研爛置瘡上鋪艾灸之痛否皆以前法爲度

陳氏曰腦爲諸陽之會頸項近咽喉腎俞乃致命之所皆不可灼艾

伍氏曰凡用蒜餅灸者蓋蒜味辛溫有毒主散癰疽假火勢以

行藥力也。有只用艾炷灸者，此可施於頑疽癰發之類。凡赤腫紫黑毒甚者，須以蒜又同灸爲妙。○又曰：凡治疽癰發背疔瘡，若初灸卽痛者，由毒氣輕淺，灸而不痛者，乃毒氣深重。悉宜內服追毒排膿外傳消毒之藥，大抵癰疽不可不痛，又不可大痛，悶亂不知痛者難治。○又曰：凡隔蒜灸者，不論壯數，則邪無所容，而真氣不損，但頭項見瘡，宜用騎竹馬法，及足三里灸之。

千金云：癰疽始作，或大痛，或小痛，或發如米粒，卽便出膿，宜急斷口味，利去其毒，用騎竹馬灸法，或就患處灼艾。重者四面中央總灸一二百壯，更用敷藥，其效甚速。

立齋云：夫瘡瘍之證，有諸中必形諸外，在外者引而拔之，在內者踈而下之，灼艾之功甚大。若毒氣鬱結，瘀血凝滯，輕者或可藥散，重者藥無全功矣。東垣曰：若不針烙，則毒氣無從而解，是故善治毒者，必用隔蒜灸。含是而用苦寒敗毒等劑，其壯實內熱者，或可彼怯弱氣虛者，未有不敗者也。又有毒氣沉伏，或年高氣弱，或服剋伐之劑，氣益以虛，膿因不潰者，必假火力以成功。大凡蒸灸若未潰，則拔引鬱毒已潰，則接補陽氣，祛散寒邪，瘡口自合，其功甚大。嘗治四肢瘡瘍，氣血不

足者祇以前法灸之皆愈。疔毒甚者尤宜灸。蓋熱毒中隔內外不通不發泄則不解散。若處貧居僻一時無藥則用隔蒜灸法充便。每三壯一易蒜片。大槩以百壯為度。用大蒜取其辛而能散。用艾炷取其火力能透。如法灸之必瘡發膿潰。繼以神異膏貼之。不日自愈。一能使瘡不開。大二內肉不壞。三瘡口易合。見效甚神。丹溪云。惟頭為諸陽所聚。艾壯宜小而少。○曹工部發背已十八日。瘡頭如粟。瘡內如錐。痛極時有悶瞀。飲食不思。氣則愈虛。以大艾隔蒜灸十餘壯。尚不知而痛不減。遂明灸二十餘壯。內瘡悉去。毒氣大發。飲食漸進。更以大補藥及桑木燃灸。瘡肉漸潰。○劉貫卿足患疔瘡已十。一日氣弱亦灸五十餘壯。更以托裏藥而愈。○黃君腿癰膿清脈弱。一婦臂結一塊已潰。俱不收斂。各灸以豆鼓餅更飲托裏藥而愈。○一男子胸腫一塊半載不消。令明灸百壯方潰。與大補藥不斂。復灸以附子餅而愈。○一男子患發背瘡頭甚多腫硬。色紫不甚痛。不腐潰。以艾鋪患處灸之。更以大補藥數日。死肉脫去而愈。○陳工部患發背已四五日。瘡頭雖小根畔頗大。以隔蒜灸三十餘壯。其根內消。惟瘡頭作膿數日而愈。○余丙子年忽惡心。大椎骨甚痒。須臾臂不能舉。

椎

神思甚倦此天疽危病也急隔蒜灸之痒愈甚又明灸五十餘壯痒遂止旬日而愈精要云灸法有回生之功信矣薛按

史氏引證曰瘍醫常器之於甲戌年診太學史氏之母云內有蓄熱防其作疽至辛巳六月果背脾微痒瘡粒如黍灼艾卽消隔宿復作用膏藥覆之暈開六寸許痛不可勝歸咎於艾適遇一僧白云病瘡甚危嘗灸八百餘壯方甦遂用大艾壯如銀杏者灸瘡頭及四傍各數壯痛止至三十餘壯赤暈悉退又以艾作團如梅杏大者四十壯乃食粥安寢瘡突四寸小竅百許患肉俱壞而愈○立齋曰灼艾之法必使痛者灸

至不痛不痛者灸至痛則毒必隨火而散否則非徒無益而反害之

愚意癰疽爲患無非血氣壅滯留結不行之所致凡大結大滯者最不易散必欲散之非藉火力不能速也所以極宜用灸然又有孫道人神仙薰照方其法尤精尤妙若毒邪稍緩邪淡經遠而氣有不達灸之爲良若毒邪熾盛其勢猛急而垂危者則宜用薰照方更勝於灸也

膿針辨 十二

齊氏曰若發腫都輒而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大

熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是
寒熱所爲也畱積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰者必多
成癭宜早服內塞散以排之○又凡察癰疽以手掩其上大
熱者膿成自輒也若其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱
者膿未成也○若患瘰癧結核寒熱發渴經久不消其人面
色痿黃者被熱上蒸已成膿也○至於臟腑腸胃內瘡內疽
其疾隱而深藏目既不見手不能近所爲至難但以診脈而
辨之亦可知也有患胃腕癰者當候胃脈胃脈者人迎也其
脈沉數氣逆則甚甚則熱聚胃口而胃腕爲癰也若其脈洪
數者膿已成也設脈遲緊雖膿未就已有瘀血也宜急治之
不爾則邪氣內攻腐爛腸胃不可救也○又肺癰論曰始萌
則可救膿成卽死不可不慎也久之欬膿如粳米粥者不治
嘔膿而止者自愈也○又腸癰論曰或透臍生瘡膿從瘡出
者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

伍氏曰瘡腫赤色按之色不變者此膿已成也按之隨手赤色
者其亦有膿也按之白色良久方赤者此遊毒已息可就赤
白盡處灸斷赤腫自消凡癰疽以手按之若牢韌未有膿也
若半軟半韌已有膿也又按腫上不熱者爲無膿熱甚者爲

有膿宜急破之

立齋曰：瘡瘍之證，毒氣已結者，但可補其氣血，使膿速成。膿成者，當驗其生熟淺深，視其可否針而去之。不可論內消之法。小按便痛者，膿淺也；大按方痛者，膿深也。按之不復起者，膿未成也；按之即復起者，膿已成也。膿生而用鍼，氣血既泄，膿反難成。膿熟而不鍼，則腐潰益深。瘡口難斂，若瘡深而針淺，內膿不出，外血反泄，若瘡淺而針深，內膿雖出，良肉受傷，若元氣虛弱，必先補而後針，勿論尻神。其膿一出，諸證自退。若膿出而反痛，或煩躁嘔逆，皆由胃氣虧損也，宜急補之。○若

背瘡熱毒熾盛，中央肉黯，內用托裏，壯其脾胃，外用烏金膏塗於黯處，其赤處漸高，黯處漸低。至六七日間，赤黯分界，自有裂紋如刀割，然黯肉必漸潰矣。當用鉅針利剪徐徐去之，須使不知疼痛，不見鮮血為妙。若雖有裂紋，膿未流利，及膿水雖出而仍痛者，皆未通於內。並用針於紋中引之。○若患于背脾之間，凡人背近脊處，并脾皮裏有筋一層，患此處者，外皮雖破，其筋難潰，以致內膿不出，令人脹痛苦楚，氣血轉虛，變證百出。若待自潰多致不救，必須開之引之，兼以托裏。常治此證，以利刀剪之，尚不能去，似此堅物，待其自潰不反

甚乎此非氣血壯者未見其能自潰也○若元氣虛弱而誤服剋伐患處不痛或肉將死急須溫補脾胃亦有生者後須純補之藥庶可收斂若妄用刀針去肉出血則氣血愈虛愈傷矣何以生肌收斂乎大凡瘡瘍膿血既潰當大補血氣爲先須有他證當以未治○又曰凡瘡不起者托而起之不成膿者補而成之使不內攻膿成而及時針之不數日卽愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷肉而不肯用殊不知瘡雖發於肉薄之所若其膿成必腫高寸餘瘡皮又厚分許用鍼深不過二分若發於背必腫高二三寸入針止於寸許况患處肉既已壞何痛之有何傷之慮凡怯弱之人或患附骨等疽待膿自通以致大潰不能收斂氣血瀝盡而已者爲多矣○又曰凡瘡既成膿皮膚不得疎泄昧者待其自穿殊不知少壯而克實者或能自解若老弱之人氣血枯槁或兼攻發太過不行針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不誤事若毒結四肢砭刺少緩則腐潰深大亦難收斂毒結於頰項胸腹緊要之地不問壯弱急宜針刺否則難治如沈氏室黃上合等皆以此而歿者多矣大抵瘡瘍之證感有輕重發有深淺淺者腫高而軟發於血脉深者腫下而堅發於筋骨

然又有發於骨隨者則皮肉不變故古人制法淺宜砭而深
宜刺使瘀血去於毒聚之始則易消若膿成之時氣血壯實
者或自出怯弱者不行針刺鮮有不悞凡瘡瘍透膜十無一
生雖以大補藥治之亦不能救此可為待膿自出之戒也故
東垣云毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不烙反攻於內
內既消敗欲望其生豈可得乎茲舉一二以告同道并使患
者知所慎云○又曰凡患瘡疽雖因積熱所成若初起未成
膿脈洪數乃陰虛陽亢之證若膿潰于內不得發泄於外身
必發熱故脈見洪數乃瘡疽之病進也膿既去則當脈靜身

涼腫消痛息如傷寒表證之得汗也若反發熱作渴脈洪數
者此真氣虛而邪氣實死無疑矣○又曰若治元氣不足之
證卽其初患便當內用參芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨
接補陽氣使自消散若久而不能成膿者亦用前二法補助
以速之若膿既成而不潰用艾於當頭灸數炷以出之却服
十全大補湯

論鍼法 十三

上古有砭石之制內經有九針之別制雖不同而去病之意則
一也且瘡瘍一科用針為貴用之之際雖云量其潰之淺深

尤當隨其肉之厚薄若皮薄鍼深則反傷良肉益增其潰肉厚針淺則膿毒不出反益其痛用針者可不慎哉至於附骨疽氣毒流注及有經久不消內潰不痛者宜燔針開之若治咽喉之患當用三稜針若丹瘤及癰毒四畔焮赤疼痛如灼宜用砭石去血以泄其毒則重者減輕者消如洪氏室患復癰膿脹悶者以臥針刺膿出卽蘇一人患囊癰膿熟腫脹小便不利幾殆急針之膿水大泄氣通而愈大抵用針之法迎而奪之順而取之所謂不治已成治未成正此意也今之患者或畏針而不用醫者又徇患者之意而不針遂至膿已成而不得潰或得潰而所傷已深矣卒之天枉者十常八九亦可悲矣見外科心法

經曰天溫日明則人血淖溢而衛氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰則人血凝滯而衛氣沉是以因天時而調血脉也故凡遇天寒水冰或陰氣凝滯之時欲行針刺則先當溫衣覆蓋或以艾葉炒熱或熱鹽熱衣類先熨其處務令血脉溫和而後刺之則血瀉氣行其病立已若血寒脈滯遽爾用針則邪毒不瀉徒傷良肉反以益其病也

立齋曰凡元氣虛弱者必當補助脾胃禁用刀針若妄用之而

去肉毒血使陽隨陰散是速其危也

薛按曰四明有屠壽鄉者當門齒忽如所擊痛不可忍脉洪大
而弦余曰弦洪相搏將發瘡毒也先用清胃散加白芷銀花
連翹一劑痛即止至晚鼻上發一瘡面腫黯痛用前藥加犀
角一劑腫至兩額口出穢氣脉益洪大惡寒內熱此毒熾血
瘀藥力不能敵也乃數砭患處與唇上并刺口內赤脉各出毒血再
日腫痛尤甚又砭患處與唇上并刺口內赤脉各出毒血再
服前藥至數劑而愈

用針勿忌元神 十四

立齋曰針灸之法有太乙人神周身血忌逐年元神逐日人神
而其穴有禁針禁灸之論犯者其病難瘳理固然也但瘡瘍
氣血已傷肌肉已壞急宜迎而奪之順而取之非平人針灸
之比何忌之有外科精義云瘡瘍之證毒氣無從而解膿瘀
無從而泄及攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎危惡之
證發於致命之所禍在反掌腹癰囊癰二便不通胸腹脹悶
唇疔喉痺咽喉腫塞其禍尤速患者審之
鄰人蘇子遇之內左手指患疔麻痺寒熱惡心左半體皆麻脉
數不時見余曰凡瘡不宜不痛不宜大痛煩悶者不治今作

麻痺尤其惡也。用奪命丹二服不應，又用解毒之劑。麻痺始去，乃作腫痛。余曰：勢雖危，所喜作痛，但毒氣無從而泄，欲針之，適值望日，其家俱言：尻神不從，勢愈腫甚。余強針之，諸證頓退。又用解毒之劑，其瘡乃愈。薛按

圍藥十五

內經云：五臟不利，則七竅不通；六府不和，則留結為癰。又云：形傷痛，氣傷腫。此以臟腑不和，而瘡發於外也。明矣。若塗貼寒涼，豈能調和臟腑，宣通氣血耶？○若其腫痛熱渴，脈滑數而有力，證屬純陽者，宜內用濟陰湯，外用抑陽散，則熱毒自散。

瘀滯自散。○若似腫非腫，似痛非痛，似潰不潰，似赤不赤，脈洪數而無力，屬半陰半陽者，宜內用沖和湯，外用陰陽散，則氣血自和，瘀滯自消。○若微腫微痛，或色黯不痛，或堅硬不潰，脈雖洪大，按之微細軟弱，屬純陰者，宜內服回陽湯，外敷抑陰散，則脾胃自健，陽氣自回也。○丹溪曰：敷貼之劑，應酬輕小熱證耳。若不辨其陰證，陽證之所由分，而妄敷寒涼之劑，則迷塞腠理，凝滯氣血，毒反內攻，而肉反死矣。况運氣得寒，則不健；瘀血得寒，則不散；敗肉得寒，則不潰；新肉得寒，則不生。治者審焉。見外科樞要

立齋曰大抵瘡之起發潰斂皆血氣使然各人元氣虛實不同有不能發出而死者有發出不能成膿而死者有成膿不能腐潰而死者有腐潰不能收斂而死者敷貼之法但可應酬輕小之證耳若血氣已竭其患必死不但敷貼不效且氣血喜溫而惡寒勝理喜通而惡塞氣血因而愈滯腫患因而愈盛邪氣因而愈深腐潰因而愈大怯弱之人取敗多矣况瘡瘍乃七情相火或食膏粱或餌金石以傷陰血陽盛陰虛受病於內而發於外若不別氣分血分陰陽虛實腐潰淺深卽服藥尙有不能保生者可敷貼而已乎

施二守項右患一核用涼藥敷貼頸皆腫又敷之腫胤胸腋冷應腹內不悟涼藥所致尙以爲毒盛形體困憊自分不起延余治之見其敷藥處熱氣如霧急令去藥良久瘡色變赤刺出膿血用托裏藥而愈○張侍御發背專用敷藥瘡黯不起胸膈悶氣不能呼吸自分不治余用辛溫托裏藥而愈○一男子腎癰腐潰肌肉不生用藥敷之肌肉四沿反硬予診之脈澁而弱此氣血俱虛不能營於患處故敷涼藥反硬乃血氣受寒凝結而非毒也用大補藥而愈○一男子患胸疽腫高作痛腫處敷藥痛雖止而色變黯腫外作痛仍敷之肉色

亦黯喉內作痛不悟此爲涼藥所誤反盡頸敷之其頸皆潰而死○一男子因怒左脇腫一塊不作痛脉瀦而浮余曰此肝經邪火熾盛而真氣不足爲患宜培養血氣爲主彼以草藥敷貼遂致不救○王安人發背正潰時欲速效敷以草藥卽日而死○張宜人年踰六十患發背三日肉色不變頭如粟許肩背腫脉洪數寒熱飲冷予以人參敗毒散二劑及隔蒜灸五十餘壯毒大發背始輕再用托裏藥漸潰因血氣虛甚而作渴用參芪歸熟等藥而渴亦止彼欲速效乃自用草藥罨患處毒氣復入遂不救薛按

凡癰瘍腫痛宜用圍藥敷治者惟降癰散爲第一無論陰毒陽毒皆所宜也

腐肉 十六

齊德之曰夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將爲膿留於節腠必將爲敗蓋瘡疽膿潰之時頭小未破瘡口未開或毒氣未出疼痛難忍所以立追蝕腐潰之法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若絛其瘡而血出不止者則未可絛於瘡上摻追蝕之藥待其熟可絛方絛若絛其瘡而痛應心根者亦不可強絛之誤觸其

瘡焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癰膿成未破於上薄皮剝起者卽當用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取效如神矣若膿血未盡便用生肌歛瘡之劑欲其早愈殊不知惡肉未盡其瘡早合後必再發不可不慎也

立齋曰瘡瘡之證膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫余嘗治脉證虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不生脉證實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾

胃則未成者自散已成者自潰又何死肉之有若不夫痛或大痛或不赤或內膿不潰或外肉不癢乃血氣虛弱宜用桑枝灸及十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔卽消瘡頭卽腐其毒自解又何待於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍加白朮壯其營氣則肌肉受毒者自潰已死者自活已潰者自歛若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變爲陰證也急用參附湯溫補回陽亦有可生○又曰夫腐肉者惡肉也大凡癰疽瘡腫潰後若有腐肉凝滯者必取之乃推陳致新之意若壯者筋骨強盛氣血克溢真能

勝邪或自去或自平不能為害若年高怯弱之人血脈少肌
 肉澁必迎而奪之順而取之是謂定禍亂以致太平設或留
 而不去則有爛筋腐肉之患如劉大尹汪夫人取之及時而
 新肉即生得以全愈金工部鄭揮使取之失期大潰而斃予
 嘗見腐肉既去雖少壯者不補其氣血尚不能收斂若怯弱
 者不取惡肉不補血氣未見其生也故古人曰壞肉惡於狼
 虎毒於蜂蠱緩去之則戕賊性命信哉○又曰瘡瘍之證若
 毒氣已結腫赤熾盛中央肉死黯黑者內用托裏健脾之劑
 外用烏金膏塗之則黯處漸低赤處漸起至六七日間赤黯
 之界自有裂紋如一劃狀其黯漸潰若用鉞針利剪徐去猶
 好須使不知疼痛不見鮮血為善若膿未流利宜用針於紋
 中引之若膿水已出腫痛仍作乃內筋間隔亦用針引之若
 元氣虛弱誤服剋伐之劑患處不痛或肉死不潰者急溫補
 脾胃亦有復生者後須純補脾胃庶能收斂此則不可妄用
 針刀若誤用之以去肉出血使陽隨陰散是速其危也

一論外通用方

鉞頭散

外一四四

去腐管

代鉞膏

外一四五

潰頭

透骨丹

外一四三

潰頭

猪蹄湯

外一二五

洗腐

舍時從證 十七

立齋曰經云諸痛痒瘡皆屬於心若腫赤煩躁發熱大痛飲冷
便秘作渴脉洪數實者爲純陽雖在嚴冬之時必用大苦寒
之劑以瀉熱毒若不腫不痛脉細皮寒瀉利腸鳴飲食不入
嘔吐無時手足厥冷是爲純陰雖在盛暑之時必用大辛溫
熱之劑以助陽氣不拘嚴寒盛暑但當舍時從證若微腫微
痛似潰不潰時出清膿者爲半陰半陽宜用辛熱之劑溫補
胃氣此亦治陰陽法也經曰用寒遠寒用熱遠熱有假者反
之雖違其時必從其證若劫膏法無不誤矣○壬午仲冬金

臺一男子患腹痛誤服乾薑理中丸卽時口鼻出血煩躁發
狂入井而死○辛卯冬一吏患傷寒誤服附子藥一鐘下咽
發躁奔走跌死○夫盛暑之際附子薑桂三藥並用連進三
四劑無事嚴冬時令三藥單用一味止進一劑者卽死可見
羅謙甫先生有舍時從證權宜用藥之妙余宗此法凡冬間
瘡證如脉沉實洪數大便秘瘡焮痛煩躁或飲冷不絕者卽
用硝黃苓連之劑攻之雖在夏令而脉見虛弱或浮大瘡不
潰膿清稀惡寒飲者卽用薑桂參芪之劑補之如脉見沉細
瘡不潰不痛作呃逆手足冷大便不實或瀉利或腹痛更加

附子皆獲大效。昧者反以爲非，惑亂患人，恪守常法，必使冬用溫熱，夏用清涼，以致誤人，深可哀也。薛按

至元壬午五月二十八日，王伯祿年逾五旬，有七右臂膊腫甚，上至肩，下至手指，色變，皮膚涼，六脈沉細而微，此乃脈證俱寒。余舉瘍醫孫彥和視之，曰：此乃附骨癰，開發已遲，以燔針啟之，膿清稀，解次日肘下再開之，加吃逆不絕。彥和與丁香柿蒂散兩劑稍緩，次日吃逆尤甚，自利臍腹冷痛，腹滿，飲食減少，時發昏潰於左乳下黑盡處，灸二七壯，又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥，咬咀一兩半，欲與

服。或者曰：諸痛痒瘡瘍皆屬心火，又當盛暑之時，用乾薑附子可乎？予應之曰：理所當然，不得不然。內經曰：脈細皮寒瀉利前後，飲食不入，此謂五虛。况吃逆者，胃中虛寒故也。諸痛痒瘡瘍皆屬心火，是言其定理也。此證內外相反，須當含時從證，非大方辛熱之劑急治之，則不能愈也。遂投之。諸證悉去，飲食倍進，瘡勢盡，膿色正，彥和復用五香湯數服，後月餘平復。噫！守常者衆人之見，知變者知者之能，知常不知變，因細事而取敗者亦多矣。况乎醫哉。見羅氏衛生寶鑑

愚意羅先生以含時從證之法，垂訓後人，誠百世不磨之要道。

也。但時之遷變本所難知而證之幽顯尤不易識何也。蓋常人之所謂時者春夏秋冬之時也。歲歲時常之主氣也。誰不得而知之而不知五六周環則長夏有寒淫之令三冬有炎暑之權此則雖若舍時而實以從時昧者固能知此乎。又如察證之法則凡脉細皮寒泄瀉厥冷之類是皆已見之寒證也。又誰不得而知之不知其來有源其甚有漸即諸證未見之前而本來已具此際便難錯認使必待焦頭爛額而後曲突徙薪則已晚矣。此羅先生之所以明已然而余則更為慮未然蓋恐人之見之遲而無及於事也。雖然余常見今人之於已然者尚不能見而復欲其見未然誠哉迂矣。然余慨然之念則不能不道其詳而深望於知音者。

陽氣脫陷 十八

立齋曰瘡瘍陽氣脫陷或因針伐之劑或因膿血大泄或因吐瀉之後或因誤以入房大凡潰後勞後元氣虧損或夢遺精脫或脉數便血或外邪乘虛而入以致發熱頭痛小便淋瀝或目赤煩喘氣短頭暈體倦熱渴意欲飲水投水身熱增寒惡衣揚手擲足腰背反張鄭聲自汗脉浮洪大此無根虛火之假熱證也。若畏寒頭痛欬逆嘔吐耳曠目矇小便自遺瀉

利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮齒牙浮痛肢體麻痺冷汗時出
或厥冷身痛咬舌嚙唇舌本強硬呃逆喘促脉微沉細此陽
氣脫陷之真寒證也凡此危候無論脉證但見有一二急用
參附湯或用托裏消毒散去連翹白芷金銀花三味急加桂
附大劑補之多有復生者

內翰楊臯湖孟夏患背疽服尅伐之劑二旬餘矣漫腫堅硬重
如負石隔蒜灸五十餘壯背遂輕以六君加砂仁二劑涎沫
涌出飲食愈少此脾虛陽氣脫陷也劑用溫補及嘔不食仍
用前藥作大劑加附子薑桂又不應遂以參芪各一觔歸朮

陳皮各半觔附子一兩煎服三日而盡流涎頓止腐肉頓潰
飲食頓進再用薑桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈矣○少叅
史南湖之內夏患疽不起發脉大而無力發熱作渴自汗盜
汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不實喘促時嘔脉
細微按之如無惟太衝不絕仍以參芪白朮當歸茯苓陳皮
計觔許加附子五錢水煎二鐘作一服諸證悉退脉息頓復
翼日瘡起而潰仍用前藥四劑後日用托裏藥調理兩月餘
而愈薛按

一婦人於癸卯冬失物發怒缺盆內微腫甲辰春大如覆碗左

肩脾亦腫肉色如故或針出鮮血三碗許腹痛如錐泄瀉不止四肢逆冷嘔吐惡寒或時發熱絕食已七日矣其脈洪大時或微細此陽氣脫陷也用六君加炮薑三錢附子二錢早服至午不應再劑加附子五錢熟睡覺來諸證頓退六七可進稀粥再四劑諸證悉退飲食如故缺盆始痛針出清膿二碗許諸證復至此虛極也以十全大補加薑桂附各一錢三劑而安後減薑附各五分與歸脾湯兼服五十餘劑而愈薛按

溫補按則 十九

留都鄭中翰仲夏患發背已半月瘡頭十餘枚皆如粟許漫腫

堅硬根如大盤背重如負石即隔蒜灸五十餘壯其背頓輕彼因輕愈不守禁忌三日後大作瘡不起發但苦作痛用活命飲四劑勢少退用香砂六君子湯四劑飲食少進彼恃知醫自用敗毒藥二劑飲食益少口流涎沫若不自知此脾虛之甚也每用托裏藥加參芪各三錢彼密自揀去大半後雖用大補藥加薑桂亦不應遂令其子以參芪各一劑歸朮各半筋乾薑桂附各一兩煎膏一罐三日飲盡涎頓止腐頓潰食頓進再用托裏健脾藥腐肉自脫而愈下俱薛按

張侍御患背瘡三枚皆如粟彼以為小毒服清熱化痰藥外用

涼藥敷貼數日尚不起色黯不熾胸中氣不得出入勢甚可
畏連用活命飲二劑氣雖利膿清稀瘡不起欲用補劑彼泥
於素有痰火不受參朮之補因其固執遂陽以敗毒之劑與
視之而陰以參芪歸朮各五錢薑桂各二錢服二劑背覺熱
腐肉得潰方信余言始明用大補藥乃愈

南都聶姓者時六月患發背腐肉已去瘡口尺許色赤焮腫發
熱不食欲嘔不嘔服十宣散等藥自爲不起請余決之其脉
輕診則浮而數重診則弱而瀯此潰後之正脉然瘡口開張
血氣虛也欲嘔不嘔脾胃虛也色赤焮腫虛火之象也尚可

治遂與十全大補湯加酒炒黃柏知母五味麥門及飲童便
飲食頓進肌肉頓生服至八劑瘡口收如粟許又惑於人言
謂餘毒未盡乃服消毒藥二劑復發熱昏瞶急進前藥又二
十餘劑乃愈後兩月因作善事一晝夜不睡以致勞倦發熱
似睡不睡與前湯二劑更加發熱飲食不進惟飲熱湯後以
前藥加附子一錢二劑復愈

尚秋官貞甫孟秋發背色黯而硬不痛不起脉沉而細四肢逆
冷急用大艾隔蒜灸三十餘壯不痛遂用艾如粟大者著肉
灸七壯乃始知痛與六君子湯二劑每劑入附子二錢不應

後劑又加肉桂二錢始應而愈

一男子脇腫一塊日久不潰按之微痛脉微而瀉此形證俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉予以人參養營湯治之彼不信乃服流氣飲虛證悉至方服前湯月餘少愈但腫處尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘日膿成以火針刺之更灸以豆鼓餅又服十全大補湯百劑而愈

定痛 二十

齊氏曰瘡疽之證候不同凡寒熱虛實皆能爲痛故止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛而不知臨病

制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒涼之藥折其熱而痛自止也寒邪之痛以溫熱之劑熨其寒則痛自除也因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者去之陰陽不和者調之經絡秘澁者利之臨機應變方爲上醫不可執方而無權也

立齋曰瘡瘍之作由六淫七情所傷其痛也因氣血凝滯所致假如熱毒在內便秘而作痛者內疎黃連湯導之熱毒熾盛燉腫而作痛者黃連解毒湯治之不應仙方活命飲解之瘀

血凝滯而作痛者乳香定痛丸和之作膿而痛者托裏消毒散排之膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之若因氣虛而痛四君加歸芪血虛而痛四物加參芪腎虛而痛六味地黃丸口乾作渴小便頻數者加減八味丸此皆止痛之法也慎勿驟用寒涼之藥况血氣喜溫而惡寒若冷氣入裏血卽凝滯反爲難瘥之證矣丹溪云膿出而反痛此爲虛也宜補之穢氣所觸者和解之風寒所逼者溫散之若專用龍竭生肌乳沒止痛吾知其必無效也

凡癰毒焮腫赤痛之甚者雖內治之法已具如前然煎劑功緩而痛急難當者必須外用敷藥旣欲其止痛又欲其散毒則無如降癰散之神妙也

生肌收口

附成漏證二十一

陳良甫曰癰疽之毒有淺深故收斂之功有遲速斷不可早用收口之藥恐毒氣未盡後必復發爲患匪輕若癰久不合其肉白而膿少者此氣血俱虛不能潮運而瘡口冷澁也每日用艾葉一把煎湯避風熱洗及燒松香煙薰之或用豬蹄湯洗之更以神異膏貼之必須守禁調理否則不效○又曰脉得寒則下陷凝滯肌肉故曰畱連肉腠是爲冷漏須溫補之

丹溪曰諸經惟少陽厥陰之生癰者宜須防之以其多氣少血也血少則肌肉難長故瘡久未合必成敗證苟反用驅利毒藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣

立齋曰肌肉者脾胃之所主收斂者血氣之所使但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑夫瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加當歸黃芪補熱內熱陰血虛也四物加參朮膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應竹葉石膏湯熱渴而小便頻數

腎水虛也用加減八味丸料煎服若敗肉去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生氣也但用四君子湯以培補之則不日自斂若妄用生肌之藥餘毒未盡而反益甚耳殊不知瘡瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣榮養○東垣云胃乃發生之源爲人生之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本堅固誠哉是言也可不慎歟○又曰若肌肉傷而瘡口不斂用六君子湯以補脾胃若氣虛惡寒而瘡口不斂用補中益氣湯以補脾肺若血虛發熱而瘡口不斂用四物參朮以滋肝脾若膿多而瘡口不斂用八珍湯

或十全大補湯以養血氣如不應但用四君歸芪以補脾胃
 更不應乃屬命門火衰急用八味丸以壯火生土若脉數發
 渴者難治以真氣虛而邪氣實也○又曰生肌之法當先理
 脾胃助氣血為主若氣血俱虛不能生者當用托裏之劑若
 有風寒襲於瘡所不能生者宜用豆豉餅灸之若流注頑瘡
 內有膿管或瘀肉或癰核須用針頭散腐之錠子尤妙如背
 瘡杖瘡湯火瘡大潰當用神效當歸膏則能去腐生新止痛
 大有神效○又曰癰疽潰後毒盡則肉自生常見世之治者
 往往用龍骨血竭之屬以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何
 以得生氣血既虛龍竭豈能得效設若膿毒未盡就用生肌
 則反增潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者重者必
 致內攻或潰爛不斂反致危矣○又曰凡瘡瘍成漏皆因元
 氣不足營氣不從陽氣虛寒則寒氣逆於肉裏稽留血脉腐
 潰既久即成是患故凡治不足之證於其初患便當內用參
 芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨接補陽氣使自消散若久
 而不能成膿亦用前二法補助以速之若膿既成而不潰用
 艾於當頭灸數炷而出之却服十全大補湯患者又當慎起
 若節飲食庶凡收斂若用冷針開刺久而內出清膿外色黑

小冊上

黷或誤用生肌散速其口斂反束其邪必成敗證

諸瘡患久成漏常有膿水不絕其膿不臭若無反肉者法用炮

附子去皮尖為細末以唾津和為餅如三錢厚安瘡上以艾

炷灸之漏大艾亦大漏小艾亦小但灸令微熱不可令痛乾

則易之每灸一二十壯不論灸後貼以膏藥隔二三日又如

前再灸更服大補氣血之藥直至肉平為度或用炮附子切

片三分厚灸之亦可或用江匹淡豆鼓為餅多灸之亦效○

若瘡久成漏外有腐肉內有膿管不能收口者以針頭散和

作細條絛入口內外用膏藥貼之待膿管盡去自然漸平收

口或先用灸法數日後用此絛藥亦可仍內服十全大補等

藥

郭氏灸法瘡疽久不收斂及有膿水惡物漸潰根深者用白麩

硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分安

於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易後隔四日用藥錠

針頭散等藥絛入瘡內反肉盡去好肉長平然後貼收斂之

藥內服應病之劑調理即瘥矣

一男子年踰二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌

肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆鼓餅

灸之月餘而痊。○一婦人左臂結核年餘方潰膿清不斂。一男子患貼骨癰腿細短軟瘡口不合俱用十全大補湯外以附子餅及貼補藥膏調護得宜百劑而愈。大凡不足之證宜大補之劑兼灸以補接陽氣祛散寒邪爲上。○京師董賜年踰四十胸患瘡成漏日出膿碗許喜飲食如常以十全大補湯加貝母遠志白欬續斷灸以附子餅膿漸少謹調護歲餘而愈。薛按

用香散藥二十二

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆

於肉理故鬱聚爲膿得香散藥則氣流行故當多服五香連翹湯萬金散清心內固金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若毒氣入胃則爲咳逆古人用此可謂有理且如飲食調令香美則益脾土養真元保其無虞矣

立齋曰今人有瘡瘍不審元氣虛實病之表裏病者多喜內消而醫者卽用十宣散及敗毒散流氣飲之類殊不知十宣散雖有參芪然防風白芷厚朴桔梗皆足以耗氣况不分經絡時令氣血多少而槩用之乎敗毒散乃發表之藥果有表證亦止宜一二服多則元氣反損其毒愈盛雖有人參莫能補

也况非表證而用之乎流氣飲乃耗血之劑果氣結隔滿亦
止宜二三服多則血氣愈傷夫血氣凝滯多因榮衛氣弱不
能運行豈可復用流氣飲以益其虛况諸經氣血多寡不同
而流氣飲通行十二經則諸經皆為所損及為敗證雖有芎
歸亦難倚伏若服之過度則氣虛血耗何以成膿苟不察其
由而泛投尅伐之劑能無危乎此三藥者其不可輕用亦明
矣河間云凡瘡止於一經或兼二經者止當求責其經不可
干擾餘經也

槐花酒 二十三

槐花治濕退熱之功最為神速大抵腫毒非用蒜灸及槐花酒
先去其勢雖用托裏諸藥其效未必甚速惟胃寒之人不可
過用

滁州于侍御髀髀患毒痛甚服消毒藥其勢未減卽以槐花酒
一服勢隨大退再以托裏消毒之藥而愈○王通府患發背
十餘日勢危脉大先以槐花酒二服殺退其勢更以敗毒散
二劑再以托裏藥數劑漸潰又用桑柴燃灸患處每日灸良
久仍以膏藥貼之灸至數次膿潰腐脫以托裏藥加白朮陳
皮月餘而愈○劉大尹發背六七日滿背腫痛勢甚危與隔

全書卷四十一
外科
蒜灸百壯飲槐花酒二碗卽睡覺以托裏消毒藥十去五六
令以桑枝灸患處而潰數日而愈○一上舍肩患疽脉數以
槐花酒一服勢頓退再與金銀花黃芪甘草十餘服而平薛按

忍冬酒 二十四

忍冬酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何處或婦人
乳癰皆有奇效如或處鄉落貧家服此亦便且效仍兼以麥
飯石膏及神異膏貼之甚效

一園丁患發背甚危令取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鐘絞
取酒汁溫服粗卷患處四五服而平彼用此藥治瘡足以養

身成家遂棄園業諸書云金銀花治瘡瘍未成者卽散已成
者卽潰有回生之功○一男子患腦癰其頭數多痛不可忍
先服消毒藥不應更以忍冬酒服之卽酣睡覺而勢去六七
再四劑而消○又一男子所患尤甚亦令服之腫痛頓退但
不能平加以黃芪當歸瓜蒌仁白芷甘草節桔梗數劑而愈
○一男子被鬼擊身有青痕作痛以金銀花煎湯飲之卽愈
本草謂此藥大治五種飛尸此其驗也

腫瘍 二十五

立齋曰腫高焮痛脉浮者邪在表也宜托之○腫硬痛深脉沉

者邪在裏也宜下之○外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也當調營衛○焮腫煩躁或咽乾作渴者宜降火○焮腫發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之○大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒○煩躁飲冷焮痛脈數者邪在上也宜清之○惡寒而不潰者氣虛兼寒邪也宜宣而補之○焮痛發熱汗多大渴便結譫語者結陽證也宜下之○不作膿或熟而不潰者虛也宜補之○又曰大抵癰腫之證不可專泥于火爲患况稟有虛實及老弱不同豈可槩用寒涼之藥設若毒始聚勢不盛者庶可消散尤當推其病因別其虛實若槩用涼藥必致誤事如膿將成邪盛氣實者用消毒之劑先殺其毒雖作膿不爲大苦潰亦不甚若就用托裏必益其勢如膿將成不成及不潰者方用托裏膿成勢盛者針之膿一出諸證悉退矣

丹溪曰腫瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主如欲用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以補接爲主如欲用香散未免虛虛之失

愚意前論腫瘍有云忌補宜下者有云禁用大黃者此其爲說若異而亦以證有不同耳蓋忌補者忌邪之實也畏攻者畏

氣之虛也。卽如腫瘍多實，潰瘍多虛。此其常也。然腫瘍亦多不足，則有宜補不宜瀉者；潰瘍亦或有餘，則有宜瀉不宜補者。此其變也。或宜補，或宜瀉，總在虛實二字。然虛實二字，最多疑似。貴有定見。如火盛者，宜清者也；氣滯者，宜行者也；既熱且壅，宜下者也；無滯無壅，則不宜妄用攻下。此用攻之宜禁者也。至若用補之法，亦但察此二者。凡氣道壅滯者，不宜補。火邪熾盛者，不宜溫。若氣道無滯，火邪不甚，或飲食二便清利如常，而患有危險可畏者，此雖未見虛證，或腫瘍未潰，亦宜卽從托補。何也？蓋恐困苦日久，無損自虛。若能預固元

氣，則毒必易化，膿必易潰，口必易斂。卽大羸大潰，猶可望生。若必待虛證叠出，或旣潰不能收斂，而後勉力支持，則輕者必重重者必危，能無晚乎？此腫瘍之有不足也。所係非細，不可不察。○向予長男生在癸丑，及乙卯五月甫，及二週而患背疽。初起時，背中忽見微腫，數日後按之則根深漸潤，其大如碗，而皮色不變，亦不甚痛。至十餘日，身有微熱，其勢滋甚。因謀之瘍醫，或云背疽，或云痰氣，咸曰葷腥溫補一毫不可入口，乃投以解毒之藥一劑，而身反大熱，神氣愈困，飲食不進矣。予危懼之甚，因思丹溪有云：癰疽因積毒在臟腑，當先

助胃氣為主使根本堅固而以行經活血佐之又曰健見腫
痛參之脉證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉是誠確論
也因却前醫而專固元氣以內托其毒遂用人參三錢製附
于一錢佐以當歸熟地炙甘草肉桂之屬一劑而飲食頓進
再劑而神彩如舊抑何神也由是弛其口腹藥食並進十劑
而膿成以其根深皮厚復用針出膿甚多調理月餘而愈向
使傾信庸流絕忌溫補滋味專意解毒則胃氣日竭毒氣日
陷飲食不進倘致透隔內潰則萬萬不保矣且此兒素無虛
病何敢乃爾益以其既屬陰證又無實邪見有確真故敢峻

補脾腎方保萬全嗚呼醫之關係皆是類也因錄此按用告
將來以見腫瘍潰瘍凡虛證未見而但無實熱壅滯可據者
便宜托補如此則其受益于不識不知有非可以言語形容

者
新按

腫瘍不足 二十六

汪太夫人年逾八十腦疽已潰發背繼生頭如粟米脉大無力
此膀胱經濕熱所致然脉大無力乃血氣衰也遂以托裏消
毒散數服稍可更加參芪之劑雖瘡起而作渴此氣血虛甚
以人參黃芪各一兩當歸熟地各伍錢交冬五味各一錢數

服渴止而愈此不有臟腑能言氣血能告豈能省悟病者至
死皆歸於命深可哀也○又有患者氣虛素實或有痰不服
補劑然不知膿血內潰氣血愈虛豈不宜補余常治瘡陰用
參芪大補之劑陽書敗毒之名與服之俱不中滿瘡亦隨效
虛甚者尚加薑桂甚至附子未嘗有不效也薛按

潰瘍 二十七

立齋曰膿熟不潰者陽氣虛也宜補之○瘡肉不腐者宜大補
陽氣更以桑木灸之○膿清或不斂者氣血俱虛宜大補○
膿後食少無睡或發熱者虛也宜補之○倦怠懶言食少不

睡者虛也宜補之○寒氣襲於瘡口不能收斂或陷下不斂
者溫補之○脉大無力或微濡者氣血俱虛也峻補之○出
血或膿多煩躁不眠者乃亡陽也急補之○凡膿潰而清或
瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛
也非補不可○凡膿血去多瘡口雖合左當補益務使氣血
平復否則更患他證必難治療也○又曰大抵膿血大泄當
大補血氣爲先雖有他證以未治之凡癰疽大潰發熱惡寒
皆屬氣血虛甚若左手脉不足者補血藥當多於補氣藥右
手脉不足者補氣藥當多於補血藥切不可發表○大凡癰

疽全藉血氣爲主。若患而不起。或潰而不腐。或不收斂。及膿少。或清。皆血氣之虛也。俱宜大補之。最忌攻伐之劑。亦有膿反多者。乃氣血虛而不能禁止也。常見氣血克實之人。患瘡者。必腫高色赤。易腐潰而膿且稠。又易於收斂。怯弱之人。多不起發。不腐潰。及難於收斂。若不審察。而妄投攻劑。虛虛之禍。不免矣。及患後更當調養。若癩癧流注之屬。尤當補益也。否則更患他證。必難措治。慎之。○又曰。潰瘍氣屬。氣血俱虛。固所當補。若患腫瘍。而氣血虛弱者。尤宜預補。否則雖潰而不斂矣。又凡大病之後。氣血未復。多致再發。若不調補。必變爲他證而危。或誤以瘡毒復發。及行攻伐。則速其不起。深可爲戒也。○又曰。若瘡瘍腫焮痛甚。煩躁脈大。則辛熱之劑。不但腫瘍不可用。卽潰瘍亦可用也。

太平聖惠方云。凡癰疽膿潰之後。脈微澁遲緩者。邪氣去而真氣將復也。爲易愈。若脈來沉細而直者。裏虛而欲變證也。若膿血旣去。則當脈靜身涼。腫消痛息。如傷寒表證之得汗也。若反發熱作渴。脈洪數者。此真氣虛而邪氣實也。死無疑矣。

潰瘍有餘二十八

潰瘍有餘之證。其辨有四。蓋一以元氣本強。火邪本盛。雖膿潰

之後而內熱猶未盡除或大便堅實而能食脉滑者此其形
 氣病氣俱有餘仍宜清利不宜溫補火退自愈亦善證也一
 以真陰內虧水不制火膿既泄而熱反甚脉反躁者欲清之
 則正氣以虛欲補之則邪氣愈甚此正不勝邪窮敗之證不
 可治也一以毒深而潰淺者其肌腠之膿已潰而根盤之毒
 未動此乃假頭非真潰也不得遽認爲潰瘍而槩施托補若
 誤用之則反增其害當詳辨也又有一種元氣以虛極似宜
 補然其稟質滯濁肌肉堅厚色黑而氣道多壅者畧施培補
 反加滯悶若此輩者真虛既不可補假實又不可攻最難調

理極易招怨是亦不治之證也總之潰瘍有餘者十之一二
 故潰瘍宜清者少腫瘍不足者十常四五故腫瘍宜補者多
 此亦以癰疽之危險有關生死者爲言故貴防其未然也至
 若經絡浮淺之毒不過腫則必潰潰則必收又何必卷卷以
 補瀉爲辨也觀者審之

一男子年逾三十腹患癰腫脉數喜冷齊氏云瘡瘍腫起堅硬
 瘡虛之實也河間云腫硬木悶煩躁飲冷邪氣在內也遂用
 清涼飲倍加大黃三劑稍緩次以四物湯加芩連山梔木通
 四劑遂潰更以十宣散去參芪肉桂加金銀花天花粉漸愈

彼欲速效自服溫補藥遂致肚腹俱腫小便不利仍以清涼
飲治之膿潰數碗再以托裏藥而愈○趙宜人年逾七旬患
鬢疽已潰焮腫甚痛喜冷脈實大便秘澁東垣曰煩躁飲冷
身熱脈大精神昏悶者皆臟腑之實也遂以清涼飲一劑腫
痛悉退更以托裏消毒藥三十餘劑而平若謂年高潰後投
以補劑實實之禍不免矣薛按

潰瘍作痛 二十九

立齋曰膿出而反痛者虛也宜補之○脈數虛而痛者屬虛火
宜滋陰○脈數實而痛者邪氣實也宜泄之○脈實便秘而

痛者邪在內也宜下之○脈澀而痛者氣血虛寒也溫補之
○大抵瘡之始作也先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故多痛
膿潰之後腫退肌寬痛必漸減若反痛者乃虛也宜補之亦
有穢氣所觸者宜和解之風寒所逼者宜溫散之

丁蘭年二十餘股內患毒日久欲求內消診其脈滑數知膿已
成因氣血虛不潰遂刺之膿出作痛以八珍湯治之少可但
膿水清稀更以十全大補湯加炮附子五分數劑漸愈仍服
十全大補湯三十餘劑而痊○一僧股內患腫一塊不痛不
潰治以托藥二十餘劑膿成刺之作痛予謂腫而不潰潰而

及痛此氣血虛甚也宜峻補之彼云氣無補法予謂正氣不足不可不補補之則氣化而痛邪自除遂以參芪歸朮熟地黃治之兩月餘而平

薛按

潰瘍發熱

附惡寒三十

用手模熱有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按之至筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也

仲景曰脈虛則血虛血虛生寒陽氣不足也○寸口脈微為陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒尺脈弱為陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也

王氏曰病熱而脈數按之不鼓動乃寒盛格陽而致之非熱也形證似寒按之而脈氣鼓擊於指下盛者此為熱甚拒陰而生病非寒也

東垣曰發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣或日痛鼻乾但脈洪大按之無力者非白虎湯證也此血虛發躁當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱之證如不能食而熱自汗氣短者虛也當以甘寒之劑瀉熱補氣如能食而熱口舌乾燥

大便難者當以辛苦大寒之劑下之以瀉火保水○又日晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜發熱煩躁是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

立齋曰脉浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣○脉濇而熱者血虛也宜補血○脉浮數發熱而痛者邪在表也宜散之○脉沉數發熱而痛者邪在裏也當下之○午前熱者補血為主○午後熱者補氣為主○左手脉小於右手而熱者用血藥多於氣藥○右手脉小於左手而熱者用氣藥多於血藥

血藥

發熱煩躁 三十一

王太樸曰大寒而甚熱之不熱是無火也當治其心大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止條忽往來時動時止是無水也當補其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也夫寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責腎之弱治者當深味之

立齋曰瘡瘍發熱煩躁或出血過多或膿潰大泄或汗多亡陽

或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而非火也○若發熱無寐者血虛也用聖愈湯兼汗不止氣虛也急用獨參湯○發熱煩躁肉瞶筋惕血氣俱虛也用八珍湯○大渴面赤脉洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯○肢體微熱煩躁面赤脉沉而微陰盛發躁也用四君加薑附作嘔三十二

立齋曰喜熱惡寒而嘔者宜溫養胃氣○脉細腸鳴腹痛滑瀉而嘔者宜托裏溫中○喜寒惡熱而嘔者宜降火○脉實便秘而嘔者宜瀉火○若不詳究其源而妄用攻毒之藥則重

者不能潰潰者不能斂矣雖丹溪曰腫瘍時嘔當作毒氣攻心治之潰瘍時嘔當作陰虛補之殊不知此大槩之言耳况今之熱毒內攻而嘔者十纔一二脾胃虛寒或痰氣而嘔者十居八九故不可執以爲言也○又曰凡癰瘍腫赤痛甚煩躁脉實而嘔者爲有餘當下之若腫硬不潰脉弱而嘔者乃陽氣虛弱當補之若嘔吐少食者乃胃氣虛寒當溫補脾胃若痛傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖在腫瘍當助胃壯氣若妄用攻伐多致變證不治

薛氏樞要曰瘡瘍作嘔不可泥於熱毒內攻而槩用敗毒等藥

○如熱甚，燉痛，邪氣實也。仙方活命飲解之。○作膿，燉痛，胃氣虛也。托裏消毒散補之。○膿熟，脹痛，氣血虛也。先用托裏散，後用針以泄之。○燉痛，便秘，熱壅於內也。內疎黃連湯導之。○若因寒藥傷胃而嘔者，托裏健中湯。○胃寒少食而嘔者，托裏益中湯。○中虛寒滯而嘔者，托裏溫中湯。○肝木乘脾而嘔者，托裏抑清湯。○胃脘停痰而嘔者，托裏清中湯。○脾虛自病而嘔者，托裏益黃湯。○鬱結傷脾而嘔者，托裏越鞠湯。○又曰：大凡諸瘡作嘔，若飲冷便秘，是熱毒也。黃連消毒散解之。○飲冷便實，是胃火也。竹葉石膏湯清之。○懶食飲湯，是謂虛也。補中益氣湯補之。○大便不實，喜飲熱湯，是脾胃虛寒也。六君加炮薑以溫之。○常見脾胃虛弱者，用前散，及心膈陰冷致嘔，而喉舌生瘡，乃腎水枯涸，虛火炎上也。其證甚惡，急用加減八味丸，亦有得生者。

熱毒作嘔證，如劉貴忠腹癰，燉痛煩躁，脈實作嘔。河間云：瘡瘍者，火之屬，須分內外，以治其本。若脈沉實者，先當疎其內，以絕其源。又曰：嘔噦心煩，脈沉而實，腫硬木悶，或皮肉不變，邪氣在內，宜用內疎黃連湯治之。然作嘔，脈實毒在內也。遂以前湯通利二三次，諸證悉去，更以連翹消毒散而愈。○金臺

王時亨年踰四十患臂毒焮痛作嘔服托裏消毒藥愈甚予
用涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而消薛按

胃寒作嘔證如顧浩室人年踰四十患發背治以托裏藥而潰
忽嘔而瘡痛胃脉弦緊彼以爲餘毒內攻東垣云嘔吐無時
手足厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後發嘔不食者濕氣侵于
內也又云膿出而反痛此爲虛也今胃脉弦緊木乘土位其
虛明矣予欲以六君子湯加酒炒芍藥砂仁藿香治之彼自
服護心散嘔愈甚復邀治仍用前藥更以補氣血藥兩月而
愈○大抵濕氣內侵或感穢氣而作嘔者必喜溫而脉弱熱

毒內攻而作嘔者必喜涼而脉數必須辨認明白亦有大便
不實或腹痛或膨脹或嘔吐或吞酸噯腐此皆腸胃虛寒也
以理中湯治之如不應加熟附子二三片○予嘗飲食少思
吞酸噯腐諸藥不應惟服理中湯及附子理中丸有效蓋此
證皆因中氣虛寒不能運化鬱滯所致故用溫補之劑使中
氣溫和自無此證矣○張生患漆瘡作嘔由中氣虛弱漆毒
侵之予以六君子湯加砂仁藿香酒炒芍藥治之彼不信另
服連翹消毒散嘔果甚復邀治仍以前藥外用麻油調鐵銹
末塗之而愈薛按

戴氏曰如惡心者無聲無物欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心寔非心經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也

各元禮
南院使

作渴 三十二

李氏曰人病疽多有愈後發渴而不救者十有八九或先渴而後患疽者尤為難治急用加減八味丸可免前患若疽安而渴者服此丸則渴止疽安而未渴者預服此丸則永不生渴或未發疽而先發渴者服此不惟渴止且疽亦不作氣血加壯真神劑也○又曰癰疽已安之後或未安之際口舌燥黃

如雞內金者乃腎水枯竭心火上炎此證最惡古人云玉華池竭七廟亡若誤投以丹藥則禍在反掌急用加減八味丸桑枝煎五味子湯以滋補之○又云一貴人病疽未安而渴作一日飲水數升予以加減八味丸治之諸醫大笑云此能止渴我輩當不復業醫皆用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等劑服多而渴愈甚不得已用此藥三日渴止久服遂不服渴飲食加倍健於少壯蓋此藥非出鄙見自為兒時聞先君言有人病渴用渴藥累年不愈一名醫使服此藥降心火生腎水為最家藏此方親用嘗驗患者當知所鑒

詳外科精要

馬益卿曰癰疽作渴乃氣血兩虛宜用參芪以補氣當歸地黃以養血或用黃芪六一湯或用忍冬丸其方以忍冬藤入瓶內加無灰酒微火煨一宿取出晒乾少加甘草俱為末仍用餘酒調糊為丸桐子大每服百餘丸溫酒下兼治五痔諸瘻氣

立齋曰尺脉大或無力而渴者宜滋陰降火○上部脉沉實而渴者宜瀉火○上部脉洪數而渴者宜降火○胃脉數而渴者宜清胃火○氣虛不能生津液而渴者宜補中氣○脉大無力或微弱而渴者宜補氣血○膿血大泄或瘡口出血而

渴者宜大補氣血如不應急用獨參湯

薛氏樞要曰瘡瘍作渴若焮腫發熱便利調和者上焦熱也用

竹葉石膏湯○腫痛發熱大便秘澀者內臟熱也用四順清

涼飲○焮腫痛甚者熱毒蘊結也用仙方活命飲○漫腫微

痛者氣血虛壅也用補中益氣湯○若胃火消爍而津液短

少者用竹葉黃芪湯○若胃氣虛弱不生津液者用補中益

氣湯○若胃氣受傷內無津液者用七味白朮散○若腎水

乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸○或先口乾作渴

小便頻數而後患疽或疽愈後作渴飲水或香黃乾硬小便

數而疽生者，尤其惡也。苟能逆知其因，預服加減八味丸，補中益氣湯，以滋化源，可免是患。○心法曰：予治瘡瘍作渴，不問腫潰，但脈數發熱而渴，以竹葉黃芪湯治之。○脈不數，不發熱，或脈數無力而渴，或口乾，以補中益氣湯。○若脈數而便秘，以清涼飲。○若尺脈洪大，按之無力而渴，以加減八味丸。若治口燥舌黃，飲水不歇，此丸尤效。

瀉痢 三十四

止齋曰：瘡瘍大便泄瀉，或因寒涼剋伐，脾氣虧損，或因脾氣虛弱，食不剋化，或因脾虛下陷，不能升舉，或因命門火衰，不能生土，或因腎經虛弱，不能禁止，或因脾腎虛寒，不能司職，所主之法，若寒涼傷脾，六君加木香砂仁，送二神丸。○脾虛下陷，用補中益氣，送二神丸。○命門火衰，用八味丸料，送四神丸。○腎虛不禁，用薑附湯，加吳茱萸五味。○脾腎虛寒，用參附湯，送四神丸。○病機云：脈沉而細，身不動作，睛不瞭，瞭飲食不下，鼻準氣息者，薑附湯主之。身重四肢不舉者，參附湯主之。○仲景云：下痢腸鳴，當溫之。脈遲緊痛未止，當溫之。大孔痛當溫之。心痛當救裏，可與理中附子四逆輩。○精要云：癰疽嘔瀉，腎脈虛者不治。凡此難治之證，如按前法治之，多

有可生者

御醫王彭峯之內年踰四十背疽不起發泄瀉作嘔食少厥逆
脉息如無屬陽氣虛寒用大補劑加附子薑桂不應再加附
子二劑瀉愈甚更以大附子薑桂各三錢參芪歸朮各五錢
作一劑腹內始熱嘔瀉乃止手足漸溫脉息遂復更用大補
而潰再用托裏而斂十年後仍患脾胃虛寒而歿薛按

大便秘結 三十五

立齋曰瘡瘍大便秘結若作渴飲冷其脉洪數而有力者屬實
火宜用內疎黃連湯○若口乾飲湯其脉浮大而無力者屬

氣虛宜用八珍湯○若腸胃氣虛血燥而不通者宜用十全
大補湯培養之○若瘡證屬陽或因入房傷腎而不通者宜
用前湯加薑附回陽多有得生者○若飲食雖多大便不通
而肚腹不脹者此內火消燦切不可通之○若肚腹痞脹而
直腸乾澀不通者宜用猪膽汁導之若誤行疏利復傷元氣
則不能潰斂○經曰腎開竅于二陰臟精於腎津液潤則大
便如常若潰瘍有此因氣血虧損腸胃乾澀當大補為善設
若不審虛實而一於疎利者鮮有不誤○若老弱或產後而
便難者皆氣血虛也猪膽汁最效甚者多用之更以養血氣

樂助之萬不可妄行攻伐

姑賓鷓鴣仲夏患發背黯腫尺餘皆有小頭如鋪粟狀四日矣此真氣虛而邪氣實也遂隔蒜灸之服活命飲二劑其邪頓退乃純補其真陰又將生脉散以代茶飲瘡邪大退余因他往三日復視之飲食不入中央肉死大便秘結小便赤濁余曰中央肉死毒氣盛而脾氣虛也大便秘結小腸虛而不能傳送也小便赤濁脾虛而火下陷也治亦難矣彼始云莫非間斷補藥之過也余曰然乃急用六君子加當歸柴胡升麻飲食漸進大便自通外用烏金膏塗中央三寸許四圍紅腫漸消

中央黑腐漸去乃敷當歸膏用地黃丸與前藥間服將百劑而愈薛按

小便淋瀝不利 三十六

立齋曰瘡瘍小便淋漓頻數或莖中澀者腎經虧損之惡證也宜用加減八味丸以補陰○足脛逆冷者宜用八味丸以補湯○若小便頻而黃者宜用四物湯加參朮麥門五味以滋肺腎○若小便短而少者宜用補中益氣加山藥麥門五味以補脾肺○若熱結膀胱而不利者宜用五淋散以清熱○若脾氣燥熱而不能化者宜用黃芩清肺飲以滋陰○若膀胱

膀胱虛陽無以生者宜用滋腎丸○若膀胱陽虛陰無以化者宜用六味地黃丸腎虛之患多傳此證非滋化源則不救若用黃柏知母反瀉其陽是速其危也○若老人陰痿思色精氣內敗莖中痛而不利者用加減八味丸加車前子牛膝不應更加附子多有復生者○若精已竭而復耗之大小便中牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛以前藥加附子亦有復生者○王太僕云無陰則陽無以化無陽則陰無以生當滋其化源若專用淡滲復損真陰乃速其危也

發瘧 三十七

立齋曰瘡瘍發瘧因氣血虧損或爲外邪所搏或內虛鬱火所致其形則牙關緊急四肢勁強或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔瘧風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛瘧寒能滯血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍產後多患之乃敗證也若大補氣血多有可治者若作風治速其危矣

瘧論法俱詳見雜證謨十二卷瘧證門所當參閱

無寐 二十八

立齋曰瘡瘍潰後無寐發熱煩躁血虛也聖愈湯○自汗不止

無寐氣虛也四君加黃芪五味子○發熱煩躁肉瞶筋惕氣
血虛也八珍湯○大渴面赤脉洪大而浮陰虛發熱也當歸
補血湯○肢體微熱煩躁面赤脉沉微陰盛發躁也四君加
薑附

瘡瘍出血 三十九

立齋曰瘡瘍出血因五臟之氣虧損虛火動而錯經妄行也當
求其經審其因而治之○若肝熱而血妄行者宜四物加炒
山梔芩朮丹皮○肝虛而不能藏血者六味地黃丸○心虛
而不能主血者四物加炒黃連丹皮芩朮○脾虛熱而不能

統血者四君子加炒梔子丹皮○若脾經鬱結用歸脾湯加
五味子○脾肺氣虛用補中益氣湯加五味子○氣血俱虛
用十全大補湯○陰火動者用六味丸加五味子○凡火
血過多見煩熱發渴等證勿論其脉急用獨參湯以補氣經
云血生於氣苟非參芪歸朮甘溫等劑以生心肝之血決不
能愈若發熱脉大者不治○凡患血證皆當以犀角地黃湯
為主

戒忌調護 四十

李氏云病疽之人當戒酒麪炙燻醃臘生冷油膩雞鶩魚腥之

類若起居七情尤當深戒務令臥室潔淨馨香使氣血流暢仍忌僧道孝子產婦經婦及雞犬猫畜之類若背疽難於隱凡宜用綠荳十斗作一袋隱伏其上以解毒涼心也○又曰大凡臟腑已利瘡毒已潰氣血既虛最當調護若發熱而服涼藥無不致禍

立齋曰綠荳性寒主丹毒煩熱風疹或金石所發實熱煩渴飲食如常證屬純陽者極宜用之否則不可輕用也○又曰如瘍食肉乃自棄也瘡瘍之毒發於營氣今反助之與自棄何異雖用藥治亦不能愈

東垣云胃為五臟之根本胃氣一傷諸證皆虛七惡蜂起可不慎哉

愚按瘡瘍當忌暈腥然以愚見言之則惟熱火證及疔毒陽則毫不可犯宜切慎也至若營衛大虛而毒不能化肉不能長凡宜溫宜補等證豈亦不宜滋補乎故古人號黃芪為全肉則既宜黃芪未有不宜羊肉者惟猪肉牛肉醇酒及傷脾助濕等物則不可不忌

陰陽證變

四十一

太監劉開患發背腫痛色紫診其脉息沉數陳良甫云脉數發

熱而痛者發於陽也且瘡瘍赤甚則紫即火極似水也詢之
嘗服丹石藥半載乃積溫成熱所致遂以內疎黃連湯再服
稍平更用排膿消毒藥及猪蹄湯太一膏而愈經曰色與脉
當相參應治之者在明亢害承制之理陰陽變化之機焉耳
○舉人潘光甫年四十患腦疽焮腫診其脉沉靜予謂此陽
證陰脉斷不起已而果然蓋瘡瘍之證雖屬心火尤當分表
裏虛實與元氣克實內有實火者寒劑或可責效若寒涼
度使胃寒脾弱陽證變陰或結而不潰潰而不斂陰陽乖戾
水火交爭死無日矣薛按

論列方 外科止

參附湯 補三八

薑附湯 熱三三二 外三三三

托裏散 外四三

四君子湯 補一

八珍湯 補十九

獨參湯 補二六

六君子湯 補五

四物湯 補八

聖愈湯 補九一

理中湯 熱一

歸脾湯 補三三三

六味丸 補一二二

回陽湯 外三七

滋腎丸 寒一六三

八味丸 補一二二

護心散 外七二

敗毒散 散三六

二神丸 熱一五一

冲和湯 外二四

清涼飲 外九十

四神丸 熱一五二

麻黃湯 散一

流氣飲 外五五

涼膈散 痘八三

五淋散 寒百十七

清胃散 寒四五

五香湯 木人即 外五一方

十宣散 痘十四

濟陰湯 外八五

白虎湯 寒二

萬金散 外六七

漏蘆湯 外九五

奪命丹 外七七

蠟礬丸 外七四 七五

冰心酒 外百二

槐花酒 外百四

遠志酒 外百六

國老膏 外六八

桑枝煎 外百九

製甘草湯 外六八

五味子湯 補五八

神仙截法 外百十

十全大補湯 補二十

仙方活命飲 外一

人參黃芪湯 外二六

補中益氣湯 補三一

托裏消毒散 外二

托裏溫中湯 外十二

托裏健中湯 外十一

托裏清中湯 外十六

托裏益黃湯 外十五

托裏益中湯 外十三

托裏抑青湯 外十七

托裏越鞠湯 外十九

托裏溫經湯 外十四

七味白朮散 小七

丁香柿蒂散 熱六五

黃芪六一湯 補五十

當歸補血湯 補四五

加減八味丸 外三八

人參養營湯 補二一

人參平肺散 寒三七

人參理中湯 熱一

人參敗毒散 散三六

附子理中湯 外二四

竹葉黃芪湯 寒七

黃連消毒散 外六十

黃連解毒湯 寒一

竹葉石膏湯 寒五

連翹消毒散 外六一

內疎黃連湯 外九三

五香連翹湯 外五一

四順青涼飲 攻二五

黃芩清肺飲 寒三八

內固金粉散 外七三

犀角地黃湯 外四六

乳香定痛丸 外五七

犀角升麻湯 外四七

香砂六君湯 補七

神仙薰照方 外二二二

附子餅 外百十六

豆鼓餅 外百十七

桑枝炙 外百二十

葱熨法 外一二一

隔蒜灸 外百十五

騎竹馬法 外百十四

鐵頭散 外一四四

降癰散 新因三六

交飯石膏 外一三九

烏金膏 外一四二

陰陽散 外一三三

抑陰散 外一三一

抑陽散 外一三二

猪蹄湯 外三二五

浴毒陽 即百草煎之類新因三七

太乙膏 外三百八

當歸膏 外三一四

神異膏 外三百十

景岳全書四十六卷終



