

元戎

120

庫文閣内			
漢	三	二	二
函	二	二	二

内閣文庫			
番號	漢	12421	
冊數		12(4)	
函號	300	216	



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



医聖元戎卷第四

趙州教授兼提舉管内医学王好古進之箚次

陽明證

王朝奉集註

證語例

陽明證

王朝奉集註

證語例

陽明證

陽明證

之重

謔語有數種

有胃實謔語者下證

也

有合病謔語者乃太陽合病也其證腹

痛身重口不仕

面垢謔語遺尿白虎湯有少

陽謔語少陽不可發汗只宜小柴胡湯有火

劫劫

却謔語以大却發汗熱氣入胃故也救逆湯

驚

語

有汗多亡陽譫語不可下也宜柴胡桂枝湯和其采衛以通津液自愈有下後譫語傷寒八九日下之胃滿煩多小便不利譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蛎湯有熱入血室譫語陽明病下血譫語者熱入血室俱臥汗出刺期門又婦人中凡經水適來譫語為熱入血室小柴胡湯刺期門穴有肝乘脾譫語傷寒腹滿譫語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰橫刺期門穴有畫則明了夜來譫語此熱入血室無犯胃氣及上二焦

不治自愈

仲景調胃承氣湯

一李李元

治正陽明而不滿

大黃 酒浸 五錢 甘草 三錢 芒硝 一錢

右剉作一服水煎服加生薑亦得調胃承

氣湯方四物湯各半合名玉燭散

大承氣湯 治大實大滿

枳實 炒 厚朴 剉 大黃 實酒 芒硝 燥

小承氣湯 治太陽明實而微滿

枳實 炒 厚朴 剉 大黃 生

海藏云調胃承氣湯治實而不滿即正陽明

是也大氣湯治大滿大實而太陽明是也小氣湯治實而微滿少陽明是也太陽明正陽明為最高之分大黃但用酒浸從巔而下之也惟少陽明為最下之分三經之內故大黃不用酒浸也非若二經而高者若最高之分用最下之藥則耳目昏冒咽頰腫痛神疾不清之病有不免矣若最下之分用最高之藥則胃中氣消日久不復虛損成癆之病又不免矣故仲景三氣湯各有主治隨經而用即不同也又年老

虛人傷寒可下者大氣湯調胃氣湯皆去硝慢煨火熬成入玄明粉量輕重而下之

煉玄明粉法

朴硝二斤淘淨生好牙者用砂鍋一枚墨實以炭火十斤煨之徐徐輕沸可住大火令大沸定以炭蓋之復以炭十五斤緊煨至火盡放冷一伏時出鍋中藥放紙上攤勻就地上以盆蓋之一伏時日晒乾入甘草二兩炒微黃剉碎熱同搗細末量熟熱輕重沸熨二三錢亦可愈正經云味辛甘性冷則治熱病明矣兼

鍋

熟恐熱訛

味辛又鹹此能潤躁燥更堅也非大便燥結水
滑有力及洪大者不且眠却言煖水藏甘子
眠之補血脈有失用某寒熱之本意鍾云鹹
能勝血豈能補血哉又方治陰毒一句其
言又為錯矣若令硫黃附子及諸陽藥多寡
相佐而行則可以治陰中有伏陽也若是陰
毒別無伏陽殺人甚速矣太清伏煉法云硝
能制伏陽精解火石之毒則不治陰可知用
者審詳也

仲景治雜病三物厚朴湯

厚朴 半斤 枳實 五斤 大黃 四兩

右以水一斗二升煎厚朴枳實取五升內入
大黃再煎取三升溫服二升腹中轉動失氣
是也更眠一眠下之不効再眠易老治消渴
在中為順氣散

調胃承氣湯加牛蒡子寒水石為細末煉蜜酒
服治疫氣大頭病加當歸為滌毒散治
時氣疣瘡五癰瘡喉閉留頭大便軟升
廣荷葉湯陽震之象也王朝奉舉常谷之
云有大小便不通氣結一條有大便不通

荷

連服三承氣湯及諸下湯不通者多是氣結
必死矣可針會陰穴在兩陰之間此數有救
得者因此亦有承氣內兼巴豆下而通者不
可不知加郁李仁佳 蜜導善銳二法在後
氣結會食療云酒服郁李仁四十九粒更
瀉尤良

仲景厚朴七物湯

治收痛腸滿

厚朴 半斤 大黃 三兩 生薑 五兩 桂 二兩
甘草 三兩 大棗 十枚 枳實 五枚

右以水一斗煎取四升去滓溫服八合日三

服 呃者加半夏五合 下痢者加大黃

寒多者加生薑半斤

楊氏治身軀腫滿水

氣急卧不得郁李仁一大合為細末和麵搜
作餅子分食入口即大便通利氣便差

仲景桃仁承氣湯此下證脉在左手中其熱邪

侵昼無形之氣則入有形血也 調胃承氣

湯加桂桃仁引而入血也此當在畜血條下

仲景枳實理中湯 煉蜜作丸如刺子大白湯

下三十九

深師消飲丸

治宿酒停飲、胃滿吐逆、目視眊々、腹中水聲、痛不思飲食、

白朮 二兩 茯苓 半兩 枳實 麩炒 乾姜 各七

右細末、蜜丸、桐子大、空心溫水下、三十丸、日三服、半月愈、

仲景神奇枳實湯、治心下水、易老改二味作

丸、老年內傷便軟、

梅師治痞方

白朮 沢瀉

生薑煎服、與枳朮湯、和合四物作丸亦可、

五苓平胃各半散 生薑調服、治心下水 五

苓加石羔寒水石甘草、為末露飲、亦治心下水、^并并飲酒水瀉者、生薑調三五錢、清濁立分、

雄黃銑散

治下部蠱瘡

青箱子 雄黃 苦參 黃連 各三分 桃仁 去尖、一分、

右為散、以生艾搗汁、和丸、如東核、綿裹內下、部、扁竹汁更佳、冬無艾、只用散、綿裹內、亦得、狐惑、夕蠱、皆為虫證、傷寒熱入、食少、腸胃空、虛、三虫行、作求食、蝕人五藏、及下部、為蠱病、

其候齒無色舌白唇黑有瘡忽喜眠上唇有瘡食其藏也下唇有瘡食其肛也害人甚急治蠶挑仁湯黃連犀角湯雄黃銳散

小便不通例

仲景豬苓湯

本少陰之劑以其有五苓時三故列陽明條子又治中脘旁疝下有水或小便不通

豬苓 茯苓 沃陽 滑石 阿膠

右每眼五錢匕水二盞煎至一盞去滓內膠烱昼溫服日三小便不通一切利小便藥不

効以其眼附子太過消昼肺陰氣所不化師用黃連芩鮮毒而得通又劉子安病腦痼眼內托散後泄小止小便大不通亦消肺陰之過諸藥不効郭子明輩用五苓水道導之愈秘予用陳皮茯苓生甘草之類肺氣下行遂通若止用利小便藥其不知本甚矣

吳苑治五種淋疾勞淋血淋氣淋石淋至甚

者透格散

消石 一兩各泥白者研 虛人宜玄明粉

仁 仁 諸淋各依湯便干後

煎

勞倦虛損小便不出小腹急痛菜子未熟湯
 通後便須服補虛人參散 血淋小便不出
 時下血疼痛滿急 熱淋小便熱赤色淋瀝
 不快膝下急痛並用冷水調下 氣淋小腹
 滿急尿後常有餘瀝不通煎湯下 石淋莖
 中痛尿不能出引小腹膨脹急痛尿下沙
 石令人悶絕將菜末先入銚子內隔紙炒至
 紙焦再研細溫水調下 小便不通舊校云忍尿水字小麦湯
 下 卒患諸淋並宜冷調並空心先調便菜
 散如水即服之更以湯使送下服諸菜不効

先

者服此即愈 三焦熱淋玄明粉舊校云忍尿水字辛之如石
 羔尤佳本草云玄明粉調下劉禹錫云偏主
 石淋并止淋難產 冷淋小腸不利莖中急
 痛用石斛葉為末每服三錢水一盞葱白七
 寸煎至六分去粗食前溫服兼治吐血玄葱
 白不用冷淋熱淋俱用葱白連鬚取其潤而
 噉也

千金翼治淋黃芩四兩袋貯之水五升煮三升
 分三服小便卒大數非淋也令人瘦以石羔
 半斤碾細水一斗煮五升稍溫飲五合抱朴

子云石淋若不通石在小腸中、覓取淋中菜
當叩煎、有神効

抵聖散

治五淋小腸不利、莖中痛

栝柳三錢 麝香一兩 赤芍藥

右以咀、每服三錢、水一大盞、煎至七分、去粗
溫服食前

出

千金難產、經數日、不能生子、胎中、母欲死
者、瞿麥煎濃汁服、亦治竹木刺不得出肉
者、服此瞿麥汁

八正散 主治脩製並見方

扁

大黃 瞿麥 木通 通草 滑石

梔子 燈草 車前子 水煎

本證外、又治飲食過度、前後陰間有瘡、諸藥
不効、宜服此散、兼以馬齒莧及青黛為散上
之、可得痊愈、出衍義本草、馬齒莧條下

瞿麥湯

瞿麥 木通 各一 車前子 三分 茯苓

黃芩 猪苓 滑石 扁蓄

各

通草 各一分

石以咀、水煎服。渴者熱、加瓜蒌根。小便

赤、加黃芩。小便少、加車前子。小便澀淋

加石葦、冬葵子、續隨子。膝下悸動、加桂枝

石葦

石葦散

石葦 一本二兩 木通 一本二兩 瞿麥 各三 王不留行

耳草 當飯 芍藥 已上、各一兩 滑石

白朮 葵子 已上、各三兩 石為細末、湯調服

六一散

滑石 六兩 甘草 一兩

石為細末、調服。加當飯并泉石、為四血散

治衄血吐血便血。淋者、加梔子。莖中痛

加蒲黃。水瀉、加車前子、米飲調服

梔子散

治五淋、見鈴註

車前子散

治水瀉完、穀不化、三二年久不愈者、瘦弱氣

脫、諸菜難治

車前子 土、炒 陳皮 各二兩 甘草 一兩

右為細末、米飲調下

立効散

瞿麥 一兩 車草 三分 梔子 半兩

瘤

右吹咀、連鬚葱白、燈草、生姜、同煎、加連翹四兩、桔梗一兩、蜜丸、治癰痛結核。

○金鑰匙散

治產後大小便不通、腹脹等證。

滑石

蒲黃 各半斤

右細末、酒調下。

滑石、治婦人過忍小便、致胞轉、滑石為末、葱白

湯調下二錢、或三錢。

塗臍法、治大便不通。

芫遂末、內臍下白麪。

糊

紙花子帖、仍及臍下、並陰處、別用甘草湯服之。

傷寒類要、腹痛滿不得小便、及天行病、雄黃細

末、蜜凡如束核大、付溺孔中、雄黃常減減癰痕黑

髮、梅師治疳、淋瀝不通、水道熱、車前子葵

根水煎服之。

畜血、小便忘秘、而反自利、甚色白。

小便自利。

腎虛、下焦不收、胞有遺溺而頻。

楊氏產乳子母二方、治婦人妊娠小便不利、燕

青子末水調服方寸匕、日二服、莖菁、即蔓菁也。

广仁例 手陽明大腸經、亦可利之、太陰津液不行之根、

广仁凡

脾釣凡

神功凡

潤腸凡

三脫凡

五柔凡

三和散

七聖凡

七宣凡

大广仁凡

凡熱燥寒秘用

半疏丸

快活丸

仲景广仁凡 古方料

濕

治脉实多汗、浮芤相搏、為胃熱、浮洪相搏、為便難、此三者皆燥而損濕、故曰脾釣。

广仁

二升芍藥

半斤

枳實

半斤

大黃

一斤

厚朴

一尺

杏仁

一升

去皮尖、炙

研、作脂

熬

右六味、為細末、煉蜜丸、如桐子大、飲下十丸。

漸

日三服、漸加以和為度、
活人脾釣凡 見料、大抵浸數、則大便難。

广仁 半斤

芍藥

大黃

各二

厚朴

二兩

半

枳實

杏仁

各二

合半

石細末、煉蜜丸、桐子大、飲下十丸、末和益之。

並

汗多胃熱便難三者皆燥而乏液故曰脾約

千金翼并范仕張文仲崔氏等方煎與仲景同

許學士治年老虛人秘

大广仁 紫蘇子各半合作兩

右碾爛取汁分二作粥食之後不眠茶而愈

局方大广仁丸 主治脩製並見局方

陳皮 杏仁 木香

潤腸丸 蜜丸

陳皮 丁香 血加桃仁

活人五柔丸 主治脩製並見局方

大黃 前胡 半夏 茯苓 酒當飯

芍藥 茯苓 細辛 葶歷

右蜜丸如桐子大溫水下二十丸

局方中三和散

活人神功丸 主治並見局方

广仁 碎五兩 人參 半兩 大黃 訶子肉 各二兩

右細末煉蜜丸桐子大溫水下二十丸產後

秘者米飲下

局方七宣丸 主治脩製並見局方

大黃

枳實

木香

柴胡

桃仁

甘草

訶子皮

右煉蜜丸、桐子大、米飲下、二十九

東垣云、治在脉則瀉、在時則秋

七聖丸 主治脩製、並見局方

東垣云、治在脉則弦、在時則春

枳櫛

木香

川芎

羌活

桂心

大黃

郁李仁

右煉蜜丸、桐子大、溫水下、十五丸

活人三晚散 主治脩製、並見局方

獨活

白朮

陳皮

木香

甘草

大腹皮

紫菀

木瓜

沈香

川芎

枳櫛

右以咀、水煎服

半硫丸

治老弱虛人、大便秘者、此能利之、易簡云、此

潤劑也

硫黃

半夏

主治脩製、並見局方條下

快活丸 治中滿虛痞、此燥劑也

良薑

乾薑

枳實

陳皮

木香 吳茱萸

右細末、麩糊丸、桐子大、生薑陳皮湯下。

海藏已寒凡 此丸不僭上、陽生於下。

治陰證、脈四逆、輩、曾中發燥、而渴者、或數日
大便秘、小便赤淡、服此丸、上不燥、大小便自
利。

肉桂 附子 炮 烏乳 炮 良薑

乾薑 芍藥 茴香 各半分

右細末、米糊丸、桐子大、空心溫水下、五七十
丸、或八九十九、食前亦得、酒醋糊丸俱得。

仲景云 跌陽脈浮而濡、浮則胃氣強、濡則
小便數、浮濡相搏、大便則難、主病人溲數大
便亦難 **海藏**云 已寒上五味、雖熱者芍藥
茴香、潤劑引而下之、陰得陽而化、故大小自
通、如得春和之陽、冰自消矣。

五燥大便秘

東方 其脈弦、凡燥也、宜瀉凡之藥治之。

独活 羌活 防風 茱萸

地黃 柴胡 川芎

燥 南方 其脈洪、熱煩也、宜鹹苦之藥治之。

黄芩

黄连

大黄

黄蘗

芒硝

緩

西南方 其脉沉、土燥也、宜潤湿之、茶治之

芍药

半夏

生姜

乌梅

木瓜

西方 其脉沉、血燥也、宜滋血之、茶治之

杏仁

广仁

桃仁

當飯

气结用木香

枳实

枳实

陳皮

地黄

郁李仁

北方 其脉迟、寒燥也、宜温热之、茶治之

當飯

肉桂

附子

烏頭

硫黄

巴豆

玄皮

良姜

仲景吐下之後、不大便、五六日、至十余日、晡

所發潮熱、不惡寒、独治如見鬼狀、劇者發則

不論人、循衣摸床、^{疑盛}狂陽而^{疑劇}不安、微喘但發熱、護

語者、上誠則戲、今慌語也、屬大氣、氣陽

枳实

厚朴

大黄

芒硝

另入

右煎如常法、一服利者止、不必盡劑、千金翼

並同、海藏云、此治下之後、大便澀也、循衣

摸床者、熱之極也、自氣而之血、上而下之

識語

至厥陰之分、循衣摸床、撮空、惕而不安、擲手、揚視、手太陰也。此下而復上也。熱而不得出、故厥陰復傳于太陰也。

地黃黃連湯

治婦人血氣證、因大脫血崩漏、或前後血、因而枯燥、陰熱不^{一有陰字}循衣撮空、摸床、閉目不省、擲手、揚視、搖動不寧、錯語失神、脉弦浮而虛、內燥熱之極也。氣虛鼻乾而不聞、上下通燥、此為難治。當服此藥。

防凡 二面 川芎

當飯

生地黄

各七

梔子

黃連

各三

黃芩

赤芍藥

各二

右以咀、每服三錢、水二盞、煎七分、取清飲之。

時徐：夕之、若脉實者加大黃下之。大承

氣湯^{一有氣字}藥也。自內而之外者用之。血氣合病、循

衣撮空、其證相同。自氣而之血、而復之

氣、大承氣湯下之也。自血而之氣、而復

之血、地黃黃連湯主之。二者俱不得大便。

東垣先生、議論撮空證、並見難知。許學士

云、屬厥陰、潔古云、屬太陰、自下而上也。

畜血例

吐

衄血畜血上焦心下手不近畜血中焦旦將腹

小^{疑腹}大痛畜血下焦畜血上焦或吐或衄

或吐此胃中手不可近也

活人犀角地黄湯 易老云此藥為最勝

犀角 如無以升 芍藥 生地黄 牡丹皮

右以咀水煎服 熱多者加黃芩 脉大未

遲咳不喘自言喘者無熱也不用黃芩 升

广分犀角性味主治不同以升广代之以是

知引入陽也治瘡疹大盛 如元應人以黃

芩芍藥湯主之

活人黃芩芍藥湯 治虛不能飲食衄血吐血

白芍藥 黃芩 甘草

二藥治傷寒衄血吐血衄血 一法加生薑

黃耆

地黄散 治衄血往來久不愈

栝

生地黄 熟地黄 地骨皮 栝杞子

右末久焙乾為細末每服二錢蜜湯調下三

時

犀角地黄湯

治心經邪熱及言語蹇澀發狂心惕恍惚惑

忘之疾

生犀角

硃砂

黃連

牡丹皮

甘草各一

白茯苓

生地黄

各一

右為麻末水煎

錢氏亦治傷寒少陽、明

合病

必勝散

治男甘血妄行、吐血、衄血、咯血、衄血

人參

當歸

熟地黄

小薊根

川芎

蒲黃

烏梅肉

右末、分、麻末水煎、去滓、溫時服、

藥皮湯

治衄血吐血、吐血、皆失血虛損、形氣不理、羸瘦不能食、心忪少氣、燥渴發熱

生地黄

甘草

黃蘗

白芍藥

各一兩

右以咀、用醇酒三升、漬之一宿、以銅器盛、米

飲下、葶一炊時久、漬汁半升、食後時服、對病

增損、時後用熟地黄、水酒煎、飲清

○

香石湯

治產後血迷、不省人事

海浮石

研黃蘗

末

陳皮

去

甘草

各一兩

右為細末、陳米飲下三升、終分、連三服

至差、更益產後病、大破血、點雞冠、上化水

為驗

治室女月露滯淡心恍惚

鉛白霜細碾為末每服一錢地黃汁一合調

下如無汁生地黄煎水亦得

治鼻衄血鉛白霜末新水調下一字

畜血中焦

仲景桃仁養氣湯此即心下手不可近

易老用此湯獨治中焦以其內有調胃養氣之湯按此脫桂枝

桃仁

大黃

甘草

芒硝

右治牙齒等蝕數年不愈當作陽明畜血治

之此藥為細末煉蜜丸桐子大服之好飲葷

多有此疾屢服有效

畜血下焦三焦畜血脈俱在左手中

張仲景抵當湯脩治並見本方

水蛭 蠭虫 各三 桃仁 二十 大黃 三兩

右剉水煎服

舊按云疑夫按醫綱作夫

許州陳大人傳張仲景百勞丸

治一切癆瘵積帶疾不鍾藥壞證者宜服

當歸 炒 乳香 沒藥 各一 蠭虫 十四 去翅足

瀾

人參一大黃 四水蛭十四 桃仁十四 炙去皮尖 浸
 右為細末、煉蜜為丸、相子大、都作一服、可百
 九、五更用百沸水下、取惡物為度、服白粥十
 日、百沸水、杓揚百遍、乃仲景開水也。
 抵當丸、方陽、四味、日、但分而減半、搗細、水調服
 前之百方丸、乃是此抵當丸內、加人參、當歸
 沒藥、乳香、蜜丸、瀾水下。
 通經丸方、乃仲景抵當丸、加川山甲、廣茂、桃仁
 肉桂、蜜丸、婦人傷寒、姙娠、不可以此丸下、當
 以四物湯、大黃各半湯下之、在厥陰例、四物

湯條下

四血散 出診治明理論

治鼻血、口血、大小便血、服時隨病上下、食前
 後、

紫蘇

丹參

蒲黃

滑石

右各等分、細末調、以下有脫語

又方衛州張推官在戲院、王公以職、一有宿字 官直夜

口傳此方、治人効者、不可勝數、尋常凝滯、其
 効尤速、任衛不調、經脉閉塞、漸成癥瘕、

蛭虫

炙、炒、四

水蛭

炙、炒、四

斑猫

去翅、炙

杜牛膝各二 當飯 红花各三 滑石二

右細末、每服一錢、生桃仁七個、細研入酒調下、如血未通、再服、以通為度、食前

韓氏微旨方

地黄湯

治病人七八日後、兩手脈沈遲、細微、膚冷、膝下滿、或喜或妄、或狂、或燥、大便實而色黑、小便便自利者、此畜血證具也、若老年及少年氣虛弱者、宜此方主之

生地黄自然汁一升 如無生地黄自然汁一升

生藕自然汁半升 如無藕以藕刺汁半升

藍葉一握、切、碎、乾 蠶虫三十個、去足、翅、炊、黃

大黃散子大 桃仁半兩、炒 水蛭十個

右同一處、水三升半、同慢火熬、及二升以來

放冷、分三服、投一服、至半日許、血未下、再投

之、此地黃湯、此抵當湯凡、其實甚滯也、如無

地黄汁與藕汁、許升、散添水、同煎

〇〇生漆湯

病人七八日後、兩手脈沈細而數、或閉前脈

大疝下消、或狂走、或喜妄、或謔語、不大便、小便自利、若病人年少、氣實、即血凝難下、恐抵當凡力不能及、宜此

生地黄 汁一升、如無汁、只用

犀角 一兩、鎊為末

大黃 二兩、剉碎

桃仁 三十個、拍碎

右作一處、用水三升、好酒一升、慢火熬三升

以東、傾出、瀝去滓、再入鍋、投點一作光先生、瀝一兩

半、再熬之、至二升、即住、滓瀝去、滓放冷、作三

服、每投、服候半日、許、血未下、再投一服、候血

下、即止、服藥、如無生地黄汁、更添水一升、以

剪

海藏云、畜血、可用仲景抵當湯、凡恐庸医不知

藥性、用之太過、有不止、損血之候、老弱虛人

之禁也、故立生地黄湯、畜虫水蛭、大黃、桃仁

內、加生地黄、乾漆、生藕、藍葉之輩也、又云

生漆湯一方、亦恐其抵當湯、凡下之太過也

是以知乾漆為破血之劑、比之抵當湯、則輕

用之、通則重、用之、破積治食、則重也、食藥內

乾漆、礪砂、非氣實、不可用也

活人大黃湯

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

桃仁

二十个
麩炒黃

官桂

七兩
去皮

大黃

一耳草
兩

一兩

芒硝

二錢半

木通

一兩

大腹皮

一兩

右以咀每服四錢水一升鍾煎至六分去粗溫

服每時此方細末煉蜜丸桐子大溫酒下二

三十丸治婦人經閉或不調右婦人經閉

或不通當在此條下亦在少陽例鍾云二

陽之病榮心脾不得隱曲女子不月注云

男子少精亦曰若登高墜下重物撞打箭

鏃又傷心腹胃中停積爵血不散以上中下

三焦部分分之以易老犀角地黃湯桃仁羹

氣湯抵當湯之九此字似錯類下之亦有以小便以酒

煎治之者更有內加生地黃當飯煎服者亦

有加大黃者又法虛人不禁下之者以四

物湯加川山甲煎服妙亦有以花萸石散以

童子小便煎服或酒調下此茶與寒茶正

分陰陽不可不年也若瘀血已去以復元通

氣散加當飯煎服亦可又法筋骨損傷用

左鍾丸之數或用草烏乳末肉為丸服之以

行諸鍾者以其內無瘀血改用之茶劑寒

熱溫涼不一惟智者能擇之而不可偏執也

掌中金丸 治婦人乾血氣

川山甲 炮 草烏 乳 豬牙皂角 各二錢

苦丁香 苦葶藶 川椒

甘草 白附子 巴豆 各一錢合用研

右為細末生葱絞汁和丸彈丸大每服一丸

新錦包定內陰中一月即白二日即赤三日

即血神效

○五通丸

治婦人月水不通肺腹硬痛寒熱盜汗

乾漆 炒

紅花

丁香

牡丹皮

當飯

官桂

廣茂 各半兩

右醋丸桐子大每服三十丸當飯酒下米飲

亦得 女子不月帝曰何以知其婦人之懷

子也岐伯曰身有病而無邪脉若身有病而

脉亦病尺亦不至是經不調也胞閉亦小

桃花散 治室女經閉不通五心火熱

紅花

當飯

杜牛膝

桃仁 炒 玄

右等分每服三錢溫酒調下

通經丸 治室女經不通或疼痛或癥

癥

桂心

大黃

青皮

乾姜

川烏 炮 川椒

廣茂

乾漆 炒

當飯 桃仁

石為細末先以四戈水醋一作米熬成膏和餘末七

戈九桐子大空心醋湯下加至三十丸溫酒

亦得

結胃例

大小陷胃湯凡

主治並見仲景本方

仲景大陷胃湯

大黃

芒硝

甘遂

右先煮大黃至八分去滓下硝一沸止後調

甘遂末一字溫服利止後服

小陷胃湯

大黃

黃連

枳實

右水二盞先煮枳實至一盞半下諸藥煎取八分溫服未利再服下黃連

大陷胃湯

大黃

葶藶

芒硝

杏仁

白

右上一味為末下二味研和凡如彈子大每服一丸入甘遂末半字白蜜少許水二盞半

煎至一盞頓服一宿未利再服

活人大陷胃湯

主治並見本經

桂枝

甘草

人参各三

大束

三枚

枳实

一枚、玄皮、用

右剉广豆大、水二盞、煎至八分、去粗、溫服、

中无坚物者、勿服、

○治结胃、聖餅子灸法

黃連

七兩

巴豆

十四枚

通玄皮用

右為細末、唾和成膏、安填入脐中、以艾炷灸

其上、候透方止、神効

許學士治结胃、内茶

脐中、並見前治法

本草治结胃、蜂螯一个、碾生油绞汁、并花水調

下、後見少陽墮虫丸條

王朝奉云、大小陷胃湯丸、不効、宜增損理中丸

乾姜

兩

炮半

人參

枳实

黃芩

玄皮、枯

白朮

牡蛎

各二

枳实

黃芩

玄皮、枯

白朮

二兩

右細末、煉蜜丸、彈子大、白湯半盞、煎服、不歇

飯、与之、不過五六服、胃中豁然矣、用茶神速

未嘗見也、本方渴加瓜蒂根、不渴者除之、汗

者加牡蛎、不汗者勿用

宿食停留、结胃、具見

微

旨方

此非

已

病飲水

過多、成水、结胃也、韓氏茯苓陷胃湯主之

婦人血結胃 海蛤散在少陰仲景大蜜丸後

活人治婦人傷寒血結胃膈而痛不可接近者宜

海蛤散

治婦人血結胃法當利期門仲景無業此方疑非仲景之方言然而頗有理姑存之

海蛤 一兩 滑石 一兩 芒硝 半兩 甘草 一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈血散胆中血衰則小腸壅滯胃中血不流宜此方若便利血行宜桂枝紅花湯治之

臚 裏

仲景文蛤散

治病在陽以汗解之及以冷水噀之若灌之其熱蔽却不得去弥更益火肉上粟起意欲飲水及不渴宜文蛤散若不差者服五苓散寒實結胃無熱證者三物白散服方寸匕常云小陷胃丸非也文蛤一兩為散沸湯和

外臺治五蒸五勞方內有芒硝苦參蜜及青箱艾葉大黃石膏生地黃之類皆不出湯液用者

各隨經虛實內外淺深治之盡矣

古今錄驗鮮五蒸湯

耳草 一兩 竹葉 二把 茯苓 人參

知母 黃芩 各二 乾地黄 葛根

石膏 各三 碎 粳米 一合

右十味以水九升煮取二升半分爲三服亦

可以水三升煮小麥一升乃煮茶忌海藻菘

菜芫荽米醋芫薺日一服忌耳草茯苓人

參竹葉

又五蒸丸

烏梅 雞骨 紫苑 五兩 芍藥

大黃 黃芩 細辛 各五 知母 四分

礬石 煅二 括藹 桂心 各三

右十一味細末蜜和丸桐子大飲服十九日

二忌生薑生菜一方冬桂心自汗者加地

骨皮冬汗者加柴胡根

五蒸

實熱 黃連 黃蘗 黃芩 大黃

虛熱 烏梅 秦皮 柴胡 氣也

青蒿 鱉甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮

血也

肺鼻乾

烏梅

紫苑

天門冬

麥門冬

皮舌白

石羔

桑白皮

膚唇白

牡丹皮

氣喘促

身氣熱

人參

黃芩

梔子

大腸乾

鼻口孔

芒硝

大黃

脈血白

浪語狂

不調

當歸

生地黃

心舌乾

黃連

生地黃

桂心

童子

小便

血髮焦

地黃

當歸

桂心

小腸下

唇木通

赤茯苓

生地黃

脾唇焦

芍藥

木瓜

苦參

肉食生

味芍藥

胃痛下

石羔

粳米

大黃

芒硝

葛根

肝眼黑

前胡

川芎

當歸

胆眼白

柴胡

桔梗

三焦作寒

石羔

竹葉

腎而耳

石羔

知母

生地黃

寒水石

腦耳眩

羌活

地黃

防風

髓中焦

骨當歸

地黃

地黃

天門冬

焦

去一作失明

跌

生地黃

骨齒逆變黑腰痛足
驚甲 當飯 地骨皮 牡丹皮 生地黃

肉藏反細俱熱 石羔 黃蘗

胞小使。泥寫 茯苓 沈香 滑石

膀胱焦丸耳 泥寫 茯苓 滑石

凡此諸蒸皆因熱病後食肉由臟行房飲酒犯

之而成久蒸不得除變成痼病即死矣

右二方數條當在前外墨五蒸議論條下

仲景蜜導煎法 外又有猪膽和醋法灌下部中

中崔氏依仲景法亦用猪膽汁灌下部中

通 又有善光一作銳法割生薑如小指長

鹽

二寸搗塗之內下部中立通屈人不可下者

宜用以其先結後澹也 崔氏云若胃有燥

屎令人錯語宜兼氣陽 若大便利錯語宜

黃連解毒湯 又云兼氣陽旧有芒硝以其

有毒故去之用之甚安如脹陽不得利者用

善光法用此又不得利者始可用加芒硝湯

下之 海藏云古人詳細不妄用如此今人

好用涼藥過泄之者宜觀此為鑑戒也以上

諸蒸或藏病或府病或藏府俱病脈絡氣血

交經相連用藥皆當合而用之君臣佐使上

下奇偶表裏虛實逆從通塞汗下吐補俱在
其中矣



壬子十一月十有六日直夜校訖

元簡記

函墨元戎四卷終

