

卷二十二 雜證謨 腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

痞滿

卷二十四 雜證謨

泄瀉

痢疾

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄

上

二卷

金言卷一  
傳忠錄

中

道集

三卷

傳忠錄

下

四卷

脈神章

上

有目二張

五卷

脈神章

中

六卷

脈神章

下

須集

七卷

傷寒典

上

有目二張

八卷

傷寒典

下

從集

九卷

雜證謨

全書卷一

總目

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

痙證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘧氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

玄運

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

恶心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

鵶雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲瘡

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

腳氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴斂

瘡閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒

附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規上 有目四張

三十九卷

婦人規下

謨集

四十卷

小兒則上 有目二張

四十一卷

小兒則下

四十二卷

痘疹証

麻疹全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上  
有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈐上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈐下

大集

四十八卷

本草正上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共六十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宦集

五十八卷 热陣

五十九卷 固陣

六十卷 因陣

長集

六十一卷 婦人

六十二卷 小兒

六十三卷 痘疹

春集

六十四卷 外科

景岳全書總目終

景岳全書卷之二十二 雜證謨

心集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

腫脹

經義

腹中論帝曰有病心腹滿日食則不能暮食此爲何病岐伯曰名爲鼓脹治之以鷄矢醴一劑知二劑已帝曰其病有復發者何也曰此飲食不節故時有病也雖然其病且已時故當

卷三十一  
病氣聚於腹也

經脈篇曰足大陰虛則鼓脹○胃中寒則脹滿

水脹篇曰膚脹者寒氣客於皮膚之間鑿鑿然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也○帝曰鼓脹一何如岐伯曰腹脹身皆大犬與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也

脹論帝曰脈之應於寸口如何而脹岐伯曰其脉大堅以濇者脹也○帝曰何以知臟腑之脹也曰陰爲臟陽爲腑○帝曰夫氣之令人脹也在於血脉之中邪臟腑之內乎曰三者皆

存焉然非脹之舍也夫脹者皆在於臟腑之外排臟腑而郭  
胸脇脹皮膚故命曰脹五臟六腑者各有畔界其病各有形  
狀營氣循脈衛氣逆爲脈脹衛氣並脈循分爲膚脹○心脹  
者煩心短氣卧不安○肺脹者虛滿而喘欬○肝脹者脇下  
滿而痛引小腹○脾脹者善噫四肢煩悶體重不能勝衣卧  
不安○腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛○六腑脹胃脹者  
腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難○大腸脹腸鳴而痛  
濯濯冬日重感於寒則飧泄不化○小腸脹者少腹脹脹引  
腰而痛○膀胱脹者少腹滿而氣癃○三焦脹者氣滿於皮

膚中輕輕然而不堅○膽脹者脇下痛脹口中苦善太息○

岐伯曰衛氣之在身也常然血脈循分肉行有逆順陰陽相

隨乃得天和五臟更始四時循序五穀乃化然後厥氣在下

營衛畱止寒氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合爲脹也

此下  
鍼治

之法具  
詳本經

陰陽應象大論曰濁氣在上則生脹脹

生氣通天論曰因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭

五臟生成篇曰腹滿腹脹支膈胠脇下厥上冒過在足太陰陽

明

本神篇曰脾氣實則腹脹○腎氣實則脹

六元正紀大論曰太陰所至爲中滿霍亂吐下○太陰所至爲重肺腫○土鬱之發民病心腹脹肺腫身重

至真要大論曰諸濕腫滿皆屬於脾○諸脹腹大皆屬於熱○按以上諸脹皆言氣之爲病也

水熱穴論帝曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者大陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也○故水病下爲肺腫

大腹上爲喘呼不得卧者標本俱病

水脹篇曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脈動時  
歛陰股間寒足胫腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手  
而起如囊裹水之狀此其候也

五癃津液別篇曰陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不  
化畱於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則爲水脹

評熱病論曰諸有水氣者微腫先見於目下也水者陰也目下  
亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也

經脉篇曰胃病則大腹水腫

邪氣臟腑病形篇曰胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上支兩脇  
隔咽不通飲食不下○三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小  
便窘急溢則水畱卽爲脹○腎脈微大爲石水起脅已下至  
小腹脹脹然上至胃脘死不治

宣明五氣篇曰下焦溢爲水

逆調論曰不得卧卧則喘者是水氣之客也夫水者循津液而  
流也腎者水藏主津液主卧與喘也

陰陽別論曰陰陽結糾多陰少陽曰石水少腹腫○三陰結謂  
之水

湯液醪醴論帝曰其有不從毫毛生而五藏陽已竭也津液充  
郭其魄獨居孤精於內氣耗於外形不可與衣相保此四極  
急而動中是氣拒於內而形施於外治之奈何岐伯曰平治  
於權衡去宛陳莝是以微動四極溫衣繆刺其處以復其形  
開鬼門潔淨府精以時復五陽已布踈滌五藏故精自生形  
自盛骨肉相保巨氣乃平○按以上諸脈皆言水之爲病也  
太陰陽明論曰飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五  
臟入五臟則膩滿閉塞

異法方宐論曰北方者其民樂野處而乳食藏寒生溼病○按

以上二條乃言飲食之爲脹也

論證共四條

腫脹之病原有內外之分蓋中滿者謂之脹而肌膚之脹者亦謂之脹若以腫言則單言肌表此其所以當辨也但脹於內者本由藏病而腫於外者亦無不由乎藏病第藏氣之病各有不同雖方書所載有濕熱寒暑血氣水食之辨然余察之經旨驗之病情則惟在氣水二字足以盡之故凡治此證者不在氣分而在水分能辨此二者而知其虛實無餘蘊矣病在氣分則當以治氣爲主病在水分則當以治水爲主然水

氣本爲同類故治水者當兼理氣蓋氣化水自化也治氣者亦當兼水以水行氣亦行也此中玄妙難以盡言茲雖條列如左然運用之法貴在因機通變也

一病在氣分者因氣之滯如氣血之逆食飲之逆寒熱風濕之逆氣虛不能運化之逆但治節有不行者悉由氣分皆能作脹凡氣分之病其色蒼其內堅其脹或連胸膈其痛或及臟腑或候而浮腫者陽性急速也或自上及下者陽本乎上也或通身盡腫者氣無不至也有隨按而起者如按氣囊也然此雖皆氣分而氣病有不同故有氣熱而脹者曰諸脹腹大

皆屬於熱也。有氣寒而脹者曰胃中寒則腹脹曰膽寒生滿病也有氣濕而脹者曰諸濕腫滿皆屬於脾也有氣虛而脹者元氣虛也。曰足太陰虛則鼓脹也有氣實而脹者邪氣實也。曰腎氣實則脹曰脾氣實則腹脹曰胃氣實則脹也。凡此雖皆脹病而治之之要則全在察其虛實大都陽證多熱熱證多實陰證多寒寒證多虛先滯於內而後及於外者多實先脹於表而漸及於內或外雖脹而內不脹者多虛小便紅赤大便秘結者多實小便清白大便稀溏者多虛脈滑有方者多實弦浮微細者多虛形色紅黃氣息粗長者多實形容

憔悴聲音短促者多虛年青少壯氣道壅滯者多實中衰積勞神疲氣怯者多虛虛實之治反如米炭若誤用之必致害矣

一病在水分者以陰勝於陽而肌膚皆腫此與氣證本有不同凡水之爲病其色明潤其皮光薄其腫不速每自下而上按肉如泥腫有分界蓋陰本於下而浸漬有漸皆水病之證也觀水脹篇言寒氣之脹按其腹窅而不起水腫之病以手按其腹隨手而起如囊裹水之狀此其候也然以愚見及察之證驗則若與此論相反蓋凡是水證必按之窅而不起此其

水在肉中如糟如泥按而散之猝不能聚未必如水囊之比  
凡隨按隨起者亦惟虛無之氣其速乃然故辨當若此也凡  
欲辨水氣之異者在欲辨其陰陽耳若病在氣分則陽證陰  
證皆有之若病在水分則多爲陰證何也蓋水之與氣雖爲  
同類但陽主則氣化而水卽爲精陽衰則氣不化而精卽爲  
水故凡病水者本卽身中之血氣但其爲邪爲正總在化與  
不化耳水不能化因氣之虛豈非陰中無陽乎此水腫之病  
所以多寓陽虛也然水主於腎氣主於肺水瀆於下而氣竭  
於上所以下爲腫滿上爲喘急標本俱病危斯亟矣此當速

救本源庶保萬一倘以虛喘作實邪而猶然泄肺無不敗矣  
一少年縱酒無節多成水鼓蓋酒爲水穀之液血亦水穀之液  
酒入中焦必求同類故直走血分經曰飲酒者衛氣先行皮  
膚先充絡脈此之謂也然血者神氣也血屬陰而性和酒者  
淫氣也酒屬陽而性悍凡酒入血分血欲靜而酒動之血欲  
藏而酒逐之故飲酒者身面皆赤此入血之微亦散血之微  
也擾亂一番而血氣能無耗損者未之有也第年當少壯則  
旋耗旋生固無所覺及乎血氣漸衰則所生不償所耗而且  
積傷併至病斯見矣故或致血不養筋則爲中風或致傷脾

則爲痰飲瀉痢或濕熱上浮則爲喘汗鼻淵或流於筋骨則爲瘧癰疼痛或致動血傷精則爲勞損吐衄或致傷肌腐肉則爲爛瘡痔漏其有積漸日久而成水鼓者則尤多也蓋酒性本濕壯者氣行則已酒卽血也怯者着而成病酒卽水也不惟酒爲水而血氣既衰亦皆隨酒而悉爲水矣所以凡治水鼓者必當以血氣爲主而養陰利濕是誠善矣然奈無知少年初不知畏而惟酒是耽此其浸漬已非一日致令血氣天真敗極至此又豈能以旦夕挽回者哉故於諸鼓之中則尤以酒鼓爲最危難治之證嘗有一杜康之徒不信余說云

公爲此言其亦過矣茲見有某人者以酒爲生自朝繼暮今  
年已若干未聞其病豈酒果傷人者耶是不知若人者惟千  
百中之一二而天稟之精出者也不然何善飲者如此其多  
而壽於飲者僅見其人則其他之困於此者從可知矣使不  
有斯人之稟而有斯人之嗜吾恐其不免於斯矣

### 腫脹危候

大凡水腫先起於腹而後散四肢者可治先起於四肢而後歸  
於腹者難治○掌腫無紋者死○大便滑泄水腫不消者死  
○唇黑唇腫齒焦者死○臍腫突出者死○缺盆平者死○

陰囊及莖俱腫者死○脈絕口張足腫者死○足跗腫膝如  
斗者死○肚上青筋見瀉後腹腫者死○男從身下腫上女  
從身上腫下皆難治

氣分諸脹論治

凡八條

凡脹滿由於氣分者宜察氣之虛實若脹滿在中而不在外者  
其病多實經曰中滿者寫之於內此之謂也若果因酒食厚  
味氣滯脉滑而大滿大實者宜廓清飲主之兼脹兼痛諸藥  
不效者宜神香散主之○若臟腑脹實而堅痛者宜承氣湯  
或百順丸下之然必年壯力強素無損傷虛弱等證而暴見

脹滿者方可峻攻否則只宜緩治○如果氣實於中而表裏俱脹者宜用蒜瓣以滾湯煮微熟畱性少蘸鹽醋常以佐食大能破氣消滯亦佳法也○若氣脹而兼小水不利者宜用四苓散以半熟蒜搗膏丸服極妙

一飲食停滯而致胃口中焦脹滿者宜大小和中飲酌用之○兼痛者宜排氣飲主之

一怒氣逆於中焦或脹或痛者宜排氣飲解肝煎之類主之○

兼喘脹者宜四磨飲或神香散

一大人小兒素無脾虛泄瀉等證而忽爾通身浮腫或小水不

利者多以飲食失節或濕熱所致宜廓清飲加減主之或四  
苓散胃苓湯之類皆可用或濕勝者宜平胃散之類主之  
一脾胃虛寒中氣不健而三焦脹滿者是爲氣虛中滿其爲證  
也必多吞酸嘔腐惡食惡寒或常爲溏泄而別無火證火脉  
者必屬臟寒此所謂臟寒生滿病也惟宜溫補○寒在中焦  
者宜溫胃飲理中湯○寒在下焦者宜理陰煎八味地黃湯  
之類主之

一單腹脹者名爲鼓脹以外雖堅滿而中空無物其象如鼓故  
名鼓脹又或以血氣結聚不可解散其毒如蠱亦名蠱脹且

一肢體無恙脹惟在腹故又名爲單腹脹此實脾胃病也夫脾胃爲中土之臟爲倉廩之官其臟受水穀則有坤順之德其化生血氣則有乾健之功使果脾胃強健則隨食隨化何脹之有此惟不善調攝而凡七情勞倦飲食房闌一有過傷皆能戕賊臟氣以致脾土受虧轉輸失職正氣不行清濁相混乃成此證○凡治此者若察其病由中焦則當以脾胃爲主安參芪白朮乾薑甘草之屬主之○若察其病由下焦則當以命門母氣爲主玄人參熟地當歸山藥附子肉桂之屬主之○如果氣有否塞難於純補則宜少佐辛香如陳皮厚朴

砂仁香附丁香白芥子之屬○如或水道不利濕氣不行則當助脾行濕而佐以淡滲如猪苓澤瀉茯苓之屬○若諸藥未效仍當炙治如後法○以上諸法大畧如此然病成單散終非吉兆必其傷敗有漸然後至此使非盡掃塵務加意調理則未有或免者矣

一治脹當辨虛實若察其果由飲食所停者當專去食積因氣而致者當專理其氣因血逆不通而致者當專清其血其於熟著寒之結者散之清濁混者分利之或升降其氣或消導其邪是皆治實之法也第凡病腫脹者最多虛證若在中年

之後及素多勞傷或大便溏滑或脈息弦虛或聲色憔悴或因病後或因攻擊大過而反致脹滿等證則皆虛損之易見者也諸如此類使非培補元氣速救根本則輕者必重重者必危矣○若虛在脾肺者宜四君子湯歸脾湯之類主之○若脾虛兼寒者宜理中湯溫胃飲五君子煎○若脾虛兼痰者宜六君子湯○若腎虛兼痰者宜金水六君煎○若虛在肝腎者宜六味地黃湯○若腎虛兼寒者宜理陰煎或八味地黃丸甚者加減金匱腎氣湯主之○若以虛證而妄行消伐則自不活一矣其有果以少壯停滯或肝強氣逆或時氣

亢害爲邪者方可直攻其病但辨之宜詳不可忽也

一凡外感毒風邪畱膚腠則亦能忽然浮腫如東垣所謂八益  
之邪自外而入者是也然其來必速其證則必有脉緊及頭  
疼骨痛等證方是外感之候先宜解散其邪如正柴胡飲小  
柴胡湯敗毒散參蘓飲葛根葱白湯之類隨宜用之○若風  
因火熾而表裏俱熱者宜芍藥清肝散或龍胆瀉肝湯之類  
主之○若邪傳入裏太陽陽明併病而胃實熱甚必日晡潮  
熱大渴引飲者白虎湯主之○若大實大滿而熱結不退者  
大承氣湯或百順丸下之○若少陽陽明併病寒熱往來滿

而實者宜大柴胡湯下之五常政大論曰下之則脹已此之類也

水腫論治 凡七條

凡水腫等證乃脾肺腎三臟相干之病蓋水爲至陰故其本在腎水化於氣故其標在肺水惟畏土故其制在脾今肺虛則氣不化精而化水脾虛則土不制水而反寇腎虛則水無所主而妄行水不歸經則逆而上泛故傳入於脾而肌肉浮腫傳入於肺則氣息喘急雖分而言之而三藏各有所主然合而言之則總由陰勝之害而病本皆歸於腎內經曰腎爲胃

關關門不利故聚水而從其類也然關門何以不利也經曰  
膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣夫所謂氣化者  
卽腎中之氣也卽陰中之火也陰中無陽則氣不能化所以  
水道不通溢而爲腫故凡治腫者必先治水治水者必先治  
氣若氣不能化則水必不利惟下焦之真氣得行始能傳化  
惟下焦之真水得位始能分清求古治法惟薛玄齋先生加  
減金匱腎氣湯誠對證之方也余屢用之無不見效此雖壯  
水之劑而實卽脾肺腎三臟之正治也何也蓋腎爲先天生  
氣之源若先天元氣虧於下則後天胃氣失其所本而由脾

一及肺治節所以不行是以水積於下則氣壅於上而喘脹由生但安峻補命門使氣復元則三臟必皆安矣今論其方如所用桂附以化陰中之陽也熟地山藥牛膝以養陰中之水也茯苓澤瀉車前子以利陰中之滯也此能使氣化於精卽所以治肺也補火生土卽所以治脾也壯水通竅卽所以治腎也此方補而不滯利而不伐凡病水腫於中年之後及氣體本弱者但能隨證加減用之其應如響誠諸方之第一更無出其右者

一證有全由脾肺不足而爲腫脹者治宜以四君歸脾之屬爲

主固是正治之法然亦須兼補命門蓋肺土非命門之火不能生肺氣非命門之水不能化人知土能制水而不知陽實制陰人知氣化爲精而不知精化爲氣也虛則補母正此之謂

一凡素稟陽盛三焦多火而病爲水腫者其證必煩渴喜冷或面赤便結或熱而喘歟或頭面皆腫或脈見滑實此濕熱相因陰虛之證也凡辛香燥熱等劑必所不堪宜用六味地黃湯加牛膝車前麥冬之類大劑與之○其有熱甚者宜加減一陰煎加茯苓澤瀉車前牛膝之類主之○其有虛中挾實

肺膈不清宜加陳皮白芥子之類佐之○其有生平不宜熟地者則單用生地亦可但此等壯水等劑必十餘服後方可望效若先因尅伐致虛者其效尤遲慎毋欲速自求伊戚也  
凡年少縱酒致爲濕熱所乘元氣尙強脉實有力而不便於溫補者此當逐去濕熱亦能速效宜禹功散瀉水丸瀉川散  
三花神祐丸之類皆可擇用瀉後宜薄滋味戒飲酒久之方  
可復元

古法治腫大都不用補劑而多用去水等藥微則分利甚則推逐如五苓散五淋散五皮散導水茯苓湯之類皆所以利

水也如舟車神祐允濬川散禹功散十寒湯之類皆所以逐  
水也再如巴豆朴硝鍼砂滑石三稜蓬朮射香琥珀土狗地  
龍田螺水蛭鯉魚鯽魚蘿蔔子蓮子商陸葶苈杏仁防己秦  
艽木瓜瞿麥通草厚朴赤小豆猪苓海金沙五加皮大腹皮  
羌活獨活之類無非逐水利水之劑但察其果係實邪則此  
等治法誠不可廢但必須審證的確用當詳慎也凡今方士  
所用則悉皆此類故能晚服而早通朝用而暮瀉去水斗許  
腫脹頓消效誠速也但彼不顧人之虛實不慮人之先生惟  
以見效索謝而去不知隨消隨脹不數日而復脹必愈甚苟

以年衰積損之證而復遭此刲則百無一生矣

一水腫證以精血皆化爲水多屬虛敗治宜溫脾補腎此正法  
也然有一等不能受補者則不得不從半補有并半補亦不  
能受者則不得不全用分消然以消治腫惟少年之暫病則  
可若氣血既衰而復不能受補則大危之候也故凡遇此輩  
必須千方百計務救根本庶可保全嘗見有專用消伐而退  
腫定喘者於腫消之後必尪羸骨立略似人形多則半年少  
則旬日終無免者故余之治此凡屬中年積損者必以溫補  
而愈皆終身絕無後患蓋氣虛者不可復行氣腎虛者不可

復利水且溫補卽所以化氣氣化而全愈者愈出自然消伐  
所以逐邪逐邪而暫愈者愈由勉強此其一爲真愈一爲假  
愈亦豈有假愈而果愈者哉

一無論氣鼓水鼓凡氣實可下者宜用赤金豆或百順丸以漸  
利之

新按二條

腫脹之治凡脾腎虛證如前論所列薛氏醫氣湯者誠然善矣  
然用之之法猶當因此廓克不宜執也向余嘗治一陶姓之  
友年逾四旬因患傷寒爲医誤治危在呼吸乃以大劑參附

熟地之類幸得挽回愈後喜飲未及兩月忽病足股盡腫脹及於腹按之如鼓堅而且鞭因其前次之病中氣本傷近日之病又因酒濕度非加減腎氣湯不可治遂連進數服雖無所碍然終不見效人皆料其必不可治余熟計其前後病因本屬脾胃大虛而今兼以滲利未免減去補力亦與實漏卮者何異元氣不能復病必不能退遂悉去利水等藥而專用參附理陰煎仍加白朮大劑與之三劑而足脰漸消二十餘劑而腹脹盡退愈後人皆嘆服曰此證本無生理以此之脹而以此之治何其見之神也自後凡治全虛者悉用此法無

二不效可見妙法之中更有妙焉顧在用者之何如耳塞因  
塞用斯其最也學者當切識此意

一因食滯氣痛脹余嘗治一烟家子年力正壯素日飲酒亦多  
失饑傷飽一日偶因飯後脇肋大痛自服行氣化滯等藥復  
用吐法盡出飲食吐後逆氣上升脇痛雖止而上壅胸膈脹  
痛更甚且加嘔吐余用行滯破氣等藥嘔痛漸止而左乳胸  
肋之下結聚一塊脹實拒按脰腹隔閉不能下達每於戌亥  
子丑之時則脹不可當因其嘔吐既止已可用下凡大黃芒  
硝稜巴豆等藥及蘿蔔子朴硝大蒜橘葉搗罨等法無所

不盡毫不能效而愈攻愈脹因疑爲脾氣受傷用補尤覺不便湯水不入者凡二十餘日無計可施奢齧待斃只得用手一揀按其處彼云肋下一點按着則痛連胸腹及細爲揣摸則一正在章門穴也章門爲脾之募爲臟之會且乳下肋間正屬一虛里大絡乃胃氣所出之道路而氣實通於章門余因悟其一日輕夜重本非有形之積而按此連彼則病在氣分無疑也一但用湯藥以治氣病本非不善然經火則氣散而力有不艾矣乃制神香散使日服三四次兼用艾火炙章門十四壯以逐散其結滯之胃氣不三日脹果漸平食乃漸進始得保全

此其設治俱奇誠所難測本年春間一隣人陡患痛脹隔食全弱此同群醫極盡攻擊竟以致斃是真不得其法耳故錄此以爲後人之式

述古方五條

仲景曰腹滿不減減不足言當下之腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥

華元化曰人中百病難療者莫出於水也水者腎之制也腎者人之本也腎氣壯則水還於腎腎氣虛則水散於皮又二焦壅塞營衛閉格血氣不從虛實交變水隨氣流故爲水病

丹溪曰水腫脉多沉病陽水兼陽證脉必沉數病陰水兼陰證  
一脉必沉遲○若遍身腫煩渴小便赤澁大便閉結此屬陽水  
一先以五皮散或四磨飲添磨生枳殼重則疏鑿飲○若遍身  
一腫不煩渴大便溏小便少不澁赤此屬陰水宜實脾散或流  
氣飲主之

徐東臯曰經云臟寒生滿病脉經云胃中寒則脹滿脾爲陰中  
之至陰故經曰太陰所至爲穧滿大抵脾濕有餘無陽不能  
施化如土之久於兩水則爲泥矣豈能生化萬物必待和風  
暖日溫去陽生自然生長也故凡若此者宜以辛熱藥

○又曰經云下之則脹已此以濕熱飲食有餘脾胃充實者  
言也如仲景治傷寒邪入於裏而成腹滿堅實大便秘而不  
利者宜以三承氣湯下之可也若因脾虛內寒不足而氣不  
能運化精微以成腹滿者故宜以甘溫補脾爲主少佐辛熱  
以行壅滯之氣庶使脾土旺健脹滿運行斯可愈矣即經所  
謂塞因塞用從治之法耳医者不察乎此惟執下之脹已急  
於癟效病者苦於脹滿喜行利藥以求通快不知暫快一時  
則真氣愈傷腹脹愈甚去死不遠矣俗謂氣無補法者以其  
痞塞似難於補不思正氣虛而不能運行爲病經曰壯者氣

行則愈是也○又曰水腫本因脾虛不能制水水瀆妄行當以參术補脾使脾氣得實則自健運而水自行大抵只宜補中行濕利小便切不可下但用二陳加人參耆白术爲主或佐以黃芩麥冬炒梔子以制肝木若腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若陷下加升麻柴胡提之必須補中行濕加升提之藥能使大便潤小便長○又曰諸家治水腫只知道濕利小便孰此一途用諸去水之藥往往多死又用瀉水丸舟車丸神祐丸之類大下之此速死之兆蓋脾氣虛極而腫愈下愈虛雖劫目前之快而陰損正氣禍不旋踵大法只宜

補中宮爲主看所挾加減不爾則死當以嚴氏實脾散加減  
要知從治塞因塞用之理然後可以語水腫之治耳

孫一奎曰子在吳下時有吳生譙震者博雅士也一日偶談及  
鼓脹乃詰予曰鼓有虫否乎予卒不敢應俛思久之對曰或  
有之本事方云臍腹四肢悉腫者爲水只腹脹而四肢不腫  
者爲蟲註曰蟲卽鼓脹也由是衆之古人曾以蟲鼓同名矣  
且蟲以三虫爲首豈無旨哉愚謂鼓脹卽今云氣虛中滿是  
也以其外堅中空有似於鼓故以名之彼蟲證者中實有物  
積聚旣久理或有之吳生曰子誠敏也予堂嫂病鼓三載腹

大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者  
多用火薑燒至腹忽響聲如炮人皆駭然乃見虫從腹中爆  
出高二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之皆蛇也不  
下千萬數大者長尺餘虫腹中復生小虫多者十五六條或  
十數條或五六條虫在人腹中蕃息如此曷不令人脹而死  
哉惜乎諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然猶未親  
見其異也歲萬曆癸巳至淮陰有王鄉官者其子年十六新  
娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四肢瘦削發熱晝夜不退  
已年半矣醫惟以退熱消脹之劑投之其脹愈甚其熱愈熾

喉中兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其腹則疼又  
多嗜肥甘余思諸凡腹痛者唇色必淡不嗜飲食今其若此  
得非虫乎遂投以阿魏積塊丸服之果下虫數十大者二三  
紅一黑長尺餘虫身紅線自首貫尾虫腹中復有虫大者數  
條小者亦三四條虫下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前  
聞之不虛也

鍼灸法

脾俞

治脹隨年壯灸之

肝俞

治脹灸百壯

三焦俞

治心腹脹滿飲食減少小便不利羸瘦少氣

分水

治腹脹達脣結痛不能食若是木病尤宜灸之

神闢主水腫臍脹腸鳴  
如水之聲極效

石門主水腫水行皮中小便黃

足三里主水腫腹脹

水溝主一切水腫

按水腫證惟得鍼水溝若鍼餘穴水盡卽死此明堂銅人所戒也庸醫多爲人鍼分水誤人多矣若其他穴或有因鍼得瘥者特幸焉耳大抵水腫禁鍼不可爲法

腫脹論列方

○摩清飲新和十三

○四苓散和一八七

○四君子湯補一

○神香散新和二十

○平胃散和十七

○五苓散和一八二

五君子煎

新熱六

○胃苓湯

和百九

○二陳湯

和一

○六君子湯

補五

○五淋散

寒百十七

○五皮散

和六八

○正柴胡飲

新散六

○參蘿飲

散三四

○排氣飲

新和六

○小柴胡湯

散十九

○理中湯

熱一

○理陰煎

新熱三

○大和中飲

新和七

○歸脾湯

補三三

○溫胃飲

新熟五

○小和中飲

新和八

○解肝煎

新和十

○實脾散

熱百五

○嚴氏實脾散 熟百粒

○六味湯 補一二一

○入味湯 補一二一

○金匱腎氣湯 補一二六

○四磨飲 和五二

○流氣飲 和四六

○金水六君煎 新和一

○敗毒散 散三六

○疏鑿飲 和五三

○加減一陰煎 新補九

○白虎湯 寒二

○十棗湯 攻二八

○葛根葱白湯 散三二

○禹功散 攻四一

○瀦川散 攻四二

○導水茯苓湯 和六二

○神祐丸 攻四入

○導水丸 攻七一

芍藥清肝散

寒六一

舟車丸

攻七十

芍藥清肝散

寒六一

赤金豆

新攻二

龍胆瀉肝湯

寒六三

大柴胡湯

攻七

百順丸

新攻六

論外備用方

三和湯

和六十  
脾濕腫

健脾散

和六三  
邪中快氣

參木健脾湯

和六四  
補脾行滯

當歸散

和六五  
水氣腫

四磨飲

和五二  
行氣

麻黃附子甘草湯

散五  
風濕

百合湯

熟一三五  
腫喘

越脾湯

散八九  
風水悉腫

全書卷三  
麻黃甘草湯

散六水腫取汗

調胃白朮散

和三三利水

蘓子降氣湯

和四一順氣

人參養胃湯

和二三四利胃

調氣平胃散

和十八順氣

七氣湯

和五一積脹

半夏丁香丸

和百十三氣滯

厚朴湯

和五四氣滯

麵蘖枳朮丸

和八一食滯

香砂枳朮丸

和八十氣脹

木香寬中散

和五五行氣

沉香琥珀丸

和六九利便

消導寬中湯

和五八食氣滯

人參木香散

和五七利水

養胃進食丸

和八九健脾

化滯調中湯

和五九食滯

瀉水茯苓湯

和六二利水

道滯通經湯

和六一脾溫

木香分氣飲

和五六  
氣溫

當歸活血散

和六六  
瘀血

檳榔煎

和二三六  
瘴氣

大正氣散

和二十四  
覽濕中滿

溫胃湯

熟十二  
胃寒中滿

養胃湯

熟七十  
虛寒滯

厚朴丸

熟一六一  
寒滯中滿

腹脹方

熟百七

紅丸子

熟一九一  
消食脹

胡椒理中湯

熟六  
虛寒

強中湯

熟九三  
生冷傷脾

復元丹

熟百三  
寒滯

沉香桂附丸

熟百十二  
中寒

感應丸

攻五四  
積聚脹痛

透膈湯

攻三十  
逐滯消脹

厚朴溫中湯

熟九  
寒滯

枳實逍滯丸

攻五七  
清火攻滯

通門

珠大士

能食  
燒一丸

乳林大士

寒帶布  
燒一六一

蠶惺蟲

胃寒中  
燒十二

蘇厥煎

軟麻  
味二三六

木香冬桑膏

麻五六

當頭風血膏

瘀血  
味六七

景岳全書卷之二十三雜證謨

心集

會稽 張介賓 與卿著

會稽 魯超 謙菴訂

積聚

經義

百病始生篇岐伯曰風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然遇  
一疾風暴雨而不病者蓋無虛故邪不能獨傷人此必因虛邪  
之風與其身形兩虛相得乃客其形是故虛邪之中人也留

而不去傳舍於腸胃之外募原之間畱着於脈稽留而不去息而成積或著孫脈或著絡脈或著經脈或著輸脈或著於伏衝之脈或著於督筋或著於腸胃之募原上連於緩筋邪氣滯沃不可勝論○其著孫絡之脈而成積者其積往來上下臂手孫絡之居也浮而緩不能句積而止之故往來移行腸胃之間水滌滲注灌濯濯有音有寒則腹脹滿雷引故時一切痛○其著於陽明之經則挾脅而居飽食則益大饑則益小○其著於緩筋也似陽明之積飽食則痛饑則安○其著於腸胃之募原也痛而外連於緩筋飽食則安饑則痛○其

著於伏衝之脉者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如  
湯沃之狀○其著於督筋在膀後者餓則積見飽則積不見  
按之不得○其著於輸之脉者閉塞不通津液不下孔竅乾  
壅○帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒  
乃生厥乃成積也○帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足慾  
足慾生脛寒脛塞則血脉凝滯血脉凝滯則寒氣上入於腸  
胃入於腸胃則腹脹腹脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以  
成積○卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷  
陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢

則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣○卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液滯滲著而不去而積皆成矣

奇病論帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是爲何病岐伯曰病名息積此不妨於食不可炙刺積爲導引服藥藥不能獨治也

邪氣臟腑病形篇曰心脉微緩爲伏梁在心下○肝脉微急爲肥氣在脇下若覆杯○腎脉微急爲奔豚

五臟生成論曰赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之○白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也○青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痺得之寒濕與疝同法○黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四支汗出當風○黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而臥

平人氣象論曰寸口脈沉而橫曰脇下有積腹中有橫積痛○

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應衣脉宗氣也結而橫有積矣

大奇論曰腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆爲瘕三陽急爲瘕

刺熱篇曰類下迎顧爲大瘕

氣厥論曰小腸移熱於大腸爲處瘕

骨空論曰任脈爲病女子帶下瘕聚

衛氣篇曰新積痛可移者易已也積不痛難已也

腹中論帝曰病有少腹盛上下左右皆有根此爲何病可治不

岐伯曰病名伏梁裏大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死帝曰何以然岐伯曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生膈挾胃脘內癰此久病也難治居齊上爲逆居齊下爲從勿動取奪○帝曰人有身體髀股脇皆腫環齊而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於盲盲之原在齊下故環齊而痛也不可動之動之爲水溺瀦之病

六元正紀大帝曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殮亦無殮也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

全書卷二十三  
論證共四條

積聚之病凡飲食血氣風寒之屬皆能致之但曰積曰聚當詳辨也蓋積者積壘之謂由漸而成者也聚者聚散之謂作止不常者也由此言之是堅鞭不移者本有形也故有形者曰積或聚或散者本無形也故無形者曰聚諸有形者或以飲食之滯或以膿血之畱凡汁沫凝聚旋成癥塊者皆積之類其病多在血分血有形而靜也諸無形者或脹或不脹或痛或不痛凡隨觸隨發時來時往者皆聚之類其病多在氣分氣無形而動也故難經以積爲陰氣聚爲陽氣其義卽此凡

無形之聚其散易有形之積其破難臨此證者但當辨其有形無形在氣在血而治積治聚自可得其梗槩矣

一飲食之積凡暫積者不過以飲食偶傷必在腸胃之內故可行可逐治無難也惟飲食無節以漸畱滯者多成痞積於左脇膈膜之外蓋以胃之大絡名曰虛里出於左乳下其動應衣此陽明宗氣所出之道也若饑飽無倫飲食疊進以致陽明胃氣一有所逆則陰寒之氣得以乘之而脾不及化故餘滯未消乃并腸外汁沫搏聚不散漸成癥積矣然其初起甚微人多不覺及其既久則根深蒂固而藥餌難及今西北小

一兒多有此疾而尤於食麵之鄉爲最正以麵性多滯而留疾於皮裏膜外所以不易治也卽如婦人血癥氣痞或上或下者亦多在腸胃之外募原之間故當以漸消磨求法治之慎母孟浪欲速妄行攻擊徒致胃氣受傷而積仍未及反以速其危也

一風寒外感之邪亦能成積如經曰虛邪之中人也留而不去傳舍於腸胃之外募原之間畱著於脉息而成積又曰病名伏梁此風根也由此觀之凡今人以瘧後成痞者是卽風寒之屬類可推矣但瘧由風寒固易知也而諸積於風若不相

涉不知飲食之滯非寒未必成積而風寒之邪非食未必成形故必以食遇寒以寒遇食或表邪未清過於飲食邪食相搏而積斯成矣經曰虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形信乎致積之由多由於此卽血癥氣痞之由亦無出於此然積以寒畱畱久則寒多爲熱風以致積積成則證已非風故治此者亦但當治其所畱不可發散以再傷其真氣也惟慎疾者能知所由而慮之於始則可爲保脾之良策

一癥痞之積凡或上或下或左或右本無定所大都血積多在一下而氣積食積則上自胃脘下自小腹凡有畱滯無處不可

一停畜余嘗治一食癥結痛者乃在小腹下右角尖處自後屢見此證方知食道之行必由小腹下右以入廣腸此實人所不知也別有食停治按在心腹痛門可考故凡治積聚者必當詳審所因庶得其確嘗見丹溪之論曰痞塊在中爲痰飲在右爲食積在左爲血塊其不能作塊或聚或散者氣也塊乃有形之物痰與食積死血而成也愚謂可聚可散者氣也塊聚無疑也若以左爲血積右爲食積中爲痰飲則鑿矣卽如小兒多有痞者必在左肋之下此無非縱食所致豈因其在左卽爲血積而可攻其血乎若爲左血右食則右豈無血

而左豈無食平不可以爲法也此仍有論在諸風門論丹溪  
條下當金闕之

論治 其十一條

經曰堅者削之畱者攻之結者散之客者除之上之下之摩之  
浴之薄之劫之開之發之適事爲故

凡積聚之治如經之云者亦旣盡矣然欲總其要不過四法曰  
攻曰消曰散曰補四者而已詳列如左

一凡積堅氣實者非攻不能去如秘方化滯丸化鐵丹遇仙丹  
感應丸大硝石丸三花神祐丸赤金豆蔻順丸之類皆攻劑

之峻者也○又如三稜丸勝紅丸阿魏丸助氣丸紅丸子溫白丸之屬皆攻劑之次者也

一凡不堪攻擊止宜消導漸磨者如和中丸草豆蔻丸保和丸大小和中飲之類是也若積聚下之不退而元氣未虧者但當以行氣開滯等劑融化而潛消之

一無形氣聚宜散而愈者如排氣飲神香散指迷七氣湯十香丸四磨飲之屬是也

一凡積痞勢緩而攻補俱有未便者當專以調理脾胃爲主如潔古之枳朮丸乃其宜也余復因其方而推廣之近製芍藥

枳朮丸兼肝脾以消膨脹除積聚止腹痛進飲食用收緩功  
其效殊勝於彼再如大健脾丸木香人參生薑枳朮丸皆調  
補脾胃之妙劑所當擇用者也

一凡脾腎不足及虛弱失調之人多有積聚之病蓋脾虛則中  
焦不運腎虛則下焦不化正氣不行則邪滯得以居之若此  
輩者無論其有形無形但當察其緩急皆以正氣爲主○凡  
虛在脾胃者宜五味異功散或養中煎溫胃飲歸脾湯之類  
主之○虛在肝腎者宜理陰煎腎氣丸燮肝煎之類酌而用  
之○此所謂養正積自除也其或虛中有滯者則不妨少加

全書卷三  
佐使

一治積之要在知攻補之宜而攻補之宜當於孰緩孰急中辨之凡積聚未久而元氣未損者治不宜緩蓋緩之則養成其勢反以難制此其所急在積速攻可也若積聚漸久元氣日虛此而攻之則積氣本遠攻不易及胃氣切近先受其傷愈攻愈虛則不死於積而死於攻矣此其所重在命不在乎病所當察也故凡治虛邪者當從緩治只宜專培脾胃以固其本或炙或膏以疎其經但使主氣日強經氣日通則積痞自消斯緩急之機卽萬全之策也不獨治積諸病亦然

一九堅頑之積必在腸胃之外募原之間原非藥力所能猝至  
宜用阿魏膏琥珀膏或水紅花膏三聖膏之類以攻其外再  
用長桑君鍼法以攻其內然此堅頑之積非用火攻終難消  
散故莫妙於炙余在燕都嘗治愈痞塊在左脇者數人則皆  
以炙法收功也

一積久成瘡乃其經絡壅滯致動肝脾陽明之火故爲頰腫口  
糜牙齦臭爛之證此其在外當用膏藥艾火以破堅頑在內  
當用蘆薈等丸以清瘡熱

一婦人血癥氣聚論治詳婦人門

金匱要略  
卷之三  
經言論  
述古 共六條

難經曰病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故一陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所雷止其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也○又曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬瘡瘍連歲不已○心之積名曰伏梁起齊上大如臂上至心下久不愈令人病煩心○脾之積

名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸  
飲食不爲肌膚○肺之積名曰息貢在右脇下覆大如杯久  
不已令人酒淅寒熱喘欬發肺壅○腎之積名曰賁豚發於  
少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨  
瘦少氣

仲景曰積者臟病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移  
爲可治諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中  
微出寸口積在喉中關上積在臍旁上關上積在心下微下  
關積在少腹尺中積在氣衝脈出左積在左脉出右積在右

一脉兩出積在中央各以其部處之○愚按仲景此說固詳而  
一善雖亦疑其太鑿然於理則通故述於此亦可以資意見若  
一以余之歷驗則凡病癥癖者脈必沉緊而疾如內經曰微急  
小急者卽其脉也若診見和緩則胃氣本無恙終非癖塊之  
脉

許學士曰大抵治積或以所惡者攻之或以所喜者誘之則易  
愈如硇砂水銀治肉積神麴麥芽治酒積水蛭虫治血積  
木香枳榔治氣積半牛甘遂治水積雄黃膩粉治涎積礞石  
巴豆治食積各從其類也若用群隊之藥分其藥勢則難取

效須要認得分明是何積聚兼見何證然後增減斟量使之  
不爾反有所損要在臨時通變也

潔古云壯人無積虛人則有之脾胃怯弱氣血兩衰四時有感  
皆能成積若據以磨堅破結之藥治之疾須去而人已衰矣  
乾漆硇砂三稜大黃牽牛之類用時則暫快藥過則依然氣  
愈消疾愈大竟何益哉故治積者當先養正則積自除譬如  
滿座皆君子縱有一小人自無容地而去但令其真氣實胃  
氣強積自消矣實中有積大毒之劑治之尚不可過况虛而  
有積者乎此治積之一端也邪正盛衰固宜詳審

張子和曰積之始成也或因暴怒喜悲思恐之氣或傷酸甘辛  
鹹之味或停溫涼寒熱之飲或受風寒暑濕燥火之邪其初  
甚微可呼吸按道方寸大而去之故不難也若久而延之畱  
滯不去遂成五積

徐東臯曰養正積除此積之微者也如脾胃失於健運而氣積  
食積之不疎導者惟養脾胃之正氣而滯積自疎矣若夫大  
積大聚如五積之久而成癥病堅固不移者若非攻擊悍利  
之藥豈能推逐之乎惟虛弱之人必用攻補兼施之法也

鍼灸法

長桑君鍼積塊癥瘕法先於塊上鍼之甚者又於塊首一鍼塊  
尾一鍼訖以艾灸之立應

一法曰凡灸痞者須灸痞根無有不效其法在脊背十三椎下  
當脊中點墨記之此非灸穴却於墨之兩傍各開三寸半以  
指揣摸覺微有動脈卽點穴灸之大約穴與臍平多灸左邊  
或左右俱灸此卽痞根也或患左灸右患右灸左亦效

一灸穴法○中脘○期門○章門○脾俞○三焦俞○通谷○  
此諸痞所宜灸者

積痞在上者宜灸○上脘○中脘○期門○章門之類積塊

在下者宜灸○天樞○章門○腎俞○氣海○關元○中極  
○水道之類○凡灸之法宜先上而後下臍腹之壯用宜稍  
大皆先灸七壯或十四壯以後漸次增加愈多愈妙以上諸  
穴皆能治痞宜擇而用之然猶有不可按穴者如痞之最堅  
處或頭或尾或突或動處但察其脉絡所由者皆當按其處  
而通炎之火力所到則其堅聚之氣自然以漸解散有神化  
之妙也第灸痞之法非一次便能必效務須或彼或此擇其  
要者至再至三連次陸續灸之無有不愈者

積聚論列方

排氣飲

新和六

養中煎

新熟四

溫胃飲

新熟五

歸脾湯

補三三

枳木丸

和七九

芍藥枳木丸

新和十六

四磨飲

和五二

十香丸

新和十五

木香人參枳木丸

和八一

理陰煎

新熟三

神香散

新和二十

燮肝煎

新熟十五

五味異功散

補四

弼氣丸

補一二一

保和丸

小三五

指迷七氣湯

和五一

溫白丸

攻六一

和中丸

和八七

○秘方化滯丸 攻五八

○助氣丸 攻六七

○三稜丸 攻六十

○大健脾丸 和入五

○勝紅丸 攻六六

○三紅丸子 攻九六  
因

○大和中飲 新和七

○感應丸 攻五四

○迺仙丹 攻五一

○小和中飲 新和八

○赤金豆 新攻二

○神祐丸 攻四八

○草豆蔻丸 和一六七

○百順丸 新攻六

○阿魏丸 攻六四

○阿魏膏 外三一二

○大硝石丸 攻五六

○琥珀膏 外三一七

三聖膏

攻三八

水紅花膏

外三一九

○化鐵丹

攻五九

○蘆薈等丸

寒一六八後

論外備用方

消食丸

和九十一  
行滯

枳實丸

和八四  
食癖

木香枳榔丸

攻五十  
火盛積堅

麵术丸

和百十  
宿食

法制陳皮

和七十

香砂枳术丸

和八十  
氣積

白术丸

和三七八  
息積

陳麵丸

熱一六四  
冷積瀉痢

麵蘖枳术丸

和八一  
食積

流氣丸

和一五五  
逐寒滯

桃仁煎

攻三九  
血瘕

枳實導滯丸

攻五七  
濕熱食積

安脾散

熱六八  
冷積

三稜散

攻三六  
積痞

雄黃聖餅子

攻六九  
去積

三稜丸

攻三七六十  
血瘀食積

神保丸

攻五三  
寒積痛

川山甲散

攻四十  
血瘀

備急丸

攻五二  
寒積

消痞核桃

攻八七  
一

守病丸

攻六五  
一

紅丸子

熱一九一  
寒食積

熨瘡方

攻八八  
一

大異香散

攻四四  
脹滿

加減四物湯

婦百十二  
血積

# 痞滿

經義

太陰陽明論曰飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五

臟入五臟則膩滿閉塞

生氣通天論曰味過於甘心氣喘滿味過於苦脾氣不濡胃氣

乃厚

臟氣法時論曰脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化

厥論曰厥或令人腹滿何也曰陰氣盛於上則下虛下虛則脹

滿

異法方安論曰臟寒生滿病

陰陽應象大論曰濁氣在上則生膈脹○中滿者瀉之於內  
五臟生成篇曰腹滿膈脹支膈胠脇下厥上冒過在足太陰陽  
明

大惑論曰人有善饑而不嗜食者何氣使然曰胃氣熱則消穀  
故善饑胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食也

脈解篇曰太陰所謂病脹者陰盛而上走於陽明陽明絡屬心  
故上走心爲噫也

經脈篇曰胃病則貢嚮腹脹○脾病則腹脹善噫○心主病則  
胸脇支滿

六元正紀大論曰太陰所至積飲痞膈爲中滿霍亂吐下○寒氣至則堅痞腹滿痛急下利之病生矣○水鬱之發善厥逆痞堅腹滿○木鬱之發病膈咽不通食飲不下

五常政大論曰備化之紀其病痞○卑監之紀其病留滿痞塞○敦阜之化其病脹滿○太陰司天胸中不利心下痞痛氣交篇大論曰歲火不及民病脇支滿○復則病鶩溏腹滿食飲不下○歲水不及民病腹滿

至真要大論曰太陽司天民病胸腹滿○少陰之勝腹滿痛○太陽之勝腹滿食減○陽明之復甚則心痛痞滿○太陽之

復心痛痞滿

論證

痞者痞塞不開之謂。滿者脹滿不行之謂。蓋滿則近脹而痞則不必脹也。所以痞滿一證大有疑辨。則在虛實二字。凡有邪有滯而痞者實痞也。無物無滯而痞者虛痞也。有脹有痛而滿者實滿也。無脹無痛而滿者虛滿也。實痞實滿者可散可消。虛痞虛滿者非大加溫補不可。此而錯用多致誤人。

論治 共四條

虛寒之痞。凡過於憂思或過於勞倦或饑飽失時或病後脾

氣未醒或脾胃素弱之人而妄用寒涼尅伐之劑以致重傷  
脾氣者皆能有之其證則無脹無悶但不知饑亦不欲食問  
其胸腹脹痞則曰亦覺有些而又曰不甚脹蓋本非脹也止  
因不欲食而自疑爲脹耳察其脈則緩弱無神或弦多胃少  
察其形則色平氣怯是皆脾虛不運而痞塞不開也此證極  
多不得因其不食妄用消耗將至胃氣日損則變證百出矣  
治宜溫補但使脾胃氣強則痞滿開而飲食自進元氣自復  
矣○又凡脾胃虛者多兼寒證何也蓋脾胃屬土土虛者多  
因無火土寒則氣化無權故多痞滿此卽寒生於中也亦有

爲生冷外寒所侵而致中寒者然胃強則寒不能侮而寒能勝之總由脾氣之弱耳此義詳命門火候論中當益察之○凡脾胃微虛而若滿非滿食少不化者宜四君子湯或異功散○若心脾氣虛或氣有不順者歸脾湯或治中湯○若三陰氣血俱虛治節不行而不便於溫者宜五福飲○若中焦不煖或噯腐或吞酸而痞滿者非溫補不可宜溫胃飲五君子煎或理中湯聖木煎或參薑飲○若脾胃兼寒命門不煖則中焦不化或腹溏或胸腹喜暖畏寒或上下腹俱膨脹而小水黃澁者宜理陰煎甚者宜六味回陽飲此二藥最妙而

實人所罕知也○予嘗治金孝廉以勞倦思慮致傷脾氣別無他證但絕口久不欲食遂悉用參术歸熟附子薑桂甘草之屬半月始愈後因病後復不食如此自分必死仍用前藥大加薑附各至三錢而後愈又一婦人病後久不食自言病前曾食牛肉乞求去此余佯應之而培補如前方得全愈故凡病如此者只宜溫補不可行滯新按

一飲食偶傷致爲痞滿者當察其食滯之有無而治之○凡食滯未消而作痞滿或兼疼痛者宜大和中飲或和胃飲加減一治之或枳术丸亦可甚者神香散此有治按在腫脹門○若

食滯旣消脾氣受傷不能運行而虛痞不開者當專扶脾氣  
微者異攻散養中煎甚者五福飲溫胃飲聖人煎○若命門  
母氣不足者治宜如前○若偶食寒涼傷胃痞滿不開而不  
可補者宜和胃飲如山楂麥芽之類或用厚朴溫中湯

一實滯之痞當察其所因而治之○若濕勝氣滯而痞者宜平  
胃散或良方厚朴湯或五苓散○若寒滯脾胃或爲痛爲痞  
而中氣不虛者厚朴溫中湯○若脾寒氣滯而痞者和胃飲  
○若怒氣暴傷肝氣未平而痞者解肝煎○若大便氣秘上  
下不通而痞者河間厚朴湯○若胃口停痰而痞者二陳湯

或橘皮半夏湯○胃寒氣滯停痰痞而兼嘔者加減二陳湯

○膠痰不開壅滯胃口者藥不易化須先用吐法而後隨證治之○若大便秘結不通而痞滿不開者宜微利之

一外邪之痞凡寒邪感人者必自表入裏若邪淺在經未入於府則飲食如故稍深則傳入胸次漸犯胃口卽不能飲食是亦痞之類也治此者但解外邪而或散或消或溫或補邪去則胃口自和痞滿自去此當於傷寒門求法治之○又傷寒家曰陽證下之早者乃爲結胸陰證下之早者因成痞氣此以邪在表而攻其裏邪在陽而攻其陰不當下而妄下之以

致邪氣乘虛階結心下是誤治之害最危者也實者硬滿而痛是爲結胸虛者滿而不痛是爲痞氣竅審別治之治法詳結胸腹滿條中

述古 共三條

丹溪曰痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦形痞則內覺痞悶而外無脹急之形也蓋由脾氣不和中央痞塞皆土邪之所爲也有因誤下裏氣虛邪乘虛而入於心之分爲痞者有不因誤下而得之如中氣虛弱不能運化精微而爲痞者有飲食痰飲不能施化爲痞者有溫土太甚邪著心下爲痞者

東垣曰傷寒痞者從血中來從外之內從無形雜病痞者亦從  
血中來從內之外從無形有形以苦瀉之無形以辛散之○  
玉機云痞滿之病人皆知氣之不運也獨東垣以血病言之  
謂下多則凶陰而損血此前人之未論也世之用氣藥治痞  
而不效者蓋不知此理故也

劉宗厚曰古方治痞用黃芩黃連枳實之苦以泄之厚朴生薑  
半夏之辛以散之人參白朮之甘溫以補之茯苓澤瀉之鹹  
淡以滲之隨其病之所在以調之也既痞有濕惟宜上下分  
消其氣果有內實之證庶可畧與陳導世人苦於痞塞喜行

利藥以求速效暫時通快痞若再作益以滋甚是皆不察夫  
下多亾陰之意也如結胸是實邪大陷胸湯主之痞是虛邪  
諸瀉心湯主之○愚據劉公此論既云下多亾陰又云痞是  
虛邪誠然善矣然欲用諸瀉心湯以治虛邪能無失乎蓋未  
知塞因塞用別有神化之妙法而痞滿多在脾尤不可以瀉  
心也

痞滿論列方

○二陳湯 和一

○四君子湯 補一

○五君子煎 新熟六

○歸脾湯 補三三

○治中湯 熟十

、大和中飲 新和七

○溫胃飲 新熟五

、神香散 新和二十

○理中湯 熟一

○加減二陳湯 和二

○聖术煎 新熟二五

、和胃飲 新和五

○理陰煎 新熟三

○六味回陽飲 新熟二

○平胃散 和十七

、養中煎 新熟四

○橘皮半夏湯 和十三

○異功散 補四

○參畫飲 新熟八

○良方厚朴湯 和五四

○五苓散 和一八二

、五福飲 新補六

○河間厚朴湯 和三三六

、解肝煎 新和十一

○枳术丸 和七九

○厚朴溫中湯 熟九一

論外備用方

四君子湯 補一

香砂六君湯 補七

人參養胃湯 和二三四

啓脾丸 和八六 行滯

大健脾丸 和八五

小半夏茯苓湯 和九 痰痞

嘉禾散 和百六十 氣痞

八味理中丸 熟七 虛寒

沉香桂附丸 熟百十 中寒

越鞠丸 和一五四 火鬱

胡椒理中湯 熟六 氣滯

半夏丁香丸 和官三十 氣滯

沉香降氣散

和四十氣滯

木香寬中散

和五十五行氣

藿香正氣散

和二十寒滯

蘆子降氣湯

和四順氣一

葛花解醒湯

和一二三四

貼痞琥珀膏

外三一八

燮痞方

攻入八

消痞核桃

攻八七

木香人參枳术丸

和八二

水紅花膏

外三一九

消痞膏

外三一六

全書卷二十三終



景岳全書卷二十四雜證誤

心集

曾稽 張介賓 曾卿著

曾稽 魯超 謙菴訂

泄瀉

經義

金匱真言論曰長夏善病洞泄寒中

陰陽應象大論曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生脾脹○  
濕勝則濡泄○春傷於風夏生飧泄○水穀之寒濕感則害

人六腑

臟氣法時論曰脾病者虛則腹滿腸鳴飧泄食不化

百病始生篇曰虛邪之中人也留而不去傳舍於腸胃多寒則

腸鳴飧泄食不化多熱則溏出糜

舉痛論曰寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣○怒

則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

經脈篇曰脾所生病心下急痛溏瘕泄○肝所生病胸滿嘔逆

飧泄狐疝

宜明五氣篇曰大腸小腸爲泄

厥論曰少陰厥逆虛滿嘔變下泄清

太陰陽明論曰食飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則膄滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼

陰陽別論曰一陽發病少氣善欬善泄

邪氣臟腑病形篇曰肺脉小甚爲泄○腎脉小甚爲洞泄

脈要精微論曰胃脉實則脹虛則泄○數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血○久風爲飧泄○全羸不藏者是門戶不要也水泉不止是膀胱不藏也得守者生失守者死

平人氣象論曰尺寒脉細謂之後泄

玉機真臟論曰脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂五虛

○泄而脉大脫血而脉實皆難治

師傳篇曰臍以上皮熱腸中熱則出黃如糜○臍以下皮寒胃

中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄○胃中寒腸中熱則脹而

且泄

論疾診尺篇曰大便赤辨飧泄脈小者手足寒難已飧泄脈小

手足溫泄易已○春傷於風夏生後泄腸澼

欵論曰五臟各以治時感於寒則受病微則爲欵甚則爲泄爲

痛

熱病篇曰泄而腹滿甚者死

玉版篇曰其腹大脹四未清脫形泄甚是一逆也○腹鳴而滿四肢清泄其脉大是二逆也○欬嘔腹脹且飧泄其脉絕是五逆也

標本病傳論曰先病而後泄者治其本○先泄而後生他病者治其本

四時氣篇曰飧泄取三陰之上補陰陵泉皆久畱之熱行乃止氣交變大論曰歲木太過民病飧泄食減體重煩冤腸鳴腹支滿○歲火太過民病血溢血泄注下○歲土太過民病腹滿

溏泄腸鳴反下甚○歲水太過上臨太陽病反腹滿脹鳴溏泄食不化○歲木不及民病少腹痛腸鳴溏泄○歲火不及復則埃鬱病驚溏腹滿食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛○歲土不及民病飧泄霍亂體重腹痛○歲金不及民病血便注下○歲水不及民病身重濡泄

五常政大論曰卑監之紀上角與正角同其病飧泄邪傷脾也  
○發生之紀上徵則其氣逆其病吐利

六元正紀大論曰不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至則堅痞腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂血溢血泄

淋閼之病生矣○太陰所至爲中滿霍亂吐下○厥陰所至爲脇痛嘔泄○少陽所至爲暴注○太陽所至爲流泄禁止至真要大論曰歲少陽在泉火滯所勝民病注泄赤白少腹痛尿赤甚則血便少陰同候○厥陰司天風滯所勝民病食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉病本於脾○少陽司天火滯所勝民病泄注赤白○陽明司天燥滯所勝民病寒清於中感而瘧欬腹中鳴注泄鶩溏病本於肝○厥陰之勝腸鳴飧泄少腹痛注下赤白○少陰之勝腹滿痛溏泄傳爲赤沃○太陰之勝濕化乃見善注泄○陽明之勝清發於中左胠腋痛溏

泄○太陽之勝寒入下焦傳爲濡泄○陽明之復清氣大來甚則心痛痞滿腹脹而泄○諸病水液澄澈清冷皆屬於寒○暴注下迫皆屬於熱

論證共三條

凡內經有言飧泄者有言濡泄者皆泄瀉也有言腸澼者卽下痢也然痢之初作必由於瀉此瀉之與痢本爲同類但瀉淺而痢深瀉輕而痢重瀉由水穀不分出於中焦痢以脂血傷敗病在下焦在中焦者濕由脾胃而分於小腸故可澄其源所以治宜分利在下焦者病在肝腎大腸分利已無所及故

宜調理真陰并助小腸之主以益氣化之源此瀉痢之證治  
有不同而門類亦當有辨然病實相關不可不兼察以爲治  
也

一泄瀉之本無不由於脾胃蓋胃爲水穀之海而脾主運化使  
脾健胃和則水穀腐熟而化氣化血以行營衛若飲食失節  
起居不時以致脾胃受傷則水反爲濕穀反爲滯精華之氣  
不能輸化乃致合汚下降而瀉痢作矣脾强者滯去卽愈此  
强者之宜清宜利可逐可攻也脾弱者因虛所以易瀉因瀉  
所以愈虛蓋關門不固則氣隨瀉去氣去則陽衰陽衰則寒

從中生固不必外受風寒而始謂之寒也且陰寒性降下必及腎故瀉多必升陰謂升其陰中之陽耳所以泄瀉不愈必自太陰傳於少陰而爲腸澼腸澼者豈非降泄之甚而陽氣不升臟氣不固之病乎凡脾胃氣虛而有不升不固者若復以寒之復以逐之則無有不致敗者此強弱之治大有不同故凡治此者有不可槩言清利也

一泄瀉之因惟水火土三氣爲最夫水者寒氣也火者熱氣也土者濕氣也此瀉痢之本也雖曰木亦能瀉實以土之受傷也金亦能瀉實以金水同氣因其清而失其燥也知斯三者

若乎盡矣然而二者之中則又惟水火二氣足以盡之蓋五行之性不病於寒則病於熱大都熱者多實虛者多寒凡實熱之證必其脈盛形強聲音壯亮食飲裕如舉動輕捷者此多陽也虛寒之證必其脈息無力形氣少神言語輕微舉動疲倦者此多陰也故必察其因而於初鴻之時卽當辨其有餘不足則治無不愈而亦不致有誤矣

分利治法 共二條

凡泄瀉之病多由水穀不分故以利水爲上策然利水之法法有不同如濕勝無寒而瀉者宜四苓散小分清飲之類主之

但欲分其清濁也○如濕挾微寒而瀉者宜五苓散胃苓湯之類主之以微溫而利之也○如濕熱在脾熱渴喜冷而瀉者宜大分清飲茵陳飲益元散之類主之去其濕熱而利之也

一泄瀉之病多見小水不利水穀分則瀉自止故曰治瀉不利小水非其治也然小水不利其因非一而有可利者有不可利者宜詳辨之○如濕勝作瀉而小水不利者以一時水土相亂併歸大腸而然也○有熱勝作瀉而小水不利者以火乘陰分水道閉滯而然也○有寒瀉而小水不利者以小腸

之火受傷氣化無權而然也○有脾虛作瀉而小水不利者  
以土不制水清濁不分而然也○有命門火衰作瀉而小水  
不利者以真陰虧損元精枯涸而然也○凡此皆小水不利  
之候然惟暴注新病者可利形氣強壯者可利酒濕過度口  
腹不愾者可利實熱閉滯者可利小腹脹滿水道痛急者可  
利○又若病久者不可利陰不足者不可利脈證多寒者不  
可利形虛氣弱者不可利口乾非渴而不喜冷者不可利蓋  
虛寒之瀉本非水有餘實因火不足本非水不利實因氣不  
行夫病不因水而利則亡陰瀉以火虛而利復傷氣倘不察

其所病之本則未有不愈利愈虛而速其危者矣

諸泄瀉論治 共九條

一泄瀉之暴病者或爲飲食所傷或爲時氣所犯無不由於口腹必各有所因宜察其因而治之○如因食生冷寒滯者宜抑扶煎和胃飲之屬以溫之○因溫滯者宜平胃散胃苓湯或白朮芍藥散以燥之利之○因食滯而脹痛有餘者宜大小和中飲之屬以平之○因氣滯而痛瀉之甚者宜排氣飲或平胃散之屬以調之○因食滯而固結不散或胃氣之強實者宜神祐丸赤金散首順丸之屬以行之○凡初感者病

氣未深臟氣未敗但畧去其所病之滯則胃氣自安不難愈也

一凡脾氣稍弱陽氣素不強者一有所傷未免即致泄瀉此雖爲初病便當調理元氣自非强盛偶傷者之比○如因瀉而神氣困倦者宜養中煎或溫胃飲或聖末煎或四君子湯或五君子煎○如微寒兼滯而不虛者宜佐關煎○若脾虛而微滯者宜五味異功散○若脾虛而微寒微滯者宜六味異功煎或溫胃飲○若因飲食不調忽而溏瀉以漸而甚或見微痛但所下酸臭而顏色淡黃便是脾虛胃寒不化之證卽

宜用五德丸再甚者卽宜用胃關煎切勿疑也

一凡兼真陰不足而爲泄瀉者則或多臍下之痛或於寅卯時爲甚或食入已久反多不化而爲嘔惡溏瀉或瀉不甚臭而多見完穀等證蓋因丹田不煖所以尾閭不固陰中少火所以中焦易寒此其咎在下焦故曰真陰不足也本與中焦無涉故非分利所及也惟胃關煎一劑乃爲最上之乘且人之患此者最多勿謂其爲新病而不可用也勿謂其爲年少而未宜用也覽有是證卽宜是藥劑少功多攸利非小但知者見其先昧者見其後見其後恐見之遲矣所以貴先見也

一腎泄證卽前所謂真陰不足證也每於五更之初或天將明  
時卽洞泄數次有經月連年弗止者或暫愈而復作者或有  
痛者或有不痛者其故何也蓋腎爲胃關開竅於二陰所以  
二便之開閉皆腎臟之所主今腎中陽氣不足則命門火衰  
而陰寒獨盛故於子丑五更之後當陽氣未復陰氣盛極之  
時卽令人洞泄不止也古方有椒附丸五味子散皆治此之  
良方若必欲陽生於陰而腎氣充固則又惟八味地黃丸爲  
宜然余嘗用此則似猶未盡善故特製胃關煎一炁丹九炁  
丹復陽丹之屬斯得其濟者多矣或五味子丸亦佳其有未

一甚者則如五德丸四神丸皆其最安者也

一凡脾泄久泄證大都與前治脾弱之法不相遠但新瀉者可治標久瀉者不可治標且久瀉無火多因脾腎之虛寒也○

若止因脾虛者惟四君子湯參术湯參芩白术散之屬爲宜

○若脾胃兼寒者宜五君子煎黃芽丸五德丸○若脾氣虛

寒兼滯悶者宜六味異功煎溫胃飲聖木煎○若脾氣虛寒

之甚而飲食減少神疲氣倦宜參附湯术附湯十全大補湯

○若病在下焦腎氣虛而微熱者宜六味地黃湯微寒者宜

八味地黃湯或胃關煎○若脾虛溏泄久不能愈或小兒脾

泄不止者止用敦阜糕粄水固腸糕亦易見效○若脾胃寒濕而溏瀉不止者蒼朮丸亦佳○若久瀉元氣下陷大腸虛滑不收者須於補劑中加烏梅五味子粟殼之屬以固之

一大瀉如傾元氣漸脫者宜速用四味回陽飲或六味回陽飲主之凡暴瀉如此者無不卽效若久瀉至此猶恐無及蓋五奪之中惟瀉最急是不可見之不早也倘藥未及效仍宜速灸氣海以挽回下焦之陽氣仍須多服人參膏

一酒泄證飲酒之人多有之但酒有陰陽二性人有陰陽二臟而人多不能辨也夫酒性本熱酒積則寒人但知酒有濕熱

而不知酒有寒濕也故凡因酒而生濕熱者因其性也以羸  
汗不滋陰而悍氣生熱也因酒而生寒濕者因其質也以性  
去質不去而水留爲寒也何以辨之常見人有陽強氣亢而  
善飲者亦每多泄瀉若一日不瀉反云熱悶蓋其隨飲隨瀉  
則雖瀉不致傷氣而得瀉反以去濕此其先天稟厚胃氣過  
人者也最不易得亦不多見此而病者是爲陽證不過宜清  
宜利如四苓散大分清飲或酒蒸黃連丸之類去其濕熱而  
病可愈也○若陽虛之人則與此大異蓋脾虛不能勝溫而  
溫勝卽能生寒陽氣因寒所以日敗胃氣因濕所以日虛其

證則形容漸羸飲食漸減或厭息見弦細或口體常怯寒或  
脅腹常有隱疼或眩運常多困倦或不安於五鼓或加甚於  
秋冬但無熱證可據而常多飧泄者則總屬虛寒也凡若此  
者若不速培陽氣必致漸衰而日以危矣余於四旬之外亦  
嘗病此數年其勢已窘因徧求治法見朱丹溪曰因傷於酒  
每晨起必瀉者宜理中湯加葛根或吞酒蒸黃連丸王節齋  
曰飲酒便泄者此酒積熱瀉也宜加黃連茵陳乾薑木香之  
屬薛立齋曰若酒濕未散脾氣未虛宜用此藥分利濕熱若  
濕熱已去中氣被傷宜用六君調補中氣又曰酒性大熱乃

無形之物無形元氣受傷當用葛花解醒湯分消其濕凡此  
諸論若已盡之然朱王二家之說則不分寒熱皆用黃連是  
但知酒之有熱而不知酒之有寒烏足憑也惟薛氏之說雖  
亦云酒性大熱而所重在脾誠若善矣余因效之初服葛花  
解醒湯不效繼服六君子補中益氣湯又不效再服理中以  
至八味俱不效斯時也計窮力竭若無再生之望矣因潛思  
熟計料非峻補命門終無益也乃自製胃關煎右歸丸一剂  
丹等方以治其病仍絕口不飲以杜其源調理年餘竟得全  
愈自後始明性質之理多得濟人向使已無確見執信濕熱

之說而妄用黃連乾葛清涼分利之劑則焉望其有今日卽或自用稍逞則旣甚亦難挽矣矧今人之病此者最多而是陰是陽不可不辨凡陽盛者脾強胃健而氣不易奪者也故治本無難而泄亦無慮陽衰者脾腎旣傷則脫氣最易故宜防其無及不可不爲深慮也若必以酒爲熱則其爲古法所誤者誠不少矣

此氣泄證凡遇怒氣便作泄瀉者必先以怒時挾食致傷脾胃故但有所犯卽隨觸而發此肝脾二臟之病也蓋以肝木克土脾氣受傷而然使脾氣本強卽見肝邪未必能入今旣易

傷則脾氣非強可知矣故治此者當補脾之虛而順肝之氣此固大法也但虛實有微甚則治療宜分輕重耳○如稟壯氣實年少而因氣泄瀉者可先用平胃散或胃苓湯○若肝氣未平而作脹滿者宜解肝煎先順其氣○若脾氣稍弱者宜二术煎或粘米回腸糕或消食導氣飲○若脾氣稍寒者宜抑扶煎吳茱萸散或蒼朮丸○若脾弱居多者宜溫胃飲聖术煎或六味異功煎○若既畏此證爲患則必須切戒氣怒

一風泄證亦當辨其風寒風熱而治之熱者如傷寒外感熱利

之屬是也宜以傷寒門自利條諸法治之寒者以風寒在胃而脾土受傷如內經所云春傷於風夏生飧泄之屬是也宜以前溫胃理中之法治之

述古共六條

丹溪曰世俗例用瀉藥治瀉若瀉而虛者或可用之若初得之者必變他證爲禍不小殊不知瀉多因濕惟分利小水最爲上策

薛立齋曰凡傷食瀉黃若飲食已消而泄瀉未止此脾胃之氣傷也宜用五味異功散○若泄瀉而腹中重墜此脾氣下陷

也宜補中益氣湯○若服尅伐之劑而腹中窄狹此脾氣虛  
痞也宜六君子湯○若脇脹善怒瀉青此肝乘脾虛也宜六  
君加柴胡升麻木香○若少食體倦善噫瀉黃此脾虛氣陷  
也宜六君加升麻柴胡

又立齋曰凡久瀉脾胃虛弱或作嘔或飲食少思屬脾胃虛弱  
用四君子加半夏木香○或腹痛屬脾胃虛寒用六君加炮  
薑木香○大抵此證多由泛用消食利水之劑損其真陰元  
氣不能主持遂成久瀉若非補中益氣湯四神丸滋其本源  
後必胸痞腹脹小水淋瀝多致不起

又立齋曰若久瀉腸胃滑泄不禁但脾胃虛寒下陷者用補中  
益氣湯加木香肉豆蔻補骨脂○若脾氣虛寒不禁者用六  
君子湯加炮薑肉桂○若命門火衰而脾土虛寒者用八味  
丸○若脾胃俱虛者用十全大補湯送四神丸○若大便滑  
利小便閉澁或肢體漸腫喘嗽唾痰脾腎氣血俱虛宜用十  
全大補湯送四神丸或宜金匱加減啓氣丸○每見元氣既  
虛而復用五苓之類因損真陰以致前證益甚者急投金匱  
腎氣丸多有得生者若反用牽牛大黃峻劑而通之是速其  
危也

又立齋曰大凡黃連枳實雖消停滯開痞悶若人脾胃克實暴患實痞宜暫用之若屢患屢服或脾胃虛痞者用之則脾胃反傷而諸證蜂起矣故東垣先生曰脾胃實者用黃連枳實瀉之虛者用白朮陳皮補之

徐東臯曰大抵諸泄瀉證各宜以類推求必先分利後實脾土益元氣無不全愈

泄瀉論列方

○四苓散 和一入七

○五苓散 和二入二

○胃苓湯 和百九十九

○平胃散 和十七

○益元散

卷一百十二

、茵陳飲

新卷八

○理中湯

熟一

、溫胃飲

新熟五

○二术煎

新和十二

、聖术煎

新熟二五

○胃關煎

新熟九

、佐關煎

新熟十

○十全大補湯

補二十

、抑扶煎

新熟十一

○養中煎

新熟四

、補中益氣湯

補三二

○參术湯

補四一

、參附湯

補三八

○五味異功散

補四

、敦阜糕

新固十

○右歸飲

新補三

、右歸丸

新補四

六味異功煎新熟七

解肝煎新和十一

○术附湯補四二

、四味回陽飲新熟二

、排氣飲新和六

、蒼术丸新和十七

○六味回陽飲新熟二

、五德丸新熟十八

○四神丸熟一五二

○六味地黃湯補一二二

○一炁丹新熟二二

○九炁丹新熟二三

○八味地黃湯補一二二

、黃芪丸新熟二一

○復陽丹新熟二十

○參苓白朮散補五五

○椒附丸熟百十三

○人參膏補一六五

○白术芍藥散 和三五

○神祐丸 攻四八

○赤金豆 新攻二

○葛花解酲湯 和一二四

○四君子湯 補一

○百順丸 新攻六

○五味子散 熟百五十

○金匱腎氣丸 補一二六

○大和中飲 新和七

○五君子煎 新熟六

○粘米固腸糕 新固七

○大分清飲 新寒五

○小和中飲 新和八

○消食導氣飲 和一九七

○小分清飲 新和十

○吳茱萸散 熟百四十

○酒蒸黃連丸 寒一七九

論外備用方

歸脾湯

補三三

脾虛泄瀉

加味六君湯

補六

藿香正氣散

和二十

益黃散

和十九

脾寒氣滯

茯苓湯

和一八九

白朮芍藥湯

散三四

濕瀉

滲濕湯

和一七四

胃風湯

散五七

風濕

升陽除濕湯

和一七九  
調脾

麵术丸

和二百一

暑濕暴瀉

戊己丸

和二百二

猪苓湯

和一八九

發熱小水不利

草果散

和一九五  
寒痛泄

大七香丸

和一三一

寒氣

調胃白朮散

和三三  
行氣和胃

太平丸

寒百十九  
熱瀉

大橘皮湯 和一九六

濕熱水瀉

橘半胃苓湯 和一九一

補胃和胃

薷苓湯

寒百十八  
暑瀉

黃芩芍藥湯 寒八九

熱瀉

真人養臟湯

和一九四  
調脾

胃愛散

熱七  
虛寒

八味湯

熟一四二  
虛寒滯

八味理中丸

熟一五七  
脾胃虛寒

三神丸

熟一五一  
脾胃虛寒

草撥丸

熟一五七  
中寒

附子理中湯

熟一  
一

漿水散

熟一四八  
陰毒

九寶丹

熟一四四  
溫補脾胃

吳茱萸湯

熟一三八  
暑濕受寒

四柱散

熟一四五  
冷痛泄瀉

陳麴丸

熟一六四  
磨積止瀉

附子茴香散

熟一四九  
煖胃和中

鐵刷散

熟百十  
寒濕泄瀉

縮脾丸 熱一六二

濕清

澹寮四神丸 熱一五三

腎泄

補脾湯 熱六九

胃寒

小已寒丸 熱百七十

中寒洞泄

五味子丸 熱一五六

脾腎泄

養胃湯 熱七十

虛寒痛泄

厚朴丸 熱一六一

寒滯脹泄

白术聖散子 熱一三七

胃腸溫胃

內豆蔻丸 熱一五八

藏寒滑泄

小安腎丸 熱一六八

久瀉

訶梨勒丸 熱百六十

寒滑

固腫丸 固五三

溫補固瀉

泄瀉經驗方

周四九

# 痢疾

經義

通評虛實論帝曰、腸澼便血何如岐伯曰、身熱則死寒則生○  
帝曰、腸澼下白沫何如岐伯曰、脈沉則生、脈浮則死○帝曰  
腸澼下膿血何如曰、脈懸絕則死、滑大則生○帝曰、腸澼之  
屬身不熱、脈不懸絕何如曰、滑大者曰生、懸濇者曰死以臟  
期之

百病始生篇曰、陽絡傷則血外溢、血外溢則衄血、陰絡傷則血  
內溢、血內溢則後血

太陰陽明論曰、食飲不節、起居不時者、陰受之、陰受之則入五

臟入五臟則膜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼

大奇論曰脾脈外鼓沉爲腸澼久自已○肝脈小緩爲腸澼易

治○腎脈小搏沉爲腸澼下血血溫身熱者死○心肝澼亦

下血二臟同病者可治其脈小沉濇爲腸澼其身熱者死熱

見七日死

論疾診尺篇曰大便赤辨飧泄脈小手足寒者難已飧泄脈小手足溫泄易已○春傷於風夏生後泄腸澼

經脈篇曰醫所生病爲腸澼

陰陽別論曰陰陽虛腸澼死

氣厥論曰腎移熱於脾傳爲虛腸澼也

玉機真臟論曰泄而脈大脫血而脈實皆難治

論證

共二條

痢疾一證卽內經之腸澼也古今方書因其閉滯不利故又謂之滯下其證則裏急後重或垢或血或見五色或多紅紫或痛或不痛或嘔或不嘔或爲發熱或爲惡寒此證之陰陽虛實最宜博審詳察庶不致於差失若見有不確則大致悞人前泄瀉門諸法本與此通必互相參酌用之爲善

一痢疾之病多病於夏秋之交古法相傳皆謂炎暑大行相火

一司令酷熱之毒蓄積爲痢今人所宗皆此一說夫痢因於暑一而言其爲熱豈不宜然然炎熱者天之常令也當熱不熱必反爲災因熱食涼者人之常事也過食生冷所以致痢多見人之愾疾者雖經盛暑不犯寒涼則終無瀉痢之患豈其獨不受熱乎此其病在寒邪不在暑熱病在人事不在天時從可知矣但胃強氣實者雖日用水果之類而陽氣能勝故不致疾其次之者雖未卽病而日用日積迨夫大火流西新涼得氣則伏陰內動乘機而起故寒濕得以犯脾者多在七八月之間此陽消陰長之徵最易見也再其次者多以脾腎本

弱則隨犯隨病不必伏寒亦不必待時尤爲易見夫以生冷  
下咽鴟痢隨起豈卽化而爲熱乎奈何近代醫流止見此時  
之天熱不見此人之臟寒但見痢證開口便言熱毒反以寒  
涼治生冷是何異雪上加霜乎俗見相同死者不可勝言矣  
或曰然亦有用寒藥而愈者何也曰以胃強陽盛之人而得  
濕成熱者亦有之以元氣壯實而邪不勝正者亦有之此皆  
可以寒治而愈亦可以通利而愈而此輩極少以胃弱陽虛  
而因寒傷臟者此輩極多若再用寒涼或妄加瀉滌則無有  
不死凡今以痢疾而致死者皆此類也觀丹溪曰鴟痢一證

屬熱者多屬寒者少戴原禮曰以酷熱之毒至秋陽氣始收火氣下降因作滯下之證皆大謬之言也不可信之因作俚詞以志其戒

俚詞曰

夏日多炎陰邪易入暑熱是主風寒是客身不被風瘧從何致口不受寒痢從何得治必求本軒岐金石志此微言可爲醫則

論瀉痢虛實

共三條

凡治痢疾最當察虛實辨寒熱此瀉痢中最大關係若四者不明則殺人甚易也

一實證之辨必其形氣強壯脈息滑實或素縱口腹或多脹滿堅痛及年少新病脾氣未損者方可用治標之法微者行之利之甚者瀉之

一虛證之辨有形體薄弱者有顏色青白者有脈雖繁數而無力無神者有脈見真弦而中虛似實者有素稟陽衰者有素多淡痰者有偶犯生冷者有偶中雨水陰寒者有偶因飲食不調者有年衰脾弱者以上諸證凡其素無縱肆而忽患瀉痢此必以或瓜或果或飲食稍涼偶傷胃氣而然果何積之有又何熱之有總惟脾弱之輩多有此證故治此者只宜溫

調脾胃但使脾溫則寒去卽所以逐邪也且邪本不多卽用溫補健脾原無妨礙不過數劑自當全愈切不可妄云補住邪氣而先用攻積攻滯及清火等藥倘使脾氣再傷則輕者反重重者必危矣

論瀉痢寒熱

凡瀉痢寒熱之辨若果是熱則必畏熱喜冷不欲衣被渴甚飲水多亦無碍或小便熱澀而痛或下痢純血鮮紅脈息必滑實有力形氣必躁急多煩若熱證果真卽宜放手涼解或兼分利但使邪去其病自愈○若無此實熱諸證而瀉痢有不

止者必是虛寒若非溫補脾胃必不能愈卽有愈者亦必其元氣有根待其來復而然勿謂虛寒之證有不必溫補而可以愈者或治痢必宜寒涼而寒涼亦可無害者皆見有未真也

### 論積垢

凡腹中積聚之辨乃以飲食之滯畱蓄於中或結聚成塊或脹滿鞭痛不化不行有所阻隔者乃爲之積此皆粗粕成形之屬所當逐也今人不能辨察但見痢如膿垢者皆謂之積不知此非粗粕之屬而實附腸着臟之脂膏皆精血之屬也無

一論瘦人肥人皆有此脂但肥者脂厚瘦者脂薄未有無脂者也若果無脂則腸臟之間豈容單薄赤露非惟藩籬不固而且臟必易傷無是理也今之凡患瀉痢者正以五內受傷脂膏不固故日剝而下若其臟氣稍強則隨去隨生猶無足慮若臟氣至敗剝削至盡或以久瀉久痢但見血水及如屋漏水者此在庸人云其積聚已無反稱爲善而不知脂膏刮盡則敗竭極危之候也使今後醫家但識此爲脂膏而本非積聚則安之固之且不暇而尙敢云攻之逐之或用苦寒以滑之利之者否

論五色

凡五色之辨如下痢膿垢之屬無非血氣所化但白者其來淺浮近之脂膏也赤者其來深由脂膏而切膚絡也下純血者多以血爲熱迫故隨溢隨下此其最深者也若紫紅紫白者則離位稍久其下不速而色因以變或未及脈絡此其稍淺者也若紅白相兼者此又其淺深皆及者也大都純血鮮紅者多熱證以火性急速迫而下也紫紅紫白者少熱證以陰凝血敗損而然也純白者無熱證以臟寒氣薄滑而然也然有以無紅而亦因熱者此以暴注之類而非下痢之謂也有

以紫紅雖多而不可言熱者此以陰絡受傷而非暴注之比也若辨黃黑二色則凡黃深而穢臭者此有熱證亦有寒證若淺黃色淡不甚臭而或兼腥馊氣者此卽不化之類皆寒證也黑而濃厚大臭者此焦色也多有火證若青黑而腥薄者此肝腎腐敗之色也猶以爲熱其謬甚矣雖五色之辨大約如此然痢之見血者無非陰絡受傷卽或寒或熱但傷絡脈則無不見血故不可以見血者必認爲熱也凡臨此證當必以脉色形氣病因兼而察之庶不致有疑似之誤

論腹痛

凡瀉痢腹痛有實熱者有虛寒者實熱者或因食積或因火邪  
但食積之痛必多脹滿堅鞭或痛而拒按此必有所停滯微  
者宜行其滯甚者宜瀉而逐之○火邪之痛必有內熱等證  
方宜清之利之然邪實於中者必多氣逆故凡治痛之法無  
論是火是食皆當以行氣爲先但宜察藥性之寒熱擇而用  
之可也○虛寒之痛尤所當辨蓋凡瀉痢之痛多由寒氣之  
在臟也經曰痛者寒氣多也有寒故痛也又曰病痛者陰也  
故凡人有過食生冷或外受寒氣卽能腹痛此可知也寒在  
中者治宜溫脾寒在下者治宜溫腎也○再若虛寒刮痛之

義則人多不知蓋元氣不足於內則雖無外受寒邪而中氣  
不暖卽寒證也所以瀉痢不能止飲食不能化而病有不能  
愈正以陽虛多寒也且瀉痢不止胃氣既傷膏血切膚安能  
不痛此其爲痛乃因刺及腸臟而然是以痢因於痛痛因於  
痢故凡以寒侵腑臟及脉絡受傷血動氣滯者皆能爲痛但  
察其不實不堅或喜揉按或喜煖熨或胸腹如饑而不欲食  
或胃脘作嘔而多呑酸但無實熱等證則總屬虛寒安得謂  
痛必因積痛皆實證耶凡治虛寒之痛者速宜溫養臟氣不  
得再加消伐致令動者愈滑者愈滑必至危矣若謂諸痛

不宜補必待痛定然後可用則元氣日去終無定期嘗見一  
醫云痢疾須過七日方可用補而不知六日已死執迷不悞  
愚亦甚矣但其痛之甚者當於溫補藥中稍加木香以順其  
氣或多加當歸以和其血俟痛稍減則當去此二味蓋又恐  
木香之耗氣當歸之滑腸也若寒在下焦而作痛者必加吳  
茱萸其或痛不至甚則但以溫補脾胃爲主使脾胃漸安則  
痛當自止此不必治其痛也

論裏急後重

凡裏急後重者病在廣腸最下之處而其病本則不在廣腸而

在脾胃。凡熱痢寒痢虛痢皆有之。不得盡以爲熱也。蓋中焦有熱則熱邪下迫。中焦有寒則寒邪下迫。脾腎氣虛則氣陷下迫。欲治此者。但當察其所因。以治脾胃之本。則無有不愈然病在廣腸已非食積。蓋食積至此瀉則無畱而所畱者惟下陷之氣。氣本無形。故雖若欲出而實無所出。無所出而又似欲出。皆氣之使然耳。故河間之用芍藥湯。謂行血則便自愈。調氣則後重除。是固然矣。然調氣之法。如氣熱者涼之。則調氣寒者溫之。則調氣虛者補之。則調氣陷者舉之。則調必使氣和。乃爲調氣行血之法。其義亦然。若但以木香。檳榔。當

歸大黃行血散氣之屬謂之調和不知廣腸最遠藥不易達而所行所散者皆中焦之氣耳且氣既下陷而復以行之散之則氣必更陷其能愈乎矧痢止則後重自止未有痢不愈而後重能愈者也故凡欲治此者但當以治痢爲主

### 論大孔腫痛

凡病痢疾多有大孔腫痛者其故何也蓋脾胃不和則水穀之氣失其正化而濁惡難堪之味出諸孔道此痛楚之不能免也又若火因瀉陷陽爲陰逐則胃中陽氣并逼於下無從解散此腫之所由生也所以痢多則痛多痢少則痛少痛與不

痛亦由氣之陷與不陷耳故無論寒痢熱痢大孔皆能爲痛  
不得謂痛必由熱也欲治此者但治其痢痢止則腫痛自散  
亦如後重之法也自丹溪云大孔痛因熱流於下木香枳榔  
芩連加炒乾薑主之是但知火能爲腫爲痛亦焉知元陽之  
下陷也後人所宗皆其法也凡虛寒之輩其不能堪此亦多  
矣

論口渴

凡瀉痢之證必多口渴今人但見口渴卽認爲火而不知有火  
者固能渴無火者亦能渴此不可不辨也如火盛於中則薰

脾爍胃津液耗乾故酷好冰水多而不厭愈涼愈快隨飲隨  
消者此因熱而渴治宜涼也○又如口熱作渴雖欲飲水而  
飲不能多者卽非真火不宜涼也凡口雖乾渴喜涼而復不  
喜涼者是卽寒聚於中而無根之火浮戴於上此最忌寒涼  
者也然渴有真渴有似渴真渴者必好茶飲但以喜熱喜涼  
即可辨其寒熱似渴者乾也非渴也口雖乾而不欲湯飲則  
尤非熱證可知也然渴痢之證因其水泄於下必津涸於上  
故不免於渴渴而欲飲正以內水不足欲得外水以相濟也  
豈必皆因於火乎諸如此者必當詳審其有火無火若火有

餘者自當清火水不足者自當滋陰是固然矣然氣爲水母其有氣虛不能生水者不補其母則水不能生而渴不止也土爲水主其有脾虛不能約水者不强其主則水不能畜而渴不止也使能不治其渴而治其所以渴又何渴病之有

### 論小水

凡瀉痢之證小水必多不利或多黃赤此其寒熱虛實大有關係不可不察也若暴注之瀉以其清濁不分水穀并歸於大腸故水有不利者惟其暫也若痢疾之小水則病本不一今人但見黃赤不利無不云其爲熱誤者多矣凡因於熱者必

其熱赤之甚或多澁痛或見鮮血然必上下皆有熱證方是  
真熱此宜清涼治之若非真熱則或以中寒而逼陽於下者  
有之或以瀉痢凸陰而水虧色變者有之或以下焦陽氣不  
暖而水無以化者有之或以妄用滲利而肺逼乾汁者亦有  
之但察其三焦無火則雖黃雖濇總皆凸陰凸液之證不得  
通以熟論速當培補真陰乃爲良法內經曰中氣不足溲便  
爲之變至哉斯言何令人之不能察也不獨此也每見有小  
水清白而兼腹痛者仍用芩連之類余則不知其何謂可恨  
可恨

論陰陽疑似

陰陽之道卽養生治病之本而人有不易知者以其有莫測之  
妙也夫陰陽之用欲其相濟不欲其相賊相濟者相和者也  
陰中不可無陽陽中不可無陰也相賊者相害者也陽賊陰  
則爲焦枯陰賊陽則爲寂滅也凡諸爲病者無非陰陽相賊  
而有失其和耳蓋陰陽之性陰常喜靜而惡動陽常喜緩而  
畏寒及其相賊則陰畏陽之亢所以陰遇陽邪非杓則槁陽  
畏陰之毒所以陽逢陰寇不走卽飛此陰陽相妨之機誠多  
難測凡諸病劇而有假真疑似者卽其證也而尤於傷寒痢

疾爲最焉若今之患病最甚者多見上下皆有熱證而實非  
真熱者何以見之如煩則似熱非熱躁則似狂非狂懊惱不  
寧莫可名狀此非真陽證也蓋以精血敗傷火中無水而陰  
失其韻故煩躁若此也又如飛者飛於上走者走於下飛於  
上則爲口渴喉瘡或面紅身熱走於下則爲孔熱孔痛或便  
黃便血此非實熱證也蓋以水火相刑陽爲陰逐而火離其  
位故飛走若此也今之人但見此等證候僉曰察病不離形  
證形證之熱既已若此而猶謂之寒何其妄也是但知外之  
有熱而不知內之有寒也知上下之有熱而不知中焦之有

寒也又豈知煩躁之爲陰虛而飛走之爲陽虛也余言若此一聞者果能信乎將猶疑乎疑似之間猶不可不辨也且如肌表皆有熱證本當惡熱而反不舍衣被或膚腹喜煖而宜熨宜按者此則外雖熱而內則有寒也又如九竅皆有熱證必喜冷飲然有口欲寒而腹畏之故凡寒冷下咽則或增嘔惡或加腹疼或噎塞不行而反生脹悶或口舌雖有瘡痛而反欲熱湯飲者此則上下雖熱而中焦之有寒也此外有陽氣素弱及脈色少神如前論等證若止知爲火治以寒涼其奈內本因寒而再加以寒則寒涼入胃直犯中焦是外熱不相

及而中寒必更甚故致飛者愈飛走者愈走所謂雪上加霜

欲孤陽之不減不可得也故凡治此者但能引火歸原使丹田緩則火就燥下原固則氣歸精此陰陽顛倒之神理而或

者昧之亦猶苦海無邊未得其岸故余悉此用垂普救之衣

鉢云

論治 共十條

凡治痢之法其要在虛實寒熱得其要則萬無一失失其要則爲害最多辨論如前所當熟察前如泄瀉門調治諸法俱宜

酌用

一生冷初傷飲食失調而胃氣未損元氣未虧或爲痛爲脹爲  
暴瀉暴痢等證而食滯有未清者宜抑扶煎五德丸或平胃  
散胃苓湯五苓散之類畧祛寒滯愈之極易

一脾腎虛弱之輩但犯生冷極易作痢無論大人小兒凡係脾  
虛致痢別無實熱等證者先宜佐關煎溫其脾氣如或稍深  
而病及肝腎者卽宜胃關煎爲最妙之治勿以新病畏而弗  
用也或五德丸四神丸之類俱可間用

一病痢凡脾腎俱虛而危劇可畏者只宜以胃關煎爲最溫胃  
飲次之或相機間用亦可或兼用四維散九蒸丹復陽丹庶

可保全也

一、痢疾嘔惡兀兀欲吐或聞食氣卽見恶心者此胃氣虛寒不能容受而然必宜溫補安胃用五君子煎或六味異功煎溫胃飲聖木煎之類主之○嘔甚者宜六味回陽飲之屬主之○若陰中火虛氣不歸原而嘔者宜胃關煎理陰煎主之○若胃火上衝而致嘔吐者則必有煩熱脹滿等證乃可用清涼降火等藥宜大分清飲益元散之類主之

濕熱邪盛而煩熱喜冷脉實腹滿或下痢純紅鮮血者宜清流飲黃芩芍藥湯或用香連丸或用河間芍藥湯○熱甚者

宜大分清飲或茵陳飲此等藥若數劑不效便當思顧脾胃矣

一癆有發熱者似乎屬火宜從涼治然實熱之證反未必發熱惟癆傷精血陰虛水虧者則最多爲熱爲躁也如或虛中有火脈見有力者宜加減一陰煎或保陰煎主之○若原本無力全屬虛火則不可治火單宜壯水補陰如三陰煎及六味八味等丸○若陰盛格陽而爲外熱者必宜胃開煎及右歸飲之屬主之

一癆疾初作氣稟尙強或因縱肆口腹食飲停滯凡有實邪脹

痛堅滿等證而形氣脈氣俱實者可先去其積積去其瘀自  
止宜承氣湯或神祐丸百順丸主之或用赤金豆以微瘀之  
此通因通用痛隨瘀減之法也但此等證候必須確審然後  
用之若以脾胃虛寒致瘀而妄用此藥及寒涼剋伐等劑再  
敗元陽者多致不可解救最當慎也

一禁口不食乃痢疾最危之候而自古未有明辨觀丹溪云禁  
口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎汁終日呷之如吐再喫  
但得一呷下咽便好人不知此多用溫藥甘味此以火濟火  
以滯益滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者當推明而祛其毒

此丹溪之說也而不知禁口之辨其義最微豈皆胃口蒸甚  
而總以黃連可治乎蓋噤口者以食不得入雖亦有實熱證  
而惟脾胃虛寒者居多若因食積胃中而噤口者其胸腹必  
有脹滿或見鞭痛此當行滯去積積滯去而食自入如青陳  
查朴之屬是也有因火鬱胃中而噤口者其臟腑必多熾熱  
或脈見洪數此當瀉火去熱邪熱去而食自入如芩連梔柏  
之屬是也凡此者皆以邪畜於中乃噤口之實證也然實證  
無幾而近之病者每察其胃口則多無脹滿等證或察其大  
都則亦非實熱等證但見其有出無入而胃口日窮精神日

敗蓋其旣無脹滿本非積也又無真熱本非火也無積無火而食不能入其故何也以臟氣不能容受也不能容受其故有一蓋一由脾氣之弱故或爲嘔惡或爲吞酸或惡聞食氣而泛泛不寧或饑不能食而枵枵待因此以中焦不運故食不能入責在脾也一由腎氣之弱故命門不能煖則大腸不能固小腸不能化則胃氣不能行此以下焦失守而化源無主責在腎也欲健中焦非人參白朮乾薑甘草之屬不可欲實下焦非熟地附子吳茱萸肉桂之屬不可脾腎強而食自入其理甚明其應如響余之活人於此者不勝紀矣如丹溪

一之用黃連及以火濟火以滯益滯之說乃悉以實火爲言特  
一曲之見耳局人意智絕人生幾此其關係非小不得信以  
爲然

一久痢陽虛或因攻擊寒涼太過致弱脾胃元神而滑脱不止  
者本源已敗雖峻用溫補諸藥亦必不能奏效矣宜速灸百  
會氣海天樞神闕等穴以固其陽庶或有可望生者

述古共八條

仲景曰夫六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內  
利不禁下甚者手足不仁○下痢腹脹滿身體疼痛者先溫

其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

褚氏遺書曰陰已耗而復竭之則大小便卒疼愈疼則愈欲大

小便愈便則愈疼

東垣曰飲食有傷起居不時損其胃氣則上升清華之氣反從下降是爲飧泄久則太陰傳少陰而爲腸澼裏急後重膿血相雜數至圊而不能即便者專用補中益氣湯爲主使升降之道行其痢不治自消矣○裏急者腹中不寬快也亦有虛坐而大便不行者皆血虛也血虛則裏急後重

薛立齋曰若白痢久胃弱氣虛數至圊而不能便或少有白膿

者乃土不生金肺與大腸氣傷而下墜也當用補中益氣湯舉其陽氣則陰自降而二便自愈○若飲食不入發熱作渴勢甚危急用十全大補湯如不應送二神丸○若紅痢久胃弱血虛脾經血熱下注而不愈若用四物加白朮茯苓○若脾經氣虛不能統血而不愈者用四君加川芎當歸○若中氣下陷不能攝血而不愈者用補中益氣湯

凡嘔吐食不得下其或脾胃素有實熱或過食辛辣厚味而暴患者宜開胃行滯○若胃氣虛陷嘔吐者宜六君加生薑凡痢腹痛後重怕手按腹或脈洪實者爲積滯閉結宜疎通

之○若腹痛後重喜手按腹或脉微細爲陽氣虛寒宜六君

乾薑溫補脾氣

凡氣血虛而作痢若脾虛血弱者宜四君子湯○胃虛血弱者補中益氣湯○久病氣血俱虛者入珍湯○若脾氣虛寒下陷補中益氣湯加粟殼薑桂如不應急用附子○若氣血虛弱宜十全大補湯加附子粟殼○若命門火衰宜入味丸以補母氣○若腹痛作渴飲湯手按之而痛稍止者俱宜溫補脾胃

徐東皋曰凡痢疾之治須審病者氣體厚薄曾無通瀉及用攻

積苦寒之藥脉之有力無力及正氣邪氣有餘不足對證施治未有弗效今醫治病多峻用下劑及苦寒太過鮮有不致誤者况年高與體弱之人遂致元氣虛陷反不能支胃氣既虛其痢益甚有陽虛陷入陰中則脫血陣陣而下者醫尙謂血痢不已仍用苦寒漸至脈絕四肢厥冷而死者易可勝紀且令人之患病者多有脾胃先虛而後積滯通濁之劑宜酌用也稍或過之遂致虛脫蓋有由焉

附按共三條

王海臘治楊師三朝三大醉至醒發大渴飲冷水冰茶各三杯

遂病便血約一盆先用吳茱萸丸又用平胃五苓各半散三  
大服血止後復爲白痢又與神應丸四服白痢乃止或曰何  
不用黃連之類以解毒而反用溫熱之劑予曰若用寒涼其  
疾必大變蓋寒毒內傷復用寒涼非其治也况血爲寒所凝  
浸入大腸而下得溫乃行所以用溫熱其血自止經日治病  
必求其本此之謂也胃既得溫其血不凝而自行各守其鄉  
也觀此治法可見治血痢者豈可偏執爲熱乎○又海藏曰  
暑月久而痢不可用黃連陰在內也

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得泄痢連月蘿

壁間有韻語云暑毒在脾溫氣運脚不泄則痢不痢則瘧獨  
煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治瘧醫家大錯  
如方與服其疾隨愈按此說頗奇雖未及用姑亦錄之以存  
其法

唐太宗實錄云貞觀中上病氣痢久未痊服衆醫藥不應因下  
詔訪問時金吾長張寶藏會因此疾卽具疏以乳煎華菱方  
上服之立效宣下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾  
復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也  
徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈

不及汝耶卽命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤

草菱三錢同煎減半空腹頓服

痢疾論列方

○抑扶煎 新熱十一

○佐關煎 新熱十

○胃關煎 新熱九

○五苓散 和一八二

○胃苓湯 和百九十

○溫胃飲 新熱五

○平胃散 和十七

○四逆湯 热十四

○百順丸 新攻六

○四君子湯 補一

○五德丸 新熱十八

○四神丸 热一五二

五君子煎 新熱六

○二神丸 熟一五一

復陽丹 新熱二十

○六君子湯 補五

四維散 新熱十二

○九蒸丹 新熱二三

吳茱萸丸 熟一四一

○六味丸 補一二二

八味丸 補一二二

○大分清飲 新寒五

理陰煎 新熱三

○右歸飲 新補三

六味異功煎 新熱七

○四物湯 補八

入珍湯 補十九

○六味回陽飲 新熱二

三陰煎 新補十一

○保陰煎 新寒一

○十全大補湯補二十

○桂枝湯散九

神應丸未收

○補中益氣湯補三一

清流飲新寒六

○茵陳飲新寒八

加減一陰煎新補九

○香連丸寒百十三

益元散寒百十二

○河間芍藥湯攻三二

承氣湯攻一

○神祐丸攻四八

○黃芩芍藥湯寒百九

○赤金豆新攻二

聖末煎新熱二五

論外備用方

歸脾湯 補三三

大防風湯 補九九  
痢後風

十寶湯 補九七  
虛寒

大七香丸 和一三一  
寒氣

戊己丸 和二百二  
溫熱

黃芩半夏生薑湯 和十六  
乾嘔

斗門方 和一九  
毒痢膿血

藿香正氣散 和二十  
寒滯

真人養臟湯 和一九四  
調和

簡易八方 和二百  
寒滯

大黃湯 改十一  
濕熱

木香化滯湯 寒百十  
濕熱滯

黃芩湯 寒百五  
乾嘔痢

六神丸 寒百十四  
食積熱痢

黃芪散 寒百八  
熱赤痢

理中湯 热一  
中寒

草撥丸 热一  
寒痢  
五七

白术聖散子 热一  
固陽溫胃  
三七

自通湯  
熱一  
少陰病  
四六

桂香丸  
熱一  
冷滑不禁  
六三

附子茴香散  
熱一  
暖胃和中  
四九

固腸散  
溫固  
五十

桃花丸  
固五六  
冷滑久痢

诃梨勒丸  
熱百六十  
寒滑痢

固腸丸  
固五三  
溫補固瀉

大斷下丸  
固五四  
溫瀉

生地黃湯  
固五七  
熟血痢

瀉腸散  
固二八六  
傳移

當歸黃芪湯  
補九八  
妊娠下漏

升陽除濕防風湯  
和百八十  
濕帶