

傷寒

杭州圖書館



仲景主

復門

陰陽易

仲景主

大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

枳實四枚

梔子十四枚

豉一兩

枳實

有食者大黃

右三味以清漿水二盞空煮退一盞內枳實梔子煮取八分下豉更煮五六沸去渣溫服覆令取微汗若有宿食內大黃量虛實加減

有熱者柴胡

傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉實者以下解之

有水氣者

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣

澤瀉

蜀漆洗去

商陸

海藻洗

括萎根

葶蘆各等分

右為散水服方寸匕小便利止後服日二

醫學綱目卷三十一

胃有寒者

大病瘥後喜睡久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸

氣逆欲吐者

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉

石膏

半夏

人參

麥門冬

去心甘草

嘔者加生姜

右咬咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分

米熟湯成去渣溫服

診風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

後賢主於補虛

潮大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎

氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內為中州調中可已此為有形病也但見外證則謂之復病非為勞也如再感風寒是也

虛當補
其母

勞當補
其子

本記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗後後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

八醫學綱目卷三十一

二

人參

白朮

甘草

橘皮去白皮

青皮去白皮

乾姜各等分

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得

潮治勞復麥門冬湯氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬兩

甘草二兩

粳米一合

右麥門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯

一小盞半入藥五錢七棗二枚去核新竹葉一十五片

同煎至一盞去渣溫服不能服者綿滴口中又治小兒

不能灌藥者宜用此綿滴法 此方不用石膏以其三

焦無火熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏

若加人參大妙

外大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛

乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期十日

服不住佳

肚治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鷺甲服方寸

七

活雄鼠屎湯治勞復

梔子十四箇

雄鼠屎二七枚兩頭尖者是

枳殼三枚炒

右為細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白連鬚

乾葛

新豉半合

生姜切一合

麥門冬法

熟地銕

流水四升以杓揚之

右七味用清水煎三分減二去查分二服漸漸服之取汗

入醫學綱目卷三

三

右傷寒勞復莫若仍用丹溪以參芪歸朮加發散之劑汗之為的當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒祖散主之

燒祖散取婦人中裋近隱處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裋襠燒灰用

管治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調燒祖散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

陰陽易續法

寒熱

熱有寒

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞

痛婦人則裏急腰膝連腹內痛名為陰陽易也其男子病

新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新

瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女

並不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒着於人

如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四

肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不自死而病苦少腹

裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離脈緩弱血氣虛

骨髓竭便恍恍翁翁氣力轉小着床不能動搖起止仰人

或牽引歲月方死宜燒棍散猥鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯

乾姜湯當歸白朮湯選用之海藏云熱者燒棍散竹茹湯

至於按正方妙香丸條下治雜病陰陽易中有牛黃散射之類是治其熱症也

竹皮湯療交接勞復邪腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮一升

用水三升煮取一升絞去渣分二服立愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣衝胸手足拘

急搖搦如中風狀宜此湯

瓜蒌根兩 青竹茹刮半升

右以水二升煮取一升二合去渣分二三服

妙香丸熱條

百一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕衄刺

數條絞取汁服之良

澀若陰陽易果得陰脈當隨症用之 若脈在厥陰當歸

四逆湯送下燒棍散 若脈在少陰通脈四逆湯送下燒

棍散 若脈在太陰四順理中丸送下燒棍散所用之藥

各隨其經而效自速也 猥鼠糞湯療傷寒病後男子陰易

寒者熱

醫學綱目卷三

四

茈白根把

猥鼠糞十四粒兩頭尖者見

右二味以水五升煮取半升去查再煎三沸溫服得效未汗再服亦理諸般勞復

當歸白木湯治婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝四肢不任舉動無力發熱者

白木

當歸

桂枝

附子生

甘草

芍藥

黃芪

人參各二錢半

生姜兩半

右咬咀水煎服食頃再服溫覆取微汗差

李良佐子病太陽症尺寸脈俱浮數按之無力余見其內陰虛與神朮加乾姜湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒

醫學綱目卷五

五

加芍藥茴香等丸五六服三日內約服丸六七百丸脈復生又用大建中接之大汗作而解

山因女色病陰証傷寒者用陳皮熱鍋內炒焦以酒烹下濾酒飲之

四時傷寒不同

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧

一歲長幼病相似為溫疫 多眠多汗脈浮為風溫 一

身盡痛為濕 身反張為疰

四時傷寒

陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此

四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏若能固密則不傷

於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病

惟傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病者為傷

寒不即病者為寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變

瘧疾

為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫

熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也
凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時
應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣
是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行瘧疾也

三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕

五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣

已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病及暑病相似但治

有殊者要在辨其病原寒熱溫三者之異則用藥冷熱之

品味判然矣

其冬有非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫

復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同冬溫應常紀者有三歲少陰司

醫學綱目卷三

六

天之政五之氣陽明司天之政總之氣厥陰司天之政總
之氣皆病冬溫其不應常紀而反常者則不可候之而隨
時變易也 氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或

有至而太過者皆成病氣也

丹溪用

補中益

氣通治

四時傷

寒氣用

海藏用

神木日

木通治

濕症

傷寒與

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯
氣虛者四君子湯加發散劑血虛者四物湯加發散劑東
垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻薑本蒼朮海藏
治風濕無汗者用神木湯有汗者用白朮湯治剛症用神
木湯加羌活麻黃治柔症用白朮湯加桂心芫朮治風濕
用白朮湯隨證加藥治中喝脈弦細扎遲者用黃芪湯此
皆與仲景所謂辛苦之人觸胃之病傷寒同意也
附子理中湯其議藥則得之矣曰傷日中未有議其異同
者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌

腠自密鬱發為熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝葦微表而安以病體不甚虛也若中寒則倉卒感受其病即發而暴因其腠理踈豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此氣大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門

傷寒

冬為傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也治法除濕暑瘧疾外皆傷寒法也

溫病

春為溫病

從立春節後其中無暴寒又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變為溫病春溫應常經陽司天之政初之氣太陽司天之政初之氣陽明司天之政終之氣太陰司天之政二之氣皆病溫其不應常祀而

反常者不可候之而隨時變易也

入醫學綱目卷三

七

冬傷於寒春必溫病全文見太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病治見冬溫

溫毒

陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒論見大法治見發班活人云初

風溫

發汗不解身灼熱為風溫其證脈浮汗出身重多眠蓋其病不獨見於春間故另立風溫門春發班咳

尺膚熱甚脈盛躁者病溫也全文見診夫精者身之本也故藏於精者春不病溫

針灸

凡治溫病可刺五十九穴成註云所謂五十九穴者刺

兩手內外側各三九十二疔五指間各一八疔足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三九六疔顛上一顛會一髮際一廉泉一風池二天柱二內經云氣口靜人迎躁者取之若氣口人迎皆靜者勿刺

也人迎謂結喉動脈也 王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行

五行者以越諸陽之熱逆也 謂頭中行上星額會前頂百

五穴承光通天絡却王梳十穴第三行 大杼膺俞缺盆

兩傍臨泣目窓正營承靈臑空十穴也 氣衝三里巨虛上下兼

背俞此八者以瀉胸中之熱也 雲門髃骨委中髓空此八者

以瀉四肢之熱也 五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱

也 謂背第五行兩傍臑戶神

也堂寬門意舍志室十穴也

溫病續法

活夏至前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮緊者溫病也春

月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發為溫病蓋

因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏月熱病不

同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之

不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

煩躁發渴脈實大便秘澀者大柴胡湯微利之虛煩用竹

葉湯次第服之

仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒各不同

當以仲景為正

升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根一兩 黃芩 芍藥各半 甘草炙

桂心各一分 麻黃三分去 湯泡

右吹咀每服五錢水一盞半棗子一枚煮八分日三服

三四日不解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之

雲傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也

經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而

取之 如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太

陽溫病也 如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺寸脈

汗下後

經不

溫病

仲景注

人謂溫

醫學綱目卷三十一

俱長者陽明溫病也 如胸脇痛汗下後過經不愈診得
尺寸脈俱弦者少陽溫病也 如腹滿噤乾診得尺寸脈
俱沉細過經不愈者太陰溫病也 如口燥舌乾而渴診
得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也 如煩滿囊縮診
得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而
取之隨其症而治之如發斑乃溫毒也

夏為暑病

中暍忌
汗下溫
針

太陽中暍者發熱惡寒身重而頭痛其脈弦細扎遲小便
已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥
若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

惡寒身
熱而渴

太陽中熱暍者其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯

者自虎
加入參

活人云夏月自汗惡寒身熱而渴面垢手
足冷脈微無力者中暑也白虎湯主之

身寒重
者一物

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行

瓜蒂

皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯用瓜蒂二七七箇以水一升煮取五合去查

頓服

右瓜蒂湯後賢罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者

亦宜用之

暑病續法

暑病有

酒中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以
此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷
暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以
脈虛 又有濕溫與中暑同但身涼不渴為異耳

丹暑熱病用黃連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪
或用清暑益氣湯

脈洪身
熱惡寒

酒夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者熱病

天熱病

也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月藥性須帶涼不可大溫桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之比夏月服之必有發黃班出之失熱病三日外與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍証用也若三月至夏為晚發傷寒梔子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊為麻黃青龍證

桂枝半兩 石膏一兩 黃芩兩 甘草炙一兩

入醫學綱目卷三十三

十一

梔子錢 白芍藥 升麻 乾葛

生姜三分

右咬咀每服五錢半水一盞半煮至八分去渣食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒三月至夏為晚發

生地半斤 梔子十箇 升麻一兩 柴胡

石膏兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分頓服病不解更作

脈虛身熱惡寒身中者

頭暈而得之為中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納涼於深堂大厦得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也海賦云

暑惡寒脈沉細靜而濕脈傷形者白虎加蒼朮湯主之
大順散見局方甘草一錢半乾姜杏仁桃桂各一錢是也

動而得之為中熱中熱者陽證為熱傷原氣非形體受病

也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必

苦頭疼發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄

無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之
海藏云動而傷

暑身熱脈洪大動而火勝傷

氣者白虎加人參湯主之

汗中暑背寒面垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重

其脈微弱按之無力白虎湯主之
方見發熱

困有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎

湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細乳

遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而

脈虛弱所謂弦細乳遲者皆虛脈也仲景以弦為陰朱龐

亦云中暑脈微弱則虛可知

入醫學綱目卷三三

海脈虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之
方見瘧

活酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥可治伏暑發

渴者

黃連四兩以無灰酒浸蒸乾

右為末糊丸熟水下三十九丸胸膈涼不渴為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮去白二兩 生姜兩一 棗子五枚去核 甘草炙半兩

人參錢一 竹茹半斤

右分五服每服水一盞二分煮取八分去查熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒
方見勞復

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快
方見渴

溼若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懷生姜

湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

莖中痛宜服下方

蒲黃三錢

滑石五錢

生甘草一錢

中謁脈弦細扎遲黃芪湯主之

人參

黃芪

白朮

甘草

茯苓

芍藥各等分

右咬咀每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分去渣温服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴予曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛遂以人參竹葉作湯調辰砂四苓散八貼而安

針灸

雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥不能治當灸大椎穴

脛冷腹痛頭痛

活濕温者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於

入醫學綱目卷三十一

十一

濕而無熱者温

濕因而中暑濕熱相搏則發濕温其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暈如此死者醫殺之耳白虎加蒼木湯主之

本癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈關前濡關後數予曰當作濕温治之蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕温先以白虎加人參湯次白虎加蒼木湯頭痛漸退足漸温汗漸止三日愈此名賊邪悞用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑

而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漿漿未嘗乾每服此藥二三盞即愈海濕溫汗少者白虎加蒼朮汗多者白虎加桂枝白虎加桂枝方見

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏既安詣孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

入醫學綱目卷三三

主

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力衆醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也

保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗四肢沉重謂之濕溫蒼朮石膏湯主之白虎加蒼朮湯是也

蒼朮兩半

石膏三錢

知母二錢半

甘草一錢

右咬咀水一盞煎至一半溫服謂內有濕也多不欲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜桔梗散此非濕溫証乃熱病也

桔梗散

薄荷

黃芩

甘草

梔子各一錢

桔梗三錢

連翹二錢

右劉每服五錢水煮加竹葉如大便澁加大黃半兩

海消膏丹

半夏一斤

茯苓一斤

生甘草半斤

右以醋五升煮半夏盡醋熬乾姜汁作糊無見生水為丸每服五十九丸熟水咽下精意修治用之極效 中暑為患藥下即甦 傷暑發熱頭痛服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及

此 若痰飲停節並用生姜湯下入夏之後不可缺此又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂

菴荳粉四兩

石膏四兩

白礬布

硫黃各一兩

水浸餅為丸彈子大辰砂為衣用姜汁醋點新汲水化開服之

丹暑風挾痰挾火實可用吐法

玉龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神效

硫黃

硝石

滑石

明礬各一兩

入醫學綱目卷五

百

用無根水調丸

秋為瘧

夏傷於暑秋必病瘧治法見瘧門

脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧

一歲長幼疾狀相似為溫瘧

非時之疫氣為溫瘧

春應煖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時

行瘟疫病也論見傷寒

瘟疫續法

活一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也

非時之疫

老君神明散治瘟疫

白朮錢

烏頭四兩炮
去皮炭

桔梗分

細辛兩

附子一兩炮
去黑皮

右五味為粗末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄三七以水一碗煮令大沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見活人書時毒流行用聖散子者一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一大盞即時氣不入

草薺十箇
洗去皮

猪苓去

石菖蒲

茯苓

良姜

獨活去
芦

附子炮製
去

麻黃根
去

厚朴去
皮

藁本

芍藥

枳殼去
穰

柴胡

澤瀉

細辛

醫學綱目卷三

五

防風去
芦

白朮

藿香

半夏

吳茱萸湯
洗

蒼朮

甘草各半
兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取八分去渣熱服餘查

再煎空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

非時之
時者寒

丹衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃

黃芩

黃連

人參

桔梗

防風

人中黃

滑石

香附

蒼朮

右麩糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下氣

虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳

湯送下熱甚者用童便和前經同送下

本草清臘月截淡竹去青皮浸膠取汁治天行熱狂熱疾

中毒并惡瘡毒取汁浸皂角甘蕉治天行熱疾

并解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少酒取無灰酒一處研去渣溫服須臾大瀉毒亦隨出雖十分渴亦不可飲水飲水難救

右三方熱多裏多者宜之

禦瘟疔法

雄黃九治疫不相染

雄黃研一兩

赤小豆炒熟

丹參

鬼箭羽各二兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心以溫水下五丸可與病同床共衣亦不相染矣

活務成子螢火丸主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠱諸毒五丘白刃盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭羽皮

蒺藜各一兩

雄黃

雌黃各二兩

礬石汁

荊羊角

銀鼈灰

醫學綱目卷三十一

去

鐵錘柄入銀處燒焦用一分半

右九味搗為散以雞子黃并雄雞冠一具和之如杏仁大作三角縫囊盛五九帶左臂上仍可掛於戶上

春寒

春應煖而清氣折之則實邪在肝升麻解肌湯主之方見溫病

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射于湯半夏

夏寒

桂枝甘草湯選用之

調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈悶脈數宜下之

大黃去皮三分

黃芩

芍藥

葛根

桔梗

茯苓去皮

藁本擇真者無則川芎代之

白朮

甘草炙已上各半兩

右改咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時再服之得

快利便止小兒減與服虛冷不壯結但下列

射干湯方見 半夏桂枝甘草湯方見

秋蒸

秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加蒼朮湯茵陳

汁調五苓散白虎蒼朮湯見

冬溫

丹冬溫為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏

而反發泄於外專用補藥帶表藥

作入中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於中仍以竹木釘塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用

治瘟毒用此藥一味入補藥帶表同煎服之

活冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜姜蕤湯方見

診

多眠多汗脈浮為風溫

陽脈浮滑陰脈懦弱更遇於風變為風溫論見

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗

六 醫學綱目卷三

七

出身重多眠睡息必射語言難出若被下者小便不禁

直視失溲若被火者微發黃色刺則如驚癇時瘵瘵若火

薰之一逆而引日再逆從命期經云傷寒發汗已則身涼若發汗已身灼熱者非傷

寒乃風溫也

風溫續法

風溫尼發汗

活風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即

謔言獨語內煩躁不得臥若驚癇目亂無精如此死者醫

姜蕤湯加減法

殺之耳 風溫忌發汗宜姜蕤湯身灼熱者知母乾葛湯如渴甚者括萋根湯脈沉身重汗出者漢防己湯

姜蕤湯治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛

喉咽乾舌強胃內痞痞腰背強

葛根兩

姜蕤分

石膏一兩

白芷半兩

麻黃用沸湯羌活去青

川芎錢三

甘草炙半兩

杏仁去皮尖雙仁者半兩

青木香錢一

右咬咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

知母錢三 葛根錢八 石膏錢六 甘草

黃芩

木香

升麻各一錢

荜蕤錢三

南星生二錢

人參

川芎錢各一

麻黃節去

防風

杏仁

羌活各二錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去查服

防已湯治風濕脈浮身重汗出一方無人參

防已錢四

甘草

黃芪略一

生姜兩二

白朮兩三

人參兩一

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去查飲訖仍

坐被中汗出如虫行或被臥取汗出

許學士云風濕謂汗用防已黃芪湯

之故

潮治風濕活人本方荜蕤湯以有麻黃不敢用宜白朮湯

主之方見前太陽病發熱續法若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣

若腰背強硬者加羌活 若舌乾發渴者加人參 若身

灼熱甚者加知母 若身體重多汗者加黃芪 若內傷

冷者不加

一身盡痛為濕

痛而發黃為中濕痛不得轉側為風濕活人又以身痛脈

沉為中濕脈浮為風濕亦通治法見太陽病體痛門

身反張為瘥

有汗為柔瘥無汗為剛瘥治法見柔瘥門

婦人傷寒 熱入血室 妊娠傷寒 產後傷寒

海藏以白朮加荜蕤代姜

濕病有

熱入血室

血熱

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

東垣云妄見妄聞夜夢亡人皆肝木火盛而瀉邪也刺期門與此義同

血結胸者刺期門

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲不可行也無已則有一馬刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或過經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既妊則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳

八醫學綱目卷三十一

九

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於膈中結於乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

甚明瞭夜語話者小柴胡

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

活人云小柴胡和之

○犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也

衍有一婦人溫病已十二日診之其脈六七至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝姜一日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼脈漸勻尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不藥

時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢
攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中
有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘
虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加乾姜五味
子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水道斷者此為
熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之
熱入血室續法

預防熱
入血室

雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室姪娠傷
寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之
婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐
熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝半兩 赤芍三兩 生姜半兩 大棗六枚

入醫學綱目卷三

辛

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入
血室宜麻黃加生地黃湯

麻黃二兩 桂枝一兩 甘草半兩 生地黃兩

杏仁二十五箇 去皮尖

右咬咀每服五錢水煎

寒多者
柴胡乾
姜

活婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜用乾
姜柴胡湯

柴胡兩 枳實兩 桂枝半兩 牡蠣兩

乾姜 甘草炙各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服初服

微煩再服汗出而愈

熱多者
柴胡生

羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來適

斷晝日明了夜則謔語如見鬼神亦治產後惡露方來忽
間斷欲死

柴胡一兩二錢半 人參 黃芩 甘草炙

半夏湯洗七次 生地各七錢

右為粗末生姜三片棗二枚同煎

雲婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁
晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滯者小柴胡加

牡丹皮主之大實滿者桃仁承氣主之

小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二兩 黃芩七錢 人參二兩 半夏六錢

大棗三枚 甘草 生姜各七錢半 牡丹皮二兩

右剉細每服一兩生姜同煎

實滯者桃仁承氣湯方見

醫學綱目卷三十一

三

氣柴胡河硝黃

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水
閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀
脈沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡二兩 黃芩七錢 半夏一兩 甘草五錢

大黃 芒硝各七錢 大棗三枚 生姜七錢

右剉每服一兩生姜同煎去渣下芒硝再沸溫服若脈

不沉數即不可下

喘急者先化痰後降熱

本辛亥中寓居毗陵學官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇
夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎响如引鋸牙關緊急
瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月
經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱
晝雖靜夜則有鬼祟從昨日涎生不省人事予曰此熱入
血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則

陽標病也宜風濕六合湯

四物湯兩 防風

蒼朮各錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發班如綿紋宜升麻六

合湯 四物湯兩 升麻 連翹各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽症也宜柴胡六合湯

四物湯兩 柴胡 黃芩各七錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本

病也急下之宜大黃六合湯

四物湯兩 大黃錢 桃仁去皮尖十箇炙炒

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯兩 人參錢五 五味子錢五

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯兩 厚朴 枳實炙炒各五錢

八 醫學綱目卷三

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯兩 梔子 黃芩錢五

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯兩 石膏 知母各五錢

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯兩 茯苓 澤瀉各五錢

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯兩 琥珀 茯苓各五錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯兩 阿膠 艾各五錢一方加甘草同
上一方加甘草乾姜黃芪

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

四物湯兩 附子炮去 桂各五

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下之 四物湯兩 生地 大黃酒浸各五錢

婦人妊娠或畜血抵當桃仁勿妄施要教子母俱無損大黃四物對服之

安胎方

丹旄孺人傷風未解兩足下脛冷嗽多不吐痰頭眩蓋其性急又當臨月

黃芩半錢 陳皮 白木各一分 蘇梗三分

木通 枳殼炒各五分 麻黃三分 甘草炙二分

桔梗 蒼朮各半錢 水煎服無時

雲婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當歸湯

桂枝 芍藥 當歸各一兩

醫學綱目卷三十一 語

右剉細末服一兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下服沉者太陰病也

宜芍藥湯

芍藥 白木 甘草 茯苓各一兩

右如前修服

活治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參 白茯苓 阿膠炒 桑寄生

白木各等分

右搗羅為細末糯米飲調下二錢日二服

治妊娠傷寒安胎宜白朮散

白朮 黃芩各等分 麝香尾上炒

右為末每服三錢水一鍾生姜三片大棗一枚劈破同煎至七分去渣溫服但覺頭疼發熱便可服二三服即

瘥惟四肢厥冷陰症見者未可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白十莖

生姜二兩

右剉水二盞煎至一盞連服取汁

海葱白一物湯用葱白二把以水一升煮熟取汁令食盡亦主安胎若胎死須臾即出

治婦人傷寒妊娠服藥例 若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡 若大渴者不離知母石

膏五味子麥門冬 若大便泄者不離桂附乾姜白朮

若大便燥結者不離大黃黃芩 若月經適來道斷者不

離小柴胡 若胎不安者不離人參阿膠白朮黃芩 若

發汗者不離葱豉生姜麻黃旋覆 若頭痛者不離石膏

山梔前胡 若傷暑頭痛者不離柴胡甘草石膏 若滿

醫學綱目卷三

五

悶者不離枳實陳皮 若胎氣不安者不離黃芩麥門冬

人參 若斑發黑者不離黃芩梔子升麻

雜方
大治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細未調塗臍下三寸乾即易瘥即止

又方 井中泥塗乾即易之二方出本草有故

又方 浮萍 朴硝 蛤粉 藍根 大黃炒

右為末水調傅臍上安胎解熱極妙

治妊娠霍亂二方附少陰吐利門

治妊娠發斑變為黑色宜梔子大青湯

黃芩 升麻 梔子仁各二兩 大青

杏仁各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎至一盞

去渣溫服

產後傷寒

未

產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖多陽旦證耳可與陽旦湯即桂枝湯方見大陽病產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉把

葛根兩三

防風

桔梗

桂枝

人參

甘草各兩

附子一枚炮

右咬咀每服五錢棗一枚姜五片水一盞半煎一盞去查服溫覆使汗出若頭項強用大附子牛錢煎藥揚去沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒續法

產後傷寒宜補虛

丹產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈不足補氣 惡寒發熱又腹痛當去惡血 惡寒發熱乳汁不通及腹者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯作四

醫學綱目卷三

五

服調下 有子當下用木通通草猪蹄汁調煎服

忌發長忌苦寒

產後纔見身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾姜治之大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

腹痛者去活面

大凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏之類竟不救者多矣

乳不通者宜壓熱下乳

玉露散治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯悉治之涼膈壓熱下乳

人參

茯苓

甘草各半兩

苦梗炒

川芎

白芷各一兩

當歸各一兩

芍藥三

右咬咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大

便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

夫注

緊傷寒表裏攻發 有表證惡風惡寒者當發表海藏云惡風者

白木散惡寒者神木湯 如氣盛能食不大便無表證者可攻裏

春主溫屬木身溫當發汗海藏云神木湯 夏主長屬火身熱而

煩躁合大發散海藏云神木加黃芪湯 長夏主化屬土及居四季

同當調其飲食海藏云四時子湯 秋主收屬金身涼內溫合微

下海藏云通膈九金花丸 冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而

寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外海藏云熱在內者調胃滯氣湯

調中湯九 潔凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升

浮則順發之氣收藏則下之 有汗發熱惡風脈浮緩者

風傷衛桂枝湯 無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮

眩者寒傷榮麻黃湯 有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱

八醫學綱目卷三

七

惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯 無

汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其脈與不脈

量寒熱淺深而治之 有汗四肢厥脈沉微者名陰厥四

逆湯 無汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉

如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦宜京藥三五服

下之 黃芩甘草湯 黃芩白木湯 黃芩蒼朮湯 黃

芩梔子湯 連翹飲子 小柴胡湯 八正散 京膈散

白虎湯 五黃散 此上中下三焦藥宜選用之 中

暑脈虛皆惡寒自汗而渴者白虎湯身涼脈緊熱在內者

急下之口燥咽乾不大便是也 無汗身大熱者可發汗

升麻湯大耋膏天麻膏 有汗身大熱者桂枝湯惺惺散

解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之 發汗者量四

時暄暑燥濕風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之

表証

錢傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表証也
紫古補遺云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮毛滋口中氣熱者當發散秋冬用溫熱藥春夏用涼藥

大青膏

天麻錢一

白附子錢半

蝎尾去毒生半錢

硃砂研一字

烏梢蛇肉酒浸

青黛研

天竺黃研

麝香研一字

烏梢蛇肉酒浸

木半兩

末半兩

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲

雄黃小棗大研

并醋一大盞 薄荷根水

甘草末

川甜硝各三錢

寒水石研細

錢七

腦子一字

硃砂分五

右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

醫學綱目卷三

天

右大青膏發散貪睡口中氣熱呵欠煩悶表証者蓋為三歲已下小兒未能言者設也

活尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之

方見癩

海傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛

瓜蒌桔梗各一分生姜薄荷煎或加防風川芎各一分內

有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌加桔梗多虛汗夜啼

者加麥門冬 傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防

風等分細辛羌活減半同煎

活咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

雲人參羌活散治小兒寒邪及瘟氣時疫瘡疹頭痛體疼

壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活

獨活

柴胡

人參

芎藭

枳殼炒

甘草炙各二兩

前胡

桔梗

天麻酒浸

地骨皮兩

白茯苓去皮

右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去渣溫服不拘時候

七寶散治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉

香附炒各三兩

陳皮

甘草炙

桔梗

白芷

川芎各一兩

右吹咀姜棗煎服

海麻黃黃芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

麻黃

赤芍

黃芩半兩

甘草

桂枝各二錢半

右為粗末水煎服

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻

葛根

黃芩

芍藥各半錢半

醫學綱目卷三

羌

甘草半錢

右吹咀每服二錢水煎溫服

右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋為三

歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而

知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗

惡寒第六方治有汗惡風

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水

不止而善食者可微下餘不可下也此裏症也素古補遺云大熱飲水能食不

大便用大黃丸作散子與服之如瘧便自調慎不可妄下恐外熱逐於內而變結胸危証多矣

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止有

下證者宜服之

裏証

大小便後能食飲水為裏証

川芎半兩

兩黑牽牛半兩半生熟炒

大黃一兩酒蒸

甘草二錢半

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十九丸温蜜水下
乳後服以澹利為度未利加九數

活頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲
三黃丸主之四順飲連翹飲三黃丸並見痘門身體潮熱頭目昏痛心

神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散散謂胃承氣湯主
之洗心散見痘門

大便白而酸臭為食積頭額身體温熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主
之方見食癖門

小便不利利宜利小便瀉如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝
濕藥白朮茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澁大便褐色面赤熱者導赤散
錢傷風兼藏兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣
嗽兼腎則畏明各隨補毋藏虛見故也

醫學綱目卷三十一 三

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發
散肢冷或利或瀉或吐瀉散此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥無汗脈沉滑者不宜此法宜大承氣湯而加臍粉

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發散
大青膏主之未瘥調中丸主之有下証大黃丸下之後服
温驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去
脹塌氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉治見吐瀉門治吐瀉用益黃散白朮散發散用大青膏

湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

薄荷葉兩半羌活 全蝎 麻黃去節

甘草半兩 天竺黃 姜蚕 白附子炮各一分

右為細末每服一錢水小半盞煎至三分加竹瀝少許

妙

兼心則驚搖

雲小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛卽生風欲為驚搐而氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之宜大青膏

兼肺則喘嗽

肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散散風大青膏主之若止傷寒則不

胸滿

兼腎則

腎虛則畏明宜補腎地黄丸有表者間用大青膏發散之

兼分虛

傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生胃中津液多服白朮散 小兒結熱於內口乾而渴身黃

體重者宜白朮散

湯傷寒發渴宜白虎湯

潔大熱飲水能食不大便用大黃九作散服之

右三方白朮散治虛渴為下後而食少胃虛者設也白

醫學綱目卷三

三

虎湯大黃九治實渴為未經下而能食不大便者設也

嗽分虛實

傷風寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也合用阿膠散面白如枯骨者死不治 身熱咳嗽吐痰者當用福

銀九方見咳

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為哽氣長出氣者設也

福銀九治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒

而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是也

陰厥陽厥見大法條

厥分陰陽

潔身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯卽小半夏加茯苓湯方見嘔門

湯傷寒嘔者枳殼半夏湯

枳殼 半夏各半

右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉

厚朴製

半夏製

甘草炙

陳皮

蒼朮米泔浸炒

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚煎至二分去

查溫服

瀉大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸三方俱見齊門潮熱

有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸方見小兒積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有

表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘

二方治表寒而吐也

白汗為虛

湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參

地黃

黃芪兩

白芍三

甘草

人參

醫學綱目卷三

三

熟地兩各半

右咬咀每二錢水半盞煎至三分去查服

白汗為虛

小兒傷寒形症 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內喘

息 兩手脈洪數 頰赤眼溢 身上寒毛起 口鼻出

水 眼赤黃 口乾澀 咳嗽 山根青色 噴嚏

活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱

為斑疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與

傷寒表證同治者候也當作斑疹治之

溫病

溫病溫病者春月之溫病而不蒸也

回春日溫病 未滿三日先用惺惺散二服後四五日不

解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七日

大便燥結用四順飲子下

心腹大實大滿生黃通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺

和解因時法

溫中法

灰包熨法

抵和改
用仲景
法因時
世

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻黃等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於韓祇和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之末也韓祇和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今編祇和之法於篇末以廣後學之見云

韓氏和解因時法

寸脈定
發表隨
氣候立
方

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮為

醫學綱目卷三十一

三十一

在表今畧舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易為開悟耳

寸關力
齊等末
可發表

病人二三月已前兩手脈浮或緩或緊按之差軟寸關

見傷寒
脈未見
傷寒症
宜和

尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如關尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症為先脈為後治傷寒病以脈為先證為後病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若寸脈力小關後尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃表氣已盛先見於脈

也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之調脈湯

葛根一兩

防風

前胡去苗三分

甘草炙半兩

右為粗末每服二錢水一盞生薑一塊如小指大劈破煎至七分去渣溫服如寸脈依前力小加棗三箇同煎

葛根柴胡湯

葛根半兩

柴胡去芦一兩

芍藥

桔梗

甘草炙各三分

右咬咀每服二錢水一盞生薑二片煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯

人參

桔梗各三分

麻黃去節一兩

石膏三兩

甘草炙三分

醫學綱目卷三

五

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

見中風脈未見中風症亦宜和

病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷二兩

葛根半兩

人參二分

甘草炙半兩

防風去芦一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去渣熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯

防風去芦一兩

桔梗三錢

甘草炙半兩

旋覆花半兩

厚朴三分

右咬咀每服三錢水二盞姜一塊同煎熱服如三五服寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香芎湯

川芎一分 石膏二兩 升麻三兩
甘草炙半兩 厚朴製半兩

右咬咀每服二錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸脈力尚小加細辛二分同煎

前二段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見而症猶未見尚可以藥解之故立方耳

寸小於尺宜清陰助陽表藥

病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘為多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已

醫學綱目卷三

三五

後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯

麻黃去節兩 葛根七錢半 人參五錢
甘草炙五錢 蒼朮七錢半

右咬咀每服三錢水一盞棗二枚煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荆芥三分三五服後不惡風猶汗者加丁香皮半兩一方又加荆芥七錢

七物柴胡湯

柴胡兩 蒼朮
麻黃各一兩 甘草炙七錢 荆芥

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊棗二枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯

麻黃去節一兩 蒼朮二兩 人參

當歸各半兩 甘草炙三分 丁香皮三分

右咬咀每服三錢水一盞入姜一塊枣三枚同煎至七分去查熱服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止為度

寸大於尺宜消陰助陰去藥

病人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發胃悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘為身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯 人參兩半 芍藥三分 石膏兩二

柴胡 甘草炙三分

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊蔥七分熱服如三五

醫學綱目卷三 美

後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祇和方補之傷寒便覽有前胡湯方用黃芩知母山梔大青各三錢姜蔥煎服疑卽是此石膏一兩前胡半兩竹茹

石膏湯 石膏兩 芍藥兩 升麻三分

黃芩三分 柴胡兩 甘草炙三分

右咬咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

尺寸俱有力宜平之

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前宜知母湯主之

解肌湯 石膏兩 麻黃去節三分 甘草炙

升麻各半

兩

右吹咀每服三錢水一盞入豉半合煎至八分去查熱
服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩
芍藥湯

甘草

炙半兩

芍藥

石膏

荆芥穗

右吹咀每服三錢水一盞生姜一塊煎至七分去查熱
服如三五服後猶惡風者每服加生姜一塊同煎服

知母湯

知母

石膏

麻黃

升麻

各半兩

右吹咀每服三錢水一盞入生姜一塊同煎至七分去
查溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩
前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈
症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

醫學綱目卷五

五

中風傷寒作一法治

仲景云傷寒為病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此
二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛于骨
髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外
傷風而引內邪出及乎內邪既出而為病一也古人云立
此二端恐後人疑其繁脈與緩脈治別也若中風與傷寒
脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也
病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表症亦可依
脈症投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病症甚
可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如
症依前未解可作熱粥投之粥內加葱白亦可如有汗出
勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也

診

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脈
頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思訓保命新書亦分尺

寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈俱浮而緩緊則爲傷寒無汗緩則爲傷風自汗又有傷寒有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大卽爲傷寒尾小頭大卽爲傷風人病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述爲和解因時法也又恐後人疑其不與金前聖合遂於本方內又立加減法數條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也又寸口脈小欲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若飲冷舉按全無也若果寸口舉按全無卽不可解表只宜溫中不可不知

韓氏溫中法

除症

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條目自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰症云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼脈沉者附子湯又厥

陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈
沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之
良法于今世用之尚有未盡證者愚常校之自至和初歲
迄於今三十餘年不以歲之太過不及爲則每至夏至已
前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿
悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病說理同
而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方纔見脈沉及胸
膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服
之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然
或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後
必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥多對證不
可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小

八醫學綱目卷三

堯一

胸膈塞滿氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治
之 病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及
力小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身
體拘急手足逆冷急宜溫之 若立春已後至清明已前
宜溫中湯主之清明已後芒種已前宜陳皮湯主之芒種
已後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯

丁香各一兩

乾姜炮

白朮

陳皮

丁香各二錢

厚朴一兩

右爲細末每服二錢水一盞葱白三寸荊芥五穗煎至
七分去查熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜

各二錢

陳皮湯

陳皮一兩

藿香三錢

白朮

葛根各二錢

厚朴一兩

右爲末每服二錢水一盞姜一塊同煎至七分去查熱
服如三服未快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂
枝各半兩每服加葱白三寸煎服

七物理中丸

白木

五錢

乾姜

二錢半

人參

七錢半

桔梗

七錢

乾葛

七錢半

藿香葉

五錢

甘草

二錢

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九水一盞煎八
分和查熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏生薑
各半兩

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停等亦是陰氣盛也
更不須候寸脈短治之或胃脇滿悶身體拘急疼痛手足
逆冷速宜溫中藥和之 若立春已後至清明已前宜厚
朴丸主之清明已後至芒種已前宜白朮湯主之芒種已

醫學綱目卷五

平

後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸

半兩

丁香

半兩

厚朴

一兩

細辛

二錢半

人參

七錢半

甘草

半兩

乾姜

半兩

右爲末煉蜜爲丸彈子大每服一九煎至六分查熱
服三服後脈尚細及寸脈尚細無力者每服加葱白三
寸同煎服

白朮湯

白朮

半夏

當歸

厚朴

製

乾姜

炮各半兩

丁香

七錢

右爲末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去查熱
服三五服後脈未有力寸脈尚小者加細辛半兩每服
加葱白三寸同煎服

橘皮湯

橘皮

酢

藿香

各三錢

葛根

各三錢

半夏

厚朴

製各半兩

右爲末每服三錢水一盞生姜如枣大同煎至七分去
查熱服三五服後脈尚小手足逆冷者加細辛半兩
病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是
停飲宜二苓湯

赤茯苓

木猪苓

白朮各半兩

滑石一兩

通草

白芫荑各二錢半

丁香皮七錢半

陳皮半兩

桂枝五錢

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去查熱服小便未
快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏兩浙浙惡寒甚每
服加葱白三寸

灰包熨法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過
上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦

入醫學綱目卷之三

聖

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用
溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二
三升許入好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹
置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛爲
度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰
包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是
陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而
解病人三部脈沉寸脈小於關尺此爲陰盛當溫中藥以
消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸

人參

白朮

厚朴

陳皮

藿香

當歸

細辛

神朮湯亦同治陰躁而渴不可慢用涼藥若執藥冷服內

有伏陽則可若脈已虛按之全無力或病人素無食養事
只可溫服

醫學綱目卷之三十三

醫學綱目卷之三十三

望

杭州圖書館