



外科集驗方卷下目錄

腸癰痔瘻論

大黃湯

四聖散

牡丹散

梅仁湯

神仙蠟礬圓

薏苡仁湯

秦艽白朮圓

秦艽防風湯

地榆散

槐角圓

釣腸圓

皂角煎圓

神效散

蝸牛膏

拔毒散

雞峯烏金散

枳殼散

結陰丹

猪臟圓

乳癰論

內托升麻湯

連翹飲子

百齒霜圓

十六味流氣飲

葛稚川方

兵部手集方

神効栝萸散

究原五物湯

乳癰方

敷乳方

復元通氣散

肺癰論

升麻湯

栝槲湯

葶藶散

補肺散

理肺膏

五香白朮散

排膿散

四順湯

治肺癰方

諸疔瘡論

應効散

博金散

烏金散

截疔散

麝香輕粉散

七寶橫榔散

玉粉散

甘石散

金銀花散

治下疳瘡

如聖膏

青金膏

鴉鵲散

乳香華撥散

牢牙散

麝膽散

三礬散

青金散

附骨疽論

貫衆湯

當歸散

內托黃芪芪胡湯

內托黃芪酒煎湯

犀角湯

漏蘆湯

應痛圓

赤木圓

黑鯽膏

諸瘡論

將軍鐵箍膏

葵花散

百合散

臘脂散

甘草塗敷方

香辦瘡方

乳香膏

黃芪湯

附子散

白蒺藜散

蜜陀僧散

玉粉散

七寶散

赤石脂散

玉女英

連翹飲

桑螵蛸散

紫花地丁散

萬寶代針膏

神効方

拔毒散

治蛇頭瘡

水銀膏

胡粉散

綠礬散

麝香散

漆瘡方

乳香蠟油膏

苦練散

烏梅醋法

豆疔散

陰瘡膏

沐浴長春散

津調散

清涼膏

黃蘗散

蛤粉散

雞黃油

貝母膏

螵蛸散

雞腦膏

白礬散

黃蠟膏

盧會散

玄參散

蓬砂圓

甘露飲

升麻飲

黃連散

黃蘗散

絳雪

治喉内生癰方

疥癬論

升麻和氣飲

當歸飲子

羌活散

烏蛇圓

除濕散

苦參圓

疥藥神效散

一笑散

熏疥方

胡粉散

銀粉散

八寶散

治疥神效方

五倍子散

香疥藥

治濕癬方

一抹散

白附子散

一掃散

祛風白芷散

癭瘤論

海藻圓

守癭圓

木通散

五癭圓

白頭翁圓

南星膏

繫瘤法

昆布散

治小瘤方

散腫潰堅湯

癩瘡論

隔紙膏

治癩瘡久不愈

治癩瘡下注

治癩瘡方

翠玉膏

治癩瘡方

奇妙施子散

粉麝散

秘傳隔紙膏

便毒論

退毒散

雙解散

復元通氣散

敷藥方

桔萸散

三物湯

治外腎癰瘡

連翹湯

四神散

外科集驗方卷下目錄

外科集驗方卷下

腸癰痔瘻論



夫腸癰者乃陰陽偏勝喜怒無時伏於臟腑之中結在腸胃之內血凝氣滯回旋失度不能通行聚結成癰致生腫痛孫真人云卒得腸癰而不曉其病候庸醫治之錯則殺人腸癰之為病初起覺腹中微痛小腹腫而強抑之則痛小便澁似淋時時汗出復惡寒其身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀而按之濡或發熱無汗灑淅惡寒皆其候也其脉洪數者為有膿也可下其脉遲緊者未

有膿不可下也甚者腹肚脹大轉側聞有水聲或透臍

生瘡或膿從臍出或大便下膿血凡此皆為惡證若夫
胃腕癱者何以別之內經云人病胃腕癱者當論胃脉
沉細沉細者氣逆逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不
行故胃腕為癱也治法亦與腸癱頗同初以疎利之藥
導其滯次用排膿消毒托裏之藥調之此其大法也若
夫痔瘻之疾與腸癱不同其狀初起於肛門邊或如鼠
乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒此證皆由酒色
過度久嗜肥甘醉飽入房勞擾血脉腸癖滲漏衝注下
部發於肛邊遂成痔疾其名有五一日牝痔二曰牡痔
三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄

痔皆五痔之別名也日久不愈遂成瘻瘡則難治矣具
方於後審而用之

大黃湯

治腸癱小腹堅硬腫大如掌而熱按之則痛其上色
或赤或白小便稠數汗出增寒其脉遲緊者未成膿
如脉數則膿已成

大黃 剉炒

牡丹皮

硝石 研

芥子

桃仁 湯浸去皮尖雙

右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心溫服
以利下膿血為度未利再服

四聖散一名神效括萋散

治腸癰癰疽生於腦髀背腫乳便毒服之神效

生黃括萋

一枚 去皮 粉草 四兩

沒藥 研末 三錢

乳香

研末 一錢

右用好紅酒二大盃慢火煎至一盃分作兩服兩日服盡大便順道惡物妙若乾括萋則用兩枚一方若病在上食後服病在下食前服毒已結成即膿化為水毒未成即於小便中出疾甚再合服以退為妙

牡丹散

治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

牡丹皮

人參

天麻

白茯苓

黃芪

木香

當歸

川芎

官桂

桃仁 去皮尖 各三分

白芷

薏苡仁

甘草 炙各二分

右為細末每服三錢用水一鍾煎至七分食前溫服

梅仁湯

治腸癰裏急隱痛大便閉澀

梅核仁 四十九箇 去皮尖

大黃 三兩

牡丹皮 一兩三分

冬瓜仁 四兩

芒硝 二兩半

犀角 鎊一兩

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服以利下膿血三兩行為度

神仙蠟礬圓

治腸癰內托神妙此藥不問老幼皆可服之無不作效最止疼痛不動臟腑

黃蠟

半兩要黃色者一方用七錢

白礬

一兩要明者細研

右鎔化黃蠟和礬為圓如梧桐子大每服二十圓漸加至三十圓食遠用溫白湯送下

薏苡仁湯

治腸癰腹中結痛煩毒不安或脹滿不食小便澀婦

人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

薏苡仁

栝萋仁

各三錢

牡丹皮

桃仁

各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

秦朮白朮圓

治痔疾并痛有膿血大便燥硬作疼痛不可忍

秦朮

去蘆

桃仁

去皮尖別研

皂角仁

燒存性各一兩

枳實

麩炒

當歸尾

酒製

澤瀉

白朮

已上各半兩

地榆

三錢

右為細末與桃仁泥碾勻湯煮麥麩糊和圓如梧桐子

大令藥光滑焙乾每服一百圓白湯空心送下服待
少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麪
酒及五辛辣熱大料物之類犯之則藥無驗矣數服
而愈

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛非痔漏也此
藥主之

秦艽

防風

當歸

白朮

各一錢半

黃蘗

橘皮

芫胡

大黃

澤瀉

煨

各一錢

紅花

桃仁

升麻

各五分

甘草 炙六分

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服避風寒忌房事
及酒濕麪辛辣之物

地榆散

治痔瘡腫痛

地榆

黃芪

枳殼

檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活

白歛

蜂房

甘草

炒焦

各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

槐角圓

治諸痔及腸風下血脫肛

槐角

去梗一兩

防風

地榆

枳殼

炙炒

當歸

黃芩

各半兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心

用米飲送下

釣腸圓

治久新諸痔肛邊腫痛或時瘡痒有膿血

栝蒌

二箇燒存性

蝟皮

二箇燒存性

白礬

煨

綠礬

煨

白附子

生用

天南星

雞冠花

剉炒

半夏

各五兩

胡桃仁

十五箇煨存性

枳殼

炒

附子

炮去皮

訶子

去核各二兩

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服三五十圓臨臥用溫酒送下遠年不瘥者服十日効久服除根

皂角煎圓

治內痔漏腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角

三握去核核

白礬

煨

刺蝟皮

炙黃

薏苡仁

白芷

已上各一兩

桃仁

去皮炒

甜葶藶

炒

川芎

桔梗已上各半兩

猪後蹄垂甲十枚燒存性

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓空心用桑白皮煎湯送下

神効散

治洗痔凡富貴之人多因嗜慾酒色過度喜怒不常致生痔痛或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿漏血其痛如割不可忍者但是諸腫瘡痔痛及腸風漏血此藥治之

苦參

川椒

苦葫蘆

芫荽子

槐花

枳殼

荆芥

金銀花

白芷

連翹

獨活

小茴香

麻黃

牡蠣煨

威靈仙

椿樹皮各二兩

右咬咀每用五錢水六七盞蔥白二莖煎五七沸去粗以盆盛藥水上坐先蒸後洗甚驗加黃老茄子二箇尤妙

蝸牛膏

敷痔瘡極効

蝸牛一枚

片腦

麝香各少許

右同研爛用磁盒盛次早取汁傅瘡上

拔毒散

敷痔腫毒處

大黃

黃蘗

白芨

石膏

黃芩

黃連

白斂

梔子

朴硝

各等分

右為末用井華水調塗

雞峯烏金散

治痔痛

黃牛角心

猪牙皂角

刺蝟皮

穿山甲

已上同炒焦黑

皂莢刺

槐子

枳殼

貫衆

阿膠

炒各等分

右為細末每服一錢半用胡桃肉研爛併酒調食前服大腸有熱荆芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調

下

枳殼散

熏洗痔痛

枳殼

貫衆各二兩

荆芥

大栢皮各一兩黃連

蛇床子

地骨皮

無名異

乾薑

炮各半兩

蒼耳根

冬青葉

蕪頭

栢枝 各一把

黑豆 半升

右咬咀每用一大合用水三大盞煎至二盞先熏後洗日三五次

結陰丹

治腸風臙毒大便下血

枳殼 去穰炒

威靈仙

何首烏

椿根白皮

陳皮 去白

荆芥穗

黃芪 各等分

右為細末酒煮糊同蜜少許和圓如梧桐子大每服五十圓加七十圓食前用米飲送下一方不用蜜以醋少許同陳米飲煎湯下

猪臟圓

治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊煎湯調下服之三日後効

黃連

二兩剉碎

嫩猪臟

二尺去肥

右以黃連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊圓如梧桐子大每服三五十圓米飲下

乳癰論

夫乳癰者內攻毒氣外感風邪灌於血脉之間發在乳房之內漸成腫硬血凝氣滯或乳汁宿留久而不散結成癰疽丹溪云乳房所屬陽明胃經乳頭所屬厥陰肝經乳子之母或忿怒傷肝或厚味積熱以致氣不流行竅不得通汁不得出則結為腫為痛陽明之經血熱則化為膿又有兒口之氣吹而熾熱次結成核初起時須便忍痛揉散令軟血脉通和自然消散矣失此不治則成癰膿治法初起則當發散流氣之藥若已成膿又當內托排膿養血順氣慎勿妄用針刀引惹拙病則難治

矣又有婦人積憂結成隱核有如鼈碁子大其硬如石
不痛不痒或一年二年三五年始發為瘡破陷空洞名
曰乳癰以其深凹有似蟲穴也多難為治得此證者雖
曰天命若能清心遠慮薄滋味戒暴怒仍服內托活血
順氣之藥庶幾有可生之理也

內托升麻湯
治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼并乳癰初
起亦治

升麻

葛根

連翹

當歸身

黃藥

黃芪

肉桂

牛蒡子

甘草

五分
右作一服水一鍾酒半鍾煎至一鍾食後服
連翹飲子

治乳癰

連翹

川芎

枯薑仁

皂莢刺

橘葉

青皮

甘草節

桃仁

各二錢
右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

百齒霜圓

治吹乳結核不散腫痛者神效亦治乳癰

百齒霜

即梳齒上頭垢

右為圓如雞頭子大以黃丹為衣每服一圓或二圓好酒送下如不飲酒白湯送下不可化開亦不可令病人知極有效驗

十六味流氣飲

方見前

治結乳寒熱腫痛欲成癰疽急服此藥散之

葛稚川方

治婦人乳癰

人牙齒

燒存性

右為極細末以酥調塗貼癰上

兵部手集方

療疔乳硬欲結膿服此即消

鹿角

右將鹿角於麓石上磨取白汁塗之乾又塗不得近手并以人啣却黃水一日許即散或用鹿角剉為極細末酒調二三錢服亦效

神效括萋散

治婦人乳疽癰勞

黃括萋

子多者一箇去皮焙為細末如急用只爛研

川當歸

洗去蘆焙切細半兩

生甘草半兩

通明沒藥

二錢半 別研

滴乳香

一錢 別研

右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清
汁分為三次食後服如有爛勞便服此藥杜絕病根
如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即內消疾甚者
再合服以退為度乳疽之方甚多獨此一方神效無
比萬不失一

究原五物湯

癰疽發背乳癰通用

栝蒌

研一枚

皂莢刺

半燒 帶生

沒藥

各半 研

乳香

甘草

各二錢

右瓮末醇酒三升煎取二升時匕飲之痛不可忍立

止

乳癰方

乳癰初發

貝母

右為末每服二錢溫酒調下即以兩手覆按於卓上
垂乳良久自通

敷乳方

天南星

半夏生

皂莢刺

燒帶生 各二分

白芷

草烏

直殭蠶

焙各一分

右細末多用蔥白研取汁入蜜調敷若破瘡口用膏藥貼

復元通氣散

治婦人發乳癰疽及一切腫毒

木香

茴香

青皮

穿山甲酥炙

陳皮

白芷

甘草

漏蘆

貝母

去心薑制各等分

右為細末每服三錢好酒調下

肺癰論

夫肺癰者乃肺經感受風邪熱毒所致也此病多因火嗜炙燻肥膩或勞傷氣血以致心火炎熾薰灼肺金致令咳嗽咳而不已遂成肺痿若寸口脉數其人咳中反有濁唾涎沫者亦為肺痿之疾若口中辟辟燥欬又習中隱隱而痛脉反滑數此為肺癰咳唾膿血脉數而虛者為肺痿脉數而實者為肺癰夫肺者五臟之華蓋也處於胃中主於氣候於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胃脇脹滿久久不瘥遂成前證輕則為痿甚則成癰其候

應乳上下隱隱而痛者肺疽也若肉微起者肺癰也初起皆可救若日久唾膿臭敗者不可治也但診其脈微緊而數者未有膿也若緊甚而數者已有膿也若膿如粳米粥及嘔膿不止其脈浮大而面色赤者皆難治若膿自止其脈短而濇面色黃白者皆可治何以言之蓋脈浮大面赤此心火剋肺金也故難治若脈短濇及面白者此肺氣未損也故可治治法當補肺瀉火止咳定喘為佳若不得臥者可用葶藶大棗湯肺湯及桔梗湯苡黃芪之類調之全在保肺法施治庶可全生也升麻湯

治肺癰疽胃乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭

川升麻

苦棗

葶藶以仁

地榆

葶藶去心

赤芍藥

牡丹皮

去心

生甘草

各三分

右為粗末每服一兩水一升半煎至五合去粗溫服

日三服

桔梗湯

治男子婦人欬而胃膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰小便赤黃大便多澁

桔梗

貝母

當歸

枯葶仁

蘇子

杏仁

桑白皮

甘草節

地骨皮

百合

黃芩

甜葶蘆

甜葶蘆

地骨皮

杏仁

杏仁

右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片煎七分不拘

時溫服咳者加百藥煎熟加黃芩大便秘不利加煨大

黃少許小便澀甚加木通車前子煎燥煩加白茅根

煎咳而疼甚加入參白芷煎

葶蘆散

治肺癰咳嗽氣急睡臥不安心胸脹滿

甜葶蘆子

二兩半隔紙炒赤色

百合

炒

白附子

北五味子

甘草節

羅參

款冬花

百藥煎

大硃砂

五錢別研

紫苑

去木一兩

右為末每服二錢燈心湯調下

補肺散

治肺癰已吐出膿血以此潤護

真鍾乳粉

一兩

白滑石

二兩

右為末每服三錢米飲調下

理肺膏

治肺癰正作咳唾不利胃膈迫塞

訶子去核

百藥煎

五味子微炒

條參去蘆

款冬花藥

杏仁

知母

貝母

甜葶藶子

紫苑

百合

甘草節各五錢

右為末用白茅根淨洗秤三斤研取自然汁入磁石器中熬成膏更添入好蜜二兩再熬勻候調和煎藥為圓如梧桐子大溫水吞下

五香白朮散

寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香

木香

明乳香

丁香

藿香葉各半兩

白朮

羅參

白茯苓

薑黃仁

山藥

藕豆

桔梗

縮砂

白豆蔻

粉草

蓮肉各一兩

右為末蘇鹽湯調空心服棗湯亦可有汗加浮麥煎湯下

排膿散

治肺癰吐膿後宜服此排膿補肺

嫩黃芪

川白芷

北五味子炒

人參各等分

右為細末每服二錢食後蜜湯調服

四順湯

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心

紫苑去苗

桔梗炒各一兩

甘草炙判半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎五七沸去粗不拘時稍

冷服如咳嗽甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量減

治肺癰方

右用薏苡米為末糯米飲調下或入粥內煮喫亦可
一方用水煎服當下膿血便愈

諸疔瘡論

夫疔瘡有數種有血疔風疔牙疔下疔之類血疔者乃
臟中虛怯邪熱相侵外乘分肉之間發於肌膚之上初
如紫芥破時血出遍身行處成瘡氣血損傷皮肉虛痒
久不愈或成疔癩風疔者乃足陽明胃經或受風邪熱
毒客於然谷之間注在承山之側初生如疥癬破時黃
水浸淫成瘡風濕相搏毒氣聚攻漸生遍體或生小兒
耳邊黃水瘡亦謂之疔瘡牙疔者皆由幼年好食甘甜
煎煇辛熱之物以致陽明胃經蘊積邪熱上牙齒之間
或在牙根之內發成腫痛或成腐肉敗血來侵潰爛牙

槽臭穢難近以致牙齒脫落日久不愈遂成大患下疳者乃男子玉莖生瘡此病皆由所欲不遂或交接不潔以致邪毒浸漬發成瘡毒日久不愈或成便毒或損爛陽物甚不可輕易多致不救已上諸疳治法不同具方于左

應効散

治氣瘻疳蝕瘡多年不効者

地骨皮 不以多少冬月自取只要皮蔭乾

右并為細末每用紙撚蘸推瘡口內頻用自然生肉更用米飲調二錢無時日進三服又名托裏散

博金散

治下疳蝕臭爛腫痛

白礬 與蜜陀僧同為末相和於沙鍋內火上炮汗盡

蜜陀僧 已上各五錢

白堊 二錢

黃丹

輕粉 已上各一錢

乳香 五分

麝香 一字

右為細末先須另用槐枝蔥白鹽甘草熬湯淋渴洗一二時搥乾摻上項藥每用藥先須洗浴然後摻藥甚者三五次瘥

烏金散

治疔瘻惡瘡

麝香

蟾酥

一已上各字

粉霜

硃砂

輕粉

一已上各錢

銅綠

砒霜

白乾薑

草烏頭

天南星

舶上硫黃

五已上各錢

右為細末紙撚推之或湯浸蒸餅和為錠子推瘡口

內上以膏貼之

截疔散

治年深疔瘻瘡大効

蜜陀僧

白欬

白芨

黃丹

一已上各兩

黃連

半兩

輕粉

一錢

腦子

麝香

五已上各分

右前四味為細末後四味另研極細和勻為散每用或搽或推瘡口中以膏貼之

麝香輕粉散

治血疔瘡陰蝕瘡耳疔瘡一切惡瘡皆治

麝香

輕粉

乳香

沒藥

白礬

飛過各一兩

右為細末量瘡乾貼

七寶橫柳散

治下元玉莖上或陰頭上有瘡漸至蝕透久不愈者

檳榔

雄黃

輕粉

蜜陀僧

黃連

黃蘗

朴硝各等分

右為細末和勻先以蔥白漿水洗淨軟帛挹乾如瘡濕乾摻如乾小油調塗

玉粉散

治下陰瘡痰不止

滑石

蜜陀僧

寒水石煨各半

膩粉

麝香各少許

右為細末油調傳或乾貼患處

甘石散

治下部瘡瘡

鑪甘石

蜜陀僧各半錢

輕粉一分

龍骨五分

麝香少許

椽斗子燒灰存性二錢

右為細末先用荆芥杜仲川椒煎湯放溫浴洗罷然後用藥一捻乾貼

金銀花散

治下疳瘡

金銀花

荊芥

朴硝

蛇床子

甘松

白芷

檳榔 各一兩

右吹咀每用五錢水五盞加蔥白二根同煎數沸盆
盛水先熏後洗却上藥

治下疳瘡

孩兒茶

右研為細末先洗淨乾則小油調溲濕則乾搽之神
効

如聖膏

治風疔癬或痒或痛經年不可一切惡瘡並宜治之

清油半斤

巴豆 三錢 去皮

當歸五錢

輕粉一錢

黃蠟 三兩

右先將油慢火熬次下巴豆當歸熬黑色瀝去不用
入輕粉黃蠟量瘡搽之

青金膏

治走馬牙疔蝕損腐爛者

人言一錢

輕粉半錢

粉霜半錢

青黛一錢

麝香少許

右為細末小油調新筆寫在紙上窰乾每用少許在

疳蝕處白紙封之

鴉鷓散

專治疳瘡

老鴉頭

一筒燒灰

輕粉 五分

黃丹

五分

枯礬 五分

麝香 少許

右為細末先用溫水洗淨後搽藥妙

乳香萹撥散

專治牙痛骨槽風

天麻

防風

細辛

紅豆

各一錢

荊芥穗

乳香

沒藥

官桂

各半錢

當歸

薄荷葉

各二錢

川烏

盆硝

各一錢

麝香

少許

萹撥

一錢

右為細末每用一字或半錢口含水鼻嚙之任左右

牢牙散

治牙斷綻肉牙疳腫疼牙齒動搖欲落牙黃口臭

升麻

四錢

羊脛骨灰

羌活

各一兩

草龍膽

一兩半酒製

右為細末每用少許貼牙斷處驗良久有涎吐去

麝膽散

治走馬牙疳危惡候

麝香少許

膽礬一錢

銅綠半兩

白礬生用一分

右為細末研勻上擦牙蝕處

三礬散

治牙根急疳

青礬

黃礬各半兩

白礬枯一分

麝香一錢

右為細末研勻每用此少傅於瘡上有涎吐之

青金散

治走馬牙疳蝕損唇舌肉腐牙落臭爛其効如神

銅綠

砒各等分製

右研細每用此少傅患處

附骨疽論

夫附骨疽者謂其毒氣深沉附着於骨也此證多由夏秋之時露臥為寒冷之氣折之使風熱之氣不能發散以致伏結附骨成疽其痛而不能轉初按之應骨皮肉微急洪洪如肥狀者是也但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也又有緩疽石疽與附骨疽亦相類矣所異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏於骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃赤紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛

托裏溫熱之劑以取消矣若附骨疽其治亦同宜服漏
蘆湯五香連翹散踈下之次用內消升麻湯漏潰膏藥
貼之令其浮淺則能愈矣

貫衆湯

治附骨癰生股上伏肉間淋瀝方

貫衆

地骨皮

穀精草

枇杷葉

毛灰

荆芥

蜀椒

去目合口者各一兩

右搗篩以水三升煮取二升和滓淋瀝蘸布帛搦之

當歸散

治附骨癰及一切惡瘡

當歸 半兩

甘草 一兩

山梔子 十二枚

木鼈子 一枚

去皮

右為細末每服三錢冷酒調服

內托黃芪此胡湯

治附骨癰

黃芪 二錢

芷胡 一錢

羌活 五分

連翹 一錢

三分

官桂 三分

黃蘗 二分

生地黄 一分

土瓜根 酒製

當歸尾 七分

右咬咀作一服水三盞酒一盞同煎至一盞去粗熱
服宿食消盡服一服而食昔賈德茂男年十歲丁未

四月十一日於左腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左脚乃肝之脾土也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左三部細而弦按之緩而微有力一方無黃蘗內托黃芪酒煎湯

治附骨癰

黃芪

當歸尾錢三

芪胡半錢

升麻七分

連翹

肉桂

黍黏子炒各一錢

黃蘗

甘草炙各五分

右以好糯米酒一盞半水一大盞半同煎至一大

盞去粗溫服空心宿食消盡服之待少時以早飯壓之使不令大熱上攻中上二焦也丁未季春二十二日蒲度主老年七十因寒濕地氣得附骨癰於左腿外側足少陽膽經之分微侵足陽明分濶六七寸長一尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深但行步作痛以指按至骨大痛與藥一服立止再日堅硬腫消

犀角湯

治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角鎊

木香各七錢半

連翹

梔子仁

射干

當歸切焙

升麻

赤芍藥

玄參

枳殼麩炒

甘草生各一兩

大黃炒二兩

右剉碎每服三錢水一盞煎六分去粗不拘時溫服

漏蘆湯

治附骨疽

漏蘆去蘆

升麻

連翹

麻黃去根節各一兩

防已

木香

白欬

沉香各五錢

大黃剉炒一兩半

右剉碎每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至七分

入芒硝一錢攪勻去粗空心溫服取利三兩行未利

再服

應痛圓

治走疰疼痛疑是附骨疽者

蒼木去皮

當歸

黑牽牛

草烏頭炮各一兩

右為細末醋糊為圓如小豆一大每服三十圓空心醋

湯下

赤木圓

治附骨疽膿汁淋漓久而不瘥已破未破皆可用

赤木葱一斤泔浸去油用川椒

船上茴香

破故紙炒

川練子炒

茯苓

土茴香

川白芷

桃仁去皮尖炒

右為末老人加黑附子煉蜜圓梧桐子大每服五十圓溫酒或鹽湯吞下

黑鯽膏

治附骨疽未破已破或膿出不盡者

右用黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令腹滿用線縛定用水一盞銅石器中煮水盡乾焦為末用猪油調敷已破者乾摻少痛勿恠

諸瘡論

夫諸瘡者謂諸般小瘡也其名證不同此皆心腎不交飲食不節腸胃停滯宿滯風毒與血氣相搏凝滯於肌肉之間而發也凡人體虛感受風熱濕毒之氣發為瘡瘍痒痛焮腫身熱多汗是為惡瘡若或生於手足間相對如新菜萐痒痛拆裂搔破則黃水淋漓有孔如癩久而生蟲是為癩瘡或初生如飯粒漸大而有根頭破血流膿出肉反如花開之狀是為翻花瘡或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延及遍身名曰浸淫瘡或生於兩耳鼻面爛及下部諸竅浸入筋絡月中則瘡盛

月末則瘡衰以其隨月而生是為月蝕瘡或毒氣攻於手足指弩肉裏上指甲疼痛出血瘡中有蟲是為甲蛆瘡或指頭先腫焮熱掣痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是為代指有人稟性畏漆見漆則中毒面痒而腫搔之成瘡延及遍身膿焮痒痛是為漆瘡盛暑之時勝理易開風熱毒氣搏於皮膚輕者狀如撒粟重者熱汗浸漬面匝成瘡是為癩瘡或心神煩燥遍身發瘡赤爛如火名曰熱瘡或身觸風寒冷氣以致血澁不行其瘡頑滯不知痛痒經久難療名曰冷瘡或身發瘡腫非癰非疽非癬非疥狀如惡瘡或癢或刺名曰無名瘡或

頭生白團斑剝如癬上有白皮久則成痂遂致滿頭生瘡中有孔有膿細蟲入裏不痛微痒少長不瘥名曰禿瘡若婦人玉門生瘡久不愈因而浸淫名曰陰蝕瘡或冬月因寒手足皸裂成瘡名曰凍瘡若刀斧所傷者名曰金瘡湯火所傷者名曰火瘡也已上諸瘡名目不同其治之方各具于後臨證之際宜詳審焉

將軍鐵籬膏

治諸惡毒瘡紅腫突起用藥籬瘡四圍不令滋蔓走注毒氣

南星

大黃

蒼耳根

鹽霜白梅各一兩

白及

白歛

防風

川烏各半

草烏

雄黃各三錢

右為細末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以雞羽蘸水掃之日換二三次大妙

葵花散 治一切瘡

葵花

鬱金

黃連

黃蘗

梔子仁各等分

右為細末冷水調成膏貼瘡痛處神効

百合散

治頤頰瘡一名獨骨瘡

百合

黃蘗各一兩

白及一分

蓖麻子五十粒研

右為末用朴硝水和作餅貼之日三五次

臙脂散

治翻花瘡

臙脂

貝母

胡粉各一分

蓬砂

沒藥各半

右研細先以溫漿水洗拭後敷藥

甘草塗敷方

治翻花瘡

甘草半生半炒

礬石灰

人中白

蜜陀僧兩各半

右為細末以童子小便半盞以無灰酒熬用竹篦攪成膏取塗瘡上日五次

香辨瘡方

治面上耳邊生浸淫瘡有黃水出久不愈

殺羊鬚

荆芥

乾棗去核各二錢

右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許

清油調搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次效亦治

大人小兒兩吻生瘡

乳香膏

治諸瘡痛久不瘥

乳香另研兩

食鹽

松脂

杏仁去皮尖研各兩半

黃蠟三兩

生地黄取汁三合

白羊腎脂半斤

右先熬脂令沸下杏仁地黄汁蠟煎候蠟溶盡入香鹽松脂煎以柳篦攪令勻稀稠得所磁盒盛敷瘡上

日三二度

黃芪湯

治諸瘡退風熱

黃芪剉

黃芩去黑心

麥門冬焙心

芍藥

甘草炙剉各一兩半

生地黄四兩

半夏薑製半兩

當歸切焙

大黃剉炒

石膏碎

芎藭

人參略一兩

右剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半竹葉七片煎至一盞去粗空心溫服日晚再服

附子散

治冷瘡日夜發歇疼痛

附子半兩炮去皮臍

川椒去目

雄黃細研各二錢半

白礬七錢半枯

膩粉研二錢

右為細末研勻每用清麻油調敷瘡上日二換

白蒺藜散

治熱毒瘡瘙痒心神墮躁

白蒺藜剉炒去刺

白鮮皮

防風去蘆

川大黃剉炒

赤芍藥

梔子仁

子芩

麥門冬去心焙

玄參

桔梗去蘆

前胡去蘆

甘草炙剉各一兩

右為細末每服二錢食後用薄荷湯調服

蜜陀僧散

治熱毒惡瘡臭爛久不生肌

蜜陀僧

雄黃

雌黃

定粉各半

膩粉三錢

右研為細末先用柳枝一握生甘草一兩搥碎以漿二升煎六七沸去相稍熱淋洗瘡淨拭乾敷之

玉粉散

治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉一兩

蛤粉九兩

白石脂

白龍骨

石膏各半

滑石八兩

寒水石

燒通赤於淨地上放冷出火毒一兩

粟米粉

一兩

右為細末研勻每用些少乾擦患處

七寶散

治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪

當歸

防風

荆芥穗

地骨皮

木通

各二兩

白礬一兩

右為麤末每用藥一兩水三大盞煎五六沸瀝去粗稍熱淋潔患處拭乾避風少時東垣老人云此方城北獨柳店之客舍有推江軸者皮膚皴裂不任痛兩

手不能執轅足不能履地而輒止宿因製此藥與敷之即効明日遂行自此累用屢効

赤石脂散

治痲子摩破成瘡用此止痛生肌

赤石脂細研

黃蘗去粗皮

臘茶末各半兩

白麴二兩

龍腦半兩

右為細末研勻每用時綿搵撲之

玉女英

治痲瘡痒痛

滑石半兩 細研

菜豆粉四兩 微炒

右研勻以綿搵撲之一方有棗葉一兩

連翹飲

治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血風赤斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水汁

連翹

當歸

枯蔓根

生乾地黄

荆芥

黃芩

赤芍藥

麥門冬

瞿麥

木通

牛蒡子炒

山梔子

防風

川芎

粉草各等

右以咀每服四錢水一盞半燈心二十莖煎至八分

去粗不拘時服

桑螵蛸散

治諸惡瘡

桑螵蛸

地龍

貝母

黃蘗各半

虢丹煨一兩

乳香一分

粳米粉二錢

麝香半錢

雄黃

輕粉錢一

右為細末以新汲井水和沙糖調敷

紫花地丁散

治諸惡毒瘡腫疼如神

紫花地丁

當歸

大黃

赤芍藥

金銀花

黃芪各半兩

甘草節二錢

右以咀每服一兩用水一盞酒一盞同煎至一大盞去粗隨病上下服

萬寶代鍼膏

治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用鍼刺膿此藥代之但用小鍼點破瘡頭却貼上膏藥膿即自潰此秘妙良方

蓬砂

血竭

輕粉錢各半

金頭蜈蚣 一箇 蟾酥 半錢

雄黃 一錢

片腦 少許 麝香 一字

右為細末用蜜和為膏看瘡有頭處用小鍼挑破以藥些小在紙花上封貼次早其膿自出如腋下有耍核兒名暗疔瘡或有走核可於腫處用鍼挑破如前用之忌雞羊魚酒麪等物喫白粥三日為妙

神効方

治一切惡瘡醫所不識者

水銀

黃蘗

黃連

松脂黃明者

膩粉

甘草

土蜂窠

著壁土者南方多有之或云蟻窠各等分

右將水銀放掌中以唾津殺為泥入磁器中以生麻油和研生絹濾如稀錫和藥末再研如稠錫先溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無名瘡塗一次即瘡有黃水者塗之隨手便乾痒不堪忍者塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳抓破敷藥

拔毒散

治諸惡瘡消腫去毒

天花粉

無名異

黃蘗

黃芩

木鼈子

大黃

牡蠣各等分

右為細末好醋調敷貼立効

治蛇頭瘡

其形生時在手足上瘡傍一塊開如蛇口之狀痛而流血不止者此藥治之

雄黃

蜈蚣

全蠍各一錢

右為細末看瘡濕劈開入藥擦在瘡上却以小油抹裁帛拴住如乾小油調搽

水銀膏

治月蝕瘡多在兩耳上及竅傍隨月虛盈

水銀二錢半

胡粉研

松脂

黃連去鬚為末各半兩

猪脂四兩

右先熬猪脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪令勻磁盒盛先以鹽湯洗淨瘡塗敷日三五度

胡粉散

治月蝕瘡

胡粉炒微黃

白礬煨

虢丹煨

黃連淨

輕粉各二錢

臘脂一錢

麝香少許

右末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油調

敷

綠礬散

治甲疽瘡

綠礬半兩 燒熟

盧會一錢 半

麝香一字

右研如粉以絹袋盛藥納所患指於袋中線扎定瘡為度

麝香散

治妬精瘡

青黛乾

款冬花等分

麝香少許

右末先以地骨皮桑白皮煎湯溫洗軟帛拭乾次以

津唾調藥敷

漆瘡方

生蟹取黃量瘡大小徧敷之

乳香蠟油膏

治蝸瘡久不瘥

杏仁水浸去皮尖研

乳香各三錢

硫黃

輕粉各一錢半

蠟半兩

麻油一合

右研極細先熬油沸入黃蠟鎔盡次入諸藥煎攪成膏冷地出火毒磁器盛每用少許塗瘡上

苦練散

治浸淫瘡

苦練根曬乾燒存性

右為末猪脂調敷濕則乾搽先用苦參大腹皮煎湯洗

烏梅醋法

治代指手指甲頭腫

烏梅仁搗去蕞肉只取仁

右研細米醋調稀入指浸之自愈

豆坯散

治陰蝕瘡

菜豆粉

蝦蟆灰各二錢半

臘脂二錢

右為細末乾搽

陰瘡膏

治男女陰瘡

米粉一杯許酒

芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷各一兩

右咬咀以不入水猪脂一斤微火上煎三上三下候白芷黃膏成濾去粗入米粉和敷瘡上

沐浴長春散

治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則喜住

之則痛成瘡流水為害甚苦此藥見効及治婦人下部陰濕胎元久冷

牡蠣

蛇床子

破故紙

紫稍花

官桂

乾荷葉

各等分

右咬咀每用一兩半水一小鍋入蔥白數莖煎至八分去粗先熏後洗却用後藥

津調散

治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

欵花 各等分

麝香

少許一方不用

右為細末先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津

調敷之忌生湯洗

清涼膏

治湯潑火燒此藥止痛解毒潤肌生肉

梔子仁

黃連 去鬚

白芷

各一分

生地黄 二兩

蔥白 十莖

黃蠟

半兩

清麻油 四兩

右細剉於油鑊中煎地黃焦黑色綿濾去粗澄清却於鑊內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盒內用時以雞羽搵少許塗瘡上以瘡為度

黃蘗散

治湯火傷

黃蘗

大黃

朴硝

雞子殼

寒水石

各等分

右為細末用水調塗極效

蛤粉散

治湯火傷

右以蛤蚧殼不拘多少炙焦黃色搗為細末用生油調如膏敷之如冰仍無痕一方以蜜水調敷之疼立止不用藥不若吳內翰居鄉中隣家釜翻一小兒自頭至踵皆傷熱以敷之啼立止遂無恙唯纔傷隨手用

即効少緩即不及當預先合以備用耳

雞黃油

治湯火傷

右用雞子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒直待都化作油去火毒毛翎掃下入韶粉夜明沙為末香油調敷濕則乾摻之

貝母膏

治頭禿瘡

貝母

半夏生

南星

五倍子

白芷

黃蘗

苦參 各二錢半

號丹 煨一錢半

雄黃 一錢

右為細末先以蜂房白芷苦參大腹皮荆芥煎湯熏洗拭乾即用蜜水調敷兩三次後乾摻藥

蝶蛸散

治頭上生瘡俗曰黏瘡絕妙方

海蝶蛸 二錢

白膠香

輕粉 各半錢

右為細末研勻先用清油潤瘡後摻藥只一上可

雄腦膏

治諸凍瘡久不瘥年年發歇先瘥後痛然後腫破出黃水及出血不止

雄雉腦 一枚

黃蠟 各等分

清油 減半

右同於慢火上熬成膏去粗磁器盛用每塗瘡上

白礬散

治男子婦人血風毒氣攻手足指生甲疽瘡久不瘥者努肉裏指甲疼痛出血不定用此縮肉乾瘡

白礬

石膽 各半兩

麝香

麒麟竭

朱紅 各二錢半

右將白礬石膽於鐵器內以炭火煨過入後三味同研令細每用少許乾摻瘡上以帛子纏定日兩三度換之

黃蠟膏

治冬月手足拆裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎溶入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火上烘乾即用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落若合藥入粉多則硬而成塊旋以火炙動挑敷不妨一方無五倍子

盧會散

治口舌生瘡

盧會

青蒿 研

蟾酥

羊蹄花 各半

白礬 煨研

麝香 研

牛黃 研各半分

乾蝸牛 研三枚

瓜蒂 二十枚

丁香

細辛 去苗

丹砂 研各二錢半

馬牙硝 研三分

熊膽 研一錢

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸揩之軟帛挹却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥盧會看病大小以意加減用之

玄參散

治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

升麻

獨活

麥門冬去心

黃芩

黃蘗

大黃炒

梔子仁

前胡

犀角屑

甘草

炙各三分

右為細末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

蓬砂圓

治口臭口乾口舌瘡

蓬砂二兩

片腦

麝香各一錢

馬牙硝風化四兩

寒水石煨十兩

右為細末用甘草膏和圓如麻子大不拘時含一圓

嚙津

甘露飲

治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉刷去毛

石斛

黃芩

麥門冬去心

生地黄

甘草炙各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎八分去粗不拘時溫服

升麻飲

治口内生瘡齒齩肉爛

升麻

玄參

黃連

羚羊角鎊

黃芩

葛根

大黃

麥門冬去心

羌活

防風

甘菊花各半兩

人參

知母

甘草各一分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去粗食後溫服一方無人參有牛旁子

黃連散

治口瘡絕妙

黃連

朴硝

白礬各半兩

薄荷一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭掛兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎

即愈

黃蘗散

治蠶脣

黃蘗一兩

五倍子二錢

蜜陀僧

甘草各少許

右除黃蘗外餘藥同為細末水調勻敷於黃蘗上火灸三五次將黃蘗切成薄片臨睡貼之天明即愈

絳雪

治咽喉腫痛嚙物妨礙及口舌生瘡

片腦半字

蓬砂二錢

辰砂三錢

馬牙硝

寒水石各二錢

右為細末研勻每用一字搽於舌上津嚥之
治喉内生癰方

五倍子

白殭蠶

甘草各等分

右為細末用白梅肉和圓含化其癰自破

疥癬論

夫疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之深沉者為癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥焮赤痒痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥瘡癩含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癢疹或圓或斜或如莓苔走散內藏汁而外有筐其名亦有六焉

一曰乾癬搔則出白屑索然彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔則痺頑不知痛痒四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而且堅五曰狗癬則時作微痒白點相連六曰刀癬則輪廓全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒之藥敷之內則服和脾清肺除風散濕之劑庶絕其根矣又有面上風癬初起痞癩或漸成細瘡時作痛痒發於春月名吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱之藥敷之則自愈矣

升麻和氣飲

治瘡腫癩疥痒痛

升麻

桔梗

蒼朮

乾葛

甘草

大黃煨各一錢

陳皮二錢

當歸

半夏

茯苓

白芷

乾薑

枳殼各五分

芍藥一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

當歸飲子

治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

防風

白蒺藜

荆芥各一錢半
何首烏

黃芪

甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服或為末亦可

羌活散

治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活

獨活

明礬

白蘚皮

硫黃

狼毒各一兩

輕粉二錢半

白附子

黃丹

蛇床子各半兩

右為細末油調成膏搽之

烏蛇圓

治一切風癬多年不瘥者

烏蛇酒浸去骨

白附子炮

附子小便浸一宿

天麻各二兩

全蠍炒

羌活

乳香

殭蠶炒各二兩半

苦參十兩

槐花半斤

右為細末用生薑汁一斤蜜一斤二味同熬成膏入藥和圓如梧桐子大每服三四十圓空心用溫酒送

下夜晚荆芥湯送下

除濕散

大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荊子

薄荷各一兩

白芷

天麻

川芎

防風並生用

烏蛇酒浸一宿焙乾各半兩

右為細末每服三錢茶酒調下無時日進三服六日

一浴令汗出血氣宣通一月膚澤如故

苦參圓

治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參四兩

玄參

黃連去鬚

大黃剉碎炒香

獨活去蘆

枳殼去穰炒

防風去叉各二兩

黃芩去黑心

梔子

菊花各一兩

右為細末煉蜜為圓搗千餘下圓如梧桐子大每服三十圓食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

疥藥神効散

治乾濕膿窠諸種疥癬等證有効

檳榔

蛇床子各一兩全蠍半兩

倭硫黃 一兩半

右化開硫黃入荊芥末三錢滾數沸候冷加輕粉二錢冷再碾末加三柰半兩妙右為細末先將小油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥氣神效一笑散

治渾身疥癩瘡痒生惡瘡

檳榔

藁本

硫黃

蛇床子

枯礬

五倍子

白膠香 各等分

右為細末濕者乾敷乾者香油調敷如頭上瘡便搽

上不用剃甚者不過三五次平復如故

熏疥方

明信

雄黃 各半錢

椒末 一錢

右研細用紙以方尺熟艾攤平摻勻捲成長錠尾兩口合紙捲子火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油塗眼耳口鼻小兒只空衣蓋被臥亦効宜淨室溫床牢擁衾被無令透烟以熏至其人口鼻為効

胡粉散

治一切癬瘡瘙痒甚者

胡粉 別研

雄黃 別研

硫黃 別研 各錢半

大草烏生三錢

斑猫一錢

砒五分

蠍稍三錢

麝香三分

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散

治一切頑癬

輕粉

黃丹

瀝青

白膠香各等分

右為細末麻油調拭淨或抓破竹篦挑搽二次便乾數次剥去殼也治牛皮癬如神

八寶散

治風癩松皮頑癬久不瘥者神効予一鄉人患此疾數年不愈後忽有舊親傳此方試用有効

藿香

破故紙

檳榔

大腹皮

雄黃

輕粉

硫黃

白礬各一兩

右為細末小油調擦日上三五次痒則擦之治疥神効方

狼毒

細辛

水銀各一錢

輕粉半錢

右為細末油蠟和劑作兩圓綿裹兩手於周身疥
多處擦之

五倍子散

治癬久不瘥

五倍子 一兩火燒令烟盡

黃蘗 剉

當歸 剉炒

膩粉

漏蘆

白礬 煨各一分

右為細末先用鹽漿水洗拭乾敷之

香疥藥

風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉 三錢

大楓子 筒四十九 水銀 三錢

樟腦 三錢

川椒 粒四十九 相油 燭一對

杏仁 少許

右為細末疥用絹包裹瘡上熨黃水瘡搽上此藥功

効如神

治濕癬方

黃連

明礬 煨各半 兩

胡粉

黃丹

水銀 各二錢

右為細末用豬脂油一兩夾研令水銀星盡散磁盒

收用

一抹散

治乾癬不瘥

天南星

草烏頭

各一枚
生用

右為細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

白附子散

治面上熱瘡似癬或生赤黑斑點

白附子

蜜陀僧

茯苓

白芷

定粉

各等分

右為末先用蘿蔔煎湯洗面淨後用羊乳調至夜敷患處次早洗去効

一掃散

治一切瘡疥但相對而生者便是不問乾濕痒痛日近年深用之立効

藜蘆皮

二兩

真輕粉

十貼

好蚌粉

一兩

通明雄黃

五錢

水粉

一兩

右為末用大鯽魚一箇入香油煎候熟去魚攤冷調藥搽瘡未効可加信石末少許研杏仁十粒近陰處勿用

祛風白芷散

治面上風癬瘡

白芷 三錢

茯苓 一錢五分

黃丹 二錢

黃連 二錢

輕粉 一錢

黃蘗 二錢

右為細末用油調搽癬瘡上或加孩兒茶二錢麝香二分亦可

癭瘤論

夫癭瘤者皆因氣血凝滯結而成之癭則憂患所生多着於肩項皮寬不急槌槌而垂是也瘤則隨氣留住初作梅李之狀皮嫩而光漸如杯卵是也癭有五種其肉色不變者謂之肉癭其筋脉現露者謂之筋癭若赤脉交絡者名血癭若隨憂惱而消長者名氣癭若堅硬而不可移者名石癭瘤亦有六種一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘤六曰石瘤癭瘤二者雖無痛痒最不可決破恐膿血崩潰滲漏無已必致殺人其間肉瘤不可攻瘡若夫脂瘤氣癭之類則當用海藻昆

布軟堅之藥治之如東垣散腫潰堅湯亦可多服庶得消散矣

海藻圓

治癭瘤通用

海藻 洗曬

川芎

當歸

官桂

白芷

細辛

藿香

白斂

昆布 洗曬

明礬 煨各一兩

松蘿 淨七錢

海蛤 煨七錢

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓食後含
下

守癭圓

治癭瘤結硬

通草 二兩

杏仁 去皮

牛旁子 各一合

昆布 洗

射干

訶黎勒

海藻 洗各四兩

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓化日三服

木通散

治頸下卒生結囊欲成癭

木通

松蘿

桂心

蛤蚧 酥炙

白歛

琥珀

海藻 洗

昆布 洗各一兩

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

五瘦圓

菖蒲 二兩

海蛤

白歛

續斷

海藻

松蘿

桂心

倒掛草

蜀椒

半夏 各一兩

神麴 三兩

羊靨 百枚

右為細末以牛羊脂髓為圓如芡實大每服一圓食

後及臨臥噙化服

白頭翁圓

治氣瘦氣瘤

白頭翁 半兩

昆布 十分洗

通草

海藻 洗各七分

連翹

玄參 各八分

桂心 三分

白歛 六分

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五圓用酒送

下忌蒜麪生蔥猪魚

南星膏

治皮膚頭面上瘡癰大者如拳小者如粟或軟或硬不痒不痛

右用大南星一枚細研稠黏用醋五七滴為膏如無
生者用乾者為末醋調如膏先將小針刺患處令氣
透却以藥膏攤紙上象癭大小貼之

繫瘤法

兼去鼠爛痔真奇藥也

芫花根淨洗帶濕不得犯鐵器於木石器中搗取汁
用線一條浸半日或一宿以線繫瘤經宿即落如未
落再換線不過兩次自落後以龍骨訶子末敷瘡口
即合繫鼠爛痔依上法累用之効如無根只用花泡
濃水浸線

昆布散

治癭氣結腫胃膈不利宜服

昆布洗

海藻洗

松蘿

半夏湯泡

細辛

海蛤細研

白欬

甘草炙各一兩

龍膽草

土瓜根

檳榔各二兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下

治小瘤方

先用甘草煎膏筆蘸粧瘤傍四圍乾而復粧凡三次
後以

大戟

羌花

甘遂

右等為細末米醋調別筆粧敷其中不得近着甘草處次日縮小又以甘草膏粧小暈三次中間仍用大戟羌花甘遂如前自然焦縮

散腫潰堅湯

方見前

治癭瘤結核通用

賺瘡論

夫賺瘡者皆由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛臭穢步履艱難此瘡生於賺骨為重以其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已瘡口開濶皮爛肉現臭穢可畏治法當先取蟲然後敷藥如隔紙膏麝香輕粉散之類皆可仍宜內服黃芪圓及神仙蠟礬圓之類須翹足端坐勿多行履庶可痊愈矣

隔紙膏

治內外賺瘡

當歸

白芷

黃連

五倍子

雄黃

沒藥

血竭

海螵蛸

白及

白欵

黃藥

厚朴已上各半兩

黃丹六錢

乳香研二錢半

輕粉一錢

右為細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥敷瘡上
絹帛縛定有膿水解開刮去不潔再貼藥如此數次
即愈須先用燒鹽湯洗淨片帛拭乾待片時水氣乾
然後貼藥

治膿瘡久不愈

龍骨二錢半

輕粉少許

檳榔半兩

乳香

沒藥各一錢

乾猪糞半兩燒存性

右為細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清油調
敷瘡濕則摻之

治膿瘡下注

白石脂

龍骨各半兩

白礬一兩枯

五倍子

二兩燒存性

黃丹三錢飛

雄黃少許

右為細末先將葱鹽湯洗瘡見赤肉然後將前藥敷
瘡上用藥如法厚者却用帛子包縛着不要動直候
乾自脫去瘡皮

治癩瘡方

白及

白欵

黃蘗

黃丹

另研各等分

右為極細末入輕粉些少研勻以煉蜜和成劑搗作餅貼瘡上深者填滿以帛片包扎一日一換後來瘡漸乾或有裂處只須乾摻以瘡為度

翠玉膏

治癩瘡

瀝青

一兩

銅綠

研

黃蠟

各二錢

乳香

研

沒藥

研各一錢

治癩瘡方

冬青葉

臘猪膽

百草霜

二味和勻

右將冬青葉與木人嚼爛先以蔥椒湯洗淨瘡口以膽霜敷後却敷嚼藥在上三四次即可

奇妙梳子散

治遠年日久內外癩瘡

山梳子

不拘多少燒作灰研為細末

乳香

另研各半錢

輕粉少許

右研勻以瓷器盛每時先以蔥白花椒煎湯洗淨瘡
稍歇再以溫漿水又洗一次候惡水去盡再將白水
煎百沸候溫再洗但瘡口無膿水血絲清水各盡又
用粉帛片拭乾然後敷藥如乾者香油調敷濕者乾
摻但將瘡口實滿軟縮帛護之堅硬不作膿者未可
用腫如軟有膿者依前法再洗後敷貼之三二次即
愈乃一藥二洗之功也

粉麝散

治外疔瘡臭爛數十年不愈者

生龜一箇

鳥者打死去肉取殼酸醋一盞炙醋盡
為度仍煨令白烟盡存性用盞蓋地上

出火毒

右為末入輕粉麝香拌勻臨用先以蔥水洗乾方用

藥

秘傳隔紙膏

治年月深久疔瘡不愈者

老松香

樟腦

號丹炒

水龍骨

即舊船石灰

輕粉

不愈加

白芷

川芎

螵蛸

總為細末溶化松香加少清油和之以油紙隨瘡大小糊袋盛藥夾之用水洗淨其藥縛在瘡口上二日定四日一換若單用白芷川芎蜈蚣三味煎水洗之立効

便毒論

夫便毒者生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與志也男女大慾不能以直遂其志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起慎不可用寒涼之藥恐氣血愈結不得宣散反成大患惟當發散寒氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

退毒散

治便毒腫結

穿山甲

半兩 藥法醋炙焦

木猪苓

三錢法 醋微炙

右為末每服二錢食前老酒調下次以法醋煮肥皂
研膏敷之妙

雙解散

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

辣桂

川大黃

白芍藥

澤瀉

牽牛 炒取末

桃仁 去皮炒 各一分

甘草 半分

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎食前日二
服先小便快熱從小便出後大便利皆是稠毒
復元通氣散

便毒初發用此

穿山甲

酒浸炙焦二兩

天花粉

酒浸焙

白芷

當歸

甘草

舶上茴香 炒

白牽牛 炒

延胡索

搽去皮

南木香 各一兩

青木香

半兩

右為末每服二錢温酒調食前服不飲酒南木香煎
湯服

敷藥方

治便毒腫痛

雄黃

乳香 各二兩

黃蘗 一兩

右為細末用新汲水調敷腫處自消

枯萋散

治便癰等惡瘡

枯萋

一箇去皮

金銀花

牛旁子

炒各三錢

生薑

甘草 各半兩

右將藥不犯銅鐵器搥碎用酒一大升煎數沸空心

溫服微利為度

三物湯

治便癰

牡蠣

大黃

山梔子 各等分

右為末酒水一大盞煎七分露一宿空心溫服

治外腎癰瘡

抱雞卵殼

鷹爪黃連

輕粉 各等分

右為細末用煎過清油調塗

連翹湯

治便毒腫結

連翹

獨活

川升麻

射干

木通

桑寄生

赤茯苓

甘草 炙各七錢半

大黃 生用

木香

乳香

沉香 各半兩

右剉細每服三錢慢火煎服

四神散

治便毒初發起寒熱欲成癰疽者服此神效

大黃

木鼈子

殭蠶

貝母 各二錢半

右四味各咬咀用酒一鍾水一鍾煎至一鍾食前熱服若得汗下為妙

外科集驗方卷下

