

胤產全書卷二

讀本記

金壇王肯堂泰宇父纂著

海陽張受孔心如父

海陽姚學顏伯愚父



○發育論

予嘗謂男女受天地之全陽施陰化妙合自然猶
春氣鼓盪萬類一伸葭管之灰卽枯蓍磽土勾萌
畢達所以然者得陰陽之和而成充氣之體也造
物獨不全於人乎蓋由男精病於斷喪女血著於

阻遏日損日虧奚嗣之望故發育之理不斲於人
人自斲於發育耳是以男莫先於聚精精聚則神
全神全則本立女莫先於調氣氣調則血附血附
則經平二者既得其理發必中的而生育矣故云
女不孕咎於經不調交不孕咎於精不射然未達
鼓琴之說欲成音響者必先操縵以和其弦一有
不調曲不成聲蓋亦以其不可偏勝也嗣育一端
何以異此今人不歸咎於精血之不充而謂數奇
之不偶皆不知本者也

候時

袁了凡先生云天地生物必有絪縕之氣萬物化
生必有樂育之時絪縕樂育之氣在人與物觸之
而不能自止耳此天然之節候生化之真機也世
人種子有云三十時辰兩日半二十八九君須筭
此特言其大槩耳丹經云一月止有一日一日止
有一時凡婦人一月經行一度必有一日絪縕之
候於一時辰間氣蒸而熱昏而悶有欲交接不可
忍之狀此的候也於此時逆而取之則成丹順而

施之則成胎矣其日三日月出庚又曰温温鉛鼎
光透簾幃皆言其景象也當其慾情濃動之時子
宮內有蓮花蓋者不拘經淨幾日自然挺出陰中
如蓮蕊初開內人洗下體以手探之自知也但含
羞不肯言耳男子預蜜告之令其自言一舉卽中
蓋女人月經方絕金水纔生此時子宮正開乃受
精結胎之候妙合而凝之時過此佳期子宮閉而
不受胎矣

交會旺相日

春甲乙

夏丙丁

秋庚辛

冬壬癸

春秋冬

常忌丙丁

又摘玄云二月乙酉日午北首臥合

陰陽生子必貴

交會禁忌

晦朔弦望

虹霓地震

日月薄蝕

雷電霹靂

天地晦冥

大風大雨大霧大寒暑

日月星辰

之下

神廟寺觀之中

井竈園側之側

塚墓尸柩之傍

此時此地受胎非止百倍損於

父母而所生之子亦必有育聾啞頑愚殘疾天

折不仁不義不孝不弟之類矣可不慎歟可不慎歟

男女論

男女之分亦皆有說月候方住一日三日五日交會者成男雙日者成女又云陰氣先至者成男陽氣先至者成女蓋陰陽配合二氣交感若陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開裹精陰外陽內則成坎卦而成男若陽精先入陰血後參兩傍橫氣來助精開裹血陰內陽外則象離卦而爲女故脉訣

云夫乘妻兮縱氣露妻乘夫兮橫氣助子乘母兮逆氣參母乘子兮順氣護易曰乾道成男坤道成女乾坤陰陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之資始於乾元也血成其胞萬物之資生於坤元也陰陽交姤胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系其下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽爲之主受氣於左子宮而男形成

精不勝血及柔日陰時感者則陰爲之主受氣於
右子宮而女形成是知男女之分已定於萬物資
始乾元之際陰陽交媾之時昧者不悟安有轉女
爲男之法是不明感交之理矣

○受胎類

素問云婦人足少陰脉動甚者姪子也又陰搏陽
別謂之有子妊娠初時寸微小呼吸五至三月而
尺數也脉滑疾重以手按之散者胎已三月也脉
重手按之不散但疾不滑者五月也

候胎

凡婦人妊娠四月欲知男女遣妊人南行呼之左
迴首者是男右迴首者是女蓋男胎在左則左重
故回首時慎護重處而就左也女胎在右則右重
故回首時慎護重處而在右也推之於脉其義亦
然胎在左則血氣護胎而盛於左故脉亦從之而
左疾爲男左大爲男也胎在右則血氣護胎而盛
於右故脉亦從之而右疾爲女右大爲女也此男
女不易之理

神方驗胎散

婦人三兩月月經不行疑是有孕又疑血滯心煩

寒熱恍惚此藥可驗取之內也外有身病無邪脉

以素問脉法推之十得八九矣

真雀腦等兩當歸全用重一兩者只用七錢

右為細末分作兩服濃煎好艾湯一盞調下或好

酒服可待三兩個時辰間覺腹臍微動而頻即有

胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯

惡物自行母亦安也如服藥不効再煎紅花湯調

下必有神効

又方三月後經血不行欲驗是胎

用真則等兩

細末濃煎艾湯空心調服覺腹中微動則有胎若

在臍下動者乃血癥也不動者血病更看尺脉不

止則是胎

探胎散 婦人胎氣有無疑惑之間以此探之有胎

則吐無胎不吐

皂角皮去 甘草各一錢 黃連半錢

右爲細末作一服溫酒調服

○養胎類

婦人妊娠一月名始胚足厥陰脉養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎手心脉養之四月始受水精以成血脉手少陽脉養之五月始受火精以成其氣足太陰脉養之六月始受金精以成其筋足陽明脉養之七月始受木精以成其骨手太陰脉養之八月始受土精以成膚革手陽明脉養之九月始受石精以成毛髮足少陰脉養之十月臟腑關節人神俱備此其大略若細推之受胎在腹七日一變展轉相感各有生相今婦人墮胎在三月五月七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脉陰常易虧故多墮耳如昔曾三月墮胎則心脉受傷須先調不然至三月復墮昔曾五月墮胎則脾脉受傷至五月復墮宜先治脾惟有一月之內墮胎則人皆不知但知不受妊不知其受而墮也一月屬肝怒則墮多洗下體則竅開亦墮一次旣

墮則肝脉受傷他次又墮今之無子者大半是一
月墮胎非盡不受妊也故凡初交之後最宜將息
勿復交接以擾其子宮勿怒勿勞勿舉重勿使洗
浴而多服養肝平氣之藥胎可固矣

逐月養胎法

北齊徐之才云妊娠一月名曰始胚飲食精熟酸
美受御宜食大麥無食腥辛是謂纒正

禁忌針灸

妊娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經如大敦行
關太衝中

封五里中郛
等穴是也足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月

之時血行否澁不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉
重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之

烏雌鷄湯

烏雌鷄 一隻治
如食法 茯苓 阿膠 各二
兩

吳茱萸 升一 麥門冬 五合
去心 人參 芍藥

白朮 各三
兩 甘草 生姜 各一
兩

右咬咀以水乙斗二升煮鷄取汁六升去鷄下藥

煎取三升內酒三升并膠烱化三升放溫每服一

升日三服

補胎湯 若會傷一月胎者當預服此

細辛 一兩 防風 二兩 乾地黄 各三兩 白朮 各三兩

生姜 四兩 吳茱萸 各五合 大麥 各五合 烏梅 一升

右八味咬咀以水七升煮取二升半分三服先食

服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根

二兩若有所下去大麥加栝子仁三合 一方有人參

二月養胎法

妊娠二月名始膏無食辛燥居必靜處男子勿勞

百節皆痛是為胎始結

妊娠二月禁針灸

妊娠二月足少陽脈養不可針灸其經 如胆竅丘墟付陽絕

骨外立陽陵泉等穴是也 足少陽內屬於胆胆主精二月之時

兒精成於胞裡當慎護驚動也

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎

悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒

有所下乍寒乍熱宜服

艾葉湯

艾葉 丹參 當歸 麻黃 人參

阿膠 甘草 生姜 大棗

右九味咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠

煎取三升分三服一方用烏雌鷄一隻宿肥者治

如食法割頭取血內三升酒中相和次以水一斗

二升先煮取汁去鷄內藥煎取三升內血酒并膠

煎取三升分溫三服

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此

黃連 人參 吳茱萸 生姜

生地 五兩一方 用阿膠

右五味咬咀以酢漿七升煮取三升分四服日三

夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅乙升加烏

梅者不用漿直用水耳一方用當歸半兩

三月養胎法

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化

欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數

視璧玉欲賢良端坐清虛是為外象而內感者也

妊娠三月禁針灸

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經

如中衝勞宮大陵內

關間使鄰門曲澤等穴是也

手心主內屬於心毋悲哀思慮驚

三動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤

即黃卒驚恐憂愁嘔怒喜頓仆動於經脉腹滿繞

臍苦痛或腰背卒有所下宜服

雄鷄湯

雄鷄

一隻治如食法

黃芩 白朮

生薑

各一兩

麥門冬

五合

芍藥

大棗

十二枚劈

甘草

人參

茯苓

阿膠

各二兩

右㕮咀以水一斗三升煮鷄減半出鷄內藥煮取

半內清酒三升并膠煮取三升分三服一日令盡

當溫臥一方用當歸川芎各二兩不用黃芩生薑

茯苓湯 會傷三月胎者當預服此

茯苓

丹參

龍骨

各一兩

阿膠

當歸

甘草

人參

各二兩

大棗

二十一枚擘

赤小豆

二十粒

右九味咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩深師有薤白二

兩麻子一升

四月養胎法

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月禁針灸

妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經

陽天井曲垣等穴是也如關衝陽池內關三手少陽內輸三焦四月之時兒五臟

順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲食有

熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強

痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫

胸心煩不得安卒有所下宜服

菊花湯

正菊花鷄子大一枚

麥門冬一枚

大棗十二枚

真人參一兩半

甘草

當歸各二兩

麻黃

阿膠各三兩

半夏四兩

生姜五兩

右十味咬咀水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌鷄一隻煮汁煎藥

調中湯 若會傷四月胎者當預服此

白芍藥 生姜 各四兩 厚朴 生柰根白皮

枳實 白朮 柴胡 各三兩 續斷 川芎 土

甘草 各一兩 當歸 一兩 烏梅 一升

右十二味咬咀水一斗煮取三升分四服日三夜

一八日後復服一劑

五月養胎法

妊娠五月始受火精以成氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定

五臟

妊娠五月禁針灸

妊娠五月足太陰脈養不可針灸其經 如隱白大

丘三陰交滿谷陰 足太陰內輸于脾五月之時兒

四肢皆成無太飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無

大勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛
小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹
痛悶頓欲仆卒有所下宜服

阿膠湯

阿膠

兩四

人參

兩一

生姜

兩六

當歸

芍藥

甘草

黃芩

各二兩

旋覆花

合二

吳茱萸

合七

麥門冬

升一

右十味咬咀水九升煮藥減半內清酒三升并膠

微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈

不差再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中

以水煮雞汁煎藥減半內酒并膠煎取三升半分

四服

安中湯 曾傷五月胎者當預服此

黃芩

兩一

當歸

川芎

乾地黄

人參

各二兩

甘草

芍藥

各二兩

生姜

兩六

麥門冬

升一

五味子

大麻仁

各五合

大棗

三十枚

石十二味咬咀水七升清酒五升煮取三升半分

四服日三夜一七日後復一劑

安胎當歸湯 若妊娠五月舉動驚悸胎不安小腹

痛引腰膝小便下血

當歸 阿膠炒 川芎 人參各一兩

大棗十二枚 艾葉一把

右酒水各三升煮至三升內膠令烊分三服一方

有甘草無參棗

六月養胎法

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜

處出遊於野數視走犬及視走馬食宜鷲鳥猛獸

之肉是謂變膜理紐筋以養其力以堅背腎

妊娠六月禁針灸

妊娠六月足陽明脉養不可針灸其經如厲兌豐隆陰市三

里上下兼足陽明內屬於胃主其口目六月之時

等穴是也 兒口目皆成調五味食甘美無大飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身

體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服

麥門冬湯

麥門冬升一

人參

甘草

黃芩

各二兩

乾地黄三兩

阿膠四兩

生姜六兩

大棗十五枚

右八味以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取

三升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻取

汁煎藥

柴胡湯 若曾傷六月胎者當預服此

柴胡四兩

茯苓一兩

白朮

芍藥

一作柴藎

甘草

麥門冬

苦蘗各二兩

生姜六兩

乾地黄五兩

大棗三十枚

右咬咀水一斗煮取三升分四服日三夜一中間

進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑一

方有黃芩二兩

旋復花湯 療妊娠六七月胎不安常處亦治阻病

旋復花一兩

厚朴製

白朮

枳殼

黃芩

炒

茯苓各三兩

半夏炒一兩

芍藥

生姜

各二兩

右水一斗煮取二升半分五服先食服日三夜二

忌羊肉錫醋桃李雀肉

七月養胎法

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定
止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食
稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月禁針灸

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經

如少商魚際列缺天

澤天府等穴是也

手太陰内屬於肺主皮毛七月之時

皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷

脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱

白湯主之

葱白湯

葱白 長三四寸十四莖

半夏 麥門冬 各一升

旋復花 二合 黃芩 一兩 人參 一兩 甘草

當歸 黃芪 各三兩 阿膠 四兩 生姜 八兩

右十二味咬咀水二升煮減半内清酒三升及膠

煎取四升每服一升日三夜一温臥當汗出若不

出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗

一方以黃雌鷄一隻割咽取血内酒中煮雞取汁

以前煎藥

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服之

杏仁 甘草 各二兩 紫苑 一兩 鍾乳

乾姜 各二兩 麥門冬 吳茱萸 一升 糯米 五合

五味子 三合

右九味咬咀以水八升煮取三升半分四服日三

夜一中間進食七日服一劑一方用白鷄一隻煮

汁煎藥

八月養胎法

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣

極是謂密腠理而光澤顏色

妊娠八月禁針灸

妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經 如商陽二

下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也 手陽明內屬於大腸主九竅八

月之時見九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大

起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱

胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如

米泔或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眩眩
芍藥湯主之

芍藥湯

芍藥

生姜

各四兩

厚朴

二兩

甘草

當歸

白朮

人參

各三兩

薤白

切一升

右八味咬咀水五升清酒四升合煮取三升分三

服日再夜一一方用烏雌鷄煮汁煎藥

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此

葵子

二升

甘草

厚朴

各二兩

白朮

柴胡

各三兩

芍藥

四兩

生姜

六兩

大棗

二十枚

右八味咬咀水九升煮取三升分三服日三九十

日一劑一方用烏雌鷄煮汁煎藥

丹溪縮胎丸

八九箇月用之

黃芩

夏一兩秋七錢冬五錢炒

白朮

二兩

陳皮

三兩去白

茯苓

七錢半

右爲末粥丸桐子大

九月養胎法

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢

備飲醴食其緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月禁針灸

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經

如湧泉然谷太谿交

信築賓伏溜等穴是也

足少陰內屬於腎腎主續縷九月之

時兒脉續縷皆成無處濕冷無着灸衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背

痛不可輕側短氣宜服

半夏湯

半夏

麥門冬

吳茱萸

當歸

阿膠

各三兩

乾姜

一兩

大棗

十二枚

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八

合微火上溫服四服痢即止一方用烏雌鷄煮汁

煎藥

猪腎湯 若曾傷九月胎者當預服此

猪腎

具一

茯苓

桑寄生

乾姜

乾地黄

川芎

各三兩

白朮

四兩

附子

中者一枚

大豆

三合

麥門冬

一升

右咬咀以水一斗煮腎全熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一十日更一劑

丹溪縮胎丸 九箇月用之

黃芩

一兩宜熱藥不宜涼藥法人減半

枳壳

炒七錢半

白朮

一兩

滑石

七錢半臨月十日前小便多時加此一味

右為末粥丸如梧子大每服二十九空心熱湯下

妊娠十月養胎法

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田關節人神皆備但俟時而生

妊娠十月形神俱備日滿即產矣宜服滑胎藥入

月即服

滑胎散 瘦胎易生湖陽公主每產累日不下南山

道士進此方

商州枳殼

二兩

粉草

一兩

右為細末百沸湯點二錢服空心日三服凡懷孕

七八個月已上服之令兒易生初生胎小微黑百

日以後漸漸變白此雖謂胎易產然抑陽降氣為

眾方之冠

懷孕忌服藥

玃蟹水蛭地胆蟲烏頭附子配天雄躑躅野葛虻
蛄類烏喙側子及蟲虫牛黃水銀并巴豆大戟蛇
蛻及蜈蚣牛膝藜蘆并蕒苡金石錫粉及雌雄牙
硝芒硝牡丹桂蜥蜴飛生及虻蟲代赭蚱蟬胡粉
麝莞花薇薔草三稜梔子牽牛并皂角桃仁躑躅
和茅根樅根礪砂與乾漆亭長波流茵草中藿麥
藺茹蟹爪甲蝟皮赤箭赤頭紅馬刀石蚕衣魚等
半夏南星通草同乾姜蒜鷄及鷄子驢肉蚕肉不

須供切須婦人產前忌此歌宜記在心胸

飲食忌

一受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感動胎
氣之戒然於物理亦有厭忌者設或不能禁忌非
特延月難產亦能令兒破形毋損可不戒哉

食鷄肉糯米合食令子生寸白蟲食羊肉令子
多厄食鯉魚鱠及鷄子令子成痔多瘡食犬
肉令子無音聲食兔肉令子唇缺食鱉令子
項短及損胎食鴨子共桑椹同食令子倒生心

寒食螃蠏令子橫生食雀肉合豆醬食之令子面生黥黥黑子食豆醬合藿香食之墮胎食水漿絕產食雀肉令子不耻多淫食山羊肉令子多病木食生姜令子多指生瘡食蝦蟇鱓魚令兒疳瘕食驢騾馬肉延月難產

起居忌

妊後勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸勿向非常地便勿舉重登高涉險心有大驚犯之難產子疾病勿多睡臥時時行步體虛腎氣不足生子解顛腦破不合宜溫補脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦白家及鄰家修造動土犯其胎氣令子破形殞命刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣有此等驗如影響切宜避之

惡阻類

治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生姜煎

服

保生湯

人參 甘草 各二錢半 白朮 香附子 烏藥

橘紅 各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞半姜五片煎至七分

去滓溫服無時或作末子調服立效

姜參半夏丸 妊娠嘔吐不止

乾姜 人參 各半兩 半夏 湯洗去滑二兩

右三味末之以生姜汁糊為丸梧桐子大每服十

丸日三服

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡

聞食氣好食酸醜多臥少起百節煩疼羸瘦有痰

胎孕不安

半夏 洗一兩二錢半 赤茯苓 熟地黄 各七錢半 橘紅

旋復花 人參 芍藥 川芎 桔梗

甘草 各半兩 細辛 三錢

右咬咀每服五錢姜七片水煎空心服兼服茯苓

丸 若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知

母七錢五分若腹冷下痢去地黃加炒桂心半兩
若胃中虛熱大便秘小便赤澁加大黃七錢半去
地黃加黃芩二錢五分

茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半
夏茯苓湯二劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾姜

半夏

湯泡七次炒黃

橘皮

各一兩

白朮

葛根

甘草

枳殼

各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十九丸米
飲下日三服一方加麥門冬 肘後加五味子

集驗方

療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮

各三兩

生姜

茯苓

各四兩

半夏

五兩

右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不瘥
頻服忌羊肉餛鮓等物

旋復半夏湯

治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

臥少起

旋復花

川芎

細辛

人參

甘草

各七分

當歸

半夏

湯泡

赤茯苓

乾生姜

陳皮各錢半

水二鍾姜五片煎至一鍾不拘時服

右諸方竝用半夏蓋取其辛以散結氣瀉逆氣故

嘔惡自止非專為痰設也婁全善曰大全方論半

夏動胎而不用仲景方乃用之予治妊娠阻病累

用未常動胎也經云有故無殞是也

白朮散 治惡阻吐清水甚者害十餘日水漿不入

白朮一兩 人參半兩 丁香二錢半 甘草一錢

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食後

心腹刺痛

人參 丁香 藿香葉各二錢半

右為散每服三錢水一盞煎七分溫服不拘時

醒脾飲 治妊娠阻病嘔逆不食甚者中滿口穿無

味或作寒熱服之神効

草豆蔻以濕紙裹灰中煨令紙乾取出去皮用 厚朴薑製各半兩

乾姜一兩二錢半 甘草一兩二錢半

右為細末每服二大錢水一大鍾棗二枚生姜三

片煎八分去滓呷服病輕者只一兩服便能食三
右諸方與前茯苓丸並用丁香乾姜惟中寒脉遲
者宜之

人參橘皮湯 治阻痛嘔吐痰水

人參 橘皮 白朮 麥門冬 各一兩 甘草 三錢

厚朴 白茯苓 各五錢

右為粗末每四錢加淡竹茹彈子大姜三片水煎

竹茹飲 妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬 各二兩 前胡 二兩 橘皮 一兩

蘆根一握 如體熱四肢煩熱加地骨皮一握

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前服

右方用竹茹門冬蘆根皆氣涼而性和有熱無寒

者通用之平劑也

歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服

諸藥無効者用此藥理血歸原則愈

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥

丁香 各半兩 白茯苓 白朮 陳皮 各一兩 五錢

枳殼 去穢炒 桔梗 炒各二錢五分 半夏 湯洗七次炒黃一兩

右咬咀每服三錢生姜五片棗一枚水同煎

安胎類

丹溪云妊娠因火動胎逆上作喘者可用條芩香附之類夫黃芩乃安胎之聖藥俗人不知以為寒而不敢用胃濫熱藥可以安胎殊不知胎前當清血養血則血循經不妄行故能養胎產後却不可用黃芩產後宜大補氣血為主雖有雜症以未治之黃芩安胎乃上中下三焦降火下行之藥砂仁安胎乃血中之氣藥能治漏行氣阿膠安胎治血

虛胎不安者用之

安胎

安胎有二法因母病以動胎但療母病而胎自安

因胎不堅固致動以病母但療胎則母以瘥若偶

然胎動不安腰痛者須進安胎藥二三服胎安止

安胎飲

治胎寒腹痛胎熱多驚舉重腰痛腹滿胞

急或頓仆悶胸忽有所下或飲食毒物或感時疾

往來寒熱致傷胎臟

當歸

枳殼

炒各一兩半

粉草

炙一兩

糯米

合二

熟地黄二兩 川芎一兩五錢 糯米二合

右剉每服四錢水盞半姜五片棗一枚加金銀少

許同煎七分食前服 虛弱加黃芪 下血加炒

阿膠 下血不止加熟艾 腹痛加白芷白芍藥

減食加入參白朮 各藥安出藥二三煎出安

固胎湯 不孕固經 婦人胎動不安 胎前產後 宜服此

地黃 川芎 黃芩各五分 歸身尾 而人參

白芍藥 陳皮各一錢 白朮一錢 甘草三分

黃柏炒少許 桑上羊食藤圓者廿七葉小 糯米十四粒

右咬咀水煎服 婦人胎動不安 宜服此

白朮散 妊娠養胎主之

白朮 芍藥 蜀椒七錢半 牡蠣兩半

右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦

痛加芍藥心下毒痛倍加芍藥心煩痛吐不能飲

食加細辛一兩半夏大者二十枚服後更以醋漿

水服之復不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥

服之病雖愈服之不置 杜草各三

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重

香附子一兩 藿香葉 甘草各三錢

右為細末每服二錢不拘時沸湯調下

順氣飲 產前服之安胎

紫蘇葉 木香炮 人參 草豆寇

茯苓各一兩 甘草半兩 大腹子一兩如氣弱者不用

右咬咀每服三錢水一盞苧根三寸糯米少許煎

至七分去滓溫服

阿膠散 治妊娠或因頓仆胎動不安腰痛腹滿或

有所下或胎上搶心

熟地黄二兩 白芍藥 艾葉 當歸 甘草

河膠 黃芪各一兩 一方有川芎

右咬咀每服半兩姜三片棗一枚水同煎服

立効散 治婦人胎動不定如重物所墜冷如冰

川芎 當歸各等分

右為粗末秤三錢水煎食前溫服

產寶方 治妊娠無故胎重腹內絞痛煩悶

當歸 桑寄生各一兩 川芎七錢半 豉八合

阿膠錢五 葱十四

右水二升煮八合下膠烱温分二服空心服

養生必用治胎動方 救急療胎動去血腰腹痛

阿膠 川芎 當歸 青竹茹各二錢

右以水十盞內銀一斤煮至五盞去銀入上件藥

三味煮至二盞半去滓入膠再煎膠烱分温三服

空心自早至暮晝未効再作

葱白羹飲 胎動不安

好銀煮水加葱白作羹食佳

止痛安胎飲 胎動克心煩悶欲死安胎止痛

當歸洗 川芎 人參 阿膠炒成珠

黃芩 甘草炙 葱白切

右水七升煮三升分三服

護胎法 治妊娠胎動不安護胎捷効

鯉魚斤 粳米 葱 豉 姜

右作臠食之每月一度

黃芩湯 治婦人胎孕不安

黃芩 白朮各半 當歸錢二

右作一帖水二鍾煎至一鍾不拘時服

小品止痛湯 療妊娠重下痛引腰背安胎

當歸 阿膠 乾地黄 黃連 芍藥 各兩

鷄子 一枚 秫米 升一

右七味以水七升攪鷄子令相得煮秫米令如蟹

目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑

黃芪湯 胎動不安腹痛下黃汁

糯米 合一 黃芪 川芎 各一兩

右細剉水二大盞煎至一盞三分溫服

銀苧酒 治妊娠胎動欲墮胎腹痛不可忍

苧根 二兩 銀 五兩 清酒 一盞

右以水二大盞煎至一大盞去滓分二服

地仙煎 治妊娠胎動煩悶不安甚

生地黄 苧根 取絞汁每服一升盞煎令沸入鷄子

白 一枚 攪令勻頓服

斷艾湯 治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇塞及下重

天痢不息 銀苧酒 煎而不論 誦實如寒如熱

艾葉 兩五 以好酒五升同煮取四升去滓更煎

取一升服口閉者開口嚙之藥下即瘥
吳茱萸湯 胎常墮落而不能結實或寒或熱

吳茱萸兩半 炙甘草兩半 黃芪兩 熟地兩 川芎兩

人參兩 浙木兩

右為末空心酒調二錢忌菘菜醋煎令病人食之

固胎方 胎氣不固常小產不安者

當歸兩 川芎兩 芍藥兩 地黃兩 阿膠兩 香附兩

白朮兩 黃芩兩 砂仁兩 糯米煎服

寄生湯 治胎氣不安及五箇月以後者

桑寄生洗 秦芫兩 阿膠各半 糯米粉兩

右以新汲水三升先下桑寄生秦芫二味煮至二

升去滓次下阿膠糯米再煮約一升止服三服空

心食前日午服之忌酒醋三五日妊娠胎氣至五

月已後不安者服之必効須見妊婦好飲酒食鹹

酸五辛胎必動不可不知

集驗方 妊娠二三月至八九月胎動不安腹痛已

有所見

艾葉 阿膠 當歸 川芎各三兩 甘草兩

右細切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分三服日三

子懸類

紫蘇飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛

之子懸兼治臨產驚恐連日不下

紫蘇葉一兩 大腹皮 人參 川芎 陳皮

白芍藥各半兩 當歸七錢五分 甘草二錢半

右細剉分作三服每服用水一盞半生姜薑片煎

白七寸煎至七分去滓空心服

當歸湯 治妊娠胎動盪心悶絕煩燥口乾橫生倒

產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保

安散

當歸 阿膠炒 甘草各一兩 人參兩半

連根葱白握一

一方無甘草有川芎厚朴產寶有川芎

右細切水二升煮四味至升半去滓下葱再減三

合溫服一劑分為二三服

靈保飲 治妊娠胎上逼心煩悶六七月以後胎動

困篤

用葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已
死即出未効再服

保生秘錄 治胎動上逼心痛

取艾葉如鷄子大以頭醋四升煎取二升分溫
服

又秘錄 胎上通心熱痛下血

神麩半觔搗碎和熱水絞出汁三鍾溫服即止

三神湯 治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮五兩

黃芩二兩

芍藥四兩

右水六升煮取二升半分作三服緣胎有水致痛

兼易產

葛大仲方 療妊娠卒胎上迫心痛

取弩弦急帶之立愈

子煩類

妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六
月受少陽相火氣以養氣若母心驚胆寒多有煩
悶名曰子煩也妊娠子煩是肺臟虛而熱乘於心

則心煩停痰積飲在心胸間亦令煩也若熱煩但熱痰飲而煩則嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安均謂之子煩

竹葉湯 治妊娠心驚胆怯終日煩悶

白茯苓三錢 防風 麥門冬去心 黃芩各二錢

右作一服水二鍾竹葉五片煎至一鍾服

竹茹湯 療妊娠煩燥或胎不安

用淡青竹茹兩

以水一大升煮取四合徐徐服盡為度

麥門冬湯 妊娠心驚胆怯煩悶

麥門冬 白茯苓 防風各三錢 人參一錢五分

右作一服水二鍾生姜五片淡竹葉十片煎至一

鍾去滓服

清平飲 妊苦煩悶

麥門冬 茯苓 防風 知母 竹瀝

右水二鍾煎一鍾下竹瀝食後服

子淋類

妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊

婦胞繫於腎腎間虛熱而成斯証甚者心煩悶亂
名曰子淋也

葵芍湯 尿澁小便不通熱痛

冬葵子 一兩 芍藥 多一兩 條黃芩 五錢

車前子 五錢 赤茯苓 五錢

右改咀每五錢水二盞煎八分食後溫服

地膚大黃湯 療妊娠子淋宜下

川大黃 地膚子 各三兩 知母 黃芩 猪苓

赤芍藥 通草 升麻 枳實 甘草 各二兩未調服

安榮散 治妊娠小便澁少遂成淋瀝

麥門冬 去心 通草 滑石 人參 細辛 各二錢

當歸 酒浸 燈草 甘草 各半兩

右為細末每服二錢不拘時麥門冬煎湯調服

大腹皮散 治妊娠大小便赤澁

大腹皮 枳殼 去皮 甘草 各一錢

赤茯苓 去皮

右為細末每服二錢不拘時濃煎葱白湯下

又方 治胎前諸般淋瀝小便不通

檳榔 赤芍藥 各等分

右剉每服五錢煎溫服甚効

○轉胞類

妊娠小便不通為小腸有熱傳於胞而不通耳又胎滿逼胞多致小便不利煩熱不得臥而反倚息者此名轉胞以胞系了戾故致此病宜腎氣丸主之

八味地黄丸

地黄 山茱萸 山藥 茯苓 澤瀉 丹皮

大附子 桂

煉蜜為丸梧子大每酒下十五丸至廿丸日再服

張遠文曰余室人懷孕五月而轉胞醫投他劑反增

脹劇証諸方書皆用八味丸庄之時醫泥於桂附

卒不敢用七日而斃後一隣婦症同余力以八味

丸服之小便遂行大便亦下再以前丸加車前子

一劑肚腹頓利而安大悔前為醫悞後識此方之

妙故為志之 如丸劑不能速合遂配煎藥服之

歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參 各四兩

右為末煉蜜丸如小豆大服三丸加至十丸

螬蛸散 療小便不通及胞轉

用桑螬蛸一味搗末米飲服方寸匕日三服

獨聖散 治妊娠小便不通

蔓荊子為末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

葵子茯苓散 治妊娠有水氣重身小便不利

寒起即頭眩

葵子 茯苓 各三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

仙杏丸 治妊娠卒不得小便

杏仁一味去皮尖搗丸棗豆大燈心湯吞七丸

熱立利

遺尿類

白薇散 妊娠遺尿及不知出

白薇 白芍藥 各等分

右為末酒服方寸匕日三服空心

又方 治妊娠小便不禁

蔓荊子

杏仁

桑螵蛸 二十枚 炙黃

右為細末每服二錢空心米飲調下此藥前以小
便不通今又治不禁蓋兩用之也

○尿血類

地黄飲 妊娠勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得
熱則流溢滲入脬故令尿血也

生地黄一斤切

右以酒四升煮取一升分溫三服亦療落身後血

阿膠散 治症同前

阿膠 熟地黄 各等分

右為細末空心粥飲調下二錢

薑蜜湯 治妊人小便尿血

生薑 七片 蜜 半盞 白茅根 握一

右入水濃煎服

○臟躁類

婦人心虛驚悸悲傷不止此名臟躁宜服此

淡竹茹湯

麥門冬 去心 小麥 半夏 湯泡各二兩半 人參

白茯苓各一兩半

甘草一兩

右剉每服四錢姜五片棗一枚淡竹茹一團如指

大同煎溫服

又方 治胎臟躁自悲自哭自笑

右以紅棗燒存性米飲調下

耳麥大棗湯 治同前

耳麥三兩

小麥一升

大棗十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

漏胎下血類

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由

衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血也衝任

之脈為經絡之海起於胞內手太陽小腸脈也手

少陰心脈也是二經為表裡上為乳汁下為月水

有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳

汁也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水

時下亦名胞漏血蓋則入斃矣又有因勞役喜怒

哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有

宿疾子歲為風冷所乘氣血失度使胎不安故令

下血又因氣虛血虛血熱胎本不固房室不節先
漏而後隨者須作漏胎治不可不審

膠艾湯 不問月數淺深安胎

熟地黃二兩 艾炒二兩 當歸二兩 甘草炙二兩

川芎二兩 阿膠一兩 黃芪二兩 續斷二兩

每服三錢水盞半煎七分服

大千方 治妊娠三四月腹痛時時下血

續斷二兩 艾葉 當歸 熟地黃各六兩 竹茹

阿膠 雞蘓各兩

水一升煎取六合空心再服

濟生如聖湯 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮 當歸酒浸 熟地黃酒蒸 白芍藥

阿膠蚌粉炒 川芎 續斷酒浸 甘草炙各等分

因一方有乾姜竹茹

右吹咀每服四錢水一盞苧根少許姜五片煎溫

服法一服木二...

葉寄生散 治胎漏經血妄行淋瀝不已

葉寄生 當歸酒浸 川芎 川續斷酒浸

阿膠

蛤粉炒

香附子

炒去毛

茯神

去木

白朮

各一錢

人參

甘草

各半錢

右作一服水二鍾生姜五片煎一鍾不拘時服

鄭氏人參散 治胎漏敗血奏心日漸胎乾子母危

困

人參

黃芪

炙

阿膠

炒各五錢

竹茹

木香

炙甘草

附子

炮各五錢

川芎

陳皮

苧根

各二錢

錢半

生姜

炮黑

右咬咀每四錢糯米三七粒水煎熟服忌生冷鷄

鳴魚麵

奇聖散

治妊娠下血不止

鷄肝三個用酒一升煮熟共食之大効

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便風尿血

用黃芩

炒焦

防風等分為末酒糊丸如梧子大每

服三五十九丸食遠或食前米飲或溫酒下

地黃湯 治經血妄行及鼻衄不止

生地黄

酒搗取汁半兩

薄荷

三錢

甘草

一錢

右二味為末新汲水合地黃汁調食後服

乾桃散 治胎血下不止

取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服瘡本草云桃奴破血

保命枳殼湯 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼 黃芩 白朮 各五錢 兩

右為細末每服七錢水一盞煎七分食前服

大全方 治妊娠忽下黃汁如膠如豆汁胎動腹痛

粳米 黃芪 合五兩 六兩

右以水七升煎取二升分為四服

心痛類

妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心

痛朝發夕死夕發旦死若傷心支絡則乍安乍作

若傷於子藏則胎動而血下

火龍散 治妊娠心氣痛

川練子 茴香 艾葉末 炒各五錢 鹽炒一錢半

右水三鍾煎至一鍾不拘時服

產寶方 妊娠卒心痛氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴 製各一兩

右水六升煎取二升分三服

白朮湯六妊娠卒心痛欲死不可忍者

白朮

三兩

赤芍藥

二兩

黃芩

一兩

右切以水六升煮取三升半分三服半日令盡微

下水令易生忌桃李雀肉等類

千金方賊瘵妊娠心痛

青竹茹

一升

羊脂

二兩

白蜜

三兩

右三味合煎每服棗核大三枚食前服日三服

心腹痛類

夫妊娠心腹痛者或由宿有冷瘕或觸風寒皆由

臟虛而致發動也邪正相擊而并於氣隨氣上下

又上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛

也邪正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞

絡必致動胎甚則傷墮也多是風寒濕冷痰飲與

氣相擊致成斯內令氣急吐逆

當歸芍藥散妊娠腹中絞痛心下急痛

白芍藥

半斤

當歸

茯苓

白朮

各四兩

澤瀉

川芎

各二兩

白朮

白朮

各四兩

右為細末每服二錢食前溫酒調服

葱白飲 療妊娠腹痛并胎動不安

葱白升切 人參各兩 厚朴 阿膠 川芎各二兩

當歸三兩 當歸三兩 茯苓 白朮各兩

右水七升取三升分三服一方有甘草無厚朴川芎

薤白飲 療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白升 當歸四兩 芍藥各兩 桂枝各兩 甘草各兩 阿膠各兩 白朮各兩 茯苓各兩 白朮各兩

右水五升煮取三升作三服

又方 妊娠忽心腹腰痛不安二三月娠者

當歸三錢 阿膠炒上 甘草炙二錢 葱白四錢

右剉分二服每服水二盞煎大半盞服

東鹽湯 妊娠忽腹絞痛三五月娠

大東十四枚 鹽一錢 燒燒存性 燒燒存性

右為末取一撮許酒調服之愈

茅根酒 妊娠胎動欲落腹中痛不可忍

茅根二斤 黑皮法

以水九升煮銀取五升入清酒已升同煎茅根取

小三升分三服立安

千金方 療妊娠腹中痛

五加皮散 妊娠腰痛不可忍或連髀痛先服此藥

杜仲 四兩 炒 五加皮 炒 阿膠 炙 末 防風 川芎

金毛狗脊 白芍藥 細辛 草薢 各三兩

杏仁 八十枚 去皮尖 炒

右水九升煮取二升去滓下膠作三服而服其

五加皮丸 症同前先服前散後服此丸

續斷 炒 杜仲 各貳兩半 羌活 各二兩

五加皮 狗脊 草薢 芍藥

訶子肉 各四兩 末 酒

右為末煉蜜丸如梧子大空心酒下四十九日三

紫酒 治妊娠腰痛如折

大黑豆 二合 炒令香熟以酒一大盞煮取七分

去豆空心頓服

班龍散 妊娠腰背痛不得番覆

鹿角 長六寸 燒令赤 酒中淬 再燒再淬 以角碎為度 取所淬酒飲之

鹿角為末酒服亦可

菖蒲飲 卒腰痛不安或腰痛胎轉搶心下血

用菖蒲汁酒乙升服之

又方用艾葉乙把如鷄子大以酒四升煮二升
分爲三服良不文也

立安飲 療觸動胎以致腰背痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎

草薢 各等分

右水七升煮取乙升半分溫三服

心腹脹滿類

夫妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停飲
妊娠重因觸冷發動與氣相平故令心腹脹滿

倉公下氣湯 妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食

羌活 赤芍 甘草 檳榔 青皮 大腹皮

陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

桂心 各半兩 紫蘇莖 二兩

每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分服

枳殼湯 治婦人妊娠腹脹

枳壳 三兩 黃芩 一兩

爲粗末每服五錢水盞半煎溫服

又方 妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓

六分

葉白皮

五分

前胡

四分

郁李仁

檳榔

各三分

右為細末水一升煮取一半去滓夜卧服

胎水滿類

夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀又或遍身腫滿心腹急脹名曰胎水

天仙藤散

天仙藤

洗畧炒

香附子

炒

陳皮

甘草

烏藥

右等分為細末每末三錢水大盞姜三片木瓜三片柴胡三葉同煎至七分放溫澄清空心食前服日三小便通氣脉順體輕腫漸消不須服
崔氏方 療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓

白朮

各四兩

旋覆花

二兩

杏仁

黃芩

各三兩

右細切水七升煮二升半分溫三服忌桃李雀肉

酢物

葶藶子散 療妊娠遍身洪腫

葶藶子 一兩 白朮 五兩 茯苓 三兩 桑白皮 三兩

郁李仁 各二兩

右為粗末水六升煮二升分三服小便利即瘥

又方

澤瀉 二兩 葶藶子 各二兩 茯苓 三兩 枳殼 三兩 白朮 各六兩

右細切水六升煮取二升半分溫二服小便利即瘥

瘥

防已湯 治妊娠脾虛遍身浮腫心腹脹滿喘促小

便不利

防已 半錢 桑白皮 三兩 赤茯苓 三兩 紫蘇葉 各二錢

木香 半錢

右一服水二鍾生姜五片煎一鍾食前服

千金鯉魚湯 妊娠腹大胎有水氣

白朮 五兩 白芍藥 三兩 當歸 三兩 白茯苓 四兩

右剉細用鯉魚一個不拘大小破洗鱗腹白水煮

熟取汁去魚不用每服四錢入魚汁盞半姜七片

橘皮少許同煎七分空心服以胎水去盡為度

一方加人參澤瀉

又方妊娠遍身浮腫

山梔子炒一合米飲調服

腎着湯治妊娠腰脚腫

茯苓 白朮 乾姜 甘草 杏仁

右每服四錢水一盞半煎至七分食前服

五皮散治胎水尋常脾虛腫滿

大腹皮 桑白皮 生姜皮 茯苓皮 橘皮

右等分每服半兩水二盞半入木香水一呷同煎

至八分去滓空心溫服

全生白朮散 妊娠面目虛浮如水腫狀

白朮 一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮

茯苓皮 各半兩

右為細末每服二錢米飲調下

傷食類

經云飲食自倍脾胃乃傷又云陰之所生本在五

味陰之五宮傷在五味若妊娠飲食不節生冷毒

物恣性食啜致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯

此二方最為穩捷

木香丸 治婦人有孕傷食

木香 二錢 人參 三錢 三稜 各三錢 白茯苓 各三錢

右為細末麵糊丸如菘豆大熱水吞三四十九

白朮散 治妊娠氣不調和飲食易傷

白朮 炒 紫蘇 各一兩 人參 白芷 炒各七錢半

川芎 訶子皮 青皮 各半兩

甘草 二錢五分

右為末每服二錢水一盞姜三片煎七分溫服

積聚類

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

驅積丸 血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附子 醋煮四兩 桃仁 去皮尖一兩 海粉 醋煮二兩

白朮 一兩

右為末麵糊丸服

傷寒類

熱病防損胎非時之氣傷損妊娠熱毒之氣侵損
胞胎遂有胎墜漏血俱害子母之命

柴葛散 妊娠傷寒百節痛壯熱不急治卽胎落

柴胡 乾葛 知母 石膏 各六錢 大青 八錢

梔子 一兩 升麻 八錢 葱白 切半

右水七盞煎至三盞分三四服服之

芪朮散 傷寒安胎

黃芪 白朮 等分新瓦上炒令香

右爲末三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分服

葱姜飲 傷寒憎寒壯熱當發其汗

葱白 三兩 姜 一兩切片

右每服三錢水一盞半煎八分熱服出汗

卷荷散 傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎

嫩卷荷葉 焙乾一兩 蚌粉 半兩雪白極細者

右爲末二錢蜜少許同新汲水調下食前服多合

塗腹上亦妙

浮萍散 時氣熱病護胎法

乾浮萍草 朴硝 大黃 炒 蛤粉 炒 藍根

右爲末二錢貼臍上安胎解燥熱和臟腑

又方

井中泥塗心下乾則易之又取竈中心紅土爲末

水調塗臍下二寸濶五寸乾復塗之

救急散 妊娠傷寒熱不止發斑或赤黑小便如血

命欲絕胎欲落

梔子仁 升麻 大青 生地黄 石膏

葱白 黃芩

右白水煎忌熱物

二胡散 妊娠傷寒

柴胡 前胡 當歸 人參 生地黄 芍藥

芎藭 甘草

右姜三片煎服要汗加葱白

妊娠傷寒傷風母輕服藥發熱頭痛惡風身熱用芎

芷香蘇散

妊娠熱痛六七日極者傷胎兒死身冷不能自出須

用暖胎藥服黑神散溫酒調暖胎自出評此不若

催生湯

催生湯

用蒼木二兩 桔梗二兩 橘紅六錢 白芷 桂心去皮

炙甘草各二兩 當歸酒洗 乾姜炮 厚朴

芍藥半夏洗 川芎炒各四兩 南木香

杏仁一錢炒

右每服三錢水盞半姜束煎半盞服

咳嗽類

夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳

嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心

受之其嗽不已則傳於腑妊娠患此不已則傷胎

欬冬花散 妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽頭

痛

欬冬花 麻黃 貝母煨 前胡 桑白皮

紫苑各半兩 旋覆花 白朮 甘草各二錢半

石膏一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分溫服

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑一兩 桔梗半兩 甘草 杏仁 桑白皮各二錢半

天門冬一兩

右咬咀每服三錢竹茹一團水煎去滓入蜜半匙

再煎一兩沸溫服

百合散 治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合

蒸

紫苑茸

洗

白芍藥

赤茯苓

去皮

桔梗

炒

前胡

各去

貝母

去心

麥甘草

五分

右水二鍾姜五片煎至一鍾不拘時服

馬兜鈴散

妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母

各半

六

噤者拗口嚙之得汗即愈

又方 治妊娠因感外風如中風狀不省人事

熟艾

三兩

陳米醋炒令極熱以絹帛裹熨臍下良久即省

子癇類

妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相

搏發則口噤背強名之曰瘖又云瘖其候胃悶不

識人須臾自醒良久復作謂之風瘖一名子癇亦

名子冒甚則反張

羚羊角散 治妊娠骨間角弓反張各打子癩風瘰

羚羊角 鎊 獨活 酸枣仁 炒 五加皮

薏苡仁 炒 防風 當歸 酒浸 川芎

茯苓 杏仁 去皮尖 各五分 木香 甘草 炙各分

右姜水煎服

羌活酒 治妊娠中風瘰口噤四肢強直角弓反張

羌活 兩半 防風 兩 黑豆 一合炒 去皮

右二味咬咀好酒五斤浸一宿每服用黑豆一合

炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住去滓分兩服

灌之

瘵瘵類

瘵者筋脉急而縮也瘵者筋脉緩而伸也一縮一伸手足相引搖擗不已大抵與嬰孩發搐相似謂之瘵瘵也此證屬風風主搖動心火肝木風熱熾而為瘵瘵也

鈎藤湯

鈎藤鈎 當歸 茯苓 人參 各一兩

棗寄生 兩半 苦梗 一兩半

右為粗末每服五大錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時忌猪肉菘菜若煩熱加石膏二兩半臨產月加桂心一兩

眩暈類

消風散 治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴胞膈涎壅頭旋目暈或腮項腫核

石膏煨

防風

羌活

甘菊花

川芎

羚羊角銹

當歸酒浸

大豆黃卷炒

荆芥穗

白芷各一錢

炙甘草五分

四

賊害萬物入體虛則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫容脉馳縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛寒邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病妊娠中風若不早治則令墮胎也

四肢急強

防風

葛根

桑寄生

各七兩

羚羊角屑

細辛

當歸

甘菊花

漢防已

秦艽

桂心 茯神 甘草 炙各半兩

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜五片煎至一大鍾去滓入竹瀝半合攪勻溫服無時

防已散 治妊娠中風口眼喎斜手足頑痺不語

防已 羌活 防風 麻黃 去節 黃松木節

羚羊角屑 各一兩 桂心 荆芥穗 薏苡仁

桑寄生 甘草 炙各半兩

右吹咀每服五錢水一鍾半生姜五片煎至一大

鍾去滓溫服

五

白殭蚕散 治妊娠中風口噤心腸痰涎壅滯言語

不得四肢強直

白殭蚕 炒 天麻 獨活 各一兩 麻黃 去節兩半

烏犀角屑 七錢半 白附子 炮 半夏 湯洗七次姜製

天南星 炮 藿香 各半兩 龍腦 二錢半研

右為細末入研藥令勻每服一錢生姜薄荷湯調

下日三服

赤箭丸 治妊娠中風手足不隨筋脉緩急言語蹇

澁皮膚不仁

赤箭 草薺酒浸 麻黃去節 獨活 鼠粘子

熱地黃 羚羊角屑 阿膠炒 防風

川芎 當歸炒 薏以仁 五加皮 秦艽

漢防已皮去 栝子仁 酸棗仁炒 丹參去心各錢半

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每服

三十丸豆淋酒送下食前服

白朮酒 治妊娠中風口禁語言不得

白朮一兩半 獨活一兩 黑豆一合炒

劉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服日

陳皮去白 大腹子 桑白皮 紫蘇各一兩

五味子二錢半

右咬咀每服四錢姜三片水煎服

麻黃散 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃去節 陳皮去白 前胡各一兩 半夏湯泡

人參 白朮 枳殼炒 貝母 甘草各半兩

右咬咀每服四錢葱白五寸姜三片棗一枚水煎

服

苦梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急

桔梗 紫蘇 人參 桑白皮 貝母

耳草 各半 天門冬 去心 赤茯苓 各一兩

麻黃 七錢半

每服四錢水二鍾生姜三片煎一鍾服

又方 貝母 去心并皮炒黃 為末砂糖拌勻丸如芡實大每

服一丸嚥化

二冬飲 嗽而痰中見紅

歸身 熟地黃 天門冬 麥門冬 紫苑

桑皮 杏仁 耳草 桔梗 黃芩

五味子 阿膠 炒

中右水煎入小蘇汁同服有痰加竹茹一捻

○中惡類

又夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡邪

惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣養勝而為

精神之主若血氣不和則精神衰弱故邪毒之氣

得以中之妊娠之病亦致損胎也

當歸散 治妊娠中惡心腹疼痛

當歸 丁香 川芎 各三兩 青橘皮 二兩

吳茱萸

半兩去梗湯泡三次炒黑

右為細末温酒調服不拘時服

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之不

可按摩或吐血或衄血者用熟艾如拳大煮汁頻

服

又方 用鹽一盞水二盞調和服以冷冰喫之吐即

即安

中風類

夫四時八方之氣為風也不從其令來者為虛邪

右作一服水二鍾好芽茶半錢煎至一鍾食遠服

犀角散

治妊娠諸風熱困倦時發昏眩

犀角

人參

山梔仁

羌活

黃連

青黛

川芎

吳白芷

茯苓

甘草

各一錢

右作一服水二鍾生姜三片竹葉七葉煎至一鍾

食遠服

驚悸類

大聖散

治妊娠怔悸睡裏多驚腹脇膨脹坐卧不

寧

白茯苓

麥門冬

黃芪

蜜炙

當歸

酒洗

川芎

各一錢半

木香

人參

炙甘草

各一錢

右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾服

竹葉湯

治妊娠心驚胆怯終日煩悶

白茯苓

三錢

防風

麥門冬

去心

黃芩

各二錢

右作一服水二鍾竹葉五片煎至一鍾服

竹茹湯

療妊娠煩躁或胎不安

用淡青竹刮茹一兩以水一大升煮取四合徐徐

服安為度

九

麥門冬湯

治妊娠心驚胆怯煩悶

麥門冬

白茯苓

防風

各三錢

人參

一錢半

右作一服水二鍾生姜五片淡竹葉十片煎至一

鍾去滓服

柴胡散 治妊娠心煩頭目昏重心脅煩悶不思飲

食

柴胡

兩半

赤茯苓

麥門冬

各一兩

枇杷葉

去毛

人參

橘皮

甘草

各半兩

咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分服

自是以下順正

一母散 治妊娠服藥致胎動氣不安有似虛煩不

得卧

知母 二兩 洗焙

右為細末以東肉為丸如彈子大每服一丸煎人

參湯送下

霍亂類

飲食過度觸冒風冷陰陽不和清濁相干謂之霍

亂其間或先吐或腹痛吐利是因於熱也若頭痛

体疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宣通

而風熱上衝為頭痛風入腸胃則洩利嘔吐其

手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致

傷胎也

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 厚朴 姜製

橘紅 各二錢

當歸 炒

乾姜

甘草 炙各一錢

作一服水二鍾姜三片紅東三枚煎至一鍾服

益智仁散 治妊娠霍亂腹痛吐利不止

白朮 炒

益智仁

枳殼 炒

橘紅 各七錢半

草荳蔻煨去皮

良姜炒各半兩

右為散每服三錢水煎入姜半分去滓溫服

木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯泡七次

生姜切各七錢半

木瓜切一兩半

一方有懷香七錢半

甘草一錢

茱萸半兩

加紫蘇煎

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分三服熱服

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後

服熱藥太多致煩躁宜沉井水中候冷頻服

草果仁 烏梅肉各三兩

甘草二兩

右咬咀每半兩水一碗姜十片煎八分沉冷服前

方用乾姜豆寇茱萸俱大溫之劑若發熱煩渴脈

數陽証服之即絕宜用後方

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾姜三兩 半夏半

湯洗七次姜汁半盞漿水一升煮耗一半取柒錢半

甘草七錢半

右咬咀每服五錢水二鍾姜三片竹茹鷄蛋大束

一枚煎至一盞去滓溫服

益元散治症同前

瘧疾類 治症同前

妊娠病瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛

則熱陰盛則寒陰陽相雜寒熱俱作妊娠而作多

傷於胎

驅邪散治妊娠停食感冷發為瘧疾

白朮 草果仁 高良姜炒 礞砂仁 檳榔

白茯苓各一兩 藿香葉一兩 炙甘草五分

右作一服水二鍾姜五片束一枚煎一鍾服

七寶散 治一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或

寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三

發或連日發或間日發不問鬼瘧食瘧似瘧者並

皆治之

常山 厚朴姜製 青皮 陳皮 甘草 檳榔

草果去皮各等分

咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎一

大盞去滓露一宿再用酒水煎滓一次去滓亦露

一宿來日當發之早盪温面東先服頭藥少頃再

服藥滓大有神効。世醫妊娠瘡疾不用常山等藥故岐伯曰有故無殞何疑攻治。

痢疾類

妊娠痢乃肝木尅脾土宜平肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補脾胃若黃而兼黑是水反侮土矣必溫補脾胃若黃而兼赤乃心母益子但補子益氣若腸胃虛弱風邪客之或胎氣不安急補脾胃而白安矣。

黃連湯 治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連

二兩

厚朴

姜製

阿膠

炙

當歸

乾姜

各二兩

艾葉

艾葉

黃柏

各二兩

右爲細末空心米飲調下方寸七日二

當歸芍藥散 治妊娠下痢腹痛

見前心腹痛

立効飲 治婦人胎前產後赤白痢

生薑

年少者百錢老者二百錢取自然汁

鴨子

一枚

右將鴨子打破傾入姜汁內攪勻煎八分入蒲黃

三錢再煎五七沸空心熱服立効

丹鳳散 妊娠下痢赤白絞刺疼痛

鷄子

一枚烏鷄者佳破孔傾出清苗黃用

黃丹

一錢入鷄子壳內同黃攪勻以

厚紙糊穿鹽泥固濟火上煨焙乾為細末

右每服三錢米飲調下一服愈者是男二服愈者

是女

又方治妊娠下痢腹痛小便澀白

當歸黃芪

各一兩

糯米

一合

右細切和水煎分四服

挾熱方 妊娠下痢

黃連

各一兩

山梔仁

二十一枚

右咬咀每服五錢水二盞浸二時久煮十餘沸頓

服若嘔加陳皮

一兩

生姜

三兩

挾寒方 妊娠白膿痢腹中冷

乾姜

四兩

赤石脂

六兩

粳米

一升

右用米七升煎取二升溫分三服

厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕

厚朴

姜炙三兩

黃連

三兩

肉豆蔻

一枚連皮用

右為粗末水煮頓服

水煮木香丸

治久痢裏急後重日夜無度其効如

神

鶯粟殼

去穰
三兩

青皮

去
白

甘草

炒各二
兩四錢

訶子

炮去核
八兩

當歸

木香

各六
兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸水煎化空心服

治臨產痢疾方

用梔子燒灰末之空心熱水調下一匙甚者不過

五服

又方 治胎前產後痢疾

龜板一箇醋炙末之米飲調下

能產二卷終