







HARVARD-YENCHING LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
2 DIVINITY AVENUE

Joan Joan Conway Lib.

OCT 31 1999

赤水玄珠第十五卷目錄

秘結門

大小便不通

閉癃遺溺不禁辨

小便不通門

癃門

遺溺門

小便不禁門

溺赤



脫肛門

附截腸病

前陰諸疾門

三疝門

赤水玄珠第十五卷

秘結門

新安生生子孫一奎著輯



經曰大便者腎之所主腎主五液也腎氣充則大便潤虛則津液耗竭而燥結矣又飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火邪伏於血中煎熬真陰皆能使大便燥結又有年老陰血不足而燥者惟當補而潤之不可用峻利之劑又大便秘結者不得發汗、則重亡津液必秘

八十五卷
結而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘

仲景曰脉浮數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熱之風結者諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所以能潤燥也經曰

腎惡燥急食辛以潤之

潔古曰臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能食小便赤以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛不能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化腹嚮嚮然不能大便者以苦泄之仲景麻仁

丸局方七宣丸皆以大黃為君之類是也治注夏大便瀯滯者血少

血中伏火也黃耆人參湯加生地當歸身桃仁泥潤之如潤之大便仍久不快者少加煨大黃

微利之如加大黃久不快利者非血結血秘是
 熱生風止當服黃耆人參湯內用羌活防風各
 五錢水四盞煎至一盞空心服之其便必大也
 丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不
 熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津
 液津液入胃則腸潤而通矣須知在西北以開
 結為主在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調也
 王海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年
 老虛人大便秘脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉

在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其手
 陽明病與手太陰為表裏也

脉多沉伏而結 陽結脉沉實而數 陰結脉
 伏而遲或結 老人虛人便秘結脉雀啄者不治

七宣丸

柴胡 枳實炒 訶子皮 木香各五兩 桃仁去皮

尖炒 甘草炙 大黃麴包煨 右煉蜜丸桐

子大每服二十九丸米飲下漸加四五十九丸以利

為度

厚朴湯 胃虛而秘者不能飲食小便清利

陳皮 半夏麴炒 枳實炒 甘草炙 厚朴製

白木兩三 每三五七錢 姜三片 枣一枚 水煎服

保命集大黃牽牛散 相火之氣遊走臟腑大便

秘結 大黃兩一 牽牛頭末 為細末 每三錢有

厥冷合用酒調無厥冷而手足煩熱者蜜湯調

下食後以微利為度此謂不時而熱者濕熱也

凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加射

香少許調于藥中則大便必大走也

半硫丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸 治大便秘澁通用

杏仁炒 枳殼 麻仁 陳皮各五錢 阿膠 防風

各二錢半 右煉蜜丸梧子大每五十九丸老人蘇子

煎湯下壯者荊芥湯下

麻仁丸 實秘能飲食小便赤此丸與七宣丸主

之 枳殼 川芎等分 麻仁泥減半

煉蜜丸梧子大食前溫水

又麻仁丸 風秘脾約疝小便數大便秘

大黃 枳殼 赤芍藥各一兩 厚朴五錢 麻仁

杏仁

各一兩二味俱另研

煉蜜丸梧子大每服三五十九

皂角丸

治有風人大便秘澀

牙皂

枳殼

羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

麻仁

防風

白芷

陳皮分等

蜜丸梧子大每服三五十九蜜湯下

皂角枳殼丸

大腸有風秘結老人宜服

皂角

炙去皮子

枳殼

炒各分

蜜丸梧子大每七十九空心食前米飲下

風順氣丸

治大腸秘澀

大黃

五兩半熟半生

山茱萸

麻仁泥

郁子仁

炮皮

兔絲子

山藥

牛膝

檳榔

各二兩

防風

枳

殼

獨活

各一兩

車前子

二兩半

煉蜜丸梧子大每

二三十九米飲下平旦臨卧各一服

二仁丸

治老人虛人風秘不可服大黃者妙

麻仁

杏仁

枳殼

訶子

分等

蜜丸梧子大每三十九溫水下未利增之

四磨湯

氣滯腹急大便秘澀

沉香

木香

檳榔

烏藥

分等

各磨半鍾和

勻溫服有熱者加大黃枳殼名六磨湯

橘杏丸 治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 杏仁等分 煉蜜丸梧子大每七十九空

心米飲下

蘇麻粥 順氣滑大便 蘇子 麻仁 二味不

拘多少研爛水濾取汁煮粥食之

菘容瑣陽粥 老人陰血不足大便燥結

肉菘容 瑣陽 煮粥服

通氣散 虛人憂怒傷肺致令秘澁曾服燥藥而大便秘

陳皮 蘇葉 枳殼 木通等分 水煎服立通

金液丹 治挾冷結滯兼治傷寒陰結以杏仁麻

仁煎湯吞下 方在寒門

神功丸 治氣壅風盛秘結後重疼痛煩悶

大黃 訶子各四兩 人參 麻仁各二兩

右蜜丸梧子大每二十九米飲下食後臨卧

服此藥虛實加減

小柴胡湯 治傷寒陽結能食而大便結

攢柳丸 治大腸實熱不通心腹脹滿

檳榔 大黃 麻仁 枳實 羌活 杏仁

牽牛 白芷 黃芩 各一兩 人參 五錢

蜜丸 梧子大每四十九 空心溫水下

四順清涼飲 治同前 每加灯心十根 枳殼十

片水煎服効

檳榔散 治腸胃有濕大便秘結

檳榔 不拘多少 為末 每服二錢 蜜湯點服

香薷散 治同上 加枳殼 檳榔水煎服

五仁丸 津液枯竭 大腸秘結 傳道艱難

桃仁 杏仁 各一兩 栢子仁 郁李仁 炒 松子仁

各二錢半 陳皮 四兩另 右五仁另研為膏 入陳皮末

研勻 蜜丸 梧子大 空心米飲下 五十丸

調氣滋補溫腸丸 治發汗利小便 亡津液以致

秘結 沉香 一兩另 肉蓯蓉 二兩 為末 用麻子

仁汁打糊為丸 梧子大每七十九 空心米飲下

潤腸丸 治脾胃中伏火 秘結及風結血結

桃仁 麻仁 當歸尾 大黃 羌活 各五錢 升

麻 紅花 郁李仁 右除桃麻仁另研為泥

外餘為末煉蜜丸梧子大每三五十九空心
白湯下

一方加防風錢三皂角仁燒存性兩半無升麻以下味三

歲靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥秘結

黃耆 枳殼 歲靈仙等分

煉丸梧子大每五七十九姜湯熱水任下

陳黃湯 治老人大便秘結

黃耆 陳皮各五錢為末每服三錢用火麻仁一合

研爛以水投取汁一鍾濾去渣于銀石器中

煎候有乳花起即入白蜜一大匙再煎令滾

調藥末空心服

獨束湯 治大便積日不通

大束一枚劈開入輕粉五分依舊合起以麻線

縛扎慢火水煮熟嚼碎以束汁送下

丹溪治虛熱大腸秘

白芍藥一兩半 陳皮 生地黃 當歸身各一條

芩 甘草各二錢 右粥丸每七八十九白湯下

潤麻丸 治血燥大便不通此丹溪秘方

麻仁 當歸 桃仁 生地黄 枳殼 各一兩

蜜丸梧子大每五十九空心白湯下

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上冲吸門不

開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤

之 當歸身 桃仁泥 升麻 各一錢 生地 熟

地 各五分 炙甘草 各三錢 水煎食前調攪柳

末五錢或加麻仁泥一錢若加大黃名當歸

潤燥湯

潤燥湯

升麻 生熟地黄 各二錢 當歸梢 生甘草 大

黃 煨 桃仁泥 麻仁泥 各三錢 紅花 五分

右除二仁另研作一服水煎數沸下二仁煎

空心熟服

活血潤燥丸 治大便風秘血秘時常燥結

當歸稍 錢一 防風 錢三 大黃 紙裹 羌活 各一兩 桃仁

麻仁 各二兩 皂角 燒存性一兩 三錢其性得

右除二仁另研外餘為末蜜丸梧子大空心

服五十九白湯送下三兩服後以蘇子麻仁

粥每日早晚食之大便不致燥結以磁器盛

藥紙封

脾約麻仁丸

和劑方

治腸胃熱燥大便秘結

厚朴去皮姜製

芍藥

枳實炒

杏仁去皮炒

麻仁另研各五錢

大黃蒸焙一兩六錢

蜜丸梧子大每二

十丸臨卧溫水下以通利為止

潤腸丸

治大便秘澁連日不通

麻子仁一盞半細研用水浸濾去皮取汁

芝蔴半盞微炒研用水浸取汁

桃仁泡去皮尖炒

荊芥穗為末各一兩

右前藥入鹽許少

同煎可以代茶飲之以利度

三和散

治七情之氣結于五臟不能流通以致

脾胃不和心腹痞悶大便秘澁

川芎三兩

羌活去芦

紫蘇去梗

沉香

宣木瓜

白朮

木香

檳榔

陳皮

甘草各七錢半

大腹皮

每服五錢水煎服

木香三稜散

治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑半生半炒

大腹子君

檳榔

木香

三稜煨

雷丸

義朮煨

錫灰炒

大黃已上各二兩

右為末每服三錢空心蜜水調下或砂糖水亦可須先燒肉一片口中嚼之久吐出口中肉汁然後服藥

大小便不通

烏柏湯 治大便不通如神亦能通小便

烏柏木皮方一寸七劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓散二錢空心服

推車散 治大小便秘經月欲死者

推車客

七枚

土狗

十枚

如男子病推車客用頭

土狗用身

如女子病土狗用頭推車客用

身 右新瓦上焙乾為末用虎目即虎杖樹

皮向南者濃煎汁調只一服經驗如神

皂莢散 治大小便閉格不通經三五日

不炷皂角燒灰米湯調下三錢即通

甘遂散 治大小便不通

甘遂

二兩

用赤皮者為末煉蜜二合和勻每一

兩重分作四服蜜水下如未効第二服漸之

蜜硝湯 治大小便不通

好蜜一鍾入皮硝二錢用滾水一碗空心調下

導引法 蜜二 葱汁二 猪膽汁二 青黛二

皂角末五 玄胡索三 右同和一處以猪小

腸一節將此藥灌入腸內一頭用竹筒一箇

兩頭俱用線扎定將竹管入肛門徐々擠藥

進去肛門得藥氣即通神效

兌法 凡諸秘結不通或兼他症及老弱虛極

不可用下藥者 蜜熬老入皂角末少許以葱

作骨乘熱捍作兌候冷硬用油塗肛門挿入通

猪膽汁導法 大猪膽一枚瀉汁和醋少許入竹

管灌穀道中少刻即通

霹靂煎 用鹽與蜜乘熱捍如蜜兌法上頭銳用

寸許納入穀道中少刻化開即通

一法 用蜜兌不通者 用鹽吹入肛門亦妙

提盆散 治雜病非陰候者

草烏頭不拘多少為極細末每用葱一枝肥者

削去鬚圓頭上有汁濕蘸之納穀道中

海藏用鹽與蜜兌相合如用草烏頭末相合亦可
蓋鹽能軟堅潤燥草烏能化寒消結可隨症陰
陽所宜用之

宣積丸

巴豆 乾姜 韭子 良姜 硫黃 白攢柳

甘遂各等分為末研飯為丸圓眼大早朝先用椒

湯洗手麻油塗手掌口握藥一粒移時便瀉
欲止以冷水洗之

大小便不通

鹽燒紅填臍內切蒜一片蓋鹽上艾炷灸三五

壯即通

孫尚治趙令女忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸
冷無脈凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸
得大便通脈漸和翌日乃安此閑格之病極為
難治垂死而活者惟此一女耳

孫兆方 治大小便不通

皂角燒存性為末粥飲調下三錢立通

外臺秘要方 治脹滿大小便不通

獨蒜煨熟去皮紙包納入下部氣立通

止吐透格湯

藿香

砂仁

白叩仁

各一錢

陳皮

半夏

各二錢

茯苓

厚朴

蒼朮

各一錢半

水

二鍾煎七分入姜

汁三匙徐頻服如火熱者去藿香叩仁加

黃連

姜汁炒

山梔竹茹鬱結氣滯者加

香附貝母檳榔

通關導滯散

木香

檳榔

枳殼

當歸尾

厚朴

各一錢半

大黃

三錢

如小便不通加瞿麥木通活后各一

錢半或用八正散水煎食前服

閉癃遺溺不禁辨

生生子曰閉者小便不出塞而不通也癃者罷弱

而氣不充淋瀝點滴而出或澀而疼一日

數十次或百次俗名淋病者是也閉則多是急

病癃則是緩病遺溺睡夢中溺出醒而方知是

也不禁者日夜無遍數頻而溺也今各分枝

門詳載治法以見新久虛實寒熱氣血各有所

攸重也惟肝與督脉三焦膀胱主之

經云肝主小便淋洩肝足厥陰之脉遶陰器所生
病者遺溺閉癰又云督脉者女子入繫廷孔其
孔溺孔之端也其男子循莖下至篡與女子等
其生病癰痔遺溺故遺溺閉癰皆取厥陰腧穴
及督脉腧穴也又三焦主之者經云三焦下脉
在于足太陽之前少陽之後出于膈中外廉名
曰委陽足太陽絡也三焦者足太陽少陽之所
將太陽之別也上踝五寸別入貫膈腸出於委
陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癰虛

則遺溺遺溺則補之閉癰則瀉之是也又膀胱
主之者經云膀胱不利為癰不約為遺溺然遺
溺閉癰不取膀胱腧穴者蓋膀胱但止藏溺其
出溺皆三焦及肝督脉也又經云三焦者決瀆
之府水液出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣
化則能出矣由是言之膀胱藏水三焦出水治
小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱也

小便不通門

東垣謂小便不通有在氣在血之異夫小便者足

太陽膀胱所主。長生於申。申者西方金也。金能生水。金者肺也。肺中伏熱。水不能生。是絕小便之源也。人法象天地。膀胱之源自頭項下至于足。故曰陽中之陰。如渴而小便不通者。肺不能降是也。治法者用清燥金之正。化氣味薄之藥。茯苓。猪苓。澤瀉。琥珀。燈心。通草。車前子。瞿麥。扁蓄之類。皆為淡滲之藥。能瀉肺火而清肺金。滋水之化源也。若不渴。熱在下焦。是絕其流而溺不泄也。須用氣味俱厚。陰中之陰藥治之。二者之病。一居上焦。在氣分。而必渴。一居下焦。在血分。而不渴。血中有濕。故不渴也。二者之殊。至易分別耳。

綱目云。氣鬱于下。微者香以散之。甚者吐以提之。血鬱于下。微者輕劑行之。甚者峻劑破之。

丹溪云。小便不通。有氣虛。血虛。有實熱。有痰氣閉塞。皆宜吐之。以提其氣。氣升則水自降。蓋氣乘載其水也。先哲譬言之。如滴水之器。必使上竅通而後下竅之水出焉。氣虛。參朮升麻。先服。後吐。

血虛四物湯先服後吐痰氣閉塞者二陳加木
通香附探吐實熱當分利之或八正散大便動
則小便自通老人氣短者四物加參芪吞滋腎
丸下焦血氣乾者死

結者云氣虛而小便不通者經曰膀胱者津液藏
焉氣化則能出矣氣虛則不能化故不通也
虛而小便不通者蓋血即津液之屬血虛即津
液燥而溺道不利故不通也與痰氣閉結於下
者虛實之情不同今丹溪皆用吐法乃急則治

其標也雖然氣虛血虛以虛為本虛則必補之
而後可夫以參朮四物調其真氣而吐之誠可
以通其溺而其本之虛也豈參芪四物之類頃
刻下咽遂能以補益之耶吾恐病根猶在不久
必復作故愚意以為若果氣虛血虛必用補氣
補血之藥使其氣盛而施化血生而津潤其便
自可以通不必探吐果宜吐者必須先吐俟其
溺通繼服補劑庶可平復非如痰氣閉結者但
吐之而可已此丹溪未盡之意予故表而出之

戴元禮云汗多而小便赤澁夏月多有此症盛暑
所飲既多小便反澁緣上停為飲外發于汗津
道不通小腸閉澁則水不運下五苓散然有虛
勞汗多而反澁者乃是五內枯燥滋腴既去不
能生津當以溫養潤肺十全大補湯或養榮湯
不可過用利小便藥蓋汗者心液心主血養血
則心得所養汗止金生不待通溺而自清矣諸
失精血及患癘毒人或有小便反澁之症亦是
枯竭不潤之故也

羅太無曰小便不利有三不可槩論若津液偏滲
于腸胃大便泄瀉而小便澁少者一也宜利而
已若熱搏下焦津液則濕熱不能行者二也必
滲泄則愈若脾胃氣澁不能通調水道下輸膀
胱而化者三也可順氣令施化而出

丹溪云諸淋皆屬於熱余每用黃柏滋腎丸每百
丸用四物湯加甘草稍杜牛膝木通梔仁活石
木香煎湯空心吞服兼灸三陰交如鼓應桴累
試累効

保命集云淋閉者涼膈散加滑石四兩茯苓一兩
治熱在氣分之劑

東垣清肺散 治渴而小便閉或黃澁邪熱在氣

分 茯苓錢二 猪苓 澤瀉各三錢 琥珀 瞿麥

桂各五分 通草 燈心各二分 木通 扁蓄各七分 車

前子炒一錢 每服五錢水煎熟服五苓散八正

散亦宜用

仲景猪苓湯 治脉浮發熱渴而小便不利

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各一兩

水四升煎二升去渣內膠煎溶溫服一日服三

茯苓戎鹽湯

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽彈丸大一枚

為末白湯調下

清肺飲 治肺燥而小便不通

黃芩一錢 山梔子三枚 鹽豉二十粒 長流水煎服

治熱在血分之劑

東垣滋腎丸 下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿

足熱不能履地不渴而小便閉者邪熱在血分

也

黃栢

知母

俱酒洗焙
各二兩

肉桂

錢二

右滾水為丸梧子大每百丸加至二百丸煎百沸湯空心服

潔古黃連丸

治因服熱藥過小便不利諸藥莫

能効者或臍下痛不可忍

黃連

炒

黃栢

炒

甘草

各等分

水煎服

如再不通加知母此藥助氣使氣得化則通矣

羅太無白花散

治小便不通膀胱有熱

朴硝為末每服二錢煎茴香湯調下

東垣導氣除燥湯

小便不通乃血濕致氣不通

而竅澁

知母

酒洗

澤瀉

各三分

黃栢

錢四

滑石

炒

茯苓

苓

各二錢

水煎不拘時服

小便不通腹下狀如覆椀痛悶難忍者乃腸胃乾

涸膈中氣不下則便不化者玄子謂胞器若得

氣海之氣施化則溲便下氣海之氣不及則隱

秘不通故不得便利也先用木香沉香各三錢

酒調下令氣通達便自通利

又方 煎陳皮茯苓湯調木香沉香末服之

上二方正綱目所謂氣鬱于下微者香以散之是也

丹溪治氣鬱於下甚者以吐法提之

血鬱于下小便不利微者輕劑行之如蒲灰散滑

石白魚散茯苓戎鹽湯皆主之

仲景蒲灰散

蒲黃粉七分滑石一分為細末白湯一日三服

滑石白魚散

滑石 乳髮灰 白魚各二分乃水魚也

為末米飲服五分一日三服

羅太無髮灰散 治臍下急滿小便不通

髮灰二錢 米醋二合調服 一法與葵子等分

為末米飲服二錢訖即炒黑豆葉蓋其上即通

右滑石能逐汚血蒲黃髮灰能消汚血丹溪

謂髮髮補陰之功甚捷

血鬱于下小便不利甚者峻劑破之

本事桃仁煎治婦人積血小便不通臍腹脹疼不

可忍衆醫皆作淋治如八正散之類數種皆治

不効診之乃知血瘕也非瞑眩藥不可去予用

此藥得愈 桃仁 大黃 朴硝各一兩 蜜半兩

炒四味為末先以醇醋二升半銀石器內慢

火煎取一升五合下大黃桃仁蜜等不住

手攪良久出丸如梧子大前一日不晚食五

更初温酒吞下五丸至日午腹大痛不可忍

卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁

或如鷄肝蝦蟇衣狀其痛止此藥極峻氣虛

血弱者不可輕用凡用之并可也

如見鮮血即止藥續以補藥調理此方出金方

倒換散 治癰閉大小便不通小腹急痛肛門腫

痛 大黃小便不通減半 荆芥穗大便不通減半

為末每服二錢温水調下

朴硝牛膝湯 治小便不通或血淋

杜牛膝二兩 以雪水二碗煎至一碗調朴硝一

兩空心服立通

雜方

治小便閉 用大田螺生去殼搗細封臍上即通

治傷寒後小便不通

生姜八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎

數沸用桶盛候可通手以布頻熨小腹良久恰

用紅豆末錢一江茶錢二井花水調服神效小便注如

本事方 治小便難小腹脹急不速治即死

葱白一斤細切炒令熟以帕子裹分作兩處更

替熨臍下即通

聖通方 治小便難腹滿悶不急療即死

秦艽一兩以水一大碗煎七分食分二服服之

濟世方 治小便不通

杏仁二十枚研碎水調分作二服効

千金方 治婦人卒不得小便用紫苑末以井水

調服三撮便通如小便血五撮立止

灸小便淋澀法

炒鹽不拘多少熱填滿病人臍中是神闕穴也

却用筋頭大艾炷灸七壯良驗或灸三陰交穴

又法 治小水秘澀

猪膽連汁籠套玉莖少刺汁入即通

婦人用藥末貯袋子安入玉戶中必通

玄珠經云陰陽閉格前後不通利小水自行中有轉胞之症諸藥不効無救則脹滿悶亂而死曾以甘遂末水調敷臍上內以甘草節湯飲之藥汁至臍二藥相反而胞自轉小水來如湧泉此救急良方

一法 治小便不通諸藥無効或轉胞至死用猪尿胞一箇底頭出箇小竅用翎筒通過放在竅內根底細線繫定翎筒口子細揪子堵定

上用黃蠟封尿胞口頭吹滿氣七分繫定了再用手捻定翎筒根頭放了黃蠟堵塞其翎筒放在小便頭放開翎筒根頭手其氣透入裏自然小便下神効

瓜蒌散 治腹脹小便不通

瓜蒌仁 不拘多少為末每服三錢溫酒調下如不能食酒米飲下以通為度

葵子散 治小便不通

黃蜀葵子 赤茯苓 各三錢 水煎服

鷄蘇散 治小便不通

鷄蘇一握 生地各四兩 通草各四兩 滑石 石葦炒去毛各一兩

冬葵子半一兩 以水六碗煎至三碗分三服空

心進一服約人行五里路又進一服

一方加榆莢黃芩車前子

治小便不通垂死者

玄明粉一兩 淡竹葉三十片 灯心五分 煎湯徐調下即通

治老人虛人小便不通 亦治心痛

琥珀為末人參湯調下妙

王海藏云脬轉小便不通非膀胱小腸厥陰之氣

也蓋因強力房事或過忍小便以致此疾非可

利之藥所能利之法當治氣宜以沉香湯主之

沉香 木香各三錢

為細末煎陳皮茯苓湯空心食前調服

癰門

生生子曰癰罷也下元罷憊而氣餒弱不能施化

故小便淋瀝點滴而下是又稱為淋也

陳無擇曰淋古謂之癰名稱不同也癰者罷也淋

者滴也古方皆云腎氣鬱致小腸膀胱不利漫
有冷淋濕淋熱淋等屬外所因既言心腎氣鬱
與驚思恐憂即內所因况飲啖冷熱房失勞役
及乘急忍溺多致此病豈非不內外因也大率
有五曰冷曰熱曰膏曰血曰石五種不同皆以
氣為本

嚴氏曰五淋氣石血膏勞是也氣淋為病小便澁
常有餘瀝石淋莖中痛尿不得卒出膏淋尿似
膏出勞淋勞倦即發痛引氣衝血淋遇熱即發

甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大抵此
症多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞服食
熱燥七情鬱結所致癰閉淋閉為病皆一類也

張子和曰世人多為服金石燥熱之劑得之常見
農家有此症豈是服金石之人也大抵是膀胱
蓄熱而成此疾如湯瓶久在火中煮瓶底白碱
而不能去沙石淋之症與此理同 劉宗厚曰
此譬極當內經云小腹熱澁出白液亦甚似也
東垣曰凡小便癰閉是無陰而陽氣不化也凡

利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥陽中
之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此乃奉
養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱
腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔
噦非膈上所生也獨為閉非格病也潔古云熱
在下焦填塞不便是治閉格之法因治王善夫
病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之
極腿腳腫脹破裂出黃水雙睛突出晝夜不得
眠飲食不下苦痛不可名狀求予治之因問受

病之始知病不渴近苦嘔噦衆醫皆用治中滿
利小便滲淡之藥急難措手乃辭歸從夜至旦
耿耿不寐窮究其理記素問有云無陽則陰無
以生無陰則陽無以化此病小便癢閉是無陰
則陽無以化也今病者內閉外格之症悉具死
存旦夕但治下焦可愈隨處以北方寒水所化
大苦寒之氣味俱陰者黃柏知母為君桂為引
名曰滋腎丸沸湯下二百丸少頃前陰如刀刺
火燒之痛瀉出如湧泉卧具皆濕床下成流願

盼之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可不遍覽而執一者也其症小便閉塞而不渴時見煩燥者是也凡諸病在下焦皆不渴也

千金方 治小便淋痛以杜牛膝以酒煮服

肘後方 以杜牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝

治淋之聖藥也但虛人當用補藥監治之耳

仲景云淋家不可發汗發汗則便血

寶鑑曰痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃

以湯澀於小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出焉今風寒濕邪客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其症小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便以足太陽經其直行者上交額下入絡腦氣下灌於鼻竅則為清涕也

劉宗厚曰按此則知淋閉有寒熱之殊大抵人之所稟虛實受病不同宜參脈理分治

方古庵云淋症其感不一或因勞房厚味醇酒忿

怒所致。夫房勞者，陰虛火動也。忿怒者，氣動生火也。醇酒厚味者，釀成溫熱也。積熱既久，熱結下焦，所以小便淋瀝，欲去不去，不去又來而痛，不可忍者，初則熱淋，血淋，久則煎熬水液稠濁，如膏如沙如石也。諸方中類多散熱利小便，而于開鬱行氣破血滋陰，蓋少焉。若夫散熱利小便，只能治熱淋血淋而已。其膏淋沙淋石淋三者，必須開鬱行氣破血滋陰方可也。古方用鬱金、琥珀、開鬱藥也。用青皮、木香行氣藥也。用蒲

黃牛膝破血藥也。用黃柏、地黃滋陰藥也。東垣用藥凡例，小腹痛用青皮，黃柏、夫青皮、踈肝、黃栢滋腎，緣小腹小便乃肝腎之部位也。學者不可不知。

治熱之劑

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋臍下滿痛

生地 木通 黃芩 甘草

煉蜜杵丸 梧子大每二十九 木通煎湯下

導赤散 治心蘊虛熱小便赤澀或成淋痛

生地 甘草 木通 加竹葉水煎服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子錢五 淡竹葉 赤茯苓 灯草 荆芥

穗各二分 帖水煎服

地膚子湯 治諸病後體虛觸熱、結下焦小便

赤澁多起少出莖痛如刺或尿血

地膚子 猪苓 知母 黃芩 海藻 通草

瞿麥 枳實 升麻 葵子各等分 姜三片水煎服

立効散 治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草炙三兩 瞿麥兩一 山梔仁炒五錢 每一兩姜

三片葱白三根灯心三十根水煎服

通草湯 治諸淋

通草 葵子 茅根 蒲黃 當歸 王不留

行 栝膠 瞿麥 滑石各一兩 甘草五錢

每一兩姜五片水煎服

石葦散 治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作

有時勞役即發或尿如豆汁或出沙石並治

芍藥 白朮 滑石 葵子 木通 瞿麥各二

兩當歸 甘草 王不留行各一兩 石葦去毛二兩

為末每服二錢空心小麦湯調下

五淋散 腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不

出或如膏如沙如石如豆汁並治之

赤芍藥 山梔仁各十兩 當歸 甘草生各五兩 條芩

三兩 赤茯苓六兩 每服七八錢水煎

八正散 治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便

赤澀癢閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆

治之 車前子 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草

山梔 大黃煨麵包 木通各等分 每服五七錢入灯

心十莖煎至六分食前服

又方 治諸淋

四苓散錢二 益元散 山梔子各一錢

灯心三十根水煎服

又方 益元散加車前子末錢一 或加阿膠錢一

石葦飲 治小便不利莖中痛

石葦去毛 冬葵子各二兩 瞿麥一兩 滑石五兩 車前子三兩

為末每服二錢日三服熟水下

葵根湯 治小便淋澀

葵根洗淨搗碎水煎服

又方 治沙淋

車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中五更取起

溫服若是沙淋石淋則以煨寒水石為末

調服

如治白淋用砂糖

治淋閉莖中作痛神效方

石葦 滑石 瞿麥 扁蓄 木通 冬葵子

王不留行 地膚草 各等分 為末每服三錢 白湯調下

一方 治淋及尿血立效

旱蓮草 車前草 同取汁每服半碗

一方 治淋痛及尿血

側柏葉 藕節 車前子 等分

取汁調益元散三錢神效

治石淋方

杜牛膝 搗碎水五碗煎至一碗去渣入射香

少許調服效

一方 治沙淋

石首魚腦骨五對滑石五錢為末分二服煎木

通湯調下連服數劑看沙盡止藥

海金沙散 治膏淋

海金沙 滑石末各一兩甘草二錢半

為末每二錢麥冬湯調服灯心湯亦可

一方加木通瞿麥穗通草杏仁

鹿角霜丸 治同上

鹿角霜 白茯苓 秋石各等分

為末麵糊丸梧子大每五十九米湯送下

大海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施

化或五種淋疾癢閉不通

海金沙研木通 瞿麥穗 滑石 通草各半兩

杏仁去皮尖每五錢入灯心二十根水煎服

牛膝膏 治死血作淋

牛膝四兩去芦桃仁一兩去皮尖當歸尾二兩赤芍

藥一兩生地一兩半川芎五錢

用水以炭火慢熬至二鍾入射少許分作四

服空心服如夏月用凉水換此膏不壞

滋陰降火湯 治火燥血少氣不得降而淋

當歸 黃柏 鹽水炒各一錢半 知母 牛膝 生地 各一

錢白芍 二錢 甘草 一分 稍 木通 各八分 水煎食前服

靈苑透膈散 治五種淋疾氣淋熱淋勞淋石淋

及小便不通至甚者 硝石 一兩雪白者為末 每服二

錢各依湯使服 如勞倦虛損小便不出小

腹急痛葵子煎湯下通後更須服補虛丸藥

如血淋小便不出時下血疼痛並用冷水

調下 如氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木

通煎湯下 如石淋莖內痛尿不能出內引

小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末

先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再研令細

溫水調下 如小便不通小麦湯下 卒患

諸淋並以冷水調下 以上並空心先調藥

消散如水即服之更以湯使送下凡服藥未

効者服此立愈

靈苑方 治卒患諸淋遺溺不止小便赤澁疼痛

三葉酸漿草取嫩者搗汁一合酒一合攪勻空

心服之立通 酸漿草即布谷飯

一方 治血石淋

楊樹蛀屑烏梅一大束三水煎服

羅太無石燕丸 治石淋多因憂鬱氣注下焦將

所食鹹物結成砂石小便硃痛不可忍必俟砂

石出而後小便通 石燕燒赤水中淬三滑石

石葦去毛瞿麥穗各一兩為末糊丸木子大煎灯心

瞿麥湯吞下十九丸一日三服

葛粉丸 治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

共用酒三碗煎至一碗空心服三服全愈

又治下疳如神五帖後疳愈再不發他瘡毒

腎瀝湯 治胞痺小便不利小腹急

麥冬 木通 桔梗 桑白皮 杜仲炒 犀角

屑 五加皮各一錢 赤芍五分 水二鍾加羊腎一

枚切碎煎至八分入竹瀝少許食前服

濟生木通散 小便不通小腹痛不可忍

木通 活石各一兩 黑丑頭末五錢

每服五錢灯心十莖葱白一莖水煎服

治氣開鬱之劑

芍藥檳榔散 治五淋

赤芍藥 兩一 檳榔 一枚麪包煨

為末每服一錢七空心白湯調下

丹溪 生氣藥

砂仁 錢三 海金沙 紅曲 檀香 各二錢 白豆仁

木香 丁香 各一錢 分五帖研桃仁十四枚 入生氣藥

治諸般沙石淋

琥珀 錢二 研細末空心用葱白頭煎濃湯調下

無問諸般淋疾一二服神效 本草云琥珀消汚血極驗

通秘散 治血淋痛不可忍

陳皮 香附 赤茯苓 等分 水煎服

沉香散 治氣淋疼甚多因五內鬱結氣不舒行

陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便溺不通

沉香 石葦 滑石 當歸 王不留行 各五錢

葵子 芍藥 各七錢半 甘草 陳皮 木香 青皮

各二錢半 為末每服三錢煎大麥湯下

治卒淋急痛方

益元散二錢

茴香一錢微

木香各二

檳榔各二

右為末水調服

琥珀散 治五淋砂石淋

滑石

琥珀

各一兩

木通

當歸

木香

鬱金

扁蓄

各五錢

為末每五錢以蘆葦葉煎湯調服

如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下

一方 治同上

石燕子

七枚搗如黍米大

新桑白皮

三兩剉同拌勻

二味分作七帖用水煎一日三服

治肝經氣滯蘊熱小便淋痛方

甘草稍子

五錢

青皮

黃柏

澤瀉

各一錢

水煎服効

補氣血之劑

丹溪治朱郎小便淋痛脉大右瀋此為勞傷經血

勿作淋治可補血行肝經滯血自愈

生地

當歸

赤芍

各一錢

川芎

條芩

甘草

梢

各三分

陳皮

木通

各五分

黃柏

炒二分

紅花

一分

杜牛膝一錢右以桃仁泥研滑石同煎待淋病退

減桃仁滑石杜牛膝木通入川牛膝代木通
分兩倍之

氣虛者八物湯加杜牛膝黃芩煎服

老人氣虛亦能淋參朮中加木通山梔

治勞苦傷血脈沉而大下焦蘊結而淋

人參 歸尾 白芍 香附各五錢 條芩三錢 木通

三錢 山梔仁炒三錢半 黃芪 甘草梢生各五分

分四帖煎杜牛膝湯煎服

茯苓琥珀湯 小便澀莖中痛不可忍相引脇下

痛 川練子去核炒 甘草生各一錢 人參五分 茯苓四分

琥珀 當歸梢 澤瀉 柴胡各三分 玄胡索七分

水煎服數服効

六味地黃丸 治久淋陰虛者

清心蓮子飲 治上盛下虚心火炎上口舌咽乾

煩渴微熱小便赤澀或欲成淋並治之

黃芪蜜炙 石蓮肉 赤茯苓 人參各七錢半 甘草

炙 車前子 地骨皮 麥門冬 黃芩各五分

每服七八錢水煎溫服 發熱加薄荷柴胡

治氣虛脾虛消渴淋濁

人參 滑石錢各一 白朮半一錢 赤茯苓 澤瀉各七

分麥門冬 甘草分各五 竹葉片三十

加灯心二十根水煎服

治寒之劑

千金茯苓丸 治胞痺小便內痛

赤茯苓 防風 細辛 白朮 澤瀉錢各五 紫

苑 天花粉 牛膝 黃芪 芍藥 甘草各炙

三錢山藥 山茱萸肉 獨活 半夏錢各一 附子

炮官桂錢各二 煉蜜丸梧子大每服五六十九

空心温酒下

腎著湯 治胞痺小便不通

赤茯苓 白朮兩各四 甘草兩各三 乾姜兩炮一

每服五七錢水煎一日三服

巴戟丸 治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟兩去心一 桑螵蛸炒麩 遠志去心 生地黄 山藥

附子炮 肉苁蓉酒浸續斷各一兩 杜仲炒 鹿茸酥炙

石斛 兔絲子 五味子 山茱萸 官桂

龍骨

各三錢

煉蜜丸梧子大空心溫酒下三十九

三因生附散

治淋而脉沉微小便秘澁數起不

通竅中痛

瞿麥

木通

半夏

各一兩半

滑石

五錢

附子

五錢

每二錢生姜三片灯心二十莖蜜等

匙水煎食前服

淋閉餘論

生生子曰淋閉一證王機微義闡述詳盡極當檢閱如劉河間之熱羅知悌之寒張潔古分在氣在血之異嚴用和之五淋陳無擇之三因朱彦

修之痰積苑血劉宗厚之腎虛火熾述素問靈樞脉經之要旨門分類析甚便後學惟煩人治法尚畧顧今時婦人患此頗多鮮獲竒効緣由未得其真括也考之經曰肝主小便淋洩煩人經未絕年皆厥陰肝經用事肝主謀慮者也婦人之性多於偏鄙鬱而不決氣道因澁鬱久成火凝滯濁液漸結成粒名曰砂石淋是也今之治淋者動手輒用五苓八正之類皆淡滲利竅之劑于病未嘗遠也而底績不樹何耶殊不知

淡滲皆在天之陽也。但能利肺氣。是氣降而水利矣。非治有形之陰病也。腎乃肺之子也。淡滲過劑。腎氣奪矣。陰血日虧。鬱火日熾。經曰。無陽則陰無以化。無陰則陽無以生。淡滲皆泄氣而損血者。血損則竅愈溢。則病劇。治當開鬱火。養陰血。兼之以導氣之藥。經曰。壯者氣行則愈。陰血旺。氣道滑。病自瘳矣。正如河涸舟粘。縱用力多。未若決水之為易也。學者其可忽諸。

丹溪牛膝膏加鬱金以開鬱。山梔以降火。生地以補陰。琥珀以導氣。利竅則愈矣。

遺溺門

生生子曰。按遺溺遺失也。睡夢中遺失。醒而後覺。

童稚多有此。大人少有也。夫童稚陽氣尚微。不甚約束。好動而魂遊。故夜多遺失也。古方多用煖藥。乃溫養陽氣之意。經謂虛則遺溺。又曰。不約為遺溺。從可知矣。曾見數人。二三十歲。仍遺失不止。後皆無子。得非下元虛寒所致歟。

東垣曰。小便遺失者。肺金虛也。宜安卧養氣。禁勞。

後以黃芪人參之類補之不愈當責有熱加黃
栢生地又曰立夏前候用白虎湯過多致遺溺
者宜溫藥升陽以解之

甲乙經云肺脉不足以息卒遺失無度

原病式云遺尿不禁者是熱甚客于腎部干於足
厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣不能宣通則痿
痺而神無所用故液滲入膀胱而旋溺遺失不
能收禁也

丹溪嘗治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黃栢知

母杜牛膝為君青皮甘草為臣木香為佐桂枝
小為反佐服數帖大効此法與千金翼白薇散
皆治熱甚廷孔鬱結神無所用不能收禁之也
生生子曰按劉河間丹溪千金翼方有認為熱者
必以脉症相參看治庶無偏熱偏寒之弊予前
論寒者以大緊而言也諸病皆有寒熱虛實多
有始同終異故治法不能執一而無權也

桑螵蛸散 治遺溺

桑螵蛸酒炒為末姜湯調下二錢

鷄內金散 治溺床失禁

鷄胫一具即鷄肫內黃皮并腸洗淨燒存性

男用雌女用雄研為末每二錢酒服妙

大人遺溺不知薔薇根細研酒下

雞腸草湯 治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草一兩 牡蠣粉三錢 龍骨 麥冬 白茯苓

桑螵蛸各五錢 每服三錢東一枚去核煎服

一方 治同上

補骨脂炒為末黃柏煎湯調下



