


古今醫鑑

十五


卷 十 五

癩疽	便毒	疥瘡	癩風
瘰癧	梅瘡	癬瘡	諸瘡
疔瘡	膿瘡	疥瘡	



類	號	函	架	冊
漢書門	二六〇	二〇	一六	一六

內閣文庫	
番號	漢 12610
冊數	16 (15)
函號	301 107






王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之十五

金谿 龔信 纂輯

子廷賢 續編

金壇 王肯堂 訂補



癰疽 附腸癰肚癰

脉凡諸脉浮數應當發熱其不發熱而反洒淅惡寒若有痛處必發癰疽脉微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰疽○脉浮而數身體無熱形默默胸中微燥不知痛之所在其人必發癰疽  
證內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又云膏粱之害足

古今醫鑑 卷之十五

生太丁蓋心主血而行氣氣血凝滯而為癰疽也  
癰者壅也大而高起屬乎陽六腑之氣所生也其  
脉浮數疽者沮也平而內發屬乎陰五臟之氣所  
成也其脉沉數

凡人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不  
寧煩躁飲冷者其患瘡疽必深也若人須患瘡疽  
起居平和飲食如故其瘡浮淺也

凡外敷貼藥亦發表之意一方謂貼冷藥有神效夫  
氣得熱則散得冷則斂何謂神效經曰發表不遠  
熱是也

凡腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿重按乃痛  
膿之深也輕按即痛膿之淺也按之不甚痛者未  
成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿必是  
水也

凡癰疽未破毒攻臟腑一毫熱藥不敢用若已破潰  
臟腑既虧飲食少進一毫冷藥不敢用也

凡膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸  
而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之  
凡疽發深而不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛  
也

凡腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛  
 補之若年老潰後發嘔不食宜參耆白朮膏峻補  
 河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵於胃宜倍白朮  
 凡癰疽發渴乃血氣兩虛用參耆以補氣當歸地黃  
 以養血

凡癰疽有實熱者易療虛寒邪熱者難治腫起堅硬  
 膿稠者為實腫下軟慢膿稀者為虛敗膿不去加  
 白芷則去不可用白朮蓋白朮能生膿故也  
 凡癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺或以騎竹馬  
 灸法最妙蓋火暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭

為諸陽所聚艾炷宜小而少若其身必痛灸至不  
 痛不痛灸至痛

**方** 連翹敗毒散

治癰疽發背疔瘡乳癰一切無名腫毒初起憎  
 寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒一日至四五  
 日者二三劑以解其毒輕者則內自消散若至  
 六七日不消宜服真人活命飲後服托裏消毒  
 散調理

- 柴胡
- 羌活
- 桔梗
- 金銀花
- 連翹
- 防風
- 荊芥
- 薄荷葉

川芎

獨活

前胡

白茯苓

甘草

枳殼

右剉生薑煎。如瘡在上，食後服；在下，食前服。如熱甚，并痛甚，加黃連、黃芩。如大便不通，加大黃、芒硝，下之。

○真人活命飲

治一切癰疽疔腫，不問陰陽虛實，善惡腫潰，大痛或不痛，然當服於未潰之先，與初潰之時，如毒已大潰，更不宜服。初用此劑，太勢已退，然後隨證調理，其功甚捷，誠仙方也。

乳香

沒藥

貝母

甘草節

白芷

花粉

赤芍藥

當歸稍

防風

陳皮

皂角刺

金銀花

穿山甲

三大片切碎，以蛤粉炒黃色。

○全右剉一劑，用醇酒一鍾半，以紙密封，罐口勿令泄氣，煎至一鍾，隨瘡上下，以分饑飽溫服，能飲酒者，服後再飲三五杯，忌酸薄酒，鐵器服後側臥，覺痛定，回生神功，浩大不可億度，再看證加減。○在背俞，倍皂角刺。○在腹募，倍白芷。○在胸次，加瓜蒌仁二錢。○在四肢，倍金銀花。

按右方治  
癰疽初起  
已成或未  
成未潰之  
先宜之

○槐花酒

治背發一切疔瘡腫毒不問已成未成但焮痛者宜用未成者一二服即消已成者三四服愈  
槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服

○金銀花酒

治一切癰疽發背疔瘡乳癰便毒及喉痺乳鷺不問已成未潰者  
金銀花連莖葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服可保無虞如秋冬無鮮者水煎和酒服

○追風通氣散

治癰疽發背流注腫毒腦疽打破傷折疔氣血痕脚氣諸氣痞塞塊痛腰痛一切痰飲為患此藥大能順氣勻血扶植胃本不傷元氣蕩滌邪穢自然通順不生變證真仙劑也  
氣血逆於腠理故冷壅結癰疽調和營衛實堪宜赤芍木通白芷何首烏同根殼茴香烏藥當歸更加國老等無疑酒水同煎濟世  
一癰疽生痰有二一則胃寒生痰加半夏以健脾化痰一則鬱熱而成瘋痰加桔梗並用生薑

水酒煎○一發背因服寒涼之藥過傷脾胃飲食少進顏色憔悴肌肉不生去木通少用當歸倍厚朴陳皮○流注加獨活○腦發背發去木通○打破傷折在頭上去木通加川芎陳皮○經年腰痛加革薺玄胡索酒煎○脚氣加檳榔木瓜穿山甲水煎○痰飲為患或喘或咳或暈頭痛睛疼遍身拘急骨節痺疼胸背頸項腋膊腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿或

○並有薄血或清水或如乳汁又有壞肉如破絮又

如瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不硬破之亦無膿血鍼口弩肉突出惟覺咽喉痰實結塞作寒作熱加南星半夏○腫毒堅硬不穿

○加川芎獨活麻黃連鬚葱煎熱服

○托裏消毒散

治一切癰疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成即消能壯氣血固脾胃使毒氣不得內攻膿毒易潰肌肉易生切不可早用生肌之藥恐毒氣未盡反增潰爛如有瘡口便貼膏藥以禦風入至瘡口閉合如不用貼此守成之方也

黃耆鹽水炒 花粉各二錢 防風酒洗 當歸

川芎 白芷 桔梗炒 厚朴薑製

穿山甲炒 皂角刺炒各一錢 金銀花

陳皮各三錢

右用冰酒各一鍾煎至七分瘡在<sub>心</sub>一食後服在

○并下空心服二貼後只用水煎

○千金內托散

治癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用針刀服藥後疼痛頓減此藥活血勻氣調胃補虛祛風邪辟穢氣

王道之劑宜多服之神効

黃耆蜜炙 人參去蘆 當歸各二錢 川芎

○二防風去蘆 桔梗去蘆 白芷 厚朴薑炒

薄桂 甘草生用各一錢 加金銀花亦可

右爲末每服三錢無灰酒調下不飲酒木香湯

調下亦可或都作一劑用酒煎服尤佳○癰疽

腫痛用白芷不腫痛倍官桂○不進飲食加砂

仁香附○痛加乳香沒藥○水不乾加知母貝

○麻母○瘡不穿加皂角刺○咳加陳皮半夏湯泡七次

杏仁薑五片煎○大便秘加大黃枳殼○小便



按右方治  
瘰癧已潰  
托裏消毒  
敗膿之劑

澀加麥門冬車前子木通燈心

○神仙蠟礬丸

治癰疽及腸癰消毒固臟腑止疼痛護膜止瀉  
化膿癰疽潰後宜服

黃蠟二兩生白礬三兩為末溶蠟為丸如梧  
桐子大每服二三十九酒下不飲酒者熱水  
下二日服三次肺癰蜜水下咳嗽薑湯下

○二仙散 黃賓江傳

治發背癰疽已成未成已潰未潰痛不可忍者  
白芷 未潰者用二兩  
已潰者用五錢 貝母 未潰者用五錢  
已潰者用二兩

王道之劑宜多服之神効

黃耆 蜜炙 人參 去蘆 當歸 各二錢 川芎

○二心防風 去蘆 桔梗 去蘆 白芷 厚朴 薑炒

薄桂 生用各一錢 甘草 加金銀花亦可

右為末每服三錢無灰酒調下不飲酒木香湯

調下亦可或都作一劑用酒煎服尤佳○癰疽

腫痛用白芷不腫痛倍官桂○不進飲食加砂

仁香附○痛加乳香沒藥○水不乾加知母貝

母○瘡不穿加皂角刺○咳加陳皮半夏 湯泡七次

杏仁薑五片煎○大便閉加大黃枳殼○小便

按右方治  
癰疽已潰  
托裏消毒  
敗膿之劑

澀加麥門冬車前子木通燈心

○神仙蠟礬丸

治癰疽及腸癰消毒固臟腑止疼痛護膜止瀉  
化膿癰疽潰後宜服

黃蠟二兩生白礬三兩為末溶蠟為丸如梧  
桐子大每服二三十九酒下不飲酒者熟水  
下一日服三次肺癰蜜水下咳嗽薑湯下

○二仙散

黃賓江傳

治發背癰疽已成未成已潰未潰痛不可忍者  
王白芷未潰者用二兩貝母未潰者用五錢  
已潰者用五錢

按右方治  
諸癰疼痛  
及不破者  
宜之

右剉好酒煎服

○透膿散

治諸癰疽及貼骨癰不破者不用針

刀一服不移時而自透神效

蛾口繭一箇燒灰存性用酒調服即透切勿

可用二三兩箇服之即生二三兩頭

○芙蓉膏

張秀峰傳

治發背癰疽痛如錐刺不可忍登時痛止如神

芙蓉葉

黃荊子為末各等分

右二味入石柏內搗極爛用雞子清調搽患處  
留頂如烟霧起立瘥此方用在未潰之先或將

潰之際

○三神膏 張貢士傳

治癰疽發背 草麻子 去殼四十九枚 陳醋 一碗 好鹽 一撮

右三味置鍋中用文武火熬之槐枝攪成膏先

將米泔水洗淨瘡上藥留頂末成膿者即散

已成膿者即潰忌一切發物并酒

○神妙生肌散 敏所兄傳

治癰疽發背諸般瘡毒潰爛疼痛

乳香 一錢 沒藥 二錢 二味用燈草同研 孩兒茶 一錢

血竭 一錢 赤石脂 一錢 海螵蛸 一錢 輕粉 三分

龜板 錢炒 一 鱉甲 錢炒 一 硼砂 二錢 生肌 全在此 味 水銀 錢

黑鉛 錢 〇初起加黃柏 錢 〇作痒加白芷 錢

右將銀鉛同煎化將前藥各為末入銀鉛於內

木研極細摻瘡上神效

○鐵桶膏 澤川西府傳

治癰疽發背疔瘡癩癧痔瘡粉瘤

蕎麥稈灰淋汁二碗熬至一碗下 血竭

〇王容乳香 沒藥 各三分 入汁內再熬去半碗取

下待冷入 黃丹 八分 雄黃 八分 硃砂 八分

好石灰 八錢 為極細末共一處放藥汁內攪

勻成膏磁器收貯用三稜針刺破將藥入內直送深入到底不三四次全愈

○玉容膏 秘傳

治發背癰疽潰爛用此生肌止痛外護

香油二兩黃蠟一兩二味化開入黃丹末錢

○寒水石 火煨 為細末溶化為膏紙攤貼患處

○水雲膏 闡傳 治發背

乾薑 炒 皂角 炙去皮 五倍子 炒 川芎 各 兩

孩兒茶 乳香 沒藥 各三錢 枯礬

槐花 各一錢

癰疽外治之劑

右為末苦膽汁調塗神效○又方醋炆五倍子入猪腦髓同搗如膏貼之如瘡在左用左邊腦

○千金內消散 治腸癰便毒初起即消已腫即潰

膿血從大便中出

大黃 三錢 赤芍藥 白芷 木鼈子 去殼

乳香 沒藥 皂角刺 白僵蠶

瓜蒞仁 天花粉 各一錢 歸尾 酒洗一錢半

穿山甲 三大片蛤粉炒黃色杵碎 金銀花 三錢 甘草 五分

右剉一劑水酒煎空心服○紅點加芒硝

○內消沃雪湯

陳恕軒傳

治肚内生癰及癰疽神效

當歸身

白芍藥

黃耆

甘草節

金銀花

天花粉

連翹

香白芷

穿山甲

皂角刺

貝母

乳香研

沒藥研

木香

青皮

廣陳皮

甚者加大黃

水酒煎服立消是世所可

**瘰癧**

**證**

夫瘰癧者頸腋之間而生結核也或在耳後連及

頤頷下至缺盆在鎖字骨陷中皆為瘰癧手少陽三焦經

主之或在胸及胸之側皆為馬刀瘡足少陽膽經

主之二經多氣少血其初生如豆粒或如梅李累

累相連歷歷三五枚久久不消漸漸長大按之則

動而微痛不憎寒壯熱惟午後微有熱或夜間口

乾飲食少思四肢倦怠是以堅而不能潰潰而不

能合有風毒者得之於風熱毒者得之於熱氣毒

者得之於氣乃風熱邪氣蘊結而成皆由氣血不

足往往變為癆者經云此不繫膏梁丹石之變因

虛勞氣鬱所致宜補形氣調經脈則未成者自消

已成者自潰若不詳經絡血氣多少脈證受病之

異卒用牽牛斑猫及流氣飲十宣散等則血氣已

按此方治  
癩癧半攻  
半補之劑

損而實實虛虛之禍如指諸掌

**治**

治當以養榮益氣湯主之

益氣養榮湯 治懷抱抑鬱癩癧流注或四肢患

腫肉色不變或日晡發熱或潰而不斂

黃耆 蜜炙 當歸 酒洗 人參 白朮 炒各一

川芎 酒炒 生地黃 陳皮 柴胡 黃芩 各一

香附 炒 貝母 錢各一 地骨皮 不柴胡 黃芩 各一

桔梗 炒 甘草 五分 如有痰加橘紅

刺 痛加青皮或木香 午後有熱或頭微眩加酒

炒黃柏 膿水清倍參耆歸 女人有鬱氣胸

膈不利倍香附貝母 月經不調加丹皮當歸

紅花

○散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至

肩或於脇下皆手足少陽經中及癩癧遍於

頰或至頰車堅而不潰在足陽明經所出或二

瘡已破乃流膿水並治及生癭瘤大如升久不

潰者

升麻 六分 葛根 二錢 白芍藥 二錢 當歸尾 五分

連翹 三錢 黃連 二錢 桔梗 五錢 黃芩稍 一錢半

黃柏 五錢 酒炒 知母 五錢 酒浸 昆布 五錢 洗 龍膽草 四錢 酒洗

海藻 五錢 酒炒 三稜 三錢 酒炒 莪術 三錢 酒炒 天花粉 五錢 酒浸

甘草 五分 白芍 二錢 歸尾 五分

右剉每十兩用水二鍾先浸半日煎至一鍾去

渣熱服於臥處伸足在高處頭微低每噉一口

作十次嚥至服畢依常安臥取藥在胸中停蓄

也另攢半料作細末煉蜜為丸如菉豆大每服

百丸或一百五十九丸此藥湯留一匙送下

○內消散 任中嵩傳

治瘰癧宜先用益氣養榮湯數十服後服此方

硃砂 一錢 血竭 一錢 斑猫 去翅足三分生用

○右為細末每服一分空心燒酒調服未破者三

五日立消已破者內服此藥外用金頭蜈蚣一

條研極細末用麻油一小鍾浸二日夕搽患處

其瘡即腫潰過一二日腫消可貼膏藥瘡勢大

○為者二十日瘡小者十餘日平復

○天花散 京師傳 治瘰癧潰爛疼痛

天花粉 一錢 白芷 一錢 乳香 二分 沒藥 五分

赤芍藥 一錢 貝母 七分 歸尾 一錢 金銀花 三錢

按此方治瘰癧專攻之劑

穿山甲 炒黃色 一錢二分

右判一劑好酒一鍾半煎服忌鱖魚雞羊等毒

天物

○烏龍膏 周非山傳 治瘰癧潰爛久不愈者

木鼈子 帶殼燒存 性去殼 側柏葉 焙 人中血 即髮燒灰

青龍背 即舊銅 上垢膩 紙錢灰 飛羅麵 各一錢

右為末用好醋調成膏塗瘡上外用紙貼效

○代灸散 治瘰癧潰爛臭不可聞久不能愈

官粉 一錢 雄黃 一錢 銀硃 一錢 麝香 二分

右為細末用槐皮一片將針密密刺孔置瘡上

上搽藥一撮以炭火炙熱其藥氣自然透入瘡中痛熱為止甚者換二次輕者二次全愈

○紫雲膏 治瘰癧及一切頑瘡潰爛久不愈并杖

瘡腫瘡小兒頭瘡並效

黃蠟 一兩 松香 五錢 黃丹 三錢 香油 四兩

右四味共入鐵鍋內用柳條去皮攪之文武火

熬至半炷香盡為度攤油紙貼之或搽塗患處

○地龍膏 李養齋傳 治瘰癧未破者貼之立消

雄黃 地龍糞 小麥麩

各等分研末醋調塗之



○丹青散 治瘰癧已破者搽上即愈

銀硃 一錢 銅青 一錢 松香 五分

○研朱有水乾傳之如乾燈油調搽

○瘰癧妙方 劉前岡傳

用蕎麥麩捻作圈圍住瘡上用黃酒糟壓乾撒在瘡上用麝香入艾槌爛鋪糟上火燒艾過則再換以瘡內水乾為度後貼膏藥

官粉 一兩 乳香 二錢 沒藥 二錢 孩兒茶 二錢  
蛤粉 五錢 龍骨 二錢 蜂房 二箇 蜜陀僧 二錢  
血竭 二錢 草麻子 去殼一百二十箇

右研為細末用香油四兩熬黑後將各藥放在油內熬數沸用瓦盆盛水將藥鍋坐在上出火毒紙攤貼患處如神忌食雞鵝羊肉鴨蛋鮮魚辛辣炙煨等物

○老君丹 黃賓江傳

治瘰癧并痰核結硬

老君鬚 四分 紫背天葵 三錢 乳香 三錢

○天葵沒藥 紅麴 防風 紅花 各三錢

三梔子 五分 當歸 八分 川芎 四分 草果仁 一錢

血竭 五分 孩兒茶 五分 土茯苓 五分 金銀花 五分

白芥子 五分

右共搗粗末先用獨蒜一箇順插爛入好酒一  
碗濾去渣入藥於內重湯煮一時食後臨臥服  
三劑全消妙不可言

○天葵丸 黃賓江傳

治瘰癧

紫背天葵

一兩

海藻 一兩

海帶 一兩

昆布 一兩

○天葵丸

各一兩

桔梗

一兩

海螵蛸

五錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每七十九食  
後溫酒下此方用桔梗開提諸氣貝母以消毒  
化痰海藻昆布以軟堅核治瘰癧之聖藥也

疥瘡

論

夫疥瘡者皆由臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡  
之間以致血氣凝滯注於毛孔手足頭面各隨五  
臟部分而發也其形如粟米或疼或痒以致遍身  
麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼  
花蓋疥腫初發熱突起如釘蓋故謂之疥疥瘡含  
蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速  
內經以白疥發於頸鼻赤疥發於舌根黃疥發於  
口唇黑疥發於耳前青疥發於目下蓋取五色以  
應五臟各有所屬部位而已然或有或腰或足發  
無定處如在手足頭面骨節間最急其餘猶可緩

也近世多食災牛疫馬之肉而成此證其形有十  
 三種皆以形而名之耳一曰麻子疔始末極痒忌  
 麻子油犯之多不救二曰石疔三曰雄疔四曰雌  
 疔五曰火疔六曰爛疔七曰三十六疔八曰蛇眼  
 疔九曰鹽膚疔十日水洗疔十一曰刀鑷疔十二  
 曰浮鷗疔十三曰牛狗疔惟三十六疔最為可畏  
 其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一  
 明日生二後日生三乃至十數猶為可治若滿三  
 十六則不可治矣又有所謂紅絲疔魚臍疔之類  
 其名甚多其紅絲疔者或生手足間有紅絲一條

急宜用針刺斷不然其絲入心必難治矣魚臍疔  
 者狀如魚臍也

**治** 凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘  
 下冷去惡血乃以藥敷之仍服蟾酥丸之類發汗  
 諸疔名目雖多其治法畧同如身冷自汗嘔逆燥  
 喘狂喝妄語直視者皆毒氣攻內不可治矣

**方** 飛龍奪命丹

治疔瘡發腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡  
 瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之  
 立愈此乃惡證藥中至寶危者服之立安

雄黃 二錢 硃砂 一錢 輕粉 五分 血竭 一錢

乳香 一錢 沒藥 一錢 蟾酥 二錢 銅綠 二錢

膽礬 一錢 麝香 五分 片腦 五分 蜈蚣 一條 去頭足

蝸牛 一箇 寒水石 一錢

右為末先將蝸牛連殼研如泥和為丸如菉豆

大如丸不就入酒打麩糊丸之每服二丸先用

葱白三寸冷病人嚼爛吐於男左女右手心將

丸藥裹在葱白內用無灰熱酒三四盃送下於

避風處以衣蓋覆之約人行五里之久再用熱

酒數盃以助藥力發熱大汗為度如重者無汗

再進二丸汗出即効如疔瘡走黃過心者并出

冷汗者難治病人不能嚼葱研爛裹之瘡在下

食前服瘡在上食後服忌冷水王瓜茄子油膩

鷄魚肉濕麩一切發物不可食

○化生丸 戴近山傳

治一切發背癰疽無名腫毒諸般惡毒疔瘡及

治破傷風陰證傷寒并楊梅瘡毒筋骨疼痛等

證並皆一服奏効

蟾酥 二錢 血竭 二錢 蝸牛 二十箇 瓦上焙 乾肉殼俱用

銅綠 二分半 與上 三味同研 枯白礬 一錢

輕粉 二錢 二味 同研

硃砂 三錢 研細留 一錢 為衣

右為細末用人乳汁為丸如菘豆大硃砂為衣冷病人嚼葱二根令爛吐出裹藥三丸在內吞下熱酒送之

○趙府小靈丹 治一切惡毒疔瘡諸般無名腫毒

○外及四時傷風傷寒增寒壯熱無汗初覺者

乳香 沒藥 輕粉 血竭

硃砂 川烏尖 草烏尖 巴豆霜

細辛 蟾酥 麝香 等分 減半

右為末糯糊丸黃米大雄黃為衣每服十五丸

小兒五七丸用葱白三根劈開入丸在內細嚼好酒下被蓋汗出避風婦人有孕不可服

○金蟾丸 羅穎波傳 治疔瘡

硃砂 雄黃 輕粉 草烏

○海金沙 各一錢

右為末用蟾酥為丸如菘豆大每服三丸以葱白一根劈破夾藥在內線縛住灰火煨令香取去線連鬚帶藥嚼下以溫水送之被蓋出汗忌生醋冷水

○蟾酥丸 毛惟中傳 治疔瘡發背無名腫毒咽喉

○腫痛小兒急慢驚風痘疹傷寒陰證等疾

主硃砂 五錢 雄黃 五錢 麝香 少許

右為細末以端午日將蟾酥為丸如菜子大每

服三九葱酒送下取汗為效咽喉腫疼點患處

立愈

○神仙解毒丸

治疥瘡發背魚口諸般惡瘡腫毒初發一服立

消

白礬不拘多少溶化作丸如菉豆大硃砂為

衣每服十九丸用連鬚葱七八根水煎一碗送

下立愈已成者不傷生未成者即消

○老軍散 治發背癰疽疔瘡惡毒一切無名腫痛

煨熟初起未潰者

○大黃 半生 甘草節 等分

右為細末和勻每用一匙空心溫酒調服一二

服疎利為度

○還童散 凡患疔瘡癰疽癩毒此藥能令肉消去

毒化為黑水從小便出萬無一失

知母 貝母 白芨 半夏

天花粉 皂角刺 金銀花 穿山甲

按右方治疔瘡內消專攻之劑

乳香 各一錢

右剉一劑無灰酒一碗煎至半碗去渣只作一

服溫服不得加減再將渣搗爛加秋過芙蓉葉

一兩用蜜調井花水和敷瘡口生如乾再用蜜

水潤濕過一宿自然消不必別用峻利之藥以

伐元氣也

○類聖散 西園公方 治一切疔瘡惡毒腫痛神効

川烏 蒼朮 細辛

白芷 薄芎 防風 甘草 各五錢

右為末鷄子清調塗留頂

○點點金丹 胡前溪傳 治一切疔瘡發背無名腫毒

三月清明將蝦豚收一確用雄黃一兩硃砂一

兩研細末入確內曬之至端午日取出聽用如

搽瘡用藥磨水點上立消

○陶潛膏 治疔瘡腫痛危急欲死者

菊花葉搗爛敷上即甦冬月無花用菊根亦可

○治誤食瘟牛肉生疔毒瘡

白頸蚯蚓八九條搗酒濾食其渣貼四圍患處

留頂

便毒 附魚口瘡 下疳瘡

證 夫便毒者生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發  
寒熱相作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官  
所藏者精與志也男女大慾不能以直遂其志故  
敗精搏血留聚中途而結為便毒矣况其所乃精  
氣所出入之道路也或觸物而動心或夢寐而不  
泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血  
交滯而腫結也初起慎不可用寒涼之藥恐氣血  
愈結而不得宣散反成大患惟當發散寒氣清利  
熱毒使精血宣暢自然愈矣  
陰頭腫痛生瘡者名為下疳也乃督任衝三脉之屬

督脉屬陽任脉屬陰衝脉屬厥陰陽脉主氣陰脉  
主血皆由氣血太熱有毒有風故生此瘡其瘡一  
生則便毒厲風瘡次第而發也先宜升麻葛根湯  
發出其發後服涼血解毒丸即愈不必用輕粉之  
類

下疳瘡乃男子玉莖生瘡皆由所欲不遂或交接不  
潔以致邪毒浸潰發成瘡毒日久不愈或成便毒  
或損爛陽物多致危篤又魚口瘡妬精瘡皆其類  
也俗云疳瘡未已便毒復來生也  
妬精瘡者由婦人陰中先有宿精因而交接虛熱薰



蒸即成此疾初發在陰頭如粟拂之即痛甚兩白  
出清膿作曰孔蝕之太痛婦人有生於玉門內正  
似疔蝕瘡不痛為異耳

○方通直散 治便毒如神

黑牽牛半一錢 大黃三錢 歸尾三錢 甘草節二錢

白僵蠶半一錢 木鼈三箇 穿山甲壁土炒

右剉一劑好酒煎早晨空心服少食至巳時瀉

下膿血便安

○神異散 治便毒魚口瘡

金銀花 天花粉 木鼈子各一錢 連翹

大黃各八分 山梔子七分 穿山甲炒珠 大黃二錢

○立散 木香五分 皂角刺三錢 甘草五分

右剉一劑酒水煎空心服

○通解散 治男子交感強固不泄以致血氣交錯

○百大小便澀滯或肛門腫痛或作便毒癰疽

不黑丑炒搗末 大黃炒 桃仁去皮 官桂

白芍 澤瀉各二錢半 乾薑一錢 甘草五分

○文右剉一劑水煎空心服

○黃芷湯 治魚口瘡

大黃 香白芷各五錢

水煎露一宿次早空心溫服至午後肚痛未成者自消已成未穿者膿血從大便中出

○攻毒散 治魚口瘡

油核桃去肉將蝎子於內火燒存性研末黃酒下出汗如未愈加蜈蚣同燒為末燒酒調服汗出

○百五散 王小巷傳 治魚口瘡初出三五日

紙五倍子炒黃為末入百草霜醋調貼患處一日夜即消

○立消散 治魚口便毒

大蝦蟇一箇剝去皮連腸搗爛入葱五錢再搗

敷腫處却用皮覆貼其上此瘡立刻消散決無遺毒之患也

○瀉肝湯 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或膿潰皮

脫畢丸懸掛及下疳瘡

當歸梢 赤芍藥 生地黃 龍膽草 酒浸炒

防風 黃連 黃栢 知母 酒炒

車前子 澤瀉 甘草梢 各一錢五分

右剉一劑空心水煎服

○珍珠散 焦確齋傳 治下疳瘡

黃連 末 黃栢 末 乳香 沒藥

孩兒茶 輕粉 官粉 煨 五倍子 炒

珍珠 研 象牙 各等分

右為末以米泔水洗淨搽患處

○白金散 治下疳瘡

黃栢分作手指大條慢火炙熱淬猪膽汁中用

二枚每炙每淬汁盡為度研細入輕粉錢餘香

油調敷患處

○鳳凰散 李龍菴傳

燭發

治下疳陰頭生瘡腫痛名蠟 抱過雞卵殼 黃連 輕粉 各等分

各研末均一處香油調搽

○洗疳湯 桑柳南傳

川練子 黃連 瓦松 花椒

葱根 艾葉 各等分

右水煎傾入盆內用青布一塊展洗瘡上立效

楊梅瘡

證 此瘡出自廣地居民多患之不以為異因名曰廣

瘡他鄉之人適感其氣亦即相染其狀紅肥凸出

酷似楊梅故又名曰楊梅瘡有因橫痃下疳而成

者有因宿娼感氣而生者皆屬火證故腥穢觸人

切忌服水銀輕粉等藥以取速効而遺患於後也

方防風通聖散 方見中風 治楊梅瘡初起發表

○三黃敗毒散 治天泡楊梅等瘡

黃芩 黃連 梔子 地骨皮

歸尾 赤芍 川芎 上部瘡多用 五加皮

木瓜 苦參 黃柏 薏苡仁

僵蠶干 蟬退 蒺藜 白蘚皮

○飛燕甘草 皂角刺 木通 下部瘡多用各二兩

土茯苓白者三斤共剉作五十劑每白二服

水煎服忌生鹽牛肉燒酒○瘡痛加羌活獨

活○體虛去梔子加人參茯苓

○郭主簿方 號明川 治楊梅瘡

防風 荆芥 薄荷葉 金銀花

牙皂 角刺 白蘚皮 五加皮

當歸 川芎 地骨皮 薏苡仁

人參 黃芩 牛膝 木通

甘草 各一錢 土茯苓 一兩 白花蛇 三分 水煎服

○神仙湯 秘方 治天泡楊梅瘡兼治發背毒瘡

白芷 防風 牛膝 五加皮

深右方治  
楊梅瘡追  
風收毒永  
除後之患

當歸

連翹

威靈仙

白蘚皮

各一兩

牙皂

木香

皂角刺

明天麻

各三錢

白芷

一劑用三箇

土茯苓

斤二

右剉二十劑水煎早晚各一服服盡除根忌茶

醋菘荳腐雞羊肉

○治楊梅神效方

劉小室傳

何首烏

荆芥

苦參

天花粉

各一兩

肥皂子

四兩打碎炒焦為末

右俱為末合一處每服一錢用土茯苓五兩猪

脂油二兩水六碗煎二碗分作三次服忌牛肉

燒酒茶鐵器

○一粒金丹

桑文臺傳

治楊梅惡瘡又治瘡疾効

砒

以蕎麥麩包灰火煨令焦取出去麩秤一兩

雄黃

硃砂

各一錢半蕎麥錢少一

右為末水煮蕎麥麩糊為丸如豌豆大每十粒空

心涼水下日一服七日効忌熱物

○三三丸

孫北樓傳

治楊梅等瘡

孩兒茶

一分

砒

八釐壯者用一分

輕粉

五分

右為末麩糊為丸如菘荳大分作九服日三

服清茶下三日後無形迹

雄黃敗毒丸

敏所丸傳

雄黃

硃砂

輕粉

孩兒茶

苦參 一兩

○右為末飯丸如梧桐子大每服二十九米湯下

日進二服口噤棗豈湯

回生保命丹

揚西塘傳

治一切楊梅天泡頑瘡

筋骨痛下疳瘡及輕粉毒風癰漏腫毒不拘新

久

當歸

炒二錢

川芎

三錢

白芷梢

三錢

舊槐花

一兩

乳香

五分

沒藥

五分

輕粉

四錢

硃砂

四錢

雄黃

三錢

牛黃

四分

血竭

一錢

孩兒茶

一錢

小丁香

一錢

右為末用紅草粘大米粉打糊為丸如黍米大每服十九又土茯苓四兩牙皂半箇同煎去藥

一日三服忌母猪肉醬醋茶房事

抵金丹

許昌縉紳傳

治一切天泡楊梅及遠年

近日頑瘡

細辛

白芷

麻黃

金銀花

桂枝

當歸

防風

甘草

各一兩

牙皂

十箇

龍骨

火燉

乳香

沒藥

按石方治  
楊梅瘡  
切之劑

孩兒茶

丁香

各二錢 爲末

右前粗藥十味共爲末每服不拘多少以土茯苓煎水去渣入粗藥在內攪勻再煎一二沸取出候溫加後四味末於內再加蜜一筋頭溫服以棗肉爲丸用土茯苓湯頓服亦可

○薰鼻奇方

周梅江傳

治楊梅瘡

水銀

白錫

百草霜

各一錢

右先將錫化開入水銀和勻共研爲末作紙撚丸條每早午晚各一條用紙作罩勿令泄氣薰鼻孔男左女右口噙凉水溫則易之一日薰三

次三百九次全好

○三教歸一

杜東野傳

治楊梅瘡先用表藥後用

此不問遠近一切頑瘡並效

水銀

銀硃

硃砂

各一錢

右共一處研勻用棗去核再研化丸分作兩丸每用一丸置瓦上用炭火四塊將藥居中令患人仰臥縮脚被蓋將口頻吹火燒烟薰之薰後再服解毒藥數次

○金燈照眼

俞貢士傳

白錫

一錢煎化入水

水銀

一錢 乳香

沒藥 白丁香 辰砂 線香

輕粉 各三分 自然銅 錢一分 麝香 三分

右各為細末將皮紙捲條每條七分用香油潤濕燃燈照眼觀燈口含涼水燈用帽匣盛之先要服通聖散十劑照後亦要服十數服如瘡疼宜服乳香沒藥共五分研末調酒服

○身臥烟霞

乳香 沒藥 孩兒茶 雄黃

硃砂 各五分 麝香 三分 水花珠 錢一分 潮腦 一錢

水銀 一錢 黑鉛 一錢 艾葉 三錢 血竭 五分

線香 三根

右共為細末將黑鉛化開水銀入內攪勻冷之一處將藥分作三分艾葉線香亦分作三分為條三根用瓦盛藥條被蓋身體秘密仰身縮脚藥放脚下燒烟薰之避風三五日見風早則生疥未薰之先宜服二黃敗毒散十數劑

○白杏膏 治楊梅瘡

輕粉 一錢 杏仁 七箇 去皮

共搗爛將瘡去痂先抹猪膽汁後塗藥

○千金散



按右方治  
楊梅瘡  
外施之  
劑

○金乳香

沒藥

血竭

雄黃

共杏仁

各五錢

輕粉

孩兒茶

枯礬

各五分

膽礬

三分

麝香

一分

○白右為末先用猪膽汁貼洗後搽藥

○珠粉散

翟散官傳

輕粉

一錢

珍珠

二分

天竺黃

六分

右為細末將瘡用槐條煎湯洗淨後搽藥即愈

○楊梅頑瘡

楊西塘傳

乳香

各等分

沒藥

輕粉

雄黃

銅綠

各等分

治楊梅瘡  
外施之  
劑

右共為末用人乳一鍾熬至半鍾入前藥再熬

令乾搗爛搽上

○香鯨湯治楊梅瘡筋骨痛久不愈者

○登薑茜草

麻黃

烏藥

各一撮

細茶

魚鱉

二錢

用芝麻炒成珠去麻

槐子

炒焦

花椒

各五錢

乳香

一錢

生薑

五片

葱白

五根

右剉一劑水煎一鍾通口服二三劑即愈不發

○黑金散

毛東園傳

治曾服輕粉致筋骨疼痛

當歸

川椒

去目

甘草

細茶

黑鉛

各四兩

按右方治  
楊梅瘡毒  
致筋骨痛  
者

右剉分作十劑水煎服或後入麝香一分

○換骨散 毛東園傳 治天泡瘡筋骨疼痛

○黑金川歸 東園 荆芥 麻黃 梔子

木連翹 天花粉 各一角刺 乳香

○沒藥 錢各半 土茯苓 兩四 正

右剉分十劑水三碗煎一碗二次服之

○登瀛散 治遠年楊梅風漏或筋骨疼痛

○香土茯苓 防風 荆芥 五加皮

白蘚皮 威靈仙 木瓜 各一兩半 生地黃 酒洗

白芍藥 當歸 川芎 白茯苓

川牛膝 杜仲 炒 白芷 地骨皮

青藤 槐花 黃連 各一兩

右剉十劑水一鍾半酒一鍾煎至一鍾瘡在上

食後服在下食前服渣再煎每日一貼煎兩次

○合一處度濃淡得宜作兩次溫服第三次勿煎

逐日晒乾至三貼統煎湯候溫洗浴初服五貼

之內瘡勢覺盛乃毒氣攻外勿懼輕者至十貼

重者至二十貼見奇功忌房事生冷煎燂母雞

鵝羊豬頭蹄鰕魚此皆動氣之物

○蒼耳散 治楊梅瘡已服輕粉愈後手發癬或手

○掌上一層又退一層生生不絕者名鵝掌風

○蒼耳子 金銀花 皂角刺 防風

○荊芥 連翹 蛇床子 天麻

○前胡 土茯苓 牙皂 甘草

○右軍方 治楊梅瘡後鵝掌風 右剉一劑生薑一片川椒一撮水煎不拘時服

○烏藥 五錢 白芷 五錢 雄黃 二錢 硃砂 二錢

○沒藥 乳香 各一錢

○右共為末麩丸如梧桐子大每三十九燒酒送下五七日見効

○玉脂膏 王中城傳 治楊梅瘡愈後鵝掌癬瘡久

○而不瘥一擦如掃

○牛油 柏油 香油 黃蠟 各一兩

○銀硃 半錢 官粉 二錢 麝香 五分

○右為末入內攪勻抹癬上火烤再擦再烤如神

○治梅毒久不愈

○土蜂窩 長脚蜂窩 油松節 三味同燒

○右為末用香油煎滾入黃蠟再煎入藥調如膏

○夾油單紙貼瘡一二日即變白生肌如神

○茯苓湯 敏所兄傳 治遠年久日一切楊梅天泡

○古今醫鑑 卷十五

○

○

○瘡毒甚至腐爛肌肉流膿出汁臭不可聞痛不可忍先服此湯

薏苡仁 皂角刺 木瓜 白芷

當歸尾 生地黃 川牛膝 白芍藥

○黃栢 防風 大皂角 川椒

○紅花 甘草節 羌活 金銀花 二兩

右剉作十劑每十劑和土茯苓四兩同煎空心

服忌茶

○次用照藥 水銀 一錢 黃丹 一錢 血竭 五錢

○王祖廣錫 一錢 京香 三分無麝者 右為細末用艾茸鋪

紙入藥在中捲條放碗內入香油一碗將藥條作燈草照之今病人眼看燈口噙凉水熱則又換將燈入木桶內四圍用單被圍住勿令泄燈氣看照盡藥條為度

○後用丸藥 黃丹 一錢 輕粉 一錢 皮硝 四分

珍珠 三分 花粉 一分 槐花 五分 丁香 一分

當歸 三分 右為末以爛飯為丸如棗莖大

每服三分至五分止白水送下

○如瘡不收口又用貼藥

黃栢 黃芩 黃連 白芨

杏仁俱剉 黃蠟 五錢 入好醋冬青葉同炆  
 取葉貼瘡上先用花椒煎水入鹽少許洗瘡  
 後貼藥

賺瘡

證 夫賺瘡者皆由腎藏虛寒風邪毒氣外攻三里之  
 傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛  
 疼痛臭穢步履艱難此瘡生於賺骨為重以其骨  
 上肉少皮薄故難愈至有多年無已瘡口開闊皮  
 爛肉見臭穢可畏

治法當先取蟲然後敷貼仍宜內服蠟礬之類須翹

足端坐勿多行履庶可全愈矣

方黃白散

治賺瘡濕毒及遍身熱瘡

黃栢 一兩 輕粉 三錢

右為末用猪膽汁調塗濕則乾摻

○三香膏

趙古松傳

治遠近賺瘡潰爛至骨疼痛

乳香 二錢 松香 三錢

右為細末用真香油調用艾箬葉密密刺孔將  
 藥攤在上用箬葉貼患處藥居中上用完箬葉  
 蓋之帛扎住登時止痛

○夾紙膏

張會山傳

治賺瘡頑瘡

○大松香 黃丹 草麻子 去殼各等分

右為末用香油調隔油紙攤藥夾紙中貼患處

○石村劉大尹膏

芝麻油四兩銅鍋內煎出入葱白三根煮黑色

取出入川椒去目一兩煮黑色濾去入青鹽末

○一兩以槐枝十根各長一尺合攪焦一節截去

一節以盡為度後入白礬一兩黃蠟五錢煎良

久傾碗內成膏每以油單紙夾膏一匙於中以

○銀針刺之密密多孔先以濃茶洗瘡口貼膏於

上反覆轉換時得之痛止用一二帖立效年深

者不過五七帖存其膏久久益效

○又方 劉川州傳

香油一兩鐵杓煎入黃蠟五錢化開用銅線三

錢研極細末將銅錢擦末徐徐入鐵杓內作五

十餘次入將前銅錢別放碗裏將藥傾入碗內

冷定將瘡洗淨用鹽一塊如瘡大攤藥於上勤

放患處一日一換時要洗淨

疥瘡

方諸瘡一掃光 四九兄傳

癢痒疼痛神效

治風癬疥癩坐版血風

蛇牀子 五錢炒 大楓子 去殼五錢 水銀 二錢

白錫 一錢 加枯礬 一錢 右先將錫化開次

入水銀攪勻後入上二味研勻用柏油調搽

○一上散 王少泉傳 治疥瘡

枯白礬 一兩 疏黃 七錢 人言 三分 五倍子 五錢

花椒 五錢

右為末香油煎雞子冷熟去雞子以油調搽

○香疥藥 鄭中山傳

○大楓子 去殼三十箇 太鼈子 去殼三十箇 蛇狀子 五錢

杏仁 三十箇 川椒 四錢

○枯礬 三錢 朝腦 三錢 輕粉 一錢 人言 一錢

右各另為末合勻入柏油二兩搽瘡

○鐵掃帚 徐鯉川傳 治疥癬血風諸瘡癢痒難當

硫黃 不拘 人言 少許 二味為末入白蘿蔔內

火燒存性取出研細末聽用另用香油四兩入

雞子三箇煎熟去雞子不用再入花椒四兩油

內煎至焦黑去椒不用用香油調藥搽患處

○玉綉毬 周後峰傳 治疥瘡

水銀 一錢 枯礬 五分 樟腦 一錢 大楓子 二十箇

花椒 五分 柏油 五錢

右共研不見水銀星火炙擦之

○薰疥藥

艾葉

核桃殼 雄黃

人言 少許

右為末捲作筒燒烟薰之

○洗疥藥

防風

荆芥

白礬

馬鞭草

苦參

花椒

野菊花

水煎頻洗

○又方

吳非源傳

蒼朮

皮硝

等分水煎洗愈後永不發

○仙子散

治遍身瘡疥經年舉發者

苦參

威靈仙

蔓荆子

何首烏

荆芥

右各等分為細末每服二錢食前酒

調服日二三服忌發風物

○疥靈丹

白芷

枳殼

連翹

白蒺藜

羌活

梔子

當歸

荆芥穗

苦參

糯米泔浸  
日晒乾二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每五十九滾水下

癬瘡

方必效散

黃賓江傳

治風濕癬瘡并年久頑癬

古今醫鑑

卷十五

長



川槿皮 四兩 斑猫 一錢 半夏 五錢 木鼈子 去殼 五錢

栴榔 五錢 雄黃 三錢 白砒 一錢

右俱切成片另將雄砒細研共合一處用井水

一碗河水一碗浸晒三日露三夜將藥水用鷺

翎掃疥上發百中

○立應膏 劉水山公傳 治風癬瘡

象皮 燒灰 紅棗 燒灰 針末 黃栢末

熟皮烟 三黃丹 研 輕粉 研 大楓子 去殼

右各等分爲細末煉香油調膏塗癬上

一女子兩股間濕癬長四五寸發時極痒痒定極痛

乃以利針當痒時於癬上刺百餘下其血出盡鹽

湯洗之如此三四次方除蓋濕淫於內其血不可

不礙後服浮萍散出汗

○浮萍散 治諸風疥癬癩瘡

浮萍 四兩 當歸 白川芎 赤芍藥

荆芥 麻黃 甘草 各二錢

右剉二劑葱白二根豆豉五六十個煎至八分

熱服出汗

○治鷺掌風癬有蟲吃開 羅岑樓傳

黃丹 輕粉 各三錢 猪臟頭燒油調搽

癩瘡

方

桃梅煎

陳白堊方

治癩頭瘡

桃枝

連葉七枚長四寸搗碎

烏梅

七個打碎

白礬

研一錢

胡椒

研末一錢

川椒

研末一錢

右用香油二兩煎至一兩每早擦一次

○陀僧散 治小兒頭上白癩瘡

○鴉鵲糞

炒研末

蜜陀僧

花椒末

各一錢

硫黃

一錢

人言

半分

右為末香油調搽晚間洗去

○香粉散

俞九河傳

治小兒頭上肥瘡

松香

枯礬

川椒

各五分

水粉

三分

右為末實放葱內扎在兩頭白水煮沸用時去

葱皮擦患處

○皂礬散

賈醫官傳

治癩頭白癩瘡

先用退殺猪湯洗瘡令淨用赤皮大蒜白三條

三寸長劈開裝入皂礬每一條入礬一錢用紙

包裹煨熟揉擦頭瘡即愈其髮即長矣

○神鴈膏

陳小軒傳

治白癩頭

羊糞燒黑枯存性為末鴈油調搽一二次即愈

○治肥瘡黃水瘡

紅棗燒灰 枯礬 黃丹 松香各一錢

官粉五分 銀硃三分

右為末乾則香油調搽濕則乾擦之

**癩風**

**方** 蜂房散余靈泉傳 治白癩風

露蜂房一個將生鹽築滿諸孔眼火燒存性

去鹽後用膽礬天花粉蟬退各等分俱為細

末均分用紙包三分將活鯽魚一對同酒煮

六熟無風處細嚼連刺飲酒後痒身上而下趕

入四肢

○金櫻丸懷園叔傳 治白癩風

苦參一觔 何首烏半觔 胡麻仁一兩 牛蒡子酒炒

蔓荆子兩 白蒺藜二兩 蒼耳子一兩 蛇床子酒炒

牛膝酒洗 肉苁蓉二兩 蒼朮酒製 兔絲子酒製

金櫻子酒炒

右為末麪糊為丸如梧桐子每服七十九溫酒

送下

○三黃散 治白癩風

雄黃各五錢 硫黃各五錢 黃丹 天南星各三錢

枯礬 蜜陀僧各三錢

右為末先以薑汁擦患處薑蘆藥擦後漸黑  
次日再擦黑散則無恙矣

○治白癩風

硫黃

生白礬

等分

用絹包水煮一日搽

○治紫癩風

官粉

五錢

硫黃

三錢

為末雞清調搽

○治赤白汗斑

劉進士傳

雄黃

硫黃

全蝎

僵蠶

白附子

蜜陀僧

各五分

麝香

二分

○金

右為末蘆生薑於患處擦之五日除根決效

諸瘡

方隔蒜灸法

治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如

痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散

○蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法也

用大蒜頭去皮切三文錢厚安瘡頭上用艾壯

於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成

者亦殺其太勢不能為害如瘡大用蒜搗爛攤

患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作

膿及不起發或因瘡尤宜多灸灸而仍不痛不

作膿不起發者不治此氣血虛之極也

○葱熨法 治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋掣骨痛又治流注跌撲傷損腫痛杖打刺痛及婦人吹乳乳癰陰證腹痛手足厥冷  
 葱頭細切杵爛炒熟敷患處冷則易之再熨腫痛即止其效如神

○豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡  
 江西淡豆豉為末唾作餅子如錢大厚如三文置患處以艾壯於餅上炙之乾則易之如背瘡

用漱口水調作餅覆患處以艾鋪餅上炙之如未成者即消已成者能消其毒如有不效者氣血虛敗也

○洪寶丹 西園公方治一切腫毒散血消腫治湯盪火燒金鎗打撲出血不止如神

天花粉三兩 白芷二兩 赤芍藥二兩 鬱金一兩  
 右為末熟用茶調冷用酒調塗患處○如衄血不止水和塗後項上最能絕血路

○隔紙膏 兩川叔傳治一切惡瘡腫毒頑瘡  
 雞屎炒一兩 松香生一兩 百草霜八錢 雄黃五分

枯礬 四分

○右為末香油調用傘紙貼患處攤藥於紙上再將原紙返展蓋住

○神捷膏 鄭中山傳 治諸般頑瘡及內外膿瘡久年

不愈者香油半筋先煎入黃蠟一兩松香五錢慢火熬至滴水成珠不散為度取出候冷加後

藥

乳香 三錢 沒藥 三錢 輕粉 三錢 血竭 三錢

孩兒茶 三錢 枯礬 三錢 龍骨 三錢 火煨川椒 四錢

右為細末攪入煎膏內磁器收貯若遇頑瘡先

用花椒細茶艾葉濃煎水頻頻溫洗令淨却用油紙以封刺孔比如瘡口大俱刺遍傷藥將孔面貼瘡上一日換三次二日後換一日一次每換藥必須洗淨方貼效

○斂瘡止痛生肌散 杜桐岡傳 治諸瘡及癰疽黃水

熱泡等瘡

官粉 火煨黃 色一錢

乳香 五分

右為末摻患處

黃栢 末一錢 黃連 末五分

沒藥 五分 孩兒茶 五分

○解毒散 黃賓江傳 治諸瘡腫毒並喉閉赤眼暴發

○癩疼痛

雄黃 三錢 白礬砂 三錢 銅粉 微火炒

膽礬 六錢 打碎先炒 白色再炒紫色

右共為細末治瘡或將燒酒或吐津抹濕瘡上

將末藥着指磨上立消○治眼用津抹濕服胞

將藥抹之立消喉閉吹喉中

○退風解毒湯 兩川叔傳 治血風瘡并濕熱生微其

形如釘高起寸許者

連翹 黃芩 梔子 黃柏

防風 荆芥 羌活 獨活

全蝎 殭蚕 蒺藜 金銀花

威靈仙 歸尾 赤芍 甘艸

右剉各等分水煎服

○寸金黃 劉甘泉傳 治一切紅腫熱毒瘡癩

黃連 黃芩 黃柏 大黃

皮硝 青黛 白礬 五倍子

右各等分為末雞清調搽

王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之十五終

王字家次生信爾古今醫鑑卷之十五

水谷等公品米糖散

式部 青 白 五 計 子

黃 黃 大 計

○何金黃

三三三

三三三 禮 甘

全 監 金 監 非



