

醫方類聚卷之二百八

婦人門三

調經三

聖惠方二

治婦人赤白帶下諸方

夫婦人帶下者由勞傷過度損動經血致令

體虛受於風冷風冷入於胞絡搏其血之所

成也衝脉任脉為經脉之海任之為病女子

則帶下而手太陽為小腸之經也手少陰心



經也手少陰心之經也心為藏主於裏小腸為腑主於表北一脛之血在於婦人上為乳汗下為月水衝任之所口也衝任之脉既起於胞內陰陽過度則傷胞絡故風邪乘虛而入於胞損衝任之經傷太陽少陰之血致令胞絡之間穢液與血相兼帶而下冷則多白熱則多赤故名赤白帶下也

治婦人帶下赤白無問遠近皆羌宜服桑耳散方

桑耳一兩 丹參一兩 續斷三分 芎藭三分 栝葉三分

炙微 熟艾三分 鹿茸壹兩 去毛塗黃 牡蠣

一兩 燒地榆三分 阿膠壹兩 小薊根三分

龜甲壹兩 塗醋赤石脂 當歸三分 熟

乾地黄兩 柎葉兩 牛角鯁壹兩 炙

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治婦人赤白帶下經年不差漸漸黃瘦熟乾地黄散方

熟乾地黃壹兩 白芍藥兩 牡蠣壹兩 燒乾

薑三分 炮白芷三分 附子壹兩 炮製壹兩 桂心壹兩

黃耆壹兩 龜骨兩 龜甲壹兩 龜甲壹兩 芎藭壹兩

右件藥擣細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治婦人赤白帶下日夜不止身體黃瘦不思

飲食艾葉散方

艾葉壹兩 阿膠壹兩 龜骨壹兩 附子三

炮裂大 芎藭三分 當歸三分 熟乾地黃壹兩

皮臍大 芎藭三分 當歸三分 熟乾地黃壹兩

半吳茱萸半兩 湯浸七 赤石脂兩 硫黃叁

細縮沙半兩 去皮

右件藥擣細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人赤白帶下桑耳散方

桑耳壹兩 白芍藥三分 黃耆叁分 肉苳蔻壹

去散 阿膠壹兩 熟乾地黃壹兩 當歸壹兩

炒蒲黃兩 桔梗壹兩 去

右件藥擣細羅為散每服食前以粥飲調

下二錢

治婦人血氣不和赤白帶下牛角鯁散方

牛角鯁參兩燒灰桂心半兩當歸半兩微炒判牛膝半兩

苗去

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下二錢

治婦人腹藏冷熱相攻心腹音絞疔痛腰間

時疼赤白帶下面色萎黃四肢羸乏黃耆丸

方

黃耆壹兩龍骨壹兩當歸壹兩判壹兩桑寄生壹兩

鹿茸二兩去毛塗地榆壹兩乾薑三分炮

木香壹兩代赭壹兩白石脂壹兩赤石脂壹兩人參

壹兩去艾葉壹兩微炒芎藭壹兩卷柏一兩半訶

黎勒皮壹兩熟乾地黄壹兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以煖酒下三十九

治婦人赤白帶下不止鹿茸丸方

鹿茸壹兩半塗桑耳壹兩半微炒鹿角膠壹兩

碎炒令乾薑壹兩半牛角鯁壹兩半赤石
 黃燥炮裂制脂一兩白竜骨一兩艾葉半兩附子壹兩棗
 右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大
 每於食前以黃耆湯下三十丸

治婦人赤白帶下連年不羊綠礬丸方

綠礬一兩釜底墨壹兩烏賊魚骨壹兩

右件藥同研爲末以粟米飯和丸如梧桐
 子大每於食前以煖酒下十五丸

又方白芍藥壹兩艾葉壹兩乾薑壹兩

右件藥搗羅爲末以軟餅和丸如梧桐子
 大每於食前以粥飲下三十丸

又方牛角鯁二兩馬芹子壹兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下三錢

治婦人帶下赤白年月深久不差方

凌霄花壹兩熟乾地黃各二兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下三錢

治婦人赤帶下諸方

夫婦人赤帶下者是勞傷血氣損動於衝脉任脉故也衝任為經脉之海小腸者心之腑此之經俱主於血下為月水也若經脉傷損衝任氣虛不能約制經血則與穢液相兼而成帶下然五藏皆稟血氣其色則隨藏不同心藏之色赤今心氣虛損故帶下而赤色也治婦人赤帶下不止令人體瘦心煩生乾地黃散方

生乾地黃壹兩 茜根壹兩 黃芩壹兩 當歸壹兩
炒地榆壹兩 甘草半兩炙 微赤剉

右件藥搗為散每服四錢以水壹盞入竹茹壹分煎至六分去滓每服食前溫服

治婦人赤帶下腹內疴痛四肢煩疼不欲食飲日漸羸瘦宜服阿膠散方

阿膠半兩 當歸半兩 赤芍藥半兩
炒令黃燥 微炒 熟
乾地黄半兩 牡蠣半兩 為粉 燒

右件藥搗細羅爲散不計時候以粥飲調
下二錢

治婦人赤帶下方

龍骨壹兩當歸壹兩白礬壹兩燒

右件藥搗細羅爲散每於食前以艾湯調

下二錢

又方熟乾地黄半兩牡蠣半兩燒艾葉半兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人赤帶下不止玳瑁丸方

玳瑁兩騏驎竭兩乳香兩沒藥兩故錦灰

參續斷兩安息香兩

右件藥搗羅爲末以蜜及安息香熬鍊和

諸藥末丸如棗豆大每於食前以溫酒下

二十丸

又方赤芍藥兩熟乾地黄兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下二錢

又方桑樹東南枝白皮壹握日出前取之

右細擘分爲三服每服以酒壹中盞煎至六分去滓每於食前溫服

治婦人白帶下諸方

夫婦人白帶下者是勞傷血氣損動衝任之脈衝任之脈皆起於胞內爲經脈之海若衝任氣虛不能約制經血則血與穢液相兼而成帶下然五藏皆稟血氣其色則隨藏不同肺藏之色白帶下白者是肺藏虛損故也

治婦人白帶下腰膝疼痛龜甲散方

龜甲壹兩塗醋炙令微黃當歸壹兩剉微炒桑耳三分人

參三分去蘆頭狗脊半兩去毛禹餘糧壹兩燒醋白

石脂二兩吳茱萸半兩湯浸七栢葉一兩白

芍藥半兩桑寄生半兩桂心半兩厚朴一兩去麤皮塗生薑

汁炙令香熟

右件藥搗細羅爲散每於食前以粥飲調下二錢

治婦人風冷傷於衝任之脈經絡虛損致成

白帶下桑黃散方

桑黃壹兩 鮑甲壹兩 當歸叁分 烏賊壹兩

魚骨壹兩 白芍藥壹兩 禹餘糧二兩 乾壹兩

薑叁分 吳茱萸叁分 白石脂壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人白帶下不止面色萎黃遶臍冷痛鹿

角膠散方

鹿角膠壹兩 白竜骨壹兩 桂心壹兩 當歸壹兩

附子二兩 白朮壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方牡蠣壹兩 當歸壹兩 龜甲壹兩

黃白馬蹄屑壹兩 白石脂二兩 乾薑壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以艾葉湯

調下二錢

治婦人久冷白帶下臍腹痛竜骨散方

白龍骨兩壹 烏賊魚骨壹兩半 白芍藥叁分

歸壹兩判 禹餘糧二兩燒醋 桂心兩壹 熟乾

地黃半兩 吳茱萸半兩湯浸七 乾薑半兩

判 右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調

下二錢

治婦人白帶下腹內冷痛肉荳蔻丸方

肉荳蔻一兩 附子二兩炮裂 白石脂二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以熱酒下三十丸

又方禹餘糧二兩燒醋 龍骨二兩 乾薑壹兩炮

附子一兩炮裂 右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如桐梧子大

每於食前以溫酒下三十丸

治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛

困礪砂丸方

礪砂壹兩 白礬半兩 乾薑半兩炮 川烏頭

壹兩生 去皮臍

頭

頭

頭

頭

頭

頭

右件藥搗羅爲末醋煎爲膏丸如菉豆大
每於食前以溫酒下十九

又方白礬灰二兩附子二兩炮裂狗頭骨灰一兩

右件藥搗羅爲末以軟餅和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下三十九

又方白芍藥壹兩半栢葉六兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下二錢

又方乾薑一兩炮禹餘糧二兩燒醋阿膠一兩

搗碎炒
令黃燥

右件藥搗細羅爲散每於食前以粥飲調

下二錢

又方蛇床子壹兩白芷壹兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以粥飲調

下二錢

又方白蜀葵花五兩

右搗細羅爲散每於食前以溫酒調下壹

錢如赤瘳下亦用赤花四時纂要○肘後方

以白葵花壹兩陰乾為末空心溫酒下三錢
錢匕如赤帶下用赤花衛生易 縮方同

治婦人滯下五色諸方

夫婦人滯下五色者由勞傷血氣損動衝脉任脉致令其血與穢液兼滯而下也衝任之脉為經脉之海經血之行內榮五藏五藏俱虛損者故其色隨穢液而下為滯下五色也

治婦人滯下五色無問新舊桑耳散方

桑耳一兩參叁分續斷叁分芎藭三分栢葉叁分

微艾葉參分阿膠二分擣碎壹兩燒
鹿茸一兩去毛塗壹兩地榆一兩刺薊壹兩龜甲壹兩
壹兩塗醋壹兩赤石脂壹兩當歸壹兩熟乾地壹兩
炙微黃壹兩牛角鯁貳兩櫛葉壹兩
右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治婦人滯下五色四肢黃瘦心煩食少栢葉散方

栢葉壹兩牛角鯁貳兩燒灰貳兩芎藭叁分禹餘糧貳兩

燒醋淬 黃耆壹兩 白芍藥分 龍骨兩 白朮兩
七徧 參 枳殼壹兩 麩炒分

右件藥擣細羅為散每於食前以溫酒調
下二錢

治婦人滯下五色久不止阿膠散方

阿膠壹兩 擣碎 鹿茸二兩 去毛塗 禹餘糧二兩 牡蠣二兩 燒 當歸壹兩 剉 白芍壹兩 烏賊魚骨壹兩 半 蒲黃兩 赤石脂兩
右件藥擣細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治婦人滯下五色臍腹痛漸加黃瘦不能

飲食四肢少力禹餘糧丸方

禹餘糧二兩 燒醋 白芍藥兩 桑鵝壹兩 半
黃連壹兩 艾葉壹兩 芎藭分 當歸二兩 剉
川大黃貳兩 剉 生乾地黄兩 白龍骨兩 阿膠壹兩 擣碎

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸
如梧桐子大不計時候以溫酒下三十九

治婦人癩下五色久不差漸加黃瘦鹿茸丸方

鹿茸壹兩去毛塗白芍藥三分桑鵝壹兩黃

連一兩艾葉一兩芎藭壹兩當歸壹兩阿膠壹兩

膠貳兩黃燥禹餘糧壹兩燒兩兩右件藥搗羅為末鍊蜜和膏三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治婦人癩下五色腹痛羸瘦食少當歸丸方

當歸壹兩鼈甲壹兩醋炙川大黃兩

微炒白朮三分胡椒兩訶梨勒皮三分檳榔分

枳殼三分麩炒葦芩兩右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治婦人癩下五色久不止臍腹下痛續斷丸方

續斷叁分丹參叁分當歸叁分白芷兩艾葉

微炒阿膠叁分桑寄生叁分馬蔞花兩

右件藥搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧

子大每於食前以溫酒下三十九

治婦人癩下五色久不差漸加黃瘦鹿茸丸方

鹿茸壹兩去毛塗白芍藥三分桑鵝壹兩黃

連一兩艾葉一兩芎藭壹兩當歸壹兩阿膠壹兩

膠貳兩黃燥禹餘糧壹兩燒兩右件藥搗羅為末鍊蜜和膏三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治婦人癩下五色久不止臍腹下痛續斷丸方

桐子大每於食前以温酒下三十九

又方當歸壹兩剉蘿蔔子壹合微炒

右件藥擣羅為末用軟餅和丸如菜豆大每於食前以温酒下二十九

又方早蠶出蛾絲二兩蛇床子末叁分麝香壹錢

右件藥同研如粉每於食前以温酒調下一錢

治婦人久赤白帶下諸方

夫婦人氣血不足勞逸過度胞絡傷損任衝

氣虛不能約制經血與穢液相兼而下然五藏皆稟氣血其色則隨藏不同今心肺二藏但虛損故令下赤而挾白色往來不斷或發或歇經於歲月故謂之久赤白帶下也
治婦人久赤白帶下腰腿疼痛面色萎黃四肢少力龜甲散方

龜甲一兩半醋塗炙令黃桑耳一兩微炙當歸壹兩剉烏

賊魚骨壹兩燒灰白芍藥叁分禹餘糧二兩燒醋

栢葉壹兩微炙吳茱萸半兩湯浸七桑寄生壹兩

芎藭叁分

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

治婦人久赤白帶下臍腹冷痛腰膝麻疼附子散方

附子壹兩炮裂去皮臍當歸壹兩剉微炒桂心壹兩硫黃

壹兩細研硃砂壹兩白礬灰一兩鹿角尖屑壹兩炒黃

禹餘糧一兩燒醋淬七遍

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下一錢

治婦人久赤白帶下不差羸困菰蘆散方

菰蘆壹枚并皮細剉白礬壹兩研碎消石壹兩硫黃壹兩研碎

已上菰蘆白礬二味於銚子內炒令黑色

然後入消石硫黃又同炒令相入為度

禹餘糧二兩燒醋淬七遍狗脊去毛半兩麝香壹錢細研

右件藥都細研為散每於食前以溫酒調

下二錢

又方白芍藥叁分乾薑半兩炮裂剉地榆壹兩剉白礬

二兩燒
汁盡

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調
下二錢

治婦人久赤白帶下胞中有積滯川大黃散
方

川大黃壹兩剉 川朴壹兩 當歸壹兩剉 蜜

蟲一分微炒 桃人一兩湯浸去皮尖 桂心

兩半

右件藥搗細羅為散每於空腹以溫酒調

下二錢

治婦人久赤白帶下臍腹冷連腰痛面色黃
瘦不思飲食禹餘糧丸方

禹餘糧二兩燒醋 白石脂貳兩 鼈甲壹兩塗

黃去當歸壹兩剉 狗脊三分 白芍藥叁分 白

朮一兩 附子一兩炮裂 桑寄生壹兩 栢葉壹兩

厚朴壹兩去麤皮塗生 乾薑壹兩炮 吳茱

黃半兩湯浸七 編焙乾微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

類聚三

如梧桐子大每於食前以熱酒下三十九

○和劑局方治婦人帶下久虛胞絡傷敗

月水不調醫方大成集成南北經驗方漸

成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰

膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不

思飲食桑寄生當歸夫蘆微炒○簡栢葉

微炒附子炮去鼈甲醋浸去厚朴去蘆皮乾

薑炮白朮各一兩○澹寮方去白芍藥

狗脊去毛各吳茱萸易先七次白石脂簡

方別研集 禹餘糧燒醋淬七遍右為細末

煉蜜和圓如梧桐子大每服三十圓簡易

寮方五 溫酒或米飲下空心食前服管見

同良方

治婦人久亦白帶下臍腹冷痛川椒丸方

川椒二兩去目及閉艾葉壹兩乾薑壹兩

剉白石脂貳兩芎藭叁分阿膠一兩擣碎熟乾

地黃二兩伏竜肝壹兩細

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

類聚三百八

十八

如梧桐子大每於食前以熱酒下三十丸
治婦人久赤白帶下阿膠丸方

阿膠貳兩搗碎綠礬壹兩燒赤白石脂兩貳釜底

墨貳兩烏賊魚骨壹兩燒灰

右件藥搗羅為末用軟飴和丸如梧桐子

大每於食前以熱酒下三十丸

又方白礬叁兩燒汁盡釜底墨貳兩烏賊魚骨壹兩燒灰

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下三十丸

又方白芍藥兩赤石脂兩乾薑壹兩炮裂剉

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

夫下二錢

又方蕭竹葉切貳合赤車使者

右件藥以酒二大盞煎至壹盞去滓分為

三服食前服之

又方凌霄花兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治婦人赤白帶下年月深遠日漸羸瘦起止不得宜服此方右取刺筋根不限多少曝乾秤每壹斤以童子小便五升浸一復時曝乾擣細羅為散每日空心及晚食前以温酒調下二錢

治婦人崩中下血不止諸方

夫婦人崩中者由藏腑傷損衝脉任脉血氣俱虛故也衝任之脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮藏腑若無傷損則陰陽巢氏病源

腑平而氣血調適經下依時若勞動過度致藏腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然暴下謂之崩中診其寸口脉微遲尺脉微絃寸口脉遲為寒在上臆但吐爾今尺脉微絃如此即小腹巢源痛引腰脊痛者必下血也

治婦人崩中下血不止心神煩悶頭目昏重

熟乾地黄散方

熟乾地黄壹兩 甘草半兩炙 蒲黃半兩 蟹爪半兩

貳合 白茯苓 參桂心 參阿膠 壹兩 燒碎 白
微炒 芍藥 參當歸 參分 剉 伏龍肝 參熟布 參兩
分 右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中
 蓋入竹茹壹分煎至六分去滓不計時候
 温服

治婦人崩中下血不斷淋瀝連年不絕黃瘦
 白芍藥散方

白芍藥 壹兩 牡蠣粉 壹兩 熟乾地黄 兩 白朮 參
 騏驎竭 參 栢子人 參 烏賊魚骨 壹兩 附子 壹兩

壹兩 炮裂 桂心 兩 黃耆 壹兩 龍骨 壹
去皮 臍 右件藥搗細羅為散每於食前以温酒調
 下二錢

治婦人崩中下血不絕小腹疼痛騏驎竭散
 方

騏驎竭 壹兩 禹餘糧 壹兩 地榆 壹兩
半 黃蘗 二分 赤芍藥 壹兩 生乾地黄 兩
炙 剉 右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調
 下二錢

治婦人崩中下血數升氣欲絕宜服椶櫚散方

椶櫚參兩燒灰兩紫參一兩麝香二錢伏竜肝貳兩

右件藥搗細羅爲散入麝香研令勻不計

時候以熱酒調下二錢

治婦人崩中下血不止心胃虛悶狼牙散方

狼牙草貳兩訶梨勒皮參分白芍藥參分白朮參分

黃耆參分

右件藥搗麩羅爲散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候温服

治婦人崩中下血經七八日不定或作血片

或如豆汁腹內疴刺疼痛阿膠散方

阿膠一兩搗碎炒令黃燥訶梨勒皮一兩乾薑參分

附子參分炮裂去皮臍蜜陀僧半兩椶櫚貳兩補

骨脂參分微炒

右件藥搗細羅爲散不計時候以熱酒調

下二錢

治婦人崩中下血不止牛角鯁散方

牛角鯁二兩燒灰 白礬二兩燒汁盡 橡實壹兩木賊壹兩

芎藭壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下二錢

治婦人崩中下血不止遶臍振振疼痛或時

心煩伏龍肝散方

伏龍肝壹兩細研 騏驎竭半兩 椶櫚貳兩燒灰 地榆壹兩

剉龍骨一兩當歸壹兩剉 白芍藥壹兩熟乾地

黃禹餘糧二兩燒醋七徧

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下二錢

治婦人崩中下血不止菴藥散方

白菴藥壹兩細研 栢葉壹兩微炙 栢樹細枝壹兩剉

茜根壹兩剉

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下二錢

治婦人崩中下血不止漸加虛困黃瘦桑耳

散方

桑耳二兩 茜根壹兩 阿膠壹兩 搗碎熟乾

地黃二兩

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調

下二錢

又方椶櫚皮二兩 晚蠶沙叁分 麝香壹錢

右件藥同細研為散不計時候以熱酒調

下二錢

又方寒食麪壹匙 雀兒糞壹兩 乾薑半兩 炮

末

右件藥用醋一中盞熬下二味如膏入炒

麪和丸如小豆大每服不計時候以溫酒

下十丸

治婦人崩中下血不止方

烏梅二七枚 去核壹 椶櫚二兩 乾薑三分 炮

右件藥搗細羅為散每服粥飲調下二錢

又方側柏葉壹兩 芫花壹分 醋拌 大麻根壹

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人崩中下血不止綠雲散方婦人大全良方名如

聖無此散

晚蠶沙壹兩伏龍肝兩半

右件藥擣細羅為散研令極細不計時候

以溫酒調下一錢良方二錢七

治婦人崩中下血不止通神散方

菝葜壹兩蛇床子壹兩木賊壹兩桑鵝壹兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

又方杉木節壹兩燒灰壹張蠶紙壹張燒灰

右件藥細研為散每服不計時候以粥飲

調下二錢

治婦人崩中下血晝夜不止方

芎藭壹兩

右以酒壹大盞煎至五分去滓入地黃汁

二合更煎三兩沸食前分為二服肘後方王氏集

驗方

又方阿膠一兩擣碎蛇麻子三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下壹錢

治婦人崩中下血不止頭目暈悶心神煩熱宜服此方

晚蠶沙壹兩白堊壹兩

右件藥搗細羅研為散每服不計時候以

溫酒調下壹錢

又方櫻櫚五兩麝香二錢

右件藥同細研為散每服不計時候以溫

酒調下三錢

治婦人崩中下五色諸方

夫婦人崩中之病者是傷損衝任之脉衝任

之脉皆起於胞內巢氏病源此下若勞傷過

度衝任氣虛不能統制經血故忽然崩下謂

之崩中五藏皆稟氣血五藏之色各藏不同

傷損之人五藏皆虛者故正色隨崩俱下其

狀白崩形如涕赤崩如紅藍汁黃崩形如爛

瓜青崩形如藍色黑崩形如豆汁與血色相

雜而下也巢源黑崩形如乾血色

治婦人崩中下五色及下血或月水不調側
栢散方

側栢貳兩黃耆一兩地榆壹兩赤芍藥壹兩

吳茱萸中兩湯浸七牛角鯁貳兩半兩禹餘

糧貳兩煨貳兩代赭壹兩

右件藥擣細羅為散每於食前以溫酒調
下一錢

治婦人崩中下五色或赤白不定或如豆汁

久不止令人黃瘦口乾虛煩不食伏龍肝散
方

伏龍肝壹兩甘草半兩炙壹兩赤石脂壹兩芎藭叁分

桂心兩當歸叁分剉熟乾地黃貳兩麥門冬兩

壹兩半艾葉貳兩乾薑叁分炮裂

右件藥擣麝羅為散每服四錢以水壹中
盞入棗二枚煎至六分去滓不計時候溫
服○和劑局方治氣血勞傷衝任脉虛經
血非時忽然崩下或如豆汁或成血片或

五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未
止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛

煩驚悸伏竈肝即竈中土赤石脂各壹兩肉桂去

皮甘草炙各半兩○簡熟乾地黄壹本及

全良方酒艾葉各貳兩○壹本及簡易方

浸壹宿炮○簡易當歸去蘆炒各叁分○

兩乾薑方叁兩簡易當歸簡易方酒浸到略

炒叁麥門冬去心焙壹兩半○簡易方門

兩成壹芎藭兩叁右為麤散每服四錢寶鑑水壹盞半大成

入棗三枚拔粹方擘破煎至七分去滓食

前溫服醫方集成南北經驗方袖珍方永

治氣血勞傷玉機微義治氣血勞傷衝任

四肢無力經虛血非時崩下臍腹冷痛脉遲弱食少

或赤白帶下伏龍肝赤石脂麥門冬各壹

甘草炙半兩川芎三兩當歸七錢桂半兩艾

葉叁兩熟地黄貳兩右件為粗末每四錢入棗

煎

治婦人崩中下五色及產後餘疾宜服艾葉

散方

艾葉叁分丹參叁分熟乾地黃壹兩黃耆壹兩

半芎藭壹兩忍冬壹兩地榆壹兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人崩中下五色或赤白不止粿葉散方

檉樹葉叁兩甘草壹兩麥門冬二兩乾

薑一兩炮裂剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人崩中下五色或赤白不止四肢虛困

腹中時痛牛角鯁散方

牛角鯁貳兩燒灰龍骨壹兩當歸叁分剉禹餘糧

貳兩燒醋乾薑半兩炮熟乾地黃壹兩阿

膠貳兩燒碎續斷壹兩甘草半兩炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

治婦人崩中下五色不止諸藥無効宜服鱘甲散方

鱘甲貳兩塗醋烏賊魚骨一兩燒灰龍骨壹兩

母粉貳兩鯉魚鱗貳兩燒灰白朮一兩肉桂日兩去

白殭蠶叁分微炒代赭貳兩伏竜肝貳兩乾薑一兩炮裂

判芎藭貳兩蝟皮壹兩炙微焦黃白堊壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢

治婦人崩中下五色惡物去來不斷宜服騏驎竭散方

騏驎竭壹兩芎藭一兩艾葉貳兩微炒竜骨二兩烏賊

魚骨貳兩燒灰禹餘糧貳兩燒醋伏竜肝二兩阿

膠一兩半搗碎炒令黃燥熟乾地黄一兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治婦人崩中下五色心煩腹痛宜服此方

竜骨貳兩乾薑叁分炮裂白芍藥叁分烏賊魚骨

壹兩艾葉壹兩熟乾地黃兩貳
燒灰微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以赤
糙米粥飲調下二錢

治婦人崩中下五色久不止龍骨丸方

龍骨一兩烏賊魚骨叁分白芍藥兩半鹿茸兩壹

大毛塗斷熟乾地黃兩壹側柏貳兩乾薑兩壹

炙微黃
半兩炮裂到

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

又方牛角鯁貳兩乾薑半兩炮龍骨兩壹

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人崩中下五色不止令人黃瘦心煩不

食禹餘糧丸方草壹兩陳蒲州壹兩

禹餘糧壹兩燒醋兩七白石脂兩壹龍骨兩壹當歸

叁分芎藭叁分桂心兩半附子叁分炮裂黃

天者白芷兩半熟乾地黃兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

又方騏驎竭壹兩烏藥兩半菴藥壹兩細研

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調

下一錢

又方茅根貳兩浮萍草壹兩刺薊根壹兩

右件藥細剉分為七服每服以水壹中盞

煎至五分去滓每於食前溫服

又方蠶紙灰兩壹茶籠內箬葉壹兩燒灰

右件藥細研每於食前以溫酒調下二錢

治婦人白崩諸方

夫婦人白崩者是勞傷胞絡而氣極所為肺
主氣氣極則肺虛冷也肺藏之色白虛冷勞
極其色與胞絡之間穢液相挾崩傷而下為
白崩也

治婦人白崩臍腹冷痛四肢不和面無顏色
白朮散方

白朮壹兩艾葉壹兩附子壹兩芎藭三分

阿膠壹兩桂心壹兩白石脂壹兩白礬灰壹兩

壹兩烏賊魚骨壹兩熟乾地黃壹兩吳茱萸兩半
湯浸七遍焙乾伏龍肝一兩當歸叁分炒

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調
下二錢

治婦人白崩臍下疼痛不止當歸散方

當歸二兩劉微炒木香一兩桂心壹兩芎藭壹兩鹿角

膠二兩搗碎乾薑一兩炮裂到龍骨一兩續斷壹兩

附子一兩炮裂去皮臍

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調

下二錢

治婦人白崩不止面色黃瘦臍下冷疼牡蠣

散方

牡蠣壹兩燒熟乾地黃壹兩龜骨壹兩蒲黃壹兩

阿膠壹兩搗碎乾薑壹兩炮裂到

右件藥搗細羅為散每於食前煎艾葉湯

調下二錢

治婦人白崩不止鹿角膠散方

鹿角膠壹兩搗碎鹿茸壹兩去毛塗烏賊

魚骨一兩當歸壹兩剉微炒龍骨壹兩白朮壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調

下二錢

治婦人白崩久不止禹餘糧散方

禹餘糧貳兩燒醋桂心參兩芎藭壹兩當歸壹兩

剉微烏賊魚骨壹兩附子半兩炮裂白礬壹兩

貳兩燒令汁盡

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調

下二錢

又方附子壹兩炮裂當歸壹兩剉微炒烏賊魚骨壹兩

木賊壹兩牛角二兩亦壹兩石脂壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人勞傷氣血虛損白崩發歇不止蝟皮

丸方

蝟皮壹兩炙微槐耳參分白斂半兩黃耆參分艾

葉參分桂心半兩蒲黃半兩當歸半兩剉乾薑

三分炮白馬蹄壹兩牛角壹兩剉禹餘糧

貳兩燒醋 猪懸蹄甲 七枚續斷壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治婦人白崩日夜不絕將欲困篤方

牛角鯁 壹兩 龍骨 兩 麝香 一錢

石件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人白崩去來不息方

牡蠣 貳兩燒為粉 熟乾地黄 壹兩 乾薑 叁分炮裂剉

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

治婦人崩中漏下不止諸方

夫婦人崩中之病者是傷損衝任之脉衝任之脉皆起於胞內為經脉之海勞傷過度衝任氣虛不能統制經血故忽然崩下謂之崩中崩而內有瘀血故時淋瀝不斷名曰崩中漏下也

治婦人崩中漏下不止地榆散方

地榆壹兩 伏龍肝壹兩 白茯苓壹兩 熟乾地
 黃壹兩 柏葉壹兩 蒲黃壹兩 白芍藥壹兩 甘草半兩
 炙微 鹿角膠壹兩 當歸三分 判桂心
 赤判 芎藭分 乾薑半兩 炮漏蘆 蟹爪壹兩
 兩 右件藥搗翁羅為散每服三錢以水壹中
 蓋入竹茹一分煎至六分去滓每於食前
 溫服

又方當歸壹兩 判阿膠 壹兩 搗碎 乾薑壹兩 炮裂
 艾葉壹兩 炒細墨 判艾葉

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
 蓋煎至六分去滓入赤馬通汁壹合更煎
 壹兩沸每於食前溫服

治婦人崩中漏下不止羸乏宜服此方

烏賊魚骨貳兩 芎藭參分 熟乾地黃壹兩 乾薑
 半兩 炮當歸 貳兩 判阿膠 參分 搗碎 艾葉
 裂判 壹兩 炒艾葉

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
 蓋煎至五分去滓入酒壹合更煎壹兩沸

每於食前温服

治婦人崩中漏下赤白青黑腐是近不可近令人而黑皮骨相連月經失度往來無常小腹絃急或時腹內疔痛不欲飲食薔薇根皮散方

薔薇根皮一兩 慎火草半兩 白薇一分 敗龜壹兩
塗酥炙黃連壹兩 去乾薑半兩 炮桂心半兩
令黃壹兩 黃連壹兩 去乾薑半兩 炮桂心半兩
細辛半兩 當歸一分 熟乾地黄壹兩 芍藥半兩
石斛壹兩 去白芍藥半兩 禹餘糧二兩 燒醋七兩

牡蠣二兩 燒艾葉壹兩 微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以温酒調下二錢

治婦人崩中漏下不止漸加羸瘦四肢煩痛禹餘糧散方

禹餘糧壹兩 燒醋甘草叁分 炙赤石脂貳兩
龍骨二兩 附子壹兩 炮裂芎藭叁分 熟乾地黄壹兩
一白芍藥叁分 乾薑半兩 炮當歸壹兩 微炒桂心半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調
下二錢

治婦人崩中漏下不問年月遠近栢葉散方

栢葉壹兩半續斷壹兩半芎藭壹兩半禹餘糧

二兩半燒艾葉壹兩阿膠壹兩赤石

脂壹兩牡蠣壹兩地榆壹兩生乾地黄壹兩

半當歸壹兩半鹿茸一兩龜甲壹兩

半塗酥壹兩鱉甲壹兩醋炙令黃

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢○婦人大全良方云一方有丹參

如鹿茸數煉蜜丸如梧子大每服三四十

圓空心温酒吞下

治婦人崩中漏下不止虛損羸瘦鹿茸丸方

鹿茸貳兩去毛塗壹兩龍甲一兩烏賊

魚骨壹兩白竜骨一兩續斷壹兩熟乾地黄壹兩

白芍藥壹兩白石脂壹兩肉苳蓉壹兩酒浸

皮炙乾

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治婦人崩中漏下不止漸加黃瘦四肢無力
腹內疼痛不思飲食栢葉丸方

栢葉壹兩續斷三錢芍藥叁分禹餘糧二兩

編艾葉叁分阿膠壹兩牡蠣壹兩

地榆壹兩熟乾地黄壹兩當歸叁分丹參

叁鹿茸壹兩去毛塗叁兩鱉甲壹兩鱉甲壹兩

塗醋炙叁兩赤石脂壹兩鱉甲壹兩鱉甲壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九
治婦人勞損因成崩中不可禁止積日不斷
故成漏下致五藏空虛肉色黃瘦禹餘糧丸
方

禹餘糧貳兩燒醋七兩龍骨壹兩紫石英壹兩

過人參半兩去壹兩桂心半兩川烏頭半兩

桑寄生壹兩川椒壹兩口者壹兩石斛壹兩

剉壹兩澤瀉壹兩當歸壹兩杜仲壹兩

肉蓯蓉壹兩酒浸壹兩遠志半兩五味子

半牡蠣壹兩燒甘草半兩炙
兩為粉微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸
如梧桐子大每於食前以熱酒下三十九

治婦人崩中漏下久不差宜服此方

白芍藥貳兩烏賊魚骨貳兩槲葉壹兩半
兩為粉微黃

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治婦人崩中下血不絕小腹痛方

鹿角膠一兩搗碎炒令黃燥栢葉一兩白芍藥壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調
下二錢

又方牡蠣貳兩半拘頭骨貳兩半
燒為粉炙令黃

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

又方槐鵝燒作

右細研每於食前以溫酒調下二錢

和劑局方

婦人諸疾

溫經湯 醫方大成名 治衝在虛損月候不調

或來多不斷或過期不來或崩中去血過多

不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發

熱下利手掌 簡易方 煩熱 大成五 唇乾口燥

及少腹有寒久不受胎

牡丹皮 阿膠 碎炒○壹本及 當歸 去蘆

因方酒人參 去蘆 川芎 莢 甘草 炒 肉桂 去

皮○三因 芍藥 各貳兩○簡 吳茱萸 ○三

方桂心 易方白芍藥 湯洗七次焙炒 半夏 ○叁因方貳兩

麥門冬 去心五兩半○簡易方

右為麤末每服三錢 簡易方四錢衛 水壹

盞半 大成 生薑五片 寶鑑 煎八分去滓空

心食前熱服 醫方集成南北經驗方袖珍

大全良方此下云 ○婦人大全良方治女

人曾經小產或帶下三十六病腹脹唇口

乾日暮發熱小腹急痛手足煩熱大腑不

調時時泄利經脉不調久不懷孕吳茱萸

參 白芍藥當歸芍藥 各貳兩 麥門冬 去心 半夏

各貳人參阿膠粉牡丹皮去甘草桂心各
 兩半右為粗末每服三錢水壹盞薑五片煎
 七分去滓空心食前溫服忌生冷羊肉生
 葱海藻菘菜等

消遙散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭
 目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食
 嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱
 如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮
 熱肌體羸瘦漸成骨蒸

甘草炙微赤半兩芍藥壹本及管見大
全良方衛生寶鑑必用全當歸去苗劉微
書之書玉機微義白芍藥扶苓去皮○婦人
大全良方去蘆酒浸一宿柴胡去苗各
日澹寮方酒浸一宿白朮壹兩生薑壹塊
大全良方澹寮白朮去苗各
方寶鑑白茯苓柴胡去苗各
 右為麤末每服二錢婦人大全良方醫方
方袖珍方叁水一大盞煨一本生薑壹塊
錢微義半兩水一大盞煨一本生薑壹塊
 切破薄荷少許同煎至七分去滓熱服不
 拘時候拔粹○易簡方右咬咀每服四錢
 水二大盞燒生薑二塊切片煎至六分去

萍食前熱服一方名人參散治婦人血熱
虛勞骨蒸兼治邪熱客於經絡肌熱痰嗽
五心煩燥頭目昏痛夜多盜汗補真氣解
勞倦用人參白朮茯苓柴胡半夏當歸赤
芍藥乾葛甘草黃芩各等分哎咀每服四錢
水壹盞半生薑五片棗二箇煎至六分不
拘時候服應有勞熱之證皆可服之熱退
卽止但婦人寒熱亦有因經血節閉者
遂致五心煩熱及骨節間熱或作虛勞治

之反以爲害積日既久乃成真病法當行
其經血若月事以時自然平治宜以局方
大聖散用紅花煎酒調服不能飲者以醋
湯代之仍以紅圓子醋湯嚥下此二藥大
治經事不調或腹有血塊或久無子息服
之數月其效特異但非可數服責其無功
但是病後虛損發熱若虛勞寒熱及久
患瘧疾皆宜灸膏肓輕者每穴五七十壯
重者三數百壯當夜熱若未除次日再灸

數下壯或有餘熱逐日灸一二七壯養其
火力以熱退爲期令人見病人畏灸多謂
無力勝火當俟少愈此大不然倘能漸安
又何必灼艾此皆悠悠之語及其病成則
悔無及矣凡灸此穴者切不可灸三腕腹
中臍下等處若前後受火則灸氣交攻中
腕鬲截往往嘔吐清水或氣息喘急或渴
欲引飲名爲火邪多有致斃治法以黑豆
煎湯徐徐解之輕者尚可療也或謂灸膏

育多致不救不然乃灼艾傷晚已不及耳
或因下血過多發爲寒熱常用當歸地黃
之類如大建中湯用當歸人參甘草黃芪
川芎肉桂白芍藥熟地黃白朮附子半夏
麥門冬菴容茯苓各等分每服水一盞半
姜三片棗子壹箇食前溫服藥令湯用黃
芪人參橘紅當歸肉桂細辛前胡甘草茯
苓麥門冬芍藥各二兩附子熟地黃各壹
兩半夏遠志各兩半每服水壹盞半姜五

片棗子壹箇食前服養榮湯黃芪當歸肉
桂甘草橘紅白朮人參各壹兩芍藥三兩
地黃五味子茯苓各三兩遠志半兩每服
水壹盞半姜三片棗子二箇空心服雙和
湯白芍藥七兩半黃芪當歸熟地黃川芎
各三兩甘草肉桂各二兩壹分爲細末每
服二錢水壹盞半姜三片棗子壹箇食前
服十補飲方見胃風湯輩是也然有痰飲停節
之人則難用此蓋當歸地黃與痰飲不得

其官反傷胃氣因是不進飲食遂成真病
致於不救者多矣痰飲中節致生寒熱
者以二陳湯參蘇飲等藥療之應手而效
更有服退熱冷藥太過因而咳嗽下痢
發熱自汗皆不可用惟真武湯增損名固
陽湯仍以震靈丹服之其詳更於真武湯
方中求之如早灸膏肓其效尤著得效方
白茯苓白朮去蘆當歸去蘆酒浸白芍藥北
柴胡去苗各一兩甘草炙右剉散每服三錢

水盃半薑三片麥門冬二十粒去心煎不

拘時服一方加知母地骨皮

當歸建中湯治婦人一切血氣虛按粹方損作俱

及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸吸小氣

少腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食

白芍藥六兩肉桂大盒皮叁兩○當歸去苗微炒

四兩甘草炙貳兩

右為麤散每服三錢水一盞半大成入生

姜五片棗壹枚按粹方姜叁片棗貳枚擘破同煎至

一盞去滓熱服空心醫方集成南北經驗方袖珍方與大成同

食前產訖直至滿月每日三服令人丁壯

滋血湯治婦人勞傷過度致傷藏腑衝任氣

虛不能約制其經血或暴下謂之崩中或下

鮮血或下瘀血連日不止淋瀝不斷形羸氣

劣倦怠困乏並皆治之

赤石脂火煨海螵蛸去殼側柏去枝各伍兩

右為細末每服二錢用熱飯飲調下壹日

連進三服即愈並不拘時此藥功效不可

盡述 管見大全
良方同

暖宮元治衝任虛損下焦久冷臍腹疔痛月
事不調或來多不斷或過期不來成崩中漏
血赤白帶下或月內再行淋瀝不止帶下五
色經脉將至腰腿沉重痛連臍腹小便白濁
面色萎黃肢體倦怠飲食不進漸至羸弱又
治子宮久寒不成胎孕

赤石脂 火煨 海螵蛸 去殼 附子 炮去皮臍 生
硫黃 六兩 禹餘糧 九兩 醋淬 手擦為度

右為細末以醋糊和圓如梧桐子大每服

十五圓至二十圓 醫方大成集成南北經
驗方袖珍方永類鈐方

每服參 管見大全 空心食前溫酒下或淡醋湯亦得
良方同

暖宮圓治證與前暖宮圓同

沙參 淨洗 白薇 地榆 厚朴 去蘆皮 牛膝

酒浸 白芷 桔梗 杜仲 去蘆皮 黃耆 各

兩 乾姜 炮 蜀椒 去目及閉口 細辛 去苗洗

附子 炮去皮臍 大者壹分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十
三十圓空心溫酒或棗湯吞下及療婦人
子宮久寒不成胎孕

滋血湯 御藥院方 治婦人血熱氣虛經候澀

滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身

疼倦 御藥院方 肌熱將成勞瘵不可妄服他

藥但宜以此滋養通利 又治證與前血

馬鞭草 荆芥穗 各四兩 牡丹皮 壹兩 得

枳殼 去瓢麩炒 赤芍藥 院方白 肉桂 去

皮當歸 去苗炒 得川芎 各貳兩 得

右為釐末每服四錢烏梅一介水二盞煎

至壹盞去滓食前空心 院方水壹盞半入

壹大盞去滓 溫服食後 日四五服有此證服至半月

或一月經脉自通百病皆除神効 衛生寶鑑同

○三因方治婦人血風血熱血虛經候澀

滯經脉不通四肢麻木肌體渾身疼痛倦

怠將成勞瘵馬鞭草 取穗 荆芥穗 各

兩○簡易 桂心當歸枳殼 浸湯 赤芍藥川

芍

各二兩

牡丹皮

壹兩

右麤為末每服四大錢

水壹盞半烏梅壹枚煎七分去滓空心服

婦人大全良方資血湯治婦人血熱氣虛

經候澁滯不通至使血聚肢體麻木渾身

疼痛煩倦或室女年及經脉未行日漸黃

瘦將成勞疾切不可便投紅花破硬等藥

宅日為患也若是前證則憎寒發熱

永類
鈴方

壯五心煩躁飲食減少宜服此藥滋養而

通利之馬鞭草荆芥穗

各四兩
鈴方乙兩

桂心枳

殼川芎當歸赤芍藥

各二兩

牡丹皮

壹兩

右為

粗末每服四錢烏梅一箇水二盞同煎至

壹盞去滓空心食前日四服有此證服至

半月經脉自通此方至妙不可輕視非一

二服便見特達之效而鄙之仍服後素有

諸疾因此藥皆去矣醫方大成治婦人血

熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌

體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利馬

鞭草荆芥穗

各四兩

牡丹皮

壹兩

赤芍藥枳殼

去白肉桂皮去蘆當歸去蘆川芎各二兩右咬咀

每服四錢水壹盞烏梅壹介煎服以經行

為愈醫方集成南北經醫林方治婦人紅

脉不通乾血勞忽發寒熱往來四肢麻沒

疼痛血氣不通馬鞭草壹兩荆芥青枳殼壹兩

牡丹皮壹兩川芎半兩當歸半兩赤芍藥半兩桂壹兩

右為麤末每服半兩水壹大盞烏梅同煎

去滓温服發熱者加大黃

牡丹散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭

目昏重心松頰赤口燥咽乾發熱盜汗戒食

嗜卧及血熱相搏月水不利臍腹脹痛寒熱

如瘡又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮

熱肌體羸瘦漸成骨蒸○袖珍方治血氣虛

損內則月水不行外發潮熱肢體羸困漸成

骨蒸並宜服之永類鈔方同

牡丹皮去苗當歸去蘆桂心去皮沒藥

別研延胡索炒陳皮去白烏藥紅

花一分芍藥一分甘草生用各壹兩乾

漆炒二兩○三蓬莪茂炮蘇木各鬼箭壹

右為末每服二錢袖珍方水壹盞煎至

七分不拘時候三因方

紅花當歸散治婦人血藏虛竭或積瘀血經
候不行或斷續不定時作腹痛腰膝疼重攻

刺醫方大成集成南北經驗方小腹緊硬及

室女月經不通並宜服之婦人大全良方一

鈴方一名凌霄花散即紫葳

赤芍藥九當歸去蘆○良方牛膝酒浸甘

草灸紫葳紅花經驗方蘇木各二兩

微義各叁兩良劉寄奴五兩○良肉桂去

方推碎細剉皮○良白芷各一

右為細末每服三錢大成集成經驗熱酒

調下空心臨卧各壹服若血久不行濃煎

紅花酒調下有孕不可服澹寮方管見大

同

艾煎圓治崩傷淋瀝小腹滿痛○得效方治

婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常脹
滿至晚則增

地黃熟乾者白芍藥各壹兩半菖蒲節密人參

去川芎各壹兩食茱萸湯洗當歸去蘆各熟艾

四兩用糯米飲調作餅焙乾。醫方大成集成南北經驗方抽珍方熟米飲調餅

右為末煮酒糊為圓如梧桐子大每服五

十圓酒飲任下常服補榮衛固經脈三因方同

○得效方石為末煮酒糊圓梧桐子大調

縮砂香附湯送下五十圓

大全本草

勝金方治婦人帶下白下即禹餘糧壹兩乾

薑等分赤下禹餘糧壹兩石薑半兩石件

禹餘糧用醋淬擣研細為末空心温酒調

下二錢匕

簡要濟眾治室女月露滯澁心煩恍惚鈔白

霜細研為散每服壹錢温地黃汁壹合調

下生乾地黃煎湯調服亦得

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁

一處拌勻分作兩服煎當歸酒調下
初虞世治婦人崩中連日不止熟艾雞子大
阿膠炒爲末半兩乾薑壹錢剉石以水五
盞先煮艾薑至二盞半入膠消洋湍分三
服空腹服壹日盡

食療女子月候傷過擣大小薊根汁半升服
之

劉禹錫傳信方治女子月經不絕來無時者
取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服

之頓定如冬月卽煖酒服蓐中血暈服之
立驗已斃者去板齒灌之經壹日亦活今
楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚
効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀
用

席延賞治女人經血不行及諸癥瘕等病室
女萬瘦丸乾漆壹兩爲籠末炒令煙盡牛
膝末壹兩以生地黄汁壹升入銀器中熬
候可丸丸如梧子大每服壹丸加至三五

丸酒飲下以通利爲度

圖經曰牛角鯁用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角鯁主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服女子帶下下血燒沙牛角鯁以爲灰煖酒服之

孫用和方治赤白帶下牛角鯁燒令烟斷附子以塩水浸泡七度去皮右件等分搗羅爲末每空心酒下二錢匕

外臺秘要必效婦療人帶下取兔皮燒令煙絕搗爲末酒服方寸匕以差爲度

圖經曰乳婦赤白下方用猪子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火炙又搵炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下

梅師方治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升相和半分服

子母祕錄治月水不通厚朴三兩炙水三升煎取壹升爲三服空心不過三四劑差

斗門方治女子血脉不通用安石榴根東生者取壹握炙乾濃煎壹大盞服之差婦人赤白帶下同治

藥性論云患崩中血凝痊者胡麻生取壹升擣內熱湯中絞取半升立愈

圖經曰女子赤白下藕豆花乾末米飲和服經驗方治月信滯蘘荷根細切煎取二升空心酒調服之

陳藏器序云止月經太過甘瓜子爲末去油

水調服

野鴿糞壹兩炒微焦麝香別研吳白朮各壹分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索壹兩炒赤色去薄皮七物同爲末温無灰酒空心調壹錢服治帶下排膿候膿盡卽止後服仍以他藥補血臟

三因方

萬病丸治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此爲血瘦若生肉癥

不可為也 血瘕一作氣瘕 此即若瘕證也

乾漆 杵細炒令火烟出 烟頭青白 一時久 牛膝 酒浸壹宿各 壹兩六錢

生地黄 四兩八錢 取汁

右以地黄汁入下二味為末慢火熬俟可

丸即丸如梧子大空心米飲或溫酒下二

丸日再勿妄加病去止藥婦人氣血虛經

不行若服破血行經藥是殺之也謹之○

婦人大全良方治女人月經淤閉月候不

來繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調腹中

生瘕結而不散及癥瘕等病乾漆 杵碎炒 令大煙

出煙頭青白 牛膝 去苗酒浸一宿焙各壹兩 右為末以

生地黄汁一升入二味藥末銀石器 徐氏胎產

方瓦 內慢火熬俟可圓即圓如梧桐子大

石器 空心米飲或溫酒下二圓 拔粹方同 日再勿妄

加病去止藥 袖珍方壹名 生地黃煎元 王氏集驗方室

女萬癥丸治女人經血不行及諸癥瘕等

病乾漆一兩粗末炒令煙盡為細末牛膝

末壹兩以生地黄汁一升入銀器中熬俟

可丸丸如梧子大每服壹丸加至三九五

丸酒飲下以通利為度肘後衛生易簡方

治証與集用乾漆炒牛膝各壹兩為末生

驗方同地黃汁壹升同入砂鍋內熬成膏丸如桐

子大每服壹丸加至三五丸溫酒送下不

拘時

助道方

治婦人月候不調

月候不調緣恚怒飲食無多腹作楚四物乾

薑并橘皮甘草縮砂為伴侶

婦人經候不調可用局方四物湯壹貼加

乾姜壹塊用灰火炮甘草壹寸微炙剉同

四物湯用水二大盞入生姜三片煎取八

分去滓服之如腹痛甚者加乾姜壹塊小

錢大陳皮縮砂同煮服之

治婦人月候崩漏

粟草加煎四物湯更加香附與乾薑月候若

要調勻好半減川芎與地黃

婦人月候頗多如崩狀者用局方四物湯
壹貼炒香附飲子三錢灰火微炮乾姜壹
塊甘草壹寸粟米百餘粒水三大盞煎取
壹盞半去滓分爲二次空心食前服之

治婦人經月不通候

經月已過血不通局方四物減川芎乾姜蓬
朮仍添入連煎數服有神功

婦人經月不通皆因寒搏於內宜服局方
四物湯加蓬朮一塊剉碎乾姜壹塊灰火

微炮剉碎室女退半乾姜婦人全用
水二盞生薑三片同煎取八分去滓空心食前
溫服

治婦人赤白帶下證

婦人冷病没人知面色萎黃力漸微乾薑牡
礪并艾殼龍骨同和赤石脂

婦人冷病乃是赤白帶下也一方川赤石
脂二兩火煨牡蠣壹兩火煨乾姜一兩灰
火微炮竜骨壹兩鷄頭殼壹兩如無雞頭

穀以雞頭代之不伴五味並爲細米酒糊
爲元如梧桐子大每服五十圓用艾醋湯
送下空心食前
治婦人血海崩漏
血海崩來是幾年百般服藥不能痊炒香附
子燒蓮殼送下震靈膏十元

往往婦人血崩不止以香附子二兩爲飲
炒令深赤色蓮殼五介燒灰存性二頭併
爲細末每服三錢陳飯飲湯調送局方震

靈丹十元重者三五服取効

治室婦血閉不會通

氣閉能令血不通那堪寒熱遍身中柴胡蓬
朮兼甘草四物同煎立有功

大凡室婦血閉不通或寒或熱者用四物
湯二貼蓬朮壹塊如小錢大柴胡去蘆頭
壹錢甘草三寸炙用水三盞生姜五片同
煎取壹盞半分二次服之空心食前

治室婦崩中下血證

室婦崩中分冷熱累服剛劑未能決荆芥蓮蓬燒作灰湯調服餌偏奇絕

婦人室女但崩中下血不論冷熱之病可用荆芥蓮蓬二味各等分燒為灰研為細末每服二大錢空心用米湯調服立効立應

是齊醫方

寧志膏治婦人因出血多心神不安不得睡語言失常滕生色家方極有效

辰砂袖珍方研酸棗仁袖珍方炒人參夫木茯苓夫木

人大全良方琥珀各壹分○滴乳香壹錢

方白茯苓神右為細末和勻每服壹錢濃煎燈心棗湯

調下袖珍方此○良方夫一方無茯苓袖珍

方茯苓琥珀蜜圓如彈子大薄荷湯化下一粒

血崩

治婦人血崩錢季毅傳臨安鄒郎中方屢效

當歸 白芍藥 乾薑 櫻櫚

右四味各燒存性灰等分秤醋湯調以有

節朱筋左轉調四十九調食前服婦人大

神珍方永類鈔方同

治血崩

烏賊魚骨

阿膠

剉碎以蚌粉炒成珠子

右等分爲細末米醋湯調以朱紅筋左轉

調四十九調食前服

治婦人崩漏婦人經血正淋漓舊瑞蓮蓬燒

作灰熱酒壹杯調八字自然安樂更無疑

婦人大全良方拔○急救仙方婦人血崩

粹方永類鈔方同徐氏胎產方蓮蓬散療經血不止壽域神

方若月候傷過及崩中衛生身簡方治崩

中蓋是陽乘陰則

經水沸溢宜清之乾蓮房燒灰存性酒調

每服二錢妙

治血崩姜侍郎夫人經驗

櫻欄不以多少燒灰牡蠣如火煨研

右二味抄櫻欄灰壹錢牡蠣半錢入麝香少許拌令勻空心米飲調下經驗良方同

又方此亦姜家傳蘇氏外甥女每苦此服之

必安

香附子 不以多少去毛并黑皮炒深黑色焦不妨

右為細末入塩少許沸湯點下不拘時候此方甚妙勿謂藥麤賤而輕之合時當以斤計大劑服之方見奇效○婦人大全良方治婦人血崩不止赤白帶下用香附子夫毛炒焦為細末用極熱酒調下二錢放溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢匕如山崩不可者亦能解之米飲調亦可許

學士云治下血不止或成五色崩漏常服

資血調氣是婦人仙藥也 永類鈔方同 已上並

出婦人經驗方瑣碎錄血崩用香附子不以多少炒令紫色存性為細末每服二錢

熱酒調下澹寮方治下血不止或成五色崩漏香附子春去皮毛略炒為末每服二

錢用清米飲調下亦治產後腹痛山居四

要月事不調用香附子炒黃為末 壽域神方衛生

易簡方每 陳米飲湯入米醋些少服 神方空

調下

治婦人經候淋瀝不斷孫盈仲祖方蘇翰光
閣中久患壹服而愈四物湯加側柏煎服
瑣碎錄

婦人雜治

血崩諸藥不能止者大刺芥取根洗淨細切

研自然汁半盞以溫酒半盞相和服之立

止

婦人赤白帶下用乾蓮房隔年者好為細末

每用二錢以麝香米飲下空心食前日三
服不數日見効去麝香即不効切不可減
去甚妙○衛生易簡方用舊蓮房為末麝
香少許空心米飲調下

簡易方

婦人經候

紫石英无許學士云治婦人病多是月經乍
多乍少或後或前時發疼痛醫者一例呼為
經病不曾說得是陰勝陽陽勝陰服藥所以

少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經
所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月
後若陽乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱
經水沸溢故令乍多而在月前當知其陰陽
調其血氣使不相乘以平為福

紫石英細研水飛人參澹寮方燬龜骨澹寮方燬川烏頭

炮桂心婦人大全良方官桂澹寮方去龍皮禹餘糧燬醋杜

仲妙去絲遠志澹寮方湯浸去心桑寄生澹寮方湯浸

澤瀉澹寮方酒浸當歸澹寮方酒浸菴寄生澹寮方酒浸

寮方乾姜炮五味子各一兩石斛各一兩

寮方酒浸炒牡蠣燬甘草炙川椒去目令口微

兩各一兩右為末煉蜜元梧桐子大空心飲得効方

下三十元五十元米飲

小溫經湯治經血不調血臑冷痛此方甚平
易而用藥徑捷

當歸得効方去尾附子等分炮

右以咀每三錢盞半水煎至八分去滓服

得效方同醫方大成集成南北經驗方神
珍方永類鈔方水豈蓋煎至八分空心温
服

金華散治婦人經血得熱崩漏不止口苦咽

經驗良方此下 經候不通並宜服之 養生堂
判官方

○婦人大全良方治婦人血室有熱崩下不
止服温藥不效者

延胡索 瞿麥穗 川當歸 牡丹皮

乾葛 各壹兩 石膏 二兩 蒲黃 半兩 桂心 良方別
為末 麩

靈仙 各三分 ○醫方集成
已上一味各七錢半

右為細末每二錢水壹盞姜三片煎六分

袖珍方 食前温酒日二三服 得效 ○良方

七分 又云凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同

不可一槩用藥僕常療一婦人崩漏暴下

諸醫投薑桂附子等藥服之愈甚召余診

之六脉緊數遂用此藥兼局方竜腦雞蘇

元數服即安 永類鈔 本專方單用黃芩者

亦此意也

黃芩湯治崩中下血治崩中藥多是用止血

補血之劑此是陽乘陰前所謂天暑地熱經水沸溢是也醫方集成南北經驗方袖珍方此下又云陽搏於陰謂之崩搏者盛也

黃芩

右爲末燒秤錘

得效方此下有淬字

酒調下

澹齋方經驗良

方調下壹錢玉機微義壹二錢

○婦人大全良方治崩中

下血

山本

黃芩不以多少爲細末每服壹

錢霹靂酒調下

永類鈴方燒秤錘淬酒或淬醋

許學士云

崩中多是用止血藥補血藥此治陽乘於

陰前所謂天暑地熱經水沸溢是也近朝有王御醫值夜忽有一宮女血如山崩其時暑月藥笥中只有大順散兩貼川冷水調服旋即奏效以此知醫要權變金華散亦妙急救仙方婦人血崩黃芩爲末每服二錢先燒紅鐵秤錘置酒候沸定用酒調服壽域神方治血山崩用黃芩壹味爲末每服三錢燒秤錘淬酒調下年少者用鼠尾黃芩年老者用空腸黃芩

黃蘗湯治同前

黃芩 黃蘗 各壹錢 黃連 三錢 去毛

右用水四盞煎取壹半去滓入炒阿膠末

五錢七方經半錢良滓再煎温温分三服空心

腹痛加栝子三錢方得效○袖珍方右咬咀

每服壹兩水二盞煎至壹盞如阿膠半錢

去滓食前温服如腹痛加栝子仁煎水

通經圓治婦人室女月候不通疼痛滯寮方

痛醫方集成玉機或成血痕永類鈔方此下

微義臍腹疼痛云本草入鷄子

清同元畏漆入
腸胃生瘡也

桂心滯寮方去蘆皮 青皮去 大黃炮 乾姜炮 川椒

炒出汗○滯 蓬朮炮 乾漆炒出烟 婦人

寮方去子○滯 蓬朮炮 乾漆炒出烟 婦人

炒令○滯 川烏炮 良薑去蘆 桃仁各

分炒○良 方無川烏有紅花 恐非當用之

右為細末將四錢氏集驗方四分 用米

醋蒸成膏和餘六錢得效方滯 未成劑白

中治之元如桐子大眼乾每二十元至三

徽州醫巫張擴頃年緣事在推勘院有王
 鑿者以鑿職直宿日夜與之稔熟口傳此
 方渠甚秘之予後得此方以治婦人疾不
 可勝數且欲廣行不敢自秘尋常血氣凝
 滯疼痛數服立效○良方右為細末分為
 四分用壹分以米醋熬成膏和餘分藥末
 成劑白中治之圓如梧桐子大眼乾每服
 二十圓淡醋湯下至三十圓温酒亦得空
 心食前服醫方集成右為末將一半用米

醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之丸
 如梧桐子陰乾每服五十九醋湯温酒空
 心在下濟生方不用川烏入紅花等分南
 經驗方油珍玉棧微義川椒炒蓬朮乾漆
 方鈐方同當歸壹錢青皮乾姜大黃桃仁炒川烏
 桂心各壹錢右為末將一半用米醋熬成膏
 和餘藥成劑白中杵之丸如梧子大陰乾
 每三五十九醋湯下嚴氏方無川烏有紅
 花

徽州鑿巫張擴項年緣事在推勘院有王
鑿者以鑿職直宿日夜與之稔熟口傳此
方渠甚秘之予後得此方以治婦人疾不
可勝數且欲廣行不敢自秘尋常血氣凝
滯疼痛數服立效○良方右爲細末分爲
四分用壹分以米醋熬成膏和餘分藥末
成劑白中治之圓如梧桐子大眼乾每服
二十圓淡醋湯下至三十圓溫酒亦得空
心食前服醫方集成右爲末將一半用米

醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之丸
如梧桐子陰乾每服五十九醋湯溫酒空
心在下濟生方不用川烏入紅花等分南
經驗方玉棧微義川椒炒蓬朮乾漆
方鈐方同青皮乾姜大黃桃仁炒川烏
炒當歸壹錢桂心各壹右爲末將一半用米醋熬成膏
和餘藥成劑白中杵之丸如梧子大陰乾
每三五十九醋湯下嚴氏方無川烏有紅
花

常歸散治婦人天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脈不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善

白朮

半兩○醫方集或南北經驗黃芩方油珍方永類餘方壹兩

山茱萸

一兩湯泡○當歸人川芎白芍

藥

六味一同剉碎炒各壹兩病證若是冷去黃芩加桂

右制錢木每二

三錢酒調下空心日三

服養胎益血安和子臟○婦人大全良方

當歸川芎白芍藥黃芩白朮

各半兩山茱萸

肉半兩右為細末空心食前溫酒調下二錢

日三玉機微如冷者去黃芩加桂心壹兩

鍾乳澤蘭圓治衝任虛損月水不調臍腹疔痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚愛恚不樂面少光澤飲食無味治帶下三十六疾崩中漏下五色子宮久冷無子及屢墮胎或因產勞損衝任血氣虛羸肌瘦嗜臥久

服補虛羸暖元臟益血氣潤肌體長髮去野
除頭風下臟風冷令人有子

鍾乳粉三兩澤蘭去大梗壹兩二錢半○管

栢子仁微炒門冬子去心○良方焙防風壹兩七

錢人參去蘆石斛去根熟乾地黄酒浸○良

石膏細研水飛各一芎藭甘草炙小白

芷牛膝去蘆酒浸山茱萸去核乾山藥

當歸去蘆剉炒○良方藁木去蘆土各壹

桂心去粗皮○良細辛去苗各壹兩○良艾

葉七兩半○良蕪荑炒半

右為末煉蜜圓如梧桐子大每五十元至

七十元良方壹十圓溫酒或米飲下食前

日二服人三十六

卷栢圓治衝任本虛血海不足不能流通經
絡致月水不調婦人帶下三十六疾並皆治
之常服調和經脉補暖元臟潤澤肌膚長髮
去野除頭風令人有子

卷栢去根當歸洗焙各熟乾地黄洗川芎各

兩香白芷 菘蓉 酒浸壹宿焙乾 牡丹皮 各一艾

半 錢 川椒 去目合口者微炒 栢子仁 別研

右為末煉蜜元如栢桐子大每服五十元

溫酒米飲空心下

育真丹治婦人三十六種疾下臟久虛沉寒

痼冷帶下五色變易不定漸見瘦弱

代赭石 紫石英 赤石脂 左顧牡蠣

去頭 取中用

右為末米醋和成劑分為六錠入甘鍋內

燒通紅半時辰傾出放冷擣為末次入

乳香 別研 茴香 微炒 乾姜 炮 五靈脂 去砂石各二兩

右為末却入前末和勻醋煮糯米糊為元

栢桐子大每二十元煎茴香酒下空心服

磨積元治女人三十六疾積氣內攻經候不

調腹脇多脹臍內時作刺痛不進飲食

三稜 煨香切 莪朮 煨香切 茴香 微炒 防子 炮去

白芍藥 乾姜 炮各一兩 當歸 洗焙膏 巴戟

去心微炒壹兩艾葉醋炒壹兩川練子肉炒兩

右為末酒糊元梧桐子大每五十元食前

温酒

直指方

血疾證治

血崩芎歸湯加南木香下震靈丹

血崩帶下膠艾湯以海螵蛸灸黃刮碎和人

同煎吞產寶固經圓并局方澤蘭丸

桂香圓治月事不調心腹刺痛寒熱間作

當歸鬚 川芎 赤芍藥 牡丹皮 南

木香 細辛 桂枝並日乾 延胡索略炒 乳香

沒藥等分 右煮米醋將乳香沒藥為膏餘藥末之揉

和為圓桐子大每服七十圓續斷煎湯送

下有熱多加生槐花煎湯

調榮湯治瘀血不消臍腹引腰背俱痛

川芎 當歸 芍藥 生乾地黄 三稜

莪朮 白芷 延胡索 蒲黃 香附子

調榮湯

澤蘭 細辛 川白姜 厚朴 製桃仁去

皮焙各 薤白 半夏 製甘草各 三分

右剉散每服三錢薑棗煎食前服

交濟散治血結作痛

生地黄生取 生薑四兩各洗淨 附子將

右末每服二錢溫酒調下或男女血熱心

煩或產後傷風則以荆芥煎湯調下

蒜連圓治諸血妄行

黃連日乾 獨頭蒜取肉研細

右入米醋些子攪和為圓桐子大日乾每

三四十圓陳米飲下

法製香附方治諸下血

大香附杵去毛皮以童子小便浸壹日夜

右為末每二錢米湯調下治冷帶用炒艾

葉煎湯調下

又方淨香附酒醋各半煮透焙

右為末黃秫米糊圓桐子大每四五十圓

米湯下

又方治血下帶下

香附

杆去皮二分童尿浸一日夜

艾葉

三分米醋煮透曬焙十四

右為末秫米糊圓桐子大每五六十圓艾

醋湯或醋湯下

燒揅酒治血閉腹痛產後瘀血腹痛

新布數重包裹白堊壹合炭火燒存性

右研細温酒調下新布即青麻也能逐瘀

血

和劑芎歸湯治諸血作痛血運沉迷血澁難

產一切出血過多

川芎

當歸

等分

右為麤散每服三錢水盞半取壹盞稍熱

服不拘時加縮砂治胎動腹痛漏血又名

芎藭湯

膠艾湯治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連

日不斷臍腹疼痛經血淋瀝不斷

熟乾地黄

白芍藥

各四兩

當歸

去蘆頭

艾葉

微炒各三兩

膠阿

搗碎炒令黃燥

芎藭

甘草

炙各二兩

右為麈末每服三錢水一盞酒六分煎至八分去滓熱服空心食前日三服病甚者連夜併服

產寶固經圓

赤石脂煨艾葉 補骨脂炒木賊各半附

子炮壹

右末陳米飲和圓梧桐子大每服五十圓

食前溫酒送下

澤蘭圓治氣血不調肢體瘦弱

熟乾地黃壹兩澤蘭去大枝梗人參去蘆頭黃耆

去蘆頭牛膝壹宿焙赤石脂各壹兩白茯苓

去皮木香 草薢酒浸一宿附子炮去皮臍續斷各

分乾薑炮肉桂去麁皮芎藭 白朮 當歸

去蘆酒浸壹宿甘草炙微赤

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓

溫米飲下空心食前產一百日內每日常

服壯氣益血

當歸建中湯治婦人壹切血氣虛損方見大方科諸

門汗

養正丹治婦人血氣帶下腹痛助陽接真升

降

方見大方科瘡冷門

朱氏集驗方

調經

紅花散治婦人女子經脉不通如血膈者二十服效

好紅花

細蘇枋木搥當歸

右等分咬咀每用一兩以水壹升半先煎花木然後入酒壹盞併當歸再煎服半升分兩服空心食前溫服

千金失笑散治室女經脉不通

當歸尾 沒藥

右等分每壹大錢炒紅花酒面北呷之

防風散治女人經脉不勻氣血壅滯肺有風熱遂令遍身癢疹紅紫成片肌肉頑痺皮膚粗澁或時瘙痒

北防風 川當歸 赤芍藥 牛旁子各壹

兩炒荆芥穗壹兩蟬殼七錢半生地黃香

白芷 甘草 白附子 白僵蠶去絲何首

烏酒浸去皮滑焙乾烏蛇肉秤已上各半兩紫參七錢半

右件為細末每服三大錢加至四五錢温

酒調下如不飲以蜜湯調服終不若酒之

有功

神授散調婦人經藥專治室女月經不調變

生百病誰家女子深閨裏榮衛不調阻經

水神仙有藥救世人免使成勞滯魂鬼當

歸芍藥蓬莪朮神麴麥蘖并青橘三稜一

味最深功能破血痕與血積七味細羅温

酒下壯者二錢少者一口一方留神麴作

糊丸如梧桐子大

大聖散治小產下崩不止忽大渴飲水則吐

藥食不進命在須臾一醫用後藥一服吐

住荆芥末半錢合大聖散川白湯點服

聚珍圓治婦人小產後虛羸百節疼痛不進

飲食百藥不效者

艾煎丸 木卷栢丸 大茴香丸 烏雞煎丸

巴戟丸

右五藥合作一藥搥湯溫酒任下兼服沉

香荆芥散

加味四物湯治婦人經候不通口乾頭暈嚴

醫云此肝血熱證四物湯加菊花煎服立

效

歸芎丸治婦人月候不通

陳皮 當歸 各叁兩 玄胡索 兩

右細末糊為丸每服五十丸米飲下

血崩

二妙散治婦人血崩平胃散四君子湯各二

貼先合煎數服然後喫後藥

三灰散

敗椶 椶皮 桤木葉

右化灰存性每服二錢酒煎至七分空心

服要為丸酒煮糊丸黃丹為衣

四神散

胡椒四粒血柏樹根嫩者壹兩甘草兩細葉禾甌

根壹兩

右咬咀每服二錢酒煎三沸通口服大忌

雞鴨子及壹切毒物三方得之周道人親

見其醫數人不可以草藥輕之干樹芥二

五倍散治血崩奇絕五倍子煙霞聖效方壹兩槌碎夫土

半生半熟等分爲末冷水調二錢空心服

荆芥散治血崩年深只壹服卽效

荆芥根

瓦上焙乾焦存性

茴香

各等分

右爲末每服三錢温酒調下豐泉梁國佐方

獨勝散治血崩累收效不效

防風去蘆不以多少炙焦黃色

右爲末酒糊丸空心日二服。婦人犬全

良方獨聖散治婦人血山崩不止由經方防

風去又右不以多少爲細末酒煮白麵清

調下二錢空心食前日二服更以麪作糊

酒投之醫方集成南北經驗方神珍方永類鈔方同

方治崩中防風去蘆頭炙赤色爲末每服
二錢以麩糊酒調下更以麩糊酒投之此
藥累經有效衛生易簡方治婦中蓋是陽
乘陰則經水沸溢宜清之用防風去蘆又
炙爲末酒煮糊清調下二錢空心日二服
極驗

單方治婦人月崩諸藥不效

五靈脂

十兩用酒淘去沙石熬成膏

右入神曲二兩爲丸每服三五十丸空心

溫酒下兼服四君子湯加肉豆蔻并和氣

藥○婦人大全良方治婦人血崩及治丈

夫脾積氣張氏云治血崩諸藥不能止者

妙澹寮方治下血不止或成五色崩漏五靈脾十兩爲末水

五大盞煎至三盞去滓澄清再煎成膏入

神麩二兩爲末和圓如梧桐子大每服二

三十圓溫酒下

玉機微義名五靈脂散澹寮方吞下三十圓衛生易

簡方每服二十九永類鈔方云本草五靈脂行血有功不能生血肝藏血入肝尤速

平胃散治血崩遍醫不效一道入用後藥服

之有效平胃散 但其中厚朴一味焦炒如煤其餘裂度並依本方

單方治血崩不止

定器椀櫟不拘多少極細為末

右以米糯糊為丸每服二三十丸米飲下

加味平胃散治婦人脾血不固崩漏平胃散

五貼用酒煎馬藍草空心點服

玉芝散治血崩 桂制屬經驗方

香附子 牛生牛熟 代赫石

右為末用酒調下大段崩者煎服

又方感應丸約二寸長用猪連貼二寸長剖

開安感應丸在內濕紙裏煨待熟細嚼無

灰酒下甚妙

加味佛手散治血崩佛手散加蒲黃服之取

效

如勝散 婦人大全良方永 治血崩 ○ 鈐方治

衝任虛衰為風冷客乘胞中血山崩下

棕櫚燒烏梅 乾薑 各一兩並燒灰存性

分神珍方並燒過 存五分性各二兩

右細末二錢烏梅湯良方袖珍方作酒調下空心服久患三服愈

治血崩經驗散香附子半生半炒入代赭石為末

白湯調下大段崩者甚驗

沒藥散治婦人月信退出皆為禽獸之狀似

來傷人先將絲塞陰戶只頓服沒藥壹兩

餘作丸散皆可服即時愈得效方同出張氏雞

峯方頃有莊婦病此危甚其夫來告急錄

此以與旋即痊

帶下

小陰丹治婦人赤白帶下月候不調諸虛不

足

當歸各四兩白芍藥各四兩白朮各四兩茯苓各四兩

白芷各壹兩延胡索各壹兩熟地黃酒蒸牡蠣草鞋包煨

各半各二兩人參各二兩沒藥各二兩甘草炙南木香各一兩

赤石脂煨七錢大附子壹兩炮蠶退紙燒以

多為貴

右細末煉蜜為丸如彈子大每服壹丸空

心酒服

石脂散治日冷精帶下陰挺脫出或青黑黃
白彈下攻痛腹悶頭旋眼暈耳聾啾啾痰上
壅

赤芍藥四兩 乾薑 香附子二兩

右細末每服三錢空心酒下如帶赤冷即

用陳米飲下煎阿膠艾湯尤妙若要順氣

加茴香

白芷散治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥

穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血
所致卒無已期須以此藥排膿載本草衍義

白芷兩 單葉紅蜀葵根二兩即單蒼古梅

代白芍藥 白礬燒枯別研

右細末同以蠟丸如梧桐子大空肚米飲

下十九或十五丸候膿盡仍以他藥補之

得救方同

黑附散治血海虛損淋瀝不斷心腹疼痛或
產內用力過度或產內使性氣或食生冷

乾薑

烏梅

各壹兩

櫻櫚

貳兩燒存性

黑右細末每服三錢陳米飲調下煎烏梅湯

下亦得如血過多阿膠艾豈塊水一盞煎

至七分空心服

嚴氏濟生方

帶下

白聖圓治婦人白帶久而不止面生黥黯邊

臍疼痛腰膝冷疼日漸虛困產後白帶並宜

服之

白聖

火煨

禹餘糧

煨醋淬七次

鼈甲

醋炙

烏賊骨

醋炙

當歸

去蘆酒浸

鵲巢灰

乾薑

炮

紫石英

火煨醋淬

七次附子

炮去皮臍

金毛狗脊

燎去毛

芎藭

各一兩

葉灰

半兩鹿茸

燎去毛切片

香附子

醋煮二兩

右為細末醋煮糯米糊為圓如梧桐子大

每服七十圓空心用溫酒米飲任下方同

醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方無米飲二字

白斂圓治室女衝任虛寒帶下純白

鹿茸

醋蒸焙

貳兩

醫方集成

南北經驗

方衛生易簡

方酒

蒸白欵 金毛狗脊 燎去毛 各一兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒下 得效方澹

寮方同

當歸煎治婦人室女赤帶 醫方集成南北經方袖珍方永類

鈐方赤白帶下 不止腹內疼痛四肢煩疼不欲飲食

日漸羸瘦

當歸 去蘆酒浸 赤芍藥 玉機微 牡蠣 火煨取粉 熟地

黃 酒蒸 阿膠 剉蛤粉炒 白芍藥 微義炒 續斷

酒浸已吐 地榆 半兩 各一兩 不升衣 白帶 赤帶

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服五

半圓空心用米飲送下 得效方澹

卷栢圓治婦人室女腹臑令熱相攻心腹絞

痛腰痛腿痛赤白帶下而色痿黃四肢羸乏

黃耆 去蘆蜜炙 熟地黃 洗各 還卷栢 醋炙 赤石

脂 煨醋淬 鹿茸 炙 白石脂 煨 芍藥 代赭

石 煨醋淬 艾葉 炒 桑寄生 炙 龜甲 醋炙 當歸 去蘆酒炒 地榆 各一兩 木香 不見 龍骨 各半 乾

黃煎參分得一木香不見黃骨谷半詩

右為末醋煮糯米糊為圓如梧桐子大每

服七十圓空心食前用米飲送下醫方集

經方同○永類錄方又云巢氏論婦人

亦有三十六疾者七瘕八瘕丸痛十二帶下

也而帶下不顯其證余入惟知赤白二帶

耳此由勞傷衝任風冷據於胞絡婦人平

居血欲常多氣欲常少百疾不生或氣倍

於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣

平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒

熱交并則赤白俱下其脉右手尺浮浮為

陽陽絕者無子若足冷帶下輕則漏下甚

則崩中皆心不榮血肝不藏血所致其脉

寸口弦而大弦則為減大則為芤減為寒

芤為虛寒虛相搏其脉為革主半產漏下

又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治

崩漏

鎮宮圓治婦人崩漏不止或下五色或赤白

不定或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹
脹痛頭暈眼花久久不止令人黃瘦口乾胃
煩不食

代赭石火煨醋淬七次紫石英火煨醋淬七次禹餘糧火煨

醋淬七次香附子醋煮各二兩得陽起石紅

細研芎藭 鹿茸燎去毛醋蒸焙伏神去木阿膠剉蛤

成珠蒲黃炒當歸去蘆酒浸各一兩血竭別研

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為圓如
梧桐子大每服七十圓空心用米飲下方

集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

十灰圓治崩中下血不止○衛生易簡方治
崩中蓋是陽乘陰則經水沸溢宜清之

錦灰醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方易簡方綿灰

馬尾灰 艾葉灰 藕節灰 蓮蓬灰

油髮灰 赤松皮灰 椶櫚灰 蒲黃灰

右等分為細末用醋煮糯米糊為圓如梧
桐子大每服七十圓加至壹百圓空心米
飲送下

栝子仁湯治婦室憂思過度勞傷心經心主
於血心虛不能維持諸經之血亦能致崩中
下血之患

當歸去蘆酒浸芎藭去木茯苓去木阿膠蛤

粉炒成鹿茸燎去毛栝子仁炒各壹兩香附子

珠去毛炒去毛川續斷酒浸壹兩甘草兩

右咬咀每服四錢水一盞半袖珍方薑五

片煎至七分去滓空心食前溫服得效方永類鈴

同方

嚴氏濟生續方

崩漏

陽起石圓治衝任不交虛寒之極崩中不止

變生宅證

陽起石火煨紅別研鹿茸去毛醋炙一兩

右爲細末醋煎艾汁打糯米糊爲圓如梧

桐子大每服百圓空心食前米飲送下

加減四物湯治室女二七天癸至亦有當時

水至而後至者有卒然暴下淋瀝不止有若

崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之

川當歸去蘆酒潤川芎壹兩熟地黃洗淨白

芍藥壹兩香附干炒去毛

右改咀每服四錢水一盞半生薑五片煎

至七分去滓食前溫服如血色鮮而不止

者去熟地黃加生地黃煎

管見大全良方

鹿茸元氣經候過多其色瘀黑甚者崩下吸

吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微少由

衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不能固可灸

關元百壯在臍下當

鹿耳療去毛酥炙赤石脂醫方集成

禹餘糧製各壹兩艾葉 柏葉 附子炮各半

成炮去皮熟地黃洗當歸諸方續斷各貳兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒

下三十丸婦人大全良方永類鈔方同集

丸成袖珍方玉機微義每服五十

婦人大全良方

月水不調方論 見聖惠方

加減吳茱萸湯治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之 出張氏方

吳茱萸 兩半 麥門冬 乾薑 白茯苓 牡

丹皮 南木香 苦梗 各參 甘草 各錢 當

歸 兩半 北細辛 壹錢半 防風 官桂 各

分半 夏 七錢

右咬阻每服四大錢水壹盞半生薑三片

鈐方 棗子壹枚煎至七分去滓空心温服

鈐方云局方有當歸無木香

治婦人室女經脉不調臍腹冷痛惡心腹常

脹滿至晚則增宜服小烏沉湯吞下艾煎

圓 方見和劑局方

薑黃散治血臟久冷月水不調臍腹刺痛 出

治婦人方

川薑黃 成片子者四兩 蓬莪朮 紅花 桂心 袖珍

方官川芎各一兩延胡索 牡丹皮 當歸

各貳兩白芍藥參兩

右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至

七分熱服永類鈐方玉○袖珍方右咬咀

每服一兩水二盞煎酒少許煎至一盞去

渣通口服食前

養生必用論經病

初虞世云女子十四天癸至任脉通月事以時下故令有子天癸者物之自然月者以月

至經者有常也其來不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百體則髮落而黃身羸瘦血虛則發熱故身多熱水不足則燥氣燔燥氣燔則金受邪金受邪則肺家嗽嗽則為肺癰肺痿必矣醫見經不行則用蚩虫水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄意就中不行以藥行之為害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖捶楚並

下不可得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種婦人盛實月經瘀閉利之則行自有證候學者宜審焉

當歸散治血脈不通

當歸 川山甲灰炒 蒲黃各半 辰砂錢一 麝香

許少

右為細末研停每服二錢熱酒調下如不

喫酒薄苛醋湯袖珍方亦可永類鈔

琥珀散治心膈迷悶腹臑撮痛氣急氣悶月

信不通等疾

天台烏藥兩二 當歸兩 莪茂各壹兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食

壓之大忌生冷油膩等物若產後諸疾用

炒薑酒調下已上出婦人經驗方

救急療婦人月經不調或壹月不來或隔月

不來或多或少臍下絞痛面色痿黃四體虛

吸羸瘦不能食方

當歸 川牛膝 牡丹皮 桃仁各兩 大

黃芩 芫蕪 土瓜根 芍藥 朴消 桂

心 寒 虫 去翅 水 蛭 各半 兩炒

不右咬阻以水九升煮取三升分温五服忌

如常法

治月水不通出梅師方厚朴姜汁炙不以多

少濃煎去滓空心温服○肘後方厚朴三

兩炙水三升煎取一升為三服空心不過

三四劑差衛生易王氏集驗方通經散治

婦人室女經閉不通不問新久並皆治之

厚朴姜製水一碗半煎至壹碗空心温服

病小者三服病人者不過十服如日久不

通多服為妙

治婦人經候不來數月臍腹疔痛或有壹塊

上下相挂飲食減少腹滿惡心大便祕澀

者宜服局方北亭圓用石菖蒲馬鞭草煎

湯送下三四十圓兩服必通

鱉甲圓治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積

氣結硬時發刺痛漸成勞狀出博濟方

驚甲去裙醋炙桂心 三稜醋煮急炒牡丹皮 牛

膝去苗呵子肉 琥珀 大黃煨 土瓜根

桃仁去皮尖雙人麩炒

右各等分爲細末煉蜜圓如梧桐子大煎桃仁湯送下十五圓破血撥氣塊尤妙

室女經閉成勞方論

寇宗奭曰夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子

子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿候五臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此爲例其餘

諸勞可按脉與證而治之。張氏云室女月
 水久不行切不可用青蒿等涼藥醫家多以
 爲室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱
 則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大
 有理不可不知。若經候微少漸漸不通于
 足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數
 此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火
 火逼水涸亡津液當養血益陰慎無以毒藥
 通之宜栢子仁圓澤蘭湯

栢子仁圓

栢子仁炒別研 牛膝 卷栢各半兩 澤蘭葉

續斷各貳兩 熟地黄參兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大空心飲下

三十元永類鈐方同

澤蘭湯

澤蘭葉參兩 當歸 芍藥各壹兩 甘草半兩

右爲粗末每服五錢水二觥煎至壹觥去

滓溫服永類鈐方同

沉香驚甲散博濟方治室女榮衛不調經候凝

滯或時頭目昏悶上膈積涎肢體不利五心

虛煩飲食進退多困少力

沉香 甘草 炙檳榔各叁分○修月魯木

香一兩驚甲半兩常山 當歸 柴胡 人

參 半夏 桂心 生地黃 大白茯苓

青皮 陳皮各壹兩○永類鈐方淨

右為細末每服二錢水壹盞生薑三片鈐方

煎至七分溫服空心日三服

金花散治室女骨蒸熱勞

藿香 零陵香 延胡索 芍藥 白芷

川芎 當歸 桂心各壹分○修月魯蓮

子心 晚蠶蛾各貳分○般經後錄名壹錢

右為細末溫酒調下壹錢日二服

劫勞散治心腎俱虛勞嗽二三聲無疾永類鈐方

療心腎俱虛水火 遇夜發熱熱過即冷時有

盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍

惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾

唾中有紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩 蘇黃耆 甘草 人參 當歸

半夏 白茯苓 熟地黄 五味子 阿膠

各二兩 炒

右咬咀每服三大錢水饑半生薑十二片

棗三箇煎至九分無時溫服日進三服修

魯般經後錄 拔粹方同 陳總領日華云鄉人楊元鼎女

及笄病證甚危一歲之間百藥俱試無有

效者亦嘗從予求治法無有應之者偶遇

名醫得此方只一料遂除根專錄此方傳

人兩命甘藥滋黃與口鼻肌發益

麥煎散治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四

肢心胃煩壅一兩水二升小麥煎

鱉甲方類鈔 大黃濕紙煨 常山 赤苓 茯苓

柴胡 白朮 當歸 乾漆妙令煙盡生

地黃 石膏各一兩 甘草半兩 出蘇沉良方

右為細末每服二錢拔粹方 水壹盞小麥

五十粒煎至六分食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩此黃州吳判官方驗骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗極效麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珍其效可知○
袖珍方右咬咀每服一兩水二盞小麥煎至壹盞去渣溫服食前有虛汗加麻黃根壹兩治骨蒸熱黃瘦口臭肌熱盜汗
驚煎圓治男子婦人童男室女五勞七傷傳疰飛尸尸注八極骨蒸肺痿黃瘦虛勞無力

肌肉不生婦人血蒸五心煩熱血風勞氣室女月閉黃瘦氣塊腹痛經脈不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上等疾無不效
驗

- 黃耆 柴胡 枳殼 知母 白茯苓
 - 沉香 人參 附子 木香 升麻 肉桂 胡黃連 杏仁 當歸 常山 羌活 京三稜 烏梅肉 安息香
- 明者同胡桃肉
- 研細

右十九味修製了各秤一兩爲末用活鹽一箇重十兩或半斤者以河水養七日須逐日換新水用童子小便五升無灰酒五升銀石器內慢火熬百沸先更入桃柳枝東南上者各剉三合烏梅五十箇拍破此三味用緜裏同籠煎煮至一半去桃柳枝等三味籠爛取去將肉研如膏骨併殼焙乾爲末再入汁中熬如漆色或更入酒少許此在臨時斟酌盛放瓷器中搜和前藥

入臼中杵干下圓如梧桐子大丈夫婦人十五歲已上二十圓至三十圓溫酒下婦人荆芥酒下所煮膏子須契勘多少勿令剩却但少些子不妨却別熬酒若膏剩恐髓不全故也凡服此藥恐熱三日更須服八僊飲子一服解之

修月魯般經後錄同

八僊飲子

常山 白朮 秦艽 洪州鬼臼
赤芍藥 甘草 紫蘇 銀州柴胡

存等分洗淨為粗末每服半兩水壹碗烏
 梅肉二箇葱白薤白桃柳槐枝各七寸同
 煎至一盞去滓溫服滓併煎修月魯般
 經後錄同
 治女子經脉不行脅膈滿悶身體麻木或有
 寒熱證候

厚朴 牡丹皮 茅香 藿香 甘草 各

陳皮 生半夏 麥牙 蒼朮 炒各半兩 赤

芍藥 三分 當歸 兩半

右咬咀每服半兩水壹大盞薑三片煎服

熱甚加北柴胡三錢半

羅宅大師傳有
 效

醫方類聚卷之二百八