

一收靨後復出疹者此餘毒也散之兆不必治之

夾班 六十

痘疹夾班與夾疹不同蓋疹則細碎有形班則成片無形也凡痘瘡初出有片片紅腫如綿紋者有紅暈與地皮相平而全無興起之意者是皆夾班證也班以熱毒鬱於血分而浮於肌肉之間乃足陽明胃經所主或以寒邪陷入陽明鬱而成熱者亦致發班俱宜涼血解毒但使班退而痘見者吉否則皮膚斑爛瘡易搔痒而皮嫩易破也又有赤班成塊其肉浮腫結硬者乃名丹瘤其毒尤甚瘡未成就此必先潰不可治

也

一治斑之法大抵斑在起發之前者多用表散在灌膿之後者多用解利如遍身通紅者其治亦同

一痘出夾斑輕者只以升麻葛根湯加石膏玄參甚者宜人參白虎湯合六味消毒飲

一風寒外感表邪不解而夾斑者宜荆防敗毒散或加石膏玄參

一斑色紫赤而大便秘結者宜四順清涼飲利之斑既已退卽宜用四君子之類以固其脾庶可免其內陷

程氏曰凡治夾班急宜涼血解毒以羌活散加酒炒芍藥紫草
紅花蟬退木通官桂糯米連進數服班退後以保元湯加木
香豆蔻煎服以解紫草之寒防其泄瀉○如痘中夾疹治亦
同此如稍遲則恐變成黑班爲難治矣

一痘瘡結痂之後而見班者此餘毒煎熬血分必致潰爛宜黃
連解毒湯加當歸芍藥黃芩石膏甚則大連翹飲○若熱毒
薰蒸於內大便膿血臭穢而見班者此胃爛之證不可治
一發班潰爛者以救苦滅癩散敷之

凡小兒出痘而晝夜啼哭者當辨其虛實表裏而治之其有內
未得出或外未得散而啼哭者此毒氣不解之使然也有陽
邪火盛紅赤掀突而啼哭者此痘盤疼痛之使然也有心腎
本虛邪熱乘陰而啼哭者此或以神志不攝或以煩熱不寧
之使然也有飲食不節或偶停滯而啼哭者此胃氣不和腹
痛腹脹之使然也知此之由而辨得其真則內未出者表之
托之外未散者解之化之火之盛者清其熱神之虛者養其
陰若痘毒本微而無故啼哭者多由飲食內傷或二便秘結
此或去其停滯或通其壅閉務令表裏和暢營衛通行則神

竟安泰而痘無不善矣或謂啼哭非痰卽熱而不究其本則失之遠矣

大小便閉 六二

凡痘疹小便欲其清而長大便欲其潤而實則邪氣不伏正氣不病若小便利者大便必實雖二三日不更衣者無碍也若小便少則病必進小便秘則病必甚以火盛故也但初熱時大便不宜太實若二三日不行宜微潤之不然恐腸胃不通則營衛不行而瘡出轉密惟起發之後大便却宜堅實若太實而四五日不行恐熱盛難靨亦宜微利之

一痘疹小水不利而熱微者宜導赤散熱甚而小水不利者宜八正散

一痘疹發熱時大便秘結不行而內外俱熱有不得不通以疏其毒者輕則柴胡飲子甚則三黃丸再甚則承氣湯

一自起發後以至收靨凡大便不行而火不盛或虛弱不可通利者只宜用猪胆導法或以醬瓜一條如指許導之卽出切不可輕用利藥

一大小便俱不通而內熱甚者八正散或通關散酌宜用之

一熱毒內盛而痘瘡乾黑倒陷煩躁便結者百祥丸或承氣湯

然宜慎用毋輕易也

一痘後餘熱不盡內陷膀胱而小水不利者導赤散或五苓散
大便不通者四順清涼飲

陳氏曰凡痘瘡四五日不大便用嫩猪脂一塊以白水煮熟切
如豆粒與食之令臟腑滋潤亦使瘡痂易落切不可妄投宜
泄之藥以致元氣內虛多傷兒也

薛氏曰前證若因熱毒內蘊宜用射干鼠粘子湯解之或發熱
作渴或口舌生瘡咽喉作痛並宜用之

目雖肝之竅而實五臟六腑之精氣皆上注於目故其赤脉屬
心瞳子屬腎白珠屬肺黑珠屬肝裹約屬脾又太陽爲上綱
陽明爲下綱少陽循外眥太陽出內眥此其部分各有所主
故可因證以察其本也然痘瘡之病目而爲瘴爲翳者多由
火炎於內而熱以生風風熱散於諸經因多紅赤腫痛之患
故治此者亦當察其所屬而因證以調之也

一戴眼證凡痘瘡灌膿之後或大汗大瀉之後多有目睛上吊
或露白者謂之戴眼此精氣爲膿血汗液所耗乃太陽少陰
真陰虧竭大虛之證蓋太陽爲上綱血枯則筋急所以上吊

也速宜大補氣血以六物煎六氣煎或十全大補湯之類主
之其有以此爲風熱而散之解之者是皆速其死也○若七
日以前見此者多不治或無規失志不省人事者亦不治
一痘瘡目赤腫痛翳障等證無不謂之風熱故古方亦多用清
火散風等劑夫痘瘡之火由中生目爲肝竅肝主風木而病
在目故云風熱實以風生於火由內熱也所以凡治目赤目
痛者不必治風但治其火火去則風自息矣何也蓋內生之
風與外感之風不同外感之風升之散之則解散而去內生
之風而再加升散則火愈熾而熱愈高矣常見治目多難救

而寒涼反以傷脾者正以升降相雜而用藥有不精耳經云
高者抑之果何謂乎今如古方之治火眼凡用洗肝散及洗
肝明目散芍藥清肝散之類總不如良方龍胆瀉肝湯而良
方瀉肝湯又不如加味龍胆瀉肝湯之爲得宜也

一痘瘡眼中流淚赤痛或多眼眵此肝火之盛也宜清解之以
加味龍胆瀉肝湯或抽薪飲加木賊蟬退之類主之若大便
結閉不通者亦可少加大黃

一痘瘡入眼腫痛或痘後生翳膜者宜蒺藜散蟬菊散或通神

散外以秦皮散洗之

一痘瘡目病熱少風多而昏暗澁痛眵淚羞明翳障者宜密蒙花散亦以秦皮散洗之

一痘後眼閉淚出不敢見明者此內火不清而陽光爍之故畏明也宜洗肝明目散

一痘後眼皮風毒赤爛或痛或痒燥澁羞明多眵淚者秦皮散洗之

一痘瘡靨後精血俱耗而眼澁羞明光短倦開或生翳障者宜四物湯甚者六物煎加木賊蟬退白蒺藜

一痘斑入眼在白珠上者不必治久當自去惟在黑珠上宜治

之當清肝火

一凡病目熱者最宜忌酒及椒薑牛羊雞鵝鴨一應熱物并雞鵝鴨蛋皆不可用以防連綿不愈之患

一痘瘡熱毒傷目凡必用之藥如生地芍藥麥門冬山梔玄參草決明連翹黃芩黃連肝熱者龍胆草陽明實熱者石膏石斛腎火盛者黃柏知母三陰俱熱者地骨皮火浮不降者木通澤瀉翳障不去者木賊草蟬退白蒺藜氣虛者人參黃芪血虛者當歸熟地但火炎於上者不宜升陰虛於下者不宜

泄是皆治眼之大法

一痘瘡護眼法宜錢氏黃栢膏爲佳從耳前眼皮上下顫面間
日塗三四次可以護眼稀痘

一用點藥者凡目中生痘或食發物或熱毒太盛上蒸目竅以
致熱痛或生翳障切不可妄用一切點藥蓋其非毒卽冷必
致寒熱相激反以爲害惟余之金露散乃爲相宜可間用之
以解熱痛之急

徐氏曰痘之毒氣自裏達表故有目病治宜活血解毒而已活
血不至熱解毒不至寒但得血活毒散則口疾自愈

痘癰痘毒

六四

又痘母見前怪痘形證

痘發癰毒者亦名痘母經曰痘前發母者凶痘後發母者半吉
半凶大都毒發不透必發癰疽故蘊結於經絡之間然其壅
結也猶無足慮而惟其不能消散及治之不得其法則乃爲
可慮然散之之法當之要領其在虛實之辨而已如痘癰之
有大毒者不得不爲解毒有大熱者不得不爲清火俟火毒
畧清使當調理脾氣其有外雖見熱而內本不足者則當專
用托法務令元氣完固飲食不減則毒無不化何害之有若
不察根本強弱而但知攻毒清火則無不傷脾多致飲食日
減營氣日削膿血不化毒日以陷而痘變百出矣所以痘瘡

始末皆當以脾氣爲主苟不知此則未有中氣虛敗而痘能保全者

一痘癰初起壅盛疼痛元氣無損飲食如常者宜先用連翹歸尾煎或仙方活命飲以解其毒俟毒氣稍平卽當用四君歸芪之類以補托元氣

一凡用托裏之劑如癰毒內無大熱亦無便閉煩渴等證或素非強盛之質或以陰毒深陷形不掀突不紅腫不化膿痛有不甚者此其毒皆在內俱速宜用托裏之藥以六氣煎加金銀花甘草節防風荆芥白芷川山甲牛旁子之類如陽氣不

足者仍可加肉桂附子用酒水各半煎服或全用酒煎亦可
或托裏消毒散俱可酌用

一凡內熱晡熱而飲食少思者多屬脾胃不足血氣虛弱宜六
氣煎或溫胃飲加金銀花白芷○若癰毒色白而作痒者氣
虛也治同上○若根赤而作痒者血虛血熱也宜四物湯加
丹皮白芷○若腫而不潰者血氣虛也托裏消毒散或加肉
桂○若潰而不收者脾氣虛也宜六氣煎或六物煎加肉桂

一凡飲食如常而內外俱熱癰毒腫痛或煩渴或大小便俱熱
澁者宜大連翹飲或仙方活命飲可間用之○若飲食如常

內熱作痛或兼口舌生瘡者宜間用射干鼠粘子湯

一痘毒發癰有結硬實熱難解者宜排毒散

一痘後發癰癩者乃痘中未盡之毒留於經絡肢節而爲癰腫也或解毒或清火各有所宜凡欲表裏兼解者宜柴胡麥門冬散欲潤腸解毒者宜消毒散及四順清涼飲欲涼血解毒者宜犀角地黃湯欲清火利便解毒者宜大連翹飲

疔腫瘡

六五

陳氏曰凡痘瘡已靨未愈之間五臟未實肌肉尙虛血氣未復被風邪所搏則津液澀滯遂成疔腫宜用雄黃散綿蠻散等

則入血分今見痘家傷寒家多不用此豈亦古人之未之及耶抑不知四物湯爲可物耶

生地黃 涼血行血養血治痘瘡血熱血燥凡吐血衄血痘瘡紅紫及解毒藥中皆宜用之

芍藥 可升可降能清能斂治痘瘡血散不歸賴以收之使附氣分能瀉肝脾之火故止腹之熱痛亦能止汗

川芎 能升能散能引清氣上行頭角以起頭面之痘能佐參芪以行陽分而解肌表之邪此可爲引導通行之使但性多

辛散凡火在上而氣虛者當避之

白朮 健脾利水燥濕溫中能補氣故能發痘能固脾故能止

瀉

甘草 味甘平得土氣之正故能補中和中而兼達四臟佐理
陰陽惟其甘和而潤故能解剛暴之毒瀉枯涸之火

麥門冬 生津止渴清肺滋陰除煩熱解燥毒痘疹陰虛而多
火者宜之

糯米 善滋脾胃益中氣助血生漿能制痘毒不能內攻
扁豆 健脾和中養胃止嘔

柴胡 發散熱邪瀉肝胆之火解肌開表退往來寒熱

升麻 升陽氣達肌表散風寒善走陽明

防風 散風熱解表邪舉陷氣佐黃芪能托裏祛毒

乾葛 解肌清熱涼散表邪故能止渴

荆芥穗 解風熱消瘡毒利肌表退腫清咽亦散頭目之風邪

白芷 散風邪逐寒濕止頭疼除搔痒化癰毒善走陽明故能

起頭面之痘亦托肌肉之膿

麻黃 陰寒沉滯之邪非此不能散亦痘家之要藥而人多畏

之由不能察也

薄荷 散風熱清頭目能利咽喉亦解熱毒

羌活 散肌表之毒風利筋骨走經絡故能止周身之痛

官桂 味甘辛能養營解表性溫熱能煖血行經凡痘瘡營衛

不克而見寒滯者必用此以導達血氣且善行參芪熟地之

功

附子 脾腎虛寒元陽大虧凡泄瀉嘔吐不能止寒戰厥逆不

能除者非此不可以益火之源

生薑 辟惡氣散寒氣溫中氣開脾胃止嘔吐之要藥若欲理

中寒止腹痛則炮乾薑尤勝

陳皮 和脾胃達陰陽開痰行氣和胃消脹可降可升

山查 消食快胃解利宿滯開導六腑無辛香之耗故可爲參
木之導引

木香 調諸氣和胃行滯止瀉除胸腹痛亦能溫中若氣虛煩
熱者不宜輕用

丁香 煖胃逐寒順氣止嘔且除腹痛寒滯者不可少也

肉豆蔻 固腸溫中行滯止瀉中寒滑泄者最宜之

茯苓 利水益脾去濕熱故能止瀉除煩以通津液

澤瀉 利水下行能去濕熱以消腫亦導諸藥以降火

木通 大利小水善泄心與小腸之火能使痘瘡濕熱之毒從

小便而出凡內熱毒盛者宜之若熱退中虛者不可驟用

桔梗 性味輕浮能載藥上升清火解毒故治喉痺

鼠粘子 性味清涼能潤肺散氣利咽退腫欲解痘疹熱毒此

不可缺

紫草 味苦性寒能涼血活血制熱邪解痘毒滑利大便○程

氏曰大抵凡下紫草必下糯米五十粒以制其冷性庶不損

胃氣而致泄瀉惟大熱便秘者不必糯米也

蟬退 散風清熱疎邪氣故能解痘瘡之毒風

蠶蚕 散風消痰解毒尤利咽喉

川山甲 性閱而利善通經脈直達病所凡痘有毒盛而鬱遏不能出者宜此達之然必藉血氣諸藥爲之主而以此爲佐引則可

犀角 解心火及肝脾之火凡痘中血熱吐衄及焦黑驚搐煩躁不寧等證皆可用之以解熱毒

蜂蜜 益脾生津潤燥可結痂亦可落痂

硃砂 鎮心氣除熱毒墜痰涎安驚悸定神魂凡心經痘毒及痰火上壅有餘之證皆宜用之

琥珀 安神定志利水鎮驚

玄參 能解血中之熱清遊火滋肝肺除痘疹之熱毒

黃連 解諸熱毒瀉心肝大腸之火

滑石 甘涼下降利水道清解六陽之煩熱

石膏 清肅大寒善降陽明之火凡屬陽明實熱而爲頭痛目

腫口瘡咽痛身熱煩渴狂躁便結者非此不能解

連翹 清三焦浮游之火解痘疹癰瘍之毒

梔子 利小水降脾肺膀胱之火使從小便中出

龍胆草 性寒而降大清肝腎之火上退眼目之赤痛下清足

膝之熱腫

黃芩 性味輕浮能清肺金大腸之火

大黃 通壅滯逐瘀血退熱攻堅非有大實證則不可輕用

痘家藥忌 六七

人參黃芪皆補氣助陽之劑凡痘色白陷者宜用之若紅紫壯實者用之則血愈熱而毒愈熾紅紫者轉爲枯黑及甚矣

白朮能燥濕專補氣分亦能閉氣多用則潤氣不行痘難成漿助陽生火亦難收斂

茯苓豬苓澤瀉滲泄燥濕能令水氣下行多服則津液耗散凡陰虛於下而精血不足者當避之

川芎性升氣散凡氣虛者不宜多用火浮於上而頭痛浮腫者
忌之

生地性寒腸胃虛寒者慎之

升麻提氣上衝凡下虛上實氣壅煩躁者忌之

柴胡清散而潤利汗多者不宜用脾泄者不宜多用

紫草性寒利竅多服成泄瀉脾氣虛者忌之

鼠粘子通肌滑竅多服恐內損中氣外致表虛

蟬退能開肌竅多服恐泄元氣以致表虛

麻黃開竅大泄肌表妄用恐表虛氣脫

乾葛性涼解肌多用恐致表虛

枳殼下氣寬腸多用則損中氣

山楂散血解結多則傷血陷氣

砂仁散氣動氣氣虛者不宜用

烏梅酸斂宜散宜行者不宜用

川山甲銳性有餘補性不足若任用攻毒而不以王道爲之帥則無異追窮寇而出孤注能善其終者鮮矣

人牙性烈發表太過若妄用之則內動中氣外增潰爛

訶子龍骨枯礬皆能阻塞肌竅欲通利者宜避之

大黃耗削力雄血氣中虛者不可輕用

黃連大苦大寒原非厚腸之物泄瀉無火者大忌之

山梔黃芩黃柏石膏龍胆草滑石連翹前胡天花粉之類皆大寒之物非有實火熱毒者不得妄行濫用

附子乾薑肉桂吳茱萸之類性皆溫熱凡煩熱紫黑便結毒盛者皆不可輕用

瓜蒌仁開結陷氣滑腸凡虛痰虛火及中氣不足而爲喘促脹滿大便不實者皆大忌之

桑蛭亦名桑蠶不知劔自何人用以發痘今俗醫以爲奇品莧

相傳用余嘗遍考本草痘疹諸書皆所不載及審其性類不
過爲陰寒濕毒之虫耳惟其有毒所以亦能發痘惟其寒濕
所以最能敗脾且發痘者不從血氣而從毒藥痘雖起而中
則敗矣此與摠苗者何異矧以濕毒侵脾弱稚何堪故每見
多服桑虫者毒發則唇膚俱裂脾敗則泄瀉不止前之旣覆
後可鑒矣其奈矇矓者率猶長夜之不醒何蓋其但見痘之
死總未知敗在虫毒也余欲呼之用薪代柝而弁咎夫作俑
者之可恨

保元湯 痘一

調元湯 痘二

十全大補湯 補二十

調中湯 小三

五福飲 新補六

五味異功散 補四

養中煎 新熱四

七福飲 新補七

六味異功煎 新熱七

溫胃飲 新熱五

三陰煎 新補十一

九味異功煎 新因二二

胃關煎 新熱九

五陰煎 新補十三

六味回陽飲 新熱二

佐關煎 新熱十

理中湯 熱一

七味白朮散 小七

六氣煎 新因二一

理陰煎 新熱三

人參白朮散 小七

六物煎 新因二十

四君子湯 補一

參苓白朮散 補五五

四物湯 補八

六君子湯 補五

金水六君煎 新和一

六味丸 補一二一

五君子煎 新熱六

人參建中湯 補二六

貞元飲 新補十九

小建中湯 補二二

黃芪建中湯 補二七

生脉散 補五七

大補元煎 新補一

人參麥門冬散 痘二三

胃愛散 痘十九

酸棗仁湯 補八五

硃砂安神丸 寒一四二

團參散 小十

大和中飲 新和七

七味安神丸 小七二

參薑飲 新熱八

小和中飲 新和八

秘旨安神丸 小七一

益黃散 和十九

大分清飲 新寒五

加減參蘘飲 痘三四

養心湯 小五九

小分中飲 新和十

升麻葛根湯 痘二六

寧神湯 小五七

小柴胡湯 散十九

柴葛桂枝湯 痘三六

茯苓湯 小六十

柴胡飲子 痘四二

柴胡麥門冬散 痘二四

止汗散 小十一

大連翹飲 寒七八

葛根麥門冬散 痘一四一

抑扶煎 新熱十一

紫草飲子 痘六七

解毒防風湯 痘五六

蘓葛湯 痘二七

大蕪荑湯 小百八

前胡枳殼散 痘九四

柴葛煎 新因十八

肉豆蔻丸 小五六

仙方活命飲 外一

五積散 散三九

疎邪飲 新因十六

連翹歸尾煎 新因三二

柴歸飲 新因十五

敗毒散 散三六

荆防敗毒散 痘三十一

雙解散 痘四一

羌活散 痘三八

十味羌活散 痘三八

二陳湯 和一

羌活湯 痘四十

十三味羌活散 痘三九

橘皮湯 痘九二

白虎湯 寒二

人參白虎湯 寒三

惺惺散 小二三

化班湯 寒三

人參石膏湯 寒三

十宣散 痘十四

化毒湯 痘五七

黃連解毒湯 寒

和胃飲 新和五

排毒散 痘九八

葛根解毒湯 痘五三

六安煎 新和二

消毒散 痘四七

托裏消毒散 痘六

清膈煎 新寒九

抽薪飲 新寒三

四味消毒散 痘四八

黃芩湯 寒百五

退火丹 痘八四

六味消毒散 痘四九

生犀散 小二八

益元散 寒百十二

玄參地黃湯 痘八六

二妙散 寒一三四

天水散 寒百十二

當歸六黃湯 寒六五

瀉黃散 寒五七

導赤散 寒一二二

導赤通氣散 痘八八

二仙散 痘二十

神香散 新相二十

五苓散 和一八二

射干鼠粘子湯 痘七七

五德丸 新熱十八

四苓散 和一八七

御藥大半夏湯 和十一

保和丸 小三五

八正散 寒百十五

九味蘆薈丸 小百十五

抱龍丸 小八五

甘桔湯 因一七五

甘桔清金散 痘八九

百祥丸 痘九六

承氣湯 攻一

四順清涼飲 攻二五

萬氏奪命丹 痘八二

赤金豆 新攻二

桂枝大黃湯 痘四三

琥珀散 小八一

三黃丸 攻六八

良方龍胆瀉肝湯 寒六二

梅花飲 小八三

香連丸 寒百十三

加味龍胆瀉肝湯 寒六四

瀉青丸 寒一五一

當歸丸 痘九五

七味龍膽瀉肝湯 寒六三

通關散 痘八五

洗胆散 痘百七

洗肝明目散 痘百六

通神散 痘百十二

蒺藜散 痘百九

芍藥清肝散 寒六一

蟬菊散 痘百十

密蒙花散 因三十

景仲竹葉石膏湯 寒五

秦皮散 痘百十一

茵陳薰法 痘百十九

六味竹葉石膏湯 寒六

雄黃散 痘一三三

胭脂塗法 痘一二五

局方犀角地黃湯 寒七九

蕎麥散 痘一二四

敗草散 痘一二六

良方犀角地黃湯 寒八十

百花膏 痘一二三

黃栢膏 痘百十三

板犀角地黃湯 寒八一

紅綿散 痘七十二

綿蠶散 痘一三四

十一味木香散 痘二一

金露散 新四四四

救苦滅癩散 痘一二八

十二味異功散 痘二二

萬牛黃清心丸 小九四