

瘡癆經驗全書目錄

第六卷

怪症一百有九

遍身肉出如錐

眼見飛禽形

眼垂至鼻

腹中有聲應

好飲油

臥則四肢不動

皮痒抓之血出

眼白黑見物形

喘不能語垂死

手足甲出血刺

脇破腸出

口鼻氣凝如黑葢

頭面發熱有光

身生泡水出有石片

醉吞水蛭

小便屎大便尿

玉莖硬不萎

身及面腫如蛇

大腸蟲出不斷

兒身泡生水出

兒生無皮

寒熱肢有聲

腸出寸餘

鼻臭水流

肢脫而皮連

腹如鐵膽水出

眉搖而目不能視

皮血出脹如鼓

蛇痕

蛟龍痕

鱗瘕

雞瘕

口厥

瘡如蛇出數寸

眼視物顛倒

婦胞傷不能便

產婦出內線

產物乳垂至腹

婦見壁滿蓮花

病見物如獅

腫潰骨出

炙而血出手冷欲絕

頭皮咀出

肋竅兒啼

頭風耳雀鳴

產婦舌不收

婦生蟲

婦眼出血

產食茶粥一月身冷數塊

產門物如帕

婦三陰交血出欲絕

鬼擊身青

秋冬身紅點作痒

看剝死牛生泡

蛇入人竅

兒聞雷則昏倒

食下若別有咽至脇而痞

胸皆皆駝

項與頭堅硬

心口痛

身痒入骨

喘不喘啞

不嘔心中憒憒

夏行飲水寒熱如刀割

盤腸產

產後腹痛煩滿

婦腹諸病

婦腹痛陰中如石硬塞

兒遍身痒

陽物飛絲纏痛

胃寒腸熱

胃熱腸寒

疝引腹痛

口瘡不已

失音

脚指濕爛

新婚陽萎不舉

小便頻

女腕軟生物如豆痛

牙疼

臥身風出

刮腸痢

婦因餌泄面腫

食肉勞蟲

酒蟲

鼓脹

兒卒死吐痢

狐惑

兒生目不開

鵝虱入耳

烟薰欲死

禿積

兒生有四死症

收蝎咒

老婦腹痛飢蟲

發背塊倦不食

眼赤鼻脹大喘

蟲如蟹走皮中

鼻毛三尺長而痛

離魂

穿斷舌心血出

身頭浮腫如蛇

蜘蛛咬

蛇咬

魅化爲貓

食芥腹痛

治中鳩毒

食河鮀戒服藥

喉爛氣眼

大胞偏腎

中惡客忤睡死

雄黃毒

產戶垂腸

救凍死

臘魅卒死

一切藥毒

喉癰腸出

中惡中忤 眼見鬼物

一切菌毒

蟲如蟹左皮中

鼻毛三尺長而痛

離魂

穿斷舌心必出

身頭浮腫如蛇

蜘蛛咬

蛇咬

魅化爲猫

食芹腹痛

治中鳩毒

食河鮀戒服藥

喉爛氣腥

大胞匾啞

中惡客忤睡死

雄黃毒

產戶垂腸

救凍死

魘寐卒死

一切粟毒

喉嚨腸出

中惡中忤眼覓鬼物

一切菌毒

耳中出血

中惡客忤

天雄附子烏頭毒

舌上出血

酒食蟲

解河鮀毒

產傷胞破

解諸藥毒

五種蟲毒

解蟾別蝦蟆毒

癰口吐沫

治一切毒

解牛馬肉毒

小腸疝氣

草烏毒

解飲饌中毒

食魚中毒

食馬肝毒

服藥中毒

中惡熱悶

椒閉口毒

自死大畜肉毒

中毒

中諸毒

食蟹中毒

小兒雜症凡
十四款

甘草法

開乳法

浴法

水飲乳

初生七竈

瘡

驚哭有淚

醫學經驗全書卷之六

宋燕山竇漢卿輯著

天都洪曉巖
桐川陳友恭 全校

世傳秘方

人遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血擁用赤皮葱燒灰水
淋汁洗內服淡豆豉湯收盡而愈

人眼前常見禽蟲飛去捉之卽無此一胆經爲疾用酸棗仁羌活
玄明粉青箱子各一兩爲末每用水煎二錢和洋日三服

人眼珠垂下至鼻大便出血名用脹用羌活水煎數服卽愈

人腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲服雷丸而愈

人飲油五升方快意此乃髮人胃血聚化爲蟲也用雄黃五錢水

調服

一人卧於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病如說某肉卽以其與看不與食之失他物望也睡中流出饅唾卽愈

一人遍身皮底渾如波浪声痒不可忍抓之血出不能止名氣奔川人參苦杖青盐細辛各一兩水二碗煎十數沸飲盡便愈

一人眼內白皆俱黑見物依由毛髮直如鐵條不話如醉名血濶用五灵脂末二錢酒調下愈

一人忽然氣上喘不能語口中涎流吐逆牙齒搖動氣出轉大卽閼絕名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參各五錢水三鍾煎八分服入手足甲忽然長劄生肉刺如錐食葵菜而愈

人脣破腸出臭穢急以香油抹腸送入卽不出又以人參枸杞子煎湯淋之皮自合喫猪腎粥十日愈

人口鼻中氣山盤旋不散凝似黑蓋過十日漸漸至肩與肉相連堅勝鐵石無由飲食多因瘧後得之用澤蘭水煎口飲三盞五日愈

一人頭面發熱有光色他人手近如火炙用蒜汁半兩酒調下吐物如蛇慾安

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一塊如指甲大其泡復生抽盡肌肉不可治矣急用三棱莪术各五兩爲末分三服酒調

下

一人夜有醉者誤吞水蛭腹痛黃瘦不進飲食用小死魚三四箇猪

油煎溶燒勻入芭荳十粒研爛和田中乾泥丸如菉豆大以田中
冷水吞下一丸泄下爲度

人小便出屎大便出屎名交腸用舊輶頭燒灰酒下五分愈
人玉莖硬不痿精流無歇時如針刺搘之則脆乃爲腎漏漏疾用
圭子破故紙一兩爲末每三錢水煎日三服卽止

人身及頭面肉腫如蛇狀用雨濕磚上青苔一錢水調塗立効
人大腸內蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調服五錢自
愈

小兒初生如魚胞又如冰晶碎則水流用蜜陀僧羅極細末摻之
小兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土抗卧一宿卽生皮又方用白
早米粉疏撲上候生皮乃止

大寒熱不止四肢如石擊之如鍾磬聲日漸消瘦用茱萸木香等
分水煎服卽愈

一人大腸頭出寸餘候乾自退落又出名截腸病用苧麻油器盛坐
之飲大麻子汁數升愈

一人鼻脣臭流水以碗盛而視之有鐵色蝦魚如米大走躍捉之卽
化爲水此肉壞矣一日食雞肉二次一月而愈

一人大腹節腕但有皮連不能舉動名曰筋解用黃蘆酒浸一宿焰
爲末酒下一錢多服方安

一人腹中如鐵石脣中水出旋變作蟲行之狀遶身匝夜痒痛難忍
扒掃不盡濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮加麝香水調服之

一人眉毛搖動目不能視喚之不應但能飲食用蒜三兩取汁酒調

下卽愈

一人毛竅節次血出少間不出卽皮脹如鼓口鼻眼目俱脹合名曰
脈溢用生姜汁并水各一二盞服安

一人患蛇瘕乃蛇精及液沾菜上人喫食之腹內成蛇或食蛇亦有
此症其人常飢食之卽吐用赤頭蜈蚣一條炙末分二服酒下
一人患蛟龍瘕用寒水石飯三升每食五合日三服吐出蛟龍而
鱗瘕痛有來止或食鱗卽痛用雞屎一升炒黃投酒中浸二宿焙爲
末仍用元浸酒調下

雞瘕有病冷痰者醫曰因食自淪雞過多故也用蒜一枚煮服乃吐
一物如升大癥暴開視之乃雞雛也再服吐十三雛而愈

一人屍奄然死去腹中氣走如雷用硫黃一兩焰硝五錢細研分三

服水後當起則止溫瀝之井時再服而安

一諸瘡如蛇出數寸用硫黃末塗即消

一人眼中視物倒植用梨薑瓜蒂爲粗末水煎服得吐而愈

一婦產後有胞傷破不能小便常漏濕不乾用生絲絹一尺剪碎白

牡丹根皮白芨各一錢水二碗煎至絹爛如餳空心頓服不得作

聲作聲卽不効

一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服失笑散次以帶皮姜三斤研爛入清油二斤煎油乾爲度用軟絹兜託肉線屈曲於水道邊以前姜熏之冷則慰之一日夜縮其大半二日卽盡再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷不可治矣

一婦產後兩乳忽然細小下垂過小腹痛甚名乳懸用荳歸各一觔

內用半觔水煎服餘用燒烟薰鼻口二料乃効

一婦見牆壁皆蓮花此痰疾也服蒙石滾痰丸

一人患心疾見物如獅子伊川教以手直前捕之見其無物久久自愈繼服牛黃清心丸

一人患腫毒潰後不時出一細骨用生桐油調蜜咤僧如膏絹攤貼

妙此亦內熱骨乃所化之物也謂之名腐骨

一人炙火至五壯血出一縷急如溺手冷欲絕以酒炒黃芩二錢爲末酒下則止

一人頭皮內時有咀出以刀破皮用絲瓜葉搗汁搽之咀出益

絕

一人淵疽之發於肋下久則一竅有聲如嬰兒啼氣陽陵泉二七聲即止而愈

一婦頭風竄耳內常鳴頭上耳內有鳥雀啾啾之聲此頭腦摶風所爲也用背歸而愈

一婦產子凸出不能收以硃砂付其舌乃令作產兒狀以二女挾之壁外漸堆盤盆益令墮地聲嚮使婦聞而驚舌則收安矣
一婦忽生蟲一對於地能行長寸餘日後月生一對醫以苦參加打蟲藥爲丸服之又生一對埋於土中過數日發而視之暴大如拳名子母蟲從此絕根

一婦眼中忽有血如射而出或緣鼻流下但出血多時卽經不行乃陰虛相火之病遂用歸身尾生地酒芍加柴胡黃柏知母條芩側柏葉木通桃仁紅花水煎食前服數劑而愈

一婦產後食茶粥每日二十餘碗十月後遍身水冷數塊人以手搘

按其冷處卽冷從指下上脰至心如是者二年諸治不効以八物湯去地黃加橘紅入蟲汁竹瀝一酒鍾十服乃可

一婦三陰交無故血出如射將絕以指按其竅縛以布條昏倒不知人事以參一兩煎湯灌愈

一婦產戶下一物如帕有尖約重一斤却喜血不盡虛急與黃芪當术升麻各五分參歸各一錢水煎服三劑而愈

一婦被鬼擊身有青痕作痛以金銀花煎服

一人每至秋冬遍身發紅點作痒此寒氣收斂腠理陽氣不得發起拂鬱內作也宜以人參敗毒散解表再以補中益氣湯實表而愈一人因剝死牛督悶令看遍身俱紫泡急刺泡處良久遂甦更以敗毒藥而愈多服紫金錠

蛇入人腹中急以手捻定以刀剖破尾用椒或辛竦物置尾以線扎之卽自出不可拔

一小兒七歲聞雷則昏倒不知人事以人參歸身麥冬少入五味盡二斤後聞雷自若

一人但飲食若別有一咽喉斜過膈下絕達至脇而作痞悶以手按之則瀝瀝有聲以控挺丹十粒服之少時痞處熱作一聲轉瀉下痰飲二升並飲食正下而達胃矣

一人胸背皆駝頸漸短問其故因食皇鱉所致患上用紫蘇煎湯洗淨次用龜尿搽之取尿法以瓶置器中用鏡照之則尿出矣

一人心口痛熬白三根搗爛面粉三錢和勻熱酒調下立効

一人頸項腫與頭相綽按之堅硬漏蘆湯一劑服下發頓刻消散

卷之六
一人田間收稻忽然遍身痒入骨髓用食鹽九錢泡湯三碗每進一碗探而吐之三進三探則不痒矣

一少年玉莖挺長腫而癢皮塌常潤磨股難行兩脇氣沖上手足倦弱先以小柴湯加黃連大劑行其濕熱少加黃柏降其逆上之氣腫漸散莖中硬塊未消以青皮爲君佐以散風之藥服之外以絲瓜汁調五倍子末付愈

一病人似喘不喘似嘔不嘔似嚦不嚦微心中憒憒然無柰用生薑半夏湯主之半夏片半斤生薑汁一升水三升先煎半夏至二升後人薑汁共煎一升半待溫分四服日三夜一病止停服

一人暑月行百里渴而飲山水至晚以單席吟地上少睡頃間寒熱吐瀉身如刀刮而痛醫皆曰中暑進黃連香港飲不應予診其脉

細啜而候此中寒也衆皆咲曰六月中寒有是事乎丁以明子璫
中湯服而効

冬天傷暑一婦冬月酒酒惡寒翕翕發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫以虛弱用滌痰二陳湯不効子治脈虛無力類乎傷暑衆不然深究之婦曰昨因天寒取綿套蓋之得此一症誠哉傷暑也但綿套盛暑晒之熱取箱中必有暑氣今體虛得之易人故智是婦曰然遂用黃連香薷進二服卽安噫冬天傷暑夏月中寒病亦少見問切之功不可不知也

一盤腸產者臨產先腸出而後產子旣產之後其腸不收以醋半盞冷水七分調勾噴婦而三噴則腸收盡此良法也

婦人腹中諸病 用當歸一兩半方藥八兩澤蕷川芎各四兩
木茯苓各四兩爲末酒下一錢

產婦因子死經斷不行者半年一日小腹忽痛陰戶內有物如石
硬塞之而痛不禁衆醫不識青林曰此石瘕病也用四物加桃仁
大黃三稜以榔胡索附子澤瀉血竭二劑而愈

小兒遍身痒甚以生姜搗爛布包擦之而止

人在山亭裸體而卧其陽被飛絲纏繞腫痛欲瘳以威靈仙散湯
浸洗而愈

久患腸熱木谷不化腹脹痞滿泄痢不止用川烏頭去尖半兩山梔
仁乾生姜各一錢半姜汁糊丸酒送下日進三服

胃熱腸寒善食而眠便溺小腹脹痛大便澀青及三稜蓬木黃連各
一兩巴豆霜二錢半麵糊丸如菉豆大或茶或酒噙下三五九

痼氣牽引小腹痛

蒺藜炒

附子炮

梔子

兩

每三錢水煎服

目瘡不已名赴筵散

黃柏

青黛

蜜陀僧各等分爲末乾摻

矣音不言

調子

四枚生熟桔梗一兩生炙甘草

一寸生炙

更各半

小兒二錢童便水各一盞煎五七沸甚者不過三服

神應散春夏脚指又濕爛

枯凡

六錢

飛丹

五分

爲末摻之

一少年新婚欲交媾女子阻之乃逆其意遂陰痿不舉五日以至
筆燒灰酒下二錢仰起

小便頻數一日夜百餘次此脬氣不足服縮泉丸
益智仁烏藥大茴臂者等分爲末酒煮山藥打糊爲丸如桐子大
臥時用鹽酒送下七十九

一女子十六歲四腕軟皮處生惡物如黃豆大半在肉內紅紫色痛
甚諸藥不効一方土將水銀四兩曰紙三張挾熱蘸水銀三日自
落而愈

牙疼 新掘李樹根取白皮搗細濃浸時時含之絕根

一腳外腫身風出約至五升隨至血肉俱壞筋骨漸多扁痺不可言狀
一雖喫水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動異聞但飲

鹽醋湯數次安

小兒刮腸痢眼闌口合名曰噤口痢用精猪肉一兩薄切片慢火炙以膩粉末五分旋舖肉上炙令成脯如不喫放鼻頭聞香自然要

喫

父方臘肉脯煨熟食之大人亦可服

一婦閉瓶爲熱氣所沖面目腫而經閉

一用炊飯布絰久者燒灰隨付揩消

一人患瘧二年一日無肉味腹痛不可忍恐傳染置空室待自終三日無肉或患雞子病人首煎食將熟鼻中忽打噴嚏有紅線二尺自鼻出跳遂以碗蓋之煎熟視乃瘧蟲也

一人自切好酒片時無酒呼呴不絕全不進食日漸羸弱或執其手

縛柱上將酒與看而不與飲即吐一物如猪肝人酒內其人遂安
鼓長日食不能暮食痛浦名雞屎醜飲

大黃桃仁鷄屎要乾者等分布一不水一鍾姜三片煎湯調下愈
后臨卧服

又方用猪血不着鹽水待自凝硬瀝去水晒乾爲末酒下洩之妙
小兒卒死而吐痢不知是何病

狗屎一先絞汁灌之無濕者水煎乾屎又汁亦可

狐惑証下唇有瘡曰狐乃蟲食其肝黃芩煎湯洗之上唇有瘡曰惑
乃蟲食其臟因服內熱腸胃虛蟲出求食用蕩心湯大黃二兩芩
連一兩水煎服

本兒胎受熱毒牛下兩日不開

爐心燒過熟皮水賊名五錢水一益煎澄清頻洗之
坐女近愈做女工忽患頭疼甚諳藥不効一醫徐察之愈外畜
知爲鬱風飛人耳內咬而痛也以稍稍煎濃汁催之風死而出道
不痛

一居民逃難石室中以烟攻之偶得葡萄食之而甦又法以口含地
卽不死

積 鯽魚一枚四兩重去腸以亂髮填滿濕紙裹燒存性人雄黃
生麻油調付 用藥湯洗卽辣

小兒初生身破裂者必死陰不起者必死股間無肉死無奪門者必
死一云必假物以開之近有女之陰亦不開 者夫以小刀割之

收蠅法 每年除夕左手拽起前循右手執三尺長棍向門榻上敲

三不念咒云蝎云蝎蟄蟄七不向梁上走却來這里聲二敲七八
箭兜畢吸氣一口吹人於杖頭復吸其氣吹於執杖手心如此三
次卽已遇有蝎蟄以手摩之卽不痛可用一年次年除夜必如法
爲之否不驗也

一老婦喉心中咬痛得食則止心思香燥之物偶夏天猫繞脚而叶
此婦素性愛猫取鹿脯嚼之喉中忽有一物出急取之墮地頭足
皆有五寸長許乃飢蟲也

人背發一塊心神兀兀四肢倦怠飲食不進一醫曰此虱瘤也剖
開果虱合許甘草湯洗淨拭乾將多手油木梳煅灰爲末菜油調

搽立

眼赤鼻大端渾身出班毛髮如銅火大且中熱生翳氣結於下焦

白芷滑石各一兩爲末作一服水三碗煎至半冷不住飲盡乃安
人有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲鉅齒之化雷丸雄黃各
一兩爲末摻在豬肉片上炙熟喫盡乃安

一人髮上水珠如汗滴不止用甘草一片煎湯三四碗作三四服其
水即止此証自幼間服藥過多故也

一人鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍雖痛一
摘一莖卽后復生此因食猪羊血過多用乳香砂各一兩爲末
飯丸空心臨卧下十九卽落

一人自覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃自離魂用
辰砂人參茯神濃煎湯飲之真者氣爽假者化也
一婦六十餘歲得飢疾每作時如蟲吃心得食方解如是四年來

夏熟納涼有一狗甚愛適猶遠叫取鹿脯目嚼啖猫至於再嚼覺一物上觸喉間引手探得之如母指大墜地以火照之其物頭尖而圓類場沙魚形身如蝦破腹有八子其病卽愈

一人穿斷舌心出止不止以米醋用鷄翎刷所斷處其血卽止仍用

旨蒲黃杏仁去皮尖砌砂少許爲末煉蜜調擦或噙化而安

一人身上及頭面肉上浮腫如蛇狀用雨滴堵傅上苦痕水化開塗

蛇頭膏消

一人被蜘蛛咬腹大如孕婦有遊僧見之教飲羊乳一日而平

妖魅變化爲貓爲鬼爲鬼病人爲其所惑不肯言鬼巍然如痴川鹿

角眉揭衣用水調服須間卽寢言爲鬼所憑也

一人食芹菜忽患腹脹而痛醫曰蛟龍子多生芹上用餳糖粳米杏

除人皆幅首不安唯二三人不吐嘔蓋食肉少而酒多也一老醫云此蓋夜露之毒也如秋夜之氣清露亦不毒今人以酒麴漬之良妙以甘草煎湯飲之卽愈

隆慶三年己巳正月二十七日鹽商胡小溪家人媳婦年方二十三歲懷脹九月矣一日食魚魚骨梗喉間至半日嘔吐繼之以血碗許魚骨尚在喉中忽吐出一條約有二尺餘形如小腸濶五分內有所食魚菜粉皮飯未化家人爲推入口中尚餘五寸其夫復納人之遂昏倦自此嘔吐不止湯亦不能進延予治之遂將生炭火一盆放病榻前以好醋一碗沃之使醋氣盈滿其室清其神也進以牛黃清心丸腹覺有微疼再用入參養胃湯加

八參

一分

紅花

牡丹皮

當歸

川芎

白芍

生地

附腰

煎服五六貼病全愈矣

嗟夫此婦所吐之腸有類於腸耳若腸出而斷頃刻立斃豈有得
生之理此吐出者肺之系也因嘔吐太甚被氣冲逆而斷其連肺
之一頭隨吐而出今旣納入復吐不已氣不平耳今用醋湯以清
其神牛黃丸以清其心煎劑以補益其氣血故旬日之間安妥如
常此亦原其病而藥之耳豈肯效好利之人乘其危而邀名索物
者同日而語哉醫者意也全在活法書此以爲世勸

耳中血出不止

龍骨末付之

救凍死以熱灰熨心冷卽易之日間氣出以粥湯溫補

也中惡中忤忽然眼見鬼物惡氣驚然倒地四肢厥冷兩手握拳口
鼻出清血此與尸厥同勿移動卽入人統燒火及安息香射督

仁乳餅羹服之三升日三服吐下蛟龍子有兩頭者
明太宗皇帝好食生芹日久腹痛召大醫盛御醫治之盛詢知好食
芹菜乃製田中泥土爲丸服之二次明早利下蟲無數皆小螞蝗
小沙塔子耳其痛即愈

隆慶二年十一月友人吳愛樓喉間忽生一塊形色如田螺頗堅硬
一月餘爛開寸許氣甚腥臭至十二月邀麟診視之莫測其爲何
症不敢輒答坐良久細思之間其家眷下曰曾患楊梅瘡百對曰
不曾患此瘡止一日忽見孩兒頭面皆生楊梅瘡問曰此兒誰家
子也對曰病人之長兒也遂原其由愛樓得子甚晚頗鍾愛晚以
頭枕父臂子曰對父之口其毒氣薰蒸於肺故喫之下肺之上爛
一大孔急以鮮蚌大者以刀抉開取其水以絹濾淨一日五六次

灌之吐出臭涎盈斗將

水片

孩兒茶

雞內金

明砂

牡礪

大紅絨灰

青錠

人中白

杏仁灰

等分

未之極細吹入患處一日七八次外服人參

桔梗

甘草

玄參

黃芪

天花粉

鼠粘子

生地

芍藥

當歸

金銀花

小柴胡

冷飯糰

麥冬

右剉水煎服三月而愈

一少婦產兒後忽玉戶中垂尺許如白腸之狀少不知事私以手摘
斷至晚腹痛號泣而絕此腸卽生腸又曰胞戶子宮切不可損損
則傷生盡氣血衰敗未能收人宜多進活血之劑三二日問日然
收入不足憂恐也予治四三人皆以此藥之力

友人春月將熟羊肉熟後肉露放月臺之上明日治以蘸卷

蘆木桃頭之類待省方可移歸

舌上出血如簪孔 赤小豆杵碎一升水三碗和攪取汁每服一盞

不拘時服

槐花末 穀上亦
妙名曰血虧

婦人生產傷動尿胞破終日不能小便但漏濕耳

黃絲絹者

一尺生
剪碎

白牡丹根皮子葉者

爲未用
無不効

白芨末

一錢水

鍾葵梢爛如泥空心服服時勿作聲作聲

不效慎之

中惡客忤腫死射香一錢研和醋灌一令人腹即甦

人患癰口出微膿如蟹吐沫此肉潰透膜也瘡腸透膜十無一生
須大補亦不活也

琥珀萬安丸

治男婦酒食蟲

枳榔

四兩

白牽牛末

黑牽牛末

各一
兩

雷丸

大黃

知母

一兩

貫眾

一兩

沉香

木香

各

蕪荑

一兩

右爲末每用四錢五更先嚼生姜一塊火用隔宿糖湯露一夕次早調藥服取下黃赤黑曰蟲積病根甫至口膠喫白粥補之先服生姜免至惡心此方亦可水丸服四錢重

雄射散

治五種蟲毒

雄黃

末

麝香

另研各一字

國老飲

治蠶症

用生羊肺一指大以刀切開內藥在內肺裹不下

曰凡

未甘草各等分

右爲細末每服二錢食遠水調下或吐黑涎

或瀉皆効若平生預服防蠶者宜以甘草熟炙煮服卽內消不令

吐神驗

聖丹治諸藥毒一切藥毒神効

硃砂另研

大山豆根五錢

雄黃

黃丹

黃藥子

續隨子生研

巴豆不去

班貓

去翅足

糯米半生半炒

赤蜘蛛二條一死一生

油

蜜

牛

右各修製入孔鉢研和於端午重陽臘日修合勿令雞犬婦人見用糯米糊丸如龍眼核大陰乾瓮盒取每服一丸茶清吞下不得嚼破須臾病人自覺心頭如洩斷皮條聲將次毒物下或自口出或自大便出嫩則是血老則成鱉或蟻蛭等狀藥丸凝血並下如口噤揭開下藥或蛇蝎諸毒以醋磨傅患處忌酒肉毒物一月惟歟飲飯可也

齊杞湯解諸藥毒

齊杞能亂人參
卽此齊杞也

薺莞

黑豆

甘草各等分

右咬咀每服七錢水二盞煎八分去渣溫服
奇方 治一切毒

白扁豆晒乾爲末每服二三錢新汲水調頓服得利則安
一方 解砒霜毒

白扁豆

青黛

甘草各等分

巴豆

霜去蕊用半斤

右爲細末每服一錢以砂糖一大塊水一鍾化開調藥飲之毒隨利后宜進五苓散益元散

又方 解砒霜毒以早禾稈燒灰新汲水淋汁納袋瀘過冷服一碗
毒從下利即安

一方 藍欖子 解砒毒及尸蠭毒用藍頭子畱三味相和研水服

之或人薄荷汁尤妙

解巴豆毒 寒水石磨水服黃連煎服葛蒲生者搗取汁服
中巴豆毒 其証口渴臉赤五心煩熱利不止用芭蕉根葉搗
解草烏毒 調曰

草烏之毒最粗凶

甘草濃煎服有功

米醋砂糖皆可用

白凡水點亦能攻

解天雄附子烏頭毒

防風裹肉濃煎服

解一切菌毒

掘一地窟取黃土以新汲水於內攏之澄清少取水

飲之名地漿

解河豚毒 一時困急以桐油多灌之使毒物盡吐出爲急或以

白凡爲末調湯服中河豚毒能殺人服此藥毒自消

解蟾蜍蠍蝮毒

生豆豉一大合

新汲水一碗煮豆豉濃汁頓服効

解食牛馬肉中毒 大甘草四兩以無灰酒研服盡病人量飲之須

臾吐大瀉如渴不可飲水飲之必死

射后方 服雄黃中毒 防已汗解之

金櫃玉函 治誤飲餌中毒者未審中何毒卒急無藥可解另煎甘

草齊危湯服之入口便活

聖惠方 治中鳩毒氣欲絕者用葛根三合水三盞調飲之如口噤

者以物揭開灌之

鳩食半夏
苗故有毒

射後方 治食魚中毒濃煮橘皮飲汁

梅師方 治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三七枚和水 飲服之

雄者兩

頭尖

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或不自沫身體冷急

用井水三二碗飲之立解椒毒

或煎濃豉汁服之

聖惠方 治食蟹中毒以生薑汁或黃乾蒜汁或冬瓜汁或紫蘇湯

並佳

葛氏方 食自死六畜肉中毒黃藥末服方寸七末解再服之

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩渴欲死燒犀角末水服方寸七

肘后方 服藥過劑及中毒煩渴欲死刮東壁土以水三升調服之

較耕錄 治食河豚者一日內不可服湯藥恐內有荆芥與此物大

相反亦惡烏頭附子之屬世傳中此毒者乃取糞糞清乃解否則必死又聞不必用此物以龍腦浸水服之能解或橄欖皆可解後

必死又聞不必用此物以龍腦浸水服之能解或橄欖皆可解後

得一方用槐花炒過與乾胭脂各等分同搗爲水用菜豆粉水調灌入少如無新破櫈以其核多磨汁服之良愈

方 治中諸毒卒惡熱黃闌欲死者以人尿者最効酒與水和服其乾者燒烟絕水清飲汁名破棺湯

棺散 治魘疰卒死及爲牆壁竹木所壓水溺卒瘡卒致闌絕產婦惡肚沖心諸暴絕証

半夏湯泡七次去滑爲末吹入鼻中 或以皂角末吹入亦可

凡魘者不可用燈照亦不得近前急噴但痛咬其足跟並大拇指甲邊或以皂角末吹鼻

硃砂散 治中惡中忤鬼氣其証或暮夜登廁或出効野或遊空室冷屋或人所不至之地忽然眼見鬼物口鼻或者惡氣驚

四肢厥冷兩手握卷鼻口出清血此証與戶厥同見此切勿移動
卽令親人圍繞燒火或燒射香安息香蘇木桂木之類直候証省
方可移歸

犀角

研末

生射干

硃砂各一錢

石爲末每服二錢新汲水調灌之

艾方

雄黃爲細末每服一錢桃葉煎湯調灌下

艾方

治人恍惚見鬼發狂平胃散加辰砂末滾湯下

艾方

治客忤中惡多於道路在外處得之令人心膈痛腹滿氣冲
心胸不急治殺人好京墨爲末每服二錢沸湯調服或瓦器盛湯

用衣襯貼於肚上熨之湯冷則換

灸法

牧麁死及一切卒死及諸暴絕証用藥或不効急於人山穴

及兩脚兩大拇指離甲一韭葉許名灸三壯五壯卽活

又法 灸腰中百壯亦効

灸大胞屬腎以艾炷放在大拇指甲并坐 在肉灸七壯七日避風勿洗足戒房勞卽効

小腸痛氣以陽物扯長對中毛際再連左右兩邊以物往處點記之小艾壯灸七斷勿

又烏絨樹炭肉子微炒爲末早辰空心好酒調下三錢

小兒雜症

小兒初生休與乳取甘草一指節長火上炙脆以水三合煮一合噙蘇兒口中可覬殼上兒當快吐膈中惡汗后待見飢渴更與兩服不吐盡一合止得吐惡汗后見智慧無病

新生三日開腸胃研粳米濃作餌如乳與兒服

兒初生時以糟胆汁碩湯內浴兒無瘡疥之疾

用之

生下不飲乳及小便不通乳汁二合葱白一寸分四破銀石器內煎

合灌立愈

生下舌下有膜如榴子連於舌根令兒語言不發可摘斷微有血如
血不止燒髮灰摻之又用白凡灰金底墨酒調用此治名七星瘡
或以細針刺之驚哭有淚是肚腹痛用蘇合香丸酒服

小兒睡中遺尿不自覺以桂木雞鷄肝等分爲末日進三服
不小便鹽安臍中熨之

尿血甘草煎服之

凍瘡取金毛狗脊上毛貼之

頭面痘癩剝去膿血出以真麻油潤之卽成瘢痕酥亦良

痘斑瘡心燥目眼不安升麻煎汁綿蘸拭乾

諸骨入肉不出者煮白梅肉爛研象牙末厚付骨刺自出

種芒人喉中取鵝涎灌之立引

釣魚針勾入喉中難出先用木針撐口次以糯米珠算盤珠裸穿
線中扯直即出

尿床以羊肚盛水令滿繫兩頭煮熟開取水頓服

小兒月內糞門上忽有瘡孔此乃糞勾瘡也深難療者當用白褐虎
灰摻之

又方

紅絨灰二錢

珍珠五分

輕粉五分

孩兒茶三分

血竭二錢

乳香一錢

各爲末乾摻

以醫一七空在百會穴用艾圓如半粒黃豆大者灸五壯爲度五壯之內不拘次第嬰兒哭聲如平時無異者生其聲嘶不響者死累試累驗百會穴在頭頂心旋毛中是穴乃嬰兒月內雖無驚病依法炙之能免一世之驚況泄瀉炙之亦妙

附錄蠶毒桃生毒

四端

福建諸州大抵皆有蠶毒而福之古田長溪爲最其種有四一曰地蠶二曰金蠶蠶三曰蝦蟆蠶四曰蠍蠶蠶皆能變化嚙見不常皆有雌雄其交合皆有定日近者數月遠者二年至期主家備禮迎降設盒水於前雌雄遂入於水中交則毒浮其上乃以針眼刺取必於是日毒一人蓋陰陽化生之氣納諸人腹而托以乃育越宿

則不能生故當日客至不暇輒宗親朋舊必施之凡飲食薦餌皆可入獨不置熟羹中遇熱則消爛或無外人至則推本家一人承之毒初入腹若無所費積久則蠶生藉人血氣以活益久則滋生長乃食五臟晚久痛楚不可忍惟啜百沸湯可暫息須臾甚則呴呼宛轉爬刮床席臨絕口眼耳鼻口漏出蟲數百形狀如一漬於水暴乾久而得水復活死者之屍雖火化而心肺獨存殆若蜂竄淳熙中畜蠶之人事泄呈之官檢其家得銀珂領子五色線環琰及小木棋子兩面書五逆五順四字盛以七孔合叉針兩包各五十枚而十一無眼及大蜈蚣一條率非尋常人家所用鞠訊其人乃云所謂順逆拱子者降蠶之助所用以卜也得順者家當之逆者家當之針之無眼者以眼盛藥既用則去之蓋所殺十一人

矣五色線凡蟲喜食綿綿不可得乃以此代其銀珂領者欲嫁蠱
移諸他處寘道旁冀見者取之也凡中蟲毒無論年代遠近但煮
一雞卵搗銀釵於內併合之約一食頃取視卵俱黑卽中其毒
也其方五倍子二兩硫黃末一錢甘草三寸一半炮出火毒一半
生用了香木香射香各等分輕粉三分糯米二十粒共八味入小
沙鑛內水十分煎七分候藥面生皺皮用熟絹慮去渣通口服痛
人平正仰臥令頭高覺腹間有物衝心者三卽不時動若吐出以
桶盛之如魚螺之類乃是惡物吐罷飲茶一盞瀉亦無效旋煮白
粥補忌生冷油膩酢醬十日後服解毒丸三兩經旬日可得平復
有一顯宦與泉州高僧西遊道由峽程其村舍皆能畜毒若就食必
遭其毒無可奈何僧曰吾有神咒可無憂也食至僧閉目持誦俄

見小蜘蛛延緣益吻僧曰速殺之於是竟食無所損其咒曰姑蘇
啄磨耶啄吾知蠱毒生四角父是穹窿窮母是舍耶女眷屬百千
萬吾今悉知汝磨訶是時同行者競傳之所至皆無恙更傳解毒
方用豆豉七粒巴豆去皮兩粒入百草霜一處研細滴水研如散
豆大以茅香湯送下七丸 又方 治金蠱毒纔覺中毒先含白
礬味甘而不澁須嚼黑豆而不腥者是也急取石榴根皮煎湯飲
之卽吐出活蟲無不立愈又以白礬芽茶搗爲末冷水調服凡一
切毒皆可治

昔一人肋下忽腫起如生癰瘍狀黃間大如盤識者云此桃生毒也
候三更以蒙豆嚼試若香甜卽是已果然速搗川升麻爲細末以
冷熱水調二錢速服之遂瀉下眞生蕊數莖根鬚皆具其腫卽消

續煎平胃散調補且食白粥經旬始復常

有一書生中雞肉桃生使商人善醫與藥服一注積肉一塊剖聞筋膜中有生肉存已成雞形頭尾嘴翅悉肖似凡食魚瓜果皆能用桃毒初中時覺胞腹稍痛明日漸加攬刺滿十日則內物能動騰上則胸痛沉下則腹痛積以瘦悴此其候也在上隔則取之其法用熱茶一甌投膽礬半錢於中俟礬化盡通口呷服良久以雞翎探喉中卽吐出毒物在下隔則瀉之以米飲下鬱金末二錢毒卽瀉下乃碾人參白朮各半兩同無灰酒半斤納瓶內微火慢熬半日許度酒熟取出溫服之每日一杯五日乃止然後飲食如常此蟲毒桃生毒世人乃極難治者予偶閱古書中得之專附錄於後以備參考焉

徽瘡秘錄總說

徽瘡一症古未言及究其根源始於午會之未起自嶺南之地至使蔓延通國流禍甚廣今當未會之初人稟浸薄天厲時行交媾閨精氣相傳染一感其毒酷烈匪常人體淪肌流經走絡或中於陰或中於陽或伏於內或見於外或攻臟腑或巡孔竅有始終只在一經者有越經而傳者有問經而傳者有毒伏本經者形症多端而治法各異卽如

毒中腎經始生下疳繼而骨痛瘡標耳內陰囊頭頂背脊形如爛柿名曰陽徽瘡甚則毒傷陰陽二竅傳於心發大瘡上下左右相對掣痛連心移於肝眉髮脫落眼昏多淚或瘻爪甲毒伏本經作偏正頭痛甚則目盲耳閉或生嗣不壽久則毒發囊穿

毒中肝經先發便毒嗣作筋疼瘡標耳項脇肋形如砂仁俗以砂仁
瘡名之甚則筋疼不起傳於脾四肢發塊痛楚或痄爛腮腫移於
心生瘡如癌痛痒交作毒伏本經大筋微疼久則毒發頸項兩膝
毒中脾經瘡標髮際口吻或堆肛門形如鼓釘俗以廣瘡名之甚則
毒伏臟內藏於腎骨痛髓烈發塊百會委中湧泉等穴移於肺肌
膚生瘡如花色紅紫褪過卽成白癥毒伏本經發斑如丹久則毒
結腸胃

毒中肺經瘡標腋下胸膛面頰形如花朵俗以棉花瘡名之甚則毒
聚咽嗌傳於肝作筋疼遇月郭空或天陰申酉時分作疼移於腎
作腎臟風痛痒交作毒伏本經生赤白癥久則毒結膺臆臂膊
毒中心經瘡標肩臂兩手紫黑酷似梅瘡俗以楊梅瘡名之甚則毒

攻眸子傳於肺發喉癬漸蝕鼻梁多作痰睡移於脾生鴟掌風癩
手足起指不隨毒伏本經十指流痛久則毒攻舌本或結旁小腸
是症也不獨交媾相傳稟薄之人或入市登園或與患者接談偶中
毒氣不拘老幼或卽病或不卽病而慘痛週身或不作痛而傳於
內室或內室無恙而移患於子女甥孫者故備述受病根源施治
本末方法啓前人末法之秘病有經絡毒有淺深藥有緩急察脈
審症應攻應補毫不可紊毒未傳變一臟見症者半月愈三臟見
症者一月愈五臟俱受病者五十日全愈此皆獨得之法已經申
証海內名公妙在易生易褪疤不紫黑身無痛苦交媾不染生嗣
無恙不伐胃氣元神誠千古不易王道之聖藥也設或妄施汗下
點擦薰洗等藥徒速一時效驗殊不知毒伏於內戕賊臟腑釀成

以上諸症以致投藥周效余能刻日收功又能拔去輕粉之毒使終身無害非若粗工之不經者此症直可自任故爲是說以公之

徽瘡或問

或問曰徽瘡爲患何目而昉乎余曰嶺南之地卑溼而暖霜雪不加蛇蟲不蟄諸凡汗穢蓄積於地遇一陽來復溼毒與瘴氣相蒸物感之則徽爛易毀人感之則瘡瘍易侵更逢客火交煎重虛之人卽冒此疾故始謂之陽徽瘡云以致蔓延傳染所以娼家有頭過之說皆由氣運所始因漸而致也

或問徽瘡爲氣運所使有云廣瘡何也余曰廣瘡者與痘相類痘瘡古所無有始生於北其氣自北而南漢時謂之胡痘由先天之所中無謂男女貴賤遇歲火流行鼓液而發若徽瘡者古亦無有始

起於南其氣自南而北今時謂之廣瘡由後天之所感不問老幼愚智元稟虛怯者觸穢而染胡痘以地命名孰非氣運之所使乎或問此症有謂楊梅瘡有謂棉花瘡有謂砂仁瘡名狀不一者何也余曰毒之相感染者一氣也臟之現症者各異也如痘瘡有紅斑者癰如痘如麻如蠶子如土蜘蛛如茱萸如葡萄或移毒眼曰肘膝形症多端大約似荳者多半故名曰痘瘡如徽瘡有赤遊紫癰如瘋如疹如砂仁如棉花如鼓針如爛柿如楊梅或結毒破爛孔竅各狀不一大約似楊梅者多半故名曰楊梅痘瘡梅瘡皆以形命名所以不一也

或問其瘡傳染不已何也余曰昔人染此症視戚不同居飲食不同器置身靜室以俟愈故傳染亦少邇來世薄人妄沈匿花柳者眾

忘於避忌一犯有毒之妓淫火交熾真元弱者毒氣乘虛而入初不知覺或傳於妻妾或傳於妓童世上鮮有醫書可正故有傳染不已之患

或問者幼之人不近妓女奚染此瘡竟有結毒者何也余曰不獨交媾鬪精或中患者毒氣薰蒸而成或祖父遺毒相傳此又非形接之比也

或問有人與患者同寢共食不傳染者何也余曰此由先天之氣充固邪氣無間而入所以有終身爲妓十世作風流客者竟無此恙或問交媾偶中毒氣有輕重否余曰毒隨神轉走絡流經壯者氣行則已怯者則着而爲患

或問諸痛痒瘡瘍皆屬心火何心經獨擬於後耶余曰此毒上起脾

肺下起腎肝心乃陽主陰邪不能先犯諸經傳變而心始受邪故初生瘡子不爲痛楚或元陽虛怯直中少陰者發作遂痛

或問毒傳臟腑切脈可知否余曰脈者氣血之道路氣清脈和氣濁脈滯若有毒者其脈必沉如毒聚肝經者左關脈必沉澁寅卯時胗之或遲或結不復流同者其毒深重餘臟倣此非若他毒以洪大滑數爲準反是者症必難治

或問有患者服藥而愈精神未復者何也余曰毒未盡化藥不勝病耳蓋毒不盡則精神不復非骨節酸痛則疮色紫黑故交媾便有所染生嗣未免有毒倘或性氣躁率屢犯禁忌者遂使一分之毒未除竟能復十分之患不知者反責前藥無效此非倦藥者自廢歟

或問醫治此患或用湯藥者或用散藥者或用丸藥者皆能獲效有等患者深慮輕粉爲害畏服丸散單用煎劑能收全功否余曰審察病機者醫之智也攻邪伐病者藥之能也夫毒有多少藥有盛衰治有緩急方有小大臟有高下腑有遠近症有表裏藥有輕重草木之性多爲湯液金石之品俱作丸散故方有七大小緩急奇偶復劑有十宜通補瀉輕重滑滯燥濕方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用凡治病在陰者毋犯其陽病在陽者毋犯其陰犯之者是謂誅伐無過病在於經則治其經病在於絡則治其絡病從氣分則治其氣病從血分則治其血病在其表毋攻其裏病在於裏毋虛其表邪之所在攻必從之受邪爲本見症爲標五虛爲本五邪爲標病屬於實宜治以急實者邪氣勝也邪不

速逐則爲害蔓延故治實無遲法病屬於虛宜治以緩虛者精氣
奪也治宜次第故治虛無速法亦無巧法虛則補之實則瀉之有
是症而用是藥此萬世之常度也如傷寒禁用丸藥恐庸俗誤用
巴豆丸若用大黃丸則宜矣且業有專門工有高下又非槩論也
或問此症有用一二方而愈有用百藥無效者何也余曰一二方而
效者多因稟厚毒淺或患者忍心耐性訪醫擇藥調攝得宜所以
正氣足而邪自除也若百藥無效者乃中毒之深也又非毒之中
深由受毒之始速求病瘉不究標本旣投湯劑以致真元耗削藥
毒蓄積於內遂有變証雜出往往至於傷生患者醫者竟不覺察
故未經藥餌者僅爲終身不瘳之疾悞投藥石者定罹天橫之患
由是紅紫眩亂使病者暗受其弊也

或問治法有用輕粉者定心者有煎湯薰澆者有藥點者有燈照者或
効或不効而受累者何也余曰凡此四法取効一時與庸工用輕
粉無異得其時者効或有之失其時者其毒反熾而終身不瘳也
或問何爲得時何爲失時余曰毒盡達於肌表而治之則爲得時毒
未透發而妄攻者謂之失時

或問患者視白製藥或用食物發之仍有結毒者何也余曰世人徒
知庸俗指授輕粉遏藥政有結毒後患殊不知妄施蟲介草汁過
服敗毒殺毒寒涼等藥其累不減於輕粉也

或問初生瘡瘍便毒入瘡細子至筋骨疼痛喉癰破鼻發塊上下破
爛孔竅齶掌白癥其治同否余曰感此毒者一氣也然毒之見症
者不一也如傷寒疹子從表而傳裏發病妄瘡從內而持外惟此

症出人無常伏見不論其本則究其末可正爲稟有厚薄病有
新久士有上下藥有良醫可局一定之方而欲愈不一之疾乎
或門已上見症據經服藥能指日收功否余曰此皆獨授秘密得心
應手譬諸行熟道者遠近可計步而至也如初生下疳腫爛未作
骨痛者服藥十三日愈痛去陽物摻藥不効名虹便或爲卷心服
藥二十五日愈橫痃雙王者服藥十三日惡阻生便毒作筋疼者
服藥十九日愈便毒潰破不歇名爲魚口兼之疳瘍者服藥廿六
日愈陽物生瘍如楊梅理滿狀如鼓椎他處不生者名爲獨脚楊
梅瘍服藥四十五日愈生瘍形如炒仁內作筋疼者服藥二十二
日愈形如爛柿內作骨痛者服藥三十一日愈瘍櫻核際口吻吐
門他處未見者服藥二十日愈形如大豆多見四肢者服藥

十七日愈胸脫面煩先標形如花朵者服藥二十五日愈上下
右對人形如楊梅者服藥三十三日愈眉骨疼痛遇天陰日晚
甚者服藥二十二日愈結毒腮腫肩膊未破者服藥三十二日
愈塊破年遠者服藥三十七日愈結毒委中湧泉玉莖百會等處
未破者服藥三十一日愈已破者服藥三十六日愈十指慘痛爪
甲發癩者服藥二十六日愈候癩日久成天白蟻蝕鼻者服藥二
十五日愈毒壅肺道不時吐痰而聲啞者服藥二十七日愈毒透
肌膚肢體生癬硬癰加錢色紅紫者服藥三十七日愈毒透
生鵝掌風者服藥四十二日愈毒流肉分蛇燭蔓延者服藥四十
五日愈胎毒胎兒屢患瘡癰遊風丹腫者服藥二十四日愈生兒
無皮不壽者必是父世蓄毒所使當以父母脉氣方見毒之有無

輕重然後服藥疎滌餘邪補立正氣庶使後孕子女永無胎毒故
微病必須服餌湯劑不可亂投尊牛者保之

或問服藥愈疾限日刻期能勿爽信乎余曰製劑療疾不外陰陽五行生成之數合而察之切而驗之若水鏡鑒形不失毫髮故病於內者司內揣外病於外者司外揣內治之之道無踰此矣非獨是疾諸症皆然夫病爲主藥爲賓賓主相得邪氣乃服邪氣一伏則限期勿爽矣

或問有毒壞心竅肢體瘦怯者醫能復原否余曰能解前藥之毒按經銷鎔其邪重施培植元本耳雖孽而復讐眼將暗而復明鼻將閉而復聾體怯者復知陽曹者復長大都泊此症者不外化毒一法第化毒之法不外攻邪補元非明經察脈辨證之精毋得妄治

故謠云傷寒染毒黃瘡癰癧病不服藥爲上至言也原非有病而不樂嘗恐醫工之不善也故有此戒

或問上扶苓味甘氣平溫胃健脾暖筋骨倘過服寒涼損胃毒滯脾經飲食少進者非此不能奏効若毒在他經脾胃健旺者縱多服亦不見功如脾虛唯寫者服此實有奇驗故曰奇良非虛名也

或問丈夫染此症內宜預服敗毒等藥可否余曰上工治未病者毋容邪氣侵也今人未見毒氣有無遂服敗毒等藥果有毒者則可如無毒者徒使元氣內虛內一虛則外邪易入是無病而使之先病也戒之慎之

徽瘡治驗

庠生年十八肄業郭外漸漸眉髮脱落遍身拘急從風治不効分
候其脉沉澁且緩此全乘水位乃徽疹毒氣所感也用發藥三劑
吞牛黃蟾酥丸大汗之次服化毒丸兼用龍膽瀉肝湯旬日
外果發細瘡如砂仁隨生隨褪二十日外瘡毒盡化眉髮復生
一詞客死楊梅疮傳於內室多方調治僅愈惟生兒多天就余商之
余曰此乃先天遺毒使然或初生無皮或月內生瘡或作遊風丹
腫或發塊或生癧皆微瘡之遺毒也遂倩余胗脈細按之六脉無
恙氣血和平何生嗣多天乃知其內室蘊毒必革有害胎元節用
逍遙湯加忍冬花川石斛貝母威靈仙二十餘劑兼服化毒丸字
丸一料嗣服加味養榮丸不一載即舉一嗣後二年又生一女章

瘡俱勣諸疾不侵

二兩堂患頭痛沿及手臂不能舉動易數醫服藥二百餘劑不瘳
後頸項發瘻塊三五枚又以瘻瘍政治亦不効余察其脈與症
合乃出前醫藥接皆以治風治火治瘻治而虛治瘻瘍余曰是衛
瘻毒氣所感太陽厥陰受症何治之謬也主人始語曰向余出京
患便毒豈餘毒相染耶先生之言不誣矣即以保安湯十劑間服
化毒於字九至半月手臂舒暢頭痛全無後更甲字丸至二十日
外頸塊消散又服加味地黃丸方獲全効

一見絕半歲患赤遊風其父用毒藥發之起瘻如癰或乾或濕身無
完膚其父邀余視之余曰此雖胎毒必爲瘻瘍惡氣所遺衆口曰
伊父性吝青樓毒或有之遂預化毒庚字九倍加半黃兼用辰砂
六一散每日間服六次人參湯送下至七日始褪二十日全愈

一貴介午二十餘染瘧日久妄用丸散大肉已削止存皮骨且咽喉爛外瘡水伏形勢微甚余懶治患者二兄曾犯此症且無嗣請治其弟余用大補藥熬膏日飲每早用化毒戌字丸晚服辛字丸至十五日喉肉始長飲食漸增至三十日身瘡褪剝又服大造丸至五十日肌肉方生七十日能步履而愈

一賈年四十餘患瘡瘍者有年塊發頭頸如拳右腮腫大如瓠者腮破遺喎嘔損陽粥食不能下日每日喉痰升許肢體羸瘦半以待斃余視其症危甚虧脉息尚有胃氣遂以六君子湯加貝母膽星石斛天麻兼服化毒壬字丸至二十日腮消已膿頭塊始消飲食便利又用戌字丸兼虎潛丸早晚服至三十餘日而腮腫如故飲食倍增更服辛字丸至五十日而諸症皆愈形更肥

縉紳年四十外九月間染下疳至次年
故施寒涼之劑用薰洗之法漸瘳盡褪
杞塊余診之右脈沉微左脈濡濡知其
人參二錢子羊肉十兩每日煮食早晚服化毒已字丸白外瘡
臘疊褪至二十日塊消痛止又服辛字丸瘡肥光瑩剗服八味地
黃丸而愈

一室女年十四忽小腹作痛不旬日痛引大腿其父延醫甚衆皆云
屈腳腸癰瘍月無妨後醫作病塊治亦不妙時在正月邀余胗視
候脈不滑不數傍見一婢頸項瘡把紫黑余知其婢所傳也其父
詢爲何疾予不明言適他往至八月纔回其疾如故飲食少進時
作驚悸其父復懼就治遂示以病因仰詭諸婢婢曰有之曰驗之

遍體生癰瘍急欲取
紫黑骨節流痛肩膝

卷之六
矣用歸脾湯兼服化毒丙字凡至半月痛始定又服乙字至二十
五日諸症皆愈

二天學年三十染濕疮飲食禁忌甚苦並不服藥至兩載而瘡不及
數月兩褪起小塊月餘而破但不潔潰自用膏丹數貼一伏一起
蔓延胸腹頸項頭面目曰一病二十餘年訪治於予予曰乃陽微
蛀也毒留肌肉之間失於汗下耳遂用防風通聖散加人參迦連進
五服以祛其蓄每兼用化毒戊字凡早晚服之至盈月而愈耳目
無恙繼止前凡更用八味丸服至三月精神如舊後取姜復生嗣
焉

節推年六十餘患陰囊破爛五年日流臭水無度諸醫易克閉戶
靜養適伊孫患浸驚延余治問及此症余曰結毒也壯年必犯此

瘡便服藥雖無好處而不敢至止裏所作非他藥可療當加味益氣湯早晚吞化毒王字丸不用敷藥至三十餘日肉長結痂而愈

士好採補誤染繖毒前陽發瘡臨溺慘痛諸藥無効日腐至根始延余治余曰此名卷心蛆瘡當用牛膝枸杞桑冬花黃芪熟地當歸首烏澤瀉石斛等大料熬膏加人參鹿膠日餌早晚服化毒發字凡半月後瘡肉始長又服戊字丸後用獨參湯奉入朱丸精神性復長而愈

青梗患瘡瘍半載沿爛疼痛不止敷藥不効多用或藥單方甚至嘔逆不食尤篤欲斃余診其脈兩尺沉濤十關俱微蓋因草藥損胃遂令脾餽不食故毒氣不能並散以加減六君子湯十餘劑兼

進化毒癸字丸至七日始納穀其痛稍減更用乙字丸至半月身發細瘡隨生隨褪至三十日全愈

一司稼年近三十患便毒月餘多方不能消散其痛甚烈立則下墜陰囊卧則上攻兩腎轉側不能自持日夜難以安息始延余治胗其脈左手結澁知腎肝毒氣熾甚遂用化毒甲字丸同癸字丸早晚服之未通連翹湯送下至七日痛止十四日腫消十八日全愈童子忽然身熱卽發丹毒數塊衆醫爲赤遊風治以藥治以灸治以敷悉不効余思之曰遊風爲悲慾是父母敵瘡毒氣所遺當用化毒辛字丸倍加牛黃鍾乳粉珍珠片角羚羊早晚服之霍然而愈

一賈年三十忽生一毒於環跳穴下狀如絳桃紅且紫或痛或痒

幾又發小塊於兩膝下服藥數月不效且潰爛至腿膝延累三載
余視其瘡口候其脈氣是結毒也患者曰不然歸詢其母始知爲
父遺毒所傳余用化毒丸半早晚服之至半月進十全大補湯
加牛膝米仁至三十日兩腿全愈後服虎潛丸精神始旺

一縣尉年五十餘客京都染楊梅瘡欲速治愈每遇春夏復發緣受
選延捱六載精神消耗兩腿破爛艱於步履余始治以大補湯加
枸杞薏苡牛膝首烏兼服化毒已半月後更申字丸服之至
三十五日而褪毒全愈後服補髓丸而復元

一孝廉年近三十眼角內潰痛引鼻梁膿水無度脆骨將脫究其因
原染黴瘡春啖黃魚之後眼角隱隱作痛醫以降火祛風之劑
治之不効余知毒伏在內遇毒一擊而發遂服化毒丸半和乙

字九早晚間服兼以神功內托散至二十日膿盡肉生後用十全
人補湯加川連恐冬花貝母服三十劑眼鼻無恙而愈

一富室季春染癰瘍如痘至仲冬而愈嗣發鴟掌風兩手又年餘腰
背生癬痛痒交作薰洗敷藥近愈未幾復作筋骨疼痛流注左右
慘楚無時漸至着牀不起方延余治胗其兩手脉沉而結知爲毒
遏於內不得發越故作筋骨疼痛遂用人參八錢升麻半兩川山
甲四錢忍冬花四兩土茯苓一兩分作五劑兼眼化毒乙字丸至
七日痛減半月後發細瘡百餘點其痛頓除調理四十日全愈
一梨園染棉花瘡恐誤友知覺求醫速痊悞服隱藥而愈期月之後
遍身流注作痛身體振掉不能自持甚至着牀不起余曰悞中蛇
粉毒也早服化毒已字丸早晚服癸字丸三十六日服神水間

脈絡判四十曰全愈

一商年四十外五月間耳內生一瘡不知覺至七月中陰囊生瘡四枚亦不識至十月陰囊頭頂生瘡共三五十箇其形酷似楊柳渴非常痛不堪忍雖天寒穢氣逼人十一月始求余治余曰真少陰症也日用歸脾湯加枸杞山萸草服化毒壬字丸晚服丙字丸至三十餘日全愈患者內室亦感此毒作傷熱骨痛即服化毒乙字丸隨生細瘡八十餘點半月後全愈

一乳母年三十患乳癰腫痛自日而潰諸藥勿效穢氣異常延余治之脉其脈原非乳癰乃徽瘡毒氣所遺究其因乳子之父曾患此症是遺毒外吹遂用化毒乙字丸兼以四物湯加貝母丹皮瓜萎子木通荳蔻香附青皮柴胡服二十餘日而愈

醫學全書
卷之六
退卽成白癬經年不瘳就余治遂用人參蛤蚧散兼服化毒寧字
九半月後又服已字丸四十餘日乃愈

二友人子年十七肄業道院忽髀厭腫痛狀如橫痃叩余索方卽以
汗下化毒之法消之嗣後肛門生瘡認爲痔以爛藥敷之不去後
用紅粉霜乃痊又作筋骨疼痛後生瘡如砂仁邀余商之余曰此
症染發不一小症應當大治伊父好方士不從余言每得一方輒
便試之療年餘肌肉消瘦外瘡水伏不起不褪又加骨痛頭額腿
膝發塊精神衰憊至技窮復就余治乃用八珍湯加忍冬花五加
彼首烏兼用化毒戊字丸千字丸早晚間服至三十日痛止大
褪又加牛膝枸杞至五十日而精神漸復後服補髓丸而愈

青樓年二十大作骨痛生瘡加楊梅求治之余用王樞丹王鑑作
二次服大渴之每日用牛羊內半兩黃芪兩許土茯苓四兩甘草
啖之兼以化毒丸字凡服至十三日大瘡乾涸卽生細瘡如痣隨
生隨褪疤無異色月餘全愈

司掾年近五十初夏染瘡瘍眼哭大汗大下等藥約數十至仲冬肢
體剝落飲食不進筋骨疼痛腫瘍遍身耳無間日無見命懸旦夕
余視之精神甚甚毒氣深固音不許治病家篤懶用補脾藥旬日
纔知食味方用化毒丸字凡服首字凡早晚間服兼飲大補養榮
膏至二十日每黑瘡中生一細瘡隨生隨褪肌痕始澤疼痛全除
內以補髓丸服之外以藥捲紙筒炙耳耳漸知聲目漸有光至五
十日方辨人語因倦於業十年來未能復全聽

一童子年十二因父母患癰瘍而藥喉癬延年餘飲食艱難喉閉聲啞余謂毒氣壅於肺道以至音聲不出每日早服化毒庚字丸晚服犀角解毒丸至半月喉癬始痊又用瓊玉膏不時嚥嚥至二十日聲出如昔

一友年近三十初習醫偶中楊梅瘡毒喉間忽生一瘡但單認爲喉蛾大用清涼解毒之藥不効延三百餘日飲食竟不進垂斃適余至其友以症告余曰此癰瘍症也次日徃視手上有數瘡隱肉遂用化毒丙字丸強吞以獨參湯接飲間以前劑調理至七日瘡發口鼻舌本至十日外能進粥又服庚字丸至二十日後善飯不詫

余藥曰爲調理

一黃冠年二旬餘染砂亡節吹凍不齶方輒試未滿百日而形復

減始就余治胗上脈太部俱沉微而緩余謂寒涼太過脾胃受傷以致飲食不進外瘡水伏兼之筋骨疼痛當以補中益胃使毒氣升發而易化用補中益氣湯倍加參术服至七日飲食漸增兼以化毒丸字丸早晚服之至半月瘡勢起發筋骨痛定又更乙字丸服至三十五日瘡痂盡褪而愈復服大補丸一料元神復旺

農年四十餘丙子春初前陰生瘡狀如鼓椎他處無一點屬醫不效交冬更服蘇州瓶藥以土茯苓煎湯作引約川百五十觔至丁丑夏其疾反重日夜痛苦無一刻安臥甚甚惡雖妻兒不敢近衆之不去點之不減方就余治胗兩手脈俱沉微而緩惟左尺欲絕是以胸膈逆悶飲食少進遂用牙皂升麻首烏牛膝木通忍冬攻是以胸膈逆悶飲食少進遂用牙皂升麻首烏牛膝木通忍冬

花煎飲吞護心丹早晚服玉宇化毒丸至半月方效更用人參黃
芪枸杞生膝鹿角當歸升麻川田田煎服至二十日外癰漸減始
得安臥兼以靈藥外敷至五十日瘡褪毒氣將脫而患者客費罷
藥精神恐未能如舊

癰瘍方法

天癰瘍爲患正氣不虛則邪毒不入如肝氣虛邪毒乘之則發橫瘍
或成魚口甚則筋疼瘍如砂仁腎氣虛斜毒乘之則生下瘍或爲
蛀梗甚則骨痛瘍形如爛柿肺氣虛邪毒乘之則毒聚於上不爲
筋疼必生瘍如花脾氣虛邪毒乘之則毒流四肢不作骨痛必生
瘍如痘心氣虛邪毒乘之則發天瘍形如楊梅左右相對而作楚
有一經獨虛而邪氣多盛者有兩經三經同虛而齊病者有現於

外而滿身生瘡者有伏於內而遍体骨痛者所以出入無常而臨
見不一也當詳究脈理按其毒氣有無輕重應發表則當發表應
攻裏則當攻裏應疏利則當疏利應溫補則當溫補應涼解則當
涼解勿令虛實顛倒斷削元神蓋病重而藥輕者但無近効病輕
而藥重者必生他變所以治此症者須標本兼治不可偏施以攻
邪補元爲主

主方

凡染有毒之妓或與患者接談稍有所感不拘便毒疳瘡或髮際
生瘡梳下薄膚如焚或手足肌膚紅點如斑惡肉當服此方使正
氣足而邪氣自除也若間服牛黃化毒丸其効甚捷

人參

黃芪

川芎

甘草

各一錢

當歸

二錢

忍冬花

漢防已 各五分 錢升麻

防風

山甲各八分

用水二大錘加生姜三片煎至半餌時服渣再煎

生黃化毒丹

治已上初見形症

牛黃

四分
須用西黃色鮮黃
黃形如筆管厚實者功以廣黃味薄功不及半

琥珀五分
用之烏金黃亦可
肝

血竭

製大黃

雄黃

水砂

須擇鏡面大塊不涉砂石
名用之近有爐丹不就轉

典藥店賣者有

大毒不入服藥

白蘚皮

川山甲

乳香

木香

未一錢各取頭

分

蟬退末

錢

生生乳

一錢

沒藥

七分

川貝母

三錢

分

右各製爲末用神砂末五錢打稠糊入藥搗勻丸如梧桐子大

研朱砂爲衣每早空心服十五丸早晚空腹服十九砂糖湯送

中病則已如餘毒未盡藥不可徹服此九切忌煩勞憤怒焦躁

卷之三

卷之三

治肝經形症並其正氣兼服化毒甲子九標本同治

當歸

三錢

白芍

川芎

丹皮

遠志

龍膽草

夏枯草

各二錢

青皮

柴胡

各八分

川水

一鍾煎

八分服渣再煎七分服

甲子化毒丸

治肝經內外前後形症

升麻

錢

牛黃

四分

生生乳

配礬石用佐藥煉

百日而成

則生

曹不易修合

如火候不到者

服之無驗

余識此方

三年始得

礬石

煅鍊得法十年間屢用屢驗誠下古不易

王道之聖藥

也未有此

葉不可依方修合

議余

須擇舊坑所產

透明

一錢

雄黃

須擇舊坑所產

透明

不臭者用之各

一錢

方之不足方法已著名

雄黃

須擇舊坑所產

透明

一錢

硃砂

須擇舊坑所產

透明

一錢

雄黃

須擇舊坑所產

透明

乳香各一錢

月月紅 白姜桑 川山甲

白鮮皮各取頭末一錢五分

廣木香

熟大黃 牡丹皮各二錢五分

右各製爲末用神廻末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研
硃砂爲衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯下炒米
湯亦可病重者逢三六九日加服三丸元弱者不必如病去藥減
如餘邪未盡藥不可徹服此尤切忌惱怒焦煩茶酒止可用十分
之三

仲真湯

治腎經形症益其正氣兼服玉宇化毒丸標本同治

何首烏 川牛膝 柏杞子各三錢 五加皮 當歸身 石斛各一錢

錢 杜仲

黃柏各

用冰二大錘煎八分食前服渣再煎服

壬子化毒丸

治腎經內外前後形症

虎脛骨

炙龜板

川山甲

炙硃砂

各一錢

月月紅

卽血餘劉奇
子頭髮月刑

者煅一錢五分

蟬退末

二錢

沒藥

乳香

白鮮皮

雄黃

分

生生乳

一錢

牛黃

五分

土貝母

二錢

沉香

七分

取沉水色
黑味甜香者用

之

琥珀

七分

右各製爲末用神麯末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研
硃砂爲衣每早空心服十五丸每晚空腹服十九人參湯送下枸杞湯亦可病去藥減如餘邪末盡藥不可徹禁忌同前

保脾飲

治脾經形症益其正氣兼服戊字化毒丸標本同治

金釵石斛

薏苡仁

忍冬花

絡二

山藥

茯苓

牡丹皮

陳皮

各一

人參

甘草

木香

各分

戊字化毒丸

治脾經內外前後形症

牛黃

四分

升麻

生生乳

各分

木香

硃砂

雄黃

川山甲

白蘚皮

乳香

各一錢五分

擇等

製大黃

二錢一宜九浸九蒸九晒

每黃十兩

當耗煮酒五十兩入藥則

中有硫成靈仙

沒藥

血竭

貝母

各一錢

右各製爲末甲子

麵末五錢打稠

加入藥搗勻丸如桐子大呂

良湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹禁忌同前

益衛散

治肺經形症益其正氣兼服庚字化毒丸標本同治

人參

貝母

曰芨

百合

阿膠

桔梗

天冬

各一
分

山藥

木香

甘草

各七
分

用水二鍾煎八分通口服渣再煎服

庚字化毒丸

治肺經內外前後形症

蟬退

炒去沙土

川山甲炙

川貝母

各二
錢

鍾乳石

須擇湖廣產者

長大危用天

四分

葵甘草水煮一日研萬遍

性堅者不用

生生乳

已上各一錢

鬱金

二錢

牛黃

五厘

木香

月月紅

乳香

白蘚皮

雄黃

各一分
五分

硃砂

一錢
七分

右各製爲末用神麃末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研
硃砂爲衣每早空心服十五丸每晚空腹服十九丸人參湯送下奇
良湯亦可病去藥減如餘毒未盡藥不可徹禁食同前

安神散

治心經形症益其正氣兼服丙字化毒丸標本同治

人參

茯神

黃連

甘草

各一分
兩

遠志

七分

石菖蒲

柏子仁

生地

赤芍

木通

各一分

用水二鍾加圓肉七枚煎八分服

涼再煎服

兩掌化毒丸

治心經內外前後形症

牛黃

珍珠各五分

犀角

審色味香有棕紅者用之

瓜兒

一血竭

紫草

硃砂

雄黃

白蘚皮

乳香

月月紅各一錢

錢五分

姜參

酒拌炒去絲

蟬退

山甲各三分

生生乳一錢

赤芍藥

錢二分

右各製爲末用神麯末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研
硃砂爲衣每早空心服十六丸每晚空腹服十一丸人參湯送下
龍眼湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹切忌惱怒焦躁茶
酒止可用十分之三

凡服十于丸先用滾湯泡燕清胸中陶氣嗣服丸藥藥後啖糕菓之
類壓丸藥下胃日宜算法毋怒

通氣飲

治橫痃初起或兩髀俱腫作痛肉木堅實應服此方

木通

爪婁子各五錢

忍冬花

粉甘草各三錢

貝母

紫蘇葉各二錢

粉甘草各三錢

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分服

消毒飲

治便毒單生腫硬大作痛者服此方

歸尾

粉草

熟太貢

黑丑搗碎各三錢

姜黃

單方

治同前

用水酒各一大鍾煎八分空腹服渣煎七分服

貝母各二錢

黑丑頭末七錢 空腹熱酒調服或汗或下後以糲飲止之

五虎湯

治同前有元氣首服之

全蝎

姜參

川山甲炙一錢
五分

蜈蚣三條

班毛頭僵土

米排以

生大黃

二錢

內托散

右研爲末分二次空腹酒服

治便毒腫痛將作膿者服之

地榆兩

黃芪

粉草

紫冬花

川山甲

白芷各二錢

用酒二大鍾煎至一鍾空腹服渣再煎服

透膿散

治便毒有膿未破作痛作脹

皂角刺

黃芪

牛膝各一錢

川芎一錢

當歸尾

川山甲 忍冬花 漢防已 各一錢

五分

用水二天鍊煎八分空腹服渣再煎七分若服前方不驗者咸毒
必重當服甲字化毒丸收功

解毒湯

治下疳初起

連翹

荆芥

木通

黃連

生地

牛膝

忍冬花

滑石

甘草

何首烏

各等分

用水二天鍊煎八分服渣再煎七分服

解毒丸

治同前

白芷

兩

班毛

四十四

二物和一處用酒拌濕透文火炒燥揀出

班毛用白芷

全蝎胡桃肉各二兩二物新瓦上焙微焦

生

黃一兩晒燥四物共研細末酒麴打糊爲丸如紫豆大每服三錢
熱酒送下

摻藥方

治下疳瘡

海巴子

煅存性一
名貝子

研極細每二兩末加冰片五分五色粉霜三分再研盛磁罐曬用

又方

雨前芽茶

麻黃

細切各一
分五

連四紙方七寸許用鉛粉鑊半

擦在紙上鋪前二味捲筒火灼存性研細加冰片一分再研盛罐

聽用

薰洗方

苦參

川椒

忍冬

花各許

用水三四碗煎數沸洗薰後

洗瘡口拭乾用摻藥從四沿摻之用薰洗摻藥不効者毒中必深
當服王字化毒丸收功

加味化毒飲

治下疳瘡腐爛陷下有凹或包皮腫如雞胞或肌膚見形如班如
疹將發瘡者當服此方

漢防已

當歸

忍冬花

白蘚皮

連翹

羌活

川芎

各兩

牙皂

五分

効

右切片分作七帖每帖加苦良四兩猪胰子一枚水四碗煎至
鍾分二次服渣再煎一鍾服屆帖後倘或不効者當服化毒生

表飲

治下疳便毒同治內作筋骨疼痛者服之

麻黃

紫蘇

桔梗

各三

川芎

升麻

當歸

忍冬花

各五分

姜桑

蟬退

各三分

子羊肉

用煮酒十碗煎至三鍾頓

服厚衣蓋覆出汙透爲度其被浸水

大便去空野

加味風流飲

治瘡初起不生疳瘡便毒者服之

防風

荆芥

川芎

升麻

鼠粘子

花粉

白蘚皮

姜桑

甘草

川山甲

牛膝

何首烏

赤芍

木通

五加皮

各分等

用水三大鍾加猪胰半隻奇良一兩煎至一碗熱服取微汙爲也

渣再煎服兼服庚戌二字化毒丸

牛黃蟾酥丸

發表化毒能治一切疔腫、癰疽瘡瘍

西黃

蟾酥

麝香

砂

雄黃

乳香

各一分

一錢

五分

先以蟾酥切片熱酒化軟將五味細末和蟾酥搗丸如黍米大每
服七丸葱頭熱酒送下出冷汗爲度

萬病解毒丹

治瘡毒初起可作下藥勝

用大黃克伐胃氣

山茨姑

二兩須擇嚴處士

產色紫血紅

芽大戟去木切薄片取

頭末一兩五分

千金子

去殼去油

文蛤

三兩各五分

朱砂

雄黃

各五分

麝香

須擇當門子

淨未

二兩

石製爲細末以糯米稀粥搗成錠子量入大小虛實服一錢上

白滾湯磨化

凡患面瘡便毒未愈有生瘡之兆預煎此油服之可免面部生瘡
麻油八兩 用自己頭髮三五錢煎化作二次服再服亦可
凡患瘡頭面及不便處者先薰洗後點藥五日卽愈

製生生乳法

煅煉舉石三兩 母石二分 硝石一兩六分 即盆硝 朱砂液九分六分 即朱
上晉譽一兩 銀礬一兩 食鹽兩半 枯礬五分 青鹽三分
右件共研不見星入羊錫罐內三方一頂火候藥化面上有霜頭
起離火候冷用鐵蓋蓋扎鹽泥固濟待罐口泥乾入八卦爐內先
用文火候蓋底熱微微擦水加炭平口用武火三番足離火先用

甘草芽皂角二錢煎濃汗收盡底白丹砂棉紙包裹浸汁內片時
取出速紙埋土中三日夜取來晒乾每兩加冰麝各七厘晨砂九
分共研極細外用乳香錢二分滚水燉化和前未研勻爲丸每重
一錢一分外以黃蠟封固卽名生生乳照方配合服之刻日奏効
每見公子王孫沾染此疾百藥無効者皆因方之不當藥之不真
也余願此方公之海內而後世易爲采擇永無差誤然世之毒藥
古方往往用之各有製度耳如水銀一物得雲母礬石同煉其毒
卽解不比粉霜輕粉之醋烈也余用生生乳配風藥而治大麻瘋
配瘡藥而治頑癱瘍久漏骨痛種種奇効不獨治廣瘡毒氣
聖藥也大凡藥性與稟性有異人有殺藥者毒藥服之竟不覺

奏功亦緩性有不殺藥者服之便覺時冒奏效亦速所
在活潑經曰大積大聚衰其大半而止不必盡劑須要體察病
功効未全者再宜進藥或問日再服或停兩三日再服務
增除毋使過劑以生藥病

製金鼎砒方法

淨白砒二兩五錢研細爲末出山鉛十六兩開如大壹許敲成薄片

用小城罐一個以鉛片桃砒末重重疊在罐內用文火鎔化俟青
煙起白煙來霜飛罐口方離火冷定鉛面清如水色如金者無渣
質者爲妙若色青黑非出山鉛也用之無効

結毒方法

大結毒者癥瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易散解作痛作腫

久則塊破潰爛不已治此症者不外乎攻補攻則毒氣去補則正氣強經曰邪之所湊其氣必虛虛者空也無也譬諸國內虛則人民離散百禍易起人之虛者亦猶是已又曰不能治其虛安問其餘蓋言虛者爲百病之本宜首舉以冠諸症也

毒結於肝膽二經者內作筋痛攻走脇肋上至於頭下至於足轉側難手不能舉足不能步或頭項發塊或破爛上下或傳他經致生別病當用乙字化毒丸兼用煎劑調理

乙字化毒丸

治已上諸症

牛黃

丁香

牙皂

各五分

琥珀

須擇堅燥者用之

鬱金

生生乳

各一

硃砂

分

雄黃

月月紅

白芷反乳香

川山甲

各五錢

製大黃

姜益

右製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研碎
砂爲衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送下炒米
湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹百日內勿使大勞大怒

順時調理

煎藥方

當歸

芍藥

川芎

人參

丹皮

各八分

膽草

柴胡

紅花

各五分

枸杞

石斛

一錢
五分

用水二鍾加蓮子十粒煎八分服渣再煎

肩氣弱加奇良一兩薏苡三錢魂不寧加酸棗仁二錢氣不順

加烏藥香附青皮各一錢泄瀉加白朮山藥各一分

毒結於膀胱并腎經者內作骨痛流注上下抽掣時癟發塊百會委
中湧泉等穴或陽物腐爛不已或陰囊腫脹作潰或生獨腳陽敵
瘡或傳他經致生別病當用癸字化毒丸兼用煎劑調理

癸字化毒丸

治已上諸症

牛黃五分

鹿角屑三分

沉香

生生乳

各一錢

硃砂

各一分

雄黃

月月紅

白蘇皮

乳香

川山甲

各一分

神水一錢

金二隻

用出山鉛十觔

打薄片二十塊

貼上銀箔取

的上缸開

一孔底中繩穿鉛片懸上缸

米醋火酒各十

隅缸口架磁盆一個將缸合好用

麵條封固以文穴下燒俟酒

醋乾取出盤中者是

盤中者是

人中白二分

擇鄉間誠實人家不生瘡

五分毒挾病者取制入藥有効

製何首烏三分

右製

用神龜末五錢打稠糊入藥

鵝均丸如桐子大另研疎沙

用神龜末五錢打稠糊入藥

鵝均丸如桐子大另研疎沙

用神龜末五錢打稠糊入藥

鵝均丸如桐子大另研疎沙

用神龜末五錢打稠糊入藥

鵝均丸如桐子大另研疎沙

用神龜末五錢打稠糊入藥

早空心服十五丸每晚空腹服九丸入參湯送下。去藥減加餘毒未盡藥不可徹百日內勿使大勞。

煎藥方

牛膝 柏子仁 枸杞 山茱萸 五加皮 當歸各二分

補骨脂 淫羊藿 川石斛 山藥各一分

澤泄三分

用水二鍾加川椒一撮煎八分服渣再煎

精氣不固加菖蒲人參

各一分 五味子

內熱加熟地黃柏牡丹皮

各二分 盜汗加白芍酸棗仁麥門冬

各一分

毒結於脾胃二經者外爲小塊肌肉蛀爛蔓延或發大塊破潰膿腫或手足生鵝掌風癬或傳他經致生別病當用七味化毒丸兼用

煎劑調理

已字化毒丸

治已上諸症

牛黃

牙兒

各五分

木香

二分

生生乳

三分

乳香

沒藥

各一錢
七分

川山甲

一分

白蘚皮

三分

硃砂

雄黃

月月紅

各一錢
五分

熟大黃

一分

僵蚕

各二分

血竭

一錢
七分

右製未用神麃末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸入參湯送下砂糖湯亦可病去藥減如餘毒未盡藥不可撤百日內勿使大勞大怒順時調理

枳殼

山藥

石斛

陳皮

葛根

三錢

當歸

一木

白芍

丹皮

各八分

木香

甘草

各五分

用水二鍾加砂仁六分煎至八分服渣再煎服

飲食少進胸中脹悶

加厚朴荳仁各一

有痰加半夏一枚

枳實白朮各一

各八分

泄瀉加肉果訶子各七分

減當歸

結於大腸肺經者爲喉癬多作瘻唾久則成大白瘻漸飼鼻梁低陷或肌膚生癬硬壓如錢色紅紫褪過卽成白點或不生癬竟成白癩風或傳他經致生別病當服辛字化毒丸兼以煎劑調理

辛字化毒丸

治已上諸症

白花蛇真蘇州者佳

羚羊角

白蘚皮

牛黃五分

錘乳粉

生生乳各一川山甲

月月紅

乳香

硃砂

雄黃各一
五分

迦藍

神水七分

川貝母二
不

蜂房炙淨未
一不

右製末用神廻末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送下熟蜜湯亦可病去癥減如餘邪未盡藥不可徹自日內勿使大勞大

時調理

煎藥方

人參

茯苓

天門冬

貝母

當歸

五味子

玄參各一
二分

白芍二
分

麥門冬

黃芩各八
分

五味子

用二鍾水加枇杷葉三片煎八分服渣再煎

痰多加白朮天麻橘紅各一錢

喘急加桑皮甘草紫蘇子各一錢

毒結於心小腸經者毒注瞳仁似平內障或見或不見或毒聚舌本作腫或十指慘痛無時或瘡生遍体内有不易結痂而腐爛不已者或傳他經致生別病當服丁字化毒丸兼以前劑調理

丁字化毒丸

治已上諸症

牛黃

珍珠

蜈蚣

去頭足炙
各四分

犀角

生生乳

牙皂各一錢

月月紅

白蘚皮

砂各一小
七分

雄黃

乳香

川山甲

各五分

琥珀

五分

貝母

血竭

榔金

製大黃

右製末用神麃末五錢打稠糊人藥搗勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每早空心服十五丸每晚空腹服十九丸人參湯送下圓眼湯亦可病去藥減如餘毒未盡藥不可徹百日內勿使大勞大怒順時調理

煎藥方

人參

桔梗

柏子仁

當歸

生地黃

各一本

遠志

麥門冬

牡丹皮

黃連

甘草

各二分

用水二鍾加圓眼肉十枚

煎分分服渣再煎

不眠加棗仁梔子

各一分

咽喉乾燥加玄參連翹絡

咳嗽加貝母知母桑白皮各一

心經元上虛怯畏寒者加大附子八分倍人參

毒丸

治生瘡時慎服輕粉粉霜服前方無効者當用此丸間服

槐花

一兩

川椒

二兩

象牙末

黃丹

乳香

沒藥

人中白

各二分

血竭

蜈蚣

川山甲

各一分

金頂砒

生生乳

各一分

右製末用神麯末一兩五錢打糊入藥搗勻丸如桐子大另研
硃砂爲衣每日早服二十九晚服十五丸上棗芩湯送下百日內
忌房勞惱怒日宜食猪肉數兩

又方

用出山鉛九觔打造壺瓶一大把盛火酒十觔奇良二十二兩孔

香紅花各一兩川椒蜀板各二兩封瓶口坐鍋中水煮日取
出埋地中三日去火毒每日早晚任意飲數盃

加味地黃丸

治病愈後精血未復者宜服

熟地黃八兩酒煮

各四兩

山茱萸

各三兩

梔苓

各二兩

牡丹皮

各二兩

桂枝

澤瀉二兩

各八兩

當歸身

各三兩

枸杞子

各三兩

右各製末搗熟地極爛和藥如乾加煉蜜再摻于杵丸如梧桐子大每日早晚服二錢淡鹽湯送下

補髓丸

治病愈後精髓空虛者必宜服之

人參一兩

地黃四兩

鹿茸一兩五錢

各一兩

當歸二兩

各一兩

杞子

柏子

茯神

白术

各二兩

麥門冬

一兩

鍾乳粉

沉香

五分

石斛

右各製末煉蜜和丸如桐子大每早晚服七十丸秋石點湯送

下醇酒亦可

安神丸

治病愈後精神恍惚升痰動火煩渴

人參

柏子

當歸

麥冬

棗仁

各二兩

生地

遠志

菖蒲

玄參

貝母

黃連

五味

各七錢

右各製末龍眼肉七兩熬膏和丸如葵莖大辰砂爲衣每服五十

丸燈心湯送下

加味養身丸

治婦人病愈後氣血衰少發熱作嗽

當歸二兩

熟地

白芍

丹皮半兩

香附四兩

人參

貝母

阿膠

山藥

茯苓

黃芩

川芎各一兩

白朮一兩

右各製末煉蜜搗和丸如桐子大每日早晚服八十九丸淡鹽湯送下

助胃膏

治脾胃虛弱飲食少進肌膚不澤

奇良二十兩

甘草二兩

炙

拘杞子

補骨脂三兩

炒

薏苡仁八兩

炒

先用大水三升燒水三十沸去大棗加前藥文火熬

濃糉存汁四錢加飴糖半兩再熬數沸盛磁瓶坐冷亦內一日
日服五六次每次服三錢七後飲人參湯其効更速
凡患筋骨疼痛先服化毒丸七日外用後方熨烙

熨烙方

川烏

草烏

肉桂

軍姜

胡葱

各等分
搗細

煮糯米飲和藥搗勻敷患處外以火熨之

凡患喉癬久不愈者先服化毒丸七日外用後方吹之

吹藥方

西黃

一分 水牛

三分 珍珠

八分 硫砂

象牙末

龍骨

一錢

瑤珠

一錢五分

分裹金
店內用者是

右製共研極細盛磁罐患著先用苦茶泡漱日吹三五次

凡患鵝掌風癰先服化毒丸九日外用後方薰洗方可擦藥

薰洗方

用桐油一觔內活蟾四隻支火煮之洗患處拭乾嗣用生鵝腦醃五色粉霜擦患處以肉熟爲度日一吹中病則已

五色粉霜是外科要藥點癩瘻去腐肉長新肌能愈諸瘡殺諸蟲
敷諸毒

水銀兩

鉛兩

火硝四

兩

白礬三

青鹽八錢

研勻入陽城罐內文火煨一香去其溫氣用鐵油一盞口以鐵線北繫鹽泥封固先文後武武火時蓋上擦水到三香離火取出埋土中二日夜取出晒乾研細盛罐聽用

藥方

風傷梅瘡久癰瘍瘍掌風結毒破爛拔毒呼膿暖筋
用

里光自然汁十兩煮酒六兩內當歸大黃赤芍肉杜牛膝
苦參躑躅花各五錢文火煎濃約存汁一碗許收汁用麻油二
四兩加頭髮三兩煎至滴水成珠入前藥汁文火煎和加研細
粉蜜陀僧各五兩緩緩攢轉俟火候好滴水不老不嫩離開火
後加入研細乳香沒藥茴舌白占各三錢麝香三分粉霜一錢收
錙坐水中出火毒攤貼須用重湯頓軟

余按臟腑感染陽陰傳遞配製化毒十子丸以爲定法而服藥亦有
約但人之稟性不同有素服藥有素不服藥素欲素不欲之殊有
患者當請上工酌擬詳脉氣真賦藥性時候攻補不失始獲全功

尊生者不可不察也

徽瘡宜忌

夫宜忌者卽所苦所欲也五臟各有所宜五臟各有所忌如徽瘡一症舉世未諳藥物宜忌并飲食宜忌混同施治殊不知從其氣則和違其氣則有偏勝之害故凡有益於陽者必不宜乎陰有益於陰者必不宜乎陽宜於燥者不宜乎濕宜於濕者不宜乎燥能破散者不可以治虛能收斂者不可以治實故藥物有良毒之難齊味之莫測有相益相濟相畏相惡相忌相制之不同不諳宜忌者則其失也罔請以余所見聞者嘵之一友患便毒其勢熾盛欲速愈單服大黃五錢不利又服七錢亦不利後加至兩許終不能通而大黃毒甚攻上孔滯血而弊築黃瘡服敗毒敗毒散不效後

服商陸根汁遂吐瀉經兩日不正藥食俱不受六日而死一人患
楊梅瘡毒結於百會穴破爛南年諸醫不効偶遇方士傳靈砂方
卽製服之經七日齒落喉閑飲食不進而亡一人生棉花瘡無力
贖藥用毒蛇一條酒煮薦飲卽時昏昂膚理腫裂出水至五日方
知痛甚其瘡猶不愈一人患班瘡使毒乘之筋骨疼痛數服草藥
不効又取活蟾七隻內猪脂煮食食未畢作吐不已水漿不進方
延余治余胗之曰胃氣傷也非大劑人參不治遂咀人參五錢加
烏梅七個同煎漸飲之又服一劑纔能進粥後用化毒甲子丸一
料服盡而愈一人生魚口不痊服大料五虎湯少頃小便作脹日
夜呻吟苦不能溺邀余胗之余曰乃班毛毒氣爲患當速解之卽
用豬脂二兩糯米五合粉草五錢長流水煎頓服外以葱白食鹽

煎湯採洗解出血筋數條始通其毒仍不減後又生瘡如砂仁從余調治方愈噫今之庸醫襲不經之方投有毒之藥外患未盡內毒尚存諸如此類誤莫能拔寧知脉症相對名實相符方可投劑今以五藏苦欲藥物宜忌謹錄于後

心爲君主之官神明出焉其華在面充任血脉爲陽中之太陽爲牡臟通于夏氣神靜固守則氣血流通萬物係之以興亡思慮太過則虛邪從之病於內傷者十居六七病於外感者自無四五調若當以安神養血爲主味忌鹹多食鹹則脈凝泣而變色味宜辛肉小麥荅薤之屬心苦散緩急食酸以收之五味子之屬是七味則寧靜清明故宜酸以收其緩也軟者和調之義也雙者木和火邪氣乘之則燥急故宜用甘硝之酸去除其邪熱以軟其氣急

之氣使復其平也以酸補之澤瀉導心氣以入腎也煩勞
而生熱故用參芪甘草一甘溫以益元氣而虛熱自退故爲之
湯也七以下交於腎爲泰炒鹽之鹹以潤之卽得心與腎參也火
空則發隨爲水味得之使心氣下降是旣濟之道也有神之義焉
故飲卽補也

經藥食所宜

藥宜

補

人參

茯神

遠志

當歸

柏子

石菖蒲

紅花

天雄

桂心

血餘

紫不英

甘草

苜蓿

辰砂

琥珀

乳香

胎元

升麻

細辛

麻黃

紫草

木通

瀉

川山甲

連翹

貝母

鬱金

赤茯苓

蚌房

犀角

珍珠

血竭

片腦

赤小豆

忍冬花

黃連

牛黃

麝

食宜

羊肉

鹿肉

鷄卵

牛乳

犬肉

豬心

火肉

風魚

淡菜

龍服

荔枝

芝麻

茶豆

薑菜

橙

藕

梨

杏

棗

心經藥食所忌

藥忌

死砂

生砒

輕粉

苦參

麥冬

虻

蟻

卷之六

蠅牛

稍

食忌

石首魚 蟹

腥 猪肝

鴨卵

鵝

蜋 蛤

南麌 荑

茄

茭荀

諸牡血

肝爲將軍之官謀慮出焉血之本竄之居也其華在瓜其充在筋爲陽中之少陽爲牛臟通於春氣魂靜則至道不亂木性不動動則有催折之意焉怒甚血不歸肝而溢於外病於外感內傷者居半味忌辛多食辛則筋急而瓜枯味宜酸犬肉小荳李韭之屬肝苦急急食甘以緩之甘草之屬是已扶蘇條達木之象也升發開展魂之用也故其性欲散急食辛以散之解其束縛也是散即補也

辛可以散用苦之屬是已若其太過則屈制之毋使逾分酸可以收芍藥之屬是已急也歟也肝性之所苦也違其性而苦之肝斯虛矣補之以辛是明以散爲補也細辛生姜陳皮之屬是已

肝經藥食所宜

藥宜

(補)

當歸

川芎

地黃

山萸

酸棗仁

遠志

茯神

甘草

阿膠

桂皮

木瓜

烏梅

琥珀

辰砂

龍齒

驅甲

牛黃

(瀉)

芍藥

膽草

柴胡

菊花

升麻

香附

丹皮

瓜蔞

皂角

薄荷

全蝎

射干

秦皮

梔子

全蝎

川山消

降香

羚羊

乳香

片腦

珍珠

膽鰍

姜黃

麝

食宜

犬肉

鴨

鴈

鹿肉

鮋魚

火肉

風魚

猪腎

鷄卵

葡萄

橄欖

李

薺

林檎

馬齒莧

肝經

藥食所忌

茱忌

生砒

輕粉

木鱉

胡黃連

商陸

死砂

生砒

輕粉

木鱉

胡黃連

商陸

食忌

石首魚

水鷄

鵝

鴨卵

猪肝

蝦

茄

蒜

芋

杏

諸血

脾爲倉廩之官五味出焉主運動磨物之臟營之所居也其華在唇四
白其充在肌此爲至陰之類通于土氣爲牝臟意平則智無散越
宜健而不宜濡濡則精矣濡則邪氣從之病於內傷者多半調治
者當以去濕導濡味忌酸多食酸則肉眠鴟而唇揭味宜甘牛肉
粳米棗葵之屬脾苦濕急食苦以燥之使復其性之所喜脾斯健
矣白木之苦溫是已過燥則復欲緩之以甘甘草之屬是已稼穡
之化故甘先入脾性欲健運氣旺則行補之以甘人參是已長夏
之令濕熱主人脾氣斯困故當急食苦以瀉之黃連之苦寒是已
虛則宜補炙甘草之甘以益血人棗之甘以益氣乃所以補其不

足也

本草綱目

藥宜

補

白术

茯苓

人參

黃芪

薏苡仁

山藥

陳皮

甘草

蒼朮

扁豆

石丹

荳蔻

天麻

當歸

奇良

雄黃

辰砂

丁香

萎蕤

山查

瀉

升麻

白芍

防已

白芷

砂仁

烏藥

草菓

大黃

靈仙

鳯船

忍冬花

山甲

皂子

沉香

沒藥

乳香

山豆根

烏蛇

牛黃

麝

食宜

牛肉

猪脂

鳴

犬肉

鹿肉

鯷鱧

蚶

馬魚

鷄卵

火肉

羊

鯽魚

猪腴

芡

蓮肉

棗

荔枝

橄欖

松子

川椒

姜

萊菔

芹

經藥食所忌

藥忌

死砂

生砒

苦參

胡黃連

地黃

胆草

蝦蟆

蜈蚣

食忌

石首魚

鵝

猪肝

鳴則

雉

蝦

藥忌

菱

梅

柰

糟

醋

爲和體之管治節出焉氣之未阨之居也其聖在君其充在皮爲
陽中之太陰爲牝臟通於秋氣瞿安則德修壽延氣常則順氣
則逆逆則違其性矣病於外感者居半調治者當以清肅上焦而
使氣平味忌苦多食苦則皮枯而毛折味宜辛鷄肉黃黍桃葱之
屬肺苦氣逆急食苦以瀉之黃芩之屬是已其政歛肅政其性
善收宜食酸以收之白芍之屬是已賊肺者熱也肺受熱邪急食
辛以瀉之桑白皮之屬是已不歛則氣無所管束是肺失其職也
故宜補之以酸使遂其收斂之性是卽補也五味子之屬是已

經藥食所宜

藥宜

補

人參

黃芪

茯苓

呵膠

白荳仁

木香

桂枝

沙參

蛤蚧

琥珀

鍾乳粉

辰砂

牛黃

杏仁

防風

升麻

川貝

鴉

麻黃

荳蔻

橘紅

射干

擗榔

桔梗

羌活

荆芥

蘭葉

槐花

鼠粘

蘇皮

花粉

牙皂

片腦

白花蛇

麝

山甲

姜蚕

神水

升麻

射干

擗榔

食宜

鷄

豬肺

火肉

風魚

豬胰

羊肉

鷄卵

牛

鵝

鶴

胡荽

菜菔

片

麻

松子

榛子

梨

榧

補

蜜

葱

胎經藥食所忌

藥忌

死砂

生砒

苦參

黃連

班毛

胡連

天門冬

鉛粉

硫黃

亭蘆

食忌

石首魚

蝦

蟹

鴨卵

豬肝

麩筋

杏

柰

楊梅

銀香

萐苣

諸血

腎爲作強之官伎巧出焉封臘之本精之處也其華在鬚髮其充其骨爲陰中之少陰爲牝臟通於冬氣志管則骨髓滿實屬宜陰其性本潤故惡燥涸病於腑者多外感病於臟者多內傷調治者當

以滋陰益精味忌甘多食甘則骨痛而齒落味宜鹹豕肉太葷粟
藿之屬腎苦燥急食辛以潤之知母之屬是已欲堅急食苦以堅
之益腎非堅則無以稱作強之職四急以遇濕熱則軟遇寒冷則
堅五味以得鹹則軟得苦則堅故宜急食苦以堅之黃柏味苦氣
寒可以堅腎故宜急食以遂其欲堅之性也以苦補之是堅卽補
也地黃黃柏是已鹹能軟堅卽瀉也澤瀉是已虛者精氣奪
非益精無以爲補故宜熟地黃黃柏補之

賢經藥食所宜

藥宜

補

熟地

枸杞

薯

五味

藜

川牛膝

當歸

杜仲

首烏

故紙

益智仁

塵

茸

敗龜

蟹甲

附子

肉桂

五皮

蛇床

羊藿

鍾乳

磁石

虎骨

陽起石

海苟腎

紫河車

紅鉛

天靈

瀉

黃柏

知母

澤瀉

獨活

况香

川山甲

蟬退

金蝎

血竭

烏藥

琥珀

牛黃

麝

食宜

豬腎

醃鷄

甲魚

鰻鱺

塵肉

豕肉

鷄卵

火肉

風魚

雀

芡

犬肉

胡桃

乾筍

栗

腎經藥食所忌

藥忌

靈砂 灵砒 輕粉 胡連 蟬酥 羞郎
食忌 牛肉 鵝 石首魚 鴨卵 猪肝 蝦
蛙 鯿魚 茄 甜菜 蕎麥 南麵

柑

糖 青梅

宜忌一則雖不及於傷寒痘疹投劑少差死生立判是證少錯輕必
變而爲重重必至於傾危毫釐千里毋得忽畧且宜忌不爲智者
道也如產後無虛汗無補法痘瘡不宜汗下傷寒不宜進補此教
者皆謂粗工不諳病之進退故有是戒余觀上古哲人治疾或以
毒藥攻之投毒藥者不盡劑也所以有十去其幾之約殊不知十

去其幾之約爲最難而又難於識病氣之淺深也明其病氣淺深者又不拘於藥之良毒矣如扁鵲投人毒藥名聞諸候王不散不忌參术感應尤甚黃竝施瘧後以人參五言問同削此皆古人心契意會立方之妙故良將用兵苟正虛實互施者神算故也業此術者豈不亦猶良將乎哉傳曰神而明之存乎其人信夫