

藥局方

特59

774

書府

新門

三部

四類

二函

一十棚

全六八七号

TOYOBU LIBRARY



奥山虎炳閱  
前田清則譯補

# 官藥局方


海軍軍醫寮



特59  
774

序

軒轅氏尚  
目其所載  
材之大全  
以色味配  
而捕風焉  
黃白味有  
甘辛而已  
至夫功用  
則平淡



藥局方

序一

海軍軍醫寮



奥山虎炳閱


前田清則譯補

# 官版藥局方

海軍軍醫



特59



序

軒轅氏尚

目其所載

材之大全

以色味配

而捕風焉

黃白味有甘辛而已至夫功用則平淡

疾至明季

殆不下并

知難然

香

耳况其所用

特

種

無

固

抵

者本草細

寔可謂藥

無替荒誕

不過捉影

藥局方

序一

海軍軍醫



膚淺罔功罔害、假令誤用之、其戕性命者殆罕、唯西國藥物則不然、兼用草木金石、有數藥而合為一藥者、有一材而分為數材者、取其英、去其滓、釀為酒者、熬為鍊者、揀為油者、升為丹者、因物采宜、製法特精、是以其量誤毫釐、而斃人於眼前者、比比皆是、豈可不慎乎、頃者

前田清則專就英國局方、傍就諸書、輯其日用不可欠者、為一小冊子、今將上之桑梓、以頒我諸艦、及諸局、是固我輩一片老婆心、而唯冀我諸子臨配伍調劑之際、有所標準、以不致錯誤耳、若其大備、則宜就健卿林君所著窠篤兒藥性論而見焉、



明治壬申晚秋 奥山虎炳識

凡例

○秤量

一 比 十二号 即五千七百六十斤

一 号 八号 即四百八十斤

一 号 三号 即六十斤

一 刃 即二十斤

○液量

藥局方

凡例三

海軍軍醫



- 一 瓦 ワ 八巴
- 一 巴 バ 二十汚
- 一 汚 ウ 八汚
- 一 汚 ウ 三汚
- 一 汚 ウ 二十m
- 一 茶 チ 五 ハ 四汚 ニ 齊 シ

○日用溶量

- 一 酒 ウ 盞 ガ ハ 二汚 ニ 齊 シ
- 一 食 チ 匙 シ ハ 半汚 ニ 齊 シ
- 一 茶 チ 匙 シ ハ 一汚 ニ 齊 シ

○服量之比例

- 大 入 一 即六十八
- 一 歲 十二分一 即五十八
- 二 歲 八分一 即七十八



三歲	六分一	即十八
四歲	四分一	即十五
七歲	三分一	即二十
十四歲	半分	即三十
廿歲	三分二	即四十

例之廿一歲至六十五歲ハ全量六十  
 氏ヲ與スレハ六十五歲以上ハ右ニ

反シテ逐次減量スベシ

一 製劑中載スル所ノ時ハ皆西洋ノ  
 時ニ從フ

一 服量ハ皆大人一回ノ量ヲ云フ

一 各條ノ下掲タル所ノ原語ハ悉ク  
 羅甸語トス



明治壬申晚秋 前田清則識

海軍醫藥局方目次

- 浸劑之部 十一葉至十五葉
- 煎劑之部 二十六葉至二十六葉
- 丁幾劑之部 二十七葉至二十七葉
- 酒劑之部 二十八葉至二十八葉
- 精劑之部 二十九葉至二十九葉
- 水劑之部 三十葉至三十葉



○稀酸類 八十九葉至

○醋並蜜類 九十三葉至

○舍利別並里謨奈埕 九十四葉至

○丸劑之部 百四葉至

○散劑之部 百一十一葉至

○錠劑之部 百二十六葉至

○昆設兒弗漿並乳劑之部 百四十二葉至

○塗擦劑之部 百三十一葉至

○軟膏之部 百三十九葉至

○硬膏之部 百五十一葉至

○灌傷劑之部 百五十七葉至

○坐藥方 百六十四葉至

○藥湯 百六十五葉至

○巴布類 百六十八葉至

藥局方

目次七

海軍軍醫署



○肉羹汁鷄子耐及米汁 一百七十七葉

○元質類 百七十二葉

○鹽類 百七十三葉至

○鑛屬 百七十五葉至

○酸類 百七十八葉

○越幾斯類 百七十九葉至

○油類 百八十一葉

○植物類 百八十二葉至

○樹脂草汁之類 百八十五葉

○動物類 百八十六葉

○土質及非鑛元質之類 百八十七







時ニシテ濾過ス

**主効** 衝動、強壯、解熱、服温催吐

**用法** 一汚乃至四汚

○橙皮浸 一シ、二シ、三シ、四シ、五シ、六シ、七シ、八シ、九シ、十シ

橙皮 半細切 沸湯 十汚

右製法同前

**主効** 温暖、強壯、健胃

**用法** 一汚乃至二汚

○複方橙皮浸 一シ、二シ、三シ、四シ、五シ、六シ、七シ、八シ、九シ、十シ

橙皮 二細切 枸櫞皮 一細切

丁香 半搗碎 沸湯 十汚

右製法、主効、用法共ニ同前

○弼箇浸 一シ、二シ、三シ、四シ、五シ、六シ、七シ、八シ、九シ、十シ

弼箇葉 半搗碎 沸湯 十汚



右蓋器内ニ浸漬スル一時間ニシテ濾過ス

**主効** 強壯、利尿

**用法** 一汚乃至四汚

○格倫僕浸インシニシムカリンベ

格倫僕細割半汚 冷水汚

右製法同前

**主効** 強壯、防腐

**用法** 一汚乃至二汚

○丁香浸インシニシムカリンベ

丁香搗碎 沸湯汚

右蓋器内ニ浸漬スル一時間ニ

シテ濾過ス

**主効** 温暖、驅風



**用法** 一汚乃至四汚

○葛私加栗刺浸カイリン 一汚乃至四汚

葛私加栗刺皮粗末 一汚乃至四汚 沸湯汚十

右蓋器内ニ浸漬スル一汚乃至二汚

シテ濾過ス

**主効** 輕温強壯

**用法** 一汚乃至二汚

○阿仙藥浸イシヤク 一汚乃至二汚

阿仙藥粗末百 桂皮搗碎三

沸湯汚十

右蓋器内ニ浸漬スル一汚乃至二汚

シテ濾過ス

**主効** 強收斂

**用法** 一汚乃至二汚



○吉列太浸 インズーシム、キレテ

吉列太 細了 餾水 百二十度ノ者十汚

右製法同前

**主効** 健胃

**用法** 一汚乃至二汚

○黄幾那浸 インズーシム、シニコ子、  
フラヴェー

黄幾那 粗末 沸湯 十汚

右蓋器内ニ浸漬スル一二時ニ

シテ濾過ス

**主効** 強壯

**用法** 一汚乃至二汚

○ユスバリアヤ浸 インズーシム、ユス  
パリエ

ユスバリアヤ皮 粗末 餾水 百二十度  
ノ者十汚

右製法同前



**主効** 衝動、強壯

**用法** 一、汚乃至二汚

○ コスソ 浸 イン 五ー 五、コスソ

コスソ 粗末 半号 沸湯汚ハ

右蓋器内ニ浸漬スル一十五分  
時濾過セズメ用ユ

**主効** 絲蟲ニ偉効アリ

**用法** 四汚乃至八汚 服后蓖麻子油ヲ與フ可シ

○ 實芟多里斯浸 タイン 五ー 五、シ、

實芟多里斯葉 乾枯シタル者三十人

沸湯 汚十

右蓋器内ニ浸漬スル一一時ニ  
シテ濾過ス

**主効** 利尿、鎮靜



**用法** 二汚乃至四汚

○蜀羊泉浸 イン、エ、小、エ、ム、ドルカマ

蜀羊泉 一搗碎 沸湯 汚十

右製法同前

**主効** 利尿、發汗、麻醉、變質

**用法** 一汚乃至二汚

○麥奴浸 イン、エ、一、エ、ム、エ、ル、ハ、テ、一

麥奴 粗末 沸湯 汚十

右蓋器内ニ浸漬スル一半時ニ

シテ濾過ス

**主効** 衝動、麻醉、通經

**用法** 一汚乃至二汚

○複方健質亞那浸 イン、エ、一、シ、ム、ゼ、ン、チ、ア、子、コ、ハ、ホ、シ、テ、ム  
健質亞那根 薄切 橙皮 細切各一汚



拘櫟皮

細切

沸湯

十

右蓋器内ニ浸漬スル一四時ニ

シテ濾過ス

**主効** 芳香、強壯

**用法** 一汚乃至二汚

○刺答尼亞浸

イン、エー、エム、クラメ

刺答尼亞根

搗碎

沸湯

十

右製法同前

**主効** 強壯、收斂

**用法** 一汚乃至二汚

○亞麻仁浸

イン、エー、エム、リナイ

亞麻仁

百六

甘草根

薄切

沸湯

十

右蓋器内ニ浸漬スル一四時ニ



シテ濾過ス

**主効** 緩和

**用法** 二汚乃至四汚

○忽布浸 イシニ至一シテ、ロニ至一

忽布半汚 沸湯汚十

右蓋器内ニ浸漬スル一ニ時ニ

シテ濾過ス

**主効** 強壯、輕麻酔

**用法** 一汚乃至二汚

○麻知姑浸 イシニ至一シテ、マチセ一

麻知姑葉細判半汚 沸湯汚十

右蓋器内ニ浸漬スル一ニ時ニ

シテ濾過ス

**主効** 強壯、衝動止血



**用法** 一汚乃至四汚

○括失亞浸 インゴーシム、レアイ

括失亞 細屑 冷水汚

右製法同前

**主効** 強壯防腐

**用法** 一汚乃至二汚

○大黃浸 インゴーシム、レアイ

大黃根 薄削 沸湯汚

右蓋器内ニ浸漬スル一時間ニ

シテ濾過ス

**主効** 健胃、下泄

**用法** 一汚乃至二汚

○加酸玫瑰浸 インゴーシム、ローゼー

赤玫瑰花 細碎 稀硫酸汚







右製法同前

**主効** 下泄

**用法** 一汚乃至二汚

○攝兒扁太里亞浸インゴニシム、セ  
ルベシライ

攝兒扁太里亞根ニ搗碎沸湯十

右蓋器内ニ浸漬スル一ニ時ニ

シテ濾過ス

**主効** 衝動強壯發汗通經

**用法** 一汚乃至二汚

○烏華烏兒失浸インゴニシム、セ  
エ、ウルカイ

烏華烏兒失葉搗碎沸湯十

右製法同前

**主効** 強壯緩利尿

**用法** 一汚乃至二汚



○纈草浸

イ、ン、ニ、一、ジ、ム、ダ、レ、リ、ア、子

纈草根

二、搗、碎

沸湯

十

右蓋器内ニ浸漬スル一、一時ニ

シテ濾過ス

**主効** 衝動、鎮痙

**用法** 一、汚乃至二汚

○亞兒蘚浸

イ、ン、ニ、一、ジ、ム、ダ、レ、リ、ア、子

亞兒蘚

一、半

沸湯

一

右浸漬スル一、一時ニシテ濾過

ス

**主効** 驅蟲、強壯、鎮痙

**用法** 一、汚乃至二汚

○亞兒尼加浸

イ、ン、ニ、一、ジ、ム、ダ、レ、リ、ア、子

亞兒尼加花

半

沸湯

十二

藥局方

十三

海軍軍醫官



右浸漬シ放冷濾過ス

**主効** 衝動

**用法** 二汚乃至半汚

○杜松子浸イニ五一立ムシヨニハ

杜松實一搗碎沸湯汚

右蓋器内ニ浸漬スル一一時ニ

シテ濾過ス

**主効** 衝動、利尿

**用法** 一汚乃至三汚

○芸香浸イニ石一立ムル夕

芸香字 沸湯一

右蓋器内ニ浸漬スル一一時ニ

シテ濾過ス

**主効** 衝動、鎮痙、通經、驅蟲



**用法** 一汚乃至二汚

○薩毘那浸 インズーシム、サビ子

薩毘那 一 沸湯 八汚半

右製法同前

**主効** 衝動、通經

**用法** 半汚乃至一汚

○失麻兒拔浸 インズーシム、シマル

失麻兒拔根皮 搗碎百 沸湯 九汚

右蓋器内ニ浸漬スル一時ニ

シテ濾過ス

**主効** 苦味強壯

**用法** 一汚乃至二汚



煎劑之部 デコク 去ム

○複方蘆薈煎 テコク 去ム、アル 一ス

蘆薈 百二 十 沒藥 泊芙蓉藍 各九 十

炭酸剝篤亞斯 六十

甘草越幾斯 一 複方益智丁幾 八

餉水 宜適

右先ソ蘆薈及沒藥ヲ粗末トナ



シ炭酸刺篤亞斯ト甘草越幾斯  
 ヲ共ニ蓋器内ニ入レ餾水一巴  
 ヲ注キ微火ヲ以テ煮ルト五分  
 時、洎芙蓉ヲ加ヘ放冷シ隨テ益  
 智丁幾ヲ加ヘ密封シ浸漬スル  
 一二時ニシテ終ニフラスルヲ  
 以テ之ヲ濾過シ適宜ニ餾水ヲ

注ヒテ全液三十滴ヲ取ル

**主効** 下泄、通經

**用法** 半滴乃至二滴

○依蘭苔煎

デコクキム、セトラリエ

依蘭苔

一 餾水

右先ツ冷水ヲ以テ依蘭苔ヲ洗  
 淨シ次ニ餾水ヲ注ヒテ蓋器内



ニ煎ル一十分時温ニ乘シテ輕々濾過シ又適宜ニ餉水ヲ加ヘテ全量一巴トナス

**主効** 緩和強壯

**用法** 一汚半乃至三汚

○黄幾那煎

デコクキム、シニコ子、  
フラガエー

黄幾那皮

粗末一  
汚ニ汚  
餉水一  
巴

右蓋器内ニ煮ル一十分時、冷ルヲ待テ濾過シ適宜ニ餉水ヲ加ヘテ全量一巴トナス

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 一汚乃至二汚

○柘榴根煎

デコクキム、ガラナタイ、  
ラシキス

柘榴根皮

薄削  
ニ汚  
餉水  
二巴



右煎熬シテ一巴トナス

**主効** 驅蟲

**用法** 一汚乃至二汚

○坎百設木煎 デコクキム、ヘマト  
キシライ

坎百設木 細屑 桂皮 粗末

餹水 一巴

右坎百設木ヲ蓋器内ニ煮ル

十分時、桂皮ヲ加ヘ濾過シテ滓ヲ去リ適宜ニ餹水ヲ注ヒテ全量一巴トナス

**主効** 收斂

**用法** 一汚乃至二汚

○大麥煎 デコクキム、

大麥 二汚 餹水 一巴半



右先ツ冷水ヲ以テ大麥ヲ洗淨  
シ水氣ヲ去リ之ヲ葢器内ニ貯  
ヘ餹水ヲ注ヒテ煮沸スル一  
十分時ニシテ濾過ス

**主効** 緩和

○ 嬰粟殼煎

デコク去ム、バ  
ダライス

嬰粟球

搗碎

餹水 一巴  
半

右葢器内ニ貯ヘ煮ル一十分時  
ニシテ濾過シ適宜ニ餹水ヲ加  
ヘテ全量一巴トナス

**主効** 蒸濕劑トシテ緩和、鎮痛ノ

効アリ

○ パレイラ煎

デコク去ム、  
パレイラ

パレイラ根

薄削一  
半

餹水 一巴



右蓋器内ニ煮ル<sub>一</sub>十五分時ニ  
シテ濾過<sub>ニ</sub>適宜ニ餾水ヲ加ヘ  
テ全量一巴トナス

**主効** 強壯、緩和利尿

**用法** 一汚乃至二汚

○槲皮煎

テコク<sub>左</sub>キ<sub>右</sub>ル<sub>中</sub>キ<sub>下</sub>ス

槲皮<sub>一</sub> 搗碎<sub>一</sub> 餾水<sub>一</sub>

右蓋器内ニ煮ル<sub>一</sub>十分時ニ  
テ濾過<sub>ニ</sub>適宜ニ餾水ヲ加ヘ  
テ全量一巴トナス

**主効** 收斂

○撒兒沙煎

テコク<sub>左</sub>サ<sub>右</sub>ル<sub>中</sub>セ<sub>下</sub>一

撒兒沙根<sub>二</sub> 半<sub>一</sub> 沸湯<sub>一</sub> 半<sub>一</sub>

右蓋器内ニ浸漬スル<sub>一</sub>一時間



之ヲ煮ル一十分時ニシテ放冷  
濾過シ滓ヲ去リ適宜ニ餾水ヲ  
加ヘテ全量一巴トナス

**主効** 變質

**用法** 二汚乃至十汚

○複方撒兒沙煎 テコクテ左ハサレ巨イ  
コンコシテ五ム  
撒兒沙根 二汚半 薩沙布刺斯 屑細

癒瘡木

碎細

瑞香皮

六十分

甘草根

搗碎各  
二巴

右製法同前

**主効** 同前

**用法** 二汚乃至十汚

○スコパルムス煎 デコクテ五ムスコパ  
リアイ  
スコパルムス 一汚 餾水 一巴

藥局

主

海軍軍醫局



右蓋器内ニ煮ル丁十合時ニ  
テ濾過シ適宜ニ餾水ヲ加ヘ全  
量一巴トナス

**主効** 大量ハ吐下小量ハ利尿

**用法** 二汚乃至四汚

○蒲公英煎

蒲公英根薄刮 餾水一巴  
デコクテム、タラキサ、イ

右製法同前

**主効** 變質

**用法** 二汚乃至四汚

○榆皮煎

榆皮細判ニ 餾水一巴  
デコクテム、エルマイ

右製法同前

**主効** 緩和強壯



用法 二升乃至四升

○悉篤滿濃煎 デフクニム

撒爾薩根 十二 井水 二百八十

右煮ル 八分時ニメ 后藥ヲ加

フ

甘汞 半 明礬 白糖 各一

銀朱 一 布囊ニ盛ル 以上四品豫メ

旃那葉 二 甘草 一

遏泥子 胡蘆巴子 各半

右八味ヲ加ヘ再ビ煮テ全液百

九十二升ヲ取リ之ヲ八瓶ニ分ツ

○同薄煎

濃煎萍 撒爾薩根 各六

拘櫟皮末 桂皮末 益智 各三



甘草六 井水二百八十

右煮テ全液百九十二分ヲ取り

之ヲ八瓶ニ分ツ

**主効** 經久微毒慢性皮膚病及慢性

痛風ノ骨腫等ニ服用ス

**用法** 初日早朝二瀕藥散廿六

巴未二十ル者一劑ヲ瀕服シ二

日ヨリ五日迄、毎日午前ニ濃煎一瓶ヲ温服シ午后ニ薄煎一瓶ヲ冷服ス第六日又瀕藥散ヲ服シ七日ヨリ十日迄又毎日濃薄二煎ヲ服スルヲ初、知止此方一劑ヲ盡スト雖モ奏効未ダ十全ナラザル者ニハ更ニ一劑



ヲ用フベシ且此法ニ從事スル  
 間ハ飲食ヲ節シ暖室ニ籠居ソ  
 力所及蒸氣ノ發越ヲ扶クベシ  
 ○舍電華謨白煎 デコクモ、アル  
 ハ、ハ  
 鹿角屑 蒸餅心 各ニ  
 水六三  
 十  
 右煮テ二十四汚ニ至リ白糖半  
 子ヲ加フ

主効 緩和滋養

○沙列布煎 デコクモ、  
 サ、ソ、ブ

沙列布 未一  
 水汚十

右煮ル一暫時ニ、濾過ス

主効 同前

○亞兒的亞煎 デコクモ、アルセー

亞兒的亞 ニ子代用  
 蜀葵根 水汚十二



右煮テ六汚ヲ收ム

**主効** 粘滑緩和

丁幾劑之部 チニクモラエ

○雙蘭菊丁幾

チニクモラエ

雙蘭菊根

粗末ニ

濃酒

一巴即再  
餉酒精精

劑ノ條トニ詳ナ  
リ就テ見ルベシ

右根ヲ曝ニ内レ濃酒十五汚ヲ

注キ密閉シ時々震盪シ清ス

一二日間濾器ニ輸シテ液ヲ取

藥方

五

海軍軍醫



リ其滓ニ殘餘ノ酒精五汚ヲ加  
ヘ復之ヲ濾シ適宜ニ濃酒ヲ加  
ヘテ全量一巴トナス

**主効** 鎮靜

**用法** 五ml 乃至十五ml

○蘆薈丁幾

チンクチュス  
アルース

蘆薈

粗末  
半匁

甘草越幾斯

一匁  
半

淡酒 適宜即稀薄酒精製法詳ニ  
精劑ノ條下ニ掲グ参考ス

右蘆薈及ヒ越幾斯ヲ壘ニ容レ

淡酒十五汚ヲ加ヘテ密封シ時

々震盪シ清スル七目濾シテ滓

ヲ去リ適宜ニ淡酒ヲ加ヘテ全

量一巴トナス



**主効** 小量ハ強壯大量ハ下泄傍  
ヲ通經ノ効アリ

**用法** 一汙乃至二汙

○亞爾尼加丁幾 チンクチラ、アルニケド

亞爾尼加根 粗末 濃酒 一

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 麻痺神經性頭痛等ニ良シ

或ハ水ヲ以テ稀釋シ挫傷及ヒ  
浮腫ニ外布シテ局部ノ衝動藥  
タリ

**用法** 一汙乃至二汙

○阿魏丁幾 チンクチラ、アサフチデー

阿魏 細屑ニ 濃酒 適宜

右製法蘆薈丁幾ニ同シ



主効 鎮痙、殊ニ子宮諸病ニ稱用

用法 半匁乃至一匁

○橙皮丁幾 チンクチアウ

橙皮 細割ニ号 淡酒 一

右場ニ内レ密封シテ時々震盪シ漬ス一七日濾シテ滓ヲ去リ

適宜ニ淡酒ヲ加ヘテ全量一巴トナス

主効 強壯、健胃

用法 一匁乃至二匁

○莨菪丁幾 チンクチアウ

莨菪葉 粗末 淡酒 一

右製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ



**主効** 鎮痛

**用法** 五ml乃至二十ml

○複方安息香丁幾 チンクチュエベンゾ  
イニール、コムポシタ

安息香 粗末  
二g 精製蘇合香 一g  
半

篤留拔兒撒謨 半g 蘆薈 百六  
十g

濃酒 一  
巴

右製法橙皮丁幾ニ同シ

**主効** 衝動祛痰、往時ハ刀創挫傷

等ニ外布シテ外氣ヲ防キ且其

癒合ヲ促ス所謂布里謁兒氏拔

兒撒謨是ナリ

**用法** 半汚乃至一汚

○弼箇丁幾 チンクチュエ  
ビニキナ

弼箇葉 粗末ニ  
半g 淡酒 一  
巴



右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 弼箇浸ニ同シ

**用法** 一汚乃至二汚

○格倫僕丁幾 チンクチュエ  
カクシム

格倫僕根 細割ニ  
弓半 淡酒 一  
巴

右製法同前

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 半汚乃至二汚

○複方龍腦丁幾 チンク  
レ、コム  
ボシム

名龍腦  
レゴリク  
エリキシ  
ル 阿片丁幾 各四  
十人

阿片 粗末 安息香酸 各四  
十人 龍腦

三十  
人 遏泥子油 半汚 淡酒 一  
巴

右製法橙皮丁幾ニ同シ

**主効** 氣管支炎咳嗽、冒寒、下痢等



ニ偉功アリ

**用法** 十五ml乃至一升

○大麻丁幾

チニクキラ、カンナビス、  
インヂケ

大麻越幾斯<sub>一</sub> 濃酒<sub>一</sub>

右越幾斯ヲ取り濃酒中ニ溶解

ス

**主効** 麻醉鎮癒

**用法** 五ml乃至二十ml

○莞菁丁幾

チニクキラ、カン

莞菁

粗末  
淡酒<sub>一</sub>

右製法橙皮丁幾ニ同シ

**主効** 衝動利尿

**用法** 五ml乃至二十ml

○番椒丁幾

チニクキラ、  
ガブニサイ



番椒

六搗碎

濃酒

右製法雙蘭菊丁幾二同シ

**主効** 刺戟衝動

**用法** 十匁乃至二十匁

○複方益智丁幾

チンク、左、カ、ル、ダ、マ、イ、コ、ハ、ホ、シ、タ、ス、ル、者、ニ、与、

益智

ス、英、ヲ、除、テ、搗、碎、

葛縷子搗碎

干葡萄

核ヲ去ル者ニ与

桂皮細剉

半与

コ一七二一ル

未六十八

淡酒

右製法雙蘭菊丁幾二同シ

**主効** 芳香、健胃、驅風

**用法** 半匁乃至二匁

○葛斯加栗刺丁幾

チニク、左、カ、ス、カリ、レ、イ

葛斯加栗刺皮

搗碎ニ与

淡酒

右製法雙蘭菊丁幾二同シ



**主効** 衝動、強壯

**用法** 半汚乃至二汚

○葛斯篤儂謨丁幾チレクテカス

葛斯篤儂謨粗末濃酒一

右製法橙皮丁幾二同シ

**主効** 強壯、鎮瘧

**用法** 半汚乃至一汚

○阿仙藥丁幾カタク

阿仙藥粗末桂皮一搗碎

淡酒一

右製法同前

**主効** 強收斂

**用法** 半汚乃至二汚

○吉列太丁幾チレクテカス



吉列太 細劉二 淡酒巴

右製法雙蘭菊丁幾二同シ

**主効** 強壯、健胃

**用法** 半汚乃至二汚

○複方哥囉叻嚙丁幾 チンク、ホルマイン

シムホ

シタ 汚二 濃酒 汚八

複方益智丁幾 汚十

右混合

**用法** 二十卍乃至六十卍

○複方幾那丁幾 チンク、ホルマイン

幾那 粗末 橙皮 細劉 攝見扁

太里亞根 搗碎 洎芙蓉藍 六十

コ一七二一ル 末三 淡酒巴



右製法雙蘭菊丁幾二同シ

**主効** 衝動、強壯

**用法** 半汚乃至二汚

○黄幾那丁幾チルクエラシニユ子

黄幾那粗末 淡酒一

右製法同前

**主効** 強壯

**用法** 半汚乃至二汚

○桂皮丁幾チルクエラシニ

桂皮粗末 淡酒一

右製法同前

**主効** 芳香、健胃、輕收斂

**用法** 半汚乃至二汚

○コ―セニール丁幾チルクエラ



コ―セニール末二等 淡酒一巴

右製法橙皮丁幾ニ同シ

**主効** 色彩ニ用ユ

○格兒失屈謨丁幾チンクオラコル

格兒失屈謨實シナイセミム 淡酒一巴

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 利尿、發汗、下泄、鎮痙、催吐

**用法** 十ル乃至三十ル

○失鳩荅丁幾チンクオラ

失鳩荅實コニアイ 淡酒一巴

右製法同前

**主効** 麻醉、鎮痙

**用法** 二十ル乃至六十ル

○泊美藍丁幾チンクオラ



藥局方

海軍軍醫官

泊芙蓉 一  
淡酒 一

右製法同前

主効 通經、或ハ色彩ニ供ス

用法 半斤乃至一斤

○ 華澄茄 丁幾 チンク、エラ、

華澄茄 末ニ 濃酒 一

右製法同前

主効 衝動

用法 半斤乃至二斤

○ 實芟多里斯 丁幾 チンク、チュラ、

實芟多里斯 葉 粗末ニ 淡酒 一

右製法同前

主効 浸劑ニ同シ

用法 十斤乃至三十斤

藥局方

三

海軍軍醫官



○麥奴丁幾チルンクテラ

麥奴粗末 淡酒一

右製法同前

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 十川乃至一汚

○醋酸鉄丁幾アセクチス

過硫酸鉄液ニ汚 醋酸剥篤亞

斯ニ 濃酒適

右先ツ醋酸剥篤亞斯ヲ取り濃

酒十汚ニ溶解シ別ニ濃酒八汚

ヲ取り其中ニ過硫酸鉄液ヲ注

キ之ヲ各瓶ニ貯ヘ竟ニ二巴ヲ

容ルベキ壺中ニ前ノ二液ヲ混

淆シ絶ヘズ震盪スル一小時ニ



シテ濃過シ更ニ適宜ノ濃酒ヲ  
加ヘ全量一巴ニ至ルヲ度トス

**主効** 肺癆、萎黃病、慢性心臟諸病

等ニ稱用ス

**用法** 五ml乃至三十ml

○過格魯兒鉄丁幾 チンク去エズルリ  
ペルコロライダイ

過格魯兒鉄強液 五 濃酒 十五

右混和固封シ貯リ異重〇・九

九二

**主効** 收斂、強壯

**用法** 十ml乃至三十ml

○没食子丁幾 チンク去エ  
ガルクイ

没食子 粗末ニ  
写半 淡酒 一

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ



**主効** 收斂

**用法** 半汚乃至二汚

○複方健質亞那丁幾チンク、五、エ、ゼ、ン、チ、ヤ、子、一、コ

ム、ホ、シ、タ

健質亞那根細判一 橙皮細判六

益智英ヲ去ル 淡酒一

右製法同前

**主効** 強壯、健胃

**用法** 半汚乃至二汚

○安母尼亞製癒瘡木脂丁幾チンク、チ、ユ、ク

グ、ワ、イ、ア、サ、イ、ア、ム、モ、ニ、ア、タ

癒瘡木脂末四 芳香礮砂精適

右癒瘡木脂ヲ壘ニ容レ芳香礮

砂精十五汚ヲ注キ密封シテ時



々震盪シ浸ス一七日濾シテ滓ヲ去リ適宜ニ芳香礫砂精ヲ加ヘテ全量一巴トス

**主効** 衝動、解凝、發汗

**用法** 半汚乃至一汚

○菲沃斯丁幾 チンクモスハイオシ

菲沃斯葉 粗末ニ 淡酒 一巴

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 麻醉、緩和、催睡

**用法** 半汚乃至一汚

○沃陳丁幾 チンクモス

沃陳 半汚 沃度剥篤亞私 二

濃酒 一巴

右濃酒中ニ溶解ス



用法 五匁乃至二十匁

○藥刺巴丁幾 チンクエシヤ  
ラップエー

藥刺巴 粗末ニ  
写半 淡酒 一匁

右製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

主効 下泄

用法 半匁乃至二匁

○吉納丁幾 チンクエシヤ  
トノ

吉納 粗末  
ニ写 濃酒 一匁

右製法 橙皮丁幾ニ同シ

主効 收斂

用法 半匁乃至二匁

○刺荅尼亞丁幾 チンクエシヤ  
カラメエー

刺荅尼亞根 粗末ニ  
写半 淡酒 一匁

右製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ



**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 半汚乃至二汚

○複方刺賢堙兒チンク丁幾クダクンクジクレクスクラク

△ホ  
シタ

刺賢堙兒油一汚 迷迭香油十

桂皮 肉荳蔻各細列百 朱檀

三百 濃酒二

右桂皮、肉荳蔻及ヒ朱檀ヲ壞ニ  
容レ濃酒ヲ注テ密封シ時々震  
盪シテ浸ス一七日濾過シテ滓  
ヲ去リ油ヲ加ヘ之ヲ再濾シ適  
宜ニ濃酒ノ加ヘテ全量ニ巴一  
ナス

**主効** 衝動、驅風



**用法** 半汚乃至二汚

○拘櫟皮丁幾 チンクナラ、リモナイヌ

拘櫟皮 薄刮ニ 淡酒 一

右製法橙皮丁幾 一同シ

**主効** 芳香、強壯

**用法** 半汚乃至二汚

○魯弊里亞丁幾 チンクナラ、ロベリナ

魯弊里亞 粗末ニ 淡酒 一

右製法雙蘭菊丁幾 一同シ

**主効** 祛痰、鎮痙、催吐

**用法** 十汎乃至半汚

○亞的兒製魯弊里亞丁幾 チンクナラ、エロベリ

エー、エー、セリア

魯弊里亞 粗末ニ 亞的兒精 一



右製法橙皮丁幾ニ同シ

**主効** 同前

**用法** 十川乃至半乃

○忽布丁幾 チンクチュラ、ロビユライ

忽布 ニ 淡酒 一

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 半乃乃至二乃

○沒藥下幾 ナレンク、イ

沒藥 粗末ニ 濃酒 一

右製法同前

**主効** 健胃衝動祛痰鎮痙通經

**用法** 半乃乃至一乃

○番木鱉丁幾 インク、スシ、スジ



番木鱈号二 濃酒号一

右先ツ番木鱈ヲ蒸シテ之ヲ

柔軟ナラシメ速ニ之ヲ乾燥シ

テ粉末トナシ罎ニ内レ濃酒十

五匁ヲ注キ密封シテ時々震盪

シ浸ス一二日瀝シテ滓ヲ去リ

適宜ニ濃酒ヲ加ヘテ全量一巴

トナス

**主効** 強壯神經衝動

**用法** 強壯ニハ五匁至十匁神經

衝動ニハ十匁至三十匁

○阿片丁幾 チンク ウガニウム オピアイ

阿片粗末 淡酒

右製法橙皮丁幾ニ同シ此丁幾



一 汚中ニ阿片溶解合三十三八  
ヲ含ム

**主効** 鎮痛、麻酔

**用法** 五兀乃至四十兀

○安母尼亞製阿片丁幾 チンツチュエ  
オピアイ、ア

ムヒニ  
ハタ

阿片粗末 泊美藍 安息香酸

各百八 過泥子油 礮砂精  
十兀 濃酒 十六

右製法同前

**用法** 半汚乃至一汚

○括失亞丁幾 チンク  
クサイ

括失亞 細屑  
六分 淡酒 一

右製法同前



**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 半斤乃至二斤

○規厄丁幾 チニク左エ  
クイニエ

硫酸規厄涅 百六 橙皮丁幾 一

右壘ニ容レ文火ヲ加ヘ溶解シ

密封シテ時々震盪スル一三日

ニシテ濾過ス

**主効** 強壯

**用法** 半斤乃至二斤

○大黃丁幾 チンク左エ  
レアイ

大黃 粗末  
ニ号 益智 莢ヲ去リ搗  
碎スル者

胡隨子 搗碎 洎芙蓉 藍各ニ 淡酒 一

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 健胃下泄



**用法** 健胃ニハ一沔至二沔下泄

ニハ半沔至一沔

○薩比那丁幾 チンクテラ  
サビ子一

薩比那 粗末ニ  
字半 淡酒 一  
巴

右製法同前

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 二十沔乃至一沔

○海葱丁幾 チンクテラ  
スキルレ一

海葱 搗碎ニ  
字半 淡酒 一  
巴

右製法同前

**主効** 祛痰利尿

**用法** 十沔乃至三十沔

○遠志丁幾 チンクテラ  
セ子デ一

遠志根 粗末ニ  
字半 淡酒 一  
巴



藥方  
海軍軍醫

右製法同前

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 半行乃至二行

○ 旃那丁幾 チニク 五エ  
セニ子 一

旃那 細碎ニ 干葡萄 核ヲ去ル  
者ニ等

葛縷子 胡隨子 各搗碎 淡酒 一

右製法同前

**主効** 暖性衝動下泄

**用法** 一行乃至四行

○ 攝兒扁太里亞丁幾 チニク 五エ  
ルベロ タリエ

攝兒扁太里亞根 粗末ニ 淡酒 一

右製法同前

**主効** 浸劑ニ同シ

**用法** 半行乃至二行

藥方  
海軍軍醫



○蔓陀羅丁幾

チンク  
ラモニ  
アイト  
チンク  
ラモニ  
アイト

蔓陀羅子

搗碎ニ

淡酒一

右製法同前

**主効** 鎮痛鎮痙

**用法** 十兀乃至三十兀

○篤留丁幾

チンク  
トリュ  
タナ

篤留拔兒撒謨ニ

濃酒宜適

右篤留拔兒撒謨ヲ壘ニ容レ濃

酒十五兀ヲ注キ密封シテ時々

振盪シ侵ス一六時間或ハ其全

ク溶解スルヲ待テ濾過シ適宜

ニ濃酒ヲ加ヘテ全量一巴トナ

ス

**主効** 衛動祛痰



**用法** 二十川乃至四十川

○ 纈草丁幾 ナニクモラウレリ

纈草根 粗末ニ 淡酒 一

右製法 雙蘭菊丁幾一同シ

**主効** 衝動、鎮痙

**用法** 一汙乃至二汙

○ 安母尼亞製 纈草丁幾 キニクモラウレリア子

一、アマモ  
ニアタ

纈草根 粗末ニ 芳香礮砂精 一

右製法 橙皮丁幾一同シ

**主効** 前ニ同フシテ 衝動ノ効大

ナリ

**用法** 半汙乃至一汙

○ 綠藜蘆丁幾 ナニクモラウレリア子



綠藜蘆根粗末 濃酒一

右製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

**主効** 鎮靜、催吐、發汗

**用法** 五匁乃至二十匁

○乾薑丁幾 チンクエ、ジンジ

乾薑粗末 濃酒一

右製法同前

**主効** 溫暖、驅風

**用法** 十五匁乃至一匁

○強烈乾薑丁幾 チンクエ、シヨル

乾薑細末 濃酒適宜

右乾薑末ヲ濾器ニ密填シ濃酒

半巴ヲ注キ二時ヲ隔テ更ニ濃

酒ヲ加ヘ徐々ニ濾過シテ其全



液一巴ニ至ルヲ度トス

**主効** 同前

**用法** 五ml乃至二十ml

○ロンドン鐵丁幾

鐵屑 各一  
桂皮 肉荳蔻 各二

白葡萄酒 二十  
四割

右浸漬スルヲ十二日濾過シテ

貯フ

**主効** 鐵酒ニ同シ

**用法** 十五ml乃至三十ml

○カリサヤ、エリキシル 一名黃幾那  
エリキシル

黃幾那 各四  
新鮮橙皮 各二  
桂皮

胡荽子 各一  
過泥子 葛縷子

益智 各百二  
コトセニール 十八



ブランデー酒 單舍利別 各二  
亞爾箇兒 水各適 巴半

右先ツ前ノ八味ヲ細末トナシ

次ニ稀耐ブランデー酒ニ巴半

者四河ヲ以テ末ヲ濕シ之ヲ圓

雛形ノ濾器ニ置キ殘餘ノ稀耐

ヲ其上ニ注キ了ニ稀亞爾箇兒

アルコール一分ニ適宜ヲ加ヘ

水三合ヲ混マル者

徐々ニ濾過シテ六巴半ノ液ヲ

取リ舍利別ヲ混和ス

主効 芳香、強壯、健胃、衝動

用法 一汚乃至三汚



酒劑之部

ザソイニム

○蘆薈酒

ザソイニム  
アルース

蘆薈

一  
半

益智

茨ヲ去リ搗  
碎スル者

乾薑

粗末各  
八十匹

設置酒  
巴

右壘ニ入レ

密閉シテ

時々

震盪

シ浸漬スル

ル

七日

濾過シテ

滓

ヲ去リ

設置酒

適宜

ヲ加ヘテ

全



量二巴トナス

**主効** 温暖下泄

**用法** 一汚乃至二汚

○安質母尼酒 ガイニム、アンチモニアールン

吐酒石 四十 設里酒 一

右溶解ス

**主効** 變質發汗催吐

**用法** 五卍乃至一汚

○橙皮酒 ガイニム、アウランチアイ

右新鮮橙皮ヲ糖水ニ浸シテ泡

釀ヒシムル者是ナリ

○格兒失屈謨酒 グワイニム、コルシカイ

格兒失屈謨根 薄劑 設里酒 一

右壘ニ入レ密封シテ時々震盪



シ浸漬スルヲ七日濾過シテ滓ヲ去リ設里酒適宜ヲ加工全量一巴トナス

**主効** 丁幾ニ同シ

**用法** 十川乃至三十川

○鐵酒 ヱルリ

鐵線 ヲ一 設里酒 巴一

右壺ニ貯ヘ密封シテ時々震盪

シ浸漬三十日ニシテ濾過ス

**主効** 強壯

**用法** 一汚乃至四汚

○枸橼酸鉄酒 ヱルリ

枸酸鉄安母尼亞 十百六

橙皮酒 巴一



右壘ニ入レ溶解シ密封シテ時々震盪スルヲ三日ニシテ濾過ス

**用法** 一汚乃至四汚

○土根酒 ウイニム、イペカ

吐根 一搗碎 設里酒 一

右製法格兒失屈謨酒ニ同シ

**主効** 祛痰發汗催吐

**用法** 祛痰ニハ每眼五卍至四十

卍催吐ニハ三汚至六汚

○阿片酒 ウガイニム、ラピア、シ、シ、ラ

マインハ 一 阿片越幾斯 一 桂皮 一 丁香 各

碎七 一 設里酒 一 巴 一

五 一



右壺ニ入レ密封シテ時々震盪  
シ浸漬七日ニシテ濾過ス此液  
一汚中阿片越幾斯ヲ含ムテ殆  
ト二十二人

**主効** 丁幾ニ均シ點眼劑トシテ  
眼炎ニ稱用ス

**用法** 十ル乃至四十ル

○規尼涅酒 ヴァイニニニクイ

硫酸規尼涅 ニ 拘橐酸 三十

橙皮酒 一

右先ツ拘橐酸ヲ壺ニ入レ橙酒  
ヲ注テ溶解シ次ニ規尼涅ヲ加  
テ密封シ時々震盪スル一三日  
ニシテ濾過ス



**用法** 半汚乃至一汚

○大黃酒 ガロイニム、

大黃 粗末一 白桂 粗末六

設里酒 一

右製法格兒失屈謨酒ニ同シ

**主効** 健胃、強壯、緩下泄

**用法** 一汚乃至二汚

精劑之部 スピリチュス

○忽右滿鎮痛液 スピリタス、エーセリ

硫酸亞的兒 汚八 亞的兒油 汚三

濃酒 汚十六

右混和ス

**主効** 衝動、鎮痙、鎮痛

**用法** 半汚乃至二汚



○甘硝石精 スピリチス、エーセリス、

硝酸 三 硫酸 二 銅線 二

濃酒 適宜

右濃酒一巴ヲ取り徐々ニ硫酸

ヲ注テ攪和シ次ニ硝酸ニ汚半

ヲ加ヘルノ前ノ如ク此ヲ驗温

管ノ附タル列篤兒土ヲ採掘器ニ

貯ヘ銅線ヲ其内ニ入レ文火

十度ヨリ漸ク百七十五度ニ進

ム決テ百八十度ヲ越ムベカラ

スニ上セテ蒸餾シ十二汚ヲ得

ルニ及テ火ヲ下シ列篤兒土ヲ

放令シ殘餘ノ硝酸半汚ヲ加ヘ

再ヒ蒸餾スルノ前ノ如クシ全

液十五汚ヲ采ルニ此液ニ濃



手入ノ  
シ  
シ  
シ

酒二巴ヲ加ヘテ稀釋シ固封シ  
貯フ異重〇・八四五

**主効** 衝動、鎮痙、利尿、發汗

**用法** 半汚乃至二汚

○芳香礮砂精 スピリチュス、アマモニエ  
シ、アロマチキス

炭酸安母尼亞 ハ  
チ 礮砂精 四汚

肉荳蔻油 四汚 枸橼油 六汚

濃酒 六巴 水 三巴

右混合蒸餾シテ七巴ヲ取ル異  
重〇・八七〇

**主効** 衝動、發汗、制酸

**用法** 半汚乃至一汚

○惡臭安母尼亞精 スピリチュス、アマ  
モニエ、フウチ  
シユス

藥局方

六五

安母尼亞精



阿魏一 礶砂精二 濃酒適  
 右先ツ阿魏ヲ搗碎シ之ヲ蓋器  
 内ニ貯ヘ濃酒十五升ヲ注キ浸  
 漬スル一二十四時ニシテ蒸餾  
 シ精ヲ取り之ニ礶砂精ヲ混和  
 シ更ニ濃酒ヲ加テ全量一巴ト  
 ナス

**主効** 衝動、鎮痙

**用法** 半升乃至一升

○複方沙羅根精スピリチュス アルモ  
 ラシエー、コムポシ  
 ラス

沙羅根 橙皮細劉各 肉苳  
 薤搗碎 淡酒一 水二  
 右混和シ文火ニ上セ蒸餾シテ



一瓦ヲ取ル

**主効** 衝動

**用法** 一汚乃至二汚

○加耶布底精 スピリチュス、カダプエタイ

加耶布底油 一汚 濃酒 四十汚

右溶和ス

**用法** 半汚乃至一汚

○龍腦精 スピリチュス、カムゾレ

龍腦 一汚 濃酒 九汚

右溶和ス

**主効** 外布シテ衝動鎮痛ノ効アリ

リ

**用法** 十汎乃至三十汎

○呀囉防密精 スピリチュス、ホルマ

藥方

李

海軍軍醫



哥囉吩啞汚一 濃酒汚十九

右混和ス異重〇・八七一

**主効** 鎮瘧

**用法** 二十ml乃至六十ml

○杜松子精スピリタス、  
ジュニペライ

杜松子油汚一 濃酒汚四十

右混合ス

**主効** 衝動、利尿

**用法** 半汚乃至一汚

○刺賢埵兒精スピリタス、  
ラヂ

刺賢埵兒油汚一 濃酒汚四十

右混合ス

**主効** 衝動、驅風

**用法** 半汚乃至一汚



○薄荷精

スピリタス、メン  
ス、ピペリテ

薄荷油

濃酒

右混和ス

主効 衝動

用法 半汚乃至一汚

○肉荳蔻精

スピリタス、メ  
リスチケ

肉荳蔻油

濃酒

右混和ス

主効 香竈、衝動

用法 半汚乃至一汚

○民埵列里精

スピリタス、  
レリス、  
又、  
ライユル、  
ア

ムホニエ、  
アセチス

醋酸

炭酸安母尼亞

子三  
或ハ

適 餡水

二巴



右先ツ炭酸安母尼亞ヲ粉末ト  
 シ徐々ニ醋酸中ニ混和シ其液  
 全ク中和性トナルニ至テ水ヲ  
 加フ

**主効** 清涼發汗

**用法** ニ汚乃至六汚

○迷迭香精 マスピリチスロス

迷迭香油 汚 濃酒 九四汚十

右混和ス

**主効** 衝動

**用法** 一汚乃至二汚

○再縮酒精 スピリチス、レクタ  
 才カチス即濃酒

異重 ○・八三八

○稀薄酒精 スピリチス、  
 才イオル即淡酒



濃酒巴五 蒸餾水巴三  
右混合異重。・九二。

水劑之部 アクリエ

○龍腦水 アクリカム

龍腦精一 餾水十

右混和

**主効** 發汗

**用法** 一汚乃至二汚

○桂皮水 アクリクマイン



桂皮精一 餉水十

右混和

**主効** 驅風

**用法** 一汚乃至二汚

○苗香水 ア クワ フー  
キ ラ イ

苗香精一 餉水十

右混和

**主効** 衝動、驅風

**用法** 一汚乃至二汚

○薄荷水 ア ク リ メ ン セ ー  
ビ ペ ラ イ テ ー

薄荷精一 餉水十

右混和

**主効** 驅風

**用法** 一汚乃至二汚



○安母尼亞水 ライユール、アムニオン

強烈安母尼亞液 一、二 餾水 一、二

右混和固封シ貯フ異重。・九

五九

**生効** 衝動、祛痰、發汗

**用法** 十兀乃至三十兀

○砒石水 ライユール、アルセルニカラ、イスイヨール、アルセルニカラ

砒酸 炭酸刺篤亞斯 各八、十、各

複方刺賢堽兒丁幾 五 餾水 適宜

右砒酸及ヒ炭酸刺篤亞斯ヲ壘

ニ入レ餾水十汚ヲ注テ熱ヲ加

ヘ其液全ク透明トナルニ至テ

放令シ丁幾ヲ混和シ更ニ餾水

適宜ヲ加テ全量一巴トナス異



重一・〇・〇九

**主効** 變質

**用法** 二升乃至八升

○石灰水

カルサイスル

精製石灰 二 餾水 一

右石灰ヲ水ヲ盛りタル器内ニ

入レ密封シテ震盪スル一二三

分時ニノ靜定十二時間ヲ隔テ

其液全ク透明ナル之ヲ用ニ

ル毎ニ曲管ヲ用テ上清ヲ取ル

可シ

**主効** 制酸

**用法** 一汚乃至四汚

○過格魯兒鉄強液

ライコイル、ズル  
リール、メルコトラ



イジ、子  
ル、ル

鐵線

二

塩酸

十二

硝酸

九

餾水

八

右塩酸

八

二

餾水

ヲ

混シ

テ

釋シ

微熱

ヲ

加ヘ

鉄線

ヲ

其中ニ

溶解

セシ

テ

濾過

シ

テ

殘餘

酸

及ヒ

硝酸

ヲ

加ヘ

更ニ

烈火ニ

上セ

赤烟

ヲ

放タシ

ノ

重湯

煎

以テ

煎熬

シ

全液

十

分

ヲ

取ル

異

重

一

・

三

三

○過格魯兒鉄液

ヲ

イ

コ

ノ

五

分

過格魯兒鉄強液

五

分

ヲ

混

合

右混合

主効

收斂

強壯



用法 十川乃至三十川

○過硝酸鐵液 ライコル、エルリ、

鐵線 者 一 号 硝酸 四 号

餾水 適宜

右先ツ 餾水十六号ヲ以テ硝酸

ヲ稀淡シ 鉄線ヲ其中ニ溶解セ

シノ濾過シテ適宜ノ餾水ヲ加

工全量一巴半トナス

主効 收斂腐蝕強壯

用法 十川乃至四十川

○硝酸汞液 ライコル、ハイドラル

シライ、ナイトラチス、マ

水銀 四号 硝酸 五号 餾水 一号

右先ツ 硝酸ト 餾水ヲ混和シ水



銀ヲ其中ニ入レ熱ヲ加ヘス溶  
解セシメテ文火ニ上セ煮ル  
十五分時冷ルヲ待チ固封シ貯  
フ

**主効** 外用腐蝕

○沃實謨水 ライコール  
アイマダイ

沃實謨 二十 沃度剝篤亞斯 十三

右 蝕水 一

右 溶和

○醋酸莫兒比涅水 ライコールモル  
スィアセクス

醋酸莫兒比涅 四 稀醋酸 八

濃酒 二 蝕水 六

右 酸精及ヒ水ヲ混合シ莫兒比

涅ヲ溶和ス



主効 麻酔

用法 十ml乃至六十ml

○注入莫兒非涅水

醋酸莫兒非涅水四 餾水一

稀醋酸二 滴

右文火二上セ溶解シ四ml至十

五mlヲ注入此液十五ml中莫

兒非涅一氏ヲ含ム

○塩酸莫兒非涅水三イコ一ルモル

ラチ

塩酸莫兒非涅四 稀塩酸八

濃酒二 餾水六

右先ツ酸精及ヒ水ヲ混合シ莫

兒非涅ヲ溶和ス此液六十ml中



莫兒非涅ヲ含ム一殆ニ下半氏

**主効** 鎮靜、鎮痛、發汗

**用法** 十兀乃至六十兀

○鉛糖濃水

ライコール、ブルゴロム、バイン、ソブアセタチ、ス一名ゴ

ウラルド

越幾斯

酸化鉛末

即金密陀  
三々半

鉛糖

一巴戎  
ハ適宜

ハ適宜

右鉛糖及ヒ金密陀ニ餉水ヲ注

テ煮ル一小時其間絶へズ攪和

ニ濾過シテ放冷シ更ニ餉水ヲ

加テ全量二千ヲ取り固封シ

貯フ

○鉛糖薄水

ライヨール、フロム、バイン、ソブアセタチ、ス、ダイ、リ

ラ、ス、一、名、ゴ、ウ、ラ、ル、ド、水



鉛糖濃水

濃酒

各二

餾水

十九

右混合シ紙片ヲ以テ濾過シ固

封シテ貯フ

**主効**外用收斂清涼

○剥篤亞斯水

ライコール  
ポックスエール

炭酸剥篤亞斯十六精製石灰二十

餾水一

右炭酸剥篤亞斯ヲ鉄器ニ入レ

餾水ヲ注キ煮テ漸々石灰ヲ加

ヘ絶ヘス攪和シ又煮ル十分

時ニシテ火ヲ下シ其液全ク透

明ナルヲ待チ曲管ヲ以テ之ヲ

瑠璃壺ニ輸シ固封シテ貯ク異

重一〇五八



**主効** 齶蝕制酸利尿

**用法** 十五兀乃至六十兀

○砒酸曹達水 アルイコ一兀ソ一兀  
アルセニアチス

砒酸曹達 兀四 餾水 一兀

右溶和

**主効** 砒石水ニ拘ニケレ兀刺戟

性稍緩ナリ

**用法** 五兀乃至十兀

○斯篤里規尼水 レキナエ  
ルスト

斯篤里規尼 兀四 稀塩酸 兀六

濃酒 二兀 餾水 六兀

右餾水四兀ヲ取り稀塩酸ヲ注

テ斯篤里規尼ヲ混和ニ熱ヲ加

ヘ溶解セシメテ濃酒及レ殘餘



ノ餉水ヲ加フ此液十ℓ中斯篤  
里規尼ヲ含ムト殆ント十二公  
分一

**主効** 神經衝動

**用法** 五ℓ乃至十ℓ

○黄汞水 シロシヨ、ハイドラ  
イ、フライダラ

昇汞 ハ十八 石灰水 十

右混和

**主効** 微毒性潰瘍ニ外用ス

○黑汞水 シロシヨ、ハイドラ  
イ、ナイグラ

甘汞 三十分 石灰水 十

右混和

**主効** 同前

○硫灰水 ソルヒユレチユム、カルシキ  
ム、ライコイジユム



硫黄 等十五 石灰 等三十 水 八十

右文火ニ上セテ煮沸スル一時間瀘過シテ固封シ貯フ

**主効** 疥癬ニ外布ス

○硫肝水 ロシヨ、ポットアツサ、ソルヒユラタ

硫化剥篤亞斯 等五 水 一

右混和

**主効** 同前

○石炭酸水 カルシヨ、アシジウム、カルボリキウム

石炭酸 等一 リスリシ 等二 水 五

右先ツリスリシト水ヲ混合シ

次ニ石炭酸ヲ溶和ス

**主効** 外用防腐

○稀石炭酸水 ロシヨ、アシジウム、カルボリキウム、ダイリユキウム



石炭酸水 一 水 十

右混合

稀酸類

○稀醋酸

アシジユム、ダイリキユム、  
ダイリキユム、アセチキユム、

醋酸 一 餾水 七

右混合 異重 一・〇〇六

主効 清凉、收斂

用法 一 汚乃至二 汚

○稀塩酸

アシジユム、ハイドロコラ  
イキム、ダイリキユム



塩酸汚ハ 餾水宜適

右先ツ餾水十六汚ヲ以テ塩酸  
ヲ稀淡シ六十度ノ熱ニ下ルヲ  
待テ更ニ餾水ヲ加ヘ全量二十  
六汚半トナス異重一・〇五二

**主効** 強壯、防腐

**用法** 十兀乃至三十兀

○稀青酸

アシジユム、ハイドロシアニ  
キユム、ダイリユム

黄青酸剥篤亞斯ニ

硫酸汚一

餾水三十汚或ハ適宜

右青酸剥篤亞斯ヲ餾水十汚ニ

溶解シ硫酸預メ餾水四汚ヲ混  
シテ放冷シタル者

ヲ注キ之ヲ蒸餾器ニ貯ハ先少

採瀝器中ニ餾水八汚ヲ置キ徐

藥局

全

海軍軍醫



々ニ蒸餾シテ全液十七汚ヲ取  
リ更ニ餾水三汚ヲ混和シ異重  
〇・九九七

**主効** 鎮靜鎮痛

**用法** 二ml乃至八ml

○稀硝酸 アシシユム、ナイトライキム、  
ダイリキム  
硝酸 汚六 餾水 宜適

右先ツ餾水二十四汚ヲ取リテ  
硝酸ヲ稀釋シ六十度ノ熱ニ下  
ルヲ待テ適宜ニ餾水ヲ加ヘ全  
量三千一汚トナシ異重一・一  
〇一

**主効** 強壯變質

**用法** 十ml乃至三十ml



○稀硝酸

アミジム、ナイトロハイドロコプロライキム、ダイ

リム

硝酸

汚三

塩酸

汚四

餾水

汚五

十

右酸ヲ壘内ニ混合シ壘口ヲ緊

閉セス静定スルヲ二十四時ニ

シテ徐々ニ餾水ヲ混和シ固封

シ貯フ異重一・〇七四

**主効**皮膚及ヒ肝臓ニ刺戟ノ効

ヲ奏ス兼テ健胃ノ効アリ

**用法**五ル乃至二十ル

○稀磷酸

アシジム、アノス、アライキム、

結晶磷酸

汚一

硝酸

汚四

餾水

宜適

右磷酸ヲ餾水三汚ニ溶解シ次

ニ硝酸ヲ加ヘ煮テ硝酸ノ臭氣



全ク盡キ舍利別ノ稠トナルヲ  
度トス即此液ニ適宜ノ餾水ヲ  
加テ全量十二沼半ヲ取ル

**主効** 善ク燐酸石灰ヲ溶解スル  
力故ニ亞爾加里尿及ヒ動脈化  
骨等ニ稱用ス又清凉ノ飲料ト  
ナシテ熱病ニ卓効アリ

**用法** 十川乃至三十加

○稀硫酸 アシジュ、ソル、ライキム、

硫酸 七沼適宜

右餾水七十七沼ヲ以テ酸ヲ稀  
釋シ六十度ノ熱ニ下ルヲ待テ  
適宜ニ餾水ヲ加ヘ全量八十三  
沼半トナス異重一・〇九四



**主効** 收斂、強壯、清涼

**用法** 五川乃至三十川

○芳香硫酸

アシジウム、ソルエン、イギ、  
ム、アロマチキ、ヒ、一名エ  
ウ、キ、トリ、オル、ブ、

硫酸 濃酒

桂皮 粗末

乾薑 粗末

右徐々ニ硫酸ト濃酒ヲ混和シ

桂皮、乾薑ヲ加テ屢々震盪シ浸漬  
スルヲ七日ニシテ濾過ス異重

〇・九二七

**主効** 稀硫酸ニ均シ

**用法** 五川乃至三十川



