

MG
R711
11



3 2173 9236 8

閨房醫庫

上編【目錄】

第一章 閨房醫事

一・病房衛生……………	一
(一)病房設備……………	一
(二)病房空氣……………	二
(三)病房溫度……………	三
(四)病房清潔……………	四
(五)病房牀帳……………	四
二・病人衛生……………	五
(一)病人衣服……………	五
(二)病人飲食……………	六
(三)病人睡眠……………	七
(四)病人咳嗽……………	八

第二章 閨房醫理

一・男性生理……………	一六
(一)精液機能……………	一七
(二)睪丸機能……………	一七
(三)陰莖機能……………	一七
三・檢查體溫……………	一〇
(一)脈搏測定……………	一〇
(二)脈搏測定……………	一〇
(三)呼吸測定……………	一〇
三・病人看護……………	一〇
(一)檢查體溫……………	一〇
(二)脈搏測定……………	一〇
(三)呼吸測定……………	一〇
(五)病人嘔吐……………	九
(六)病人糞便……………	九
(七)病人汗液……………	九

(四)輸精機能……………	一七
(五)陰囊機能……………	一八
(六)其他機能……………	一八
二・女性生理……………	一九
(一)卵子機能……………	一九
(二)月經機能……………	一九
(三)子宮機能……………	一九
(四)陰戶機能……………	二〇
(五)卵管機能……………	二〇
三・分泌生理……………	二三
(一)甲狀分泌……………	二三
(1)粘液分泌……………	二三
(2)拔塞病腺……………	二三

閨房醫庫 上編 目錄

(二) 辜丸分泌……………三三

(1) 閹割分泌……………三三

(2) 刺戟分泌……………三四

(三) 卵巢分泌……………三四

(1) 青春分泌……………三四

(2) 更年期分泌……………三五

(四) 胎盤分泌……………三五

(1) 乳汁分泌……………三五

(2) 胃膜分泌……………三五

(3) 腸膜分泌……………三六

(4) 刺戟分泌……………三六

(5) 脾臟分泌……………三六

四・神經生理……………三六

(一) 觸覺神經……………三六

(二) 壓覺神經……………三六

(三) 辨覺神經……………三七

(四) 感覺神經……………三七

(五) 疼覺神經……………三七

第三章 閨房醫術

一・尿道洗滌……………三七

二・陰道洗滌……………三六

三・藥水灌腸……………三六

四・西藥應用……………三六

五・藥量計算……………三六

六・藥品貯藏……………三六

七・消毒常識……………三六

(一) 蒸氣消毒……………三六

(二) 煮沸消毒……………三六

(三) 日光消毒……………三六

(四) 火焰消毒……………三六

(五) 化學消毒……………三六

八・綳帶常識……………三六

(一) 橡皮膏帶……………三六

(二) 棉花紗帶……………三六

(三) 龜甲形帶……………三六

(四) 人字形帶……………三六

(五) 提乳峯帶……………三六

九・避妊醫術……………三六

(一) 避妊準備……………三六

(二) 避妊方法……………三六

(1) 自然避妊……………三七

(2) 藥物避妊……………三七

(3) 手術避妊……………三七

一〇・受胎醫術……………三六

(一) 不妊原因……………三六

(二) 子宮發炎……………三六

(三) 人工受胎……………三六

- (1) 科學種子……………四一
- (2) 受胎手術……………四三
- (3) 受胎準備……………四三

第四章 閨房醫方

- 一・乳劑處方……………四四
- (一) 乳劑種類……………四三
- (二) 乳劑配裝……………四三
- (三) 服用處方……………四四
- 二・丸劑處方……………四四
- (一) 丸劑種類……………四四
- (二) 丸劑配製……………四四
- (三) 服用醫方……………四四
- 三・錠劑醫方……………四五
- (一) 配製方法……………四五
- (二) 服用藥方……………四五

- 四・囊劑醫方……………四六
- (一) 配製方法……………四六
- (二) 服用藥方……………四六
- 五・液劑醫方……………四六
- (一) 配製方法……………四六
- (二) 服用藥方……………四六
- 六・布劑醫方……………四七
- (一) 配製方法……………四七
- (二) 服用藥方……………四七
- 七・卷劑醫方……………四七
- (一) 卷包種類……………四七
- (二) 配製方法……………四七
- (三) 服用藥房……………四六
- 八・膠劑醫方……………四六
- (一) 配製方法……………四六
- (二) 服用藥方……………四六

- 九・咳劑醫方……………四九
- (一) 配製方法……………四九
- (二) 服用藥方……………四九
- 一〇・腸劑醫方……………四九
- (一) 腸劑種類……………四九
- (二) 配製方法……………四九
- (三) 服用藥方……………四九
- 一一・栓劑醫方……………四九
- (一) 栓劑種類……………四九
- (二) 配製方法……………四九
- (三) 服用藥方……………四九
- 一二・花柳醫方……………五〇
- (一) 六〇六劑……………五〇
- (二) 新藥成份……………五〇
- (三) 藥劑比……………五一
- (四) 注射新法……………五一

第五章 閩房醫病

——醫男性病——

一三。水銀劑方……………	五	(1) 暗野視法……………	五	四。醫治遺精……………	六
(一) 水銀軟膏……………	五	(2) 染色新法……………	五	(一) 遺精原因……………	六
(二) 水銀注射……………	五	(3) 切斷新法……………	六	(二) 遺精醫法……………	六
(三) 水銀療法……………	五	(4) 移植新法……………	六	(三) 有夢遺精……………	六
一四。沃度劑方……………	五	(5) 驗血新法……………	六	(四) 早洩精液……………	六
一五。蒼鉛劑方……………	五	(6) 血清新法……………	六	五。醫治不育……………	七
		(7) 反應新法……………	六	(一) 精虫缺乏……………	七
		(8) 全體療法……………	六	(二) 先天遺傳……………	七
一。醫治梅毒……………	五	二。醫治橫痃……………	六	(三) 缺乏精虫……………	七
(一) 梅毒起源……………	五	(一) 橫痃症狀……………	六	(四) 精虫死滅……………	七
(二) 梅毒微菌……………	五	(二) 橫痃診斷……………	六	六。醫治陰萎……………	七
(三) 初期梅毒……………	六	(三) 橫痃療法……………	六	(一) 陰萎原因……………	七
(四) 二期梅毒……………	六	三。醫治下疳……………	六	(二) 陰萎種類……………	七
(五) 三期梅毒……………	六	(一) 軟性下疳……………	六	(三) 陰萎醫法……………	七
(六) 梅毒診療……………	六	(二) 硬性下疳……………	七	七。醫治淋病……………	七
		(三) 混合下疳……………	六	(一) 內服主藥……………	七

一〇・醫關節炎……………七
 (一) 淋毒性炎……………七
 (二) 自療醫法……………七

一一・醫女性病……………

一。月經酸痛……………七

(二) 局部療法……………七
 (三) 預防療法……………七
 (四) 注射療法……………七
 (五) 坐藥療法……………七

八・醫睪丸炎……………七
 (一) 預防方法……………七
 (二) 局部療法……………七
 (三) 其他療法……………七

九・醫膀胱炎……………七
 (一) 微菌檢查……………七
 (二) 自療醫法……………七

(一) 酸痛原因……………七
 (二) 閨房自療……………七

二・陰阜無毛……………七
 (一) 無毛原因……………七
 (二) 閨房自療……………七

三・陰戶瘙癢……………七
 (一) 瘙癢原因……………七
 (二) 閨房自療……………七

四・陰戶惡臭……………七
 (一) 惡臭原因……………七
 (二) 閨房自療……………七

五・外陰毒炎……………七
 (一) 發炎原因……………七
 (二) 閨房自療……………七

六・腔道發炎……………七
 (一) 發炎原因……………七

(二) 閨房自療……………七
 七・子宮前屈……………八〇
 (一) 前屈原因……………八〇
 (二) 閨房自療……………八〇

八・子宮後屈……………八〇
 (一) 後屈原因……………八〇
 (二) 閨房自療……………八〇

九・喇叭管炎……………八〇
 (一) 發炎原因……………八〇
 (二) 閨房自療……………八〇

一〇・卵巢囊腫……………八二
 (一) 囊腫原因……………八二
 (二) 閨房自療……………八二

一一・卵巢發炎……………八二
 (一) 發炎原因……………八二
 (二) 閨房自療……………八二

一一・子宮發炎	八二
(一)發炎原因	八二
(二)閨房自療	八二
一三・子宮生癌	八二
(一)生癌原因	八二
(二)閨房自療	八二
一四・子宮肉腫	八三
(一)肉腫原因	八三
(二)閨房自療	八三
一五・子宮筋腫	八三
(一)筋腫原因	八三
(二)閨房自療	八三
一六・子宮脫垂	八三
(一)脫垂原因	八四
(二)閨房自療	八四
一七・尿道淋炎	八四

(一)發炎原因	八四
(二)閨房自療	八四
一八・月經停止	八四
(一)停止原因	八四
(二)閨房自療	八四
一九・性交痙攣	八五
(一)痙攣原因	八五
(二)閨房自療	八五
二〇・性不感症	八五
(一)不感原因	八五
(二)閨房自療	八六
二一・妊娠生育	八六
(一)月經作用	八六
(二)妊娠機能	八七
(三)卵子機能	八七

閨房醫庫

下編【目錄】

第一章 閨房經病

一・經閉醫理……………	九八	二・痛經醫方……………	九六	四・瘀經醫方……………	九九
二・經閉醫方……………	九〇	三・熱經醫理……………	九七	一・逆經醫理……………	九九
三・經閉醫方……………	九二	二・熱經病象……………	九七	二・逆經病象……………	九九
四・化氣歌訣……………	九三	三・熱經醫方……………	九七	三・逆經醫法……………	九九
一・經前醫理……………	九四	四・熱經醫方……………	九七	四・逆經醫方……………	九九
二・經前醫法……………	九四	一・病經醫理……………	九六	一・漏經醫理……………	一〇〇
三・經前醫方……………	九五	二・病經病象……………	九六	二・漏經病象……………	一〇〇
一・經後醫理……………	九五	三・病經醫法……………	九六	三・漏經醫方……………	一〇〇
二・經後醫法……………	九五	四・病經醫方……………	九六	一・紫經醫理……………	一〇〇
三・經後醫方……………	九六	一・瘀經醫理……………	九六	二・紫經病象……………	一〇〇
一・痛經醫理……………	九六	二・瘀經病象……………	九六	三・紫經醫法……………	一〇〇
		三・瘀經醫法……………	九六	四・紫經醫方……………	一〇〇

一。黃經醫理	一〇二
二。黃經病象	一〇二
三。黃經醫法	一〇二
四。黃經醫方	一〇二
一。綠經醫理	一〇一
二。綠經病象	一〇一
三。綠經醫法	一〇一
四。綠經醫方	一〇一
一。氣經醫理	一〇二
二。氣經病象	一〇二
三。氣經醫法	一〇二
四。氣經醫方	一〇二
一。虛經醫理	一〇三
二。虛經病象	一〇三
三。虛經醫法	一〇三
四。虛經醫方	一〇三

第二章 閨房女病

一。催經醫理	一〇三
二。催經病象	一〇三
三。催經醫法	一〇三
四。催經醫方	一〇三
一。週經醫理	一〇三
二。週經病象	一〇三
三。週經醫法	一〇三
四。週經醫方	一〇三
一。血膨醫理	一〇四
二。血膨醫法	一〇四
三。血膨醫方	一〇四
一。血熱醫理	一〇五
二。血熱醫法	一〇五
三。血熱醫方	一〇五

一。血崩醫理	一〇五
二。血崩醫法	一〇五
三。血崩醫方	一〇六
四。血崩醫話	一〇七
一。便濁醫理	一〇八
二。便濁醫法	一〇八
三。便濁醫方	一〇八
一。白淫醫理	一〇九
二。白淫醫法	一〇九
三。白淫醫方	一〇九
一。淋病醫理	一一一
二。淋病醫法	一一一
三。淋病醫方	一一一
一。白帶醫理	一一二
二。白帶醫法	一一二
三。白帶醫方	一一三

(1) 泔水白帶	二二二
(2) 魚腦白帶	二二三
(3) 鼻涕白帶	二二四
(4) 脂膜白帶	二二四
一、水崩醫理	二二四
二、水崩醫方	二二五
一、赤淋醫理	二二五
二、赤淋醫法	二二五
三、赤淋醫方	二二五
一、赤帶醫理	二二五
二、赤帶醫方	二二五
一、臍氣醫理	二二五
二、臍氣醫方	二二五
一、浮腫醫理	二二六
二、浮腫醫法	二二六
三、浮腫醫方	二二六

第二章 閨房種子

一、實腫醫理	二二六
二、實腫醫方	二二六
一、痰毒醫理	二二六
二、痰毒醫方	二二七
一、種子醫理	二二七
二、男女成因	二二八
三、種子成長	二二九
四、種子醫方	二二九
五、種子戒期	二二九
一、妊娠脈法	二三三
(1) 男女脈法	二三三
(2) 雙胎脈法	二三三
(3) 死胎脈法	二三三
(4) 鬼胎脈法	二三三

一、妊娠胎形	二三三
(1) 一月胎形	二三三
(2) 二月醫法	二三三
(3) 二月胎形	二三三
(4) 二月醫法	二三三
(5) 三月胎形	二三三
(6) 三月醫法	二三三
(7) 四月胎形	二三三
(8) 四月醫法	二三三
(9) 五月胎形	二三三
(10) 五月醫法	二三三
(11) 六月胎形	二三三
(12) 六月醫法	二三三
(13) 七月胎形	二三三
(14) 七月醫法	二三三
(15) 八月胎形	二三三

(16) 八月醫法	一三六
(17) 九月胎形	一三七
(18) 九月醫法	一三五
(9) 十月胎形	一三七
(10) 十月醫法	一三七
一· 妊娠中風	一三七
二· 妊娠傷寒	一三六
三· 妊娠跌蹠	一三六
四· 妊娠腹痛	一三六
五· 妊娠子腫	一三六
六· 妊娠漏胎	一三六
七· 妊娠不孕	一三三

第四章 閩房生產

三· 臨產須知	一三四
四· 臨產醫方	一三五
(1) 兒捧母心	一三五
(2) 胞衣不下	一三五
(3) 胞水放乾	一三五
(4) 交骨不開	一三五
一· 小產醫理	一三五
二· 小產醫方	一三五
一· 難產歌訣	一三六
二· 難產醫法	一三六
三· 縮胎醫法	一三六
四· 難產醫方	一三六
五· 難產十論	一四〇
(1) 正產醫論	一四〇
(2) 傷產醫論	一四〇
(3) 催產醫論	一四〇

第五章 閩房產病

(4) 凍產醫論	一四二
(5) 熱產醫論	一四二
(6) 橫產醫論	一四二
(7) 倒產醫論	一四二
(8) 倒產醫論	一四二
(9) 碍產醫論	一四二
(10) 坐產醫論	一四二
一· 胎前痢疾	一四二
二· 胎前白帶	一四二
三· 胎前赤帶	一四二
四· 胎前中風	一四二
五· 胎前咽痛	一四二
六· 胎前發暈	一四二
七· 胎前謊語	一四二

八・胎前便閉……………	一四〇
九・胎前頭風……………	一四〇
一〇・胎前嘔吐……………	一四〇
一一・胎前胎氣……………	一四〇
一二・胎前咳嗽……………	一四〇
一三・胎前吐血……………	一四〇
一四・胎前傷血……………	一四〇
一五・胎前總論……………	一四〇
一・產後總論……………	一四一
二・產後醫理……………	一四一
三・產後醫法……………	一四一
一・產後敗血……………	一四一
二・產後狂喘……………	一四一
三・產後虛勞……………	一四一
四・產後虛渴……………	一四一
五・產後浮腫……………	一四一

六・產後風痲……………	一四二
七・產後怔忡……………	一四二
八・產後中風……………	一四二
九・產後陰虛……………	一四二
一〇・產後瘧疾……………	一四二
一一・產後泄瀉……………	一四二
一二・產後心痛……………	一四二
一三・產後咳嗽……………	一四二
一四・產後腳氣……………	一四二
一五・產後頭痛……………	一四二
一六・產後疹痛……………	一四二
一七・產後兩損……………	一四二
一八・產後寒熱……………	一四二
一九・產後脚痛……………	一四二
二〇・產後風濕……………	一四二

第六章 閨房百病

(上)中醫部門	
一・美容醫法……………	一四三
(1)澤面醫方……………	一四三
(2)細膚醫方……………	一四三
(3)媚容醫方……………	一四三
(4)面黥醫方……………	一四三
(5)口臭醫方……………	一四三
(6)玉容醫方……………	一四三
(7)雀斑醫方……………	一四三
(8)香身醫方……………	一四三
(9)擦面醫方……………	一四三
(10)面瘡醫方……………	一四三
(11)潤顏醫方……………	一四三
(12)癍痕醫方……………	一四三
(13)粗皮醫方……………	一四三
(14)化白醫方……………	一四三

(15) 身濯醫方	一六三
(16) 脂膚醫方	一六三
二・神祕醫法	一六三
(1) 脫眉醫方	一六三
(2) 脫髮醫方	一六四
(3) 赤鼻醫方	一六四
(4) 黃髮醫方	一六四
(5) 白癩醫方	一六四
(6) 赤疵醫方	一六四
(7) 汗癩醫方	一六四
(8) 齒疎醫方	一六四
(9) 液臭醫方	一六五
三・隱病醫法	一六五
(1) 腦漏醫方	一六五
(2) 鷄眼醫方	一六五
(3) 乳癬醫方	一六五

(4) 腳拆醫方	一六五
(5) 綳裂醫方	一六五
(6) 鵝瘋醫方	一六六
(7) 脫白醫方	一六六
(8) 口臭醫方	一六六
(9) 脫骨醫方	一六六
(10) 脫痲醫方	一六六
(11) 內瘡醫方	一六六
(12) 交腸醫方	一六六
四・女病醫法	一六六
(1) 無乳醫方	一六七
(2) 陰脫醫方	一六七
(3) 玉門醫方	一六六
(4) 陰癢醫方	一六六
(5) 下血醫方	一六六
(6) 尿胞醫方	一六六

第七章 閨房百病

(7) 陰疝醫方	一六九
(8) 陰吹醫方	一六九
(9) 絕育醫方	一六九
(10) 胞衣醫方	一七〇
(下) 西醫部門	
一・美容醫法	一七〇
(1) 美髮醫法	一七〇
(2) 減瘦醫法	一七〇
(3) 長身醫法	一七〇
(4) 面胞醫法	一七〇
(5) 雀斑醫法	一七〇
(6) 點痣醫法	一七〇
(7) 汗斑醫法	一七〇
(8) 濃眉醫法	一七〇

(9) 白髮醫法	一七三
二・房事醫法	一七四
(1) 見色流精	一七四
(2) 包莖狹小	一七五
(3) 陰莖短小	一七四
(4) 手淫醫法	一七四
(5) 遺精醫法	一七五
(6) 尿管醫法	一七五
(7) 贅肉醫法	一七六
(8) 遺尿醫法	一七五
(9) 陰囊醫法	一七六
(10) 角虱醫法	一七六
三・隱病醫法	一七六
(1) 白經醫法	一七六
(2) 黑經醫法	一七六
(3) 出血醫法	一七七

(4) 宮翻醫法	一七七
(5) 宮癌醫法	一七七
(6) 陰瘤醫法	一七六
(7) 陰核醫法	一七六
(8) 陰瘡醫法	一七六
(9) 陰腫醫法	一七六
(10) 陰癢醫法	一七六
(11) 陰癢醫法	一七六
四・產婦醫法	一七六
(1) 不孕醫法	一七六
(2) 宮垂醫法	一八〇
(3) 陰裂醫法	一八〇
(4) 翻花醫法	一八〇
(5) 銷陰醫法	一八〇
(6) 陰毛醫法	一八二
(7) 陰物醫法	一八二

(8) 陰疹醫法	一八一
五・精神醫法	一八一
(1) 失眠醫法	一八一
(2) 嗜眠醫法	一八二
(3) 睡軋醫法	一八二
(4) 脂漏醫法	一八二
(5) 傷風醫法	一八三
(6) 失音醫法	一八三
(7) 嘔吐醫法	一八三
(8) 胃痛醫法	一八三
(9) 煙毒醫法	一八三
(10) 醜酒醫法	一八四
(11) 狐臭醫法	一八四
(12) 多屁醫法	一八五
(13) 口臭醫法	一八五
(14) 齒痛醫法	一八五

(15) 潔齒醫法	一九六
(16) 眼病醫法	一九六
(17) 火傷醫法	一九七
六・雜病醫法	
(1) 濕疹醫法	一九七
(2) 手汗醫法	一九九
(3) 脚汗醫法	一九九
(4) 脚癬醫法	一九九
(5) 足繭醫法	一九九
(6) 面斑醫法	一九〇
(7) 頑癬醫法	一九〇
(8) 疥癬醫法	一九〇
(9) 脫肛醫法	一九一
(10) 便血醫法	一九一
(11) 血尿醫法	一九二
(12) 紅斑醫法	一九二

(13) 癩癧醫法	一九二
(14) 癩瘋醫法	一九三
(15) 疝氣醫法	一九三
(16) 痔瘡醫法	一九四
(17) 瘻痔醫法	一九四

閨房醫庫

浦左王定九新編

第一章 閨房醫事

國人對於衛生。素欠講求。西法醫院。尙未得全信任。國家社會的衛生設施也。沒普遍。所以有病送醫院。除通都大邑。特殊階級（中上家庭）外。其他都不知醫院爲何物。只知道有病自己家庭內延醫調理。所以「閨房即病房」。這是國人的傳統習慣。因此編者現把家庭應具日常醫事的常識。介紹諸者。使就閨房式的病房。變通改良。酌量應用。

一，病房衛生

（一）病室設備 國人的病房。既是閨房。所以房間的位置。如環境許可。以朝南爲最佳。朝

東或朝西北的稍次。地方第一求高燥。不可潮濕。最忌接近廁所和廚房。防穢氣侵入。以致引起病人的不快。又不宜靠近大門。走廊客室……等。因爲這幾處都是行人出入。會客嘈雜之所。騷擾病人。有碍安靜。病室的光線充足。更是必要條件。但房間寬敞。尤妙。至於大家富戶。公館門第。建有花園等的。那麼非但空氣清新。光線充足。並且景色優美。病人處身此種環境中。更得悅目遣神之樂了。

中國人的閨房裏。普遍情形。雜物亂堆。床底屋角。好似舊貨攤。展覽會。竹頭木屑。破瓶碎甕。破布爛紙……兼收並蓄。豬欄牛欄式的閨房。試想於衛生上有多麼的妨礙啦。

所以閨房之內。不宜多置放東西。尤當夫妻二人兒女等某一人患病居家治療。充作病房的時候。更須把不需要的東西搬出去。揀無用東西棄去。日後有用東西。存放別室。因為房內東西。多便難保清潔了。

病床宜置在房間的當中央。一端靠牆。不如靠室板乾燥。床旁陳列茶几一張。靠背椅數事。置放藥水瓶。熱水瓶。茶杯……等病人應用另件。

數房內的燈光。現代電學發達。除內地窮鄉僻鎮。和雖有電燈設備。而克儉守舊人家。房內沒有電燈。仍借重煤油燈。與燭台。油盞外。其他都有電燈了。電泡光線。不可過於明亮。夜間又不宜關熄。通常以十六支光。四麻紗罩。或綠色紙套。最合度。搖曳的洋燭。十製。燭都不相宜。又燈光須從病人頭部後方射出。不可在眼前正對了他。因為直射入眼。非但眼睛感光太強。有頭暈目眩。流弊。

並且妨礙他的安眠哩。

閨房臨時改變的病房。當然不能像醫院病房般。必要時禁止望病人入內。這裏親友鄰舍前來。都須延擱。不過病室以靜為第一條件。故可對人聲明。走路宜輕——皮鞋聲最忌——談話亦宜抑。抵切戒與病人作不需要浮言浪語。使病人徒費精神。而引起煩鬧。兒童在可能範圍內。禁阻進內。

凡患急性眼病。腦膜炎。頭痛。破傷風。興奮性……等症。倒很適合閨房式的病房了。故不求明亮。而須略暗。因感光一強。便有刺戟神經。興奮精神。亢進病機之虞。

(二)病室空氣 閨房病室中的空氣。也該相當研究與注意的。因為閨房既成了病房。比較平時的氣氛。大不相同了。病人排出的有害炭酸氣。和病人排泄物揮發產生的臭氣。倘蘊積在

室內而不使流通掉換。非但不潔有礙衛生病體。並且窒悶欲死呵。

吾國舊社會習俗。閨房取暗室主義。據云。一暗可藏金。亮則露財。一閨房空氣。混濁萬分。陌生人闖進去。終覺異味撲鼻。現幸新式家庭。破除此種迷信了。

閨房內混濁空氣。怎樣掉換呢。譬如天氣溫暖。便釋無風處。把窗戶打開。稍有風吹。慎重防範起見。可加窗簾。天氣寒冷時候。那使朝夜開窗一次（每次自五分鐘至十分鐘）當這剎那之間。該注意病人的體溫。而加蓋棉被衣服。倘觀察這天的風力過於強烈。直接吹襲。恐病人感受。那麼可用間接法。啓鄰室之窗。而開通聯之門。或置放摺屏在床前。使作擋風。這樣寒風既不致侵及病人。實得掉換空氣之益了。

掉換空氣時。也不可任意爲之。凡含有灰塵

沙泥。都不適當。故當任風飄起。鄰舍與本宅舉炊。工廠煤烟。室外有人灑掃……等等。都該稍待。不可掉換。又因病室注重空氣。而須換氣。故燃點洋燭。洋油爐。吸紙烟……等。足使空氣混濁者。亦在禁止之例。

（三）病室溫度 閨房病室。除注意空氣流通外。對於溫度方面。也該有相當保持。夏季清涼。冬季溫暖。普通以華氏六十二三度（攝氏十七度上下）爲最宜。過冷過熱。都該設法調節。務使病者感到舒服。與適合病體才好。

家庭之間。防冷設備。而有水汀的。非豪富階級。與在醫院之內。終居絕對少數吧。所以冬季病室內。生火爐。增加溫度。惟於爐上。該置水壺。使蒸發水蒸氣。調和乾燥。病人不致因此。而誘發鼻加答兒。頭痛眩暈等。又舊式的暖爐。炭盆。因燃燒時。易生一種。養化炭氣。往往使空氣污濁。極不衛生。

須禁用爲要。無論何種火盆。都不可近在病牀頭邊。以防病人腦充血。頭腦不快等感覺。

夏天氣候炎熱。宜把閨房內的外窗戶全部開放。以流通清新空氣。並在房中噴散冷水。或置冰塊在面盆床下牀側均可。

閨房成了病房。吾人欲知牠的溫度。可懸掛寒暑表在壁上。注意牠的升降溫度數。

閨房中。在有病人住居時。溫度的高低。可斟酌病情而加減。譬如發寒熱的室溫。在華氏五十八度左右。血虛病和老年小兒非熱性病。室溫提高至華氏六十五度至七十度。又病人的體溫。每有日輕夜重的現象。室溫也該隨之而變動。譬如白天華氏六十三度。到了夜間。便該六十度上下。室溫過高。妨礙病人的睡眠。

(四) 病室清潔 吾人日常寢處的閨房。固宜清潔。一旦改成病房的時候。更該注意清潔。

因爲病房而污穢了。不但有礙衛生。並足影響疾病的治療。所以病室清潔。天經地義。必須注重。每日掃除。至少一次。灑水輕掃。免灰塵的飛揚。輕症病人可以移動的。灑掃時。暫往別室。俟收拾清潔後。再搬回重症臥床不起的。那便用紗屏障。格使灰塵不致揚入他的鼻孔。

閨房內一切器皿。該每日揩拭。病人用具。能浸入消毒藥水的消毒。不能浸入藥水的。用潔淨濕布揩抹。

傳染病人。閨房自療。對於清潔格外重要。病痊以後。方可掃除。再用「福爾買林」加熱而蒸發之。使蒸氣密佈全室。獲消毒之效。

(五) 病室床帳 閨房裏的臥床。白木從松木紅木至銅鐵鋼……隨各家的經濟貧富而定。床的優劣。普通住戶房內的白木床。最不合衛生。臭蟲跳蚤。鑽營作大本營。醫院病床。一律採

鐵製的。係因鐵的無縫可鑽。根絕臭蟲跳蚤盤踞呵。

床墊普通用棕的或籐的。這也便利臭蟲跳蚤寄生。以網絲墊最合標準。中下家庭財力上不能辦到。那可在棕籐床墊外包一白布套。這樣以後也可使臭蟲等無法橫行哪。

被單以白色爲尙。被頭棉胎。須輕而軟。不宜過重。被套枕套。白色最好。污穢容易發現。普通被褥四五日洗滌一次。但病人嘔吐洩瀉的。便須立即撤換。

枕宜寬緊合度。枕心木棉與綠豆壳俱佳。內質稻草硬實使頭部不快。最不適宜。枕頭外覆毛巾或白布。以便隨時更洗。

現代家庭臥床趨尙新型。閨房之內。都市方面。十九半牀沒有帳子了。惟內地房間舊式木床與新式銅鐵床。仍張帳子。因爲內地蚊蟲繁多。舊

式房子。簷塵又多。非用帳子不可呵。床帳布料。以麻布與紗羅有網眼通空氣者爲佳。

二、病人衛生

(一) 病人衣服 病人衣服。因臥病在床。都只襯衣一襲而已。襯衣以白色柔軟寬大爲宜。依照醫院習慣。有一定格式之病衣。並視病況而定何時更洗。吾國國醫主張。病人的襯衣。自病起至病愈。何論如何汗濕淋漓積垢。膩決不更換。據說另換乾淨新衣。雖合衛生原則。但是有受風寒後病危險。所以神奇的保守着污衣不換。這問題至今傳習如此哩。

不過西醫最重衛生。對於病人衣衫的更換。特別勤忙。至多隔二三天。如遇發熱病人出多量。大汗與吐瀉膿汁血液糞便。即立即更換。以重衛生。

爲病人換衣時。動作不可粗暴。以迅速細心。

爲原則。對於外科病者。某部有創傷的。更宜小心。翼翼。換衣確須受風。故可閉窗戶。冷天並設火爐。預備換上的新衣褲。先在熱水壺上烘暖。或晒太陽中片刻。總之。和病人換衣。避免新刺激。便對

(二)病人飲食。一個人患了病。胃納雖然不佳。但終須進些飲食。好滋養延續生命。故病人飲食之適當與否。實與疾病有至密切的關係。而爲閨房看護病人者。必不可少的常識。病人食物。終以富於滋養。缺乏刺激性爲合格。不過有時也須視疾病的種類而有異。茲擇常用食物分別說明如下。

(一)牛乳。牛乳爲公認唯一滋養豐富的食品。因爲液質。易於消化。故最宜病人食用。不過牛乳以新鮮爲佳。隔天的與未經煮沸的。都不可飲。又牛乳含脂肪及乳糖極多。凡腸炎便瀉。糖尿病人。禁飲。

(二)米粥。米飯煮成的粥。爲吾國一般社會病人的飲食品。雖比牛乳缺少滋養。但亦便利消化。不過糖尿病時忌服。

(三)米湯。這是一種粥糜。比粥更薄。應用重症病人或急性熱性病恢復初期。最爲相宜。

(四)麥片。藕粉。消化力與稀粥類似。也宜應用。

(五)鷄汁。牛肉汁。這二種動物液質。菁華。通用於各種慢性虛弱症。病後調補。不過牛肉汁一次不可多食。因有礙胃的脹胞呵。

(六)肉類。吾國舊醫對內外症。主張戒葷。十分嚴格。病人十九吃素。甚至油炒東西亦不許。很少准許吃肉。西醫便非如此。凡慢性虛弱病人。糖尿病和病後。都准少量服食。不過須煮得極爛。使易消化。胃腸炎。赤痢。肥胖病。痛風。腎石。疝。膀胱結石等。雖是西醫也絕對禁食。

(七) 蛋類 鷄蛋鴨蛋鵝蛋烏蛋……等最富蛋白質。尤以鷄蛋最好。凡慢性虛弱症。病後滋補等。多可應有。不過鷄卵不宜煮得太熟。反宜生食或半熟食。因為蛋白質凝固了。後便有妨害消化了。

(八) 菜類 「菜根香」的菜。實與吾人養命之源。牠雖為肉食者鄙視。但有很多種有益衛生。像蘿蔔（中醫指蘿蔔。剋性。服藥者戒吃。豈知蘿蔔與人參同一植物類。外皮刮去熟食。並無剋性。可以服食也。）青菜。菠菜。油菜。大菜。塔菜。芹菜……冬瓜。這種菜。蔬便秘。炎症病人服之有益。壞血病人多吃。更有特效。不過韭菜。韭菜。辣椒。大蒜。生薑。葱。筍……等有剋性的菜類。則戒食。

(九) 水果 牛梨。蘋菓。香蕉。菊子……等果品。凡患各種胃腸病。與赤痢時。禁食。便秘。炎症。壞血病人。則不須禁忌。

(一〇) 酒類 病人吃酒。終居少數。因酒富刺激性。病者不宜哪。痛瘋。肥胖病。糖尿病。胃出血。肺出血。臟腺症。癲癇。脊髓癆。腦充血。動脈硬化。症。動脈瘤。黃疸。心悸。亢進。氣管支病。胃腸病。肋膜炎。及腹膜炎。眼病。各種炎症……嚴格禁酒。不過各種急性熱性病。心臟衰弱。虛脫。失神。大出血。後和慢性病。恢復期。因酒類除興奮作用外。兼有退熱效力。故可酌量少飲。

(一一) 咖啡濃茶 通常食品。一般社會嗜好。興奮性特強。所以神經性病。耳鳴。不眠。心悸。亢進。精神與奮等病人。有時可與酒類般酌量少服。

(一二) 飲料 病人最易口乾。普通給以白開水。不過腎臟炎。腹水。滲出性肋膜炎。遺尿症等。也須節制供飲。

(三) 病人睡眠 吾人生活。睡眠幾佔畢

生三份之一。因工作以後，要求疲倦恢復，非睡眠不能補償。健康之人，日常睡眠以八小時為度。病人的睡眠時間，便較平時延長。所以病人能夠睡覺，儘量讓他安睡充足，不可去驚擾。

患病之人，很多失眠，輾轉反側，終夜不寐。便能驟瞓睡去，但偶一刺激，便又驚醒了。病人又易做惡夢，發熱時，且有詭語，切齒，胸內苦悶，咳嗽，疼痛，而屢屢醒覺，失眠症經過長久，能使身心疲勞，增進病人的衰弱，而遭不良結果。

所以家人閨房養病看護他的人，對於病者睡眠須代留意，研究他不眠原因，設法禁止。閨房與鄰室內，高聲言語，阻止親友不甚親密的省視，與不必要的言語，酒類濃茶咖啡等刺激性東西，不可給飲。閨房以外人事上，得失切勿告訴他，免喜怒而致不寐。凡便秘病患者，當夜該謀排洩，皮膚有搔癢的，可用塗布劑，衣服有發汗濕潤的，則

更換乾燥臥床不舒的，務使安定。

熱性病不眠時，可施濕布摩擦，或行低溫浴。心臟病和喘息，肋膜炎，腹水等病人，安臥極感不舒，那便於背部墊置枕頭，或睡於榻椅，精神過度興奮，或精神病持久不眠病者，可持續溫浴，並用鎮靜劑或催眠劑，劇痛或劇咳而致不眠的，酌用鎮痛劑或鎮咳劑。

重症病人在睡眠時間中，面色突然慘白，或發生其他現象時，家人趕急請醫上門急救，倘發現與不眠相反現象，嗜眠和昏睡，嗜眠病人多頭部創傷，腦病，高度熱性病，昏睡狀態，每見於重病末期，大失血，腦病中毒……等。

(四)病人咳嗽 「東亞病夫」的吾國士風，積弱患肺癆的統計，佔世界第一高位。社交場中，年青仕女，已像老人般咳嗽連連了，從此種現象可知咳嗽的普遍性與重要性了。

咳嗽終屬病象。同一咳嗽。分乾咳濕咳兩種。乾咳全無咯痰。或量甚少。濕咳便有痰了。又咳嗽有持續性。斷絕性。反覆連咳而併發嘔吐的。

凡衰弱病人咳嗽時。須一手支托他的前額。再拿一手持痰盂。盛其口下。使吐痰便利。咳嗽過劇時。用手擊他背部。並施高枕。取半臥的位置。小兒百日咳發作時。宜掖持病兒。使前胸略低。促痰涎容易流出。病人的痰。必須吐入痰盂。不可嚥下。盂內灌入石炭酸水等消毒藥。閨房中痰盂能加蓋。免微菌飛揚空中。更合衛生。再病人咳嗽次數。咳時狀況。以及咯痰形狀。色澤等。都須隨時注意。告訴醫生。作診病時的參攷。

(五)病人嘔吐 嘔吐。病人的常態。凡胃腸內食物。逆行食道。吐出口外的。謂之嘔吐。所吐的東西。都爲未消化的食物。混有粘液。膽汁。或血液。濃汁等。甚至有糞便。從口中吐出。不過這種畢

竟少見啊。

病人嘔吐的時候。應速寬解其衣帶。使容易吐出。嘔吐發作時。看護他的人。可支持他的頭部。使勿過於低垂。以防吐物。竄入鼻內。或喉頭。誘發不快。與咳嗽。嘔吐停止後。可予清水漱口。吐出的東西。都是腐敗性。有傳染病菌。故宜注意消毒。

(六)病人糞便 病人的大小便。很關重要。茲分別述之。

(一)大便 病人大便的顏色。有泥土色。淡黃色。米泔色。赤色。赤褐色。或類赤色。綠色。更有軟便。硬便。水樣便。混有粘液。血液。濃汁。寄生蟲。結石。或其他異物。這都是患病者症狀的具體表示。醫生從這上面。可以觀察與覆驗。所以新式家庭。延西醫診治者。可將病人大便。保存在瓷器馬桶。或瓶盂中呵。

(二)小便 病人的尿質。也多異態。有增

有減。有混有濁。水樣淡黃色。濃厚黃赤色。暗黃色。黃褐色。乳白色。等等。臭氣也不一致。所含成份。有粘液。血液。蛋白。糖份。血球。尿圓錐。寄生虫。細菌。：等。小便變化頗多。在診斷上。很是重要。凡小便的回數。尿量。色澤。臭氣。：等等。

病人小便又多。講究有排泄完全停止的。這名無尿症。往往繼起。癱瘓。昏睡。嘔吐。等尿毒症狀。危險異常。

(七)病人汗液 發汗為病者普遍狀態。牠的原因。不外溫熱刺激。身體勞動。神經機能亢進。或服發汗藥。和解汗藥。病勢轉換。肺結核。虛脫現象等。

疾病出汗有的只有局部。有的發現全身。對於病體有益。或有害。須視病疾的性質。而不一。汗的多少。汗的冷熱。發汗的久暫。發汗的部位。發汗時皮膚的色澤。以及有否發疥等。續見。都須一一

注意到。

凡重病病人。發現他前額冷汗。粘稠覺滋。並且皮膚厥冷的。這為虛脫瀕死的預兆。呵。

三，病人看護

(一)檢查體溫 體溫升降。與疾病大有關係。康健者的平常體溫。平均為攝氏三十七度。生理上一日間稍有變更。午前二時至六時最低。午後五時至八時最高。不過牠的相差。終不出一度左右。即三十六度至三十七度之間。(華氏九十六度八分乃至九十八度六分)這名平溫。倘超過平溫三十七度以上。或下降至三十六度以下。這便是疾病現象了。

熱的分類有如下例。

(1) 虛脫熱 攝氏三十六度以下。

(2) 正常熱(平溫) 攝氏三十六度至三十七度。

(3) 次熱 (亞性次熱) 攝氏三十七度半至三十八度

(4) 輕熱 攝氏三十八度至三十八度

半
(5) 中熱 攝氏三十八度半至二十九度半

(6) 著熱 攝氏三十九度半至四〇度

(7) 高熱 攝氏四十度至四十一度以上。

(8) 劇熱 (過熱) 攝氏四二度。

檢查體溫須用檢溫器 (寒熱表) 這器具

通常應用者別有三種

(一) 攝氏檢溫器 德日派醫生最為常用。

(二) 華氏檢溫器 英美派醫生多用之。

(三) 列氏檢溫器 法派醫生尚有應用。

三氏檢溫器的溫度比較製表如下。

列氏	攝氏	華氏
28, 00度	85, 00度	95, 00度
29, 00度	86, 25度	97, 25度
30, 00度	87, 50度	99, 50度
31, 00度	88, 75度	101, 75度
32, 00度	40, 00度	104, 0度
33, 00度	41, 25度	106, 25度
34, 00度	42, 50度	108, 50度

再將三氏溫度改算公式併述如下。

攝氏改算列氏公式	$(攝氏度 \times 4) \div 5 = 列氏度$
列氏改算攝氏公式	$(列氏度 \times 5) \div 4 = 攝氏度$
攝氏改算華氏公式	$(攝氏度 \times 9) \div 5 + 32 = 華氏度$
列氏改算華氏公式	$(列氏度 \times 9) \div 4 + 32 = 華氏度$
華氏改算攝氏公式	$(華氏度 - 32) \times 5 \div 9 = 攝氏度$
華氏改算列氏公式	$(華氏度 - 32) \times 4 \div 9 = 列氏度$

檢溫器應用方法 先把右手拇指和第二指執住檢溫器上端。用力向下振動手腕。使器內的水銀柱降至三十六度以下。然後插入腋窩內。使病人固定上膊於胸側。如腋窩有汗。須先以乾布拭乾。或改插在舌下亦可。倘不省人事的重症。患者或小兒等。不又插入肛門或腔內以檢查。行此法時。須以脂肪或油類塗布在檢溫器的尖端表面。不過直腸和陰道裏的溫度比較腋窩測得的溫度。常高出五度。

檢溫器插入病體檢查。不論放在何部。須經過二分至十分鐘。平均照五分鐘為最適宜。因過短往往檢知不確。過長也能使病人厭惡。

檢溫次數。視熱的高低。病的輕重而異。輕症通常朝夕二回。便是午前七時至九時。午後四時至六時各一次。重症便須二三時檢查一次。

熱有數種。熱現在分類說明如下。

(一) 稽留性熱型。便是熱度的日差(拿朝夕測溫所得的度相比較)在一度以下。而熱

狀常在一定的高度的。

(二) 弛張性熱型 卽熱度之日差在一度以上者。這型中更有日差達三度以上。特稱曰「消耗熱」。

(三) 間歇性熱型 卽熱度之日差最低點在攝氏三七度以下。最高點在四〇度以上。熱退與健體沒有兩樣。熱來的時候。往往驟然寒慄。又有先以惡寒戰慄起。而後體溫驟然暴騰。稽留數日。旋即發汗。復降至常溫。約間斷三四日。又復發作如初。這名「回歸熱」。

熱性病的經過狀態也可分爲下列數種。

(一) 各種熱性病的開始。往往合併輕度惡寒而緩徐增進。或合併戰慄而迅速增進。達於極期後。便是熱度最盛時期。持續一定日期。再漸漸降低。便是退期。

(二) 退熱時或則三四日緩緩退盡。或

散。或則兼發大汗而於一二日迅速退盡。(分利)更有經過多日而始退盡。(引長分利)或則迅速退後。繼又重復發熱。而後始真正退盡者。(僞分利)又有於分利之前。體溫前進不省人事。而發昏厥譫語者。(分利前擾症)。

(三) 熱性病經過中有體溫忽然減少。(下體溫)卽降至常溫以下。皮膚蒼白。脈搏微弱。而呈虛脫現象。

(二) 脈搏測定 「切脈」爲吾國醫祖傳的古法。因脈與心臟的搏動呼應相等。所以從測定的脈數。可以推知心臟動作的強弱。和血行的遲的健康者。脈搏除在身體運動。精神興奮與食物之後。溫熱刺戟等。暫時變遷外。其餘時間都正常。不亂有一定的強度。(中等度彈力)及形態。並且牠的跳數也有一定。老年和小兒比較。成年人多。女子也較男子多。身體短的人也較身

體長的人速。口中與早晨亦較夜間多。脈搏的風
妙確為吾國藥診斷上偉大發明。現代西醫也承
認在診病時採用作旁證了。這和有的國藥兼知
西法的診察病人熱度時也採用西醫的檢溫器
相同。彼此融會貫通救世的醫術。本沒有國界的
呵。

茲將健康無病人的每分鐘脈搏數與年齡
差別列表如下

- 出生嬰兒 每分鐘約一四〇至一三五次
- (睡眠時九〇至一〇〇次)
- 二歲 約一二五次至一一五次
- 三歲八歲約一〇〇次至九〇次
- 九歲至十六歲 約九〇次至七六次或七
〇次。
- 十六歲至六〇歲 約七六次至七〇次。
- 六十歲以上 約八五至八〇次。

上列為健康無病人的脈搏數。倘生疾病時。
那麼脈搏數或增速。或減少。大概與體溫的升降
成正比例。便是發熱愈高。脈搏愈速。不過。也有少
數疾病不隨體溫而變化。這全在看護病人的和
醫生們的臨機應變了。

測定脈搏的方法。通常以左手食指及中指
(或中指)輕貼橈骨動脈上。(腕節內面稍近
拇指之側)再以右手持表預備觀察。然後細辨
病人脈搏每分鐘的跳數。(即至數)有無紊亂
不整。(便是調節)對於按脈時抵抗指頭之力
如何。(即脈性質)。

病脈可分下列數種。

- (一)數脈(即速脈)及遲脈。速脈一分
鐘的至數比較平常增多。遲脈便是一分鐘脈的
至數比較平常減少。
- (二)大脈及小脈。大脈的脈搏很覺宏

大小脈的脈搏很覺細小。

(二)硬脈及軟脈。硬脈便是把指頭切脈時能耐重按而覺有抵抗。軟脈便是切脈時不耐重按。

(四)絲狀脈。便是切脈時覺得極細小的。

(五)輕震脈。便是脈小輕微而顯著無力。(小脈只能震動管壁)

(六)不感脈。便是脈來細小至不能切知。(以上四五六三種脈象都於心力高度衰弱時見之)

(七)間斷脈(可稱間歇脈)。便是脈搏持續到一定數之後忽覺缺一次搏動。

(八)交換脈。便是切脈時觸知脈搏忽大忽小。

(九)二連脈 三連脈 四連脈 便是

脈搏二至 三至 四至之後間歇一定時間再反覆發現(以上第八九種都在代償機能有障礙之心臟疾患時見之)

(三)呼吸測定。「人生一股氣。佛靈一股香。」足見吾們人生在世只不過一口氣罷了。氣這東西比不得脈。牠無影無踪怎樣捉摸呢。不明生理與醫藥智識者更莫明氣的機能哩。

人類賴肋骨與橫膈膜的運動。遂有胸廓張縮的動作。因之肺臟得換氣作用。從肺臟排出穢濁的空氣。這便是「呼息」。吸入新鮮空氣於肺臟。謂之「吸息」。合併這二種。便是一般人所說的「呼吸」。

健康成人的呼吸數。在安靜狀態時。每分鐘約自十六至十八次。婦女約自十八至二十次。初生兒平均四十四次。幼兒約二十六次。

一呼吸間的脈搏。平均為四至。(便是呼吸

一回脈搏四次。不過因年齡長幼的差異。外界氣候的冷熱體位變更。勞働疾走精神與意識作用。生理上亦有變化。又男子靜呼吸時。多用橫隔膜。因腹壁的動作特顯著。故有腹式呼吸之稱。婦女多用肋骨。因胸壁的動作也顯著。故有胸呼吸之稱。不過在深強呼吸時。兩性頗難區分呵。

怎樣測定呼吸呢。拿一手掌輕按在病人胸廓上。他手執表。計其每分鐘時呼吸的次數。不過呼吸由意志得增減其數。一回的檢查恐不確實。最好反覆計測之。倘其數量略近一致。才可認為真呼吸數。

病態呼吸的性質。有淺表。疾速。徐緩。不整。衝突狀等。

呼吸異常中。最宜注意的。為 Cheyne-Stoke 氏呼吸現象。便是呼吸運動有一定的休息。每隔十五秒或三十秒或一分鐘後的第一次呼

吸。由淺而深。終呈著明呼吸困難狀態。又復漸次變為微弱而停止。休息一定時間。又復反覆如初。多見於重篤心臟病。腦病。尿毒症。嗎啡中毒等。

此外呃逆也。為呼吸運動的變態。健康人有一時自然而發。並無顯著原因。倘於疾病時發見較常久的呃逆。則為體力耗竭不良之兆。多於腦力猝衰。出血過多各種重症將虛脫時見之。

測疾病人呼吸。與檢驗體溫脈搏有同樣重要。每日至少施行二次。如有見發 Cheyne-Stoke 氏呼吸現象。或多次呃逆。便須延醫診治。勿誤呵。

第二章 閨房醫理

一、男性生理

男性生殖英文名 (Männliche Fortpflanzung) 包括精液。睪丸。輸精管。精囊……等等。現在分述如下。

(一) 精液機能 成年壯健的正常男子。便有排出精液的可能性了。精液為男子營生。殖作用的重要物質。主要成份除精虫外。尚有睪丸精囊。攝護腺。以及尿道球腺等分泌物混入。精液為濃厚不透明的乳白色。因有精虫存在的緣故。倘精虫數著明減少時。便呈水樣透明。又精液中有一種含有窒素物質。便是精液素 (Sperm)。

(二) 所以有特別奇異的臭氣。通常男女交媾時排出的精液量。平均約為六西西。其中約有精虫百萬個以上。試想這樣累累的精虫。肉眼所能瞧見的。祇黏液數滴而已。不知顯微鏡下。却有如此驚人的估計了。不過房事過度與患生殖器官病時。都能使精液與精虫的數量減少。健全的精虫。在顯微鏡下檢查。有如小蝌蚪形狀。具有活潑的蛇行狀運動。進行的速度。每分間約三至四種。所以交媾時極容易深達女性的子宮。而與卵子結合。

完成其生殖作用。通常排卵時期。大都在月經停止以後。不過也有在月經前或月經中間排出的。

(二) 睪丸機能 睪丸分左右兩個。在醫學上名正副睪丸 (1) 正睪丸的功用。為製造精虫的器具。由無數細精管構成。精虫便附着於細精管壁的原細胞變化而成。(2) 副睪丸的功用。牠能分泌一種透明液體。名曰「副睪丸分泌液」。為精液中重要的一個成份。

(三) 陰莖機能 男子的陰莖。是主精液射入女子腔內。牠好似在做媒介。不過陰莖在這遞送工作時。必須興奮勃起。故牠所以能勃然而起。乃充血現象。因為陰莖是海綿體的無數神經交織而成。具有很強的彈力。海綿體中。又附有無數毛細血管。所以一受刺激。血液便易多量下注。而發生膨大堅實的現象了。

(四) 輸精機能 男子輸精工具有二。

1) 輸精管。牠是精液到精囊裏面儲存着。完全靠牠的機能而輸送。很是重要呵。(2) 精囊。牠是儲存精液的大本營。從睪丸製造精液。都由輸精管運到睪丸貯存。準備男女交媾時放射。所以睪丸和精囊的關係。宛似肝臟的和膽囊。二位一體。手臂相連。同一功用哩。

(五) 陰囊機能。陰囊是睪丸的外圍。一重綑皮。看似無關重要。豈知牠直接有保護睪丸的功用。間接有保護精虫的機能。因為睪丸漲縮。可以調節溫度。譬如氣候炎熱。或體溫亢進時。陰囊便行膨脹。使其面積放大。得由皮膚放散高溫。如氣候寒冷。或接觸冷水時。陰囊更行縮小。使其溫度不易減退。陰囊具有這種作用。才使精虫能夠照常蘊伏。睪丸內不斷產生。免受外間影響。而妨礙牠的發育。

(六) 其他機能。男子下體除上述生殖

外。當有攝護腺與尿道球腺。這二種腺在生殖上也大有功用。先說攝護腺吧。英文名 (Amwendung der Prostata) 牠能分泌一種乳白色的稀薄液體。名曰「攝護腺分泌液」。當射精的時候。排出來混入精液。可使精虫活動旺盛。因為攝護分泌液呈鹼性反應。精虫適宜在鹼性中生存。反在這液體中。靈活繁殖。這真是男子生理一大奇蹟。

再說尿道球腺吧。這種人生新發明的腺。歐洲新醫學上專門名詞曰 (Arwendung der G. ureseirison) 牠的分泌液粘稠。也帶有鹼性。主要功用。為常久保持尿道的鹼性。使精虫經過尿道。不致發生障礙。因為尿道中有尿的排泄。牠殘遺刺留的尿液。呈鹼性反應。尿道球腺的分泌液。便担任這中和工作。使鹼性保持着。這也是人生有機化學的奧妙哩。

二，女性生理

女構生殖構造繁複不下於男子。牠的神祕更較男子來得與妙。什麼卵子。月經。卵巢。子宮。陰道……等等。都為女性性機能生殖特徵。醫學上大有研究。現在這裏先作扼要的說明。使一般閱房自療的人。明瞭性生殖的原理哪。

(一) 卵子機能 卵子為女子的一種精仔。與男性精虫恰恰相等。凡康健美的娘兒。到了花信年華(十四五歲)淑女懷春的那時。便有卵子排出。牠的形狀。為一種富於原形質的球形。大細胞直徑約〇・二。耗外被卵胞薄膜。內含卵黃。胚胎。胚斑……等等成份。這中間尤以卵黃最重要。因為他是胎兒發育的養料。發育未成熟的卵子。在卵巢中約有三至四萬。自懷春期起。每四週間。祇有成熟一個。排出在卵外。巢以備和精虫結合。統計女子自十五歲至四十五歲。或五十歲約

有排卵四百個。其餘在卵巢內無為而終。

(二) 月經機能 娘兒懷春期中。除了排卵機能外。還有定期性的月經來潮。月經發生的原因。全為卵巢內有一種刺戟素存在。在作祟的關係。便是新名詞所謂內分泌腺在起作用。而致生理大變態。同時又為生殖器成熟的表徵。月經出自子宮。當牠來潮時。子宮裏的粘膜先行膨脹。充血。毛細血管因壓迫而破裂。遂致血液流出在外面。而月經。

有的說。月經初潮時。子宮粘膜表面變為粗糙。能使卵子附着穩固。對於成胎上也有助力。通常女子月經初期。平均為十四歲。零八月。或十月。但這不能一定做標準。亦有因風土人種氣候。生活各方的不同。而生差異。大概月經每回來潮的週期。最正常為四週一次。便是月經的第一天。到次回月經的第一天。其間相隔二十八日哪。

不過二十八日指吾國女子生理習慣。與健康姑娘的正常狀態。很多因身子強弱。先天遺傳。智慧愚魯所居氣候——等關係。有早見四五日。與遲見二三日。的這種過早與過遲。名曰「不調」。非健美之證。而爲有病之兆了。所以女子的月經。不啻女性有病與無病的真顏色哩。

行經的時日。也有差異。長短各人不同。普通三日至五天。但也有只一二天。或多至七八天。停止紅潮的。至於月經的液量。依健全者。正規估計。每次約自九十至二百西西。大概行經日期長的。其量則多。日期短的。其量則少。又經來時。這女子作劇烈運動的。亦能增多月經量。

月經的顏色。紅爲本位。鮮豔紅潤。才是健美無病之徵。倘月經或褐色與黑色。那便病象了。婦女生理上月經停止期。吾國女子通常四十至五十歲而斷經。沒有月信了。故定四十五歲爲「更

年期」。因女子到了這時候。卵巢子宮次第衰退。甚至生殖器也萎縮。不慣行人事了。

(三)子宮機能 子宮爲女子們受種生胎的大本營。生殖細胞結合後。便假這場所。漸漸發育長大胎兒。所以子宮真是人種之宮。民族蕃殖生命腺。佔生理上最重要位置。而爲女人生殖器偉大的器管哩。

(四)陰戶機能 女子的生殖器與男子構造。根本不同。總名「陰戶」。的確這是一道神祕的陰戶。哪陰戶部份。詳細分晰計。(一)陰道。這是排泄月經。分娩胎兒。以及和男性交媾。接觸的要所。牠於周圍成自括約肌。富於彈力。性所以能充分擴張。(二)陰阜。陰戶之上有隆起的一塊厚肉。便是陰阜。生理機構上好似多餘的。沒有什麼功用。只增加男女相交時一種快感(?)。或說牠的上面叢生陰毛。故又爲預防交接時。男

女腹壁摩擦損傷。(三)陰唇。這是陰戶之外。陰道的入口。哪也在生理上沒有顯著的功用。只左右相合。使陰道變為狹小。又是增進兩性性交的美感。(四)陰核。這樣的一粒圓錐體。海綿質小東西。最是神祕。因牠上面佈滿神經。小血管。所以感覺特別敏銳。與男性陰莖性質類同。只大小之比罷了。

(五)卵管機能。女子除前述卵子外。尚有卵巢。輸卵管兩種。娘兒們的有卵巢。猶如男子的有睪丸。牠具有產生卵子的功用。

輸卵管又同男子輸精管。牠也是把卵巢內排出的成熟卵子。由這器官送入子宮。同時卵巢所生的各液體也賴此管而排出於體外哩。

三分泌生理

吾人身體由無數細胞互相集合。而構成各種組織與器官。再由各種器官與組織。而各營固

有的效用。這中間因有特殊物質存在。所以能收全體聯絡與調和之效。高等動物一切思想行動。都由中樞主宰的腦神經指揮各部工作。這種偉大神奇的效力。完全仰賴慎密佈滿週身的神經纖維担任傳達。

不過這種傳達靈敏的神經纖維。還不能認牠有單獨負擔身體各部聯絡調和的能力。因為除了牠外。尚有一種化學作用的體內產物相輔而行。這是什麼東西呢。那便所謂刺戟素和醒覺素啊。

什麼叫刺戟素呢。牠是從腺狀腺所產生。直接向身體內各部血液中輸送。並非如唾液。膽汁。腺液。腸液。等向外分泌。所以現代醫學家發明了牠的偉大。訂新名詞曰「內分泌」。

凡有內分泌作用的腺器。大都沒有排泄器。而富於血管。故又稱曰無管腺。或血管腺。又內分

泌產生的刺戟素。對他臟器能呈一定的作用。或促進。或制止。或對新陳代謝的有害產物而發揮她解毒的特效。所以一旦內分泌發生異常。便引起種種的病狀來了。

內分泌在現代醫學上是一個偉大的發明。法國生理學家柏龍石卡氏(Bowen, Sc. Pva.)當一八八九年。他曾發表一奇妙的實驗。拿動物睪丸的壓榨液。注射在自己體皮下。便覺食慾亢進。身體增強。腦力活潑。性慾旺盛……一切現象。返老還童啦。

柏龍石卡實驗發表的種種成效。未免太誇張了些。不過由他的發明。近世各國醫學博士。都認內分泌的確有意想不到之效力。

一 甲狀分泌

甲狀腺位在喉際氣管前面的兩側。在前只認牠是這器官為保持頸部美觀的東西。又有人

認牠為能分泌淋巴液。滑澤喉頭使聲音轉強。其後拉以那特(Raynard)康配爾(Cooper)藍柏(Rapp)諸醫學博士。把犬類甲狀腺行摘出試驗。結果發重篤症狀立斃。從此知道甲狀腺關係生命十二萬分重要。動物沒有了牠。竟至不能生存。

人類甲狀腺分泌異常時發生的疾患。可分別為下面二種。

(一) 粘液分泌。這是甲狀腺分泌不足或缺乏時所起。皮膚浮腫。蒼白。乾燥。口唇肥厚。舌也腫大。顏面往往因浮腫而短大。呈一種特有的醜態。精神障礙。記憶薄弱。常存無慾觀念。甚至言語動作也漸緩慢而不靈敏了。此外體力疲憊。汗和皮脂的分泌都減少。毛髮指甲也容易脫落。幼年人患這種病症。往往骨骼不發育而異常短小。骨殖發生遲緩。智慧發育不良。生殖器雖已到達

成年期了。但仍短小如兒童。不能和人事哪。

(一) 拔塞病腺。本病因為拔塞多氏 (Moriva Basedow) 發明。所以醫學上稱拔塞多氏病。是甲狀腺機能亢進的一種病。患女子發生比較佔多數。很顯明的徵象有四。

(1) 心悸亢進。每分鐘脈搏一百二十乃至一百四十止。偶然有達二百次的。

(2) 狀腺腫大。這是發生在上述心悸亢進以後。甲狀腺全部增大而柔軟。富於血液。

(3) 眼球外突。這有輕重。有的兩眼一齊外突。有的只一隻眼。瞬目運動減少。試向下方注視。則上眼臉不見下垂。

(4) 手與全身。都有震顫現象。此外體溫昇騰。頭痛眩暈。精神不安。多汗。羸瘦。煩渴。嘔吐。下痢等等。

〔註〕甲狀腺疾患時。須用甲狀腺製劑治療之。現有替雷烏依丁 (Thyrothinn) 替雷烏依兌西丁 (Thyrolicetin) 二種西藥。治之。很見效驗。

二 睪丸分泌

(一) 閹割分泌。睪丸為男性生殖器中最重要的器官。除產生精蟲外。又產生一種刺激素。能使身體達到男性固有的發育。男子兒童時代。睪丸沒有發育完全。所以通常沒有性慾。身體構造。除生殖器外。也和女性沒有什麼差異。迨至十六歲左右。男性特有的發育進行極快。這時春機勃發。「君子好逑」。色情亢進。便呈現出種種特徵來了。毛髮生長旺盛。鬍鬚陰毛。都次第發生。喉頭增大。變音。骨骼也立變為壯健了。倘在幼年時代。把兩側的睪丸閹割。那麼身體精神上。發育都生障礙。到了春情發動期。既沒

有男性特有的變化。反是肌肉弛緩。體力薄弱。脂肪極多。毛髮稀少。喉頭發育停止。聲帶並不延長。因之聲調仍和小兒無異。性慾毫不衝動。感覺遲鈍。思想愚魯。總之一切男性。都消失到干干淨淨。吾國古代皇宮裏的太監。去勢防止淫亂。近似女性。便因缺乏了睪丸內分泌腺呵。

(二) 刺戟分泌。倘把兩側的睪丸保存。而結紮輸精管。其不能排出精蟲。雖無異於去勢。但是尚不致有上述的變態。換句話說。便是雖不能射精。而性慾則完全不變。身體也毫無變化。因為輸精管被結紮後。只精蟲的出路給他閉塞了。睪丸裏面的分泌作用。仍無絲毫影響。

倍而推而特氏 (clairhead) 曾經拿動物試驗過。把雄雞睪丸摘出。見其雞冠。頸下肉。雞鳴等都減退。斯忒拉乃黑氏 (Steinach) 又把雄鼠雌鼠各一頭。更換其生殖細胞。從雄鼠摘取睪

丸移植於雌鼠。又從雌鼠摘取卵巢移植於雄鼠。那麼雄鼠的狀態現為雌化。雌鼠的狀態現為雄化。

由動物的實地試驗。經醫學博士斷定。睪丸之中。實含有發揮男性特徵之一種刺戟素哩。

(註) 男性生殖器官。應用睪丸分泌製劑頗多。計賜保命 (Spermin) 天福麟 (Testiphorin) 安樂根 (Erygon) 斯保質丁 (Spermatin))

三 卵巢分泌

(一) 青春分泌。卵巢為女子生殖器中最重要的器官。除排卵作用外。尚有一種刺戟素的內分泌。譬如沒有到春情發動期的少女。倘摘出她兩側的卵巢。那麼以後肉體和精神上。都不現女性特有的體質了。

便是體格剛強。但缺乏處女溫柔美。性情粗

魯性慾也。竟灰然。無動於中。若待她到了十六歲小姑娘懷春的那時。把她兩側的卵巢摘出。那麼生殖器立即衰退。月經也停止了。性慾消失。乳汁分泌減弱。這種婦女。若以卵巢製劑治之。其一切變態便可漸漸回復。

(二) 更年期分泌 婦女們平均四十五歲至五十歲為更年期。便是月經停止。子宮及其他生殖器官衰退。性慾薄弱。致他原因。也不外卵巢刺戟素產生減退故。

在動物試驗上。幼稚的雌性動物。倘把牠兩側卵巢都摘出。那麼成長後。便無交尾慾。再把卵巢移植在這動物的體內。那麼生殖器又完復發育了。與普通雌性動物無異。哪。

從上面種種觀察。可知女子卵巢中。也同男子睪丸。亦有一種刺戟分泌。才能表現女性固有的特徵。

治療婦女有碍性機能發育的卵巢製劑。計有安婦靈 (Ophorin) 安婦能 (Qnon) 必吾懷兒 (Royal) 溫敦注射液 (Vaden) 安度卵巢精 (Erde Qarina)

四 胎盤分泌

(一) 乳汁分泌 婦女懷娠的時候。乳房雖漸膨大。但在未分娩前。並不發生乳汁。必須待胎兒產出了後。才有乳汁分泌。很是旺盛。這一種生理上的妙用。實屬於胎盤與胎兒內分泌在作用。因為睪丸。卵巢 (父母親的) 兩種刺戟素。輸入母體血液中。對於乳汁的分泌。都有抑制的機能。一旦胎盤與胎兒脫離時。則母體中抑制乳汁分泌的刺戟素。缺乏。乳汁便不得不向外間流出了。

(二) 胃膜分泌 據歐特克司氏 (Edkins) 的研究。胃粘膜炎除分泌胃液外。幽門部的

粘膜。還產生一種刺戟素。有促進胃液的能力。

(三)腸膜分泌 據司塔麟 (Starling) 和百禮司 (Payson) 兩醫學博士研究結果發表。小腸起首部的黏膜。分泌出一種刺戟素。有促進腸液分泌能力。又能促進膽汁。唾液。及腸液分泌。

(四)刺戟分泌 攝護腺除必泌粘稠的攝護液外。或謂尚有一種刺戟素能促進等丸發育與精蟲產生。

(五)脾臟分泌 脾臟除產生血球外。或謂亦有刺戟素產出。與消化機能頗有關係。若將脾臟摘除。那麼消化力減退。便會發現多食多養症狀。

四。神經生理

皮膚因有神經分佈所以能感粗、滑、軟、硬、輕、重。觸覺。後乳頭之中。便有觸細胞。觸小體。巴氏小

體等觸覺器存在。這觸覺器為知覺神經的末梢器。所以一遇刺戟便能傳導刺戟於腦而生觸覺。現把各種觸覺分別說明如下。

一。觸覺神經

神經這種感覺。只能感知物體的接觸。而其銳鈍程度。那却隨身體部份而異。例如指尖。舌尖。為最銳敏。額。腕。背。足。等。便較鈍了。究其原因。便知因知覺神經末梢分佈的疎密。常隨部位不同。哪

二。壓覺神經

這是皮膚有辨別壓迫輕重程度的機能。不過這種感覺的強弱。常隨表皮的厚薄而不一。例如前額。頰部。手背等處。縱使輕微重量。也能感覺。足臚等部。則非重量壓迫顯著。往往不易感覺。又壓感須暫時持續。便是初回壓迫與次回壓迫。宜有間隔的時間。否則必誤認為同一的感覺。例如急旋鈍齒車輪。指尖觸於齒輪。每有誤認為齒輪

皮有齒的哩。

三 辨覺神經

這是辨知物體接觸部位的感覺。也有種種定則。觸覺神經末梢分佈較多的皮膚。最為敏銳。運動較大的皮膚部位。也很敏銳。四肢橫方向。較縱方向為敏。屈側較伸側為敏。此外液體溫潤皮膚。可使部位感覺一時增進。貧血和鬱血時。能使部位感覺發生遲鈍。生理上幼兒的部位感覺。很其薄弱。所以被蚊蚤刺螫後。往往難斷其確實之位置。

四 感覺神經

這是辨別物質冷熱的感覺。也如抵觸感覺。看身體部份如何而分等差。大抵舌尖。眼臉。口唇。頭部等處。最為敏銳。此外物體容易傳熱與否。面積大小等等。與這感覺也都有關係。譬如觸到同一溫度的鐵片或木片。往往覺前熱而後冷。又如

在洗浴時。拿手足入水。不覺過冷或過熱。倘以臀部入水。便覺溫度變更了。

五 痛覺神經

觸覺依刺戟的種類中。樞必起一定的感覺。不過他的刺戟。常有限度。不可越出範圍。倘刺戟過弱。便不足以起感覺。倘刺戟過強。便轉變為疼痛的感覺了。又有謂痛覺在觸覺器中。也有一部分。末屬主宰的痛覺最著之部。為口鼻唇舌指頭。外陰部肛門部骨膜等處。背部臀部的痛覺。便比較來得輕微了。

第三章 閨房醫術

一 尿渣洗滌

男子尿道洗滌法。這應用於患白濁的人。洗滌用器械。為一玻璃製管。管端尖形。可以插入尿道。管後有一柄。可以抽吸藥水。與普通節筒相仿。

洗滌時。先用溫水洗清器具。再令病人小便。然後以嘴管吸收藥水。向上壓出數滴。排除器內的空氣。又令病人仰臥。把褲子拉下。施術的人拿左手拇小二指上下。壓開尿道口。以右手執洗滌器。入管尖於尿道中。拿拇指徐徐把藥水壓入。等藥水注盡後。取出洗滌器。再像前引藥水注入之。這樣三四回後。便告畢事。這種普通硼酸水洗滌的方。法倘用收斂殺菌藥。則宜設法將藥水暫留在內。此時拔出洗滌器。便趕速把拇小兩指壓迫牛殖器龜頭。並將陰莖向上。使藥液不能外流。約隔五至十分鐘。然後放去手指。任藥液盡以棉花拭乾。之。通常收斂藥注入。祇須一管已足。不必像硼酸水數回洗進了。

二 陰道洗滌

這應用於白濁白帶的女性。洗滌用的器械有兩種。一種和男子用尿道洗滌器同。不過管的

一端呈圓形而已。這在注射少量藥液時用之。另一種係用圓筒式的灌腸器。不過橡皮端更換一個有密孔圓形嘴管而已。這於注射多量藥液時用之。前種用法。同男子洗滌器。上節已有說明。後一種用法。令病人仰臥在手術台上。(家庭之間沒有手術台的。臥床亦可改用。)舉起兩腳。置大膿盤或搪瓷扁便桶於臀下。高懸洗滌器。入注之藥水筒中。施術的人便把左手的拇小兩指張開。開陽戶口。以右手執嘴管。插入陰戶中。乃啓上開關。藥水即流入陰戶之中。待藥水洗盡後。即取出嘴管。普通陰戶的洗滌藥。多用硼酸水昇汞水。與過猛酸鉀液等。

三 藥水灌腸

灌腸法在閨房中亦有應用。茲述如下。
灌腸者。以藥水灌入腸中之謂也。目的有三。
一為通便。二為洗滌腸部。或消毒。三為咽頭病。

人不能飲食時。灌入牛乳。雞卵等滋養品。以供營養而延續生命。

灌腸器也有兩種。一種爲橡皮製成的器具。器的中央有一球。其形長圓兩端尖銳。各連橡皮管一條。管的一端附有金屬製的吸水小件。他端裝有黑角的嘴管（插入肛門的）。使用的時候。先把吸水端投入盛有藥水的盆中。拿嘴管端塗凡士林。少許輕輕插入肛門。旋即用手握中球。一寬一放。使藥液逐漸吸入器中。而射進腸內。直至灌水完畢爲止。另有一種灌腸器。形如大口圓筒。這筒有玻璃製。有洋磁製的。筒的下端連有長橡皮帶。帶的下端也裝有黑角製的嘴管。用時將藥水傾入筒中。將筒高掛。一面將嘴管照上法塗油。類插入肛門。牠的嘴管之上有閉關裝置。旋轉開關。藥液便射出流入腸中。

吾人不論應用何種灌腸器。灌時都須令病

人一時忍耐。開大其口。直至便意窘迫。不可忍時。方任其如廁（灌腸後。病人便意非常窘迫。不及久待。故須預備便桶在旁）。再灌腸時。病人身體的位置。須令其偏左而臥。臀部向外。施術者以右手執灌腸器。灌注藥水。嘴管須與肛門並行插入。勿稍偏倚。也勿過淺過深。又灌腸藥水。以加溫至攝氏之二十五度左右。不冷亦不熱爲宜。注入少許藥物於腸內時。通常不用灌腸器。多用玻璃水節筒替代。

四 西藥應用

現代家庭。使用西藥之處頗多。所以應用西藥常識。亦多爲閨房之內所當知。茲擇最簡單易行者。分別說明如下。

西藥配藥時所用器械。都有一定。稱藥粉和一切固形藥。都須天秤。量少的時候。改用手續。配藥水和藥油等。可用量杯。其他零星用具。大致相

同。現在介紹如下。

(A) 天秤 天秤為調劑中最重要的用品。其量可稱自〇・一起至一〇〇瓦的藥物。另有比較大的亦有。

(B) 手秤 手秤可稱〇・一至一瓦的藥物。也可稱一・〇至一〇瓦的。

(C) 量杯 量杯有大小兩種。自一西西起至一〇西西。也有自五西西起至二百西西的。(英美派醫生另用盎斯制的量杯。其量杯上都刻有劃度。配藥時用量。便以此為標準。)

(D) 熱湯斗(又名量湯器) 普通有磁製與金屬製二種。供熱湯溶解藥品之用。

(E) 滴瓶 這為配製劇烈藥物時計算滴數的瓶。用時先把瓶塞拔去。把藥液放入少許。然後再裝上瓶塞。把手執在倒斜方向。藥液便能自瓶口徐徐滴下。

(F) 乳鉢(又名研鉢) 有磁製與玻璃製兩種。用他研碎粗大藥物或研和藥粉之用。

(G) 藥匙 這是挹取粉狀藥物用的。有銅製牛角製兩種。倘遇金屬易起變化的藥品(如昇汞、甘汞、硝酸銀等)則以牛角製為宜。

(H) 藥篋(又名軟膏刀) 形如洋刀。用以調製軟膏硬膏或其他膏類。

(I) 漏斗 有大中小三種。更有搪瓷製與玻璃製之別。凡欲傾倒藥液於小口瓶時用之。以防藥液溢出之虞。

五 藥量計算

藥品的分量曰藥量。有重量與容量的分別。重量在天秤上或手稱上稱得。容量用量杯量得。吾國西醫。傳統計算容量。都用法國格蘭姆制度(即瓦公分)。原文為(Gram)。拿法國之方劑制計算容量(即西西。耗公撮)。原文為(

Cadiacentimeter) 縮寫(C.C.)以十進爲進退。頗爲簡便。譬如方中寫明1.0即係一瓦或一西。西0.1即係一瓦十分之一。或一西西十分之一。10.0即係十瓦或十西。西不論固體或液質。處方所開分量同一寫法。

又西醫處方上有寫一刀尖形的。約合二西。西一小兒匙者。約合八西。西一食匙的。約合四西。西。

六 藥品貯藏

藥品貯藏。在家庭中固談不到配製藥櫥。閱房之內。因陋就簡。利用各種瓶管儲藏。不過西藥是一種化學有機體。有兩大犯忌。

例如硝酸銀遇了日光。便變黑而化。分。甘汞遇光。便變黃而成大毒的東西。杏仁水。山道年。過鹽化。鐵液。過錳酸加里等藥。遇光。也不免常有改變。藥品變化。非但減少治病效力。且有惹起意外。

危險。所以上述藥品。都直裝在有色的瓶內(藍色或褐色)並放暗處。

哥羅方。以脫酒精樟腦薄荷精等藥品。倘遇空氣化散極速。所以都宜裝入玻璃瓶中。緊塞緊閉。以免泄氣。此外如毛地黃。規那皮末。大黃末。麥角膏等等。忌熱。忌濕。一受潮氣。往往霉壞。不能應用。所以上述藥品。更直置放乾燥地方呵。

七 消毒常識

(一) 蒸氣消毒 蒸氣消毒。應用高熱原理。殺菌的一種。高熱有乾熱與溫熱之分。溫熱便是指水蒸氣而言。牠的殺菌力。遠勝於乾熱。因蒸氣的傳染力極強。多數病原菌。平均六〇度的溫熱。約半小時到一小時便死去。百度的溫熱。無芽胞菌。遇之無不立即死亡。外科上應用之。綑帶。紗布。棉花。縫合線。以及手術衣。布類等。都可應用。該項消毒。

(二) 煮沸消毒 也是應用高熱原理殺菌法。效力比較蒸氣尤爲迅速。譬如芽胞菌對蒸氣須五分鐘方死的。本法便只二分。凡醫藥上所用器械。便探本法消毒。家庭方面病人盥碗。筷匙。衣服。被布等。更應放入鉄鍋中行煮沸消毒。

(三) 日光消毒 日光具有高溫及乾燥兩種作用。所以殺菌力亦強。譬如傷寒結核菌在強烈日光下。約一二小時。更趨死滅。不過日光只能殺滅物體表面的細菌。不能深入物體的內部。這是牠的缺點。凡不能行煮沸消毒的傢俱。均可應用石炭酸清拭。後置在日光中曝曬。病人厚的衣服。不便煮沸消毒的。尤宜勤加日曬。

(四) 火焰消毒 火焰消毒有兩種。最猛烈的。便是燒滅。這是最高熱迅速殺菌方法之一。譬如檢查細菌時的白金線。可在酒精燈火焰中燒灼。醫械刀鉗等急速要用時。也可在酒精火焰

中燒過。至於燒滅消毒。凡那種東西如病人衣服。與污濁極點。價格低廉東西。已不需要棄去的時候。便都一把火燒燬了。

(五) 化學消毒 化學消毒範圍最廣。便是應用各種藥品。而達消毒目的。現分述如下。

(一) 昇汞(過氯化汞)爲白色透明結晶。殺菌力最強。其千倍的溶液。剎時間便可殺滅各種細菌。外科上因常應用。牠千倍至五千倍的溶液。洗滌創面。潰瘍。血。不過本品藥性猛烈。如用在廣大的患部。容易有吸收中毒的危險。不可不慎。再本品易和金屬化合。凡金屬器具不可貯藏。也不能用爲金屬器具的消毒材料。

(二) 石炭酸 這是無色的結晶塊。有特異臭氣。其三至四%溶液。與千倍昇汞水。有同等殺菌力。一%之溶液。能在二三分鐘時殺滅傷寒菌與化膿菌。若二%溶液。膿那麼牠的殺菌力更

爲迅速。通常多製成一至二%溶液。洗滌各種創面及潰瘍面。

(三) 來沙爾(又名利沙耳)這是一種褐色澄明的液質。有特異臭氣。其五%溶液。能在四五分鐘殺滅各種細菌。醫界常用一至二%溶液。作爲自己手指皮膚消毒。不過本品刺激性很劇烈。除搔癢皮膚病常有加入浴水洗滌外。對於各種創面大都罕用。

(四) 過猛酸鉀(過猛酸加里。欽錒養)這是紫黑色乾燥棱狀結晶。殺菌力亦頗不弱。通常製成〇一。至〇。五%稀薄溶液爲創面尿道。淋病。濃漏眼。和惡臭皮膚潰瘍等洗滌之用。

(五) 過養化輕(雙養水。過酸化水素)爲澄明無色無臭之水樣液。殺菌力亦極著。除創面粘膜面潰瘍等深部可用以洗滌外。對口腔疾患亦可加入水中爲含漱用。

(六) 硼酸。爲白色有光澤的結晶或粉末。殺菌力中庸。但無刺激性。其二至三%水溶液。常爲創面洗滌。洗眼漱口用。

(七) 酒精。這是無色透明的液體。有純稀兩種。不過稀者的殺菌力反較純者爲強。用作手指消毒或器械的清拭洗滌等。

(八) 海碘方(沃度方)這是有光澤黃金色的細末。有竄透性臭氣。接觸創面。遇膿汁能分解。而將碘質游離。發現其強大殺菌作用。外科上多用爲撒布劑。或製成軟膏。紗布。甘油溶液等外用。

(九) 沃度丁幾(碘酒)這是一種亦褐色的液體。有特殊臭氣。外科手術。常用作塗布。

(十) 炭酸鈉(曹達)這是白色結晶粉末。其一%溶液。煮沸經五分鐘以上。多數細菌都能死滅。本品無毒。對於金屬也無腐蝕之弊。所以

外科用以加入水中為器械煮沸消毒之用。

(十一) 福爾買林 這是透明無色的液體。殺菌力特強。有特殊鼠透性臭氣。多應用牠的蒸氣為病房消毒。拿福爾買林(二)立特水中加入一〇一二〇〇〇)傾入特製消毒器或瓷盆內。置放炭火上。使成蒸氣。把門窗等密閉。經過十二至二十四小時為度。又有福爾買林水殺菌作用亦不弱。

(十二) 生石灰 酸化鈣 為類白色堅硬之塊。有強大殺菌力。因其價廉。廣用於溝渠牆屋角落藏垢納污處消毒之用。又病人吐瀉物咯痰內也多加入本品為殺菌最便易價廉原料。

(十三) 鹽化鈣 氣化石灰 這是白色的塊。殺菌力亦強。對於便所污穢等處消毒。也可適用。不過價稍昂貴。不及生石灰來得廣用。

(十四) 粗色克雷瑣耳 這是黃色油狀液

體。市上購賣的臭藥水。便是拿本品為主要成份。加水製成稀薄溶液。用為家屋便所牆角等污穢處的消毒。

八 綳帶常識

(一) 橡皮膏帶(又名絆創膏)具有黏著性。因為牠類似象皮故名。這膏黏着在稀麻布上。用時任意剪若干條。扯下。慎勿連麻布拚扯。使用之後。仍須捲好。藏入裝象皮膏的原筒中。以免久觸空氣。致失固有的粘性。至於他的功用。很是廣大。凡患部或傷處。很小。不能應用。或不必要應用。綳帶時。都可剪取狹小長條的該膏。作十字式或井字式。貼在布紗棉花之外。這便是尋常所見外科醫生處置的狀況。又對割刺。擦破等小瘡。可速用這膏小塊直接貼上。能收迅速封口止血之效。並可防細菌侵入。所以家庭間也宜常備。

(二) 棉花紗帶 醫療用的棉花。與尋常

不同經。過消毒殺菌。其色潔白。並且脫去脂肪性。容易吸水。故又名脫棉。用時拿潔淨的手。指取一小塊。投消毒藥水中。浸濕洗滌患部。或夾入紗布中。掩蓋患處。這是使用棉花的方法。

至於紗布一名棉紗。是一種極稀薄的布。色白也。善吸水。用作掩蓋患部。普通剪成小方形塊。放入紗布筒。經過蒸氣消毒。以備應用。用時先把布摺疊幾層。對摺或再摺。或完全不摺。單用一塊。或疊加數塊。……都視患部大小情形而異。紗布之上。或塗軟膏。或搽藥粉。或完全不放任何藥品。都有。

(三) 龜甲形帶 又名交叉帶。應用於下肢關節部。先將帶環行一二回於下腿。旋即斜過膝關節。上至大腿作半環形。後交互纏絡膝關節的上下兩部。然後再環繞於關節中央。或先由關節中央。依次纏絡其上下兩方。終則環繞於股或

下腿。這種龜甲帶於肘關節絆紮時亦用之。

(四) 人字形帶 又名麥穗帶。用於肩頭鼠蹊等部。先將帶由肱內側迂迴肩胛。經背部及對側腋窩後。還至肩胛上。終則環行於胸廓以固定之。對於鼠蹊部。可先用環狀法於股上部。如在右側。則經右臀部。薦骨部。再纏引至左側之上部。次經腹下及鼠蹊部。至股後外側。又向內纏繞。反覆數次。終則環繞帶於腰際。

(五) 提乳峯帶 本帶應用於婦女胸廓。包紮先纏環行帶於胸廓下部。斜包乳房下緣。超過他側肩胛。繞腋經背部。還至乳房。反覆纏絡。起初包乳下緣。次便包乳上緣。末了包乳中央。環繞在胸廓下部。以收帶端。又有複提乳帶。便行前法於兩側。以包兩乳。

九 避妊醫術

中國是多產的國家。人口數佔世界最高位。

據內政部近年粗枝大葉約略調查。已達四萬萬五千萬驚人的數字。足見人丁興旺。生殖力特強了。

吾國舊社會。以多子多孫算爲「三多」之一。和「多福」「多壽」並祝。普通人家。因行早婚。抱孫心切。因愛好「多子」。儘他加重負擔。勞而無怨。這與家庭經濟大有影響。人浮於事。對國家民族的貢獻。却無表見呵。

小家庭制度。受時代洗禮。脫離大家庭。好似各個細胞般獨立後。「制度生育」「產兒制限」的呼聲。便繼之高唱了。提倡節育。專家山額夫人來華宣傳。極得新仕女歡迎。紛紛實踐制育主義了。

制育既適合現代潮流。又合家庭環境。因爲如此這般了。後對人種優秀。父母負擔（家庭經濟）伉儷幸福……都有利。尤以節制生育爲閨

房真大幸福。夫妻的所以糾纏。生活的所以艱苦。兒女的所以吵鬧……全因多產之累。節育之後。此種現象便可排除哩。

怎樣節育呢。這須有賴乎「避妊術」了。避妊有醫藥與自然手術……等門類。但這和「打胎」不同。所以和法律不生抵觸。於人道更無影響。總之。範圍以內的避妊。實有百利而無一弊的呵。

（一）避妊準備。避妊是節育主義的實踐。從理論到事實的表見。這題目很大。有民族國家性與社會家庭性……這裏所說的避妊。完全根據閨房之內。夫婦二人爲主體。

凡夫婦結婚後。兩性生活完滿。多育多產。生緣葉成蔭。子滿枝——這在平民家庭。兒女過多。感到負擔不勝。富有家庭。撫育雖無問題。可是感到兒女太多。平添煩惱。加以婦人多育。必致

其色早衰。每多情愛極篤的伉儷。爲了多育女子。色衰。促使丈夫棄舊憐新。愛河便生裂痕。試想爲生育兒女而父母犧牲僥福。未免太不值得。

基本上原因。具有上述情形的夫婦大都同意節育。實行避妊。以增進閨房永久幸福。因避妊動作在乎夫婦合作。結果妻子又身當其衝。所以避妊必經床頭會議議決後才準備酌量彼此的環境體格而定。採何種步驟與醫藥或自然療法等。

(二) 避妊方法 避妊的方法很多。計有藥物的手術的自然的。現分述如下。

(一) 自然避妊 自然的避妊。便是不依靠藥物與手術。只利用生理的自然而獲避妊的實效。

誰都知道婦女的懷妊。因她們卵子成熟。普通經過二十八日而排泄。這便是「月經」。行經期中。子宮粘膜增大發肥。上皮剝落。從子宮腺上

又生出新的上皮。這新上皮因具有使卵子容易接觸的機能。所以卵十一和牠相接觸。便一直線地不顧一切向前突進。同時男子的精子也經過了一場活潑的戰鬥。只剩最後挺壯健的一條。從子宮口向子宮腔中突進。與卵子會合。受了牠們的包圍。困居在子宮內。使胚胎成嬰。出生小兒了。婦女的受妊。既在行經期後三四天至八九天內。所以欲求避妊的夫婦。可利用生理自然。在這期內停止性交。這樣不是可以仍得閨房真趣。但無多子累了嗎。

又有人主張夫婦分居或分床。減少性交機會與次數。也是最不費力的避妊良法。本法年青夫婦。閨房之樂。正在琴瑟友之時。既難辦到。又太違情理。只宜於中年以上。夫妻與丈夫作旅在外。想思兩地者。

男女搆精。才得懷妊。所以避妊者。只要少交

接。終能達到節育目的。兩性任何一方有病症——如性病與生殖器障害病等。這時性神經雖受特別刺激而慾念亢進了。但因各存戒心而不敢行房。這樣疾病患者的夫婦。有時亦很自然地不避姪而自避姪了。

(二)藥物避姪 藥物的避姪方法雖多。欲求確實有效的很少。現在擇簡妥可行者介紹。夫婦性交以後。利用硼砂水洗滌下體。使卵子與精子的活動同告死滅。本法的硼砂水。該用〇〇。五倍比較一般的消毒水濃烈些。洗滌時深入些。才使精子確實死滅。否則殘餘少數復活或游竄不死。仍有得胎可能呵。

利用哥羅汁避姪。也有特效。性交以後。可滴數滴於臍內。其作用亦在使精蟲與卵子死滅也。藥房中有某種避姪藥。供節育主義者應用。這種藥。性交後插入臍內。亦在使精子卵巢

毀滅呵。

藥物避姪方法。新舊傳說很多。但據實驗報告。靈效的十不獲一。所以編者介紹。只此三方。貢獻節育夫婦已夠應用。不兼收並蓄了。

(三)手術避姪 手術避姪。其法亦多。現在分別介紹如下。

最普通的。便是俗名風流××袋的避姪法。了。因這種薄橡皮魚腸等製造品的××袋。龜頭頂尖成球形。供男性射精時儲藏之用。夫婦性交為求避姪而利用此袋。可免精蟲竄入臍道而進子宮。試想精蟲既告隔絕。當然何從受胎。不過××袋市售的劣貨居多。服用時對每易中途破裂。仍使精蟲漏入臍道而仍生懷胎效用。更因市售××袋。經過攔置。人手轉輾。難免附有微生物。服用的時候。最好經過消毒手續。既用之後。每次棄去。不可一物二用。

海綿球在避妊上。也有特殊功效。每次性交時。婦女先把海綿球塞入腔內。使男子龜頭與子宮間。有此阻隔。而免受精懷妊。

手術避妊。尚有多種方法。什麼洩精戶外哩。密廠××哩……想入非非。一言道破。都在謀男子精蟲。免入子宮罷了。編者因為這種手腕太猥褻卑鄙。所以不俱錄。而有志避妊者。即欲手術。從事得上述之法。已夠應用了。

一〇 受胎醫術

多育固然有碍人種優劣。家庭經濟。產婦姿色……而非閨房之福。但不育亦非辦法。多育的以節育補救。不育的則將怎樣彌此缺憾呢。

現代科學昌明。醫學萬能。人死尚可復生。人老尚可還童。欲求不娠婦人得胎生子。這便該利用下述各節了。

(一) 不妊原因 不能生男育女。這責任

通俗都歸之女子。實在這是一種病態。該探討原因。而對症醫治。並非女子完全過失。有時男子陽痿遺精。精冷。房事過度。生殖器發育不全等等。雖有健美的妻子。也何從生育呵。不過普通不娠原因。女子方面比較男性為易犯罷了。

婦女不妊。基本祕密。都在子宮發育不全。醫學名「處女子宮」。因牠沒有長成和健美。女子同型。某種缺憾。常如十二三歲女子不能生種一樣呵。

成熟的子宮是這樣的。長七糲乃至十糲。腔長約七糲。譬如子宮頸部的長和寬。比子宮體大。子宮頸管約有子宮全部三分之二。而它的體長不過四糲乃至五糲。這樣的子宮。便斷定不能妊娠的哪。

又有這樣的子宮發育反常。卵巢的發育也有受牠的影響。而成卵巢發育不全。形體為長扁

平。彷彿少女那樣。因為遺泡的發育不充足。所以月經的來潮是不充分的。本來子宮的發育與卵巢的機能互相關聯。卵巢發育。一有障害。子宮便會萎縮。而與在卵巢的機能中絕的月經閉止。後多數婦人都得着脂肪過多的症。同一理由。患本症的人。有好多是外貌絕對健美。很是胖白的人。（婦人脂肪過多症。雖亦影響生育。而致不妊。然治療尚易。不需利用手術。只要吃減肥藥。最好注意運動。習體操作。摒絕肉類。多吃青菜。移居鄉下。散步爬山……等。後脂肪自能逐漸減削。恢復生育機能了。）

(二)子宮發炎 婦人的子宮固屬健全。並非上述的「處女子宮」。可是患有內膜炎。而致妨礙生育。同一不妊了。

子宮內膜炎是細菌傳染性。與非細菌傳染性。又分急性慢性兩種。

子宮內膜炎起於傳染性。是由淋菌。化膿菌。結核菌。等細菌的作用而發生。淋菌又居極多數。這種子宮內膜炎。更容易連帶發生頸頭內膜炎。子宮內膜炎主要的變化。是什麼徵象呢。牠在子宮的間質。是滲出性內膜炎。而在這個間質的炎症。主要的病變。是圓形細胞和布拉司馬細胞的浸潤。因為這樣。精子無論如何勇敢的衝進去。拚命要和卵子結合。潛藏於子宮內膜炎。是困難的。縱然僥倖懷妊。二三月後。也必有流產危險。接患流產性慢性子宮內膜炎。或更發生產後慢性內膜炎。這病的主要症狀。為月經過多。子宮出血。或行經困難。分泌亢進。白帶盛下……等。釀成普通婦人病了。

傳染性的子宮內膜炎增殖症。便是子宮內膜炎。肥厚。成不平等狀態的肥厚。——表面凹凸不。等。是囊狀或茸狀的肥。這是自瀆。或房事過度等。

非常地持續了性的刺激所致。便如子宮腫瘍。子宮位置反常和其他附屬器的炎症等。這都是骨盤臟器。尤其在子宮裏持續地發生的慢性充血的緣故。

本症主要為月經反常。子宮出血和白帶頻下等。因為病很執拗。所以往往連帶發生種種症狀。像頭痛。偏頭痛。下腹部壓迫感。全身倦怠。神經性消化不良。歇斯的中。貧血。因此便障害了生殖機能。而成了不妊。子宮的粘膜不能使受妊。卵子成胎。或雖妊娠而流產。同前述的傳染性一樣。不過上述的疾患。如能努力攝生。健康恢復之後。自然仍會生育。

(三)人工受胎 兩性生殖器械。與上述不妊病等使婦女終沒有生育能力。不妊狀態長久延續。可是子嗣缺乏。求子心切者。將怎樣辦法呢。科學世界萬能的現代。便有人工受胎術的

發明。給「可憐天下父母心」一劑無上安慰的神藥了。

怎樣叫人工受胎呢。吾國科學不發達。民衆常識缺乏。對於天然生育嬰孩。竟也可用人工來強迫受胎。終認為神仙法寶。不敢過份信任。大半的人更感驚艷詞色哩。

實則拆穿「人工胎術」的西洋鏡。也並沒有什麼了不起呵。

(一)科學種子 人工受胎術的實施。是人工把男性精子注入婦女子宮內部。使牠和健美夫婦媾精而妊娠的起同樣作用。本法係意大利科學家麥蘭賽尼氏所發明。最先拿雌犬試驗成功。才雇用不妊的婦女試驗。當施術時。是採取男子的精液。裝入特製的玻璃管中。用它的一頭插入子宮頸管內。而把精液注入子宮。居然得心應手。意外成功後。經逐步研究。因特製玻璃管有流

弊。所以另又發明一種輸精的注射器了。

(二) 受胎手術 這種人工受胎術是用食鹽水充分地把腫洗滌之後。在醫生指定的地位行夫婦性交。然後這個受精了的女子。就原位置靜候受胎。醫生一面把精液納入注射器。而馬上從子宮頸管注入子宮裏面。不過這種人工受胎的方法。婦女們雖抱恨自己。有病或體弱：等等而不妊。斷宗絕嗣。老年無靠。丈夫因己不妊。另納側室。移愛如夫人。或妍度健美女子。遺棄髮妻。不妊婦人在吾國禮教社會。普遍受人歧視。——有不生男育女婦人。不得台而。軋不得大淘——俗諺。而在婦女本身。也啞子吃黃連。說不出苦處。所以人工可以受胎。她們在經濟力可能範圍內。怎不興奮呢。只是受醫生的固定指揮。當陌生人面前。赤裸下體。串演猥褻情狀……那便求子之念。抵不住怕羞觀念。而沒勇氣嘗試了啦。

所以欲求本術的履行。還是閨房之內。夫婦二人祕密動作。男子練習了注射技術。便可合作一次。嚐試失敗。可二次三次……終求成功為止。

又有人發明採取精液於陰莖袋（即如意袋）中。而用上述相似方法。注入女子子宮。據云受術者。只要就原處靜臥二小時。便能妊娠了。此說脫胎於麥蘭賽尼所發明。雖有相當的理由。或竟亦有成功的可能。但一般看來。終嫌太簡單。滑稽。未免荒誕不經。真的「姑妄言之妄聽之」吧。

(三) 受胎準備 人工受胎施術時期。在月經來了一兩天後。最為適宜。並須週密準備。像施術室溫度的和暖。手術床台部位高低恰切。婦女臥在上面。真能助導精虫注到。最要事先檢查夫婦兩人身體格。究竟有沒有生殖素和其他的病菌嗎。精子的生殖力。詳細估量。必使真有胚胎。

嬰孩的才用以注射。否則豈非徒勞無功了嗎。經一番力氣。結果失敗。如此醫術上制勝人類生殖的大手術。豈是兒戲的。

總之事實告訴我們。吾人的胎育。雖非真的上帝創造。却有些神祕性的。歐美科學家。憑他怎樣本領。研究多年的機器人。還沒成功。現在介紹的人工受胎術。也只在試驗期間。而非如其他的醫術。般確有把握。百試百驗。生育終以夫婦自然爲上。人工雖能受胎。中途是否不致流產。與胎兒真的成熟出生。平安產下了。但其成長過程中。人工胎兒。也和天然胎兒一般。天真活潑。可以成立呢。

所以人工受胎。雖有上述具體的發明了。終不脫爲「謎」哩。編者採入本篇。介紹讀者。並非希望之嗣。不姓女子。

第四章 閨房醫方

一 乳劑處方

乳劑爲水劑的一種。似卵黃。阿拉伯樹膠。牛乳等爲媒介物。使水與油質親密調和。成白色濁液。後外觀便類乳汁了。故名「乳劑」啊。

(一) 乳劑種類 乳汁分二種。一爲真性乳劑。又名「種子乳劑」。是取含有油質樹膠質的植物種子。搗碎研磨。更和水。便製成功了。二爲人工乳劑。係用樹膠質。卵黃。牛乳等爲媒介。使水和油親密混和而製成。

(二) 配製方法 種子乳劑的配製方法。甚繁瑣。須先把藥物種籽。分別稱準。入適當器中。注以沸水。靜俟五分鐘。指捺取皮。乃用乳劑曰搗碎。搗時。手力先宜略輕。俟仁已破碎。方漸漸加重。至爛泥爲止。而徐徐加水。十分攪拌。絞榨濾過。在

這濾液中加入其他配伍藥品。

假性乳劑的配製通常多用阿拉伯膠樹為媒介。所用油類大概為蓖麻子油、魚肝油、橄欖油等。先把油類和樹膠粉入乳鉢中，注入少許的水，均勻研和，使成泥塊狀物。然後漸漸加水稀釋之。不過初加入的水，須注意一定分量，便是照油類與樹膠粉的混合量減半。例如油類一〇，樹膠粉二〇，〇相加為三〇，〇則宜用一五，〇西。

(三) 服用處方。

蓖麻子 OI Ricini 20.0

阿拉伯樹膠 Gummi Arabisum

10.0

糖漿 Sirup Simplex 10.0

溜水 Ap. Dest 160.0

(上面各藥，共和為乳劑，一次頓服。)

二 丸劑醫方

(一) 丸劑種類 「苦口利於病」西藥更比國藥來得難吃。因牠化學混合物，有的其味非但難以下嚥，甚且聞嗅氣味，已令人作三日嘔。因此想出丸劑來補救此弊。所謂丸劑，便是圓滑球狀小粒，使便於吞嚥。通常丸劑重量自〇・一至〇・一五亦有達〇・五以上的。丸劑又較其他藥類能貯藏經久，變化亦微，而攜帶便利，吞服容易。故西醫界普遍採用。居常也歡迎飲服。這和吾國藥的「××丸」相等，不過太陳宿堅硬的藥丸，飲入胃腸，不易溶化，往往隨大便還原而出。更有在腸中作梗成盲腸炎的，所以不可不注意呵。

(二) 配製方法 配製丸劑的藥物，區別

為主藥、賦形藥。結合藥三種。主藥係丸劑中有效成份，例如規寧丸中的規寧、蘆薈丸中的蘆薈等。

賦形藥是爲味。爲便利製丸成形之物。例如甘草末。桂皮末。蒲胆末。澱粉……等。結合藥含有黏性。使各種藥品粘合而製成適當的丸劑。例如甘草膏。蒲胆膏。阿拉伯樹膠。甘油糖漿。白陶土。藥用石鹼水等。欲防藥膏互相粘住。常用石粉子末爲衣。欲使丸衣之味佳美。又可用糖類或其他芬芳性藥品爲衣。

配製丸劑須有固有的器械。一爲展延板。把各藥調和後。展延均勻。二卽截丸器。把丸劑條塊截斷之用。三卽成丸器（又名轉丸器）把丸粒造成圓形之用。四卽上丸衣器。把丸粒粘附丸衣之用。

(三) 服用藥方

鹽酸必羅卡而賓 Pilocarpin Hydrochloricam 0.3
 甘草膏 Etopvirinae 1.5

甘草末 Pulv. Etopvirinae 1.5
 (上藥混合爲丸三十粒。一日三四食。前每服一至二粒)

三 錠劑醫方

錠劑是拿白糖乳糖。或阿拉伯樹膠等爲賦形藥。和粉末狀藥物混合。製成扁圓形的藥物。所以又名「片劑」。錠的重量約一〇。

(一) 配製方法 先把粉末狀的藥粉。與乳糖或白糖細末研合。滴入稀酒精。潤至錠劑稠塊爲度。如難於粘合時。可微加阿拉伯樹膠末。錠塊既成。可分爲若干分。然後投入製錠器中。製成錠劑的器械種類很多。舊式的錠劑型。爲金屬製的圓筒。當中有圓椎狀桿。可以上下。錠塊放入。強力打壓。便成新式器械。能在很快時期。製出多數錠劑。家庭服用。還以向藥房購取。省事省費。

(二) 服用處方

山道年 Santonin 0.25

乳糖 Sacch Ict 10.0

(上藥兩味。可製錠劑十個。早晚每服

一至二錠)

四 囊劑醫方

膠囊劑因牠是一種橢圓形有蓋的空囊。灌藥而成。所以俗名「空心丸」。牠拿膠質做基礎。而加入阿拉伯樹膠。白糖。甘油等。凡有臭惡氣味的藥物。都可裝入病人囓圖吞下。膠囊有大小數種。

(一) 配製方法 膠囊不易自製。可向藥

房購買。大小隨自己飲服方便而定。先秤取要用的藥。置在紙上。平均分為三份。裝入膠囊。倘是流動液體藥物。則用小量杯或滴瓶裝入膠囊。

(三) 服用藥方

鹽酸規寧 Chinin Hydrochlorid-

1ml.0

(上藥分裝膠囊三個。一日分服。)

五 液劑醫方

洗滌劑是一種藥液。用棉花或玻璃管。橡皮管。吸取注洗患部皮膚或粘膜等處。外科應用最多。閱房之內。遇外體創傷。消毒洗滌。亦所常有。

(一) 配製方法 秤量藥物。先從少量開始。漸次及於多量。投入藥瓶中。再加其他配伍藥。最後把水加入。使其完全溶化。配合既終。待至明亮處。視其內容清潔與否。如有游浮不潔等物。快須濾過。拿紙摺疊入漏斗中。或用棉花塞入漏斗內。然後把藥水傾入濾過之濾畢。便手續完成了。配製洗滌劑。有應注意之處。(1) 手持量杯。必須垂直平整。不可歪斜。(2) 用量杯取藥時。配藥者的視線。須細察其量杯上的劃度。是否

和所配之量符合。有否過多或過少。(3)藥液傾入量杯。須慢緩小心行之。否則便有過多之虞。如遇藥液倒出過多。寧將餘量棄去。切勿再注入原瓶。以免混濁而致不純潔。(4)量杯使用後。宜洗滌清楚。而倒置之。以免灰塵侵入。(5)藥物瓶塞不可用口咬取。(6)配製量洗滌劑。玻璃瓶該放暗處。防生變化。

(二)服用藥方

硼酸 Acid Boric

蒸溜水 Ap dist

六 布劑醫方

撒布劑便是外用的散劑。應用在皮膚。粘膜。創面等處。具有防止外來刺戟。吸收分泌物。止血。防腐等種種功用。

(一)配製方法 先取固形藥物。放在乳鉢中。研磨數十回。再用藥匙括取。附着於乳鉢周

圍及研棒者。再行研磨。使混和均勻爲度。取出照方分作數包。倘有半流動體或液體藥物。少量時。須先以固形藥物一部分。與之研勻後。再加入其他藥物。同研極勻爲要。

(二)服用藥方

次硝酸鉍 Bismuth Subnitricum

1.0

亞鉛華 Zinc Oxydatum 10.0

七 褌劑醫方

拿藥棉浸漬藥液。貼在皮膚局部的。名褌劑。

(一)褌包種類 計分二種。一曰溫褌包。以保持局部溫暖。促進血行爲目的。其液當加溫而應用。二曰冷褌包。以防腐消炎爲目的。其液多低溫應用。

(二)配製方法 與普通水劑配製相同。

倘行溫卷包時。則改用熱水配製。

(三) 服用藥方

醋酸鉛 *Plumbum aceticum* 4.0

蒸溜水 *Ap. dest* 200.0

(一) 藥振盪倒在棉花卷包患部。一日

多次更換)

八 點眼劑醫方

點眼劑便是眼藥水。普通男女常犯。故為閨

房常備藥品之一也。

(一) 配製方法 凡配製點眼劑的藥物。

大都能溶解在水中者。間亦有用難溶解之藥物。

便該當先把該藥入乳鉢中研成細末。再用再蒸溜

水溶解濾過之。如有細微不潔物。須反覆濾清。不

過硝酸銀液則不能濾過。因見了光易生變化。啦

(二) 服用藥方

硫酸鋅 *Zinc Sulphuricum* 0.1

蒸溜水 *Ap. dest* 20.0

[註]先秤取硫酸鋅〇。一〇。置入玻璃量

杯中。再加二〇。〇。西。蒸溜水。以玻璃攪拌。俟

其完全溶解後。濾過裝入點眼瓶內。以備應用。

九 嗽劑醫方

含嗽劑。便是以收斂性或防腐劑藥物。作成

水溶液。以供口內洗滌用是也。在閨房中。應用亦

廣裨益。衛生匪淺。

(一) 配製方法 本劑配製。與普通水劑

同。請參閱。

(一) 服用藥方。

氯化鉀 *Kali Chloricum* 5.0

蒸溜水 *Ap. dest* 20.0

(一) 混合為含嗽劑。每日多次。)

一〇 腸劑醫方

灌腸劑為注入劑的一種。藥液自直腸灌入

也。

(一) 腸劑種類 灌腸劑共分三類。一為通便灌腸。多用溫水。鹽水。石鹼。蜂蜜。或蓖麻子油等。二為滋養灌腸。多用肉羹汁。牛乳。或卵黃混和澱粉。酒類等。三為止瀉灌腸。多用止瀉藥配成水劑。

(二) 配製方法 本劑配製與普通水劑相同。請參閱。

(三) 服用藥方。

藥用石鹼 Saho Medicatus 1j.0

蒸溜水 Ad dist 500.0

(上混和為灌腸用)

一一 栓劑醫方

栓劑(又名坐藥)為插入肛門。尿道。或陰道(陰道)的外用藥也。其稠度介於硬膏與軟膏之間得體溫而漸溶化發揮藥物的作用。

(一) 坐藥種類 本劑的形狀有數種。用於肛門的為粗圓錐形。重約二。〇。長約三。乃至四。〇。用於尿道者為細長圓錐形。重約肛門坐藥十分之一。長約四。乃至五。〇。用於陰內者為球形或卵圓形。重約三。〇——四。〇。瓦。

(二) 配製方法 栓劑通常多拿可可脂為賦形藥。牠的製法先秤取主藥入乳鉢中。加可可脂少許研磨到軟泥狀。再將其餘的賦形者混入。攪拌使勻。待至適當稠度分為數塊。用藥匙取出。移放紙上展延。作適當形狀即可。若用栓劑模型製造時。則先將各藥加溫溶化。乘熱半冷傾注模型孔內(預塗油類以防粘着)俟冷取出。坐藥所配的主藥大都為通便。防腐。收斂。鎮痛；男女之間家庭之中亦常應用者也。

(三) 服用藥方

黃蓉膏 Extractum Scopol. a. 0.25

可可脂 Oleum Cacao

(上為陰道坐藥十個)

研和均勻。取出作球形用之。

〔註〕(一)將荳蔻膏與可可脂入乳鉢中。或插入後有不快感。所以該項坐藥。醫界用者漸少。坐藥自製如感麻煩。藥房有售。

一二 花柳醫方

(一)六〇六劑 「六〇六」這藥。是非常也。毒性強烈的砒素的化合物。這是艾利氏所發明。創製這進入人體而無害於人體。直接殺死。徵毒原菌的藥劑。舊六〇六另有專名。因為在艾利博士研究室研究着的許多藥劑裏。這味藥適。當第六〇六號。於是有一「六〇六」的俗名在「赫斯脫製藥廠出賣的時候。以「救世」的意味。遂起了個「新爾佛生」的名稱。

這舊「六〇六」有在處理上一不小心。馬上。有變化成劇烈毒性的物質的恐怖。為補救這。缺點。後來又從事研究改良。到了第「九一四」號。便造成「新殺爾生」了。又在第「一二〇六」號。製造出來「新殺爾生」到第「一四九五」號。又造出一種「銀殺爾佛生」來。這三種都。因為使用簡便而效力不大。效果照常。所以在。今日少有使用「舊六〇六」的大都使用這種新。藥了。

日本也有六〇六的製造。因當歐洲世界大。戰。因為德國的「六〇六」裝運不到。便造出同。樣的藥品來。不過「和製」的因藥商複雜。沒有。德品純粹。

(二)新藥成份 現在市上販售的六〇。六。計從一號至五號。茲分釋其內容如次。
新六〇六 一號 〇・一五格蘭姆

新六〇六 二號 〇。三〇格蘭姆
 新六〇六 三號 〇。四五格蘭姆
 新六〇六 四號 〇。六〇格蘭姆
 新六〇六 五號 〇。七五格蘭姆
 凡一號注射二十回。全量不過三〇格蘭姆。而用四號注射五回。便是三〇格蘭姆。與一號的二十回同量。並且六〇六這藥。雖是同量地人體內三〇格蘭姆。而一號的二十回。差不多是沒有效果的。這恰與飲酒一樣。一碗一碗地分碗去飲。無論飲了多少碗數。也不會打動身心。而一時飲一升之酒時。全身是要暈醉的。一六〇六一也是這樣。若不一時盡力地。多量地往身體內注射梅毒原菌。是不容易死滅的。少量少量地分回注射梅毒原菌。才為藥性所馴。對於藥的抵抗力加強起來。以後就是使用極多量。——幾乎把患者弄死那樣的多量。——它也是不會死滅

的梅毒原菌。仍是在平然地活動着。簡直是沒有辦法了。

(三)藥劑比較 「六〇六」水銀劑。沃度劑。都是治療梅毒的特效藥。現在來研究牠各個的藥性。作一比較。

把梅毒原菌培養在試驗管中。把「六〇六」水銀劑。沃度劑。漸漸地加入培養基中。慢慢兒把藥量加多。六〇六和新六〇六。四個月間。五六倍水銀劑為三十倍沃度劑。在水銀以上的比較加強。梅毒原菌馴於強烈的藥劑之中。而能夠生活的事情。是被證明了。在人體內。因為與在試驗管裏的種種狀態。關係不同。雖然不一定是這樣的。比例。但因為習慣性。是的。確地會養成的。所以十分了解這事實。而開始治療。必能達到治療的目的。

又有某醫學博士。曾把一度對於強的藥劑。

得到了習慣性的梅毒原菌。證明了那個習慣性。是至某程度減低而更遇着以內的強烈的藥劑。便會死滅的事情。倘事實贊同這理論。則長期間繼續驅黴療法。可以說是好的。便是太長期也繼續時。梅毒原菌爲藥劑弄馴。人體逐漸衰弱。而治療效果便要缺少。因此之故。凡是需要長期的一時中止治療。過二三個月。梅毒原菌的習慣性減薄的時候。在身體的衰弱恢復了的時候。再施行強力的驅毒法。這是最合理論的治療法。

(四) 注射新法 「六〇六一」可以用種種的方法而施用的。現在最廣用的方法是靜脈內注射法。計有稀薄液注射法與濃厚液注射法兩種。對於這兩種方法。都是有好多的贊成者。同時也有反對者。不過據長時期診斷經驗。稀薄液注射法比較濃厚液注射法有優良效果。因爲這容易向各部分配。

濃厚液注射法。也可說是簡便的方法。因爲使用極便易。極簡單。所以一般普通花柳醫生樂於採用此法啊。

稀薄液注射法。必須選擇蒸溜水的極新鮮的。並且要多量。又鹽化鈉必須使用極純粹的。因爲使用日本藥局法上所製的鹽化鈉。有發熱的事情。所以是必須要更其純良的。生理的食鹽水及注射器的完全消毒。乃至操作中的消毒的注意等有非常的麻煩。因之一般都依據簡便法了。

濃厚液注射。往往有誤洩於血管外的時候。而在那裏發生劇痛。發生壞疽的事情。又據動物試驗。證明使用很濃厚的液的時候。肝臟。腎臟。脾臟等重要的器官。皆發生實質的變化。以及組織內的分佈。也是很不良的事情。

「六〇六一」在靜脈注射法之外。有肌肉內注射法。皮下注射法等的應用方法。又神經梅毒

有脊髓腔內注射法。腦腔內注射法。薦骨腔內注射法。等。這都須就診於可靠的專門醫生。非閨房之內所得自療也。

一三 水銀劑方

「六〇六」沒有發明以前。水銀製劑是驅除梅毒法中佔主帥的地位。不可缺牠的。呵。當「六〇六」發明的初期。曾有人主張廢除水銀劑。可以永遠不用了。但經臨床實驗。各國醫師仍不忍棄牠。公認尙具傳神價值。這才流傳到今日。水銀劑依舊有牠相當的地位。

水銀化合物裏。現時製品很多。他們應用的方法。雖有種種。可是驅毒的效果。大體相同。使用簡單。並且在使用之際。很少疼痛和中毒。所以仍公認是好藥品。

(1) 水銀軟膏 水銀可以製成軟膏。有塗擦全身的方法。這是從古代直到現在盛行的

方法。雖然有些許不便。但也有隨症狀和年齡必須靠這種方法的時。候的。這個方法。便是把水銀軟膏。用自己的手。在皮膚軟的地方。每天隔半小時。擦入。以六天爲一週。轉而復始。以六星期爲一期。

(2) 水銀注射 水銀化合物注射。因爲便利入於體內的。量。明瞭地看出來。所以現今也仍廣大的沿用着。大概是在臀部肌肉裏面。每隔二三天注射一回。水銀有溶解於水的。有不溶解於水的。又在注射部。發生劇痛的。或無痛的水銀。因爲是掩蔽性的。結合所以毒的成份少。便是靜脈注射。也可以把大量的水銀。注入體內。

因爲梅毒原菌對於水銀。也是很容易得着習慣性。所以在只用水銀劑行驅梅毒法的時候。有時中止治療的必要。大概以二個月。的治療爲一期。一年爲二期的治療。二年爲重復六期。這樣

定能全治的了。又水銀化合物有作爲內服藥而使用的時候。對於先天梅毒著有特效。

(3) 水銀療法 水銀的療法發明甚多。現綜述如下。

計有水銀鹽蒸療法。吸入法。浴湯療法。水銀因爲常作局部的散布。或塗布劑而使用。有時隨不免發生副作用。便是輕度的中毒作用。但這不過是口內炎。大腸炎。下痢。腎臟炎。皮膚發疹。輕熱等疾患。是沒有多大的憂慮。爲預防時發生口內炎起見。施行水銀注射的時候。把嘴一噉便好了。又有對於水銀的特異體質而會發生劇烈的中毒作用時。但這是很少發現的。

一四 沃度劑方

沃度化合物沒有殺黴菌原毒的力。因此單獨地使用它是不夠根治的。沃度劑對於第一期只有使發現於表面的症狀趕快消失的能

力。不過對於第三期的護膜腫有非常的效果。便是把病的產物迅速吸收消失。症狀便能大大的減輕了。

又有對於第二三期潛伏的全身症狀。便是頭痛。關節痛。神經痛等。也會見功效。在惡性黴毒用六〇六和水銀劑都沒有顯著的效果時。一用沃度劑。效果便非常地顯著的事情呵。沃度劑用於內服的時候最多。有時也拿來用作注射。單獨用沃度劑的時候。是不很多的。和水銀劑六〇六併用便大有效力哪。

一五 蒼鉛劑方

本劑的發明只有近十年歷史。爲日本所發明。也是爲好多混合物所配成。有溶解性的。也有不溶解性的。施行注射的時候。有痛的。也有無痛的。就驅逐黴劑說。可以說是最有效的藥劑。是最適合於特異體質的人。因爲姓婦的黴毒或是神

經微毒等不會起中毒作用。所以普遍地被使用了。

第五章 閨房醫病

醫男性病

一 醫治梅毒

(一) 梅毒起源 世界上生梅毒的傳染人。據說是亞美利加大陸發現者的哥倫布。與和哥倫布們最先往西印度洋的水手們應負全部責任。因為他們一登在泰凱回西班牙受盛大歡迎於「巴爾寒羅市」首府的時候。他們攜回的寶物中有一種「特烈活乃馬」梅毒便是從這種馬身上傳播的。後來經轄爾軍與日耳曼英吉利西班牙……各國苦戰多年。梅毒逐漸傳染遍及了全歐。所以歐洲是「開天窗」的鼻祖。講究

衛生。最重禮貌的他們。至今正史上詳細的載着事實不容諱言哪。

至於吾國梅毒的傳入。放在明末清初。西班牙人帶了「烈活乃馬」航行太平洋大西洋各海口。於是勃爾求加爾的船員足跡所到之處。梅毒便有發見。遠東梅毒的猖獗。是先由印度而至吾國南海口岸的廣東。再由廣東而蔓延南北各埠。間接深入內地。數百年來。浸成現在的情況了。

(二) 梅毒微菌 梅毒的微菌。形狀性質。完全不同於其他細菌。牠是細菌與原蟲中間植物與動物的中間物。形體細長。好似一枚螺旋。不用最高度的顯微鏡。肉眼是瞧不見的。牠比奎扶斯菌或赤痢菌長十數倍。螺旋的數目並不一定。有時相差大概從四個至三十個。竟有這般相差哪。

梅菌活動。很靈活。能做出種種的花樣。

說句笑話。新世界曾有跳蚤戲。倘有人培育梅毒不煩教導牠做出的動作保證比笨拙的螻蛄蚤靈活多哩。

梅毒的端。很是尖銳。好像錐子。生殖力繁殖驚人。別種微菌。至多從一個分裂到八個。梅毒却能由一個分裂成十個以至數十個。

梅毒的坑毒力。又很利害。酒精。石炭酸。來沙爾。福爾。福。過滿。倫。酸。加里。等消毒藥。必須經五六分鐘。才能消滅。牠不過昇。最。怕。備。用。一萬倍的昇。汞。一。觸。便。死。立。制。彼。命。也。

梅毒在蛋白質豐富的粘液。與濕濕的地方。最便利牠的繁殖。所以人口。密集。肛門。陰戶。這種繁殖之所。梅毒良居。樂不思蜀了。有的更利用牠的分泌物。在人身各部份找尋牠的殖民地。
下。梅毒也似肺癆般分三期。現在分別說明如下。

(三) 初期梅毒 第一期梅毒的症象。大概受毒三星期後。在那侵入的部份。發出堅硬像豆粒一般的東西。(最長有經過三個月才發生的) 這種豆形粒狀。包在皮上。並不破裂。又不發紅。祇覺摸摩時有些小粒罷了。豈知這便是一初期硬結。(又名硬性下疳) 呢。

凡遇此種現象。一般人心理。以為快快着先鞭。延請花柳科醫生注射「殺爾佛生」(Salvarsin) 便是「六〇六」自命防範。未幾。萬無一失了。豈知這樣的醫治。大謬不然呢。因為這種最先發現的豆粒。是「軟性下疳」。注射「六〇六」。雖有立刻殺滅梅毒菌的能力。可是對於梅毒以外的另一型細菌。便敬謝不敏了。

(四) 二期梅毒 第一期的過程。略如上述。約三週間。便自然消失。而再過二十一天。也是什麼事都沒有地過去。這叫做「第二潛伏期」。

第二期以後。梅毒的全身活躍。從此便正式開始了。

首先表現在胸部。腹部。腰部等的皮膚面。名叫「蕪薇疹」的淡紅色的疹子。一齊發見出來。沒有過份的癢和痛。初起顏色淡的。漸次加濃起來。更當沐浴和飲酒的時候。因皮膚血行佳。良疹子便呈現很美麗的色采。好似桃花的瓣子。正宗性病有此艷色。真不愧牡丹花下……的風流病呵。

這種疹子不久又自然消失。倘知是梅毒而加醫治。更快隱去。不過牠的隱去。並非結束梅毒。過了三四個月。搖身再變別種形體。而復發。從這時候起。身體上。多少要感到有些輕熱。頭痛。而昏並且口輕夜重。

接着。梅毒性丘疹生出來了。小形的。很像粉刺。大形的。有一枚銅元那麼大。而且。少少向上高。

腫。色彩爲銅赤。堅硬不痛。非個距離。稀稀朗朗。絕不含混。丘疹因牠的形狀。而分小型丘疹。粟粒丘疹。巨大丘疹。環狀梅毒疹。手掌和足掌上生出的褐色斑點。形成銀色的鱗屑狀態。這名「梅毒性乾癬」。不論小孩。不分大人。倘手足掌上。有了這種豆粒大的褐色。便可斷定是染患梅毒。並且已證明在二期之末了。

又有一種像胼胝那樣地生出的。叫「角化性梅毒疹」。生於髮際。而像一個那樣的東西。的叫「脂漏性梅毒疹」。又名落屑性梅毒疹。在毛根裏一致生出的。叫「毛囊性梅毒疹」。像雞皮一般皮膚起粗粒的名「苔癬性梅毒疹」。更有「扁平峴基魯姆」。在口角。腋窩。和身體濕潤部份。呈扁凸形狀。第二期梅毒疹。都是梅毒菌在繁殖。推進。在一扁平峴基魯姆裏。而因爲特別地。有多數梅毒菌繁殖着。所以牠的傳染。

力特別利害。這種扁平凸出的一增加。便變化成「莓實樣梅毒疹」。又堅而硬的名「毒性硬化」或「胼胝腫」。類似扁平皰基魯姆的名「尖形皰基魯姆」(即俗稱「鼠之手」)發生在男子龜頭與女子下陰。更有像兒童火疔子那樣的名「梅毒性濃疹」。像水泡大的名「天疱瘡梅毒疹」。小形的名「豆瘡梅毒疹」。最小形生在背部或顏面等處。與粉刺沒有區別。這些都是有膿的脚上帶着這種膿液的蠅子。一落到別人肉體上有傷的地方便生傳染而致同樣情形了。

(五)三期梅毒 第三期梅毒發現也同。一二期在皮膚與粘膜所不同的。便是潛在性生於一局部的居多。數便是不是散在性而為集合性。這是他的特徵。

早期梅毒可在無形變化中治好。但三期梅毒完全是破壞的。破壞身體組織而變了他的形

態。脫掉色素。白斑。又成了黑色。治後殘留很深刻的癩痕。這種破壞作用發生於筋骨肉及五臟器時。便成了殘廢者。發生於內臟時。便要死亡了。

三期梅毒。最是危險。特別痛苦。骨中多病。像梅毒性骨髓炎。骨髓炎或骨護膜腫等。都是重症。該特別留意。

一般人患肝臟病與動脈瘤腦卒中。腎臟病。糖尿病等死亡的原因。攷查。很多是第三期梅毒。菌在逞暴施虐。又眼科齒科所患的慢性重病。同樣三期梅毒菌在作祟。這種毒菌侵入人體。經過經長的年月。便會直接破壞或妨害腦的組織。招來基於其他不良新陳代謝物質的腦和脊髓實質的慢性變化。便成極難治的三期梅毒哪。

(六)梅毒診療 梅毒的治療因有「六〇六」「九一四」等特效藥的發明。所以普通社會都知道。豈知梅毒輕症重症既相去十萬八

千里。一至三期與先天後天直接受毒間接沾染。肉中分別大有講究牠的變化。不下數百種。六〇六一九一四雖是效藥終非金丹仙方。怎能混統全治呢。所以編者對梅毒不云「治療」而標「診療」者。便因梅毒病症最複雜。必須診斷病情如何。才後再定治療法。現把普通各症介紹其特效診療新法如下。

(1) 暗野視法 凡梅毒發疹的時候。可以採取少量的液汁。而用特別的裝置「暗野視裝置顯微鏡」直接地看。便是不限發疹。像脊髓液和分泌液也可用這種方法。這樣可以看到潔白光亮顯明地在活動着的梅毒原菌。

梅毒原菌的樣子和牠的活動狀態。前面已有說明。這裏不再贅及。在口中。肛門等潮潤地方有很多類似梅毒原菌的微生物。

單靠顯微鏡尚不能分別。所以診視梅毒原菌的情況。知道患病輕重程度。必須使用這暗野視法呵。

(2) 染色新法 把上面取得的毒液。塗抹在小塊玻璃上。染以種種顏色。這在醫藥上名「基美瑞氏液」。色素梅毒原因初時經過很長時期沒有發見。後來有名蕭定的老醫藥博士。用這個「基美瑞氏」液染色而發現了。

另外還有很多染色法。都是非用極上等的顯微鏡。則不能看見那樣細軟的形體。裏落落染上去那些。又有依攝微原理。弄成黑色而看的「鍍銀法」。與墨汁濃合把梅毒原菌透明地看出的「陰影法」。這兩種方法。都可以看見原體。只是形態上細密的地方。還不能過於看清楚。

(3) 切斷新法 採取梅毒病變部一部份的組織。用病理學的方法把它切斷而照見的方法。用這方法在那個病組織的切片裏。看見很多的梅毒原菌時。便可確實診斷這人所患的是否梅毒了。

〔註〕 上述三種方法。都屬於診斷方面。看似無關重要。豈知治病必須探原。知道了怎樣的病。對病下藥。便利多了。不幸沾染梅毒。不願人知的。更可依照作閩房自療的初步檢毒哩。

(4) 移植新法 採取病人發疹的分泌物。血。流乳。汗。眼淚。及其他的分泌物。或是病組織的切片。把牠移植於猿或兔的睪丸裏。經過若干時日。觀察牠發生第一期梅毒徵象如何模樣。俾作治療標準。本法在個八家庭間。可利用兔試驗手續。尚稱簡便。哪

(5) 驗血新法 施行本法。必須採取人的血液。約有十西西之數。然後拿兔或山羊。天竺鼠的血液。為種種的處理。日本野口英世醫藥博士發明的「野口式」人血溶解梅毒反應法。採取人血二三十滴。(約二西西。血為人體最寶貴的。不可多取。所以有二西西強夠了。)從肘關節的靜脈。注射針。無痛地簡單採取。像按摩施術那樣地。在背脊刺絡。而用吸角採取。在採取的血液裏。混以兔。山羊。天竺鼠等的血液。而試驗它。經四五小時而成功了。

牠的結果。可以因血液的溶解程度。而驗明梅毒的有無。及其強弱。而是出的。由那個溶解程度。而有強陽性(十十十)陽性(十十)弱陽性(十)疑性(十一)陰性(一)五種區別。陽性反應有毒。陰性反

應無毒。但也有呈現陰性反應而未必無毒。或是現出陽性反應而未必有毒。總之。這種血清反應。對於潛伏梅毒。或區別診斷。是非常便利而有效的。

(六) 血清新法 第一期梅毒。因梅毒潛處體內。所以只有約百分之五十患者。現出陽性。(十) 其餘的半數。仍是陰性。

第二期梅毒。百分之九十九。乃至百分之百。是要現出陽性反應的。在三期梅毒裏。約百分之九十。現出陽性。還有約百分之十。現出陰性的。此外。可以測知梅毒性麻痺。狂從百分之九十。到一百。梅毒性脊髓癆。從百分之五十七。到七十。是陽性。餘外。是陰性。先天梅毒。百分之九十。乃至一百。是陽性。

舉上所列。在梅毒原菌潛伏期中。不能因為血清反應是陰性。就斷定無毒。實際上。

依治療而成了陰性反應的人。兩三年後。往往會再發。因此。一度受了梅毒侵犯的人。在治愈而血液反應成了陰性之後。也必須要。在三個年間。每年約行二回的血液檢查。若干年後。心身衰弱的時候。仍應好好地留心。把血液檢查一番。這樣便可防止萬惡梅毒的再發了。

陽性反應。雖然九分九厘。是有毒的。但也有少數的例外。癩病。猩紅熱。重症糖尿病。重症結核。重症癆。麻拉里亞等症。往往也會現出陽性反應來。所以在診斷時。必須要注意這些的。

對於重症糖尿。癰腫。結核患者。一類的人們。潛伏梅毒。或是第三期梅毒。是不是在併有着。往往有難以診斷的時候。因此。在不成爲病之間。施行血液檢查。爲必要的事。如

此則對於治療非常便利。又在這三種病症裏許多都是在併存着梅毒的。

(七)反應新法 除上述的陰陽性血清反應法外尚有另外一種屬於下述各種由梅毒所釀成病症的「血清反應法」。對於醫房自療亦切實用所以一併錄供參考。

(A)本法實施時先在病者腰部的脊柱刺以長的注射針而採取腦髓液。會和血液同樣地現出反應來。這是確定中樞神經梅毒的有無最必要的時情。這種液除瓦塞美氏反應法以外還有細胞學的檢查。化學的檢查。有古爾布林定量法野口式牛酪酸反應。膠樣金液反應等。好多種的試驗方法。

(B)「考安天代瓦塞美」氏反應

法操作極簡單而成績確實的血液反應法的醫學專家很多其中最通行的是雜克斯改呢爾基氏反應法。與瑪尼茲克氏反應法。二種方法在大體上表現出一致的反應相信它是與瓦氏反應法有同一的價值。並且試驗的方法極簡單對於醫士學習醫房自療者極便利哩。

(C)這是免疫學上與臨床實驗上很有價值的梅毒皮膚反應法。依着結核症的診斷。大有價值的俾爾克氏反應。同樣的理論和方法。而簡單地診斷梅毒的有無。這是全世界醫學博士專家醫士等共同試過。日本野口博士公認滿意的答案。

本法是把梅毒原菌培養在試驗管中。而把它殺死。小量的注射於人的皮膚(上膊)而在那裏現出種種的反應來。這個反

應法與瓦氏反應瑪氏反應法。理論上。稍爲差異。是具有檢出對於梅毒原菌的免疫性質有無的作用。它的現出方法也是不同。因此在別種方法不能現出反應——尤其是。在診斷上發生的疑問——是會現出百分之百的陽性反應。所以這種方法在神經梅毒。先天梅毒。內臟梅毒的診斷上。是很多要而有很多的價值。

別種血液反應法。是依梅毒治療而一時消失成了陰性。在一二年數年後仍有出現。但是爾耶勤反應是不容易消失的。即在完全治療的一兩年後消失。只要不重新感染是不會再度發現的。

以上着重梅毒病者血清的檢查方法。因爲血液中沾染了梅毒後。在一二潛伏期內是很難捉摸。所以必須明療血清反應後。

對於治療上才有方法了。

(8) 全體療法 計有二種。梅毒變化的局部療法與全身驅逐梅毒原菌。因爲包括皮膚科。內科。外科。眼科等廣泛的範圍。是不容易一說便明的。全身驅逐梅毒原菌法是治療上的根本大計。因爲把病者身上梅毒原菌完全撲滅。其他病症自然可以統治了。

任何藥劑都是因人而特別不能使用。這四種化合物對於普通人是毒力很強的藥劑。但百人中或十人中必有一人無論怎樣也不能使用的體質人。便是用於普通人。不過起了少許的中毒作用。而一用於這種體質的人。是會發生變故的。這種患者不特異體「六〇六」和水銀製劑。有很不適用於他們的。還是蒼鉛劑。換了藥是不會中毒。

的。

這四種藥劑都是單獨地使用則效果少而根治困難。同時併同兩種的在這四種之外。對於梅毒有效的藥劑大概可以說。是沒有了。別種藥劑雖也常用。但都是作為強壯劑而有補助的作用。

在梅毒治療上。身體的強健。實為第一條件。質使治療的時候。因身體的強壯或衰弱。藥的效能大有差別。譬如面紅健旺的人。只要注射三回的「六〇六」。貧血蒼血瘦弱的人。便須注射十回。才能達到同等的效力。又在青年。很有效能。而隨年紀之老。效能減少。這也是不可不注意的事情。

梅毒原菌不存。在胃腸。所以不會外出。在大量使用了水銀劑的時候。發生激烈下痢。其後梅毒輕快或全治的事情。不過這種

下痢。是水銀中毒的下痢。就是把水銀用得差不多。像中毒那樣多量的結果。梅毒也同時治好了的緣故。水銀的效能與下痢。不是同一的。在不起中毒範圍內。十分有效地使用着呵。

二 橫痃醫治

橫痃——也是性病的一種。屬於烈性花柳鼠蹊部的淋巴腺。從軟性下疳而蔓延全身。但在這裏咬住了。於是下疳菌和毒素便停留在這個淋巴腺中。化膿而增大。好似雞卵般。外部腫脹。那個部份的皮膚發赤發熱。疼痛萬分。步行困難。悔不該一夜風流。病纏上半年了（橫痃俗稱橫半年）。

（一）橫痃症狀 軟性下疳發生以後的。四五天便生出的。但通常都在一兩星期後生出。有的在下疳已經完全治癒以後生出的。其實。下

疔生出的時候。只要馬上爲適當的治療。保持安靜。便少續發橫痃了。

橫痃生出後。若是只有四五天。便守住安靜。依適當的療法。便能不化膿而消散。倘爲激烈的運動。或依不適當的療法。或是隨各人的體質。而二。三的淋巴腺。便在一星期之內。腫得像雞卵般大。那部份的皮膚。化膿發熱。再經過三四個星期。這地方赤紅的皮膚。終於藍青色。而發軟起來。結果自潰。多量膿質流出了。

有長期的流膿汁而治愈的。也有傷口漸漸地崩潰增大。而這地方弄成與軟性下疳的潰瘍面同樣的污穢廣大的傷面的。這是軟性下疳菌在淋巴腺內還沒有死因而繁殖。於是自潰瘍面在鼠蹊部生出軟性下疳來。這種鼠蹊部軟性下疳。最難治。最利害的橫痃。潰瘍面竟至直徑一尺。有生命危險了。

(二) 橫痃診斷 怎樣診斷橫痃的發生呢。計分下述四點。現在分別說明吧。

(1) 從硬性下疳發生的。那是無痛而硬性的居多數。

(2) 有在淋病初期便發生的。在這個時候。化膿的事。差不多是沒有的。牠的疹也。像軟性下疳那樣不甚利害。

(3) 從赫爾伯斯或是別的陰莖之傷。或是從腫物等。化膿菌侵入而發生化膿性橫痃的。這時候。是和軟性下疳差不多同樣療法也是同樣。

(4) 有從下肢的傷。或是腫物而波及淋巴腺的。這時候發生的場所。少在下方。但也有化膿的。

(註) 另外。在結核剝腫等的時候。有淋巴腺腫脹而發生橫痃的。但橫痃在軟性下

疖的時候。是最普遍的。

(三) 橫痃療法。橫痃初期。爲防止化膿起見。使患者服下錄方劑。在腫脹淋巴腺用冷濕布及 Ichthyolum 塗布等再施行 Calcinar 的靜脈注射。便可在一週內不化膿而消散了。有的以爲不使牠化膿消散。却使毒內攻。而成了將來發生全身病的禍根。這是絕大的誤解。因爲下疳菌。不會週行全身。所以殘留遺症的危險。是絕對地沒有的。因此可以不必割開治。好。殘留後遺症雖有。但這是混合傳染。梅毒菌也一塊地侵入。了的時候。縱然割開。而消散了。也會殘留全身。變做後遺症的呵。

依體質。也有如何的療法。也沒有效果。而迅速加大化膿。但化膿。發毒。腫脹。疼痛等。應該早些施手術。外科療法。用刀十分寬廣地割開。而與排膿同時。抓爬殘留的腺組織。而把全部取除。是爲

必要的。這種外科手術的割開療法。最是安全。並且可期早癒。倘怕痛。或胆小。僅僅穿個小孔。而排膿。非但不能痊愈。並且貽成淋巴漏。要得着因開小口。多患數月。瘡口不收的。痛苦。所以橫痃病人。不論請求外科性病醫。或自己懂得醫理。可以奏刀。開割。瘡口。必須開大。萬勿可用針刺而小。治療橫痃。刀割。總決外。還有水銀軟膏。沃度軟膏。插入法等。或是穿刺。而注入藥液。法和鬱血療法。等種種方法。須看各個人所患症狀的輕重。而定何種治療。最爲得體。

三 醫治下疳

(一) 軟性下疳。軟性下疳。是由鳩克勒氏最初發見的。叫做「連鎖狀杆菌」。這種病症的發生。不是其性的梅毒。只因病的傳染。經過和傳染部位同樣。所以傳統誤會。認梅毒一門。自從鳩克勒氏教授發現了病原菌。才知別樹一幟。

不相統屬的呵。

凡在花街柳巷走動和行不潔性交。才有傳染本症的危險。據說無傷的皮膚是不會傳染的。必定有小小的損傷。梅菌才會侵入。因此潰瘍的形狀。也是由傷的大小而有種種的不同。這個潰瘍的周緣。是銳利地突起着。底面被着灰白色或是黃色的凝膜。流出多量的膿汁。隨着時日的經過。漸次地潰瘍面增大。周緣也高了起來。手指觸着了牠。便感劇烈的疼痛。只要不是神經過敏的人。終身是不會發熱的。

軟性下疳的傷面。隨各人體質不同。而呈各種現狀。有生出很多小下疳的。有兩個下疳從周圍的皮膚高高隆起。也有深深地凹着的。

又有所謂「侵蝕性下疳」。潰瘍的表面很不潔。又為綠色與黑色的痂皮狀物所遮蔽。周圍的皮膚。又很迅速地侵蝕而擴大起來。

又有所謂「蛇行性下疳」。一方面治好了。他方面又潰爛了。一波未平。一波又起。非經過相當時日。是不容易痊愈的。

又有所謂「壞疽性下疳」。在下疳之中。是最惡性的了。凡患糖尿尿病。腎臟病。全身營養障礙的病人。每從下疳的潰瘍部。致周圍組織。全成壞疽。有從某一部份腐爛。到陰莖尖端的。利從陰頭包皮的前方腐壞淨盡。陷於把陰莖從中切斷的利害狀態。

(二) 硬性下疳 凡單純的硬性下疳。潛伏大概三四週間。最初不潰瘍。成為丘疹而發現。牠的形狀。大概一定的扁平隆起着。硬結下疳。數普通一個。有時兩個。但再多的。很是罕見。硬性的分泌液。是漿狀與血性。其量很小的。經過相當時日。潰瘍既不污穢。又不很深。指頭指觸。硬性下疳時。好似碰着了軟骨頭。

(三) 混合下疳 在軟性下疳潛伏的地方。便是粘膜裏也爲黴毒原菌最易繁殖的地方。因此多有從一個傷口這兩種黴菌一時地侵入而一時地傳染的。這個時候的下疳。便名「混合下疳」。牠的症狀。在感染後兩三天。現出軟性下疳情狀。經過十天或兩星期光景。便會在下部周圍底面。生出硬結。而轉成第一期梅毒了。這只要在軟性下疳的時候。適當治療。大概十天至多兩星期。便獲痊愈。倘是混合傳染的。治療便沒這般容易。經過相當時日。逐漸轉向硬性。

四 醫治遺精

遺精是在睡眠狀態中。不自覺地一種精液的流出。有一週二次的。有二週一次的。有四週一次的。這種次數的多少。與體質或生活環境大有關係。若有一週以上。遺精後第二天精神上並不感到異樣的。這種遺精。或許是生理上的常態。並

非病象。

(一) 遺精原因 病的遺精是怎樣的呢。遺出數既頻繁。第二天又發生疲勞。頭痛。耳鳴。心悸。亢進。四肢倦怠。或震顫。背部疼痛。精神。臃。憂鬱等症狀的。因爲遺精的回數。是看病勢的。所以病勢利害的。竟有一禮拜內。隔日便遺。最甚的。不。只。夜。間。遺。精。便。是。白。晝。衝。動。如。廁。時。或。在。運。動。走。路。時。因。某。種。的。激。盪。或。是。衣。服。和。被。褥。的。摩。擦。重。壓。精。液。竟。不。自。覺。的。流。洩。出。來。症。象。到。了。如。此。地步。虛弱已達極度。不可忽視。該趕快服藥。慎重攝生。標本兼治。當可挽救。轉弱爲強。否則便有性命危險哪。

(二) 遺精醫法 遺精也不是獨立的病症。另有牠誘發的原因。所以必須探本窮原。不只藥物所能靈效。所以醫治遺精患者。他的遺精從手淫發生的。那最便當。只要立即憬悟。戒絕這種

白濁工作。再服些魚肝油。賜保命等清補藥。與相當休息。便可痊愈。總之。任何原因釀成的遺精。終以攝生爲第一。如睡前不看色情小說。肉感畫片。不吃得過飽。衣被輕暖。不宜重壓。煙酒濃茶。咖啡。有刺激性的東西。一一戒除。免興奮精神。刺戟神經。生活有規律。思想純潔。這和陰萎一般。——長期遺精的結果。便成陰萎。——除身體虛弱。精神頹唐所致外。四週聲色的引誘。男女愛戀的思想。實爲最大病因。欲求根治。先須把生活恢復正軌。思想驅除淫念。心病有了心藥。才得康健哪。

(三) 有夢遺精 上述遺精係就無夢而論。現在所說。則爲有夢的遺精。這種精液遺出來時。每次必定有夢。而且所做的。必屬粉紅色幻境。不外桑澗濮上。幽會。或旅社。密室。合歡。對手方的女子。病者愛慕。有已發生關係。有未發生關係。單想思沒有春風快度的意中人。正臥寐以求因。

日有所思。而竟夜有所夢。在夢境時。無限歡喜。豈知醒來。南柯一夢。怨恨莫名。如此這般的夢遺。體質大受影響外。精神上更是痛苦。並且夢遺十足。是想思病涉魔後的具體表現。非藥物所能醫治。必須病者自以生命爲重。看破紅塵。去邪歸正。或早求有情成眷屬。除此以外。便別無辦法了。

(四) 早洩精液 簡稱早洩。這和遺精病。理情況在伯仲之間。不過早洩必在兩性交接時。男子方面。因身體衰弱。與陰萎遺精……等關係。真的「東亞病夫」。沒有五分鐘熱度。剎那之間。便已洩了精。病重的。甚至陰莖沒有和陰道起摩擦作用。已經「望門投帖」。洩精了。患了這樣的病症。夫婦性生活。根本有名無實。閨房之樂。斷送儘盡。很多女子爲「食色性也」。所驅。不滿丈夫的「銀樣臘槍頭」。公然地或秘密的。另和壯健的男子勾搭。滿足性慾。丈夫們自知短處。只得假作。

癩。放任一着。

男子患了早洩。便成閨房罪人。必須根本醫治。其方法和前述遺精首重攝生相同哩。

五 醫治不育

男子不育症。現社會很普遍。這不但永絕子嗣。並且妨礙閨房情趣。所以男子而不能生殖。確是可憐。可恨。可笑。可恥的呵。

男子不妊。不完全因陽萎。遺精。早洩。等重症。而不能房事。尚有缺乏精液。缺乏精虫。精虫死滅。三大原因哩。

(1) 精液缺乏 這有先天與後天兩種。先天的。是局部沒有什麼反常。龜虫勃起與普通壯男無二。亦可交接。只是不會射精。後天的。生理上並沒缺陷。也有精液。亦可性交。只是不會射精。考其原因。都由房事過度。手淫。性神經衰弱。以致無力射精。更有射精管與尿道管發生了障礙。

(2) 先天遺傳 如射精管鎖閉。這是生理上最大缺憾。無法醫治。如蠱腫瘍。攝生腺肥大。淋毒性尿道狹窄等症狀。那便可藥物與手術並重救濟。男性們不妊。

(3) 缺乏精虫 某一男子精虫。則有無。這可用顯微鏡詳細檢查。便知端的。至於為什麼缺乏精虫呢。不外患手淫。房事過度。酒精中毒。鼠罕丸炎。輸精管炎。糖尿病。以致精虫缺乏了。

(4) 精虫死滅 精虫怎會死滅的呢。當然有牠的原因。有為全身病患者。虛弱極度。與罕丸炎。精囊淋毒性炎。攝生腺分泌液。依慢性……等等原因。以致精虫盤據的大本營——精囊腐敗。精虫使無法生存。同歸於盡。完全死滅了。男子不妊症的閨房自療。與陽萎。遺精。早洩。原理相同。除先天性病器官。陷無法救濟。與後天罕丸炎……等重症。尚可請性病醫生診治。不過

本身澈底治療。仍應注意攝生爲第一要義。呵

六 醫治陰萎

陰萎——便是通俗所稱腎虛的生殖器障
害。是一種特殊的症候。而範圍廣泛。種種病。顯名
思義。便勿牠失去性慾的功能。生殖器萎不能舉
了。

(一) 陰萎原因 本症最大的關鍵。在不
能生育。男女既無閨房之樂。並且滅絕子嗣。所以
陰萎症實爲閨房大敵。凡有患這隱病的人。必須
想法自療。恢復健康。現社會有很多身體特種
衰弱。與房事過度。陰萎不舉患者。自恨惡疾。而輕
身自殺的。

(二) 陰萎種類 依生殖器的疾患。相反
常的陰萎。可分作十數種。器質的陰萎。依生殖器
的反常。畸形或病的變化而得的。這是指那以陰
莖。缺損發育不全。高度的彎曲（這有先天的和

因海綿體炎等疾患而專的兩種。）陰莖破裂。包
莖等原因的陰萎的。也有不是因歇兒尼亞。陰囊
腫瘍。象皮病。陰囊水腫等直接的陰莖疾患。是因
陰莖附近的反常而發生的。但是這一種陰萎。依
牠的疾病程度。不能說絕對地失去了生殖作用。
睪丸反常爲原因的陰萎。這是因睪丸缺損。
萎縮。損傷等事。精液的分秘停止的緣故。但是如
腫瘍。徵毒結核等病。不過侵犯睪丸的一部份的
影響是很小的。

由勃起神經的障害而發生的。多半因性慾
減退。也有完全消滅的。這是因爲攝護腺部。或尿
腺部的。慢性淋疾。和徵毒結核。腎臟病。溢血病。
脊髓炎。肥肝病等疾患。性的興奮完全受了妨礙。
失去性慾中樞的刺激而發生陰萎。酒煙鴉片。砒
素。嗎啡。等中毒。也是原因之一。更因手淫和
性交過度。勃起和射精中樞失了興奮。而生陰萎。

這便名「癡癱性陰萎」。

又有依反射作用的精神障害。因驚悸。苦慮。羞恥。激怒。恐怖等強度的精神感動而發生的陰萎。現代青年雖色情居多。但亦有意志純潔。疾惡肉慾。更恐懼一和女性沾染。便易罹致性病。花柳惡症。心理上常存恐懼。神經感受刺激。日久竟也反常。不期然成了陰萎了。還有用功學問。盡瘁科學。用腦過甚。把精神集中在一方面。這樣情況之下。也有成功陰萎可能。

(三) 陰萎醫治 陰萎不是獨立疾患。另有別種原因。所以醫治。必先探究其原因。治療陰萎不難。而能遵醫囑。遵守攝生。輔助治療。却很費周章。看們簡易而實不克辦到呵。

家庭攝生。刺激性的飲食。不可多吃。更其酒類。咖啡。烟草等。與番東西。最宜戒絕。牛乳。肉湯。雞卵。雞肉。魚肉……滋養料豐富食物。多吃為宜。

此外行冷水浴及冷水擦。也是自強的好方法。神經性的陰萎。應特別把生活弄成秩序。的時。配正確。思想淡薄。清心寡慾。避免身心過勞。漸漸回復元神。適當的運動。雖然也是正當而必要的。但有慢性淋疾。攝護腺炎等病的。遇有運動機會時。該自攷慮。

七 淋病醫治

淋病——白濁 已成都會摩登病了。白色恐怖。佈滿青年心理。上海一埠。二十歲以上的人。沒有患過白濁的人。十不得二吧。足見淋病的普遍性了。

上海私立花柳病院。五步一樓。十步一閣。這種畸形發達現象。便是適應數十萬病家而設的。淋病。屬花柳門。算是最輕微的病。症。豈知因淋菌的游竄。天性的執拗。尤似其匪。牠佔據了人體的下部。便如貼骨之蛆。很難驅逐。牠因為近世醫藥

雖然高明。惟淋病特效藥。尚未發明成功哪。

現把淋病治療方法介紹如下。供一般人自療的參考罷。

(一) 內服主藥 淋病內服主藥。為尿道鎮痛劑。有臭素劑和其他的鎮痛劑。內服和冷浴法。內服藥在急性淋病的初期。是很必要很有効力的。在前多用拔兒撒謨(Balsanum)劑。它的作用沒有完全的殺菌力。只有溶解於尿中。而防止淋菌的繁殖和鎮痛。而限制分泌物的重要能力。這中間主要被(引用)的為骨泔波拔兒撒(Balsanum (opav)) 白檀油。特爾濱油(Olifim Pontio) 止虐兒(Tugoi) 殺虎兒(Sali) 夸夸(Kwakaw)等。

究竟那一種藥最有確實効力呢。這在現在還難斷定。因為藥的作用與人的體質有差異。所以必須慎重地應用呵。

淋病內服藥。總以無礙胃腸為佳。又如烏華葉。挖接特老餅(Vrotiopin) 的利尿劑和沙利先酸納(Natrum. acilyie m) 一類也是常用的藥。

在起初發病時吃藥。並用浴法及攝生法。更整理便道。數日後炎症狀減輕。這時候再開始局部療法才兼顧安全了。

(二) 局部療法 淋病洗滌藥和注入等方法。目的在一個殺盡淋菌。但要不妨礙粘膜。才合條件。具有使淋菌全部撲滅的強烈的殺菌力藥液。在粘膜上細胞裏。無論如何都是有害的。又因淋菌不只在粘膜上面。並且在粘膜下面。且侵入尿道傍一道深的細穴中去。所以使藥液達於淋菌非常困難。

近世醫學昌明。有透熱電療與人工太陽燈。新機械傳導科學。使直接撲滅淋菌。結果各家醫

院雖都採用。但其根治功效。仍沒有人敢保險呵。

(三) 預防療法 有一種名「頓坐療法」的。是在淋病初傳染時。用種種的藥劑。以達消毒的目的。可是這種方法。而完全施行「頓坐療法」。很是困難。因之。只有其名。沒有顯著成功。

編者經驗。淋病預防應用本法。尚有微效。在性交以後。塗上這種強烈的油劑。那確可隔離外襲的淋菌。而防止牠的傳染哩。

(四) 注射療法 局部注射藥劑。計開

- (A) 蛋白銀 (Protargol)
- (B) 可立佛兒 (Choleal)
- (C) 阿巴瑾國高寧 (Argonin)
- (D) 拉爾琴 (Largi)
- (E) 硝酸銀阿爾根太明 (Argentamin)
- (F) 奚溪窩兒 (Tethyolum)
- (G) 溪窩腦兒 (Thyrol)

(H) 青酸酸化汞抗裏搜兒 (Parsol)

(I) 過滿俺酸加里打爾淋 (Ihallium)

(J) 勒索琴 (Resorcium)

除上列各種外。尚有硫酸亞鉛。醋酸亞鉛。索昨沃度兒亞鉛。過滿俺酸亞鉛。明攀單仁 (Tanic) 硫酸銅。硫酸打爾淋。硫基石炭酸亞鉛等等。

(五) 坐藥療法 患了淋病。在閩房內。利用坐藥治療。應用伐克辛。牠雖然沒有絕對的免疫力。可是會生出免疫物質。所以淋病拿伐克辛來注射。也比現社會一般新藥來得有效驗哩。

更有酪素 (Casein) 和 (Calcium) 酪素的效力。經人試驗。並不高明。(Calcium) 劑的用於淋病治療。功效和伐克辛相同。牠更不限於淋病。凡一切發炎的病。都是很有效力的。就消散紅腫。減少分泌的藥劑來說。乃是必要的藥劑。

八 腎丸炎

淋病到了後尿道炎的時候。由於不適當的療法。騎馬。手淫。性交。以及其他操勞。……等等。不注意攝護腺按摩等。遂致淋菌逆着侵入於輸精管及精囊。然後達到副腎丸。而在這裏重新生出急性的有痛病症來。這就是俗稱的腎丸炎呵。

(一) 預防方法 當淋毒進入後尿道有繼發腎丸炎危險的時候。必須恪遵疾病攝生。特別提心預防。絕對避免劇烈運動。衣食住行種種方面都該留神。

(二) 局部療法 腎丸炎初發的時候。機械的療法。藥液注入等。便該中止。患者使用提辜帶。絕對守靜。服鎮痛方劑。施行冷罨法。若在發病兩三天後。就施行溫濕布溫熱療法。等這樣可以迅速治愈。將來不會殘留硬結。(又腎丸炎亦可使用上述伐克辛注射。為非常有效而必須使用

的呵。)

(三) 其他療法 腎治腎丸炎的方法還有很多。鬱血療法。橡皮膏縮帶。水銀軟膏。綳帶。電氣療法。穿刺法。膠質劑。靜脈注射。局部塗布。……等療法。都有相當功效。隨各人的病况體質。而定何種方法比較奏效神速啦。

九 腎膀胱炎

從淋病的傳染尿中混入化膿菌。大腸菌。恥垢菌。便混合而成難治的膀胱炎了。

(一) 病菌檢查 欲知膀胱炎的程度。可自放尿二器至三器。用顯微鏡檢查。裏面有上述各種微菌。與一縷縷小白游絲的。便知膀胱炎無疑了。發病了後。約二十分鐘左右。分尿一回。身發高熱。下腹部隱痛。病重的尿成酸性。甚有排出血尿的。

(二) 自療醫法 治療膀胱炎。以平心靜

氣安臥晏居。保持腰部的溫和為主。服用及烏藥等藥。這樣安詳自療。大概經二星期可痊。機械療法。反以不施為宜。因為過份刺激了。非但於病無利。反蒙江湖醫生之害呵。

一〇 醫關節炎

關節炎也從淋病而起。因淋菌最是活動。游竄體內到處進攻。遇了關節也譁張為幻。使人患關節僵麻。賈斯那樣劇烈的關節炎了。

(一) 淋毒性炎 淋毒性關節炎。大都發生在膝關節。初感劇烈的痛疼。周圍發赤。全部浮腫。緊漲着而陷於運動完全不可能的半屈曲狀態。這時候一用注射器把他刺破。便流出溷濁的漿液體的液狀來。全身發熱。初時達於高度。後來時發時退。沒有一定了。

依適當的治療。經過兩三個星期。便不殘留何等的障害而治愈。淋毒性關節炎。半數是發生

於膝關節。指關節。足趾關節。肩胛關節。肘關節等處。

(二) 自療醫法 治療關節炎。以白檀油和骨湃波拔兒撒漢。或是沃度劑。水楊酸劑的內服。在局部施行冷罨法和溫罨法。為保持關節的安靜起見。可使用副木。高週波電氣。溶感傳電氣。或是鬱血療法。外科的手術等。

醫女性病

吾國婦女傳統多愁工病。加以生理構造。娘兒確似水做的。比較泥做。男子脆弱得多。別且不談。一只此一家。一的月經已夠麻煩。偶然疏忽。不知衛生。從月經上釀成的病症。便不知多少呢。

吾國婦女界對於「食色之性」。素給禮教社會束縛。抵死不敢啓齒。只一人在性慾小路上暗摸。靠各個人的命運。獲得天賦

幸福。或畢生痛苦。這樣的自甘暴棄。真太辜負美麗的人生了。

現代婦女解放。性慾公開。女子的生殖器。雖沒禮教社會認作猥褻。不堪承教。從沒有人研究了。今日兩性性生活。已引起雙方注意。漸知討論了。可是具有這般勇氣的女子。仍不多見。↓下流婦女與皮肉生涯妓女。她們對生殖器的公開。是另一種意識。不能代表正大光明科學精神上。——實則女子生殖機能的爱護。大與人種民族繁殖有關。小則增進男女愛情優美日常生活。論其價值。超然四書五經哩。

編者因在本書中對女子生殖系各種病症。醫理療法專章介紹。使閨房之內。夫妻真享健美幸福。增進兩性愛情哪。

一 月經酸痛

月經。既為婦女的看家本領。生理特徵之一。牠的有病與無病。影響她們健康最利害。可是說也奇怪。月經雖沒有迷信價值。有時却有些神秘。偏偏多病徵呢。

月經酸痛。便是最普遍易犯的一種。經血來潮時。每感腰部零碎痛。重症的。竟像生育臨盆。痛如刀割。也有痛在薦骨。小腹正面。與兩腿酸麻。四肢乏力。胃呆等……現象。無論酸與痛。都隨經來而跟經去。豈非奇怪嗎。

(一) 酸痛原因 月經痛從子宮前屈子宮口狹窄而來的最多見。或為子宮頸管炎症。體狹窄。神經性……等等所引起的。

(二) 閨房自療 月經酸痛的急救醫法。閨房自療。可用芥末溶化。貼在酸痛的地方。約經十分鐘。便可爽然若失。如用麻醉藥品。也有效呵。

二 陰阜無毛

女子下體的陰阜。實際沒有多大功用。只供兩性交接時。避免肌膚正面磨擦。與豐滿隆起。肉感誘人。鼓動淫興……等罷了。阜上之毛。小焉者也。更不屑道了。

(一) 無毛原因。可是陰阜無毛。也是一種病態。雖不與性病完全有關。但終為處女時代的一種隱羞。陰阜無毛。有先天後天原因。發育不良。先天也。與毛髮共同因大病。血虛或年老而脫落。後天也。

(二) 閨房自療。本症閨房自療。可用下方。

Glucosein	二〇〇・〇
堯青丁幾	二〇〇・〇
酒 精	四〇〇・〇
Creolin	一五〇・〇
硫黃華	二〇〇・〇

(把上面五種藥配合成軟膠狀。隨時隨意塗抹患處。有生新毛之效。因為這服外用敷藥。便是生毛藥呵。自製自療。比時報紙廣告。虛偽宣傳的生毛藥。價廉而具實效呵。)

三 陰戶瘙癢

陰戶瘙癢。這是一種惡症。婦女患此者。怎願公開告人。並自脫袴子求醫生診治呢。本症不論處女。婦人。倘染患着了。便瘙癢難忍。利害的療養區域。更從陰戶口。蔓延至大陰唇。會陰。瘙癢和雙股間哩。

(一) 瘙癢原因。本症患者。或由於女子自瀆——手淫——或月經妊娠前後。侵 蟻 蟲 有為子宮加答兒。與子宮癌腫的濃液。及經血和其他不潔物粘着而發生。

(二) 閨房自療。撲滅陰部瘙癢。清潔為第一義。每日局部洗浴。溶解百倍石炭酸水。藥棉

塗飽。貼在癢處。這樣換過五六次後。便可止癢痊愈。

四 陰戶惡臭

水做女人。傳統異性禮讚是香的。甚至婦女居室的閨幽亦稱「香房」。可是現在婦女們有一種陰戶惡臭症。從陰戶發出這樣的婦女。試想有誰再願拜倒石榴裙下呢。所以惡臭不除。影響兩性愛情。大非閨房之福。萬惡臭聲。

(一) 惡臭原因 陰戶惡臭。由於膾加答兒子宮內膜炎的分泌物。或係月經後不潔的剽留。除生理原因外。尚有人爲的要素。凡惰性癩瘡婦女。娼妓。僕婦。女工。等。不洗下體。終年不浴。褻褲污穢。房事後不加洗滌。如此這般。試想怎不釀成臭而且惡哉。

(二) 閨房自療 本症婦女。第一行座浴。清潔下體。用百倍食鹽水洗。倘爲膾加答兒疾患。

還須看所患何病。而用何種西藥哩。

五 外陰毒炎

(一) 發炎原因 少女淋性外陰炎。是惡性傳染的一種。因少女——五六齡至十二三歲的——外陰肌膚嫩薄。一經沾染淋菌。便赤腫發炎。而生潰瘍了。

(二) 閨房自療 淋菌最惡。牠很頑拗。猶如四竄的共匪。所以用硼砂水。來沙耳……等消毒藥水。初起時洗滌不效。潰瘍了後。必須延醫診察。敷用殺菌藥膏。

六 腔道發炎

(一) 發炎原因 腔炎和上述外陰部炎相仿。不過比較加重。而擴大。女子自瀆。手淫。月經來潮。接觸腔道的東西。是不潔物。或亦受淋菌傳染。即便發炎了。(有急性與慢性的分別)

(二) 閨房自療 飲清淡食物。利尿通便。

瀉去體內熱毒。再行座浴。清潔腔部。洗滌用百倍單寧酸水塗的藥膏。處方如下。

Priractun Ra avine 四〇・〇〇

凡士林 五〇・〇〇

(兩藥搗和。塗在沙布上敷患處。又方柯柯

阿路三。〇。Alil〇。五。兩藥搗成小圓

球形。插入腔內。亦有神效。)

七 子宮前屈

(一)前屈原因 本症大概由於先天子宮發育不完全或後天患子宮炎以致子宮變動了正當位置。向前方傾倒着。影響不能妊娠與行經困難神經性病外。對於夫婦交接也缺少快感。損失閨房情樂。實甚可憐呵。

(二)閨房自療 子宮前屈因生理上的畸形。必須利用手術。非藥物可治。不過手術方面現在也少實施。牠的治療。請參照子宮發育不健

全消極療法吧。

八 子宮後屈

(一)後屈原因 這和「前屈」適成反比。因腹部反壓在子宮前面。迫使後屈了。又因處女手淫與常患便秘。膀胱充滿。致子宮韧带弛緩。助長腹壁作用。而後屈發生。薦骨痛。腰痛。下腹充滿。胸悶欲吐。心悸亢進。失眠。幽痛。卵巢痛。行經時上述症狀更劇。既行經困難。又影響不妊。即懷妊亦都流產。本症故亦為閨房之敵哪。

(二)閨房自療 本症也是生殖器反常藥物無用武之地。必須請西醫名手。施用手術。

九 喇叭管炎

(一)發炎原因 因實質炎。子宮內膜炎。外膜炎。卵巢囊腫。淋毒。微毒性潰瘍。骨盤蜂窩熾炎……等症。而發生的喇叭管炎。有急慢性。急性高熱突發。下腹部發生劇烈炎痛。非常利害。慢

性有連續急性而來。有起初便是慢性。本症內從月經發生。故經行停滯。排血困難。子宮出血。喇叭管發炎。膿血流入子宮。很是可憐呵。

(三) 閨房自療 急性喇叭管炎。閨房自療似非所宜。但在家自療。首須使病者身體靜臥。禁止性交。局部放置冰袋。不使便秘。倘有爲白帶所刺激的現象。則用微溫食鹽水洗滌陰道等處。

吾人對於喇叭管炎必須深切注意。因爲牠生病後。管道反常閉鎖。有了障礙。足使婦女不妊。又厭惡性交。每度和男子交接。必感劇痛。這樣不是閨房無趣了嗎。所以不可忽視。遇不幸發生本症時。該請著名醫生澈底根治。免斷送畢身幸福。

一〇 卵巢囊腫

(一) 囊腫原因 本症俗名「脹滿」。初期下腹膨脹。發生便秘。下肢痛。痛而麻痺。一般因有目爲脚氣病的。接着脹至腹部。好似懷孕。因之

肺臟。心臟。子宮。胃腸。都受牠的壓迫。呼吸困難。卵巢的囊腫。同時子宮也生障害。而成慢性子宮內膜炎哩。

(二) 閨房自療 本症非比尋常。病勢兇險。須用剖腹手術。把卵巢完全割去。非高明醫生。手脚慢一些。便侵入空氣。腹雖剖而仍脹滿狀態。因此家屬選擇醫生。千萬注意。

一一 卵巢發炎

(一) 發炎原因 卵巢化膿爲炎。大都受淋菌侵犯。有急慢性。病勢都不輕。因本症每發生於產婦坐褥的時候。故分娩不久。夫婦即行性交。也是釀成發炎的主因。因卵巢發炎時。腹部片面作痛。身體搖動。性交通便……的時候。痛更利害。適當月經前後。更促病勢發展。經量特多。或極少。並因病情延續。蔓延到脊骨。大腿也發痛了。竟成半身不遂狀態。爲了性病淋菌的傳染。與產後提

早同房。以致閨房良友。患此大病。做男子的人該自留神呵。

(二) 閨房自療 卵巢炎屬於急性。又從腹壁或腔部瀉血同時的。可用冰囊貼住腹部。服利便劑。慢性的宜保持病人身心的安靜。能行溫泉浴。可獲天然治療之功。如求本症根本解決。則進醫院切除卵巢。不過這樣以後永遠不妊了。

一二 子宮發炎

(一) 發炎原因 這是子宮實質發炎。以淋菌與產褥腐敗房事過度。月經感冒等等為本原因。亦分急慢性。急性的頻發寒熱。腰部下腹發痛。淋性實質炎。因侵犯喇叭管至腹膜。所以全體發痛。行動都不能了。腸和膀胱也受絕大障害。

慢性的都續發症。其成因為子宮內膜炎。子宮周圍炎。手淫和一切不規則性行為。下腹和脊

骨部也發痛。更有下白帶與月經不順等現象哩。
(二) 閨房自療 急性炎的治療。非同兒戲。必須就可靠名醫診治。在家治療。注意身體安靜。用冰囊冰下腹。或利用水蛭吸取病人身上惡血。慢性的尚宜在家。微溫水中洗浴。能當地有銹質溫泉可供洗浴最好。

一三 子宮生癌

(一) 生癌原因 子宮裏面有癌。豈非奇事嗎。現今年頭。一癌一出。風頭不過。癌非在肝而生。子宮未免太猥褻不堪了。

子宮癌分三種。陰部癌。頸部癌。子宮體部癌。本症是緩性的。起期不大覺得。放任坐大了。後才稍稍感覺。出血與流粘液了。其量隨癌的進展而加多。最後發出惡臭。精神上也不舒適了。子宮頸部的癌。腫起於性交間的鬱血。或隨血管的破壞而出。血經歇時。子宮出血。便是這癌在作祟呵。

(二) 閨房自療 子宮癌治療用手術光線治療法。氣療治血清療治挖開勤治療洗射療治……等結果都能夠根治。實施手術分體式子宮與腹式子宮全部摘出兩種。手術愈早愈好。日子長久擴大了。費力便費較多。

一四 子宮肉腫

(一) 肉腫原因 子宮實質的纖維肉腫與子宮粘膜廣泛性肉腫。也是子宮癌症的相似型病症。患的人比較「子宮癌」更少。這是開口在子宮頸管的時候。那個肉腫性的結節。可以用指頭觸知。因之這容易破碎的腫瘍。初期和間節性肉腫炎狀態相同。每有更年期老婦人。從這種肉腫延長至成子宮癌的。

(二) 閨房自療 除本人自行搔爬這肉腫外。欲求根本解決。可進著名醫院。請醫生施手術。切除這撈什仔肉腫東西。

一五 子宮筋腫

(一) 筋腫原因 子宮筋。便是一種平骨纖維。限制地增殖的。富於新生物結締的那個質。倘是堅硬。缺乏血管帶白色的時候。也名纖維筋腫。子宮筋腫因發生部位不同。而有多種名稱。在子宮粘膜下的筋腫。則把子宮口交互地牽引弛漲。因之感到陣痛。又併發子宮外膜炎。時痛仍斷續。子宮筋腫的腫瘍大起來時。下腹部便充滿和種種的反常。而有兩便不通。患尿毒症或腎腎水腫的。子宮筋腫落到小骨盤內時。又有發生化膿性骨盤腹膜炎的。

(二) 閨房自療 當腫瘍或出血的時候。可自行搔爬和電氣等療治。是行剖腹而切除病原的手術。沒有相當把握。而病况增脹的。還是請求醫生悉心診治為妙。

一六 子宮脫垂

(一) 脫垂原因 婦女生理上的子宮花樣正多。本症脫垂子宮好似一隻袋鼠。陰門很滑落的垂下來。這因產後沒有長遠。便親自過份勞作。腹部受了強壓而發生。也有手淫結果。分娩後骨盤底的組織弛緩。陰管擴大。因之稍受一些刺激。便垂下來了。

(二) 閨房自療 醫治這子宮脫垂的手術。宛似脫肛一樣。懂得門檻的人。一抬便復原位。所以自己沒有手術。還以請教外科醫生為宜。

一七 尿道淋炎

(一) 淋炎原因 這是婦人普遍症之一。淋菌侵入尿道以後。便逞毒炎。像火一般地發熱灼痛。排尿時更是利害。本症因淋菌堅拗。很是棘手。婦女又都怕羞。不願就新式電熱殺菌診治。以致根治的更少哪。

(二) 閨房自療 女性尿道幸比男子短。

淋菌不至深入。所以能內服檀香油。利尿尿鎮痛劑。外插坐藥。忌食刺激性東西。

一八 月經停止

(一) 停止原因 婦人四十歲以上到五十歲光景。月經便閉止了。醫藥上名曰「更年期」。在這時期。可發生大小不同的什麼障害和反常。每隔幾個月。不規則地仍流出多量或少許的經血。這種「更年期出血」。每易發生子宮癌腫。婦人們「更年期」中。有心悸。亢進。頭暈。耳鳴。發汗等。心身兩方面都有些障礙來了。

(二) 閨房自療 四五十歲的婦人。更年期病象。是月經閉止時的迴光反照。所以經過了若干時日。便會照常的。實質上對於上述病態。不煩治療。只要在更年期中。多吃青菜。滋養料。豐富而不厚膩的東西。禁止烟酒。茶咖啡。……刺激性便好。

一九 性交癱瘓

(一) 癱瘓原因 在少女處女膜與婦人陰道周圍的筋肉有在性交時無意識地發生癱瘓性的收縮。因此處女膜和膈括約筋成了過度的知覺敏銳。好似利刀在剛成了不妊和女性的性交恐懼。

這種癱瘓在處女膜作用時。名「處女膜癱瘓」。都因第一個和她交接的男子過於粗暴笨劣的破壞處女膜。裂孔裏殘留着癱瘓性的腫瘍或結節。以致一受到刺激。便會發生癱瘓。

婦人的癱瘓。則屬於神經性恐怖了。也因受了粗暴的性行為。以致永留惡印象。所以強姦婦女的結。最多此種畸形現象。癱瘓利害的婦女。再度性交時。甚至眩暈失神。股和骨盤同受影響。

(二) 閨房自療 欲除掉這種性交時的癱瘓缺陷。可在性交前用百分之五的 Cocain

溶液塗在陰門上。或用 Cocain 溶液浸脫脂棉插入腔內。因 Cocain 的麻痺。是可以免除女性的痛苦。不過在 Cocain 麻痺消散後。仍要感覺苦痛。可使用擴張器張之。

二〇 性不感症

(一) 不感原因 女子對性慾麻痺不感快樂。這種畸形情事。是有她先天和後天的原因的。

(1) 先天原因。性器等萎縮。發育不全。或是缺損反常等。由於神經系病的遺傳等。

(2) 後天原因。卵巢摘出(但有卵巢雖已摘出。性慾並不完全失去。只是交接時沒有健全人的快感而已)。

女性的不感症。是指對於性行為的慾望。雖是普通狀態。只是不覺她的快感。或是不滿足現

在的享受。

普通不感症。男性的滿足太早。女性的快感還沒有來到。因彼此的相左。本可快感的。却不快。感了。倘是性器管原因。則爲兩性的生殖器不能吻合。以致女子感不到快感。

倘以自瀆的手淫。而招致的不感症。因最不正當。便成病態了。頭痛。肩凝。眩暈。食慾不振。下部牽引。下腹部疼痛……等。

(二) 閨房自療 閨房之樂。全在夫婦之如魚得水。所以妻子而不感症。做丈夫的必須探究她病原。才後再治以適當的自療。倘因自瀆而致喪失快感的。該勸導她速即戒除。這反常變態。因男子早期終止。使女子不感者。這責任便在男子。該依電氣療法。藥物療法。關於女性生殖器。障礙新藥除卵藥「賀而蒙」製劑外。還有腦下垂體製劑(男女通用)使兩性同一時間感到

舒快。

二一 妊娠生兒

妊娠便是懷胎。男女性生活所結的花果。哪夫婦性交。固屬優美生活的點綴。但其作用。則在延續子嗣。爲社會負蕃殖人種的責任。男女生殖器構造與妙。性交神祕。萬分性的勾當。前賢雖目爲猥褻。不屑研究。但運用新時代眼光。祕密的正面反面。反很光明哩。

閨房之內。關於生育常識。最須透澈。現在分別說明如下。

(一) 月經作用 婦女月經。每二十八天來潮一次。這指一般健美婦女而言。很多性病隱病。痼疾。與生殖器畸形者的月經期。便大有參錯了。總之。月經行淨後的一週間。婦女性慾最旺盛。這性慾高潮期。最容易得胎。因爲月經具有妊娠的機能呵。(行經期內。必須絕對避免性交。倘不

遵守。便易罹致疾病與煩惱的人事哩。

(二) 妊娠機能 妊娠機能的主要活躍者。為精子與卵子。茲分述如下。

(A) 精子 精子是男性精液中存着的極微小的動物。牠等於毛髮萬分之一那樣細。小肉眼只見牠聚成的液體。必須用顯微鏡放大才得見其動態。

牠由細胞的核和根毛而長成。因為頭是個核。尾是毳毛。所以頭大而尾細長。和蝌蚪有似大小之比。無量數的精子。是沒法計算的。雖在顯微鏡下。也只見牠千千萬萬游着。

精液司理精子活動。輔助妊娠起見。把精液送到卵子居住的女子子宮腔裏。担任神聖的胚胎任務。很起勁的活躍着。這時是帶有黃色粘液的流動體。合着上皮細胞顆

粒。脂滴。和精子。依男性的射精而被排出體外時。牠和攝護腺與高倍爾氏腺的分泌物混合着。而有一種特具的氣味。這氣味一觸了空氣。便生凝固作用了。在精液裏。精子或成羣的運動着。或只有一個在活潑地活躍着。而一直線地突進。目不傍視。這為精子運動的特徵。

(三) 卵子機能 卵巢裏面大小無量數的濾胞名卵子。這是娘兒生殖機能的活寶。在顆粒中的一旁。有名叫卵阜的細胞鬱積部。而做它的中心。一個大的細胞而存在着的。卵子的形體是球狀。而被着透明的膜。藏着蛋黃。含着核的。漸漸的發育。細胞的被膜充滿於血管時。卵子便漸漸地成熟而膨脹起來。被膜是自然地破裂的。這個卵子破裂的成熟。就是二十八日一回月經排泄呵。

閉病因有的久患潮熱而銷其血。或因久發盜汗而耗其血脾胃不。飲食減少新血不生。經便閉止了。

(二) 經閉醫法 婦女經閉症。他的醫治。變化不一。須看各人體質病况而定。現舉其扼要。分別說明供各病家閨房醫療時的參考吧。

(1) 女子身體胖白者如患經閉。她的病。因必是濕痰和脂膜。凝塞的緣故。醫治時以枳實為君。蒼朮。半夏。香附。烏藥。厚朴。牛膝。桃仁。……各味為輔。這才去濕消痰。使脂膜一開。經血自通了。

(2) 黑瘦婦人患經閉症的原因。血枯氣滯。所以宜補血理氣為治。拿歸身。白芍。人參。廣皮。香附。……各味為主。倘因墮胎多產而傷其血。或久患潮熱而銷其血。的那便戒用破血劑。宜以四物湯（見第三項醫方欄第一條四物湯）主治。再以木香。香附。厚朴。甘草。各味為佐。這樣的補血。

理氣。雙管齊下。血液重告活潑。經閉可以不閉了。
(3) 婦女天性溫柔。不過個性強的。也都極易暴怒。氣逆肝火旺。月經便患閉止了。醫治這樣的病症。宜開其鬱而活其血。拿鬱金為主。官桂。香附。木香。桃仁。牛膝。各味作配。煮酒煎服。亦可奏效。

(4) 婦女因食生冷茶。水菓物等而患經閉的。醫治方法。拿官桂為主。以乾薑。木香。厚朴。香附。紅花。歸尾。……為佐。倘因冷水坐浴而患經閉的。則可拿附子為主。官桂。木香。山查。桃仁。當歸。乾薑。川芎。各味為副。這樣識正病源。用藥恰當。奏效很是神速呵。

(5) 每有一種少女。外貌看去。尚是健美。了無異態。到了及笄年華。天癸不至。但飲食如常。國人迷信胃口。家長見女兒食慾很佳。便以為非病之兆。這實是大誤。須知少女有上述癡象的。是

爲氣血未足。以致月經不至。必須延醫診治。攷察她的病源。處方服藥。內感痊愈。生理機能健美。無缺。氣血充盈流暢。月水便來潮了。

已婚少婦。月行經的。條忽停止。但非懷胎的十月病。這是一種變態的「暗經」。一月信到期。必作腰痛。或吐逆嘔吐的。這名「倒經」。該以當歸大黃湯施治。

(6) 名媛閨秀。經水已通。某月信期。却又不來。這雖是疾病之癥。但須看她有證無證。並驗她有疾無疾。倘面色不改。飲食如常。身不發熱。是名「歇經」。不需要服藥的。疾病。是因血份不足。呵。若是面黃肌瘦。蘊積內熱。那便是少女童子癆了。該診她的肝脈。弦出寸口。卜魚際。非藥所能治。做家長的。萬勿固執。趕快順勢利導。道之出關。和異性成婚。男女好合了。後陰陽自和。經便行而病即去。倘不這樣辦法。女子童癆。比較男子童癆。

更兇。生命犧牲。十死八九呵。

有的氣血不足。也面黃肌瘦。常帶微熱。雖然纏綿數年。仍可服藥而得治癒。不過切忌用破血猛烈方藥。像山甲三稜蓬朮蟲蟲……等味。只可用補血生津之劑。以四物湯歸脾加減總之「歇經」。患者。都因婦女心胸狹隘。與某種慾望不遂。少女懷春。情思雜亂。或寡孀尼姑。孤衾獨宿。苦度歲月。淒涼萬狀。心懷鬱結。醫治方法。終以理經開鬱爲主。

(7) 婦女經閉。血海虛寒。小腹冷痛的。宜服大溫經湯。氣血虛損。外發潮熱。頭痛背重。肢體倦怠。五心煩熱。心忡面赤。口燥神焦。腰背酸疼。盜汗勿已者。宜服丹皮散。如氣血凝滯。腹中痞塊。腰腿重疼的。宜服通經六合湯。或紅花當歸散。逐瘀生新。通經活血。也有胃氣不調。貌本壯美。飲食漸減。使胃氣不調。也能使婦女經水不通。當用異功。

散道遙散間服。異功散主消食健脾。使飲食加而元氣復。道遙散使氣血和而經自調。大凡婦女經閉到了骨蒸潮熱。永閉勿行。脈七八至。骨肉消瘦等種種現象。完全暴露。這已是危殆死症。雖有名醫仙藥。也嘆病入膏肓。無法挽救了。

(三) 經閉醫方 經閉醫法。備如上述。參酌診治。伊證融會貫通。於閨房之內。有婦女患此種病症時。大足為治療的參攷。現在再錄醫方數種如下。

(1) 四物湯 熟地三錢。當歸三錢。白芍三錢。川芎三錢。(上藥四味。清水煎服。)

(2) 歸脾湯 人參一錢半。白朮七炒二錢半。棗仁三錢五分。茯神三錢。黃耆一錢半。當歸二錢。遠志二錢。木香一錢七分。炙草一錢五分。龍眼肉一錢五分。(上藥十味。加薑棗。清水煎服。)

(3) 大瀉經湯 鹿茸一錢五分。香附二

錢。沉香二錢五分。白朮一錢半。陳皮三錢。熟地一錢。當歸一錢。白芍一錢七分。川芎一錢七分。吳茱萸二錢。小茴二錢。茯苓二錢。元胡三錢。人參五分。甘草一錢。(上藥十五味。清水煎服。)

(4) 丹皮散 丹皮一錢五分。肉桂二錢五分。歸尾三錢。元胡三錢。牛膝一錢五分。赤芍一錢七分。三稜二錢。蓬朮二錢五分。(上藥八味。清水煎服。)

(5) 通經六合湯 熟地一錢。白芍五分。當歸七分。川芎一錢。半夏五分。茯苓七分。益母五分。貝母五分。白朮七分。知母七分。紅花一錢。(上藥十一味。清水煎服。)

(6) 紅花當歸散 當歸五分。紅花七分。桃仁一錢。元胡七分。川芎一錢。小茴一分。鬱金五分。(上藥七味。清水煎服。)

(7) 如聖散 棕灰。薑灰。烏梅。(上藥三

味。各五錢。清水煎服。兼治崩漏不止。

(8) 逍遙散。當歸二錢。白菊三錢。茯苓二錢。白朮錢半。甘草三錢。柴胡錢半。薄荷二錢。丹皮錢半。山梔二錢。上藥九味。清水煎服。

(四) 化氣歌訣。吾國醫藥具有哲學的術數。習醫初步。一本草綱目。之前。像習珠算般熟讀「湯頭歌訣」。現在對於經閉病亦有「化氣歌訣」。這不但為醫生們治療的總訣。並且為閨房醫療的金科玉律哩。識字婦女讀了本歌訣。參透玄虛。已病的可以減病。無病的可以不病。茲錄如下。

大凡女子稟性偏執。若欲治病。先戒性急。或因怒氣。或因憂鬱。變生痰怒。氣傷血。或為疼痛。或為淋疾。淋有五種。變為五色。若欲無病。經水要正。月應乎天。水應乎地。一月一來。如期潮信。懷孕安胎。坐草理順。經或不

準。前後當訊。參前屬熱。落後屬寒。熱當清涼。寒宜助溫。血熱血虛。或清或補。有孕得疾。先保其胎。次調其疾。宜無後延。及產後。疇能救哉。新產之後。醫法有餘。先去惡露。後當補虛。補虛太早。穢不能除。惡心氣喘。瀉利汗珠。此為四惡。扁鵲難醫。症見一惡。病亦難起。小心醫治。免死而已。十月懷胎。一朝坐草。瓜熟蒂落。慎勿起早。無知婦女。昏愚。嫗老。非理催逼。反成煩惱。叮嚀戒爾。守此正道。孕婦之脈。堅強最妙。細而微。濡命恐難保。新產之脈。沉遲細小。倘遇洪大。其症必倒。敗血衝心。語言亂道。或笑或歌。佛名神號。痰犯心包。同是狀貌。敗血攻心。始終煩惱。龍齒參歸。十神湯效。痰犯心包。昏而有覺。重加芥連。導痰湯較。或夾疾病。先慎風寒。痰溷油膩。萬勿加餐。病久危困。先喻其難。醫為仁術。細審病端。子懸子

胃子煩子瀰治各有條。不容遺漏。已經懷孕。月水來血有餘也。名曰胎漏。生子不實。腹中有塊。血氣之鬱。溫血益氣。削除其積。元氣若虛。且從姑息。虛弱之證。自汗骨蒸。參耆胡連。治之量情。神仙妙術。起死回生。悉心體之。用無不靈。

(一) 經前醫理 婦女經事未到四七二十八日正軌經期。却先十日或五六天便來潮了。這種超越正常月經的病症。簡稱「經前」。本症病因在熱。有血熱過度。與氣血太多。傷入血海兩種。血熱而小腹不痛。這是患火熱之徵。前代名醫王肯堂曰：「月事先期而來。血熱必帶紫色。或先或後。血色淡而稠粘者。痰也。將來而先腰痛者。血海空虛而氣不收攝也。或止或來無定期者。因氣不調。故血亦隨之為行止也。或一月兩至。或數日一至。乃氣虛而血熱也。或經年之後。累數日而不

能止者。乃血海脫滑。兼有火以動之也。既止之後。隔兩三日而復見微血者。以舊血未盡。為新生之血所催。故不能容而復出也。明理者觀之。即可以施治矣。」故名醫王氏之言。簡賅扼要。乃是經前病理確論。

(二) 經前醫法 醫治經前症。明瞭了上述病理後。便可對症下藥了。凡身體發熱。經色紫紅。其脈洪數。宜用涼血地黃湯。虛熱病者。則用逍遙散。或補中益氣加黃柏知母。或四物湯加陳皮香附黃柏知母。醋和丸服。腹中冷痛的。禁忌寒涼。醫治該用五積散。病者倘然泄瀉的。先理脾胃。兼有咳嗽的。逍遙散加川貝。氣血多而傷血海的。便患腹痛了。故宜補血行氣為主。慎用涼藥。以歸附丸及藿香正氣散兼治。有婦人四十歲。外月經二三日一來。這精的經前頻數。實為可惡。變態。日子長久了。必成淋病呢。

(三) 經前醫方 本症醫方計開涼血地黃湯。四物湯。逍遙散。五積散。歸附丸。養血正氣散。……等。四物湯。逍遙散。已見上節。經閉病欄。其他各方選錄如下。

(1) 五積散 白芷一兩。陳皮三錢。厚朴四錢。當歸二錢。蒼朮三錢。麻黃一錢。川芎一錢。半白芍二錢。官桂三錢。桔梗二錢。甘草五錢。(七藥十一味。清水煎服)

(2) 歸附丸 當歸。附子。(七藥二味。份量相等。視病清輕重而定。約自三兩至一兩五錢。和研細末。搗和爲丸)

(一) 經後醫理 婦女月經到了正軌期後。才涓涓來遲。原因有三。(1) 血虛。(2) 血寒。(3) 澀滯。血虛的腹部不痛。身體微熱。如有腹痛的。那是空痛。而非實痛。血寒患者。從脈象上測知。浮大無力。微濡。孔細爲虛象。沉遲弦緊。則寒

象也。澀滯病。因都由氣血兩虧。以致來潮不多。不濃。體過虛弱。經色黯淡。得很呢。

(二) 經後醫法 醫治經後病起血虛空痛的。宜服生氣補血藥。八物湯。加香附。血寒的。服歸附丸。又四物湯。加香附。艾叶。五味。麥冬。亦可治。理血淡而稠粘的。以化痰爲主。二陳湯。加香附。生薑。砂仁。倘經水將來而腰腹痛疼的。以行氣爲主。拿木香爲君。佐以枳殼。香附。與四物湯煎服。經水將來而腰腹痛的。補血爲第一。熟地作君。以當歸。白芍。人參。蒼朮。川芎。茯苓。香附。陳皮。甘草爲佐。有一月兩至。或數月一至的。補血涼血爲主。以八物湯。加黃連。山梔。龜板。炒蒲黃。施治。倘經止經來。沒有秩序。捉摸不定的。應當調氣。拿香附爲君。陳皮。烏藥。砂仁。艾叶作配。與四物湯併同煎服。經來數日不止的。炒黑山梔爲君。炒蒲黃。地榆。炭。牡蠣。側柏。香附。同煎。飲服。經期歸正。過了二三日後。再見

徵血的以四物湯為主。加香附。陳皮。甘草施治。本症病狀輕的。便是不服藥也無不可。只要注意攝生。自能和。健康月經無異了。

(三) 經後醫方 主治經後的醫方。茲錄如下。

(1) 八物湯 熟地三錢。白芍二錢半。川芎四錢。當歸二錢。白朮三錢。人參一錢半。廣皮二錢。半夏二錢半。(上藥八味。清水煎服)

(2) 二陳湯 半夏三錢。茯苓二錢半。陳皮四錢。甘草五錢。(上藥四味。清水煎服)

(3) 醋煎散 赤芍三錢。烏梅一錢半。甘草四錢。香附三錢。三棱二錢半。蓬朮三錢。官桂四錢。(上藥七味。加醋半杯。清水煎服。血多加當歸。紅花。青皮)

(4) 艾煎丸 白芍三錢。熟地三錢。艾叶四錢。川芎三錢。人參二錢。石菖蒲二錢。(上藥七

味。共研為末。醋糊成丸)

(一) 痛經醫理 婦女月經期間。小腹作痛的。是名「痛經」。總因氣血澀滯也。這種腹痛。有屬血虛有寒。或屬血瘀氣滯。或屬血虛有熱。或屬脾經血虛……原因很多。全視病者從何得病。哪。

(二) 痛經醫法 醫治痛經。凡氣血澀滯的。用四烏湯。行經腹痛的。恐有血瘀氣滯。不必驟補。先用四物。加陳皮。香附。再用八物湯。加香附。病瀉的。先止其瀉。痛可自止。經行時。每感頭痛。心忡。飲食減少。肌膚不潤澤的。宜加減吳茱萸湯。也有衝任虛衰。小腹有寒。月經過期。不能受孕的。大溫經湯。主治。有經水過後作痛的。這是血虛有寒。法當溫經。養血。四物湯。加桃仁。香附。肉桂。有經行著氣。心腹腰脅疼痛的。血瘀氣滯。該先順氣。消瘀。青皮。當歸。白芍。桃仁。紅花。川芎。烏藥。清水煎服。治血

虛有熱。先生血清熱。四物湯加桃仁。香附。丹皮。甘草。元胡。經氣虛空痛。可先調養氣血。宜用八珍湯加薑棗。如有經水過多。久而不止。腹痛的。宜補血健脾。四物湯加白朮。茯苓。木香。厚朴。香附。陳皮。乾薑。甘草。清水煎服。

(三) 痛經醫方 痛經的治法。已如上述。很簡要詳明了。病家衡情參治。保證定有靈效。現再將醫方公開如下。

(1) 四烏湯 烏藥三錢。當歸二錢。三棱三錢。半文朮四錢。半赤芍二錢。紅花五錢。桃仁三錢。官桂四錢。益母草二兩。香附三錢。(上藥十味。清水煎服。)

(2) 吳茱萸湯 吳茱萸。人參。大棗。老薑。(上藥四味。分量相等。煎湯飲服。)

(3) 八珍湯 熟地三錢。白芍四錢。川芎五錢。當歸五錢。人參二錢。白朮五錢。茯苓三錢。半。

甘草五錢。(上藥八味。煎湯飲服。)

(4) 四物湯 熟地。白芍。當歸。川芎。(上藥四味。分量相等。清水煎服。)

(一) 熱經醫理 婦人的月經。怎樣發熱的呢。得這病症的人。定是產後瘀血未淨。與吃了生冷的東西。像水菓。冷飯。冷粥。冷水……等等。醫云：「血見水則滯。水遇血則凝。」所以經便阻住。不流通。停頓在腹中發熱了。

(二) 熱經病象 凡患這熱經病人。初起時。身體潮熱。接着頭眩。目暈。口苦。舌乾。不思飲食。肚子內結有硬塊。好似雞蛋般大小。或左或右活動。(注意) 病者咳嗽。生痰。泄瀉不止。肌肉消瘦。這是危象。十九不治。

(三) 熱經醫法 本症初起。即治容易。否則二三月內。尚易着手。時日過久。便費力了。哪牠的治法。不外先將逍遙散。加石蓮子。天花粉。龍胆。

草退潮熱後用紫金丸破瘀血。

(四) 熱經處方

(1) 逍遙散 白朮五分。甘草七分。茯苓一錢。蘇薄荷一錢。當歸一錢。白芍一錢。柴胡五分。(水煎不拘何時都可進服)

(2) 紫金丸 陳皮五錢。良姜八錢。菘荒八錢。檳榔六錢。砂仁六錢。紅豆六錢。枳殼八錢。烏藥八錢。三棱一兩。米糊為丸。飯後米湯送下。視病症輕重與時日久暫從各服十九至五十九

(一) 病經醫理 吾國婦女十四五歲而

行天癸。從此每月一潮。身強體健者。經血充盈。衰弱患病的。其量或多或少。沒有標準。這由於陰血內衰。氣份兩虧。以致成病呵。

(二) 病經病象 凡本症患者。面色萎黃。沒有少女青春美。五心發熱。臨經的時候。小腹隱

然作痛。腹到腿灣。又或痠麻。頭暈眼花。健忘失眠。眼角露青。唇白齒黃。胃納呆木。經量多少。沒有常軌。

(三) 病經醫法 婦女經水不調的醫治方法。先用清涼散退煩熱。再用調經四物湯約連服一月可癒。

(四) 病經醫方

(1) 清涼散 黃芩一錢。知母一錢。當歸一錢。丹皮二錢。白芍一錢。(河水煎不拘任何進服)

(2) 四物湯 當歸一錢。生地一錢。丹皮一錢。白芍二錢。香附一錢。砂仁一錢。川芎五分。黃芩二錢。(加生薑三片。河水煎空心時服)

(一) 瘀經醫理 婦女月經。以鮮紅如春潮為正常。倘有紫黑若豬血。凝成條形或塊的。是為行經挾瘀之癥。因病者生產時瘀血沒有排洩

清楚。或在平日體內存積濕瀉內感伏邪。氣份下
達便混入經期。挾瘀而致此種現象了。

(二) 瘀經病象 凡本症患者。所下之經
血。其色既發紫黑。與成血絲。血塊。行經時小腹痛
痛。但亦有不痛的。面色青黃。不思飲食。懶於
操作。疲倦欲眠。

(三) 瘀經醫法 本症治法。用金狗丸破
瘀扶元。使其生新。調勻轉正。

(四) 瘀經醫方 金狗丸。當歸二兩。金毛
狗脊二兩。肉桂五錢。川芎一兩。熟地一兩。川續斷
二兩。地榆二兩。阿膠一兩。茯苓一兩。(上面九味
國藥。共研成細末。米糊成丸。空心溫陳酒送下。視
症勢輕重。每服十九至二十五丸。)

(一) 逆經醫理 患逆經的成因。以熱毒
過份利害。血熱便亂。行經水倒逆。從口鼻流出。不
循陰道。這樣的。以下犯上。試想多麼污穢。褻瀆啊。

(二) 逆經病象 逆經患者。頭痛口燥。每
熱至發昏。體如火炙。眼露紅筋等等。

(三) 逆經醫法 對於逆經的醫治。必須
格外注意。先清涼其血。切戒進補。宜用犀角黃芩
湯。後輔服黃蓮丸。如此雙管齊下。定有神效。

(四) 逆經醫方

(1) 犀角黃芩湯 犀角一錢。枳殼五分。
百草霜一錢。生地二錢。白芍五分。橘紅一錢。淡青
芩二錢。甘草二分。丹皮一錢。桔梗五分。(加生薑
三片。清水煎服。)

(2) 黃蓮丸方 川黃蓮(去鬚微炒) 七錢五分。
黃柏(微炒) 七錢五分。厚朴(去皮
生薑汁塗炙使發香) 七錢五分。乾姜(泡製) 五錢。
木香(勿見火) 五錢。地榆五錢。阿膠一兩。
(上面八味國藥。共研細成末。蜂蜜搗和。搓丸。每
服二十九。)

(一) 漏經醫理 婦女的月經。紅潮到臨時。却如房屋漏水。滴滴落落……患這病的原因。元氣虛寒。子宮內的瘀血。沒有排淨。以致釀成漏經了。

(二) 漏經病象 漏經患者。五心作熱。口苦舌乾。遍身疼痛。飲食見呆。經盡的時候。又有略見白帶的。

(三) 漏經醫法 經的所以如屋漏。這因氣血不充。才若斷若續了。應用生新血。破瘀血。為主。再培養元氣。使元神充足。重告溫和。是能獲痊哪。

(四) 漏經醫方 溫經湯 白朮五分。肉桂五分。乾姜七分。甘草二分。丹皮二錢。白芷五分。當歸一錢。熟地一錢。阿膠二錢。生薑三片。(清水煎。空心服)

(一) 紫經醫理 婦女們的月經。有的其

色和猪肝一般紫色。這也是病癥啊。原因生產勞傷。久病癆瘵。以致氣血敗壞。變成這種可惡顏色了。

(二) 紫經病象 本症患者。五心煩熱。頭目昏迷。遍身疼痛。不思飲食。惡心嘔噦。

(三) 紫經醫法 婦女經色猪肝者的治法。該先用龍腦湯。退其潮熱。再內服當歸丸。調其經水。使下月行經。便轉鮮紅正色。

(四) 紫經醫方 (1) 龍腦湯 薄荷一錢。茯苓五分。人參五分。地骨皮二錢。白芍一錢。川芎五分。(清水煎服)

(2) 當歸丸方 阿膠二兩。杜仲二兩。乾姜一兩。肉桂一兩。川斷二兩。當歸二兩。附子一兩。蒲黃一兩。白芍二兩。熟地二兩。茱萸五錢。甘草五錢。(以上主藥十二味。共研成末。米湯搗糊。搓丸。

空心鹽湯送下。輕症日服二十九。重症加倍。

(一) 黃經醫理 婦女月經有的不紅而黃。有似泥汁。種種變態。由於傷了食胃。脾熱經燥。士不能生血。以致有此現象。

(二) 黃經病象 凡患黃經症者。經色發黃。肌肉消瘦。面色以致全身皮膚病重的。都如黃紙。眼膜亦黃。胃納不佳。感覺遲鈍。常感疲勞。

(三) 黃經醫法 治黃經探得病源後。該先理食胃。驅脾蘊濕。降除五心煩燥。故先用黃芩湯。後用理脾順氣湯。這樣治療。使血調經勻呵。

(四) 黃經醫方

(1) 黃芩湯 蒼朮五分。川芎五分。當歸一錢。花粉二錢。甘草二分。黃芩一錢。白芍一錢。(清水煎服)

(2) 理脾順氣丸方 沉香二兩。小茴香二兩。草菓二兩。砂仁三兩。三棱一兩。大茴香二兩。

枳壳一兩。良姜一兩。莢朮一兩。白芷蔻一兩。烏藥二兩。陳皮一兩。(以上主藥十二味。共研細末。米糊搓丸。空心米湯送下。每服三十九為度。)

(一) 綠經醫理 婦女的月經。真是神奇的東西。世界各國對牠發生不少迷信了。豈知病症方面。更千變萬化。五花八門。像本症的「經水翠綠」。便是鮮紅的月經。却成青菜一般。如古銅綠之顏色。豈非大不相同嗎。查本症病理。由於婦女們的子宮陰冷。氣血大虛。以致釀成。

(二) 綠經病象 本症患者。面色發青。手脚寒冷。胃口呆木。動作遲緩。趨向悲觀。沉靜陰慘。

(三) 綠經治法 治療翠綠色經水。對於病人必須注意她的體格。倘這人馬肥胖的。那是體雖盛。而血則衰。忌用涼藥。該以烏雞丸散。

(四) 綠經醫方 烏雞丸方 天雄一兩。附子一兩。黃肉一兩。當歸一兩。白芍一錢。茯苓二

兩。從蓉二兩。熟地二兩。川芎八分。肉桂五分。甘草五分。鹿血片一錢（上主藥十二味與白絲毛烏骨鷄肉四兩同作藥末晒乾研爲細末。米湯糊成丸。空心陳酒送下。日服五十九分。晨午晚三次。）

（一）氣經醫理 婦女行經之前。感到氣血不和而作痛。這是血海在作祟。因爲頑痰與新血陽血相驟。以致犯了氣份。作痛了哪。

（二）氣經病象 凡經前氣痛患者。時感頭眩。嗚咳。胸格不舒與身發潮熱……等等。

（三）氣經醫法 治療本症。先用紅花全歸散。化瘀血。出子宮。再涼血。海化痰。使新血陽血與頑痰不再相擊。血海平靜。則永不作痛了。

（四）氣經醫方 紅花全歸散 紅花二錢。全當歸二錢。芫花五分。赤芍一錢。川芎五分。牛膝二錢。蘇子二錢。三棱一錢。莖朮一錢。（清水煎。

空心温服。）

（一）虛經醫理 婦女經後腹痛。適和上節成一反比。原因腹中之血去盡。仍作虛空疼了。

（二）虛經病象 略同前。不過沒有潮熱。

（三）虛經醫法 治療本症。該審問病者有否吃過姜椒鷄糜和一切熱性的東西否。倘吃過的。該用清涼劑去虛中熱呵。

（四）虛經醫方 四物湯 當歸。川芎。熟地。白芍（上面四樣主藥。分量相等）——輕病各一錢。重病各錢半或二錢——（清水煎服）。

（一）催經醫理 婦女月經一月一行。本有定期。但本症催前。失去康健正確標準。所以先數日便來。大都血熱與氣實或氣虛所致。

（二）催經病象 本症患者。病象不十分顯露。大都和康健者一般。

（三）催經醫法 本症成因。既爲血熱。所

以用涼劑治之。實者用黃芩芍藥散。虛者用內補當歸丸。

(四) 催經醫方 內補當歸丸 當歸一兩。乾姜一兩。白芍一兩。肉桂一兩。川芎一兩。阿膠一兩。熟地(酒洗)一兩。附子一兩。萊菔五錢。甘草五錢。蒲黃一兩。續斷三兩。(上主藥十二味。共研細末。用蜂蜜搗和。搓丸。鹽湯或酒送下。每日以服三十九爲度。)

(一) 週經醫理 有一種婦女。她的月經變了半月。經與十日。甚至週經。因爲一月二行。三行。四行。捉摸不定了。本症成因。由於腎虛不能攝血所致呵。

(二) 週經病象 凡本病患者。呈精神困倦。面色痿黃。頭眩眼花。腰膝痠軟。……等現象。(三) 週經醫法 治經期腹痛。該用歸經湯。使其正常。

(四) 週經醫方 歸經湯 大生地四錢。當歸三錢。白芍三錢。山萸肉三錢。續斷二錢。杜仲二錢。荆芥炭錢半。(清水煎服。)

第二章 閨房女病

吾國婦女傳統多愁工病。向以「病態」爲美的。所以伏處閨房。時在三分小病之中。便是現今健美潮流下的新女子。雖不致弱不禁風。但求真合健美標準的。除極少數運動場上女選手外。其他各界女子。依舊有些菜色呵。

婦女病症。因比男子爲多。本書是「閨房醫鑑」。「男女寶典」。對於婦女病方面。是須偏重些。因於月經。妊娠。生產。胎前。產後。等婦女「專利病」。外。再列本節。把不屬上述各門的病。症。特加介紹。貢獻診療方法。又因婦女閨房所患。近今的性病。很是流行。故分別輯入。俾春閨怨女。房幃蕩

婦抱這隱私的。不須諱疾忌醫。可單獨參證。相機自療呵。

(一) 血膨醫理 婦人血恆有虧。所以每月能大出血一次。流出月經而不致為病。閉塞不通。血積體內。反作祟不安。凡有這種病因的名「血膨」。便是血液膨脹。先小腹脹起。久則上連中脘。緊脹如鼓。青筋綻露了。本症有因氣食所成。但氣食之膨。腹雖脹而經不閉。所以經閉的定是血膨啦。又因產後惡血不下。逆而上升。滲入肌膚。充滿在中宮。甚至上騰於面。而成充色的。這是必死之象。切須注意及之。

(二) 血膨醫法 血因瘀積而膨脹。所以首須破瘀通經。用桃仁。厚朴。當歸。紅花。香附。元胡。肉桂。丹皮。乳香。木香。牛膝。小茴。砂仁。等有腹腹痛。頭疼。身發寒熱的。加減五積散以治。如手足麻痺。寒熱目眩。照前方去乾姜。加羌活。獨活。白芷。當歸。

官桂。麻黃。川芎。白芍。陳皮。蒼朮等。又有赤白帶下。子宮虛寒。宜以艾附暖宮丸治。更有病勢加劇。血海寒冷。帶下似魚腦。面黃肌瘦。四肢無力。頭暈眼花者。該服補經湯。

(三) 血膨醫方 血膨醫方計有下列兩種。

(1) 艾附暖宮丸 艾叶二錢。香附四錢。元胡一錢半。熟地一錢八分。甘草一錢。上藥五味共研為末。醋糊成丸。如桐子大。每服二十九米湯送下。

(2) 補經湯 人參二錢。白朮二錢二分。川芎一錢半。香附二錢。當歸二錢。熟地一錢八分。元胡一錢。肉桂二錢半。吳萸一錢八分。砂仁二錢。茯神二錢。沉香二錢。阿膠半兩。黃耆一錢半。小茴一錢。陳皮一錢二分。白芍一錢。上藥十三味。外加紅棗六枚。清水煎服。

(一) 血熱醫理 熱入血室。婦女患此。很是危險。為閨房重症。凡感冒發熱惡寒七八日。熱除脈遲。身涼。胸脅滿。譫語。是為經水適來。血海大開。熱邪乘虛入于厥陰藏血之室。肝主理熱。邪內擾神明。所以胸滿譫語。如見鬼狀。熱入血室發熱。有晝靜夜重的。也有虛實不同。血虛發熱。因營血不足。如陰虛而熱之證。脈必細數。血熱發熱。邪熱到了血分。脈必數大。這是該分辨清楚的。

(二) 血熱醫法 熱入血室的醫治。據吾國歷代醫書上說。『當刺期門。隨其實而瀉之。』刺期門。厥陰所注之腧。瀉其熱。以外泄仲景以小柴胡湯和之。『家秘』書上。主張倍加柴芩。重加歸芍。其功最專。另加丹皮地骨皮。身熱更易。退陰虛內熱之症。宜補血涼血兼治。血熱邪熱之症。不必補血。歸芍柴胡湯或導赤各半湯治。

(三) 血熱醫方 熱入血室醫方。柴胡湯

已見他條不贅。茲錄導赤各半湯如下。

黃連三錢。黃芩三錢。犀角五分。知母二錢。滑石一錢。八分。麥冬二錢。人參一錢。茯神二錢。甘草一錢。(上藥九味。加燈芯。棗漿清水。一同煎服。)

(一) 血崩醫理 鄭文康曰。『婦人暴崩下血。此因腎水陰虛。不鎮制胞絡相火。故血走而崩矣。此症多起於內傷。血崩證有二。說瘀血也。空痛也。瘀血者。體必作寒熱也。空痛者。不作寒熱也。瘀血則當去。空疼則當補。亦有血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。血氣成塊而得之。又有血氣損而得之者。凝聚成塊。七藏八癢。上則氣逆嘔吐。下則瀉痢。五血婦人血崩不止。乃衝任虛弱。藏府虛冷所致也。凡去血過多。氣血不足。四肢倦怠。血漏血脫。此古聖之心法也。』

(二) 血崩醫法 血崩的醫治。因本症勢甚兇猛。所以很是繁重。茲分述如下。

凡血崩而屬涼性的地黃湯治之。倘小腹作痛。則用八物湯。血氣成塊。用神仙聚寶丹。血崩患者。服湯藥不效。屬火。三黃湯治之。去大黃。加黃柏。血崩不止。小腹急痛。兼下赤白帶。宜加減吳萸湯。或艾煎丸。氣血不足。四肢倦怠。可拿四物湯。增損。先補胃氣。以助生發之源。諸甘藥為之。先務。益胃。升陽。湯是也。這藥有人誤會。補氣。欲知。甘能生血。這也是陽生陰長之理也。又人身以穀為寶。藥材須看牠食量的多少。而衡輕重。務使藥氣勝於穀氣。如腹痛。加烏藥三分。官桂少許。患口渴的。加葛根三分。如婦人年老血崩。八物湯加芩連。是為急救妙藥。不過須顧及病者胃氣。血崩而服藥劑。不止。換用散子藥。如棕灰。鍋底墨。炒黑山梔。槐花。側柏人參。黃耆。甘草等為末。童便送下。改做為丸亦可。

經曰：「帶下血崩。脈多浮動。虛澁者生。實數

者重。訣曰：生地合蒲黃。黃芩黃柏涼。人參兼五味。解毒細煎湯。水養空心服。崩中帶下良。暴者屬血熱。宜養血清火。治宜溫清散。血崩月久屬虛寒。又宜溫補。宜益母湯。其才口脈弦而大。弦則為減。大則為亢。減則為寒。亢則為虛。寒虛相搏。此名曰革。

（三）血崩醫方 血崩醫方彙錄如下。

（1）溫清散 歸身四錢。熟地五錢。白芍

二錢。半黃連五錢。黃芩四錢。川芎三錢。山梔炒五

錢。黃柏鹽炒一錢。（上藥八味。清水煎服。）

（2）益母湯 熟地三錢。陳皮四錢。香附

二錢。半阿膠一兩。益母草二兩。白朮五錢。蒲黃一

錢。甘草五錢。黃芩一錢。（上藥七味。水煎空心服。

本方治涼血補血最效。）

（3）五灰散 蓮房灰。黃絹灰。血餘。百草

霜。棕灰。白芨。（上藥五味。分量相等。共研為末。蜜

和爲丸。米湯飲下。治涼血止血最效。

(4) 赤石脂禹餘糧湯 赤石脂煨一兩。禹餘糧煨一兩。牡蠣一兩。烏鰂骨一兩。(去甲)。

伏龍肝一兩。上肉桂一兩。(上藥六味。分量相等。共研細末。用酒調服。)

(5) 梟柴散 本劑係丹方。每歲用地粟一個。燒灰存性。研服。溫酒送下。治婦女血崩最效。

(6) 補宮湯 (一) 熟地三錢。白芍五錢。阿膠二兩。地榆二錢。艾叶四錢。川芎三錢。歸身五錢。(上藥七味。用水煎服。治身發寒熱之血崩最有效。)

(7) 補宮湯 (二) 赤石脂八錢。地榆五錢。歸身四錢。艾叶四錢。甘草七分。石菖蒲一錢。白芍五錢。川芎三錢。蒲黃炒三錢。熟地四錢。小蘗五錢。(上藥十一味。清水煎成半盃。熱陳酒沖服。)

治崩淋衝任虛損最效。

(8) 益胃升陽湯 人參五錢。白朮八錢。黃耆五錢。當歸七錢。陳皮四錢。黃芩三錢。升麻四錢。柴胡六錢。甘草五錢。外加神麩一塊。薑三片。紅棗六枚。(上藥九味。與外加三物。清水煎服。)

(9) 三黃湯 黃芩黃連黃柏鹽炒。(上三味藥。分量相等。視病情輕重。加減。從一兩至四錢。清水煎服。)

(10) 百補湯 大熟地五錢。當歸四錢。川芎五錢。白芍三錢。阿膠一兩。新會皮八錢。地榆炒炭六錢。(上藥七味。清水煎服。)

(四) 血崩醫話 國醫界泰斗張仲景(傷寒論作者)對血崩症名言曰「崩有五色。青崩如藍色。黃崩如爛瓜。赤崩如絳澤。白崩如涕液。黑崩如汗血。崩漏不止。四物湯加炒白朮。人參。黃耆。香附。炒地榆。炒蒲黃。棕灰。升麻。血餘。等藥九

味。清水煎服。頭昏項強者。四物湯加柴胡。防風。虛煩失眠的四物湯。加入參。淡竹。葉。虛冷清瀉者。四物湯加官桂。附子。生薑。紅棗。胃虛嘔吐者。四物湯加入參。白朮。身發寒熱者。四物湯加柴胡。崩中漏下五色。可用赤石脂。禹餘糧湯（見三節醫方）。

又槐苓散。炒槐米三兩。黃芩二兩（上藥二味。炒研爲末。每服五錢。露酒調服。治崩中不止甚效。因本方爲張氏所擬。故特附錄於此。

（一）便濁醫理 婦人病中有一種名「便濁」的。頭名思義「小便混濁也」。凡婦女之便。有赤如血。白水。排尿管時不感疼痛的。便是痛。的便成淋了。屬濕熱。分虛實兩種。脈沉滑。胸膈不利。小便白濁。屬濕痰。宜燥中之濕。如面色不澤。身倦無力者。屬氣虛。脈洪數。五心煩熱。頰赤唇乾。小便赤濁。或白濁。屬相火。肝脈弦數。有力是爲火盛。

（二）便濁醫法 黑瘦的婦人。患赤白濁

的。宜分滲清熱。燥陰降火。可用龍胆瀉肝湯。或下固湯。濁氣下流。爲赤白濁。赤的升柴。二朮。二陳。最妙。白的黃柏。當歸。知母。白芍。二朮。二陳。能使大便潤而小便長。如兩尺脈沉弱。白濁頻數。凝白。好似奶油。光彩不定。遊腳澄下。凝如膏糊。古方指爲陽虛。也有虛而挾相火的。這不可不辨呵。宜葶藶分清飲。專主陽虛白濁。內經曰「中氣不足。小便爲之色變。必先補氣升舉之。而後分其臟府氣血。赤白虛實治之。有邪熱者瀉熱。虛者補虛。設使腎氣虛甚。或火熱亢甚者。則不宜純用涼藥。必反佐治之。要在權衡輕重而已。赤者熱傷血。宜滋陰。白者濕熱傷氣。又宜燥濕。白濁不止。宜服珍珠粉丸。用之屢驗。氣虛四君子湯。血虛四物湯。氣血兩虛八珍湯。下珍珠粉丸。

（三）便濁醫方 醫治便濁。主要用藥。已如上述。現將應用藥方分錄如下。

(1) 珍珠粉丸 樗皮炒黃六錢。黃柏鹽水炒三錢。青黛五錢。滑石三錢。珍珠二錢。(上藥六味共研爲末。神麩糊丸。無火者。加炮薑。方用樗皮。黃柏。能濕瀉清熱。青黛。能解鬱熱。蛤粉。鹹寒引下。滑石。利竅。珍珠。寧神。定志。

(2) 石蓮子湯 如上盛下虛。心火上炎。口若燥渴。五心煩熱。小便赤澀。或下白濁。宜清心蓮子飲。

石蓮子(卽建蓮。中擇有黑殼者)一兩人。參二錢。赤苓五錢。麥冬三錢。黃耆七錢。地骨皮五錢。黃芩五錢。車前子三錢。生甘草六錢。

(3) 定志丸 遠志二兩。石菖蒲二兩人。參一兩。白茯苓三兩。(上藥五味。共爲細末。用蜜調和爲丸。硃砂爲衣。每服七丸。空心米湯下。白濁經年不愈。形神衰瘦。心神不安。當作心虛治。珍珠粉丸合本丸服。)

(4) 龍胆瀉肝湯 膽草五錢。黃芩六錢。山梔六錢。澤瀉六錢。木通五分。車前七錢。當歸一兩。生地八錢。柴胡六錢。甘草一兩。(上藥十味。清水煎飲。)

(5) 葶藶分清飲 智仁五錢。葶藶七錢。石菖蒲六錢。烏藥四錢。茯苓三錢。甘草一兩。飛滑石一兩。加鹽少許。(上藥七味。清水煎服。)

(6) 分清飲 芡實。茯苓。黃蠟。(上藥三味。份量相等。用以蜜共和爲丸。如桐子大。每服百丸。淡鹽湯下。)

(7) 二朮二陳湯 白朮五錢。蒼朮三錢。廣皮八錢。半夏五錢。茯苓三錢。甘草三錢。升麻六錢。柴胡四錢。(上藥八味。清水煎服。)

(一) 白淫醫理 經曰。思慮無窮。所願不遂。意淫妄想。入房不能。帶脈不引。則發白淫。夫腎臟以慳用事。志意內治。則精全而澹。若眠思夢。

想欲淫不能。則淫洩不守。輒隨洩使而下也。因
爲「意淫妄想。入房不能」。所以春閨怨婦。寡
尼姑。患此者最多。青春少女。雖患單想。思還不到
這資格。患者尙少呵。

白淫這名詞。和白帶。白濁。白淋。相似。所以通
俗人士。很易誤會。其症病理。病情大不相同。計分
虛實寒濕鬱火。不可混治。欲知如何醫治。這裏
借用裨官家調調。且看下回分解吧。

(二) 白淫醫法 吾國最尊崇醫界寶笈
的「內經」。對於白淫醫治方法云。「白淋者淋
瀝而不止也。多起於鬱。大抵虛寒者居多。小腹不
痛。亦有去多空頭痛者。都用養榮湯加香附。補宮
湯亦可。若用熱劑。艾煎丸加白芍。痛者。四烏湯加
白芍。歸身。亦有白淋。日久漸變黃色者。此將成血
淋也。艾煎丸。歸附丸。皆可服。又有變爲沙淋者。溺
器中下。沉白渣一層如沙。小便出時。澀痛者是也。

白淋。赤淋。而無沙者。須分其氣血而治之。

(三) 白淫醫方 白淫醫方。茲錄如下。

(1) 越鞠丸 香附一兩。山楂二兩。半夏
三兩。神麩五塊。川芎一兩。半鬱金二兩。膽草一兩。
(上藥七味。共研爲末。米糊搓製成丸。每服五丸
至三九。)

(2) 人參養榮湯 人參五錢。當歸七錢。
熟地四錢。半。白朮五錢。黃耆六錢。茯苓三錢。遠志
五錢。白芍一兩。五味七錢。廣皮一兩。肉桂一兩。甘
草八錢。外加牛薺與紅棗。(上藥八味。清水煎服。
兼治脾肺氣虛。榮血不足。)

(3) 內補丸 鹿茸五錢。絲子一兩。半。沙
蒺藜二兩。紫苑茸一兩。黃耆三兩。肉桂二兩。桑螵
蛸一錢。半。肉蓯蓉二兩。附子製一兩。半。茯神一兩。
八錢。白蒺藜二兩。(上藥十一味。共研爲末。好似
黃豆般大小。用遠年花雕酒。湯服。) 烈性火酒忌。

用本丸爲內補藥方中最王道靈效者。

(一) 淋病醫理 經曰「白者屬氣。赤者屬血。但有氣血之分。而無寒熱之辨。」在今國醫都指本症成因於濕熱。但有一部份人治淋病不分寒熱。究竟如何。須視婦女患者的病況爲斷。大抵白淋寒多熱少。淋的顏色赤的。這是熱症所致。淋下時小腹有痛與不痛兩種。這是脾胃實和不實關係也。須診斷清楚。

(二) 淋病醫法 中醫所指的淋病。包括赤白二淋。不同於西醫所稱男子的淋病。醫治方法。中法治白淋用養榮湯最效。或用艾煎丸亦可。痊癒。赤淋忌服熱藥。與內補艾煎藥。可以八味湯加黃芩。黃連。香附更不可少。這三味爲婦科聖藥。宜特別注意。治腹痛淋病用四烏湯。恐有瘀血。沒有停止。去多不痛。飲食照常的。用八物湯加黃芩。黃連二味。飲服。倘胃納呆木。則用內補湯。(去人

參) 或補中益氣湯加黃柏。小腹不痛的淋病。脾胃實症。可以用八物湯加黃芩。黃連。主治胃脾不實的痛症。改用補宮湯。總之婦女淋病。都以治脾爲主。用藥如此。便得訣巧。即不請求醫士處方。閨房之內。自己斟酌處方。也可妙手回春了。

(三) 淋病醫方 關於婦女淋病的醫方。什麼養榮湯。四烏湯。八物湯等。都見以上白淫。疼經後各條中了。本節不贅註。參閱現錄。未及補中益氣方單如下。

黃耆六錢。白朮四錢。人參二錢。陳皮五錢。歸身六錢。升麻三錢。柴胡五錢。甘草七錢。(上藥八味。清水煎服。)

(一) 白帶醫理 婦女們白帶。最是普遍。故有「十人九帶」和「十人九痔」通稱。本症患處。因從腰間帶脈而來。所以名「帶」。有赤白兩色。但同屬腎虛。白帶與上述淋病相似。不過淋

液散薄。腥氣臭穢。白帶液質是滑的稠粘。無腥穢氣味。牠們的分別大要如此。

保命集曰：「白帶熱入大腸。赤帶熱入小腸。

考察病因。都屬濕熱結於脈。所以津液湧溢。便成赤白帶下。又因五經脈虛結熱。屈滯於帶。所以臍下發痛。從陰戶中涓涓而下。內經云：「任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕瘕。」王註云：「任脈自胞上過。帶脈貫於臍上。所以男子內結七疝。女子帶下崩中。帶脈起於秀脊章門。似束帶狀。今濕熱冤結不散。故為病也。」又經曰：「脾傳於腎。名曰疝瘕。小腸冤結而痛。出白名曰蠱。所以為帶下冤結也。冤。屈也。屈滯而病熱不散矣。」

(二) 白帶醫法 醫治赤白帶的方法。當然很多。現在賅要一說罷。凡熱毒不散。先用十棗湯下之。後進苦練丸。再拿一元胡索散調治。虛者不可峻功。實在亦當酌用血虛加減四物湯。氣虛

用人參。白朮。陳皮作補。帶下利害的。探固腸丸。相火動的。加黃柏滑者。加龍骨。赤石脂。滯者。加葵花性燥的。加黃連。冬月可加桂附。丹溪先生治赤白帶下。和夢遺同法。肥人有帶。都是濕痰。用海石二陳。加南星。黃柏。青黛。川芎。瘦人帶下。都是鬱熱。宜用香附。砂仁。黃柏。青黛。倘是結痰白帶。拿小胃丹。半飢半飽。津液下數丸。等候鬱積暢行了。再進補藥調理。總之。看患者的病情的變化。而隨機變遷。啦。

(三) 白帶醫方 醫治白帶的醫方。也有許多。現在選錄如下。

(1) 苦練丸 若練子打碎酒浸。尚香炒當歸。(上藥三味。份量相等。各自三兩起。共研為末。用上好陳酒搗糊為丸。每服三十粒。空心陳酒送下。如兼有腰痛的。四物羌活防風湯送下。)

(2) 十棗湯 芫花炒黑。甘遂大戟。(上

藥三味。份量相等。各一錢至二錢半。看症輕重而定。加紅棗十枚至三十枚。

(3) 小胃丹 芫花(醋拌瓦器一夜。炒黑不可使焦) 大戟(水煮一小時。水洗晒乾) 黃柏(炒) 甘遂(水浸半月。煮後晒乾) 製大黃(上藥五味各四兩。共研爲末。白煎汁膏。九像桐子大。臨臥時。津液吞下。五九至十九)。

(4) 神佑丸 甘遂一兩。芫花一兩。大戟(醋炒)一兩。大黃五錢。白丑三錢。青皮六錢半。陳皮三錢半。木香六錢。檳榔五錢。輕粉二錢。(上藥十味。共研爲末。沸水製丸。每服十九至二十九。白開水吞下)。

〔附〕白帶爲婦女普遍病患。診有「十人九帶」之語。本症名目又繁多。現特彙錄如下。藉供閨房自療者按症自醫焉。

(1) 泔水白帶

〔病理〕婦人的白帶。其色像米泔水般的。最是普通。這因太陰主使。出於肺氣也。

〔治法〕治療這種白帶。該用四物合二陳湯。服半月。至多一月。便可痊癒。不過忌食魚腥。否則有復發之虞。

〔處方〕入物合二陳湯。當歸。白芍。半夏。陳皮。熟地。甘草。茯苓。(上主藥八味。分量相等。清水煎服)。

(2) 魚腦白帶

〔病理〕這種白帶的顏色。好似魚的腦髓。所以名牠曰「魚腦白帶」。由於子宮寒冷。才血化而成呵。

〔治法〕本症治法。宜投溫痺。使子宮轉暖。血液和脈路平和。服龍骨丸。定有神效。

〔藥方〕龍骨丸方 煨龍骨一兩。煨牡蠣一兩。熟地一兩。當歸二兩。海藥。蝟三兩。川芎一兩。茯苓

膏一兩。甘草五錢。山萸肉（又名石棗）三兩。（上主藥九味共研細末米漿搗和搓丸空心陳酒送下。）

(3) 鼻涕白帶

〔病理〕婦女白帶的顏色好似普通人掀出的鼻涕形狀。這是腎經分泌出來的。才成這種黏液呵。

〔治法〕鼻涕白帶的症象。既自腎經。故宜先用補腎閉澀之藥。服牡蠣丸。

〔處方〕牡蠣丸方 牡蠣三兩。青鹽一兩。牛膝一兩。狗腎（二具晒乾）（上藥四味共研成末。嵌入黑棗內。當做丸。藥空心肚前陳酒送下。每日服二三十丸為要。

(4) 脂膜白帶

〔病理〕婦女白帶而形如猪脂膜的。這因傷食毒太過。血化成膜。以致如此呵。

〔治法〕治療這種脂膜白帶。該驅毒解熱。不可燥急。漸漸用藥物之力。破瘀除膜。使成正常。

〔處方〕閉白丸方 海浮石一兩。海螵蛸一兩。寇仁一兩。龍骨二兩。赤石脂一兩。砂仁一兩。茯苓二兩。牡蠣二兩（上主藥八味共研細末。以米糊為丸。空心陳酒送下。白開水亦可。）

(一) 水崩醫理 婦女水崩。這是不常有的險症。因婦女月經已積了多月不來。便經鬧驚人的水崩了。此症有的腹生肉球。宛似雞卵。用刀剖開。中又有小堅塊如滑石。這樣的病者。每自驚慌昏去。不返。手忙脚亂。一時醫治得法。尚不致生命危險。啞。

治療本症。首須態度鎮靜。視病之輕重而處方。以十全大補丸最效驗。

(二) 水崩醫方 十全大補湯 當歸二錢。川芎二錢。肉桂五分。白芍一錢。人參五分。熟地

二錢。甘草五分。白朮一錢。黃芪二錢。茯苓一錢。清水煎服。忌食生冷。

(一) 赤淋醫理 婦人患赤淋的。十分可惡可鄙。因為非中花柳毒。決不致這樣的。呵。當血淋下降時。小腹痛如刀割。痛苦萬分。

(二) 赤淋醫法 治血淋。國醫方面最靈效的牛膝湯。一劑止痛。再用海金砂丸。真單方。二味。氣死名醫呢。

(三) 赤淋醫方

(1) 牛膝湯 牛膝(酒洗) 麝香三分 乳香一錢 (清水煎服。不拘什麼時可服)

(2) 海金砂丸方 海金砂二兩 猪苓二兩 澤瀉二兩 白朮二兩 車前子三兩 木通一兩 革薺一兩 (上主藥七味。共研為末。米糊搗和。搓丸。空心白開水送下。每日以十五丸為要)

(一) 赤帶醫理 婦女的月經。因為每月

行期參差。逾限至二三。次。淋漓不止。病者面青。赤帶齊下。醫治赤帶下。以膠艾湯最確實見效。

(二) 赤帶醫方 膠艾湯 當歸二錢。熟地二錢。白芍二錢。川芎一錢。艾叶一錢。阿膠二錢。甘草一錢 (清水煎。隨時可服)

(一) 臍氣醫理 婦人經閉。數月的信水不行。臍結在一塊。好似肥皂橫在小腹。有的作痛。有的不痛。肌肉日漸瘦削。面色青黃。飲食少進。這樣的癥結。實為婦女之大患呵。

(二) 臍氣醫方 治療臍氣不消。當然通經破瘀。理腸胃氣。平肝經。使痞塊消去為目的。

(1) 玄胡散 玄胡索四錢。血餘炭二錢 (上兩味主藥。共研為末。每服一茶匙。陳酒送下)

(2) 沉香丸方 沉香一兩。小茴香二兩。砂仁三兩。玄胡四兩。烏藥三兩。大茴香二兩 (上

主藥六味。共研爲末。米糊爲丸。空心吞服。陳酒送下。

(一) 浮腫醫理 婦人浮腫泄瀉。原因脾弱不能剋化。飲食不能制水。當然不利於膀胱。要皮膚浮腫了。

(二) 浮腫醫法 治療婦女浮腫泄瀉。第一步該理脾消水。然後再調和胃納。化除積食。使土制水。膀胱水份通達。皮膚不致浮腫哪。

(三) 浮腫醫方 木香調胃丸 木香一兩。粉豬苓一兩。草菓(去壳)三兩。陳皮一兩。三棱一兩。葶蘆子一兩。檳榔一兩。厚朴一兩。莪朮一兩。車前子一兩。砂仁一兩。白朮二兩。枳壳二兩。建澤瀉一兩。(上主藥十四味。共研爲末。米糊搗爛。搓丸。葱五根。白酒煎湯送下。一日三服)

(一) 實腫醫理 婦人四肢堅實浮腫。肚子如五石瓠。成膨脹形。手臂腿部浮腫處有青

筋暴露。大便不通。人形瘦弱。不思飲食。這和上述浮腫泄瀉。適成反比。

(二) 實腫醫法 醫治本症。亦與上述浮腫泄瀉相反。反主瀉達。使通氣血水份而消除堅實腫勢。

(三) 實腫醫方

(1) 醉公丸方 大戟五錢。三棱一兩。黑牽牛五錢。芫花一兩。甘遂五錢。莪朮一兩。江枳壳五錢。大黃一兩。(上藥八味。共研細末。以米糊搗爛。搓丸。如桐子。每服三十九。空心清水送下)

(2) 緊皮丸方 厚朴一兩。香附一兩。青皮二兩。砂仁二兩。陳皮一兩。草菓(去壳)二兩。(上藥六味。共研細末。以米糊搗爛。搓丸。每服六十九。空心開水送下)

(一) 痰毒醫理 婦女痰結核症。都因血衰與胃裏有痰。嗽則氣逆。或左或右。頭面腫。次結

核有的臍上結塊像孟子般大小不入膜。不出皮。人體瘦弱漸至形消而骨立。

(二) 痰毒醫方 治療本症以運氣化痰爲先。

(1) 龍瓦丸方 三棱一兩。大茴香一兩。海浮石一兩。枳壳一兩。莪朮一兩。川楝子三兩。瓦楞子(煨)五錢。紅花一兩。檳榔一兩。台烏藥一兩。廣陳皮一兩。木香一兩。(上藥十二味。共研爲末。麵糊搗爛。搗丸。如桐子大。空心開水送下。日服二錢爲度。)

第三章 閨房種子

男女好合新名詞爲「調劑兩性生活」。適應雙方生理需要。但在古代醫藥上講則謂「夫婦媾精而子女以生」。經血融和而婦人受孕焉。拆穿西洋鏡。吾們男女交媾。一方面

性衝動解救兩性的好色飢渴。一方面却爲社會盡做人的義務。對家庭負擔續宗嗣的責任。至於因男女的交媾。閨房之內得到適當的淫樂。而增進伉儷情愛。子女出牛後。益發增添家庭幸福。那是題內應有之義。不煩多說了。

(一) 種子醫理 閨房之內。夫妻倆交媾適當經盡之時。如雙方體格健全。當然很易種子。哪不過男氣不足。女血虛寒的。則氣不交。徒施不聚。世間乏嗣的。不問本身疾病所在。亂服澀精壯陽劑。誤會爲種子良。這種傷天地和氣。便是幸而受孕。熟藥偶成的。也必貽毒子女。所以醫藥正宗。醫於受胎種子。特立專方。男以補腎爲本。女以調經爲先。再參補氣行氣。而究其虛實。然後可達自然的懷孕了。

上古男子三十而娶。女子二十而嫁。故種子多壽。現代人慾橫流。男未滿十六歲。而御女。女未

滿十四歲而嫁。陰氣早洩。未全已傷。未實已動。今人因不及古人壽考了。

(二) 男女成因。醫書論種子女女成因曰。一男女交合。陰血先至。陽精復衝而成。男陽精先洩。陰血後衝而成。此一說也。一又云。經水才斷一二日。血海始淨。交合者。成男。四五日後。血脈已旺。交合者。成女。此又一說也。不過或有經初斷交合。便生女。經久斷交合。而生男的。也有三四五日交合。無孕。八九日後交合。有孕的。

廣嗣要略對於種子原理。和生男育女關鍵。有很精確扼要的敘述云。一實陽能入虛陰。實陰不能受虛陽。陽微不獨射陰。弱陰不攝陽。信斯言也。世有尪羸之夫。怯弱之婦。屢屢受胎。雖欲止而不止者。亦有壯年精力過人。乃艱於育嗣者。何歟。丹溪論治婦人。以經水為主。然富貴之家。侍妾已多。其中寧無月水當期者乎。已經前夫頻頻生

育。娶之以圖其易者。願亦不能得胎。更遣與他人。轉盼生男矣。真不能受孕於此。而能受孕於彼乎。愚以為父母之生子。如天之生物。易曰。一坤道其順乎。承天而時行。夫知地之生物。不過順承乎天。則知母之生子。亦不過順承乎父而已。知母之順承乎父。則種子者。當以男為主。而交媾之時。又以百脈齊到為善。交媾而百脈齊到。雖老弱易洩。亦可以成胎。若交媾而百脈參差。雖少壯康甯難洩。亦不能成胎。婦人所攝之血。固由於百脈合聚。較之男子之精。不能無輕重之分也。若男女之辨。又不以精血先後為拘。不以月經盡幾日為拘。不以夜半前後交媾為拘。只以男女精血。各由百脈齊到者。別勝負耳。是故精之百脈齊到。有以勝乎血。則成男矣。血之百脈齊到。有以勝乎精。則成女矣。至有產而不育者。有育而不能壽者。有壽而黃者。無疆者。則亦以精之堅脆。分為修短耳。世人不察

精之堅脆而定於稟受之初。此論其常也。有少年
斲喪而大者。此論其變也。乃以不育轉付之兒。以
壽大專諉之數。不甚謬乎。」

種子的男女成因。上錄廣嗣要略。已很明白
了。現爲使大衆更深認識起見。再引前醫宋遂真
氏的交合舊論罷。

宋醫之言曰。「男女交媾。有丟洩前後之分。
男曰泄。女曰丟。蓋婦人月事已淨。其樂慾之時。網
縷之候。氣蒸而熱。昏而若悶。有不可明言之狀。此
的候也。交接之候。意合情濃。相持不舍。則百脈齊
到。而成胎矣。若男情已淡。女意未休。則男先泄而
成女。如女先丟而男後泄者。則成男矣。可知男女
各有精。非獨男也。易曰。男女構精。萬物化生。而交
合之後。卽以宗筋驗。其有血無血立見矣。可知男
女各有精也。明矣。蓋月水初淨。新血始生。藏而不
露。故交合之後。毫無血痕也。經云。「陰精所奉。其

人壽。陽精所降。其人夭。信斯言也。苟能清心寡慾。
亦何所求而不得子歟。」

(三) 種子成長。男女交合懷孕以後。胎
兒便隨着月份而成長了。一月胎似露珠。名曰胎
胎。足厥陰脈養之。二月胎似桃花。名曰胎
胎。足少陽脈養之。胎胚到了三月。始分男女。名曰
始胎。手心經脈養之。四月形象漸見。分明了。開始
受水精以行血脈。手少陽脈養之。五月五臟生。全
始受火精以成其氣。足太陰脈養之。六月方才六
府告成。始受金精以成其筋。足陽明經養之。七月
髮生而通關竅。始受木精以成其骨。手太陰脈養
之。八月動手。游其魂。始受土精以成其膚。革。手陽
明經養之。九十月受孕。期滿足。臍腑關節。眉髮耳
目。口鼻人體齊備。瓜熟蒂落而呱呱墮地了。

(四) 種子醫方。種子醫方很多。但通俗
的都違反生理。只知私用猛藥。罔顧本身體質而

強陽。非但無利。反是有害。現在編者選錄王道種子方。供讀者閱房行樂求嗣之助罷。

(1) 正元丹 香附一斤。(用藪艾三兩。

先以醋同浸一夜。分開製醋。帝便鹽山梔湯各製四兩。阿膠(蛤粉炒)一兩。枳殼兩半。(半生半炒)熟地四兩。歸身四兩。白芍四兩。川芎一兩。

茯苓四兩。琥珀二兩。(上藥十味。共研細末。醋糊為丸。如桐子大。每日早晨。婦女服。空心淡鹽湯送下。有奇效)。

(2) 千金種子丸 沙蒺藜四兩。白蓮鬚四兩。羊肉三兩。芡實四兩。薔薇二兩。龍骨五錢。(火煨)。(上藥六味。共研細末。蜜和為丸。如桐子大。婦女每於空肚前淡鹽湯送下。忌房事一月)。

(3) 聚精丸 魚膠一斤。(蛤粉炒成珠。代之蒸一柱香)。(上藥二味。研為細末。蜜和為

丸。如桐子大。婦女每服四十九丸。空心温酒送下)。

(4) 壯陽丸 肉蓯蓉二兩。仙茅二兩。半。蛇狀子二兩。山藥三兩。五味子二兩。半。補骨脂三兩。伏神二兩。紫稍花二兩。杜仲三兩。菘菜子兩。半。雄雞肝二隻。鰾肝一付。海狗腎(黃狗腎代亦可)。(上開各味。共研細末。先將雞肝鰾肝用鹽酒。

椒蒸熟。搗爛。和前藥。晒乾。再將前末藥磨細。用酒拌山藥末。醋調糊為丸。空心淡鹽湯下百丸) 如患陽痿精冷。加肉桂附子石燕各一兩。(本劑壯陽丸藥性王道。不同其他。露道強陽劑。治陽痿氣。餒不振。老年無子。有特效)。

(5) 五子衍宗丸 枸杞子三兩。菘絲子五兩。五味子二兩。半。覆盆子四兩。(酒洗)車前子二兩。(上藥五味。共研細末。蜜製為丸。如桐子大。空心淡鹽湯送下)。

(6) 金鎖思仙丹 蓮蕊。蓮子。芡實。伏神。

代之蒸一柱香)。(上藥二味。研為細末。蜜和為

三兩。上藥四味。共研爲末。用金櫻子一斤。去毛煎膏爲丸。每服三十九。空心淡鹽湯送下。服過一月後。欲癆過度之男子。卽不走泄。遇女子經後種子。用車前子湯送下。可一索得男。

(7) 女科地黃丸。熟地四兩。山萸二兩。山藥二兩。丹皮兩半。茯苓兩半。艾叶一兩。(醋炒)香附三兩。(童便炒)阿膠一兩。上藥八味。共研細末。蜜製成丸。白開水送下。每服十丸。本劑主治婦人經水不調。此丸能便經期復準。種子受胎。

(五) 種子戒期。閨房之內。夫婦陶情性的問題。雖爲應有之義。道學家尙抬出一周公之禮。聖人招牌。足證光明正大了。

的確。閨房情樂。既應合男女生理需要。調劑兩性精神。優美夫婦生活……等外。接續宗祀。蕃殖子孫和優生民族。綿延人種……等等大問題哩。

慾——七情六慾。應有限度。所以有一節慾。一呼聲。警戒青年人不可縱慾嗜淫。因而傷身爲慾犧牲何苦來呢。

養生之道。以節慾爲第一義。無論邪緣外合。滅德喪心。定必減年促壽。便是夫婦之間。人情所默許。也須有個節制。不可過縱啊。

種子既有方。亦有道也。世人茫然一切。暗中摸索。應戒房事日期。恣意觸犯。小則致疾。大則傷生。每有年少力強者。忽然急病脫陽。最多暴亡與生育怪胎……等意外。都因不知遵守慾的禁忌哪。

語云。「寡慾多男。」所生子女。聰慧俊秀。異於常兒。髮齡痧痘。可減少危險。胎毒等症。更可有節制。實爲閨房金科玉律。大衆該共遵守。編者爲此採錄。故老相傳。節慾種種定例。雖不免刻板文章。尙有相當理由。讀者幸勿以一老生常談。

而忽之。

一 每月戒期

正月初一(短壽) 初三(減壽) 初六(惡疾) 十五(短壽) 十六(短壽) 二十二 二十五(月晦日主病) 二十八(主夫婦同病) 三十(主減壽月小改廿九)

二月初一 初二(短壽) 初三 十一 十五 十九 二十五 二十八 三十

三月初一 初三 初九(產惡胎) 十五 十九 二十五 二十八 三十

四月初一 初四(失音) 初八(血症死) 十五 十六(減壽) 二十五 二十八 三十

五月初一 初五(惡疾) 初六 初七 十五(前半夜犯主男死。後半夜(三年死))

犯主女死。子時犯主男女俱死。 十六(三年內夫婦必一傷) 十七 二十五 二十六 二十七(以上九日。名九毒日。應忌之) 二十八 三十

六月初一 初四 十五 二十三 二十四 二十五 二十八 三十

七月初一 初七(減壽) 初十 十五 十六 十九 二十五 二十八 三十

八月初一 初三 初五 十五 十六(惡疾) 二十五 二十八 三十

九月初一 初九 十五 二十五 二十八 三十

十月初一(一年死) 初六 初十(死) 十五 二十五 二十八 三十

十一月初一 初六 十一 十五 十九 二十五(短命) 二十八 三十

十二月初一 初七(惡疾) 十五 二十(促壽) 二十四 二十五 二十八 三十(遇閏月照本月)

二 無定戒期

立春 立夏 立秋 立冬 春分日 秋分日 夏至日 冬至日 四絕日(四立前一日) 四離日(分至前一日) 甲子庚申日 夏至後丙丁日 冬至後庚辛日 社日 臘日 天空日(是日受胎生子主雷擊) 夫婦元辰本命日 六月十七日小月十六日

三 天忌戒日

日蝕 月蝕 雷電 狂風驟雨 大雪大霧 大寒大熱 虹霓 日月星斗之下

四 地忌戒日

地動 寺廟 井灶樞廁之旁 風露之中 燈火之下

五 人忌當戒

疾病新愈 勞倦方息 大醉過飽 遠歸新浴 大喜大怒 驚憂悲苦之後 婦人病後 臨經新產

(說明)以上三條都沒定期。不過關係最爲重大。倘能隨機警心。自不致誤有犯觸。若任情逞慾。忽不及持之下。必有傷生致病之虞。

再以上應戒日期。凡選擇婚娶。雖年命周堂通利。亦萬不可用。上述未免頑固守舊。但既依故老相傳。姑存其說。

(一) 妊娠脈法 吾國醫術的脈法。很是玄祕靈驗。近今西醫也很信服。作爲臨症時聽筒的輔助。男女構精。懷娠了後。脈象上便漸漸表現出來。知道脈法的人。固能鑒別。現把妊娠脈法介紹如下。閩房醫療上。確很重要的常識。

兩尺脈微而帶數。兩寸浮大。兩關滑。身中無

熱脈亦洪。

(1) 男女脈法 左手滑大而疾為「男」右手滑大而疾為「女」更參乳核孰執先生右女左男信無差。

(2) 雙胎脈法 雙胎脈法問如何。兩手俱洪斷不誣欲識是男併是女。縱橫詳見叔和歌。

(3) 死胎脈法 脈來沉細腹腰疼胎伏多寒冷如冰再看舌色青紋起胎死何須問鬼神。

(4) 鬼胎脈法 脈來亂點如風雨忽去移時又復來。此是夜叉人不識即時診斷勿疑猜。

(一) 妊娠胎形 婦女懷孕了後胎形怎樣情狀。吾國醫學上也有鑒別的方法。確可預卜胎兒出生。聞屏醫藥常識的一種現在分述如下。

訣云。

初月胎形似珠露。未入宮羅在昆戶。

猶如秉燭在風前。風急此時難庇護。

(2) 一月醫法 一月胎形好似草上的珠露。些微一個小肉球。未有宮羅在昆戶之所。入了腹內哩牠的形狀。欲聚欲散。沒有堅強。如月信報之。當時頭暈惡心。不喜飲食。六脈浮緊。諸症象。初次懷孕婦女。都因羞恥。觀念而隱諱。自以為歌經。而請醫生診斷。或自療服藥。這樣無病的反使有病了。

下列各方為一月胎形時。酌量本身徵象而定如何服飲。通常服安胎和氣飲。如病後受胎或稟氣虛弱的可服罩胎散。

(a) 安胎和氣飲 白芍一錢。木香四錢。益智仁七錢。砂仁三錢。香附四錢。半紫蘇三錢。甘草二錢。(上藥七味加葱清水煎服)

(b) 罩胎散 當歸五錢。川芎四錢。白芍二錢。半。砂仁三錢。甘草二錢。枳殼二錢。半。

(3) 二月胎形 二月胎形歌訣云。

二月胎形九極中。如花初綻蕊珠紅。
分枝未入宮羅內。氣受陰陽血脈同。

(4) 二月醫法 婦女懷妊到了二月受

血近陰在母體九神之中。陰戶內六寸是也。其胎入腹。未有衣裏。或負重觸傷胎氣。必致頭暈目眩。惡心嘔吐。不思飲食。可服保胎和氣飲。

(a) 保胎和氣飲方 養香三錢。厚朴五錢。廣皮三錢。半枳壳二錢。半砂仁五錢。黃芩六錢。桔梗三錢。蒼朮三錢。小茴二錢。紫蘇四錢。

(5) 三月胎形 三月胎形歌訣云。

三月胎形似血莢。有宮血垂未碾碎。
毋憎飲食諸般愛。苦辣酸鹹並納成。

(6) 三月醫法 婦女懷孕至三月與二

月相仿。不問虛弱。胎氣不和。惡心嘔吐。兼秋風時氣。寒熱頭痛。都可照前錄安胎和氣飲加減。倘寒

熱不退。加柴胡。黃芩。咳嗽加杏仁。喘急加沉香。

(7) 四月胎形 四月胎形歌訣云。

四月胎形入宮室。在母臍膊內相過。
稟彊熱物諸般忌。免兒唇缺及瘋麻。

(8) 四月醫法 胎形經過四月。便入子

宮。河車衣裏。漸至丹田。忌食一切毒物。如無鱗魚。蟹之類。以免胎毒。胎兒孕婦。倘覺身體疲倦。氣急發熱。飲食無味。嗜臥頭暈。四肢酸軟。宜服活胎和氣飲。

(a) 活胎和氣飲方 陳皮二錢。香附錢

半。砂仁三錢。小茴二錢。蘇葉三錢。厚朴五錢。蒼朮二錢。枳壳四錢。甘草二分。

(9) 五月胎形 五月胎形歌訣云。

五月胎形男女分。四肢胞穩不須憂。
男酸女淡思食味。此定陰陽造化云。

(10) 五月醫法 胎元到了五月。形象才

告完全。男女性別也已顯著。鑒別之法。可令胎母前行。使人在後呼喚。倘她向左回頭為「男」。向右回頭是「女」。又於味覺上也可辨別。男思酸。女思淡。已入子宮了。後其胎安穩。倘胎母嗜臥。飲食無味。肚腹脹悶。宜服瘦胎飲。

(a) 瘦胎飲。常歸二錢。益母草五錢。砂仁四錢半。益智仁三錢。枳殼三錢半。香附三錢半。白芍四錢。(上藥七味。清水煎服。)

(11) 六月胎形。六月胎形歌訣云。

六月胎形在腹游。左手男胎似線抽。女魂右手輕搖動。都在臍中漸漸浮。

(12) 六月醫法。胎形到了六月。男動於左。女動於右。在母臍中漸漸浮動。倘母體虛弱。用瘦母飲。使胎氣調和。易於產育。

(13) 七月胎形。七月胎形歌訣云。

七月胎形身覺邪。男將左手動擎擎。

女能右手時時動。行步艱難母嘆嗟。

(14) 七月醫法。七月胎形。男向左脅動。女向右脅動。胎重如石。行步艱難。脾胃虛弱。氣急上冲。胸臆。以致腹滿喘咳。卒然頭暈。這不是中風。而為胎氣熱邪不安。否則令兒冲心。名曰子懸。宜服知母安胎飲。

(a) 知母安胎飲方。知母四錢。蘇葉二錢半。黃芩二錢。香附四錢。枳殼二錢半。滑石一錢。甘草錢半。益母草五錢。(上藥八味。清水煎服。)

(15) 八月胎形。八月胎形歌訣云。

八月胎形具備身。毛髮生長定精神。窮思飲食吞難下。困弱憂愁耽悶困。

(16) 八月醫法。胎形到了八月。便一切俱備。上體下身各部器官和毛髮等都生長了。不過孕婦方面。心悶煩燥。味美不甘。胎氣困弱。以致脾胃不和。宜服和氣平胃散。

(a) 和氣平胃散方 蒼朮三錢。厚朴二錢半。陳皮五錢。升麻三錢。柴胡二錢。白芍四錢。地榆四錢半。肉果三錢。澤瀉二錢。(上藥九味。清水煎服。本劑除治胎氣不和之外。兼治熱毒瀉痢。)

(17) 九月胎形 九月胎形歌訣云。

九月胎形重若山。七情開竅一般般。

每夜一升三合血。待時生育暫時難。

(18) 九月醫法 胎元九月以後。非但形體完全。並且官能靈動。眼睛有光。鼻有氣。耳能聽。口知味。生殖器也顯見。身體可以舒縮。出生前轉身大動。產母左右脅知覺了。宜服保胎如聖散。

(a) 保胎如聖散 當歸三錢。紅花三錢。益智二錢半。白芍二錢。益母草五錢。甘草錢半。(上六味。清水煎服。)

(b) 烏金丸 胎兒不下。取鯉魚一尾。同藥再煎。入醋一杯。阿膠四兩。艾叶二兩。穀芽二兩。

麥芽二兩。蛇壳一條。五味一兩。(上藥六味。醋和爲丸。如松子大。每服五丸。)

(19) 十月胎形 十月胎形歌訣云。

十月胎形已充足。四肢罅縫骨精開。

坐產即宜加謹慎。莫教兒下客氣來。

(20) 十月醫法 正常生產。都十月滿足。

因這時胎形四肢罅縫俱開。臨盆墮地了。嬰孩產下。不可使之久臥地下。致被賊風吹犯。急須包裹。滿月後。才得平安。宜服活水無憂散。

(a) 活水無憂散 急性子二錢。當歸三錢。益母四錢半。紫蘇三錢。艾叶二錢半。秦艽二錢。陳皮四錢。肉桂三錢。枳壳一錢半。白芍四錢。生地三錢。鯉魚一條。(上藥十一味。清水煎。加醋一盃。服烏金丸。如兒死腹中不能產下。急取無根水再煎服。)

一 妊娠中風

中風惡候告君知。眼合肝兮手撒脾。心絕口開肺鼻肝。腎家將絕定遺尿。

右錄國醫奉為金科玉律的「妊娠中風歌訣」呵。凡妊娠期間手足搖蕩。忽然不省人事。角弓反張。形狀好似中風的。這是子癰哪。宜服砂仁湯。倘胎前無故卒然悶倒在地。不明醫理的人誤會她中風了。實在這非中風而為兒暈啦。醫名詞「子懸」該採按胎調氣法。紫蘇飲加砂仁。川貝茯苓。雖到將產。仍服紫蘇飲為。

又有胎前發喘。這因胎兒不安冒風故哪。該用帶鬚葱根廿莖煎湯飲服。立愈。葱能發散兼有安胎功能。倘因傷食起喘。拿紫蘇飲沖入童便。加砂仁煎服。若胎氣不和。滯上心腹。以致胸膈飽悶。喘急疹痛。這也是子懸。亦服紫蘇飲。因本藥確有安胎止墮之功。如胎前患偏正頭風。川芎調茶服之有效。妊娠感冒四時風寒。霍亂吐瀉的。藿香正

氣散主治。胎前忽生瘧疾。用養榮湯有效。

胎婦發呃氣逆的。也用紫蘇飲。有胎兒死在肚內以致氣侵上而呃的。下死胎後呃便止矣。上要服催死胎下藥。不須另服他方。孕婦喪食拿紫蘇飲加神麩。香肉砂仁。麥芽。兼有吐瀉的。用養胃湯有的孕婦無故悲泣不止。好似有鬼魔護身。這名「臟燥」。非大棗湯不能治癒。有的妊娠了後忽然耳聾皆贖。氣血不足的緣故呵。用十全大補湯。雙目赤腫。四物湯加黃連。遍身拘急痛無一定地方的。與夜間失眠。眠花昏黑。胎氣作祟也。宜服紫蘇飲。

二 妊娠傷寒

傷寒頭痛連百節。氣急衝心。溺如血。身熱發點紫黑。青壯熱不止。致胎滅。嘔惡不止。與心煩。腰背項強。腦痛裂。六七日來。燒腹中。小便不通。大便結。

妊娠染表症傷寒的。當服帶鬚葱頭湯。出了汗便可痊癒。不可輕易用發表藥。若誤用了。便促使墮胎。危及產婦生命。不可不慎呵。

胎前瘟疫和傷寒。同孕婦傷寒咳嗽。宜服二陳湯。加薄荷。白朮。川貝。泄瀉的。胃苓湯。去參。俟脾胃實後。再治咳嗽。參蘇飲也可服。因為風寒最易動胎。反為不差。所以胎前傷寒。身體發熱。而有咳嗽的。不過用帶鬚葱頭湯。能夠安胎順氣。倘胎不安。煎砂仁湯。服汗多服參蘇飲。乾嘔紫蘇飲。去參。加茯苓。吐血服止血丸。或二陳加黃柏。知母。查炭。白朮。倘氣血兩虛的。八物湯加黃柏。知母。

三 妊娠跌蹶

(一) 跌蹶歌訣 妊娠跌蹶。古醫有歌訣云。

懷胎跌蹶無輕重。遂至傷胎在腹中。已損包胎血。卜逆衝心悶痛母魂傾。

(二) 傷胎醫法 孕婦跌蹶。最忌犯忌。墮胎流產。十九爲了。跌蹶。凡受傷重的。可服活血藥。這藥雖然傷胎。似不宜服。但欲求傷去。非此又難望傷癒。所以在跌蹶後。先當診斷胎兒的生死。腹冷舌青。即是已死。除兆。用香桂散下胎。倘生死不能辨明。用佛手散試探。胎已傷了。立即墮下。胎未受傷。其痛即止。不過在止痛以後。還須視傷的輕重。下藥輕的。童便酒入活血藥飲之。血活了。後傷可去了。再服紫蘇飲。加童便。砂仁。這樣只治她的傷。不關她的胎。血行胎下。產母的生命才沒危險。了服紫蘇飲。加枳殼。童便。砂仁。更好的。產婦胎前衄血。產後多不吉。因為血宜養胎。不宜泄漏呵。對本症紫蘇飲加黃芩可愈。

四 妊娠腹痛

(一) 心痛歌訣 妊娠腹痛。古醫相傳歌訣云。

心腹急痛面目青。汗汗氣促命必傾。下血不止胎冲上。心腹冷悶定傷身。

(二) 腹痛醫法 本節所稱的腹痛。尚包括妊娠期間的心痛現併述其醫治方法如下

凡孕婦腹痛見血的。這名胎漏。到了臨產自癒。不過生子不健壯。——先天不足——紫蘇飲加陳皮砂仁。倘然胃口痛甚。宜服指迷湯或養胃湯。又有孕癰患者。臍眼小腹痛發光的。在普通婦女為腹癰。孕婦患了。便是孕癰。宜安胎飲消食理氣之藥。服十補托裏散。本藥補而不得胎。或用千金托裏散。有臍下冷痛腹脹。小便頻數。大便滑泄症狀的。這因正氣虛弱。遇吞生冷所致。安胎飲加枳壳與和氣的藥。可治如小腹痛。先須切脈。倘可安胎。便服紫蘇飲。否則用活血行氣之藥。內傷已很利害的。使胎下之。如血結不下。必因腹中疼痛。可服金屑散。或因宿食。炫癰氣血瘀痛。葱白

散主治一切血痛。肉炙散。白朮煎。有腰痛癥象的。腎虛所致。胎多墮落。急宜服安胎飲。使固胎元。如胎時時轉動。好似腰腹痛的。也可服安胎飲。

五 妊娠子腫

(一) 子腫歌訣 妊娠子腫。古醫相傳歌訣云。

子腫為肝腎定黑。缺盆平也必心傷。背平傷肺脾臍凸。脚背平時腎病深。

(二) 浮腫醫法 妊娠浮腫。一因胎前患水腫的少。患胎氣的多。這名氣病。便名子腫。紫蘇飲主治。倘小便不利。腹脹的。這才是水腫。紫蘇飲加澤瀉。車前白朮。治之三焦無病者。加山梔。黃芩。利小便甚捷。倘孕婦浮腫上半身者。宜發汗。下半身者。宜利小便。上下都腫。汗利兼施。吃了藥腫退脫身的。不必再服藥了。

六 妊娠胎漏

訣云。

(一) 胎漏。歌訣 妊娠胎漏古醫相傳歌

血下如同月水來。漏乾胞血必傷胎。胎傷妊娠須憂慮。急賜靈丹救得回。只緣慾火房勞損。非是尋常虛漏胎。

(二) 胎漏醫法 婦女胎漏。或誤吞動胎物。被熱毒所侵。或因房事過勞而傷損。傷輕漏也。輕傷重漏亦重。血盡使胎死。或因母病而胎動者。等病治好。其胎自安。或母體衰弱久病纏綿。以致胎元不固。如母體復健。胎便可安。更有每次經期見血。俗名漏胎。宜服安胎飲。或紫蘇飲加黃芩。白朮。阿膠。砂仁。便可痊癒。也有傷了胎氣而下血不止。可服奪命丹。胎沒傷損的可安。已經受傷了胎便可下。

七 姙娠不孕

(一) 不孕醫理 本節所說的不孕。係指

婦女月經期很準確而不受孕。這種反常現象。(一) 因痰閉子宮。(二) 因氣食生冷。(三) 因男子陽傷易洩。如痰閉子宮。這婦人必很肥。白經來腹不痛。倘是氣食生冷。那麼腹多痛疼。男子精寒易洩。不能受孕。與婦女無涉。應由男子患者服藥。

前醫薛古蒙曰：「婦人行經不正。每不受胎。然參前而受胎者亦有之。其血熱故也。」又女科書云：「先期為血熱。後期為血氣。第有參前落後互兼者。何也。大抵婦人性執。多惱着氣。則氣不調矣。夫氣為血之母。氣亂則經期亦亂矣。故調經以理氣為先……」

(二) 不孕醫法 醫治婦女經準不孕。痰閉子宮者。以導痰湯。或人參半夏丸。二陳合四物湯。主治。氣食生冷者。千金吉祥丸。主治。不過咳嗽的不宜服。以四物加陳皮香附山查。如氣作瀉的

用枳實丸調經理氣。用香附丸。四物丸治。如有衝任寒損胎孕不成。或成而後多墮者。誥誥丸主治。

(三) 不孕醫方 醫治經閉不孕醫方。除已見他條不贅外。茲將未見者照錄如下。

(1) 千金吉祥丸 天麻煨一兩。川芎二兩。肉桂二兩。丹皮一兩半。熟地二兩。白朮二兩。柳絮三兩。五味兩半。茯苓二兩。絲子三兩。覆盆一兩。半枳實三兩。桃花片一兩。(上藥十三味。共研細末。密和為丸。如黃豆大。每服五丸。空肚熱陳酒送下。)

(2) 導痰湯 半夏二錢。南星一錢半。橘紅一錢。枳實一錢。八分。茯苓二錢。人參五分。菖蒲一錢。竹茹一錢。半。甘草八分。(上藥七味。加薑三片。清水煎服。)

(3) 誥誥丸 乾薑一錢半。白朮一錢半。丹皮二錢。元胡一錢。八分。肉桂二錢。澤蘭一錢。五

分。熟地一錢二分。川芎二錢。白芍一錢。當歸二錢。石斛一錢。(上藥十味。共研細末。醋糊為丸。如黃豆大。每服五丸。熱陳酒送下。)

第四章 閨房生產

民族的綿延。國家的強盛。社會的繁榮。都靠人羣的力量。人們的蕃殖。那便是生產的機能。婦女胎育兒女。實為民族國家社會的生命線哩。

婦女生產。除經種子。妊娠過程外。一俟十月滿足。便臨產了。不過同一臨產。因孕婦體格。環境。意外打擊……等等。而有一「小產」。一「難產」。之別。小產便是一「流產」。這為不成熟的墮胎。生育的半途而廢。最堪嘆息。所費的氣力。兇險的小產。有時竟比順產還痛苦呢。

難產的嚴重。更甚小產。很多母子雙亡。或子死母存。母死子留。變化多端。須看臨盆的情況。而

定。本書命名「閨房醫庫」。對於生育方面。當然詳細說明。所以本節「閨房生產」。特把臨產。小產。難產。分述於下。這樣的步驟分清。不啻婦女生產三部曲了。

(一) 臨產歌訣 臨產之時勿易看。絳然氣湊目珠翻。唇青口噤流涎沫。子母雙雙入死關。各色鮮紅唇面。子存母死片時間。面紅舌黑兒難保。佛手仍須奪命丹。橫逆催生龍蛻散。滑胎可救漏胎乾。死胎欲下芎歸飲。更搗葦麻脚底攤。血入胞中時脹悶。上冲心胃死何難。朴硝散共紅花酒。奪命神丹逐下安。產下血逆成血暈。清魂急灌命須還。血由一倒心無主。目暗神昏汗雨漫。氣隨血脫多難救。桂附參耆大劑堪。血冲心悶成狂妄。喘促蒲黃不等閒。兒枕痛知惡露。當歸失笑效非凡。忽然口噤言顛倒。見鬼原非風與寒。敗血上冲心。血耗妙香散共黑龍丹。

(二) 臨產醫理 婦女生育。人生第一難關。死生系之。添丁雖屬喜事。俗諺又有「一隻脚在棺材裏。一隻脚在棺材外」。便因臨盆而非順產。須醫藥補救時。倘醫治得法。可以起死回生。否則兩敗俱傷。母子死亡。每有生產時。婦女用力太過。兒轉未逮。以致胎落在胯。不能出生的。或因子橫子逆而難產的。或因產婦體肥脂厚。平日太開逸了。影響生產。或因胎兒過於肥胖。出生為難的。或因產婦年長。適人以致交骨不開。釀成難產。或因胞水先破。胞內乾澀而難產的。或因胎兒受某種損傷。已夭亡在母腹中。了不能活動。難以產出的。(凡子死母腹之產婦。必定腹冷舌黑。一驗便知)或有腹大異常。好似雙胞。胎實則脈息細弱。患胞水病而致難產。臨盆時必需先服藥。驅胎水。斗餘使下。胎兒才得出生。不過這種胞水胎兒。因水漬胎中。手足浸軟。出世後也成殘疾了。(必須

在懷娠期間。預先服去水藥。始免流弊。或因胞衣出血太多。胎兒墮地即夭的。或因血奔向上。而胎兒暈厥的。或因胎兒出生。胞衣不下。敗血灌滿胞中的。救治本症必須先行去胞血。才後服墮胞衣之藥。使下。或因穩婆舊法接生。手術笨拙。誤傷內臟。傷重致產婦於非命的。……總之。婦人生育。雖爲瓜熟蒂落。天然演繹。順產居多。但因上述種種原因。而致難產。臨盆時。操心吊胆。竟成生死關頭。推究其大原因。懷娠期間。胎氣流動的。可保順產。胎氣不流動的。便發生難產。變故了。平民婦女。日常勞役。生育時。每多順產。富貴婦女。養尊處優。省力滋補。反閉塞胎氣。阻礙胎兒活動。因都難產。脈經曰。臨產六至。脈號離經。或沉細滑。若無即生。浮大難產。寒熱又頻。此時急候。急於色徵。面頰唇舌。忌黑與青。面赤母活。子命必傾。若胎在腹。子母歸真。」

(三) 臨產須知 婦人在家生產。爲閨房唯一驚天動地大事。丈夫和家人們。必須鎮靜。應付切戒喧鬧。忙亂。除物色。熟手穩婆。或產科女醫。與得力女傭外。關於產婦方面。臨產前後。宜食容易消化。而富滋養的食物。發覺腹中疼痛了。扶她緩緩行動。如一忽兒痛緊。一忽兒痛止。這名「弄胎」。一不可使穩婆手探。更不可屈腰橫臥。若接連腰痛。產婦眼前如見火光。這是胎兒轉運之徵。須扶掖徐行。起步感到艱難。便該持物立住。必須等到腰腹相引。難以行立。才後坐草。切勿過草。恐兒在腹中。難以轉動。胞水先破。子道乾澀。皆主難產。若心中熱悶。吞服生鷄蛋一枚。抱腰的人。不可傾斜。胎兒自然順下。倘臨事。惶惶用力。不恰當。便有難產之虞了。

胎兒已經出生。勿可任她便睡。宜閉目坐一息。才後扶她上床。仰臥立膝。勿令熟睡。應當時常

喚醒她。切戒得男而沾沾自喜。喜反傷心。恐生紅汗症。但也不可以生女而怨。怨則有敗血攻心。房的危險。生產的間房之內。不時拿薰發醋烟。(炭燒紅浸醋鉢中所蒸發之氣也)可防血升暈悶。一星期內不可下床。一月內外不可同房和洗滌衣物。手浸冷水之中。

(四) 臨產醫方 婦女臨產。每有意外變態。現釋習見者。彙述如下。並附醫治藥方。

(1) 兒捧母心 胎兒尙在腹內。手捧母心。這徵象最是危險。醫治不得其法。則母子雙亡。所以該用藥引入心。房。解開兒手。使之出生。胎兒手捏東西緊不放。但藥氣一到。手便軟弱。可以解開了。法用豬心血調乳香五錢。煮酒送下。立效。

(2) 胞衣不下 產後胞衣不下。有升至心。而危及產母生命的。不可忽視。但也不必驚慌。可用花蕊石一兩。硫黃四兩。入罐。鹽泥固濟。煨過。

爲未童便酒調一錢卽下。又法(a)胞衣未下時。產婦把自己頭髮推入口中。好似欲嘔的形勢亦效。(b)胞衣不下。用瓦油蓋烘熱。仰放產婦臍上。令男人以脚抵住油蓋。其胞卽下。這是鄉村歷試不爽的土法。(c)治胞衣不下。有黑神散藥方。

熟地二錢。歸尾一錢半。赤芍二錢半。蒲黃二錢。肉桂三錢。炮薑二錢半。甘草八分。黑豆(炒)半升。(上藥七味與黑豆共研爲末。童便冲服)又「神仙聚寶丹」治胞衣不下亦效。

熟地二錢。川芎一錢半。乳香三錢。五苓脂二錢。琥珀一錢二分。當歸二錢。硫黃二錢。花蕊石三錢。良薑一錢半。黑龍二錢。百草霜一錢。(上藥十一味共研爲末。蜜搗和成丹。陳酒冲服)。

(3) 胞水放乾 有胞水放乾。胎兒不能出生者。急以大劑四物湯加車前一二合。河水煎。

不停飲服。胎兒便可隨水而下。這是煮開支河的醫法呵（產婦體虛的酌加入參一錢）。

(4) 交骨不開 產婦交骨不開。有因元氣素弱。胎前失於調養。以致氣血不能運達。法以加味芎歸湯加柞樹枝一兩。大劑飲服。再拿麻油調滑石末塗入產門。交骨漸可開啦。

(5) 子死腹中 治子死母腹醫方有二。茲併錄如左。

(a) 達生散 大腹皮三錢。人參一錢。紫蘇二錢。陳皮二錢。歸身一錢五分。白朮一錢。白芍一錢。炙草二錢。上藥八味。加黃楊頭七個。枳壳砂仁各五分。青葱五莖。清水煎服。

(b) 奪命丹 桃仁二錢。赤芍三錢。官桂一錢。八分。茯苓二錢。丹皮一錢。上藥五味。共研為末。重便沖服。

(6) 其他醫方 婦女臨產時。尚有其他

中庸性藥方。現也附錄如下。

(a) 保產神方 當歸二錢。川芎一錢半。厚朴七分。枳壳三分。黃芩八分。艾叶一錢。絲子一錢。炒。一錢半。川貝二錢。羌活一錢半。荆芥一錢。白芍一錢二分。甘草八分。上藥十二味。加薑三片。清水煎服。

(b) 胃苓湯 蒼朮三錢。厚朴一錢。廣皮一錢半。白朮一錢八分。茯苓一錢半。豬苓一錢。甘草八分。官桂五分。上藥八味。加薑一片。清水煎服。

(c) 防風通聖散 防風一錢五分。荆芥一錢二分。麻黃一錢。山梔二錢。赤芍一錢五分。大黃八分。朴硝二錢。甘草八分。桔梗一錢。川芎二錢。歸身一錢二分。滑石一錢。薄荷八分。黃芩一錢五分。白朮一錢。石膏五分。連翹一錢。上藥十三味。清水煎服。主治保胎通血。

(d) 養胃湯 當歸二錢。白朮一錢二分。白芍一錢五分。茯苓一錢。半夏二錢。藿香一錢。砂仁八分。陳皮二錢。神麩一塊。香附一錢六分。(上藥十味加薑三片。大棗二枚。清水煎服。)

(e) 苦練丸 苦練(酒浸打碎)茴香(炒)當歸(卜藥三味份量相等)自一兩至四五兩隨意一共研爲末酒糊爲丸。

(一) 小產醫理 婦女懷娠了後。很多中途墮故。釀成小產的。小產又名流產。半產。倘胎形只二三月。沒有具備人形。只血肉模糊。一堆污塊。這稱墮胎。求子心切的。遭遇小產。最是不幸。同時小產症狀。更比成熟的大產麻煩而危險。所以更該注意。閨房醫療中重要部門呢。

婦女小產。總因根蒂不固。細別之。宋遂真古醫云。一初受胎而即墮者。肝血虛也。胎以血爲本。肝臟虛。則生發之機困。如春初多冷。草木不芽可

知也。治宜益肝血。胎斯固矣。二月墮者亦然。實者反是。三月墮者。心血虛也。胎以血爲根本。心臟虛。則長茂之氣消。如夏初天氣暑寒而花果不實。可知也。治宜養心補血。胎斯固矣。四月墮者亦然。五六七八月而墮者。責在氣血之並虛也。蓋氣爲血之衛。血爲氣之配。氣不能衛血。則血無所統。血不能配氣。則氣無所歸。兒在母腹中。所賴母之氣血。充和耳。苟有所傷。安所賴乎。是以調氣必先養血。益血尤須補氣。養血而血不生。補血之源。腎水是也。補氣而氣不足。補氣之根。命門火也。故五六月間而有墮胎者。六味去丹皮。加入參。麥冬。杜仲。續斷。爲要藥。寒痛者。加附子。少許。百無一失也。有胎亂動而不休者。胎熱也。不可用燥熱之劑。此外胎動者。或因衝任經虛。或因七情六欲。或因過服熱藥。須各審清病源而治之。如四五月間。心中昏悶。四肢沉重。不能移動。惡聞穀食。喜吞酸味。胎動不

安胎飲主之。或紫蘇飲加半夏茯苓枳壳。

(二) 小產醫方 小產醫治很多現集靈驗各方分別介紹如下。閩房之內遇孕婦小產時可依症狀而參酌飲服。

(1) 安胎飲 熟地三錢。當歸二錢。茯苓三錢。甘草二錢。川芎四錢。白朮三錢。半夏一錢。阿膠二錢。地榆四錢。白芍二錢。半(上藥十味加牛薑三片。清水煎服。治懷孕三四月胎動不安最效)。

(2) 紫蘇飲 紫蘇四錢。陳皮二錢。當歸二錢。白芍三錢。川芎二錢。人參二錢。甘草二錢。五分。腹皮三錢。(上藥八味。清水煎服)。

(3) 安胎和氣飲 白朮三錢。陳皮四錢。半。白芍五錢。木香二錢。半。陳倉米一撮。(上藥四味。薑水煎)。

(4) 膠艾湯 阿膠二錢。川芎三錢。半。當

歸二錢。艾葉四錢。甘草二錢。白芍三錢。半。熟地三錢。炮薑三錢。(上藥八味。清水煎服。治半產下血)。

(5) 安榮散 人參二錢。當歸四錢。通草二錢。滑石三錢。麥冬二錢。燈草五錢。甘草五分。(上藥七味。共研為末。蜜和成丸。孕婦四五月份。間日服一丸。可安胎元。免小產)。

(一) 難產歌訣 欲產之婦脈離經。沉細而滑腹又痛。定知半夜應分娩。脈法由來載內經。大凡臨產應如此。產婦安然切勿驚。身重寒熱痛頻頻。唇甲之色黑復青。子死腹中從此驗。舌青冰冷母歸陰。面赤舌青須細看。母活子死定分明。唇口俱青白沫出。子母俱亡自可憑。面青舌赤沫又出。母死子生定知真。臨症過來俱應驗。方知前哲不虛陳。

(二) 難產醫法 醫治難產。宜服重便。磨

神仙聚寶丹。或有不順的。用草麻子肉十四粒。硃砂雄黃各五分。蛇壳尺許。燒灰。加麝香一分。共研爲末。將水和作一九。用川椒湯滴於產婦肚臍內。再把丸藥也納入臍中。用綿紙數層覆其上。再用闊布縛住。等胎兒下了。便去其藥。推腸生的。倘腸不收。用新汲水入醋少許。噴其面。便自縮而上了。苦腸下時。須用溫湯洗濕。米篩盛之。若沾染塵垢。及香乾物。即不肯上。且粘住斷絕。母命不保了。

又有一種醫法。把產婦的頂心髮分開。用草麻子肉搗爛。敷在顛頂。把腸溫水養之。其腸便收。產母生命才沒危險呵。

又有橫生逆產。手足先出的。用細針連刺小兒手足。再把鹽擦其刺處。即便縮上。俗諺所謂「討鹽生」也。

(三) 縮胎醫法 前醫朱丹溪氏對難產縮胎曰：「世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。

富貴豪養之家。若貧賤辛苦者。無有也。古方書上有瘦胎飲一論。而其方爲湖陽公主作也。實非極至之言。何者。見其有用此方者。其難自若。予表妹苦於難產。後遇胎孕。則觸而去之。予甚憫焉。視其作爲。惟勤於針指。構思旬日。忽自悟曰。此正與湖陽公主相反。被奉養之人。其氣必實。耗其氣使平和。故易產。今形肥。知其氣虛。久坐。則氣不運。必氣愈弱。兒在胞胎。因母氣不能自運耳。當補其母之氣。則兒健易產矣。令其有孕至五六個月來告。卽與全方紫蘇飲。加補氣藥。與數十帖。果得男而甚快。遂以此方。隨母形色。性稟。參時令。加減與之。無不應者。因名其方曰達生散。」(本劑藥方見下錄)

(四) 難產醫方

(1) 達生散方 白朮二錢。薑皮三錢半。陳皮二錢。茯苓皮四錢。大腹皮三錢。桑皮一錢五

分。(上藥六味。共研爲末。米飲調服。)

(2) 竹叶湯方。淡竹叶二錢。麥冬肉一錢半。黃芩二錢。人參一錢。茯苓三錢。防風二錢五分。知母二錢。(上藥七味。清水煎服。)

3) 參朮飲。當歸三錢。熟地三錢。半川芎二錢。白芍三錢。人參錢半。白朮二錢。陳皮三錢。半夏二錢。甘草一錢。(上藥九味。加薑三片。清水煎服。)

(4) 參朮膏。人參二錢半。白朮二錢。黃芩錢半。茯苓一錢。陳皮一錢。桃仁一錢。炙草五分。(上藥七味。用羊猪泡煎湯代水。)

(五) 難產十論。相傳婁氏難產十論。現代醫士採爲宗法。因錄之。作問房醫術生產門參證云爾。

(1) 正產醫論。婦人懷胎。十月滿足。忽腰腹作痺疼痛。相次胎氣頓陷。至於臍腹痛甚。乃

至腰間重痛。穀道挺迸。繼之漿破出血。嬰孩遂生。此名正產。

(2) 傷產醫論。婦人懷胎。未產一月之前。忽然臍腹疼痛。有如欲產之狀。仍却無事。是名試月。非正產也。但一切產母。未有正產之候。即不可令人抱腰。亦不可令產母亂動用力。若兒身未順。纔方轉動。便教產母虛亂用力。使兒錯落。忽橫。忽倒。不能正生。皆緣產母用力未當。用力之所致也。直待身順。臨逼產門。方始用力一送。令兒下生。此名傷產。

(3) 催產醫論。孕婦欲產。漿破血下。已見是正產候。但却未服藥。不生。即可服催生藥。試之。或有經及數日而不產。則產母困倦。亦可服藥。助產母之正氣。令兒速生。此名催生。

(4) 凍產醫論。是因冬月寒冷。產母經血得冷。則凝。以致胎兒不能生下。此害最深。若冬

月生育者。下部切不可脫棉衣。并不可坐臥寒處。當滿房着火。常有暖氣。令產母背向火。使臍下腿膝間嘗暖。血得熱則流行。兒便易生。是名凍產。

(5) 熱產醫論 時當夏令。感燥酷烈。產婦要溫涼得所。亦不恣意取涼。傷損胎氣。又不可房中人多。熱氣逼襲產母。使產母血沸。發熱頭痛面赤。昏昏如醉。乃至人事不省。此名熱產。

(6) 橫產醫論 兒先露手或先露臂。此由產母未常用力。而先用力故也。兒身未順。用力一逼。遂致身橫。不能生下。當令產母安然仰臥。然後推兒。徐徐先推其手。令人直上。漸漸逼身。以中指摩其肩。推上面正之。或以指摩其耳而正之。必須產母仰臥。以便推兒正之。候其兒身正。煎催生藥一盞服之。方可用力。令兒下生。此名橫產。

(7) 倒產醫論 產母胎氣不足。關鍵不牢。用力太早。致令兒不能迴轉。更有下先露兒足。

當令產母仰臥。令穩婆推其足。漸漸入內。不可令產母用分毫力。亦不得令其驚恐。務必安慰。使兒自順。名曰倒產。

(8) 偏產醫論 兒身未正。產母用力一逼。致令兒偏柱左腿。或偏柱右腿。故頭先露。偏柱一半。不能生下。當令產母仰臥。次令看生之婦。輕輕推兒近上。以手正兒頭。令兒頭正。後產母用力一送。即便生下。若小兒頭後骨柱柱穀道。只露其額。當令看生之人。以綿烘熱。裹手於穀道外。旁輕輕推兒頭端正。便令產母用力一送。兒即下也。此名偏產。

(9) 礙產醫論 兒身已順。而露正頂。不能生下。蓋因兒身迴轉。臍帶繫其肩。因此露頂。而不能生下。當令產母仰臥。令看生之婦。輕輕推上。徐徐引手。以中指按兒肩下。撥其肚帶。仍須候兒身正順。方令產母用力一送。兒即生下。此名礙產。

(10) 坐產醫論。坐產係於臨產時。高處繫一手巾。令產母以手攀之。輕輕屈足坐定。令兒生下。非坐在物上也。此名坐產。

第五章 閨房產病

婦女生產。既為生死關頭。因此胎前產後。每多病症。這種與生育連帶的病症。中西醫學上都列為專門科目。分「胎前」「產後」情況大不相同。「胎前」為胎兒沒有破腹出世以前。產母所患的病痛。「產後」乃孕婦生育子女墮地了。後接踵所患的症候。現在編者把胎前產後兩種生育病併為一節。總名曰「閨房產病」。生男育女本是閨房唯一使命。因生產引起的種種病症。更屬閨房本色。歸納為一個範圍。很是確當吧。現在順序分述如后。

一 胎前痢疾

〔病理〕婦人胎前而生痢疾。是為險症。必須深切注意。凡小腹作痛。排泄不止。氣喘咳嗽。諸病夾雜。原因內邪外感。沾染時疫所致。

〔治法〕治理婦人胎前痢疾。病人體質素來壯盛的。宜服甘連湯。體質素弱而百病叢生的。那須請專門醫生診斷處方。或非單純的甘連湯所能奏效了。

〔處方〕甘連湯 甘草五分。黃連三錢。白朮藤三錢。(清水煎服。空心送下。)

二 胎前白帶

〔病理〕婦人胎前白帶。原因胎虛寒冷。以致凝澀而為白帶。本症很是險惡。倘日久不治。必損胎元。母子兩亡。

(治法與處方同前。脂膜白帶請參攷。)

三 胎前赤帶

〔病理〕婦人胎前赤帶。都因吃熱食太多。以

致胎元熱極。血燥妄行。下赤色的帶了。

〔治法〕治理婦人胎前赤帶。該採涼血安胎。用側柏湯主治。很著靈效。

〔處方〕側柏湯 側柏葉二錢。白朮一錢。丹皮三錢。蒲黃二錢。淡黃芩五錢。（清水煎服。）

四 胎前中風

〔病理〕婦人胎前中風。牙關緊閉。不知人事。這種暴襲的重症。原因胎婦受了外邪時症。以致發生。

〔治法〕凡遇胎婦中風者。不可驚慌。先用通關散吹入鼻中。候其自然蘇醒。再用挑風湯兼治。

〔處方〕

（1）通關散 牙皂一錢。細辛三分。原麝一分。（七藥三味共研細末。吹入病者鼻內。）

（2）挑風湯 白朮一錢。白芷皮一錢。麻黃五分。杏仁二錢。川芎五分。雙茯苓一錢。甘草二

分。當歸二錢。獨活五分。青防風二錢。（外加大棗生姜清水煎服。）

五 胎前咽痛

〔病理〕婦人胎前咽痛。原因胃中積熱。兼有痰氣。以致咽部隱隱然作痛了。

〔治法〕治胎前咽痛。可用防風升麻湯。最靈效。

〔處方〕防風升麻湯 防風二錢。升麻二錢。桔梗二錢。甘草二分。（清水煎服。）

六 胎前發暈

〔病理〕婦人胎前發暈。因血蔭胎。缺少神氣的緣故啊。

〔治法〕治療胎前發暈。以扶養神氣為主。宜用八物湯。

〔處方〕八物湯 當歸二錢。白朮一錢。人參一錢。地骨皮一錢。黃芪二錢。甘草三分。白芍一錢。

川芎一錢。(加大棗一枚。清水煎。不拘何時服。)

七 胎前謊語

〔病理〕婦人胎前大熱。不知人事。謊語鬼話。這名「子癇」。

〔治法〕胎前謊語。宜用小柴胡湯。退其潮熱。鎮他的心神。

〔處方〕小柴胡湯。柴胡二錢。黃芩二錢。半夏二錢。甘草五分。人參五分。加姜棗水煎。溫服。

八 胎前便閉

〔病理〕婦人胎前。每有大小便不通。症名「轉胞」。這因氣逆濕阻所致。

〔治法〕一般醫家。對於胎前大小便不通。治法。都主洩氣利尿。原理固對。但不收效。所以現在主張服八味丸。便竟可通了。

〔處方〕

(1) 八味丸 (治大便) 淮山藥一

兩。茯苓一兩。炙肉一兩。澤瀉二兩。製附子一兩。熟地一兩。丹皮一兩。桂心五錢。(上藥八味。共研細末。和蜜爲丸。空心塗水送下。)

(2) 海金砂丸(治小便) 海金砂二兩。猪苓二兩。澤瀉二兩。白朮二兩。灌木通一兩。葶藶一兩。(上藥六味。共研爲末。米糊爲丸。空心清水送下。)

九 胎前頭風

〔病理〕婦人胎前患頭風。是一種輕微的病症。原因不外伏邪感冒。致釀風火。眩痛了。

〔治法〕治婦人胎前頭風病。不需服藥。因恐傷其胎。只要單用雄黃散吹進鼻管便。

〔處方〕細辛五錢。藜本五錢。川芎一錢。麝香一錢。雄黃一錢。川烏一錢。(上藥六味。共研爲末。每次吹入鼻中少許。其痛即止。)

一〇 胎前嘔吐

〔病理〕婦女胎前積滯在脾。胃中好似有一樣東西格住。飲食了東西下去便吐出來。通俗一般人誤爲反胃。豈知這是一種痰逆氣份的嘔吐呵。

〔治法〕凡胸格飽悶。口吐酸水。飲食不進。胃中有梅核形痞塊隔住的好像反胃模樣的病症。先用烏梅丸。後服九仙奪命丹。消掉了這核後。飲食自會進納了。不過忌食魚腥煎炒倘若不立刻復發哪。

〔處方〕

(1) 烏梅丸 月石一錢。雄黃一錢。藜蘆四十九粒。乳香一錢。硃砂一錢。草菓一錢。胡椒四十九粒。木香五分。(上藥八味共研爲末。烏梅肉爲丸。如白菓大。每服含化一丸。日服三丸。)

(2) 九仙奪命丹 厚朴一錢。豆豉一錢。茯苓一錢。山查一錢。陳皮一錢。蒼朮一錢。枳殼三

錢。草菓一枚。木香一錢。(上藥九味共研爲末。滾湯送下。)

一一 胎前胎氣

〔病理〕婦人懷胎了後。很多在二三月後。因氣份犯逆。身體發熱。口苦舌乾。飲食了後便嘔吐。頭昏目眩。這種胎氣不和。對於十月滿足後生育很有關係。所以諺未雨綢繆。不可因懷胎病而疏忽了。

〔治法〕胎氣不和。該用和氣散主治。

〔處方〕和氣散 陳皮一錢。小茴香一錢。枳殼一錢。蒼朮五分。砂仁一錢。益智仁一錢。厚朴五分。木香一錢。(清水煎濃溫服。)

一二 胎前咳嗽

〔病理〕婦人胎氣不足。變生此症。咳嗽氣急。病重的竟不能晏臥。這在懷娠二三月後。便都患了。

〔治法〕治療婦人胎前咳嗽。該用涼藥。以白虎湯治之。不過察得病者有熱傷虛煩的那便須加米同煎了。

〔處方〕白虎湯 石膏。甘草。知母。人參。

〔編者按〕白虎湯在中醫學說為猛性涼藥。不輕易用。所以本症所開白虎湯。病家真欲照服時。最好就診社會上有信譽經驗國醫。經他診斷可服則服之。請慎重為囑。

一三 胎前吐血

〔病理〕婦人懷娠期間。如有氣急吐血。日夜不得安臥惡現象。這因痰氣壅塞五心煩熱。或傷生冷。觸動熱毒。以致上沖吐血了。通俗認為逆經實是大誤。

〔治法〕治療胎前吐血。宜用五虎湯順氣理肝。紫苑湯解熱驅毒。

〔處方〕

(1) 五虎湯 廣皮二錢。甘草二錢。桑皮一錢。桔梗一錢。蘇子三錢。石羔三錢。

(2) 紫苑湯 阿膠一錢。桑皮一錢。五味子一錢。紫苑一錢。杏仁一錢。冬花一錢。玉桔梗一錢。蘇子一錢。貝母一錢。知母一錢。廣陳皮五分。枳實一錢。(清水煎。臨臥時服。)

〔附〕熱症吐血 婦人胎前吐血。如因吃熱食太多。食火沖傷。胎氣大熱。則用側柏丸治。(側柏叶四兩。黃柏四兩。共研細末。蜂蜜搗和為丸。不拘何時開水飲服。)

一四 胎前衄血

〔病理〕婦人在胎前衄血不止。這因胎婦積熱不散。以致鼻尖紫紅。影響胎兒中熱毒哪。〔治法〕治療胎前衄血。可用丹皮湯。鼻紅隱去。便為病癒之徵。

〔處方〕丹皮湯 丹皮三錢。黃芩三錢。白芍

四錢。(清水煎服。)

一五 胎前敗血

〔病理〕婦人懷胎虛弱氣血兩虧。便要患敗血症。這種敗血其流甚急的。雖無牛命危險。終非好現象哪。

〔治法〕治療胎前敗血症。速服阿膠湯。定有神效。

〔處方〕阿膠湯 阿膠三錢。當歸三錢。熟地一錢。茯苓一錢。白芍一錢。地榆二錢。加生姜一片。(清水煎空心服下。)

一六 胎前傷血

〔病理〕婦人胎前跌傷。動紅損及胎兒。惡血流露不止。普通因此而釀小產。利害的。便有生命危險了。

〔治法〕凡遇胎婦此種意外。該用人參安胎散救治。使培元固胎。扶人安全之途。

〔處方〕人參安胎散 炒蒲黃五分。人參五分。川斷五分。當歸一錢。炒白芍一錢。生地一錢。川芎五分。蘇叶一錢。金毛狗脊三錢。阿膠二錢。(清水煎七分溫服。)

(一)產後總論 婦人生產了後。倘是平安。順產。沒有什麼變兆。那麼不須服藥。三日之內。只要拿荊芥炭。益母草。砂糖煎湯。隨時使產婦服。飲務使惡露下盡。便沒血暈腹痛的病患了。最忌飲酒雞蛋牛羊猪肉……等葷腥。須用白米粥與安樂菜。(這是上海舊式生產習俗。用鹹菜干張和香菌金針雲耳豆油煮成的素菜。習慣上由母親送來。)半月之後。才許開葷。嗜嗜肉味。(猪肉以白煮蹄胖最佳。因利奶汁。)肉量由少而多。初時只吃肉湯反增營養。因為產婦食肉過多。中醫法上立論有陽盛陰虛流弊。閨房生育。實行舊法接生的。對於這一些初步常識。必須知道。尤宜注

意。

生產時下血過多。惡露未盡。或傷飲食。或感風寒。或夾氣惱。或三日蒸乳。都可發熱。增寒。身疼腹痛。應當仔細。察病因。不可固執。已見前醫朱丹溪云。一產後以大補血為主。雖有雜症。以未治之產後。不可發表。又不可早用白芍。以其酸寒。恐伐生氣也。慎之一。丹溪先生的話。確是開房醫療常識的金科玉律。該銘牀右的呵。

(二)產後醫理 婦人產後。有發熱症狀的。這因陰血虛。陽無所附。以致浮散於外。宜服四物湯。補陰血。而炮溫薑之辛溫。從治。收斂的浮散。使歸於陰。不過產後脾胃虛弱。都由飲食過量。所傷滯而發熱。所以遇產婦有這症狀時。須審問何物所傷。有食無食。胸膈飽悶。惡食泄瀉。以傷食治。如發熱而飲食自調的。才用補血藥。產後血暈。因虛火引血上行。慢慢覺得昏暈了。遇本症變

化時。快拿鹿角燒灰。出火毒。研細末。養酒和童便。灌下。便醒。行血更快了。又通行土法。拿鉄秤錘。炭火燒紅。以醋淬之。使產婦嗅聞。也著特效。比鹿來得價廉便易呵。

前醫鄭良棟曰。一新產血暈。不省人事。大類中風。但切不可遽以中風治之。急服琥珀丸。卽癒。如兒已下地。一時血暈。昏昏不醒。速扶起抱住。勿令臥下。快與童便灌之。如不醒。再以燒紅炭投醋中。使醋氣透入產婦鼻內。卽甦。因症用法。無不應效。

(三)產後醫法 產後子已在褥。切不可使之卽臥。須扶坐片時。因初產之婦。血氣未定。恐其血乘虛而上逆也。新產飲酒。前而已說起。最是大忌。以服童便。最有益。他藥苦寒。雖屬降下品。質都能凝滯敗血。並且產後便發熱。切不可服涼藥。因她既伐生氣。而又使血液凝聚。童便是人身元

氣所成。醫學名詞稱「還元丹」。本以八補人之義。新產飲食最難剋化。如赤豆沙、雞鴨蛋……等類不可吃。因為剛才生產大下血。脾胃很弱。吃了難以消化的東西。便罹產後病了。

新產的脈緩滑結實。大絃緊。鬼來侵。若得重沉小者活。忽覺堅牢。命不存。寸口澀疾。不調死。沉細附骨不絕生。請看此候。分明見。常須念此。問心經。

新產胞衣不下。血暈不醒。腹中刺痛。敗血攻心。或眼閉口噤。或嘔語狂言。困頓垂死的。取琥珀黑龍丹灌救立效。黑神丹亦可。

黑龍丹 當歸二錢。五靈脂二錢。川芎二錢。熟地二錢。良薑二錢。上藥五味。共成一兩。拿沙盒盛。赤石脂用紙包。鹽泥封固。炭火煨使通。紅火候冷了。打開看。成黑色。研細後。再加入後藥。

百草霜二兩。硫黃錢半。乳香錢半。花蕊石一

錢。琥珀屑一兩。上藥五味。和前藥未研至極細。拿醋糊為丸。如彈子大。每服一丸。炭火煨令使紅。投入老薑自然汁。與童便。入酒。瀉出。烘乾。研細。用酒吞服。本劑治產後一切血症。和胞衣不下。危險情狀時。救急最效。

清魂散 澤蘭一兩。人參一兩。荆芥四兩。炙甘草八分。上藥四味。每服二錢。熱湯溫酒各半盞調服。

一 產後敗血

(一) 敗血醫法 產婦敗血。有衝胃衝心之別。不可不辨。上衝於心。便顛狂作亂。下衝於胃。飽悶嘔惡。兩種徵象。都是危症。前醫王肯堂曰。產後敗血。衝胃則嘔。衝心則發狂跳躍。衝肝則喘。遇發狂患者。急宜令兩人扶住。以童便降香。沉香。當歸煎湯灌下。其惡血自下行。新血各歸經。即時安寧矣。又名醫皇甫中曰。產後敗血。停蓄上

干於心。心氣閉塞。故舌強不能言語者。八珍散。產後內因痰氣鬱滯。閉目不能語。用明礬一錢。為末。白開水冲服。

(二) 敗血醫方

(1) 荆芥散方 荆芥一兩三錢。桃仁炒五錢。上藥兩味。共為末。開水送下。如喘加杏仁甘草各三錢。本劑治產後血暈亦效。

(2) 獨行散方 五靈脂四錢。一半炒。一半生。上藥研為細末。溫陳酒吞服二錢。即可破瘀生新。

二 產後狂喘

(一) 狂喘醫法 婦人產後。白搶心。悶喘。滿欲絕的。以蒲黃散治。惡露不盡。心腹疼痛。黑神散治。惡露不盡。兒枕痛。當歸失笑散治。產後忽然口噤。語言顛倒。如似見鬼。這是敗血攻心。並非風寒邪祟。妙香散治。或用黑龍丹。煨過酒吞下。

(二) 狂喘醫方

(1) 蒲黃散方 乾荷葉二錢半。甘草二錢半。丹皮二錢半。元胡二錢半。生地三錢半。上藥五味。挫作二劑。清水煎服。加入蜜少許。本劑主治惡露不快。血上搶心等症。

(2) 黑神散 黑豆(炒)升半。熟地四兩。當歸四兩。肉桂四兩。乾薑炒四兩。生蒲黃四兩。炙甘草四兩。炒白芍四兩。上藥八味。共研細末。每服二錢。童便各半盞調服。本劑治惡露不盡。胞衣不下。腹痛不止最效。

(3) 當歸失笑散方 當歸五錢。炒蒲黃五錢。五靈脂五錢。上藥三味。共研為末。每服二錢。醋調。熬成膏子。開水送下。本劑治產後心腹絞痛欲死。和兒枕作痛最效。

(4) 妙香散 麝香研一錢。遠志肉(去心)一兩。黃耆一兩。人參五錢。茯苓一兩。茯神一

兩。桔梗五錢。甘草五錢。木香煨二錢。硃砂三錢。淮山藥（薑汁炒）一兩（上藥十一味。共研爲末。每服二錢。開水調服。）

（5）滑胎散方 滑石六錢。冬麥子五錢。甘草二錢（上藥三味。共研爲末。每服二錢。用酒沖下。本劑主治坐草太早。努力過多。以致難產。最效。）

（6）神應散方 白芷一兩。百草霜一兩。（上藥二味。童便酒調下。三錢。本劑主治橫生逆產。胞漿先破。最效。）

（7）牛膝湯方 牛膝四兩。瞿麥四兩。當歸三兩。通草六兩。滑石八兩。葵子五兩（上藥六味。用水九升。煎至三升。每次服一升。本劑主治胞衣不下。臍腹堅痛。服本劑。爛下。最效。）

（8）黃耆湯方 炙黃耆二錢。白朮炒一錢。防風一錢。熟地二錢。牡蠣研煨。錢半。茯苓一錢。

麥冬五分。甘草五分（上藥八味。外加大棗二枚。清水煎服。治產後去血過多。自汗不止。最效。）

（9）扶神散方 人參一錢。伏神八分。甘草一錢。山藥一錢。當歸一錢。肉桂五分。遠志肉一錢。生薑五錢（上藥八味。大棗二枚。清水煎服。本劑主治產後心虛。怔忡不定。最效。）

（10）當歸羊肉湯 當歸七錢。人參七錢。黃耆一兩。生薑五錢。羊肉一斤（煮汁五大碗。入藥煎四碗。分作六次服。本劑主治產後寒熱。自汗。肢體疼痛。名曰蓐勞。百藥罔效。最靈。）

三 產後蓐勞

（一）蓐勞醫法 婦人產後蓐勞。原因生產久坐多語。運動用力。以致頭目四肢疼痛。寒熱如瘧。以白茯苓散治。自汗發熱。虛羸。飲食不化。時欬發渴者。人參鱉甲散治。發寒熱。石子湯治。頭痛氣短。小腹痛。而有寒熱者。增損柴胡湯治。

(二) 麝勞醫方。關於麝勞的醫方。除上節的「當歸羊肉湯外」。尚有許多。現特彙錄如下：

(1) 人參蟹甲散方。蟹甲一隻。(炙灰)

人參五錢。肉桂五錢。桑寄生五錢。當歸五錢。茯苓五錢。白朮五錢。大熟地五錢。桃仁五錢。麥冬五錢。續斷五錢。牛膝一兩五錢。黃耆一兩。(上藥物十三味。共研爲末。豬腎一對去膜。生薑一片。水二盞。棗三枚。煎至一盞。入前末藥二錢。葱白三寸。烏梅半個。荆芥五種。再煎數沸。去渣。空心服。)

(2) 石干湯。豬腰子(一對去膜。竹刀切碎。)

香薷二兩。葱白一兩。白芍二兩。(上藥物四味。分作兩劑。每用水三升。半煎。分三次服。)

(3) 白茯苓散。茯苓一兩。當歸五錢。川芎六錢。白芍五錢。肉桂四錢。黃耆五錢。人參五錢。熟地一兩。(上藥物八味。先以二盞水。煮豬腎。再

加薑二片。棗三枚。入藥五錢。去渣。溫三服。)

(4) 增損柴胡湯。柴胡五錢。半夏四錢。人參五錢。川芎三錢。半橘紅二錢。甘草一錢。半。(上藥六味。清水煎服。)

(5) 抵聖湯。赤芍一錢半。半夏一錢。澤蘭一錢。陳皮一錢。人參一錢。甘草七分。(上藥五味。加薑三片。清水煮服。)

四 產後虛渴

(一) 虛渴醫法。婦女產後。血熱心煩。口燥。這是虛渴的癥象。宜服涼血飲。虛煩而患渴的。治以生脈散。因爲產後虛渴氣少。頭目眩暈。飲食無味。熟地黃湯。或四物湯。加麥冬。花粉。

(二) 虛渴醫方。治產後虛渴醫方有二。

(1) 涼血飲方。黃芩(酒炒)二錢。赤芍二錢。川芎二錢。甘草一錢。荆芥二錢。花粉二錢。生地二錢。麥冬二錢。(上藥八味。分作二服。每服

加竹葉七片。燈心二十莖。清水煎服。

(2) 牛脈散方 人參二錢。麥冬二錢。五味一錢。上藥三味。清水煎服。

(3) 熟地黃湯 人參四錢。甘草七分。花粉六錢。麥冬三錢。熟地五錢。上藥五味。分作二服。元米一撮。蜜棗煎服。

五 產後浮腫

(一) 浮腫醫法 產後敗血停蓄五臟。循經流入四肢。為水。因成虛浮腫。宜服調經散。如產後氣血大虧。肢體浮腫。不可通利其水。補其氣。與血。四君子湯加蒼朮治之。

(1) 調經散 當歸一兩。赤芍一兩。肉桂一兩。沒藥一錢。琥珀一錢。麝香五分。細辛五分。炙甘草二錢。上藥八味。共研細末。每服五分。入薑汁少許。酒調下。

六 產後風痿

(一) 風痿醫法 產後諸風。痿弱筋攣無力者。以血風湯治。產後氣弱汗多。風搏之而成瘓。口噤。角弓反張。脊強汗出不止者。難治。大聖散加川芎黃耆。

(1) 血風湯 秦芩一錢。羌活一錢。防風七分。白芍(酒炒)一錢。大熟地二錢。白芷八分。川芎一錢。白朮(炒)一錢。歸身一錢半。炙黃耆錢半。茯苓一錢。半夏一錢。上藥十二味。清水煎服。

七 產後怔忡

(一) 怔忡醫法 婦女產後因驚而發。心神不定。怔忡恍惚。大聖散主治。產後血少。怔忡恍惚。驚悸。睡眠不寧的。益茶湯。養心湯。寧老丸。主治產後心思恍惚的。茯苓散主治。

(二) 怔忡醫方
(1) 大聖散 川芎一兩。黃耆(蜜炙)

一兩。當歸一兩。木香一兩。人參一兩。甘草三錢。伏神一兩。麥冬一兩。上藥八味。挫為末。每服七錢。薑三片。水二盞。煎至八分。空心服。

(2) 益茶湯 當歸錢半。黃耆(炙)一錢。遠志一錢。棗仁(炒)一錢。柏子仁(炒)一錢。伏神一錢。人參一錢。白芍(炒)八分。甘草(炒)三分。紫石英八分。上藥十味。薑三片。清水煎服。

(3) 養心湯 黃耆五錢。伏神五錢。遠志肉五錢。當歸五錢。人參二錢。半夏麩。川芎五錢。棗仁(炒)二錢。半肉桂二錢。半五味三錢。柏子仁二錢。甘草(炙)四錢。

(4) 茯苓散 人參一錢。甘草一錢。山藥一錢。當歸一錢。遠志肉一錢。茯苓一錢。桂心一錢。麥冬一錢。上藥八味。用棗三枚。清水煎服。

八 產後中風

(一) 中風醫法 婦女產後中風口噤。不省人事。牙關口閉。手足痠澀的。舉輕古拜散。產後血大虧損。經絡空虛。勞碌太早。風邪乘虛而入者。小續命湯。或愈風湯。中風角弓反張。涎潮湧出。大豆子湯。

(二) 中風醫方

(1) 小續命湯 麻黃一錢。人參一錢。黃芩一錢。白芍(炒)一錢。川芎一錢。甘草八分。杏仁十四粒。防己一錢。肉桂七分。附子(製)一錢。上藥十味。清水煎服。

(2) 大豆子湯 大黑豆一升。炒使焦黑。候烟起。以上好陳酒半斤。沃之入瓶內。貯候聽用。酒內再加獨活四錢。溫服亦可。

九 產後陰虛

(一) 陰虛醫理 婦女生育是大排血。產後陰虛血耗。四物湯加炮薑。產後去血過多。陰虛

而致內熱煩懣。呼吸氣短。頭痛悶亂。骨節煩疼。人參當歸散。陰虛發熱者。小柴胡湯去半夏加花粉。

(二) 陰虛醫方

(1) 人參當歸散 人參一兩。當歸一兩。肉桂一兩。熟地一兩。(上藥四味。每服五錢。加竹葉生薑煎服。)

(2) 小柴胡湯 人參二錢。花粉三錢。黃芩四錢。半柴胡六錢。甘草一錢。(上藥五味。加薑水煎服。)

一〇 產後瘧疾

(一) 瘧疾醫理 婦人產後瘧疾。有寒熱相兼。有熱多寒少。應當分別認清醫治。熱多草果飲。或青皮飲。寒多養胃湯。或四獸飲。

(二) 瘧疾醫方

(1) 草果飲 草果一錢。川芎一錢。紫蘇一錢。白芷一錢。良薑七分。甘草八分。陳皮八分。青

皮一錢。(上藥八味。清水煎服。)

(2) 四獸飲 人參一錢。白朮(炒)一錢。陳皮一錢。茯苓一錢。甘草五分。草果八分。烏梅三個。半夏六分。(上藥十二味。加薑棗。清水煎服。)

(3) 勝金丹 常山(酒蒸)四兩。尖檳榔一兩。(上藥二味。共研爲末。醋糊爲丸。病未發前。先吞三十九。至五更再吞十五。丸溫酒送下。丸如松子大。病發時切不可服。)

一一 產後泄瀉

(一) 泄瀉醫法 婦人產後患泄瀉症的。這因小便不利而瀉。陰陽不分故也。宜服胃苓湯。泄瀉都腹痛。是爲食積。宜加消食藥。惡露不行。宜活血。倘是外感風寒而內傷飲食的。宜養胃湯。惡露已淨。不必活血。倘未干淨。加歸尾。桃仁。久瀉不止。進養胃湯。加肉桂。肉果。如果挾寒腹痛。腸鳴。小

水清白不濁。口不渴。加肉果炒白芍。如熱瀉。腸垢口渴時痛時瀉。這是火哪。宜薑炒黃連。木通。或瀉或不瀉。或多或少。是痰象。前醫王肯堂云。一產後瀉利。不可混治。用補脾為主。如白朮。茯苓。神麴。甘草。陳皮等。兼以消食理氣之劑。

(二) 泄瀉醫方

(1) 君苓湯 白朮(炒)二錢。茯苓二錢。猪苓一錢。澤瀉一錢。(上藥四味。清水煎服。加平胃散即成平胃散)

一二 產後心痛

(一) 心痛醫法 婦女產後因敗血凝聚。氣往上冲。致心腹疼痛。宜用大巖蜜湯。七情相干。血和氣併發。心痛。元胡索湯可治。若為血攻於心的腹痛。可服失笑散。寒邪所致的腹痛。則用理中湯。

(二) 心痛醫方

(1) 大巖蜜湯 當歸一錢。獨活一錢。乾薑二錢。熟地一錢。甘草五分。北細辛七分。吳茱一錢。肉桂一錢。遠志一錢。白芍一錢。(上藥十味。清水煎服。主治氣上衝於心。)

(2) 元胡索湯 元胡一錢。當歸一錢。白芍(炒)一錢。厚朴(薑炒)一錢。文朮(煨)一錢。三稜(煨)一錢。川練子一錢。木香一錢。川芎一錢。二分。桔梗一錢。二分。檳榔一錢。黃芩八分。甘草七分。(上藥十三味。清水煎服。主治心腹疼痛。)

(3) 失笑散 蒲黃一錢。五靈脂一錢五分。(上藥二味。研末。陳酒吞服。主治胃脘痛。)

一三 產後咳嗽

(一) 咳嗽醫法 產後的咳嗽病。產婦很容易沾染。如因惡露未盡引起的。二陳四物湯加活血藥。已淨的。知母茯苓湯。發熱的。八物湯加黃柏。

知母少許。有惡露上攻。肺經受邪的咳嗽。二母散
主治。血風感寒熱濕氣。咳嗽痰涎。坐臥不安。用四
陰煎。有外感的。用參蘇飲。

(二) 咳嗽醫方

(1) 二母散 知母一兩。貝母一兩。人參
八錢。茯苓八錢。杏仁十九粒。(研)杏仁十四粒
(研)。(上藥六味。每服七錢。煎至八分。漸漸呷
下。)

(2) 四陰煎 生地三錢。麥冬二錢。白芍
二錢。百合二錢。沙參二錢。生甘草一錢。茯苓錢半。
(上藥七味。清水煎服。本劑具保肺清金之效。如
夜熱盜汗。加地骨皮。痰多加川貝。)

(3) 白薇湯 白薇三錢。當歸三錢。人參
錢半。甘草七分。(本劑主治多汗。產後鬱冒。由於
胃弱不實。血虛必厥。厥必鬱冒。鬱冒則多汗。汗多
便大便祕結。都因去血過多。服白薇湯。如不效。可

進蘇麻粥。(蘇子。麻仁。不拘多少。研爛。取汁。煮粥
食之。有奇效。)

一四 產後腳氣

(一) 腳氣醫法 南方地土潮濕。易患腳
氣。產婦熱悶。氣往上冲。逆轉下。而釀脚氣。小續命
湯。去麻黃。石膏。附子。主治。又有平日感受風寒。暑
濕。燥火之氣。因產後血氣不足。遂襲足經。乘虛而
發的。可用獨活寄生湯。

(二) 脚氣醫方

(1) 獨活寄生湯 獨活一錢。桑寄生八
分。杜仲一錢。牛膝一錢。細辛七分。秦艽一錢。白茯
苓一錢。白芍一錢。(酒炒)肉桂六分。川芎八分。
防風七分。人參八分。炙甘草七分。熟地一錢。當歸
一錢。(上藥十五味。清水煎服。)

一五 產後頭痛

(一) 頭痛醫法 婦女產後頭痛。有因氣

血虛。弱着寒着風不同。不可一律醫治。凡氣血虛弱的。用四物湯。痰厥的。用二陳湯。着寒着風的。用芎蘇飲。隨症加減。有產後發現異症。手足牽搐。咬牙頭痛昏冒。先服四物後服秦芫丸。

(二) 頭痛醫方

(1) 芎蘇餘方 川芎二錢。蘇葉一錢半。枳殼一錢。前胡一錢。葛飲八分。木香五分。桔梗一錢半。甘草五分。陳皮一錢。半夏一錢。(上藥十味外加薑三片。清水煎服)

(2) 秦芫丸方 川芎三兩。當歸二兩。秦芫二兩半。荆芥二兩。(上藥四味。共研爲末。醋糊爲丸。每服四錢。)

一六 產後疼痛

(一) 疼痛醫法 很多產婦。因平日勞作過度。或產後提早勞動。以致氣血升降失常。留滯在關節間。筋脈牽引。或手足拘攣。不能伸屈。以致

遍身疼痛。宜服趁痛散。若爲惡露不淨。流於遍身。肢節腰脚關節等處作痛。宜以如神湯治。

(二) 疼痛醫方

(1) 趁痛散 當歸一錢。肉桂八分。白朮(炒)一錢。牛膝一錢。黃耆一錢。獨活八分。薤白一錢。寄生一錢。(上藥八味。主治敗血。流經。最效。用薑三片。清水煎服)

(2) 如神湯 厚朴(炒)一錢。半夏六分。枳殼(炒)七分。白芍(炒)八分。木香六分。肉桂六分。陳皮六分。茯苓六分。人參六分。甘草五分。蒼朮(炒)一錢。茴香(炒)一錢。香附(醋炒)七分。桔梗八分。乾薑六分。川芎七分。當歸一錢。白芷八分。木瓜六分。桃仁六分。(上藥二十味。主治肢節疼痛。最靈效。清水煎服)

一七 產後兩損

(一) 胞損醫法 婦女產後胞損。血水淋

滴。敗血不止。淋漓不休。以烏金散治。如血不止。四肢乏力。沉困。以牡蠣散治。倘生產時。舊法穩婆。手術不慎。誤損胞衣。以致日夜淋漓者。參朮膏主治。

(二) 胞損醫方

(1) 茅根湯 茅根二錢。瞿麥二錢。半萎子二錢。茯苓錢半。人參一錢。蒲黃一錢。桃膠一錢。滑石一錢。半夏三分。石膏一錢。紫貝燒一個。(上藥十一味。外加燈心。薑水煎服。)

(2) 烏金散 麒麟竭一兩。百草霜一兩。

元胡一兩。當歸一兩。男髮灰一兩。鯉魚鱗一兩。肉桂一兩。赤芍一兩。松墨(醋浮煨)一兩。(上藥九味。共研爲末。每服二錢。空心酒下。)

(3) 牡蠣散 牡蠣粉二錢。川芎一錢。茯苓一錢。熟地一錢。龍骨二錢。續斷一錢。當歸一錢。

艾葉(酒炒)一錢。人參一錢。五味十粒。地榆一錢。甘草五分。(上藥十二味。加薑三片。大棗二枚。

清水煎服。)

(4) 參朮膏 人參一斤。白朮一斤。(上藥兩味。煎成膏。子每用三錢。白湯送下。)

一八 產後寒熱

〔病理〕 婦人產後。惡寒發熱。原因外感內傷。以致釀斯現象呵。

〔治法〕 治療產後惡寒發熱。宜用補血散去其風邪。後服五積散。

〔處方〕

(1) 補血散 當歸二錢。茯苓二錢。附子一錢。川芎一錢。白芍一錢。茯苓一錢。甘草五分。(上藥七味。用酒煎。空心服下。)

(2) 五積散 厚朴(姜汁)一錢。枳壳一錢。蒼朮(米泔水浸炒)五分。川芎五分。肉桂五分。枳梗五分。乾姜五分。陳皮一錢。甘草五分。白芍一錢。茯苓一錢。半夏製一錢。(加生姜三片。清

水煎七分。溫服。

一九 產後脚痛

〔病理〕婦人產後。雙脚痛。不可忍者。係因下血虛也。下元清冷。寒邪入骨。才釀這現象。哪。

〔治法〕治產後脚氣痛。宜用烏藥順氣散加法。

〔處方〕烏藥順氣散加法 烏藥一錢。姜蠶一錢。桔梗一錢。江枳壳一錢。天麻一錢。白芷五分。川芎五分。乾姜五分。石南藤（生）一錢。乳香五分。陳皮五分。麻黃五分。甘草二分。桑寄生一錢。葱頭（帶根）一根。（加姜三片。清水煎服。）

二〇 產後風濕

〔病理〕產後風濕。與胎前風濕同。

〔治法〕治產後風濕。亦用胎前通關散外。再用烏星湯。

〔處方〕烏星湯 杏仁一錢。姜半夏一錢。製

南星一錢。木香一錢。甘草三分。五味子八粒。製川烏一錢。茯苓一錢。（清水煎服）

第六章 閨房百病（中醫部門）

人生各有缺陷。大症小病。仰賴醫藥補救。現擇通俗百病。便於閨房自療者。分中西兩部門。選擇如下。供仕女們遵照藥方。實驗醫治吧。

（一）美容醫法 閨房是香艷的神秘的。故除下部祕密病醫療外。次要的。莫如上部髮眉目鼻唇口……等面容部份的美容了。愛美既為男女天性。閨房主角夫與婦。必須人物俊秀。姿色佳麗。才能幹出張做畫眉般風流韻事來。所以天生缺陷者。便借重人工手術與藥物治療了。

（1）澤面醫方 婦女面上有了粉刺黑斑。最礙美觀。何論閨房內外。都足引起丈夫與旁人厭惡。吾國女子。自古以膚色潔白。肌紋細膩為

標緻。便在現今健美潮流。白仍其正宗。醫治粉刺。黑斑。唐后澤面方最效。

蘇頌曰。唐后鍊益母草澤面。五月五日。

採益母根苗。其者勿令着土。晒乾。搗爛。以麵水和成丸。如鷄子大。再曬乾。仍作一爐。四旁開竅。上下置火。安藥中央。大火燒一炊久。即去大火。留小火。養之。勿令火絕。經一伏時出之。瓷器中研極細。至無聲。收用。如澡豆法。日用一方寸。每灰十兩加水。飛滑石一兩。胭脂一兩。研勻用之。一月之後。面如美玉。上錄古美容方劑。雖鍊丹般太繁瑣。玄妙。但經許多人試驗。確具化醜為妍神效。不同市售通俗化妝品。一××霜。一××膏。一呵。

(2) 細膚醫方 輕粉一兩 杏仁(皮

一兩) 滑石(水飛)一兩 冰片一分 麝香少許

(上藥方相傳。楊太真所發明。名紅玉膏。將上開藥味。共為細末。蒸過。入冰麝再研。以雞子清調勻。

洗面後塗之。過旬日。膚更若凝脂了。

(3) 媚容醫方 古代宮中宮女們為求媚主。飲服下錄醫方。據說具有陶冶媚容之功。

冬瓜仁(去壳)五兩 桃花四兩 白楊皮二

兩(上藥三味為末。米湯飲。一日三服。欲白倍加。冬瓜仁。欲紅倍加。桃花。服三十日後。面白如玉。五十日後。手足竟也白哪。

(4) 面黥醫方 治男女面黥。用爐甘石二兩。白欬十二兩。共為細末。雞子清夜塗。朝洗。亦具有潔膚白肌功能云。

(5) 口臭醫方 治男女口臭。可用辟臭方。白薤仁二錢。北細辛二錢。共為細末。睡時含之。有異效。

(6) 玉容醫方 本方係自製香粉。日常搽抹。具有玉容功能。法用白果洛一升(去壳打汁) 杏洛一兩(去皮打汁) 上甘石一兩(水

飛研。滑石（水飛）三兩。元寸二分。蘇合油三錢。冰片四分。上鉛粉一兩（玄鉛）（上藥共研至極細。用清水漂去黃水。後入冰片麝香。蘇合油。加珍珠末五分。再以胭脂水調和收貯。臨用加白蜜少許。旬日後。面白可媲美羊脂白玉。

（7）雀斑醫方 雀斑男 皆有 婦女更多。法用頭生鷄子一個。破頂去黃。留白。加大疋砂一兩。研細。填入鷄卵內。上用綿紙封固。貯哺鷄肚下。哺之待鷄雛出。取先把肥皂打除面上油膩。再用鷄子清塗之。其斑漸去。一月之後。可白玉無瑕。

又方。肥皂四兩。甘松一錢。山奈一錢。細辛一錢。白芷一錢。丁香一錢。麝香五錢。（上藥各味。共研為末。棗肉為丸。洗面後用藥擦之。其雀斑漸除。再以玉容香粉拍之。則白而嫩亮。光彩射人。又方。應粉五錢。山查五錢。蜜陀僧五錢。（上

藥三味。研為細末。將乳汁調和。夜睡擦之。一月後雀斑盡除。加蘇合四錢。更妙。清早洗去。久服身香味。閨房之內。更無往而不香。什麼香房：香湯所以香身丸的效用。在閨房之內。很有用處。法用桂心。冬瓜仁。松樹皮三味。為末。棗肉為丸。久服遍身香氣透鼻。

（9）擦面醫方 法用櫻桃皮。雀卵。紫背浮萍。牙皂。白梅肉等。研細和勻。日日洗面。擦之。肌膚漸嫩。

（10）面瘡醫方 面孔上生了瘡子。最是難看。法用黃瓜根。搗汁。漿水和勻。入冰片少許。入夜洗面。塗藥。百日後。肌膚柔嫩。非瘡全除。

（11）潤顏醫方 面無光彩。顏色白而不潤澤。使用下方可也。香芷五分。肥皂一兩。細辛錢半。甘松二錢。半荆芥五錢。木賊三錢。白丁香二錢。

杏仁三錢。花粉五錢。蕤仁五錢。雀香葉三錢。天虫五錢。山奈錢半。陀僧五錢。元明粉三錢。輕粉二錢。硫黃一錢。鉛粉一兩。蘇合油五錢。冰片一錢。上藥二十味共研細末。臨睡吐津調勻。擦面過夜。次日清早。用養酒一盃。沖熱水洗去。再拍玉容粉。

(12) 癩痕醫方 人面上有了癩痕。宛似白圭之玷。大礙羊觀。急須去之。現拿藥物補救。可用白蕤黎一兩。山梔一兩。二味爲末。醋調夜塗。旦洗。疤痕可以漸脫。

(13) 粗皮醫方 面粗皮黥。可用胰子五具。蕤青子二兩。杏仁一兩。花粉一兩。醇酒浸之。夜塗。旦洗。每日用之。老者可以返少。少者可以更變嫩白。

(14) 化白醫方 黑皮膚有違美的條件。現可用下法。化白。拿冬瓜一個。用竹刀去皮切片。勿經鐵器。酒一升半。煮爛去渣。熬成膏。夜塗。旦洗。

肌膚便從黑變化爲白了。

又法。玳瑁一條。爲末。雞子清調敷。以米泔水洗之。夜塗。旦洗。三日如素。

(15) 身澀醫方 婦人身澀不滑。亦爲美中不足。茲有身澀不滑醫法。用人乳。象精。白蜜。藕汁。各等分。熬膏。加蘇合油調勻。浴後。滿身塗之。一月之內。遍體嫩滑香潤。此方相傳爲宮女所發明。極有靈效云。

(16) 脂膚醫方 欲求手嫩面澤。法用羊乳三斤。羊胰子三副。搗和。每夜洗面塗之。清早洗去有效。

(二) 神祕醫法 閨房醫方。除上錄「美容」佔主要地位外。尙有其他神祕醫方。亦極奇。驗手續簡潔。便於閨房自療。茲分錄如左。

(1) 脫眉醫方 眉毛因病症而致脫落。可用硫黃一兩。研爲細末。醋調塗。肩間。眉毛漸出。

又方。白芥子三錢。半夏三錢。共研爲末。生薑汁調搽即出。

(2) 脫髮醫方 大病以後。頭髮每都脫落。男子尙無問題。現代女子雖因摩登而已。剪髮。且終有礙美觀。藥物補救。可用桑皮一兩。柏葉一兩。水煎七八沸。去渣。屢次洗髮。使重生了。

又。婦女產後脫髮。可用生薑三兩。薔薇根一兩。煎湯。刷之。髮使不脫也。

(3) 赤鼻醫方 赤鼻係濕重。既礙觀瞻。且據星相家言。「火燒中堂。家破人亡。」所以赤鼻必須醫治。法用批杷葉五錢。去毛。山梔四錢。苦參五錢。蒼朮五錢。米泔浸。研爲末。每服一錢。五分。白滾湯下。其亦漸退。

(4) 黃髮醫方 婦女有黃頭髮患者。可用生柏葉末一升。豬脂一斤。搗爛。和丸如彈子。大每用以布包一丸。投米泔中。化開。沐之。其髮漸

黑。

(5) 白癩醫方 白癩瘋是癩癬。一點點。如滴下的洋燭油。十分難觀。醫治方法。用白附子五錢。雄黃五錢。共爲末。薑汁調白芥蒂醃藥。擦之。其瘋漸退。

(6) 赤疵醫方 醫治赤疵法。以銀扁(藥名)烘熱。日日揩之。久久自化。

(7) 汗癩醫方 炎夏汗出如漿。有人因不拭去。而生汗癩。日後和白斑瘋類似。此種患者。可用硫黃。雄黃。蜜陀僧。白附子。鉛粉。滑石。光粉。各等分爲末。先將皂莢。煮爛。擦後。用藥末。唾津和塗之。

(8) 齒疎醫方 人齒求潔白之外。更需整齊。婦女愈見重要。故有「貝齒」之稱。故遇齒疎患者。美中不足。欲彌此缺。陷。用蘆甘石。寒水石。等分。研細。每朝擦之。忌用牙刷。久久自密。

(9) 腋臭醫方 腋臭又名狐臭。是一種

惡性隱疾。無論男女患之。都足影響閨房愛情。婦女患此。更使巽性厭惡。不敢與近。法用蚶子壳一對。將蜘蛛一隻。填入紮緊。瓦上煨加雄黃七分。生礬七分。硫黃五分。密陀僧一錢。俱煨存性。研細末。隔夜更衣。次早先將滾水洗待乾。即本人自便調研立驗。

又方。青木香二兩。醋浸夾於腋下。濕者研末搽之。

(三) 隱病醫方 一單方一味。氣死名醫。下錄人生隱病醫方。都極靈效。足為閨房自療之助。現分錄如后。

(1) 腦漏醫方 腦漏為一種嚴重性的惡疾。倘任其自然。不早醫治。日久有生命危險。法用剛才出生的嬰孩胎髮一兩。將絲棉包煨存性。加入冰片麝香辛夷共為細末。吹入鼻中。七八次。

便愈。極有靈驗。

(2) 雞眼醫方 雞眼醫法。用雄雞肝一具。竹片剖露。入百草霜拌勻。濕草紙煨熟。食之。雞眼軟而自脫。

(3) 乳癬醫方 本症係婦女產兒後所患。出主雙峯之側。癢不可忍。醫治方法。用銅絲輕粉為末。菜油調敷。癢既立止。癬亦漸脫落。

(4) 脚拆醫方 脚拆便是脚底龜裂。與脚指開拆。患此者行動時十分痛苦。用生羊腿骨內水。雞毛蘸取。潤開拆處。久久自合。永不再發。其效如神云。

(5) 綳裂醫方 手足皮膚綳開分裂。更當嚴冬。患凍瘡期間。血水淋漓。十分痛苦。用麻黃五錢。當歸五錢。苦參一錢。蛇床子五錢。蕪荑一兩。靈仙八錢。防風五錢。荆芥五錢。皂莢一兩。蒼朮一兩。等藥煎湯薰洗。

(6) 鴉瘋醫方 醫治鴉掌瘋用。蕪荑一兩。五倍子一兩。共研為末。醋調敷。七日不可下水。任其自脫。兩次可癒。

(7) 脫臼醫方 年老之人。防脫臼齒。以便咀嚼硬性食物。可拿生南星為末。薑汁調敷兩頰。又一夜即止。

(8) 口臭醫方 口臭患者。當公眾之面。開口談話。使對方掩鼻而走。閨房之內。夫妻同床。合枕。竊竊私語。情愛高潮。衝動至擁抱接吻時。試想口臭的男或女。還能使夫或妻親近嗎。豈非影響閨房和樂嗎。所以必須醫治。法用川芎。合口中。便可阻遏一股臭味了。

(9) 脫骨醫方 閨房之內。在前女子纏足。為必修功課。當時常有脫骨病。苦所以才有本方。發明用杏仁二錢。桑皮四錢。朴硝五錢。乳香一錢。上藥四味。清水煎湯。脫骨之處。重洗十數次。便

可止痛復原。

(10) 脫痂醫方 凡瘡疥患者。瘡傷潰爛。痊好後。其痂尚存。欲使落去。用土茯苓三錢。金銀花二錢。荆芥三錢。熟地四錢。製首烏二錢。上藥五味。共研為末。蜜製為丸。

(11) 內瘡醫方 凡內瘡患者。欲求痊愈。可用本方。大風子肉二兩。冰片三分。麝香三分。細辛二錢。白芷二錢。滑石五錢。安息香五錢。芸香三錢。蘇合油三錢。川椒三錢。上藥十味。共為細末。以油核桃肉三兩。搗和為丸。浴後擦之。

(12) 交腸醫方 仲景曰。交腸。乃大小便易位而出也。此因醉飽房癆。或大怒氣亂。真藏氣乖。不循常度。泌別失職之所致也。可以五苓散。或四物湯。加海金沙。木香。檳榔。木通。桃仁等煎湯飲服。

(四) 女病醫法 閨房醫藥。婦女佔主腦。

地位。現特選輯關於婦女方面奇驗醫方如下。

(1) 無乳醫方 婦人的乳汁爲嬰孩的生命腺。仰賴滋養成長。所以乳汁有無極關重要。乳的源流。資於衝脈和胃經相通。倘這婦人素有疾病。在衝任經的乳汁便少而色黃。吸食這乳汁的小孩也怯弱多病。

婦人生育以後沒有乳汁。這是亡了津液的緣故。須服滋補的藥去引動牠。雖有乳汁而不可多的。則服通經藥。至於無乳病。理有氣血太盛。壅閉不行的。有氣血滯澀而不行的。總之。虛當補之。實當疎之。疏用通草。漏蘆。土瓜之類。補用鍾乳粉。豬蹄。鱈魚等屬。

無乳醫方 醫治婦人無乳醫方如下。

(a) 雲苔立效方 元米半合。葛苳子半合。生甘草五錢。上藥物三種。煎汁一升。去渣分作三服。乳可立下。

(b) 湧泉散方 瞿麥穗。麥冬。龍骨。山甲(炙)。王不留行。上藥物四種。研爲細末。每服一錢。熱酒調下。復服豬蹄湯。再用油木梳。在左右乳上各梳二三十梳。每日三服。

(c) 漏蘆散方 漏蘆二錢半。蛇壳一條。瓜萼十隻。上藥物三種。共研爲末。用酒調服二錢。

〔註〕胎前乳汁自流。名「乳泣」。又名「乳注」。生子多不育。產後乳汁自出。是爲體虛。宜服補藥以止之。也有乳多急痛而出的。溫帛燒之。漏蘆散亦可。

又婦人乳裂。流脂疼痛。用秋冬綳拆茄子。瓦上煨。灰白蜜調敷。

(2) 陰脫醫方 產後陰脫。因產時用力太過。以致陰脫了。好似脫肛。陰戶挺出。逼近腫痛。舉重房勞。都能致此。清水續續。小便淋漓。用硫黃。

烏鯛骨各五錢。五味一分爲末。敷患處。兼服人參黃耆當歸通草升麻等藥自愈。

(3) 玉門醫方 凡產後陰腫。下脫內出。玉門不開。用石灰一升炒至極熱。湯二升投灰中。俟溫冷。澆坐水中以浸玉門。沒多時便平復如故。

又法。海螵蛸去甲。研爲細末。用雞子殼。其腫自消。產後玉門不斂。這因氣血不足。宜補中益湯。倍加升麻。

(4) 陰癢醫方 婦女陰部發癢。病因不一。有產後濕熱。宜藥湯薰洗。也有產後陰癢。用蛇床子一兩白礬二錢煎湯頻洗。癢便可止了。

(a) 雙白散 荆芥五錢。白芷二錢。白礬一兩。川椒八錢。杏仁五錢。桔梗四錢。細辛六錢。半(上藥七味。清水煎服。後加水再煎。將藥渣水洗拭陰部)。

(5) 下血醫方 婦人產後。忽然下血成片。好似血崩。這因氣血大虛。脾胃又弱。以致氣血攻於脾胃。胃氣不順。而成此症。營衛衰敗也。當和血理氣以治。

(a) 四物止經湯方 熟地六錢。白芍四錢。當歸五錢。半。川芎七錢。柏葉五錢。茯苓五錢。香附四錢。半。阿膠一兩。蒲黃六錢。白朮五錢。棗仁八錢。陳皮五錢。人參五錢。甘草二錢。(上藥十四味。清水煎服)。

(6) 尿胞醫方 婦人產後。偶取重物。尿胞墜落在外不收。這是氣弱血冷。移取重物。努力致傷臟府。因而墜下。三四月或半載。一年不能收。上還元的宜服藥治療。

(a) 收陰散 人參三錢。白朮五錢。甘草錢。半。肉桂六錢。枳殼四錢。升麻五錢。吳萸五錢。沈香一兩。(上藥八味。清水煎服。如加四物湯亦可)。

(7) 陰疝醫方 婦人患陰疝症。原因脾胃虛寒。氣滯不行。攻刺心腹。痛連胸脅。或因瘀血作痛。狀如黃瓜。在小腹兩旁。橫骨端紋中。這便是疝氣之癥。

(a) 蟠葱散方 青皮一兩五錢。釘皮一兩。砂仁一兩三稜一兩。檳榔一兩。乾薑五錢。肉桂五錢。元胡七錢五分。蒼朮五錢。甘草一兩。(七藥十味。分爲兩劑。薑棗葱煎服。臍下冷痛。加吳萸。茴香。)

(b) 桃仁當歸湯 桃仁二錢。歸尾錢半。元胡錢半。川芎一錢。牛地一錢。赤芍(炒)一錢。吳萸一錢。青皮(醋炒)一錢。丹皮八分。(上藥九味。薑三片。清水煎飯前服。)

(c) 化氣丸 香附五錢。青皮三錢。陳皮四錢。砂仁二錢。木香五錢。川芎三錢。茴香二錢。(

上藥七味。共研爲末。麩糊爲丸。)

(d) 異功散 人參二錢。白朮四錢。茯苓五錢。甘草一錢。陳皮三錢。(七藥五味。清水煎服。)

(8) 陰吹醫方 仲景曰：「胃氣泄。陰吹而正喧。此穀氣之實氣。從溺處而泄也。」

(a) 陰吹醫方 猪膏八兩。亂髮(雞子大)三枚。(上藥二味。和在一處煎。髮消藥成。服。病從小便出來了。)

(9) 絕育醫方 婦人苦生育兒女太多。精神經濟上不堪負擔。與損失。因而欲求絕育。和娼妓。尼姑等婦女。爲適應環境。必須絕育者。通俗誤聽妄言。服用毒藥。有的雖有效。而身體受傷了。所以必須拿正當藥物醫治絕育。才是正軌。節育以後。確可增進閨房幸福呵。

(a) 三白丸 白芨六錢。白斂六錢。白伏

芥八錢。秦艽四錢。厚朴五錢。當歸五錢。吳茱二錢。人參三錢。肉桂四錢。乳香四錢。(上藥十味。共研爲末。蜜和成丸。如桐子大。每服三十九。空酒吞下。)

(11) 胞衣醫方 胎兒的胞衣。婦人臨盆時。有因母體素弱。氣血兩虛。胞衣很薄。兒身轉動。隨即觸破。又有因兒未轉動。坐草過早。用力太多。以致胞破的。如已破久。那麼血水乾產。路遂濇。嬰孩便難下了。急用大劑加味芎歸湯。加熟蜜一兩。助氣兼使潤滑。俾胎兒順產而下。噫。

胞衣不下。惟花蕊散最效。胞衣不下。經時稍久。血流胞中。爲血所脹。上冲心胸。喘急疼痛。必致危篤。若遇此現象。急宜剪斷臍帶。以少物繫帶。必用力牢繫。然後截斷。使其子血不流入胞中。則胞衣自會痿縮而下。便是經過數日。只要產婦安心靜候。不致有害。胞衣終能下來呢。

(a) 花蕊散 國藥店製有成藥出售。以童便調服。取下惡血。或如猪肝。產婦從此可無血氣之血之症了。

(b) 牛膝湯方 牛膝四兩。瞿麥四兩。當歸三兩。通草六兩。滑石八兩。葵子五兩。(上藥共研爲末。以水九升。煎至三升。分爲三服。)

第七章 閨房百病下 (西醫部門)

(一) 美容醫法 閨房之內。男女相親。情愛的維繫。一言消破。相悅者彼此的顏色而已。人爲萬物之靈。愛美得自天性。女子更較男子強烈。所以現代科學發達。爲求增進兩性幸福。特發明美容新醫術。滬上開風氣之先。近年美容醫院林立。洋洋廣告。炫耀大衆。據彼宣傳。無論男女老少。一經施術。便可返老還童。化醜爲妍。非但利用藥物。使皮膚潔白。雀斑除派。並可施手術。彌補吊眼。

皮塌鼻頭。缺嘴唇等缺陷哩。

閨房既以求美爲條件。因此本書對於美容醫法。除採錄吾國古傳方藥外。現在再把西醫藥上新方法專章介紹如後。使閨房男女藉美容新醫術而更享鴻案相莊。畫眉佳趣哪。

(1) 美髮醫法 頭髮爲保護吾人頭腦的外衛。更屬美的起點。婦女青絲。素稱秀髮。最是珍惜。所以無論男女。誰都頭上用功夫。講究怎樣美髮哩。

欲使頭髮有美麗光彩。首須注意皮膚衛生。頭皮應天天清水洗滌。身體方面如多食滋養品。適當運動。呼吸新鮮空氣。享受溫和日光……等。間接亦有功美髮。因髮生於血海。身體健旺者。自因血旺而頭髮烏黑。光不致枯黃花白了。

洗髮時加入硼砂少許。既使頭髮柔軟細潤。又具清潔頭皮衛生之效。又法。取安息香酸和入

綠肥皂與適量酒精。塗在絨布上。用以擦髮。擦畢溫水洗滌。可使頭髮美麗。

現社會仕女崇尚歐化。傲碧眼黃髮之西洋人。實行電燙。使頭髮也。蜷曲成螺旋型。有種頭髮縮患者。却得自先天性。不須電燙。天生蜷曲的了。這因營養不良。精神障害。或因微生物附於毛根而發。所以這樣的蜷縮頭髮。反該醫治。以哥囉仿謨六兩加入椿油五斤。旺火燻解。等牠冷後。澆過。再加適當香料。不時塗抹。日久便可使頭髮烏黑潤長。叢叢出生。不再蜷縮了。

(2) 減瘦醫法 吾人身體肥胖。雖是康健之徵。但脂肪過多。行走不便。婦女體態。更失苗條之緻。所以像電影皇后胡蝶。四大名旦梅蘭芳。程豔秋……等都厭惡身肥。設法減瘦。閨房自療。只有從治本着手。最好實行素食。摒除葷腥。身體自可漸漸清秀。多行室內柔軟體操。與戶外遠足。

抓山旅行等。都有減瘦功效。

(3)長身醫治 吾國傳統美的條件。女子以長身玉立為美。不過吾國積弱人種。日見衰矮。據西醫界調查。東方人普通體格。男子身長五尺。體重一百二十磅。女子身長四尺二寸。體重八十六磅。考吾國男女身矮原因。一因仕女日漸閒逸。安坐居多。行動日少。二因貪懶好惰。忽視運動與衛生。現有美人敏蒂司氏。發明科學長身新術。能使脊柱高出六寸。因為人的脊骨。共有二十四個。各骨之間。都有軟骨。所以能屈伸自如。不過各軟骨。不絕受上方壓迫。漸失其彈力。而收縮。終至脊骨彎曲。像弓形。所以早起時。脊骨絞夜間高出幾分。這因夜間身體平臥。軟骨復原。因此立論。若能平正姿勢。不使身體前屈。必能使身體延長若干。

又美國大醫家司普林迦氏。發明電氣長身

方法。通電流在膝軟骨上。使軟骨的動作靈活。助牠長成。司氏曾實驗多人。均收完滿效果。法國大醫家師普愛西愛氏。也發明長身方法。用大麥燕麥。小麥。裸麥。乾甘蔗。砂糖。六種。混合物。每日取二匙。用水六合煎。約經三小時。毛篩濾出。再加水三合服之。能使小兒迅速發育。脊柱伸長。本法施諸成年。功效便不及小兒十分之一二了。

(4)面皸醫法 無論男女。面生累累面皸。終礙美容。凡本症患者。先用指甲從兩側壓皸心。使出。再用下開油藥塗擦。既可事後消除。又可事先預浪。(下列各藥。混和塗布用)

- 硫黃乳 一〇〇〇
- 硫酸以脫 一〇〇〇
- 炭酸鉀 一〇〇〇
- 屈里設林 一〇〇〇

(5)雀斑醫法 西法醫治面部雀斑可

依下開方藥施治。(下劑混和塗布用。)

苛性鉀 一〇〇

安息香丁幾 三〇〇

稀酒精 一〇〇〇〇

(6) 點痣醫法 面生紅黑痣。更較雀斑。觸目相傳。點痣方法。中西都有。不過易侵及深部。和四周皮膚。致留癩痕。現在下錄點痣新法。係日本緒方醫學博士發明。便免此流弊。施術時。先把洗淨的糯米數粒。浸入下開藥水中。

十倍苛性鉀液 一〇〇〇

六七小時後米粒膨脹。使傾去藥水。把米粒研成糊狀。用針尖取少許。點在痣的中央。切須注意。不可塗及痣外皮膚。經二小時後洗去。視痣的大小和色的濃淡。約點三次至五次。便可全失。末一次所點的藥。則不可洗去。聽任自脫。初期留淡紅色癩痕。日後漸漸消滅。

(7) 汗斑醫法 西法醫治汗斑(無水泡)可用下開藥肥皂。逐日洗擦可愈。(下劑混合劑塗擦用)

綠肥皂 五〇〇〇

那夫托爾 二〇〇〇

儂里設林 一〇〇〇

(8) 濃眉醫法 眉毛稀少。在男子無威勢。女子礙美。翹婦女淡眉。雖可用墨畫。但終不及醫療濃眉的澈底解決。(下劑混和塗布用)

乾他利司丁幾 一〇〇〇

酒精 一〇〇〇

(9) 白髮醫法 白髮有礙美觀。現雖發明染黑染黃新法。但終不及醫療的根本解決。白髮使黑。可用下開油藥。(下劑混和塗髮用)

硝酸銀 一〇〇

碳酸安母尼亞 一〇五

凡士林

三〇〇

(二)房事醫法 男子行房種種隱病。因近代性病流行。人慾橫流。所以也不下女子。限於篇幅。當然不克盡述。現擇最普通易犯的分述如下。

(1)見色流精 男子見色流精。都由房事過度。或手淫所致。宜服下開方藥。

臭劑

一〇〇

橙皮糖漿

一〇〇〇

熟水

九〇〇

上為一日量。分三次服。晨午晚飯後各服一次。

(2)句莖狹小 陰莖為包皮所阻。壓迫龜頭不能脫穎而出。甚至尿道全為封閉。小便時點滴淋漓。交合時容易早泄。並且射精力不強。難以生育。更因包皮藏垢納污的關係。極易傳染白

濁下疳梅毒……等。這樣殊非閨房之福。最好請

醫生施用手術。自療可用下開藥水。日常洗滌。

五十倍硼酸水 五〇〇〇

如有已經糜爛的。洗滌後。可撒下開藥粉。

硼酸末 八〇〇

亞鉛華 一〇〇

單寧酸 〇〇五

(3)陰莖短小 陰莖為男子生殖器。短小原因分先天後天兩種。先天短小。係由發育不全。後天短小。則因青年發育時。即行房事。或患手淫。以致短小。這樣缺乏人道能力。與閨房情趣。自

療方法。除乞靈藥物外。可用手術。戒服劣性壯陽藥。戕賊身心。可服下開藥方。(藥方同見色流精)

(4)手淫醫法 現代青年。最易犯罪。一

手淫原因。發育極早。目迷五色。懷春之後。一腔

慾火無可發洩。便罔顧一切。實行自瀆了。手淫之害人盡皆知能誘發種種生殖器病。又致陽痿而礙生育。所以手淫防止不可忽視。除不和女性接近。生粉紅色遺泄外。禁閱淫穢小說。圖畫。戒與同性同床。臥寐時不得置手陰部。夜間被褥勿宜過暖。臨睡前少飲茶水。勵行冷水浴運動。藥療方法與見色流精同請參閱。

(5) 遺精醫方 遺精原因極多。治療方藥更多。現擇最簡帶有效者。採錄如下。

臭化樟腦 〇・三
乳 糖 一・〇

本藥分作三包。一日吃完。飯後每服一包。

(6) 尿管醫法 男子患白濁。經久不愈。尿管便漸狹小。利害的小便點滴流出。受苦異常。閨房自療時。可向藥房購橡皮導尿管。從粗到細。數根浸在下開消毒藥水中。

百倍里曹兒水 二〇〇・〇

先擇最細的。從藥水中取出。塗上橄欖油。漸通入尿道。待擴大後。再用消毒水洗淨。仍浸入藥水中。數日後。換用稍粗的。每日通一二次便好。

(7) 贅肉醫法 白濁患者。不注意清潔。龜頭皮膚常受膿液的刺戟。以致漸生贅肉。也有生在包皮裏面。或肛門附近。形如楊梅。或似雞冠。大小不一。只覺灼熱奇癢。大的發痛潰爛。排出膿液。放出惡臭。閨房自療時。先撒下開藥粉於贅肉上。

里曹兒醒粉 五・〇
數日後。贅肉脫落。便改塗下開油藥
硼酸軟膏 一〇・〇

(8) 遺尿醫法 成年男子。夜間尙如小兒般遺尿。豈非閨房笑話。此種遺尿症。都由神經麻痺。服下開方藥。有效可愈。

薯木釐丁幾

一、〇

苦味丁幾

二、〇

單糖漿

一〇、〇

熟水

九〇、〇

上為一日量分三次服。每日飯後服一包。

(9) 陰囊醫法 諺云「性命卵子筋」

足見陰囊的重要了。因為血管多出血也多。陰囊容易跌打損傷。甚至舉丸有時也受傷作痛的。閨房自療時宜靜臥。高墊陰部。再用棉花浸濕。下方藥。卷包陰囊。

五十倍硼酸水

五〇〇、〇

陰囊皮膚如已受傷破碎而有出血處的可

先撒下開藥粉。

台蘇托爾

五、〇

(10) 角虱醫法 交媾不潔。傳染而生角

虱。初在陰部。後漸漸蔓延至腋窩。鬚眉……等處。

不逾頭髮沒有。虱形扁。其色黃。密着皮膚。非精細檢視不易發覺。不過只覺生虱部份奇癢。難搔而已。角虱患者。胸部和大腿。往往發生奇斑。閨房自療時。可塗下開方藥。每夕塗擦。大概經過一禮拜可愈。

五百倍昇表酒精

三〇、〇

(三) 隱病醫法 婦女最多隱病。本節所輯各症。便是關係婦女方面的。估閨房醫術上主要地位哩。

(1) 白經醫法 婦女經水之色。淡而不

紅。大原因血虛之故。呵。宜服下方丸藥可愈。

蘆薈鐵丸

日服六粒。分三次。每飯前一小時服二粒。服

此丸藥期內。禁止飲茶。否則便失效力。

(2) 黑經醫法 婦女經水發黑。大概因

子宮內生外症。除請醫生隨病診斷外。自療可用

下方藥水。洗滌子宮。向藥房中購橡皮灌腸器一具。以無嘴的一端。浸入藥水中。藥水預置乾淨而盆內。將橡皮球壓放不已。藥水便從有嘴的一端噴出來了。俟藥水稍噴出後。將嘴插入陰戶。再壓放皮球。那麼藥水噴入子宮。便收洗滌之效。本法日行一次。

百倍里曹兒水

五〇〇〇

(3) 出血醫法 處女子宮出血。係處女膜破裂所致。若是婦人。則因房事出血。或產後相隔未久。或由於生殖器疾病引起的大出血。有危及生命之虞。不可輕視。若為生殖器疾病的大出血。那麼尚須請醫生診治。一時救急之法。快以浸濕冷水的布。包下腹部。且以五十倍的明礬水（便是明礬一錢。沸水五兩中）洗滌陰戶。如尚不止。向藥房中購精製棉花少許。浸濕下開藥水。塞入陰戶內。一面快請醫生。病人宜靜臥。不可稍

動。

過鹽化鐵液

一〇〇

蒸溜水

一九〇

上劑混和外用。未經清洗之手和其他一切之物。決不可入陰戶之內。如塞入棉花球等。手指必須入陰戶時。須先用肥皂水洗淨。再以酒精拭淨。

(4) 宮翻醫法 宮翻者。婦女子宮內翻的簡稱也。便是子宮底下。翻出陰戶之外。不過產婦有之。宜先用下開藥水洗清兩手。

五十倍石炭酸水

五〇〇〇

再取精製紗布一塊。浸濕上開藥水。被覆翻出部份。輕輕用手送入。並須靜臥數日。不可稍動。
(5) 宮癌醫法 女子子宮生癌。原因由他部的癌腫轉移而來。或由房事過度所致。多生於三十歲以上。四十歲以下婦女。患此病者。白帶

如肉汁。有惡臭。經水減少。房事後。往往出血。不時。覺痛。本症應請醫生。施手術。自療方法。不能斷根。只暫時救急。減少痛苦罷了。內服藥方計開。

鹽 莫 〇。〇。三

乳 糖 一。〇。〇

本劑分三包。痛時服一包。不過一日至多三包。不可多服。(陰疔癰療法同)

(6) 陰癰醫法 陰核也有癰腫。與子宮癌同。宜及早請醫生。割除。自療方法。每日洗淨後。塗下開油藥。

一〇%伊天哇爾凡士林 三〇。〇

已經潰爛的。可撒下方藥粉(1)沃度仿

謨一〇。〇。(2)硼酸末一〇。〇。兩劑混和。撒布用。

(7) 陰核醫法 普通女子陰核。大小不過像豆。但因房事過度。或濫用手淫後。那麼陰核

便漸漸肥大。以致淫慾旺盛。無意中衣褲偶觸陰核。便動淫興。如此情形。實非閨房之福。自療時可用冷水洗滌。或包以浸濕冷水的布。更內服下開藥水。

臭 剝 一。五

橙皮糖漿 一〇。〇

熟 水 九〇。〇

上為一日量。分三次服。每飯後服一次。

(8) 陰瘡醫法 婦女陰門皮膚內侵入一種微生物。大小陰唇。陰核。都潰爛。利害的波及臀部。大腿。日子久了。生有光澤的癢痕。宜及早請醫生。割除。閨房自療。可用下開油藥。

沃度仿謨軟膏 二〇。〇

(9) 陰癬醫法 陰門皮膚變白色。乾枯不潤。奇癢不止。搔之。上皮膚為細屑。而脫落。甚者。蔓及兩股。閨房自療。可用下開藥方。

綠肥皂（洗淨後）

橄欖油（絨布摩擦）

(10) 陰腫醫法 婦女陰門紅腫。和男子龜頭淋相當。因白濁。白帶。下疳。梅毒。子宮癌等膿液的刺戟而生。也有因外傷。手淫。房事過度等而起。先覺灼熱發癢。小便利行動時發痛。利害的更糜爛出膿。有惡臭。周圍結痂而癢。閨房自療。溫水洗淨後。以浸濕的下開藥水棉花包。

五十倍鉛糖水 五〇〇〇

糜爛部宜用下方藥粉。（混和撒布用）

沃度仿謨 五〇〇

硼酸粉 五〇〇

(11) 陰癢醫法 陰門瘙癢的原因。由於白帶。經血。小便等刺戟。或子宮尿道膀胱等疾病。每致色慾過度。身體蒙非常損害。甚者。奇癢難忍。閨房自療。止癢方法。可用下開藥水。洗滌陰戶內

外。

百倍單寧酸水 五〇〇〇

〔註〕向藥房中購單寧酸一瓶。秤取五錢。溶在溫水五十兩中便成。

洗滌後。更以紗布浸濕下方的藥水。卷包於外陰部。

五十倍石炭酸水 五〇〇〇

(四) 產婦醫法 閨房自療。關於產婦部門者。亦有數種計開如下。

(1) 不孕醫法 婦望女欲求不孕。有閨房之樂而無生育之苦。除本醫庫上冊已介紹各種避孕方法外。再錄下開不妊藥水。

(a) 房事前。用五十倍單寧酸水五〇〇〇洗滌陰部。

(b) 房事後。用五十倍金雞納霜液五〇〇〇。向藥房中購鹽酸金雞納霜一瓶。秤取

一兩。溶於五十兩之溫水中即成。不過洗滌方法略見麻煩同上。黑經醫法。洗滌子宮。

(2) 宮垂醫法 產婦用力過甚。或因產後起牀太早。子宮往往下垂。利害則露出陰戶之外。妊婦必致小產。或更糜爛。不過懷孕未滿四個月。的脫出。少。國房自療。先使靜臥。不可稍動。高熱。腎部。清洗兩手。再用下開消毒藥水。清洗手指與陰部後。

五十倍石炭酸水 五〇〇〇〇

插手指入陰戶內。輕輕整復後。須靜臥數日。禁止房事。如患大便祕結。宜服蓖麻子油。輕瀉藥。免再下墮。

(3) 陰裂醫法 女子陰戶與肛門之間。名曰會陰。生產時極易破裂。遇強姦或跌撲時。也會破裂。最好請醫生診斷。用手術縫補。國房臨時自療。可撒下開藥粉於破裂處。再拿精製棉花布。

包之。

台爾麻托爾

一〇〇〇

〔註〕小便後。用五十倍硼酸水洗淨。再撒藥粉。結台後。須靜臥數日。禁止房事。與劇烈運動。否則癰痕未固。仍易裂開。

(4) 翻花醫法 陰戶翻出陰門之外。名曰「翻花」。與子宮下垂相仿。下垂子宮大。翻出陰戶小。倘翻出後。延不納入。易致潰爛。患本症時。病者宜靜臥。不可稍動。洗靜兩手。用下開藥水。清洗手指。與翻出陰戶後。把手指輕輕納入。覆藥棉於陰戶口。以布緊包。

五十倍石炭酸水 五〇〇〇〇

(5) 鎖陰醫法 鎖陰只限處女所患。陰戶周圍筋脈。知覺過敏。稍受刺激。便且壅塞。而收縮。以致不能交合。這非沒有陰戶。或陰戶不通。國房自療。可將下開藥插入陰戶。俟藥桿溶後。再

五十倍石炭酸水 五〇〇〇〇

行交接。使可不覺痛苦。行之數次。卽不插藥。亦覺爽然若失了。

鹽莫陰戶坐藥

(6) 陰毛醫法 女子陰部無毛。在東方諸國。習俗都目爲不祥。諺有「白虎」與「水晶包」等俚詞。所以陰部無毛。可借助藥物。實行開房自療。而使細毛茸茸生呵。

里曹爾醒

一·五

單寧酸

一·五

偈里設林

三·〇

拔爾撒謨油

一〇〇·〇

酒精

一五〇·〇

上藥各劑。混和外塗。連塗一星期。卽可生毛。(7) 陰物醫法 陰戶之內。每有誤入物件者。如幼女無知。拿豆類食品玩具等。插入陰戶。與閨房怨婦。淫婦。畸形。解決性煩悶。利用角

先生。蘿蔔。芋頭……等。插入陰部。誤入深處。不能取出。可用下開方藥。清洗。鉗子。入陰戶內。取出之。

五十倍石炭酸水

五·〇〇

(8) 陰疼醫法 婦女陰戶內。感覺疼痛。不是房事過度。便因陰戶內。生外症。閨房自療。可向藥房。購下開藥球。插入陰戶。有效。

莫若子宮坐藥 (每日一個。依症情輕重而定。用藥球多少。)

(五) 精神醫法

人生疾病。分肉體的與精神的。雖同用藥物治療。但像本節所輯各種病症。便都近於精神性了。

(1) 失眠醫法 現代仕女。交接殷繁。慾望過度。以致身體日弱。患失眠症的很多。本症成因。大都由於神經衰弱。精神不寧。故除下開藥水治療外。尚須自知攝生。適養精神爲要。

臭

臭

剝

二·〇

橙皮糖漿

熟水

一〇〇
九〇〇

上為一日量分三次服飯後

〔註〕冷水浴有強壯神經特效。不過吾人體格關係如須實行必須漸漸減低浴水溫度才免感冒。失眠患者戒晚間飽食。因使精神興奮難以安眠。大便祕結者腦筋充血亦難安眠。故宜每晨服下開緩和通便藥。

人工加添林鹽

二〇〇

上為一包每晨服開水沖服

(2) 嗜眠醫法 失眠固足為病。嗜眠也非所宜。試想時常昏昏欲睡。叫之不應。呼之不醒。閨房之內。尚有情趣可云乎。治療嗜眠可服補血強壯藥。

枸橼酸鐵金雞納

〇・三

次亞磷酸石灰

一〇〇

乳糖

上藥分三包

一〇〇

茶否則失效

(3) 睡軋醫治 睡中軋齒。由於精神不寧。本症患者。戒行房事。飲酒吸烟冷水浴亦可治療之功。藥物醫治可服下開藥水亦具特效。

臭剝

二〇〇

橙皮糖漿

一〇〇

熟水

一〇〇〇

上量分三次服。每夜睡前開水沖服一包。

(4) 腦漏醫法 俗稱腦漏。實非腦漏。真性腦漏。無藥可治。不過鼻中發熱。紅腫。以致鼻涕增多。或鼻管潰爛。流出極臭的膿液。病因起於感冒。或異物誤入鼻內。或由梅毒瘡。瘻。痧。子。痘。子。等。疾病。而漏出惡臭的膿液。除梅毒。毒性。重症。腦漏。須請專醫診治外。其他輕性的。可以閨房。

自療。依下方把棉花濕藥水使濕。拭去鼻涕。塗布鼻內。

五十倍鹽酸古加因液 五〇〇

再以棉花浸濕下開藥水塗布鼻內。

百倍坡洛他古液 五〇〇

(5) 傷風醫法 傷風感冒。日常易患。閩房醫藥。對於本症最多應用。處方如下。

阿司匹靈 一〇〇

〔注〕本劑藥房有成藥出售。

(6) 失音醫法 我人發音清濁高下。依吾國相書關係富貴貧賤。所以失音患者。最是不幸。重症失音。都由房事過度。癆瘵與梅毒所致。必須延請專門醫生診治。輕症失音。因感冒而咳嗽。聲帶受了刺激。發生紅腫。以致聲音低濁。下開內服藥粉可治。

阿仙藥末 一〇五

甘草末 一〇〇

薄荷腦 〇〇三

上分三包。一日量。飯後服一包。

(7) 嘔吐醫法 嘔吐亦為日常易犯病症。不過秋夏之間。不可忽視。如真性霍亂的嘔吐。該速送醫院。切勿延誤。普通嘔吐。閩房可以自療的處方如下。

重曹 三〇〇

薄荷腦 〇〇一

上分三包。每隔五小時服一包。

(8) 胃痛醫法 胃痛患者。可服下開藥方。可以立止。

燐古 〇〇三

重曹 三〇〇

上分三包。每隔五小時服一包。

(9) 煙毒醫法 現代人人手一煙。閩房

之內。去。妻。情。話。親。友。小。敘。更。吞。雲。吐。霧。滿。室。皆。烟。不。過。烟。有。時。能。使。人。中。毒。發。生。冷。汗。嘔。吐。頭。痛。流。涎。呼。吸。促。迫。顏。面。蒼。白。疲。憊。昏。朦。等。症。象。毒。甚。的。更。有。下。痢。失。神。而。虛。脫。除。多。飲。濃。茶。外。並。以。下。開。藥。粉。主。治。

咖啡因

安知必林

枸橼酸

乳糖

〇・五

一・五

〇・三

一・〇

上混和分三包。每隔三小時服一包。

(10) 醒酒醫法 飲酒傷腦與心臟。喜酒

者。因。易。發。中。風。與。心。臟。病。所。以。飲。酒。過。量。十。分。危。險。閨。房。之。內。夫。婦。淺。酌。雖。可。佐。情。興。但。遇。酒。醉。時。急。須。設。法。醒。酒。飲。以。濃。茶。外。並。依。下。開。藥。水。飲。服。

枸橼酸

重曹

二・五

五・〇

糖漿 熟水 五〇〇 四五〇〇 上混和可隨意服。如服完一瓶尚未醒。可再服一瓶。此外更宜以冷手。卷在心窩部和額上。以防腦和心臟有變。倘用上開藥水不能解醒。可再服左方。

番木鱉膏

咖啡因

乳糖

〇・〇四

〇・五

一・五

上分三包。每隔三小時服一包。

(11) 狐臭醫法 狐臭實為閨房疾病中

的惡疾。有礙兩性情愛。同床合枕。軟玉溫香。時忽來一股騷臭。豈不煞風景嗎。本症患者。體質多不良。宜服滋補品。強壯其體質。使治愈後。不致復發。閨房自療。每日用下開(a)方的藥水洗滌腋窩。拭乾後。再用(b)方粉藥塗擦腋。

(a) 千倍過錳酸鉀液 一〇〇・〇

撒 酸 五・〇

亞 鉛 華 五・〇

澱 粉 一〇・〇

(b) 結麗阿曹篤丸 (日服三次每飯後服二粒)

(2) 多屁醫法 當了旁人面前放屁。殊失體統。即在閨房之內。也非雅事。所以必須治愈。放屁原因腸中醱酵異常發生氣體所致。常服下開丸藥。則特別的醱酵漸止。氣體便不發生了。

結麗阿曹篤丸 (日服三次每次服二粒飯後服下)

大便閉結的更須服下開藥水以通利之。

硫 苦 一五・〇

苦味丁 幾 一・〇

單糖漿 二〇・〇

熟 水 八〇・〇

上為一日量。分三次服。每飯前一點鐘服一

次。

(13) 口臭醫法 口臭的可惡。不下於放

屁。因或由胃腸病。或由口中發熱。口中發熱原因或由多吃烟。或由食葱蒜等刺戟性物。或由內服含水銀質之藥物。除去原因。為治療的上策。蓋原因不除。雖日日施治。終難斷根。閨房自醫之法。可購下開藥水。時時漱口。但不可嚥下。(本劑混和漱口用)

二%鹽剝水 五〇・〇

薄荷油 一滴

(14) 齒痛醫法 齒痛原因。大概由於虫

蛀。所以平日清潔齒牙。可以預防齒痛。最好每飯後刷牙一次。如發現蛀洞時。宜速請牙科醫生填補。否則愈蛀愈大。即發齒痛時。可用棉花浸濕

下開藥水寒於痛處。(本劑混合外用)

結麗阿曹篤

三、〇

薄荷油

一滴

蒸溜水

七、〇

齒痛急性發生不及購上開藥方時可用樟腦少撮於齒痛牙縫中亦可止痛若齒牙劇痛上述二方都失效時可購下開藥水以棉花浸濕塞於病處定必有效不過有效時間很短每隔十分鐘需換藥一次本劑性質劇烈只可於齒痛利害時偶一用之不可多用

五十倍鹽酸古加因液

五、〇

(15) 潔齒醫法 牙齒痛為肉體上的痛苦牙齒不潔發黑則為觀瞻上的問題婦女更為重要欲求十全十美必須牙齒雪白細剝玲瓏張口嫣然才見嫵媚而動人愛可以促進閨房情愛潔齒方法可用下開藥水(本劑混和擦齒用)

稀鹽酸

一〇〇〇
一〇〇〇

(16) 眼病醫法 眼為人身日月極關重要一妙目盼兮一女子一付秀目更具神韻所以眼睛必須保護始為閨房幸福赤眼普通易犯自得諸公共場所手巾等傳染有本身體熱所致自療方法可依下開藥水(本劑洗眼用)

五十倍硼酸水

二〇〇〇

又法配購下開藥水滴一二滴於眼睛內

〇。三%硫酸亞鉛水

五、〇

〔註〕如求滴藥水便利可向藥房購點眼瓶再眼淚多而發劇疼的把藥棉浸上方硼酸水使濕卷包於眼外乾後再換濕

又生星翳

本症比較赤眼兇猛勢劇與

醫治不當有喪明危險閨房自療可用下開藥水每日點入眼內二次(本藥水赴藥房配購時可

賜裝於點眼瓶內。雖多化些許代價。取用上却便利不少。

沃 剝 〇・八

炭酸曹達 〇・二

蒸溜水 一六・〇

(17)火傷醫法 火傷係一種意外病痛。閉房之內。偶因近火而受傷時。便該火速自療。傷勢計分三種。輕傷只紅腫。次傷生水泡。最重的生焦痂。火傷面積如達三分之一時。必因火毒攻心。而不治。上海等繁盛都會。人烟稠密。火警頻聞。閨房中下階級。又都疊床加屋。所以火傷易於身受。對於救急醫療。常諱實為人人所該知。如遇某人。不幸受火傷時。須觀察他的輕重而定如何自療。譬如紅腫的塗以橄欖油或佩里設林。再依下開藥水浸濕紗布包之。

五十倍鉛糖水 二〇〇・〇

火傷燙出水泡的。先以針穿破。排出液質。再以五十倍硼酸水洗之。乃撒下開藥粉。用清潔的紗布包之。

次硝酸蒼鉛 一〇・〇

火傷生有焦痂。為最重患者。受傷面積大的。該速送公立醫院救急。面積小的。才可實行閨房自療。先用硼酸水洗淨傷痂。再塗下開油藥。亦用清潔紗布包之。(本劑混合塗布用)

次硝酸蒼鉛 九〇・〇

硼 酸 四〇・〇

拉 諾 林 七〇・〇

橄 欖 油 二〇・〇

(六)雜病醫法 本節所輯各種病症。沒有什麼系統。因名之曰「雜」。閨房自療時。可依本身所患何種痛苦。擇篇中相同的參證罷。

(1)濕疹醫法 濕症病因。或受藥物。濕

熱潮濕硬物等的刺戟。或因內臟有疾病。凡發生皮膚病時類都附生濕疹發現的初期。皮膚紅腫。次生丘疹。再次變水疱。更變膿疱。治癒時。結痂脫落。初發時。皮膚緊張而疼痛。名急性濕疹。若延久不癒。則疼痛合失。紅腫亦減而發癢。名慢性濕疹。開房自療紅腫和丘疹期。須嚴避衣服的摩擦和壓迫。拿浸濕的下開藥水紗布包之。

五十倍鉛糖水 二〇〇。〇〇

癢甚的先塗下開(A)種藥水。次撒(B)種藥粉。再以紗布包之。

(A)石炭酸 三。〇〇

偃里設林 三〇。〇〇

酒 精 三〇〇〇。〇〇

(B)亞鉛華 一〇〇。〇〇

澱 粉 一〇〇。〇〇

生出水疱或膿疱的。可塗下開油藥。(下劑)

混合塗布用)

硼 酸 五。〇〇

亞鉛華 二五。〇〇

澱 粉 二五。〇〇

凡士林 五〇。〇〇

已經結痂了。須先塗橄欖油。把痂皮揭去。次塗上開油藥。正在脫痂的。可塗下開藥水。至此不日可愈了。(下劑混和塗布用)

日可愈了。(下劑混和塗布用)

澱 粉 一〇〇。〇〇

偃里設林 四〇〇。〇〇

濕疹歷久不治。變成慢性的。可塗下開油藥。

(下劑混合塗布用)

木他兒 一〇〇。〇〇

硫 黃 一〇〇。〇〇

亞鉛華 一〇〇。〇〇

猪 油 三〇〇。〇〇

如再不愈。改用下開油藥。須知濕疹是頑固性的。必須忍耐長久醫治。(下劑混合塗布用)

披天羅兒

三〇〇〇

凡士林

三〇〇〇

(2) 手汗醫法 男女患生手汗的。非但做事不便。並且影響新式交際禮。——搥手——使人厭惡。同時。閨房之內。夫婦倆攜手並肩。我我卿卿。也覺汗膩。自療方法。可用下開藥水。每日洗擦數次。即癒。

單甯酸

一〇〇

酒精

二〇〇〇〇

薔薇油

二滴

(三) 腳汗醫法 腳汗更比手汗討厭。足趾癢甚。日久變成脚癬。不可以爪搔爬。搔破後便腐爛難行。閨房自療。每日洗淨後。撒下開藥粉。脚汗極多的。須每日洗滌。撒藥多次。汗便自少。而不

癢了。(下劑混和撒布用)

撒酸

一〇五

澱粉

五〇〇

滑石

四三〇五

(4) 脚癬醫法 脚癬普遍易犯。日久不愈。便成爛脚。閨房自療。宜常用水洗滌。須用下方藥水。

五十倍硼酸水

二〇〇〇〇

洗淨後。撒以下方藥粉。且夾清潔之紗布於趾間。(下劑混和撒布用)

沃度仿護

五〇〇

硼酸末

五〇〇

(5) 足繭醫法 足部皮膚易受硬物的壓迫。發生天然抵抗力。而長胼胝。俗名足繭。婦女等深處閨房。極少行動。本不致生長足繭。向為男子所普遍。患有。但現代婦女。着了高跟鞋。自尋苦

吃也易生足菌。和雞眼了。閨房自療。可用下開藥水每日塗布數次。日久便可漸漸化軟脫落。

撒 酸 一。〇

古羅地和 九。〇

(6) 面斑醫法 婦女面生斑點。原因因妊娠與生殖器官病。或由多受日光射照。或中藥物之毒。或因顏面常受硬物摩擦。故須探究原因。而後施治。閨房自療。可配下開二種方藥。(下劑混和塗布用)

(A) 昇 汞 〇。一五

拉 諾 林 三。〇

凡 士 林 三〇。〇

(B) 十倍硼酸凡士林 三〇。〇

[註]先用(A)藥。俟皮膚發熱將剝脫時。

改塗(B)種油藥。皮膚復原後。再塗(A)藥。如此輪流。至生斑皮膚自然脫落為止。

(7) 頑癬醫法 頑癬是一種慢性癩惡的病。症和疥癬兩樣。牠為一種細菌的聚發。無傳染性。概生陰部。大腿內側。與陰囊接壤處。腋窩。乳房下面。及胸廓接觸處等。先生赤色隆起小斑。漸次增大為圓板狀。發奇癢。周緣生丘疹。水泡。或痂皮。蔓延極緩。很難醫治。便請外科名醫。短期間也難奏效。所以閨房自療。必須有長久耐性。不可因初期似不見效。半途而廢。可依下開藥水混和塗布摩擦。

昇 汞 一。〇

石 炭 酸 二。〇

撒 酸 五。〇

酒 精 一〇〇。〇

(8) 疥癬醫法 疥癬為皮膚中寄生了疥癬虫而發生。皮膚嫩白之人。可以透視。本症都由同衾或坐 上一股熱毒所傳染。遇熱更癢。這

因癬虫在溫度中愈加活躍故也。疥癬俗稱疥瘡。牠附生在指側腕側膝屈面肘腋周圍腋窩陰囊大腿內側臀部膝臍臍部婦人乳房……等處發疹狀或大水泡奇癢難搔十分苦累除清潔沐浴外可塗下開油藥。

倍他那夫託爾

一五〇〇

綠肥皂

五〇〇〇

白堊

一〇〇〇

豬油

一〇〇〇〇

(9) 脫肛醫法 肛門脫出塗以油類。襯絨布或棉花納入之。且內服下開藥水。

番木鱈丁幾

一〇〇

橙皮糖漿

一〇〇〇

熟水

九〇〇〇

上爲一日量分三次服。飯前服下。

(註)相傳尙有極著效驗之土法。取生鷄蛋。

錐一小孔於壳。由是納入米粒大的明礬二粒。煨熟而食。每日食一個。連服十四個後。必可見效。見效後再服上方的藥水。一二月可不致復發。

(10) 便血醫法 大便中的血液。或出自胃腸。或出自肛門。出自肛門的。便因肛門裂傷而起。可用肛門裂傷的醫法治之。出自胃腸的。須內服下開的藥粉。

次硝酸蒼鉛

三〇〇

阿片末

一〇〇

上分三包。飯後服一包。一日服完。

(11) 血尿醫法 小便中的血液。概出自膀胱。閹房自療。可內服下開藥水。

撒曹

二〇〇

阿片丁幾

〇〇五

莨菪丁幾

一〇〇

單糖漿

一〇〇〇

熟水 九〇〇

上爲一日量分三次服。飯後服下。

(12) 紅斑醫法 手背、腳背、下腿、臂膊內側等處。如生紅斑。或平或稍隆起。或乾燥。或稍出水。癢而且熱。壓之摩擦之。則覺痛。重者全身發熱。不思飲食。病人宜靜臥。不可多動。患部可以浸濕。下開藥水。以紗布包之。

五十倍鉛糖水 二〇〇〇

此外市內服下開的藥粉。

阿司匹靈 三〇〇

(13) 癩癧醫法 癩癧頭男女患者。都有在男子尙可。女子則極礙。不雅觀。非裝假髮。何從遮醜。致本病成因。係頭皮中寄生一種微菌。所以有傳染性。不但人與人互相傳染。更能從人而傳至家畜。再從家畜傳回於人。有乾濕兩性。乾性的初起時。在頭髮根周圍的皮下。生黃色小點。漸漸

增大。至一二星期後。大如小豆。變成黃色。臍窩狀的圓板。中央貫通毛髮。鄰接的圓板。從漸漸增大。而互相融合。終於蔓延及全頭。有一種劇臭。與鼠臭相似。歷久不治者。上脫皮。堆積黃白色。石灰狀的厚層。患部的頭髮。失光澤。如覆灰塵。易斷。易脫。頭髮脫落後。永不再生。閉房自醫乾性癩癧。頭先塗下列油劑。使圓板軟化。

百倍那夫託爾橄欖油 二〇〇〇

次除去圓板。以綠肥皂洗滌之。而後逐一輕拔頭髮。拔去易脫者。留其健全者。再以綠肥皂洗滌之。俟頭皮乾後。塗以下開酒精劑。殺滅寄生菌。

石炭酸 三〇〇

個里設林 五〇〇

酒精 五〇〇

每日依上法自療。二三月後。如頭髮無變化。可停止塗藥。逐日細察其頭髮部。若仍有黃色斑

點發生。再施上法治療數星期。

濕性癩瘡。先在頭髮部生小水疱。很是發癢。後來演變為膿疱。向四周蔓延。極速。患部的頭髮雖然亦易脫落。但不若乾性之甚。愈後。年幼的尚能復生。間房自療。濕性癩瘡。每日數回用綠肥皂洗淨後。塗下開油藥。洗滌塗藥。愈勤。治愈愈速。膿疱中膿汁。須於洗滌時。破其皮面。排去之。（下劑混合塗布用）

披天勞爾

一〇〇〇

凡士林

一〇〇〇

上方效力固然確實。不過臭甚。如厭惡臭。可改用下開油藥。效力相同。而無臭味。不過藥價很貴啦。（下劑混合塗布用）

黑辯諾爾

一〇〇〇

凡士林

一〇〇〇

(14) 瘰癧醫法 本病係皮膚中寄生一種

小植物。大概發於壯年。沒有傳染性。不過極難斷根。治愈後。仍須復發。專發於胸腹頸臂的內面。腋窩乳房與胸相觸之處。陰囊與大腿相觸之處等。生於顏面者。極少。手和足則絕對不生。初生黃褐色。或暗褐色。小豆模樣的斑點。漸增大。患病常覺微癢。以爪搔之。上皮剝脫。若不醫治。決不自愈。反日見蔓延。本症雖無多大關係。但於容顏上。終是白圭之玷。影響間房情感。自療時。可購下開肥皂劑。每日朝夕塗擦。二回。數日後。上皮脫落。而愈。

綠肥皂

一〇〇〇〇

撒酸

三〇〇

(15) 疝氣醫法 疝氣發於小腸。因腹內的筋寬弛。腸內的一部墮下。根治之法。須請醫生施手術。平時忌勞動。因勞動後。易復發。病發時。宜靜臥。以棉花浸濕。下開的藥水。卷包之。

五十倍鉛糖水

五〇〇〇

又。內服下方的藥粉，使通利大便墜下之腸。自易回復。

硫 苦

二〇・〇

上沖開水一次服完（疝氣發作回復後。即向藥房中購小腸氣帶壓置發作之處。此帶宜常用。平時之大便亦須留意如閉結。易發作。宜即服蓖麻子油一湯匙以通之。

（16）痔瘡醫法 「十人九痔」痔瘡患者。因此極多。這為開房病的一種。根治方法。須請醫生施手術。若圖一時的輕快。外痔可塗下開油藥（本劑混合塗布用）

伊天哇爾

一〇・〇

凡士林

一〇・〇

出血多的則用下開油藥。（本劑混合塗布用）

沃度仿謨

三・〇

內。

單寧酸

六・〇

凡士林

三〇・〇

又。內痔醫法 可購下開藥桿。插入肛門之

伊天哇爾肛門坐藥

出血過多的改用單寧酸肛門坐藥。

（17）痔瘻醫法 痔瘡日久不愈。生管。便成痔瘻。肛門周圍生成的瘻管。穿通的名全痔瘻。不穿通的名不全痔瘻。不全痔瘻更有生於肛門外與肛門內的分別。欲求根治。須請專門醫生施手術。開房自療。只能減輕痛苦。全痔瘻與肛門外的不全痔瘻。可塗下開的油藥。


十倍沃度仿謨軟膏

一〇・〇


〔註〕生於肛門內的不全痔瘻。可插入內痔伊天哇爾肛門坐藥。

中華民國二十六年七月初版

閩房警庫 全書一册

實價國幣  角

外埠酌加寄費



版權所有
不准翻印

著者 王定九

校訂者 汪漱碧

出版者 中央書店

發行者 中央書店

總發行所上海 四馬路 中央書店

全國各大書局均有代售

