

醫統正脈全書

二七

傷寒論十卷目錄

卷第一

辨脈法

平脈法

卷第二

傷寒例

辨痓濕暎脈證

辨太陽病脈證并治法上

卷第三

辨太陽病脉證并治法中

卷第四

辨太陽病脉證并治法下

卷第五

辨陽明病脉證并治法

辨少陽病脉證并治法

卷第六

辨太陰病脉證并治法

辨少陰病脉證并治法

辨厥陰病脉證并治法

卷第七

辨霍亂病脉證并治法

辨陰陽易差後病脉證并治法

辨不可發汗病脉證并治法

辨可發汗病脉證并治法

卷第八

辨發汗後病脉證并治法

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治法
辨可下病脉證并治法

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治法

傷寒論藥方目錄

卷一 無方

卷二 方六道

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷三 方二十七道

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍

乾薑附子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當圓

卷四

方一十九道

大陷胃圓

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

炙甘草湯

白虎湯

卷五

方十道

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁圓

梔子蘖皮湯

麻黃連葛赤小豆湯

卷六

方二十道

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

四逆散

烏梅圓

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷七

方五道

理中圓

理中湯附

燒視散

枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

卷八

無方

卷九

無方

卷十

無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯

桂枝加厚樸杏子湯

桂枝加附子湯

尤附湯
方附

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝一麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

已上九方證
在第二卷

葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

柴胡加芒硝湯

桂枝加桂湯

已上六方證
在第三卷

柴胡桂枝湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

已上五方證
在第四卷

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

四逆加吳茱萸生薑湯

已上五方證
在第六卷

四逆加人參湯

四逆加猪膽汁湯方

已上五方證
在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如咬咀者卽今之剉如麻豆大是也云一升者卽今之大白盞也云銖者六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩也云三兩者卽今之一兩云三兩卽今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣

注解傷寒論卷四

江陰朱氏校刊本

漢張仲景述 王叔和撰次 成無巳注解

辨太陽病脉證并治法下第七

問曰病有結胷有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胷也何謂藏結答曰如結胷狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治結胷者邪結在胷藏結者邪結在藏二者
皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者爲結胷以陽受氣於胷中故爾與陰相結者爲藏結以陰受之則入五藏故爾氣宜通而塞故痛邪邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沉知邪結在陽

也寸脈浮關脈小細沉緊知邪結在陰也陰結而陽不
結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時
時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治藏結無
舌上白胎滑者邪氣結胷中亦寒故云難治藏結無

陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也藏

於法當下無陽證爲表無熱不往來寒熱爲半表半裏
無熱其人反靜爲裏無熱經曰舌上如胎者以丹田有
熱胷中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻病發於陽而反下之熱入因作結

胷病發於陰而反下之因作痞所以成結胷者以下之

太早故也

發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽

邪入裏結於胷中爲結胷無熱惡寒者發於陰也而反下之則表中陰

邪入裏結於心下爲痞結胷者項亦強如柔痓狀下

之則和宜大陷胷丸方結胷病項强者爲邪結胷中胷

膈結滿心下緊實但能仰而不

能俛是項強亦如柔痓之狀
也與大陷胸丸下結泄滿

大陷胸丸方

大黃

半斤味苦寒

蓼

半升熬味苦寒

芒硝

半升味鹹寒

杏仁

半升去皮尖熬
黑味苦甘溫

大黃芒硝之苦鹹所以下熱蓼
泄滿甘遂取其直達之蜜取其潤利皆以下泄滿實

物也

右肆味搗篩貳味內杏仁芒硝合研如脂和散取如
彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢七白蜜貳合水貳升煮
取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下爲効

傷寒論
卷四
禁如藥法

結胷證其脉浮大者不可下下之則死

結胷爲邪結胷中屬上焦之分

得寸脉浮關脉沉者爲在裏則可下若脉浮大心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難可制故云結胷證悉具煩躁者亦死

結胷證悉具邪結下之則死已深也煩躁者正

氣散亂也邪氣

勝正病者必死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲

熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒

者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛

客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞶則

爲結胷大陷胷湯主之若不結胷但頭汗出餘處無汗

劑頸而還小便不利身必發黃也

動數皆陽脉也當責邪在表睡而汗出者

謂之盜汗爲邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉邪氣內陷動數之脉所以變遲而浮脈獨不變者以邪結胷中上焦陽結脉不得而沈也客氣者外邪乘胃中空虛八裏結於胷膈膈中拒痛者客氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊憹皆邪熱爲實陽氣內陷氣不得通於膈壅於心下爲頓滿而痛成結胷也與大陷胷湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不結於胷膈下入於胃中者遍身汗出則爲熱越不能發黃若但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胷湯方

大黃六兩去皮苦寒芒硝一升鹹寒甘遂一錢七苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名硝石以其鹹能
火鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣
可以直達透結胷
胷陷三物爲允

右參味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒硝煮
壹兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

傷寒六七日結胷熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者

大陷胷湯主之

病在表而下之熱入因作結胷此不云
下後而云傷寒六七日則是傳裏之實

熱也沉爲在裏緊爲裏實以心下痛按之實
實鞭是以爲結胷與大陷胸湯以下結熱傷寒十餘日
熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胷無大熱
者此爲水結在胷腸也但頭微汗出者大陷胷湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱爲正邪分爭未全斂結與大柴胡湯下之但結脅無大熱者非熱結也是水飲結於脅腸謂之水結脅周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也與大陷脅湯以逐其水

太陽病重發汗而復下之不大

便五六日舌上燥而渴日晡時小有潮熱從心下至少

腹鞭滿而痛不可近者大陷脅湯主之

重發汗而復下之則內外重亡

津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱甚也與大陷脅湯以下其邪

小結脅病正

在心下按之則痛脉浮滑者小陷脅湯主之

心下鞭痛手不可近

者結脅也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結脅結脅脉沉緊或寸浮關沈今脉浮滑知熱未深結與

小陷賁湯以除
賁膈上結熱也

小陷賁湯方

黃連

一兩
苦寒

半夏

半升洗
辛溫

栝蔞實

大者一
箇苦寒

苦以泄之辛以散之黃連栝蔞實
之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右參味以水陸升先煮栝蔞取參升去滓內諸藥煮

取貳升去滓分溫參服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此

本有寒分也反下之若利止必作結賁未止者四日復

下之此作協熱利也

太陽病二三日邪在表也不能卧
但欲起心下必結者以心下結滿

臥則氣壅而愈甚故不能臥而但欲起也心下結滿有
水分有寒分有氣分今脉微弱知本有寒分醫見心下
結而反下之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣留結
爲結胷利不止至次日復如前下利不止者是邪熱下
攻腸胃爲挾熱利也

太陽病下之其脉促不結胷者此爲欲解也

脉浮者必結胷也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急

脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者惕熱

利脉浮滑者必下血

此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者爲陽盛下後脉促爲陽勝陰

也故不作結胷爲欲解下後脉浮爲上焦陽邪結而爲結胷也經曰結胷者寸脉浮關脉沉下後脉緊則太陽

之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰之絡令人嗌痛不可內食所以脉緊者必咽痛脉弦

則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脉循蹻絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下後邪氣

傳裏則頭痛當止脉細數爲邪未傳裏而傷氣也細爲氣少數爲在表故頭痛未止脉沉緊則大陽之邪傳於陽明爲裏實也沈爲在裏緊爲裏實陽明裏實故必欲嘔脈滑則太陽之邪傳於腸胃以滑爲陰氣有餘知邪氣入裏干於下焦也沈爲血勝氣虛是爲協熱利浮爲氣勝血虛是知必下血經曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此之謂也 痘在陽應以汗解之反以冷水澆之若灌之

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胷無熱證者與三物小陷胷湯白散亦可服病在陽爲邪在表也病法當汗出而解反以冷水澆之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗

以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結
於胷膈心下鞭痛本以水寒伏熱爲實故謂之寒實結
胷無熱證者外無熱而熱悉收斂於裏也與
小陷胷湯以下逐之白散下熱故亦可攻

文蛤散方

文蛤

五兩味
鹹寒

鹹走腎則可
以勝水氣

右壹味爲散以沸湯和壹服湯用五合

白散方

桔梗

三分味辛
苦微溫

巴豆

一分去皮心熬
黑研如脂辛溫

貝母

三分味辛
平

辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛
用以下氣巴豆之辛用以散實

右件參味爲散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服
強人半錢七羸者減之病在膈上必吐在膈下必利
不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟
不解欲引衣自覆者若水以漬之洗之益令熱刦不
得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥
參兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胷心下痞
鞶者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則
讞語脈弦五六日讞語不止當刺期門太陽之脉絡頭
下項頭項強痛

者太陽表病也少陽之脉循脅絡胸如結胷心下痞鞕者少陽裏病也太陽少陽相併爲病不純在表故頭項不但強痛而或眩冒亦未全入裏故時如結胷心下痞鞕此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以瀉太陽之邪刺肝俞以瀉少陽之邪邪在表則可發汗邪在半表半裏則不可發汗發汗則亡津液損動胃氣少陽之邪因干於胃上爲木刑必發讙語脈弦至五六日傳經盡邪熱去而讙語當止若復不止爲少陽邪熱甚也刺期門以婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八瀉肝膽之氣婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胷脇下滿如結胸狀讙語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之中風發熱惡寒不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胷脇下滿如結胷狀讙語者熱入血室而裏實期門者肝之

募肝主血刺期門者瀉血室之熱婦人中風七八日續審看何經氣實更隨其實而瀉之

得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘡狀發作有時小柴胡湯主之

中風七八日邪氣傳裏之時本無寒熱而續得寒熱經水適斷者此爲表邪乘血室虛入於血室與血相搏而血結不行經水所以斷也

血氣與邪分爭致寒熱如瘡而發作有時與小柴胡湯以解傳經之邪婦人傷寒發熱經

水適來晝日明了暮則譏語如見鬼狀者此爲熱入血

室無犯胃氣及上二焦必自愈

傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室空虛邪熱乘虛入於血室若晝日譏語爲邪客於府與陽

爭也此晝日明了暮則譏語如見鬼狀是邪不入府入於血室與陰爭也陽盛譏語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴胡湯

散邪發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗藥犯其上焦熱入血室智腸滿如結智狀者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪熱悉除而愈矣所爲發汗爲犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故刺期門爲犯中焦者刺期門則動榮氣榮氣出中焦故也脉經曰無犯胃氣及上二焦必自愈豈謂藥不謂針耶傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之傷寒六七日邪當傳裏之時支散也嘔而心下結者裏證也法當攻裏發熱微惡寒支節煩疼爲外證未去不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之傷寒五六日已發汗而復下之胃腸滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也柴胡桂枝乾薑湯主之傷寒五六日已經汗下之

後則邪當解今胷脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者卽邪氣猶在半表半裏之間爲未解也胷脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熟也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半斤味桂枝三兩去皮乾薑二兩味

辛熱

括蔞根四兩味黃芩三兩味

苦寒

牡蠣二兩熬

味鹹寒

甘草

二兩炙

味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳裏之邪辛甘發散爲陽桂枝甘草之辛甘以散在表

之邪鹹以更之牡蠣之鹹以消腎脇之滿辛以潤之
乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而爲渴苦以堅

之栝蒌之苦

以生津液

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎取叁升
溫服壹升日叁服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食
大便鞭脉細者此爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入
在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入
在裏此爲半在裏半在外也脉雖沈緊不得爲少陰病
所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與

小柴胡湯設不了了者得屎而解

傷寒五六日邪當傳裏之時頭汗出微惡

寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭脉細者邪結於裏也大便鞭爲陽結此邪熱雖傳於裏然以外帶表邪則熱結猶淺故曰陽微結脈沉雖爲在裏若純陰結則更無頭汗惡寒之表證諸陰脉皆至頸胷中而還不上循頭今頭汗出知非少陰也與小柴胡湯以除半表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者爲裏熱未除與湯取其微利

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡

湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此

雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心

下滿而鞭痛者此爲結胷也大陷胷湯主之但滿而不

痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

傷寒五六日邪在半

表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是爲柴胡
證具以他藥下之柴胡證不罷者不爲逆却與柴胡湯
則愈若下後邪氣傳裏者邪在半表半裏則陰陽俱有
邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽邪傳
裏者則結於胷中爲結胷以胷中爲陽受氣之分與大
陷胷湯以下其結陰邪傳裏者則留於心下爲痞以心
下爲陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發
於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之因
作痞此之謂也

半夏瀉心湯方

半夏

半升洗
味辛平

黃芩

味苦

乾薑

味辛熱

甘草

炙

味甘平

人參

各三兩

黃連

一兩味苦寒

大棗

十二枚擘

味甘溫

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而泄熱
黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人

參甘草大棗
之甘以緩之

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升温服
壹升日叁服

太陽少陽併病而反下之成結胷心下鞶下利不止水

漿不下其人心煩

太陽少陽併病爲邪氣在半表半裏也而反下之二經之邪乘虛而入太

陽表邪入裏結於胷中爲結胷心下鞶少陽裏邪乘虛下干腸胃遂利不止若邪結陰分則飲食如故而爲藏

結此爲陽邪內結故水漿不下而心煩

脉浮而緊而復下之緊反入裏則

作痞按之自濡但氣痞耳

浮而緊浮爲傷陽緊爲傷陰當發其汗而反下之若浮入

裏爲陽邪入裏則作結胷浮不入裏而緊入裏者爲陰邪入裏則作痞

太陽中風下利嘔

逆表解者乃可攻之其人黎黎汗出發作有時頭痛心
下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解
裏未和也十棗湯主之下利嘔逆裏受邪也邪在裏者
可下亦須待表解者乃可攻之
其人黎黎汗出發作有時不惡寒者表已解也頭痛心
下痞鞭滿引脅下痛乾嘔短氣者邪熱內畜而有伏飲
是裏未和也與十
棗湯下熱逐飲

十棗湯方

芫花

熬味辛溫

甘遂

味苦寒

大戟

味苦寒

大棗

味甘溫十枚擘

辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之甘遂大戟之
苦以泄水水者腎所主也甘者脾之味也大棗之甘
者益土而勝水

右上參味等分各別搗爲散以水壹升半先煮大棗肥者拾枚取捌合去滓內藥末強人服壹錢七羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因脅煩面色青黃膚瞞者難治今色微黃手足溫者易愈太陽病因發寒者外虛陽氣邪復不除也因復下之又虛其裏表中虛邪內陷傳於心下爲痞發汗表虛爲竭陽下之裏虛爲竭陰表證罷爲無陽裏有痞爲陰獨又加燒針虛不勝火氣內攻致脅煩也傷寒之病以陽爲主其人面

色青膚內瞞動者陽氣大虛故云難治若面
色微黃手足溫者卽陽氣得復故云易愈

心下痞按

之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之心下鞭按
沉者實熱也心下痞按之濡其脈關上
浮者虛熱也大黃黃連湯以導其虛熱

大黃黃連瀉心湯方

大黃

二兩味苦寒

黃連

一兩味苦寒

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯瀉服者取其氣薄而泄虛熱

右貳味以麻沸湯貳升瀉之須臾絞去滓分溫再服心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之心下痞者虛熱內伏

也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽

本以下之故心下痞與

瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散

主之

本因下後成痞當與瀉心湯除之若服之痞不解其人渴而口燥煩小便不利者爲水飲內畜津液不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍之一日乃愈者不飲者外水不入所停之水得行而痞亦愈矣

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脹

下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

胃爲津液之主

陽氣之根大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞鞭金匱要略曰中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀也脅下有水氣腹中雷鳴傷土弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃傷

寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病
不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上
逆故使鞭也甘草瀉心湯主之傷寒中風是傷寒或中
之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行穀不化腹中
雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞭乾嘔心煩不得安
者胃中空虛客氣上逆也與瀉心湯以攻表加甘草以
補虛前以汗後胃虛是外傷陽氣故加生薑此以下後
胃虛是內損陰氣故加甘草

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚
理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復
利不止者當利其小便傷寒服湯藥下後利不止而心
下痞鞭者氣虛而客氣上逆也

與瀉心湯攻之則痞已醫復以他藥下之又虛其裏致利不止也理中丸脾胃虛寒下利者服之愈此以下焦虛故與之其利益甚聖濟經曰滑則氣脫欲其收也如開腸洞泄便溺遺失瀉劑所以收之此利由下焦不約與赤石脂禹餘糧湯以瀉洞泄下焦主分清濁下利者水穀不分也若服瀉劑而利不止當利小便以分其氣

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂

一斤碎
味甘溫

禹餘糧

一斤碎
味甘平

本草云瀉可去脫石脂之瀉以收
歛之重可去怯餘糧之重以鎮固

已上貳味以水陸升煮取貳升去滓參服

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿

傷寒吐下後發汗則

表裏之氣俱虛虛煩脈甚微爲正氣內虛邪氣獨在至七八日正氣當復邪氣當罷而心下痞脇下痛氣上衝咽喉眩冒者正氣內虛而不復邪氣留結而不去經脈動惕者經絡之氣虛極久則熱氣還經必成痿弱傷

寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復代

赭石湯主之

大邪雖解以曾發汗吐下胃氣弱而未和虛氣上逆故心下痞鞕噫氣不除與旋復

代赭石湯降虛氣而和胃

旋復代赭石湯方

旋復花

三兩味鹹溫

人參

二兩味甘溫

生薑

五兩切味辛溫

代赭石

一兩味苦寒

大棗

十二枚味甘溫

甘草

三兩炙味甘平

半夏

半升味辛溫

鞭則氣堅鹹味可以煎之旋復之鹹以煎痞鞭怯則氣浮重劑可以鎮之代赭之重以鎮虛逆辛者散也生薑半夏之辛以散虛痞甘者緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升温服
壹升日叁服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻

黃杏子甘草石膏湯

前第三卷廿六證云發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者

爲與此證治法同汗下雖殊既不當損正氣則一邪氣所傳旣同遂用一法治之經所謂若發汗若下若吐後者是

太陽病外證未除而數下之遂慘熱而利利下不

止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

外證未除而數下之

爲重虛其裏邪熱乘虛而入裏虛惕熱遂利不止而心下痞若表解而下利心下痞者可與瀉心湯若不下利表不解而心下痞者可先解表而後攻痞以表裏不解故與桂枝人參湯和裏解表

桂枝人參湯方

桂枝

四兩去皮
味辛熱

甘草

四兩炙
味甘平

白朮

三兩味
甘平

人參

三兩味
甘溫

乾薑

三兩味
辛熱

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也

右伍味以水玖升先煮四味取五升內桂更煮取叁升溫服壹升日再夜壹服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大

黃黃連瀉心湯

大下後復發汗則表裏之邪當悉已此心下痞而惡寒者表裏之邪俱不解也

因表不解而下之爲心下痞先與桂枝湯解表表解乃與大黃黃連瀉心湯攻痞內經曰從外之內而盛於內者先治其外傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下而後調其內

利者大柴胡湯主之

傷寒發熱寒已成熱也汗出不解表和而裏病也吐利心腹濡煩爲

裏虛嘔吐而下利心下痞鞭者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱

病如桂枝證頭不痛

項不強寸脉微浮胷中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此

爲胷有寒也當吐之宜瓜蒂散

病如桂枝證爲發熱汗出惡風言邪在表也頭

痛項強爲桂枝湯證具若頭不痛項不強則邪不在表而傳裏也浮爲在表沈爲在裏今寸脉微浮則邪不在

表亦不在裏而在胷中也。胷中與表相應故知邪在胷
中者猶如桂枝證而寸脉微浮也。以胷中痞鞕氣上衝
咽喉不得息知寒邪客於胷中而不在于表也。千金曰氣
浮上部填塞胷心胷中滿者吐之則愈。與瓜蒂散以吐
之邪。

瓜蒂散方

瓜蒂

一分熬黃
味苦寒

赤小豆

一分味酸溫

其高者越之越以瓜蒂香豉之苦在上者湧
之湧以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄爲陰

右貳味各別搗篩爲散已合治之取壹錢七以香豉
壹合用熱湯染合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服
之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與

瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏

結死

素有宿昔之積結於脇下爲痞今因傷寒邪氣入裏與宿積相合使藏真之氣結而不通致連在臍

傍痛

引少腹

入陰筋而死傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數

升者白虎加人參湯主之

若吐若下後七八日則當解復不解而熱結在裏表熱者

身熱也裏熱者內熱也本因吐下後邪氣乘虛內陷爲

結熱若無表熱而純爲裏熱則邪熱結而爲實此以表

熱未罷時時惡風若邪氣純在表則惡風無時若邪氣

純在裏則更不惡風以時時惡風知表裏俱有熱也邪

熱結而爲實者則無大渴邪熱散漫則渴今雖熱結在

裏表裏俱熱未爲結實邪氣散漫熏蒸焦膈故大渴舌

上乾燥而煩欲飲水數升與
白虎加人參湯散熱生津

傷寒無大熱口燥渴心煩

背微惡寒者白虎加人參湯主之

無大熱者爲身無大熱也口燥渴心煩者

當作陽明病然以背微惡寒爲表未全罷所以屬太陽也背爲陽背惡寒口中和者少陰病也當與附子湯今口燥而渴背雖惡寒此裏熱也則惡寒亦不至甚故

云微惡寒與白虎湯和表散熱加人參止渴生津

傷

寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不渴者宜

麻黃湯渴者宜五苓散非白虎所宜大渴欲水無表證者乃可與白虎加人參湯以散裏熱臨病之工大宜精別

太陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺

俞肝俞慎勿下之心下痞鞭而眩者少陽也頸項強者別太陽也刺大椎肺俞以瀉太陽之邪

以太陽脉下項俠脊故爾肝俞以瀉少陽之邪以膽爲肝之府故爾太陽爲在表少陽爲在裏卽是半表半裏證前第八證云不可發汗發汗則讞語是發汗攻太陽之邪少陽之邪益甚干胃必發讞語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛入裏必作結胷經曰太陽少陽併病而反下之成結胷太陽與少陽

合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯

主之

太陽陽明合病自下利爲在表當與葛根湯發汗

陽明少陽合病自下利爲在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利爲在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以合解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以散逆氣

黃芩湯方

黃芩

三兩味苦寒

甘草

二兩炙味甘平

芍藥

二兩味酸平

大棗味十二枚擘

甘溫

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅歛腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固

腸胃之弱

右肆味以水壹斗煮取叁升去滓溫服壹升日再夜壹服若嘔者加半夏半升生薑叁兩

傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯

主之

濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胷上有寒是邪氣入裏而爲下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而爲下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而獨治於下爲下寒腹中痛陽不得降而獨治於上爲胷

中熱欲嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣

黃連湯方

黃連味苦寒

甘草炙味甘平

乾薑味辛熱

桂枝去皮味辛熱各三兩

人參二兩味甘溫

半夏半升洗味甘溫

大棗味甘溫十二枚擘

上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂薑半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之入參甘草大棗之甘以益胃

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日參服

夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不

渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之

傷寒與中風家至七八日再經之時

則邪氣多在裏身必不苦疼痛今日數多復身體疼煩不能自轉側者風濕相搏也煩者風也身疼不能自轉側者濕也經曰風則浮虛脉經曰脉來濇者爲病寒濕也不嘔不渴裏無邪也脉得浮虛而濇身有疼煩知風濕但在經也與桂枝附子湯以散表中風濕

桂枝加白朮湯主之

桂發汗走津液此小便利大便鞭爲津液不足去桂加朮

桂枝附子湯方

桂枝

四兩去皮味辛熱

附子

三枚炮去皮破入片味辛熱

生薑

三兩切味辛溫

甘草

二兩炙味甘溫

大棗

十二枚擘味甘溫

風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經者逐以附子之辛熱薑棗辛甘行榮衛通津液以和表也

右伍味以水陸升煮取貳升去滓分溫參服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子

湯主之

風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂經故骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇也風勝則

衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣爲風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫爲濕外搏也與甘草附

子湯散濕

固衛氣

甘草附子湯方

甘草

二兩炙味甘平附子二枚炮去皮破味辛熱

白朮

二兩味甘溫

桂枝

四兩去皮味辛熱

桂枝甘草之辛甘散風邪而和衛
附子白朮之辛甘解濕氣而溫經

右肆味以水陸升煮取參升去滓溫服壹升日參服
初服得微汗則解能食汗止復煩者服伍合恐壹升
多者宜服六七合爲始

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之
滑爲在表
裏有熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府
故止言寒如瓜蒂散證云胷上有寒者是矣與白虎湯
以外之邪
以解內

白虎湯方

知母六兩味苦寒
石膏一斤碎味甘寒
甘草二兩味甘平

粳米

六合味
甘平

內經曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益氣右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓溫服壹升日參服

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之

結代之脉動而中止能自還者名曰

悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脈

炙甘草湯方

甘草

四兩炙

生薑

三兩切

桂枝

三兩去皮

人參

二兩味

生地黃

一斤味

阿膠

二兩味

甘溫

甘寒

甘寒

甘溫

甘溫

麥門冬

半升去心味甘平

麻子仁

半升味甘平

大棗

三十枚擘味甘溫

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津耗散爲枯五藏痿弱榮衛潤流濕劑所以潤之麻仁阿膠

麥門冬

地黃之甘潤經益血復脉通心也

右玖味以清酒染升水捌升先煮捌味取參升去滓內膠烊消盡溫服壹升日參服壹名復脉湯

脈按之來緩而時一止復來者名曰結又脈來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脈者必難治

結代之脈一爲邪氣留結一爲真氣虛衰脈來動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動

而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰爲難治之脉經曰脉結者生代者死此謂也

釋音

俛
俛也
俛 音免
如倫切
瞶 瞶目動也
求位切
匱 匮也
於危切
痟 痹病也
柔也
炙 音羊
燶也

傷寒論卷四終

注解傷寒論卷五

江陰朱氏校刊本

漢張仲景述 王叔和撰次 成無巳注解

辨陽明病脉證并治法第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約是也

陽明胃也邪自太陽經傳之入府者謂之太陽陽明

經曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大正陽便因鞢者與小承氣湯卽是太陽陽明脾約病也

陽明者胃家實是也

邪自陽明經傳入府者謂之正陽陽明經曰陽明經傳入府者謂之正陽

惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解可攻裏也手足濶濶然汗出者此大便已鞢也大承氣湯主之卽是正陽陽明胃家實也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩

實大便難是也

邪自少陽經傳之入府者謂之少陽陽明經曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讞語

此屬胃即是少陽陽明病也

陽明之爲病胃家實也

邪傳入胃熱毒留結則胃家爲實華佗曰熱毒入胃要須下去之不可留於胃中是知邪在陽明爲胃家實也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便

此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難

者此名陽明也

本太陽病不解因汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明古人

登廁必更衣不更衣者通爲不大便不更衣則胃中物不得泄故爲內實胃無津液加之畜熱大便則難爲陽明裏

實也問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

陽明病爲邪入府也邪在表則身熱汗出而惡寒邪旣入府則表證已罷故不惡寒但身

熱汗出而
惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也

答曰雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

客邪

在陽明當發熱而不惡寒今得之一日猶不發熱而惡寒者卽邪未全入府尙帶表邪若表邪全入則更無惡寒必自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也

萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病

也胃爲水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳入於胃

入胃則更不復傳如太陽病傳之入胃則更不傳陽

明陽明病傳之入胃則更不傳少陽少陽病傳之入胃則更不傳三陰

本太陽初得病時

發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

傷寒傳經者則一日太陽二日陽明

此太陽傳經故傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濶
日轉屬陽明

濶然者是轉屬陽明也

傷寒發熱無汗嘔不能食者太陽受病也若反汗出濶濶然者

太陽之邪轉屬陽明出

傷寒三日陽明脈大

傷寒三日邪傳陽明

經曰陽明病法多汗傷寒三日陽明氣血俱多又邪併於經是以脉大傷寒脈浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小

便自利者不能發黃至七八日大便鞕者爲陽明病也

浮爲陽邪緩爲脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽

則手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在

太陰也太陰土也爲邪蒸之則色見於外當發身黃小

便自利者熱不內畜不能發黃至七八日大便鞕者卽

太陰之邪入府

傷寒轉繫陽明者其人濶然微汗出也

傷寒則無汗陽明法多汗此以傷寒邪轉繫陽明故濶然微汗出

陽明中風口苦咽乾

腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難

也脈浮在表緊爲裏實陽明中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於裏也發熱惡寒者表仍未解也若下之裏

邪雖去表邪復入於裏又亡津液故使腹滿而小便難

陽明病若能食名中風不

能食名中寒

陽明病以飲食別受風寒者以胃爲水穀之海風爲陽邪陽邪殺穀故中風者能食

寒爲陰邪陰邪不殺穀故傷寒者不能食

陽明病若中寒不能食小便不利

手足濶然汗出此欲作固瘕必大便初鞞後溏所以然

者以胃中冷水穀不別故也

陽明中寒不能食者寒不殺穀也小便不利者津液

不化也陽明病法多汗則周身汗出此手足濶然汗出而身無汗者陽明中寒也固瘕者寒氣結積也胃中寒

甚欲留結而爲固瘕則津液不得通行而大便必鞞者若汗出小便不利者爲實也此以小便不利水穀不別

雖大便初鞭
後必溏也

陽明病欲食小便反不利大便自調其人

骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解者此

水不勝穀氣與汗共併脈緊則愈

陽病客熱初傳入胃
胃熱則消穀而欲食

陽明病熱爲實者則小便當數大便當鞭今小便反不利大便自調者熱氣散漫不爲實也欲食則胃中穀多內經曰食入於陰長氣於陽穀多則陽氣勝熱消津液則水少經曰水入於經其血乃成水少則陰血弱金匱要略曰陰氣不通卽骨疼其人骨節疼者陰氣不足也熱甚於表者翕翕發熱甚於裏者蒸蒸發熱此熱氣散漫不專著於表裏故翕翕如有熱狀奄忽也忽然發狂者陰不勝陽也內經曰陰不勝其陽者則脈流薄疾并乃狂陽明蘊熱爲實者須下之愈熱氣散漫不爲實者必待汗出而愈故云濺然汗出而解也水穀之等者陰陽氣平也水不勝穀氣是陰不勝陽也汗出則陽氣衰脈緊則陰氣生陰陽氣平兩無偏勝則愈故云與汗

其并脈陽明病欲解時從申至戌上

胃爲陽明土王於申酉戌向王時是

緊則愈爲欲解

陽明病不能食攻其熱必嘔所以然者胃中虛冷

故也以其人本虛故攻其熱必嘔

不能食胃中本寒攻其熱復虛其胃虛寒

相搏故令嘔也經曰關脈弱胃氣虛有熱不可大攻之熱去則寒起此之謂也

陽明病脈遲食

難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之

腹滿如故所以然者脈遲故也

陽明病脈遲則邪方入裏熱未爲實也食入於

陰長氣於陽胃中有熱食難用飽飽則微煩而頭眩者

穀氣與熱氣相搏也兩熱相合消搏津液必小便難利

者不能發黃言熱得泄也小便不利則熱不得泄身必

發黃疸黃也以其發於穀氣之熱故名穀疸熱實者下

之則愈脈遲爲熱氣未實雖下之腹滿亦不減也經日脈遲尙未可攻

陽明病法多汗反

無汗其身如蟲行皮中狀者以此久虛故也

胃爲津液之本氣虛

津液少病則反無汗胃候身之肌肉其身如蟲行皮中者知胃氣久虛也

陽明病反無汗而

小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不

嘔手足不厥者頭不痛

陽明

陽明傷寒而寒氣內攻也

至二三日發欬手足厥者寒邪發於外也必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者是寒邪但攻裏而不外發其頭亦不痛也

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛

若不欬者咽不痛

陽明病身不重痛但頭眩而不惡寒者陽明中風而風氣內攻也經曰陽

明病若能食名中風風邪攻胃胃氣上逆則欬咽者胃之系欬甚則咽傷故必咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也

陽明病無汗小便不利心中懊惱者身必發黃

陽明

病無汗而小便不利者熱蘊於內而不得越心中懊憹者熱氣鬱蒸欲發於外而爲黃也

陽明病被

火額上微汗出小便不利者必發黃

陽明病則爲內熱被火則火熱相合

而甚若遍身汗出而小便利者熱得泄越不能發黃今額上微汗出而小便不利則熱不得越鬱蒸於胃必發

黃陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜也

汗出

浮爲在經緊者裏實脉浮而緊者表熱裏實也必潮熱發作有時若脉但浮而不緊者止是表熱也

必盜汗出盜汗者睡而汗出也

陽明病裏熱者自汗表熱者盜汗

陽明病口燥但欲漱

水不欲嚥者此必衄

陽明之脉起於鼻絡於口陽明裏熱則渴欲飲水此口燥但欲漱水

不欲嚥者是熱在經而裏無熱也陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄行必作衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此大便必

汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此大便必

鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也先亡津液使大便鞭小便數少津液分別大便必自下也傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之嘔者熱在上焦未全入府故不可下陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈陽明病腹滿者下之心下鞭滿則邪氣尙淺未全入府不可便下之得利止者爲邪氣去正氣安正氣安則愈若因下利不止者爲正氣脫而死陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃小便不利也合通也陽明病面色通赤者熱在經也不可下之下之虛其胃氣耗其津液經

中之熱乘虛入胃必發陽明病不吐不下心煩者可與

熱色黃小便不利也

陽明病不吐不下心煩者可與

調胃承氣湯

吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩卽是胃有鬱熱

也與調胃承氣湯以下鬱熱

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必

重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

濶然而汗出者此大便已鞶也大承氣湯主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若

腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病脉遲若汗出多微發熱惡寒者表未解也若脉遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足爲熱蒸之則周身汗出津液不足爲熱蒸之其手足濶然而汗出

知大便已鞭也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮是熱未成實故不可便與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣

大承氣湯方

大黃

四兩苦
寒酒洗

厚朴

半斤苦溫
炙去皮

枳實

五枚苦
寒炙

芒硝

三合
鹹寒

內經曰燥淫所勝以苦下之大黃枳實之苦以潤燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴之苦下結燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹以攻蘊熱

右肆味以水壹斗先煮貳物取伍升去滓內大黃煮取貳升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得

下餘勿服

小承氣湯方

大黃

四兩

厚樸

二兩炙去皮

枳實

三枚大者炙

大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒硝又以結不至堅故不減厚樸枳實也

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣

湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

潮熱者實得大便微鞭者便可攻之若不鞭者則熱未成實雖有潮熱亦未可攻若不大便六七日恐有燥屎當先與小承氣湯瀆之如有燥屎小承氣湯藥勢緩不能宣泄必轉氣下失若不轉失氣是胃中無燥屎但腸間少鞭爾止初頭鞭後必溏攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中乾燥則欲飲水水入胃中虛寒相搏氣逆則噦其後却發熱者則熱氣乘虛還復聚於胃中胃燥得熱必大便復鞭而少與小承氣湯微利與和之所以重云不轉失氣不可攻內慎之至也夫實則讞語虛則鄭聲鄭聲重語也

內經

曰邪氣盛則實精氣奪則虛讞語由邪氣盛而神識昏也鄭聲由精氣奪而聲不全也讞語者言語不次也鄭聲者鄭音不正也論語云惡鄭聲之亂樂又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正也今新差氣虛人聲轉者是所謂重語者直視讞語喘滿者死下利者亦也若聲重亦聲轉之直視讞語喘滿者死下利者亦

死

直視讞語邪勝也喘滿爲氣上脫下利爲氣下脫是皆主死

發汗多若重發汗者

亡其陽讞語脈短者死脈自和者不死亡陽胃燥讞語者脈短津液已絕不可復治脈自和爲正氣未衰而猶可生也傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱讞語者大承氣湯主

之若一服利止後服

若吐若下皆傷胃氣不大便五
日上至十餘日者亡津液胃氣虛

邪熱內結也陽明王於申酉戌日晡所發潮熱熟者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以爲熱氣有餘若劇者是熱氣甚大也熱大甚於內昏冒正氣使不識人至於循衣摸牀惕而不安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽絕者死熱劇者爲陽勝脈弦爲陰有餘澁爲陰不足陽熱雖劇脈弦知陰未絕而猶可生脈澁則陰絕故不可治其邪熱微而未至於劇者但發熱譏語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中病卽止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則止後服陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譏語小承氣湯主之若一服譏語止更莫復服

亡津液胃燥大便鞭而譏語雖無大熱內結亦須與小承氣湯和其胃氣得一服譏語止則胃陽明病燥以潤更莫復與承氣湯以本無實熱故也

陽明病

讞語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之

明日不大便脉反微澁者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也

陽明病讞語發潮熱若脉沉實者內實者也則可下若脉滑疾爲裏熱未實則不可下先與小

承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小承氣湯一升以除之若不轉失氣者是無燥屎不可更與承氣湯至明日邪氣傳時脉得沉實緊牢之類是裏實也反得微澁者裏氣大虛也若大便利後脉微澀者止爲裏虛而猶可此不會大便脉反微澀是正氣內衰爲邪所勝故云難治

陽明病讞語有

潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞶爾宜大承氣湯下之

讞語潮熱爲胃熱當消穀引食反不能食者胃中有燥屎

而胃中實也若能食者胃中虛熱雖鞭不得爲有燥屎雜病虛爲不欲食實爲欲食傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛熱甚者能食與雜病爲異也與大承氣湯以下燥屎逐結熱陽明病下血譏語

者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之

濶然汗出則愈

陽明病熱入血室迫使血下行使下血譏語陽明病法多汗以奪血者無汗故但

頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除陽明之邪熱散邪除熱榮衛得通津液得復濶然汗出

而解汗出譏語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過

經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下

之則愈宜大承氣湯

胃中有燥屎則譏語以汗出爲表未罷故云風也燥屎在胃則當下以表未和則未可下須過太陽經無表證乃可下之下之早燥屎雖除則表邪乘虛復陷於裏爲表虛裏實

胃虛熱甚語言必亂與大承氣湯却下胃中邪熱則止

傷寒四五日脉沉而喘滿

沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實

久則譏語

邪氣入內之時得脈沉而喘滿裏證具也則當下之反發其汗令津液越出胃中乾燥大

便必難久則尿燥

胃實必發譏語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不

仁而面垢譏語遺尿發汗則譏語下之則額上生汗手

足逆冷若自汗出者白虎湯主之

腹滿身重難以反側口不仁譏語者陽明

也針經曰少陽病甚則面微塵此面垢者少陽也遺尿

者太陽也三者以陽明證多故出陽明篇中三陽合病

爲表裏有邪若發汗攻表則燥熱益甚必愈譏語若下

之攻裏表熱乘虛內陷必額上汗出手足逆冷其自汗

出者三陽經熱甚也內經曰熱則腠理開榮衛通汗大泄與白虎湯以解內外之熱

二陽併病太

陽證罷但發潮熱手足漒漒汗出大便難而讞語者下

之則愈宜大承氣湯

本太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是無表證但發潮熱是熱

併陽明一身汗出爲熱越今手足漒漒汗出是熱聚於胃也必大便難而讞語經曰手足漒然而汗出者必大便已鞭也與大承氣湯以下胃中實熱

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿

而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤

憤反讞語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃

中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

脉浮發熱爲邪在表咽燥口苦爲熱在經脈緊腹滿而喘汗出不惡寒反惡熱身重爲邪在裏此表裏俱有邪猶當和解之若發汗攻表表熱雖除而內熱益甚故躁而憤憤反讞語憤憤者心亂經曰榮氣微者加燒針則

血不行更發熱而躁煩此表裏有熱若加燒針則損動陰氣故怵惕煩躁不得眠也若下之裏熱雖去則胃中空虛表中客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於膈使心中懊憹而不了了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣客於胸中與梔子豉湯以吐胸中之邪

若渴欲飲水口乾舌燥者白

虎加人參湯主之

若下後邪熱客於上焦者爲虛煩此下後邪熱不客於上焦而客於中焦

者是爲乾燥煩渴與白虎加人參湯散熱潤燥若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者

猪苓湯主之

此下後客熱客於下焦者也邪氣自表入裏客於下焦三焦俱帶熱也脉

浮發熱者上焦熱也渴欲飲水者中焦熱也小便不利者邪客下焦津液不得下通也與猪苓湯利小便以瀉下焦之熱也

猪苓湯方

猪苓

去皮
甘平

茯苓

甘平

阿膠

甘

滑石

碎甘

澤瀉

各一兩
甘鹹寒

利水道

甘甚而反淡淡味滲泄爲陽猪苓茯苓之甘以行小便鹹味湧泄爲陰澤瀉之鹹以泄伏水滑利竅阿膠滑石之滑以利水道

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烊消溫服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

針經曰水穀入於口輸於腸胃其液別爲二天寒衣薄則爲溺天熱衣厚則爲汗是汗溺一液也汗多爲津液外瀉胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便也

脉浮

而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

浮爲表熱遲爲裏寒下利

清穀者裏寒甚也與

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

四逆湯溫裏散寒

噦者咳逆是也千金曰咳逆者噦逆之名

胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦

脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經也

乾鼻燥能食者則衄

脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經也能食者裏和也熱甚於經迫血爲

衄胃中虛冷陰勝也水入於經其血乃成飲水者助陰氣逆爲噦發熱口乾陽勝也食入於陰長氣於陽能食

者助陽血妄爲衄三者偏陰偏陽之疾也

陽明病下之其外有熱手足溫不

結胸心中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

表未罷而下者應邪熱內陷也熱內陷者則外熱而無手足寒今外有熱而手足溫者熱雖內陷然而不深故不作結胸也心中懊憹飢不能食者熱客胷中爲虛煩也熱自胸中熏蒸於上故但頭汗出而身無汗與梔子

豉湯以吐胸中之虛煩

主

陽明病發潮熱大便溏小便自可胷脇滿

不去者小柴胡湯主之

陽明病潮熱爲胃實大便鞭而小便數今大便溏小便自可則

胃熱未實而水穀不別也大便溏者應氣降而胷脇滿去今反不去者邪氣猶在半表半裏之間與小柴胡湯以去表裏之邪

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可

與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濶然而

汗出解也

陽明病腹滿不大便舌上胎黃者爲邪熱入府可下若脇下鞭滿雖不大便而嘔舌上白

胎者爲邪未入府在表裏之間與小柴胡湯以和解之上焦得通則嘔止津液得下則胃氣因和汗出而解

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難

有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日

脈續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黃湯若

不尿腹滿加噦者不治

浮大爲陽風在表也弦則爲陰風在裏也短氣腹滿脇下及心

痛風熱壅於腹中而不通也若寒客於內而痛者按之則寒氣散而痛止此以風熱內壅故雖久按而氣亦不通陽明病鼻乾不得卧自汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而嗜卧者風熱內攻不干表也一身面目悉黃小便難有潮熱時時噦者風熱攻於胃也陽明之脉出大迎循頰車上耳前過客主人熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺之經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻若外證不解雖過十日脉續浮者邪氣猶在半表半裏與小柴胡湯以和解之若其脉但浮而不弦大無諸腹滿加噦者關格之疾也故云不治難經曰關格者不得盡其命而死

陽明病自汗出若

發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之當須
自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆
可爲導津液內竭腸胃乾燥大便因鞭此非結熱故不可攻宜以藥外治而導引之

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攬之
勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二
寸許當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手急抱欲
大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃
當大便出

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂

枝湯

陽明病脈遲汗出多當責邪在裏以微惡寒知表未解與桂枝湯和表

陽明病脈浮

無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

陽明傷寒表實脉浮無汗而喘也與麻黃湯以

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗發汗

出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱

在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

但頭汗出身無汗劑頸而還者熱不得越也小便不利渴引水漿者熱甚於胃津液內竭也胃爲土而

色黃胃爲熱蒸則色奪於外必發黃也與茵陳湯逐熱

黃退

茵陳蒿湯方

茵陳蒿

六兩苦
微寒

梔子

十四枚
擘苦寒

大黃

二兩去
皮苦寒

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補必以酸大黃之苦寒以
下瘀熱

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血

故令喜忘屎雖便大便反易其色必黑宜抵當湯下之
內經曰血並於下亂而喜忘此下本有久瘀血所以喜忘也津液少大便硬以畜血在內屎雖便大便反易其色黑也與抵當湯以下瘀血

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥

屎者可攻腹微滿初頭硬後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

下後心中懊憹而煩者虛煩也當與梔子豉湯若胃中有燥屎者非虛煩也可

與大承氣湯下之其腹微滿初頭硬後溏是無燥屎此熱不在胃而在上也故不可攻

病人不大便

五六日繞脅痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

不大便六七日者則大便必結爲燥屎也胃中燥其氣不得下通故繞脅痛煩躁發作有時也病

人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也

脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯雖得陽明證未可便爲裏實審看脉候以別內外其脉實者熱已入府爲實可與大承氣湯下之其脉浮虛者是熱未入府猶在表也可與桂枝湯發汗則愈大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯大下之後則胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食已結不消故使煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也與大承氣湯以下除之病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯小便利則大便輒此以有燥屎故小便不利而大便乍難乍易胃熱者發熱喘冒無時及嗜卧也此燥屎在胃故時有微熱喘冒不得卧也與大承氣湯以下燥屎食穀欲嘔者屬陽明也吳

茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

上焦主內胃爲之受食穀欲嘔者胃

不受也與吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸湯方

吳茱萸

一升洗
辛熱

人參

三兩
甘溫

生薑

六兩切
辛溫

大棗

十二枚
擘甘溫

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

右肆味以水茱升煮取貳升去滓溫服茱合日參服太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而

渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞶不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散太陽病脉陽浮陰弱爲邪在表今寸緩關浮尺弱邪氣漸傳裏則發熱汗出復惡寒者表未解也傳經之邪入裏裏不和者必嘔此不嘔但心下痞者醫下之早邪氣留於心下也如其不下者必漸不惡寒而渴太陽之邪轉屬陽明也若吐若下若發汗後小便數大便鞶者當與小承氣湯和之此不因吐下發汗後小便數大便鞶者是無滿實雖不更衣十日無所苦也候津液還入胃中小便數少大便必自出也渴欲飲水者少少與之以潤胃氣但審邪氣所在以法救之如渴不止與五苓散是也 脉陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過脈陽微者邪氣少汗出多者反損正氣少者爲適當故自和汗出多者反損正氣是汗出太過也 陽脉實因發其汗出多者亦爲太過

太過爲陽絕於裏亡津液大便因硬也陽脉實者表熱

甚也因發汗熱

乘虛蒸津液外泄致汗出太過汗出多者亡其陽陽絕於裏腸胃乾燥大便因硬也脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕陰陽不諧

胃氣獨治鬱而生熱消爍津液其陽爲絕趺陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則

小便數浮澀相搏大便則難其脾爲約麻仁丸主之

跌陽

者脾胃之脉診浮爲陽知胃氣強澀爲陰知脾爲約約者儉約之約又約束之約內經曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱水精四布五經並行是脾主爲胃行其津液者也今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱致小便數大便難與脾約丸通腸潤燥

麻仁丸方

麻子仁

二升
甘平

芍藥

半斤
酸平

枳實

半斤
苦寒

大黃

一斤去皮苦寒

厚朴

一尺炙去皮苦溫

杏仁

一升去皮尖熬別作脂甘溫

內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

右陸味爲末煉蜜爲丸桐子大飲服十九日參服漸

加以知爲度

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣

湯主之

蒸蒸者如熱熏蒸言甚熱也太陽病三日發汗不解則表邪已罷蒸蒸發熱胃熱爲甚與調胃

承氣湯傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯下胃熱

內經曰諸脹腹大皆

屬於熱在上焦則吐 吐後不解復腹脹滿
者邪熱入胃也 與調胃承氣湯下其胃熱

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞢者與小承氣湯

和之愈

吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏大煩者邪在表也 微煩者邪入裏也 小便數大便因鞢者

其脾爲約也 小承氣湯和之愈得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁

心下鞢至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之

令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便

少者雖不能食但初頭鞢後必溏未定成鞢攻之必溏

須小便利屎定鞢乃可攻之宜大承氣湯

針經曰脉軟者病將下弱

爲陰脈當責邪在裏得病二三日脉弱是日數雖淺而邪氣已入裏也 無太陽證爲表證已罷無柴胡證爲無

半表半裏之證煩躁心下鞶者邪氣內甚也胃實熱甚則不能食胃虛熱甚至四五日雖能食亦當與小承氣湯微和之至六日則熱甚與大承氣湯一升若不大便六七日小便多者爲津液內竭大便必鞶則可下之小便少者則胃中水穀不別必初鞶後溏雖不能食爲胃實以小便少則未定成鞶亦不可攻須小便利屎定鞶乃可傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便攻之

難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

內經曰諸脉者皆屬

於目傷寒六七日邪氣入裏之時目中不了了睛不和者邪熱內甚上薰於目也無表裏證大便難者裏實也身大熱者表熱也身微熱者裏熱也針經曰熱病目不明熱不已者死此目中不了了睛不和則證近危惡也須急與大承陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯氣湯下之邪熱入府外發熱汗多者熱迫津液將竭急與大承氣湯以下其府熱發汗不解腹滿痛

者急下之宜大承氣湯

發汗不解邪熱傳入府而成腹滿痛者傳之迅也是須急下之

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

腹滿不減邪氣實也經曰

大滿大實自可除下之大承氣湯下其滿實若腹滿時減非內實也則不可下金匱要畧曰腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥

陽明少陽合病必下利其脉不負者

順也負者失也互相剋賊名爲負也脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

陽明土少陽木二經合病氣不相和則必下利少陽脉不

勝陽明不負是不相剋爲順也若少陽脉勝陽明脉負者是鬼賊相剋爲正氣失也脉經曰脉滑者爲病食也又曰滑數則胃氣實下利者脉當微厥今脉滑數知胃有宿食與大承氣湯以下除之

裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數

不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜

抵當湯

七八日邪入府之時病人無表裏證但發熱雖脉浮數亦可與大承氣湯下之浮爲熱客於氣數爲熱客於血下之邪熱去而浮數之脉俱當解若下後數脉去而脉但浮則是榮血間熱併於衛氣間也當

爲邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴之證此下之後浮脉去而數不解則是衛氣間熱合於榮血間也熱氣合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若大便利者下血乃愈若六七日不大便則血不得行畜積於下爲瘀血與抵當湯以下去之若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也

下後脉數不解而不大便若是熱不得泄者血於下爲瘀血也若下後脉數不解而下利不止者爲熱得下泄迫血下行必便膿血傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

金匱要略曰黃家所起從濕得之汗出熱去則不能發黃發汗已身目爲黃者風氣去濕氣在也脾惡濕氣內著脾色外奪者身目爲黃若瘀血在裏發黃者則可下此以寒溼在裏故不可下當從寒濕法治之傷

寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿

湯主之

當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄於外內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出小便不

利小腹滿者熱氣甚於外而津液不得下行也與茵陳湯利小便退黃逐熱

傷寒身黃發熱

者梔子蘖皮湯主之

傷寒身黃胃有瘀熱當須下去之此以發熱爲熱未實與梔子蘖皮

湯解

散之

梔子蘖皮湯方

梔子二十五箇
擘苦寒

甘草一兩炙
甘平

黃蘖二兩

右參味以水四升煮取壹升半去滓分溫再服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連韶赤小豆湯主之

濕

相交民多病瘧瘧黃也傷寒爲寒濕在表發黃爲瘀熱在裏與麻黃連韶赤小豆湯除熱散濕

麻黃連韶赤小豆湯方

麻黃

二兩甘溫去節

赤小豆

一升甘平

連韶

二兩連翹根也苦寒

杏仁

四十箇甘溫去皮尖

大棗

十二枚擘甘溫

生梓白皮

一升苦寒

生薑

二兩辛溫切

甘草

二兩甘平

內經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘平以汗爲故止此之謂也又煎用涼水者亦取其水味薄則不助濕氣

右捌味以潦水壹斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥
煮取參升分溫參服半日服盡

辨少陽病脈證并治法第九

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

足少陽膽經也內經曰有病口苦者名曰膽癰

甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽爲之使少陽之脉起於目銳皆少陽受邪故口苦咽乾目眩少

陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐

下則悸而驚

少陽之脉起於目眎走於耳中其支者下胸中貫膈風傷氣風則爲熱少陽中風氣

壅而熱故耳聾目赤胷滿而煩邪在少陽爲半表半裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗

驚

發汗則讞語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

經曰
三部

俱弦者少陽受病脉細者邪漸傳裏雖頭痛發熱爲表未解以邪客少陽爲半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少陽之邪因傳入胃必發讞語當與調胃承氣湯下之胃和則愈不下則胃爲少陽木邪千之故煩而悸

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞦滿乾嘔不

能食往來寒熱尙未吐下脉沉緊者與小柴胡湯

太陽轉入

少陽是表邪入於裏脇下鞦滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脉沉緊者邪氣入府爲裏實尙未經吐下而脉沉緊爲傳裏雖深未全入府外猶未解也與小柴胡湯以和解之若已吐下

發汗溫鍼讞語柴胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法

治之少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損耗津液胃中乾燥木邪干胃必發讞語若柴胡證不

罷者則不爲逆柴胡證罷者壞病也詳其因何治之逆以法救之

三陽合病脉浮大上

關上但欲眠睡目合則汗

關脉以候少陽之氣太陽之脈浮陽明之脉大脉浮大上

關上知三陽合病膽熱則睡少陰病但欲眠睡目合則無汗以陰不得有汗但欲眠睡目合則汗知三陽合病膽有熱也

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰

故也

表爲陽裏爲陰邪在表則外有熱六七日邪氣入

裏之時外無大熱內有躁煩者表邪傳裏也故曰

陽去陰傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而

不嘔此爲三陰不受邪也

傷寒四日表邪傳裏裏不和則不能食而嘔今反能食而不嘔是邪不傳邪也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

內經曰大則邪

至小則平傷寒三日邪傳少陽脉當弦緊今脉小者邪氣微而欲已也

少陽病欲解時從

寅至辰上

內經曰陽中之少陽通於春氣寅卯辰少陽木王之時

釋音

廁

初吏切 圓溷也

瘕

音假腹

憒

古對切

憤

心亂也

怵

勑律切

惕

音踢敬

懼也

痺

丁賀切

瘻

音旦

黃病

傷寒論卷五終