

0
1cm 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



浙江圖書館



浙江圖書館

絲集

墨

丹溪心法附錄卷之六

蘇集

休寧東山古卷方



暑門

瘧六

丹溪心法

五 圖 書 館



○瘧疾有風暑食痰者瘧瘧母大法風暑當發汗夏月

多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也惡飲食者必自飲食上得之

無汗者要有汗散邪為主帶補有汗者要無汗正氣為主帶散

一日一發者受病一月間日一發者受病半年三日一發者受病

瘧疾

一年 二日連發住一日者氣血俱病 瘡病感虛者須以人參白朮
 一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外
 以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服 久瘡不得汗者二陳
 湯加檳榔倍蒼朮 一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截老
 瘡病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎

檳榔

紅花

當歸

炒石

白朮

蒼朮

甘草

白芷

右剉水煎露宿次早服

○治瘡一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘡丹截之若在陰分者

用藥制等起陽分方可截可前藥之屬

充較瘡在陰分須微起陽分者即格致論中云賊傳出至腑亂而

失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術下陷謂陽氣下

食血中無干... 柴胡之屬此

截藥常山飲

陷入陰血中無汗要有汗多用... 丹溪治瘧之微旨學者所當知也

穿山甲炮

草果

知母

檳榔

烏梅

甘草炙

常山

書

右咬咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順

加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚料又或加青皮陳皮

又方

柴胡

草果

常山

知母

貝母

檳榔

折

右用酒水同煎露一宿臨發前一時服

又治瘧母此藥消導

瘧疾

瘧疾

三

青皮

桃仁

紅花

神麩

麥芽

鱉甲

醋炙

三稜

義木

海粉

香附

並用

右為末丸如梧子大每服五七十粒白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲米水外多汗出

人參

白朮

黃芩

黃芩

黃連

山梔

川芎

蒼朮

半夏

天花粉

右以咀水二鍾姜三片煎服

又治瘧疾發渴

生棗

麥門冬

天花粉

牛膝

知母

葛根

炒栝

生甘草

右以咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿 半斤

冬瓜葉

官桂

馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大努

一分四服於當發之前一時服

又云青蒿一兩冬青葉二兩馬

鞭草二兩桂二兩未知孰是姑兩存

之以候知者

截瘡

書

檳榔

陳皮

白朮

常山 各二

茯苓

烏梅

厚朴 各一

圖

右吹咀作二服水酒各一鍾前至二鍾當發前一日一服臨發日早

一服服後少睡片時

又瘡疾後

白朮

半夏 一兩

黃連 半兩

白芍 三

陳皮 半兩

右為末搗丸梧子大每服六十九丸湯下

瘡疾

...

...

附諸醫論

心法附錄曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之解寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘡毋必用毒藥消之行氣消堅為主東垣謂寒瘡屬太陽熱瘡屬陽明風瘡屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘡此言是但二陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘡也寅申巳亥日者厥陰瘡也辰戌丑未日者太陰瘡也

附脈理

脈訣舉要曰瘡脈自弦弦邊多寒弦數多熱隨時變遷

心法附錄曰瘡脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而麻極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細察可見也

附方

黃連香薷飲 治伏暑發瘧煩渴者 見時疫

桂枝羌活湯 按粹方 治瘧疾處暑前發頭痛項強脈浮惡寒有汗者

桂枝 去節 羌活 防風 甘草 各半 兩

右為粗末每服半兩水煎始吐者加半夏麴等分

麻黃羌活湯 按粹方 治瘧疾頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃 去節 羌活 防風 甘草 各半 兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎空好吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯 按粹方 治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黃 去節 芍藥 黃芩 桂枝 二兩 桃仁 二十箇 去尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用此湯散血中

風寒也

桂枝黃芩湯 後詳方 治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三

合病也

甘草

人參

黃芩 各四

半夏 四升

柴胡 二升

石膏

知母 各五

桂枝 二升

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯 後詳方

治瘧疾寒後熱熱多寒少

桂枝 五升

石膏

知母 各一

黃芩 一升

右為末三分服每水二盞煎服間日者邪氣所合故也

○已上數方發散之劑

人參養胃湯

治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四散

飲之類截之因食倍加草果

見四時寒類

萬安散 治一切瘧疾得病之初以真氣壯進此藥以取效氣

治一切瘧疾得病之初以真氣壯進此藥以取效氣

虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮

清浸去
皮炒

厚朴

姜製

陳皮

去白

檳榔

常山

酒浸

甘草

炙各一
錢半

左咬咀水

煮半煎至一盞露二宿當發白作二服忌熱性物片時

山齋草果飲子

簡易方

快脾治疔

草果

蒼朮

清浸

厚朴

陳皮

半夏

甘草

烏梅

去核各
等分

圖

右咬咀每服半兩水一盞半姜五片棗二箇同煎七分不拘時服寒多

者加乾姜附子熟多者只加柴胡瘧瘧加檳榔

柴胡桂枝湯

活人方

治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者善治勞瘧

柴胡

四兩

桂枝

去皮

黃芩

半兩

瓜蒌根

一兩

牡蠣

煅碎

甘草

炙

乾姜

兩

瘧疾

去行餘卷之六

五

右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服

柴胡加桂湯 治入方 治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡 八兩 人參 去芦 甘草 炙 半夏 煨七 黃芩

肉桂 二兩 去皮各

右吹咀每服五錢水一盞半姜七片棗二箇煎服若渴者去半夏加人

參瓜蒌根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑 無汗可用

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少但或但熱頭疼口乾胃滿者

方見溫熱類

柴胡括萎根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡 去苗 二兩 天花粉 一兩 黃芩 去心 人參

甘草 炙 七錢

右服一兩姜五片棗二枚水二盞煎一盞去渣通口服

白虎加桂枝湯 活人方 治瘧疾及但熱不寒及有汗者

知母 六分 甘草 炙三 桂枝 官 粳米 三 石膏 一斤

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服

清脾飲 濟生方 治瘧瘵脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾

小便赤澀

青皮 去白 厚朴 姜製 白朮 **圖** 半夏 湯洗七次 黃芩

草果仁 柴胡 去苗 茯苓 去皮 甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時

參蘇飲 治發瘧熱多寒少兼咳嗽者 見傷風類

驅瘧飲 治發瘧熱多寒少者

前胡 柴胡 各四分 桂心 桔梗 厚朴

瘧疾

半夏各三 黃芪

乾姜炮

甘草各二

右剉水二盞，薑三片，棗四箇，煎

○已上數方治瘧熱多寒，少發散之劑。有汗可用。

大柴胡湯 治瘧熱多寒，少自痛，多汗，脉大。以此湯微利，為要。餘邪未

盡，以白芷石膏三物湯以盡其邪。方見溫熱

白芷石膏三物湯

白芷一尺 知母一尺 石膏四斤

右為粗末，每半兩水一盞，溫服，清

○已上三方治瘧熱多寒，少推逐調和之劑。

四獸飲簡易方 治五臟氣虛，喜怒不節，致陰陽相勝，結聚，延飲，與衛

氣相搏，發為瘧疾。

人參去苗 白朮 茯苓去皮 橘紅 草果仁

半夏湯炮 菓子 生姜 烏梅去核各 甘草 各二兩

右吹咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香熟

焙乾每服半兩水二錢煎六分未發前併進數服

七寶飲 簡易方 治一切瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧

厚朴姜製 陳皮 甘草 葶果仁 常山雞骨者

檳榔 青皮

右吹咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫

服睡少頃時須忌熱性物寒多加酒服

清肺湯 三方 治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴四兩 烏梅去核 半夏湯去 青皮 良姜各二兩

草果去皮 甘草炙半

右吹咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分未發前併三服忌

瘡疾

五

至冷油膩之物

○已上三方治瘡寒多熱少其截之劑

常山飲

和劑方

治瘡疾發散不愈漸成勞瘵

知母

川常山

草果

各三兩

良薑

甘草

烏梅

去核各一兩六錢

右吹咀每服五錢水盞姜五片薑二枚煎七分温服

六和湯

人參

知母

草果

貝母

烏梅

白芷

檳榔

柴胡

各一兩

川常山

二錢

右劉姜三片棗一枚酒水同煎露酒三四臨發前二時服

○已上三方治瘡熱多寒少其截之劑

鬼哭丹

治瘡三三日發者

常山 一斤醋浸春五夏
三日秋七冬十日
檳榔 各四兩
半夏
貝母 各二兩

右為末用鷄子清麩糊為丸如梧子大每服三十丸隔夜臨睡冷

酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸 治瘡三日一發或十日一發

姜黃 三錢 白朮 一兩半入參 檳榔 草果

義木 醋炒 厚朴 各半兩 黃芩 半夏 青皮 各二兩

甘草 三錢

右為末飯丸如梧子大每六十九丸遠白湯下日二服

紅丸子 濟生方 專治食瘡

青皮 醋炒 阿魏 醋化 蓬朮 煨 京三稜 煨

胡椒 二兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十九至百

瘡疾 卷之六

丸淡姜湯下或因食生果成瘡用麝香湯吞下

老瘡飲三四方治久瘡結成癥瘕痲痺在胃腸諸藥不愈者

蒼朮去皮 草果去皮 桔梗 青皮 陳皮

良姜各半切 白芷 枳殼 半夏湯洗 甘草炙

枳殼炒 桂心 乾姜炮 紫蘇葉 川芎各二錢

右以咀每服四錢水一盞益少許煎七分空心服

山甲湯 久瘡瘡母不治者宜服四獸飲間服此湯

川山甲 木鱉子等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

瘡甲飲子清生方 治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘡母

草果仁 鱉甲炙 白朮 白芍藥

厚朴炙 枳殼 枳實 川芎 甘草炙

右以咀每服四錢水一盞益少許煎七分空心服

右吹咀每服四錢水一鐘姜七片末二枚烏梅少許煎服

子將軍花 久瘡不瘳腹痛有瘡母

三稜一兩去毛 莪木生 青皮白 陳皮去白各 草果去壳

川常山二兩 砂仁 檳榔 烏梅 半夏湯泡七次各一兩

右先將常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後

入八味藥同浸至晚用瓦鉢內炭火煮乾取出曬如無日色用火焙

乾為末半酒半醋打糊為丸如梧桐子大每服三四十九白湯吞下

日進三服忌生冷魚腥酸油膩麪諸死毒物服四兩至八兩即除

根凡有積聚及行瘴濕地方宜服之

○已上諸方消道之劑

四將軍飲良方 治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一

時急救之方用之有驗

附子

一箇炮去皮

訶子

四箇去核

陳皮

羅合

甘草

炙四子

右吹咀為四服每服水一鐘半生薑七片棗七枚煎取一半令熟灌病者立可甦省

○廣按瘧疾發作而僵仆不省人事者蓋由頑痰老痰膠固於中榮衛不行故也所以中風中暑而卒倒不省人事者亦由痰之所致也附子性大熱走而不守本是治寒濕之藥今瘧疾發作僵仆而用之以其性大熱能開散頑痰使榮衛得行故耳乃是劫劑非正治之藥也

生薑飲

治瘧疾方

用生薑四兩和皮搗汁一碗夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰為寒熱

○廣按生薑自然汁凡中風中暑中氣嘔毒乾霍亂一應卒暴

此方在便司可用立可解散蓋生薑能開胃健脾化食火故也

○廣救生藥目然汗九中風中暑中氣和嘔毒乾霍亂一應卒暴之

與重便同用立可解散蓋生藥能開痰童便能降火故也

分利順元散 澹寮方 治体虛之人患瘧疾寒多不可用截藥者

川芎 附子 各一兩 南星 木香 五錢 另剉碎入

右除木香不見火外三味各將一干去皮生用一半炮熟合和咬咀

每服四錢棗七枚生薑十片水一鐘煎七分當發前一日及當發日

早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

一方 治久瘧

用青蒿桂枝各為末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分

互用各以生薑二兩連皮搗汁和熱酒調服以衣被蓋卧即愈

雄黃散 保命集 治久瘧不能食曾以元元欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃 一瓜蒂 赤小豆 各等分

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

瘧疾

治久瘧

吐為度

辰砂丸 宜明方治一切脾胃虛弱

信砂

甘草各一錢 殊

右為末滴水和丸勻分作四

忌熱性物

魁效餅子 和劑方治一切癰疔

領中外皆寒腰脊但痛寒熱

或痰聚胃中煩渴欲吐或先寒

熱不寒但寒不熱或一見或隔

龍腦

麝香

甘草

珠砂

右為末煉蜜搜和勻每兩作

新汲水藥化日發者未發者

熱毒者

以二錢

大豆 四十九粒

丸服發日日欲出煎桃心湯下一丸

作有時先寒後久乃作寒懷肢振頭

或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水

後熱或寒多熱少或熱多寒少或但

白或發後六七日身重宜治之

粉研各五 荷葉

菘豆

金箔

二十五

十九粒通合研為末每服一餅子以

服之間日發者頭夜服四數日發者

日夜服連日淨法晨服

一日夜服連日發凌晨服

不二散

人言一及為飛麩四及與人

右同和勻每服小半錢已煎

麩魚等物

雄硃丹

用雄黑豆四十九粒五月五日

為末入信末一錢再研勻細

桐子大衰老人如小黃豆大

下一丸不止并服黑豆圓者

一方治久瘡

大南星二好信三

百用濕茶調下再用茶盪淨忌食酒

書

以冷水浸從早至巳時去皮取乾研

如丸雄黃為衣曬乾收貯少壯人如梧

兒如绿豆大臨發時五更同煎并水

漸

新法水磨化日發者未發者

取之開日發者未發者

十一

右先將南星開孔用信三錢研為末裝入孔內兩星相對用泥固着
炭火煨存性取出研為細末用豉豆粉打糊為丸如豆大每服二
丸鹽茶日五更溫酒清下白湯亦可

一
方

人言二季 雄黃

豉豆各五季

右為細末麩糊為丸如筋頭天珠砂為衣每服一九用桃柳條各七
寸前湯盛一宿臨服日空心服面向東忌食熱物魚腥油膩十日
瘡疾良方 一 遺方 今人治瘡 疾多用常山慈石之類吞吐取涎縱使

得安脾胃不能不損不若此藥最為穩當

辰砂 光明者 阿魏 真者各

一 方 淋

右研勻和稀糊為丸如豆 凡子大每服一九空心人參湯下

○已上數方却奪之劑

灸法 濟生方 治瘧疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立效或灸第
三骨節亦可

對金飲子 和劑方 治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

厚朴 去皮浸去 薑末 相火 甘草 各二 陳皮 去白

右以咀每服四錢水一鍾姜三片棗一箇煎服一方如草果倍用入

米名草果平胃散

正氣散 後同方 治退寒瘧止胃寒進食

藿香 四兩 草果 四兩 半夏 一 陳皮 一 厚朴 一

砂仁 甘草 各一兩

右剉為散生姜東子煎溫服如瘧未至俟發日早服

草果飲 和劑方 治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

瘧疾

紫蘇 草果仁 良姜炒 川芎 青皮

甘草炙 陳皮去白 白芷各等分

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

○已上數方治瘧初愈理脾進食之劑

○廣按瘧疾之源蓋由暑月中表氣虛而致中氣虛則水穀停聚

為痰飲於胃脇矣表氣虛則風暑入內而使血液稽留於經絡矣

久則痰飲血液拂鬱稠粘膠固痞塞不通人之榮衛晝行陽分二

十五度春與背也夜行陽分二十五度曾與腹也榮衛行到病所

不通乃作寒戰股振頭額中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也

寒戰俱已內外皆熱心頭痛如被渴欲飲水煩滿欲吐自汗此邪火

發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開鬱散痰

為主用人參養由湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或

獨熱而無寒或汗者宜清熱補虛為主用白虎加桂枝湯小柴

為主用人參養血
白湯草果飲十之類以發散之或執多而寒少之

獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虛
胡湯之類以發散之用發散之藥三
之類以截之或瘧久在陰分亦須用
也
五服後則用四獸飲六和湯
藥徹起陽分然後截之可

瘧疾治例 出明醫雜著

書

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發
間一日連二日發有日與夜各發有有
半日發有發於夜者治法邪從外入宜
又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新
者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃
必延綿不休

主方

柴胡 去苗 白朮 各一 蒼朮 并浸

已上三味瘧疾必用之

瘧疾

陳皮七分 甘草炙五分 乾葛一錢二分

若一日一發及午前發者邪在陽分加 桔黃各疾苓半夏各一錢 蘇甚

頭痛再加川芎軟石膏各一錢 口渴加石膏知母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後發或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥

酒洗紅花酒炒黃蘗各四分 提起陽分可

截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加入參黃芪白茯苓

以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃各一錢 以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以飲之無汗柴胡蒼朮白朮黃蘗

葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃黃蘗以飲之

大川芎紅花升麻以發之故曰有汗者

有汗散邪為主

有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參一兩半

酒炒芍藥大麥芽各一錢

官

若傷食在腹或有食積者加神曲麥芽枳實炒各二錢炒黃連五分

若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢黃芩黃連各六分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢烏梅淨肉三箇肥者

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子

合四物湯加柴胡黃芩黃耆陳皮以滋補氣血

痢十九

浙

丹溪心法

痢症

二日

○痢赤屬血 白屬氣 有身熱 後重 腹痛 下血 身熱挾外
感小柴胡湯去人參 後重積與氣墜下之故兼升兼消冥木香救柳
丸之類不愈者用秦艽皂角子煨大黃當歸知母桃仁黃連枳殼若天腸風
盛可作丸服 保和丸亦治因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛
故也 後重窘迫者當和氣木香枳殼 昨必痛者肺金之氣鬱在大腸
之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦扁以開之然後用治痢藥氣用
氣藥血用藥藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥姜桂之屬
下血四物為主 下血多主食積與熱或用朴硝者 青六九治血
痢效 痢疾初得一二日間以利為法切不可用止澁之劑若實
者調胃承氣大小承氣三一承氣下之有執 先退熱然後看其氣病血
病加減用藥不可使用參朮然氣虛者可用四日虛者亦用之 血痢久不愈
者屬陰虛四物湯為主涼血和血當歸桃仁之屬 下痢久不止發

執者屬陰虛用藥涼藥必兼升散藥性併動藥 下痢久不止發

者屬陰虛四物湯為主涼血和血當歸歸地仁之屬下痢久不止發

熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥併熱藥 下痢大孔屬者因熱流

於下也以枳榔木香黃連黃芩炒乾姜 禁口痢者薑月日熱甚故也大

虛大熱用香連九連肉各一半共為末棗湯調下又方人參二分姜炒

黃連一分為末濃煎終日細細呷之如吐則再服但一呷下咽便開人

不知此多用溫熱藥其末以火濟火以滯益滯 封臍引熱下行用

田螺肉搗碎入麝香少許食臍內 下痢不治之証下如魚腦者半死

半生下如屋腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下如竹筒注者

不治 赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆濕熱為本赤白帶濁同

法 下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝主木故也有濕傷血宜

行濕清熱 內經所謂身熱則死寒則生此言大槩言必無証詳之方

可今豈無身熱而生寒而死者 脉沉少留連或微者身必深寒大數者

難治也脉宜滑大不宜弦急 仲景治痢五法可下者宜法或

痢疾

卷之八

十五

解表或利小便或待其自已還分易治難治不治之証至為詳密但與瀉同立論不分學者當辨之 大孔痛 曰溫之一曰清之按久病身冷脉沉小者宜溫宜補暴病身熱脉浮洪者宜清有可吐者亦有可汗可下者 初得之時元氣未虛必難蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下也實初病宜下虛弱衰老久病宜升之 先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此取胃得脾微邪易愈 下痢如豆汁者濕也蓋脾胃為水穀之海無物不受當兼四臟故五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹 又有時疫作痢一方一家之內上下傳染相似却宜明運氣之勝復以治之

戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通依濕熱治但分新舊更宜元氣用藥視赤白帶同

又方

黃連

滑石

甘草

白芍

桑葉

白朮

當歸

青皮

條桑

右剉水煎裏急後重炒黃連滑石加杏仁橫節甚者大黃聖者用藥

汁半夏

書

又方

乾姜一錢

當歸二錢

烏梅三箇

栝一錢半

黃連

右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼

又方 治熱與血

大黃

黃連

黃芩

黃栝

枳殼

當歸

芍藥

滑石

桃仁

甘草

白朮等分

心法附錄卷之三

十七

右為末或湯調或作丸用麩糊或神麩糊丸服 一本云誤服藥

治白痢

蒼朮

白朮

杜仲

茯苓

地榆

甘草

右劉水煎

治赤痢

地黃

芍藥

栝瀉

地榆

白朮

右劉水煎 腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香按即有熱加黃芩

山梔

又治痢方

滑石 二兩

蒼朮 半兩

川芎 三錢

桃仁

芍藥 半兩

圖

書

館

浙

甘草一錢

右為末姜一片搗細煎滾服

又方 孫部中飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮

白朮

厚朴

茯苓

滑石

右以咀水煎下促和丸

又云如炒薤白草

又方

蒼朮

酒板

白芍各二兩

酒栝 各半兩

右為末粥充以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方 痢後腰痛兩脚無力

陳皮

半夏

白芍各一錢

茯苓

蒼朮

當歸

酒芍各半錢 白朮

甘草各一錢

右以咀作一服姜煎食前服

去付餘卷之二

七

八

又方治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮 白朮 黃芩 滑石 白芍

茯苓 甘草 陳皮 神麩

右咬咀水煎下保和丸

一老年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作瀉下血淡膿水腹

痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石茯苓即木香蒼朮為佐下

保和丸二十五丸第二日前証俱減獨小便不利以益元散與之安

滑石十法

其或惡寒發熱身首俱痛此為表証宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮為

藥甘草生薑三片煎 其或腹痛後重小便短下積此為裏証宜和中

疏氣用炒枳殼製厚朴為藥陳皮滑石甘草煎 其或下墜異常積中

有紫黑血而又痛甚此為死血証法當用糯米桃仁滑石行之或口渴

及大便口燥燥是久積熱加此 或口不渴身不熱善熱手肘陽是名

有紫黑血而又痛甚此為死血証法當用糯米桃仁滑石行之或口渴

及大便口燥辣是名挾熱加止 須或口不渴身不熱喜熱手熨腸是名

挾寒加乾姜 其或下墜在 一活之後此氣滯証宜於煎藥加枳榔一

枚 其或在下則纏住在上 以嘔食此為毒積未化胃氣未平証當認

其寒則溫之熱則清之虛則 以參朮補之毒解積下食自進 其或刀

倦自覺氣少惡食此為挾虛 宜加白朮當歸身尾甚者加入參又十

分重者止用此一條如陳皮 之虛回而利自正 其或氣行血和積

少但虛坐努責此為無血証 信用當歸身尾却以坐芍藥生辛生桃仁

佐之復以陳皮和之血生自 其或纏墜退戒十之七八穢積已尽

糟粕未實當炒芍藥炒白朮 炙甘草陳皮茯苓煎湯下回腸丸三十粒

然回腸丸性燥恐尚有滯氣 未盡行者但當單飲此湯回腸丸未宜處

用蓋回腸丸有去濕實腸之功 其或利後糟粕未實或食粥稍多或

驚甚方食腹中作痛切不可 驚恐當以陳皮白朮各半煎湯和之自安

痼疾

...

...

...

...

其或久痢後體虛氣弱滑下不止又當以蔡澁之可用訶子皮肉豆
蔻白朮半夏等者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐大澁亦能作
痛又甚者灸天樞氣海 右前方用厚朴專瀉滯凝之氣然厚朴性天
溫而散氣久服大能虛人需氣稍行即去之餘滯未盡則用炒枳殼陳
皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只
用陳皮以和衆藥然陳皮土白有補瀉之善若為參朮之佐亦絕作補
藥用 凡痢疾腸痛必以公芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加
桂惡熱者加黃柏達者又能參以歲氣時令用藥則萬全豈在
乎執方而已哉

附經理

淋

脈法要曰清則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰無積不痢

麻宜滑大浮弦急死脈細無害

附諸方

五苓散 治伏熱下痢分利陰陽

見溫劑

黃連香薷飲

治感暑下痢鮮血

館

清暑益氣湯

治暑病內傷下痢不思飲食發熱

六合湯

治伏熱煩悶或成痢疾

書

○已上數方治因暑下痢之劑

敗毒散加石蓮肉

治下痢熱毒不運飲食

倉廩方

仁有方

治下痢赤白或因先受寒邪中臟腑致發熱者敗毒散

加陳米姜棗同煎

俱見傷風

防風芍藥湯

治泄痢殮滯身熱腹痛而渴及頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩各一兩

石艾咀每服

一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

新方

○已上數方治痢疾身熱者之類

香連丸 和劑方 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連 去芦二十兩用吳茱萸十兩 木香 四兩八錢不見水

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心水飲下

導氣湯 和劑方 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥一兩 當歸一兩 天黃圖 牛黃 黃芩二錢

木香 檳榔各一錢

右噉咀每一兩水二鍾煎至七分溫服食前

木香枳殼丸 聖惠方 治痢疾裏急後重黃關胸膈進飲食破滯氣散內

熱

木香 檳榔 陳皮 黃連 蓬朮 煨

當歸 枳殼 青皮 各五錢 香附 子 去毛 黃柏 各一兩

黑牽牛 頭末

右為末水丸如梧 桐子大每服五十九或七十九姜湯下 如腫毒

加服至二百丸利 五七行立消 **館**

戴人木香換柳丸 治証同前

木香 枳殼 共蓮 黃栢 大黃 各半兩 丑末

香附 各二兩 枳殼 共蓮 黃栢 大黃 各半兩 丑末

香附 各二兩

右為末水丸梧 子大每五六十九煎水下 量虛實與之紺珠多三稜

黃芩當歸分兩 同 見曲

保和丸 治脾虛因 積作後重者不可不用此消導 方見積聚

和中丸 目前 方 丸調補脾胃

○已上數 乃石痢疾後重者之劑

黃連阿膠丸 和劑方以 令熱不調下痢赤白裏急後重脘腹疼痛口燥

煩渴小便不利

阿膠炒二兩 黃連去蘆三 茯苓去皮三

石黃連茯苓為末 水熬阿膠膏和丸如梧子大每三十丸米飲下

當歸丸 濟生方 注冷 田腸胃下痢純白腹痛不止

當歸 芍藥 附子 白朮 乾姜

厚朴 阿膠炒粉炒 烏梅肉二兩

右為末 醋糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

蒼朮不芍藥湯 板料 治痢疾痛甚者

蒼朮二兩 芍藥一兩 黃芩 官桂各五錢

右吹咀每一兩水 一鍾煎至一鍾溫服

四味阿膠丸 仁存方 挾熱下痢色黃有膿多渴臍腹疼痛小便

因未何... 扶... 下... 色... 黃... 多... 腹... 痛... 小... 便...

黃連 二兩 茯苓 去皮 二兩 赤芍藥 三兩 阿膠 蛤粉炒 一兩

右為末 醋糊丸 梧子大 每服五十丸 米飲下

當歸 導氣湯 此方治膿血痢 無度 腹中痛

當歸 芍藥 各一兩 甘草 一兩 半 厚皮 七錢 槐花 七分

生地黄 此方 二兩 右吹咀水 二鐘 煎至一鐘 去滓 溫服 食前

三分澤瀉 錢如小便利 去澤瀉 此後重加木香 換御末 各

○已 上數方治痢疾 腹痛者之劑

烏梅丸 治熱 留腸胃 臍腹 疴痛 下痢 純血 或服熱藥 過多 塞于內

滲成血痢 生方

烏梅肉 二兩 黃連 三兩 當歸 枳殼 去穢 炒 各二兩

右為末 醋糊丸 梧子大 每服七十九空 米飲下

痢疾 二

茜根丸 濟生方 治一切毒痢及盤注下血如雞肝心煩腹痛

茜根 洗

川升麻

犀角 碎

地榆 洗

當歸 去芦洗

黃連 去頭

枳殼 去穢炒

白芍藥 各等分

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十九空心米飲下

槐花散 治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮

槐花

荆芥 穗 各等分

右為末水煎空心熱服

地榆散 百一理 治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢暑痢

地榆

赤芍藥

黃連

青皮 去白

右等分為末每服二錢漿水調如無只以新水亦得若血痢水煎

地榆散 治下 遠年不瘥及血痢

地榆

卷指 等分

右以咀用水沙瓶煮數十沸通口服

右吹咀用水沙瓶煮數十沸通口服

藥皮湯 經驗方 治傷寒下痢亦治久血熱痢

藥皮 三兩 黃芩 二兩 黃連 一兩

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛加山梔子小

便不利加赤茯苓阿膠煎服

椿皮丸 想驗方 治下痢清血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少為末米醋糊丸如梧桐子大空心米飲下三

四十九

四物湯 保命集 治下痢純血

川芎 當歸 白芍 生朮 槐花

黃連 御米殼 等分

右剉水煎服

刺疾

苦參丸 治血痢

用苦參不以多少炒焦為末滴水丸如梧子大每服五十九米飲下

治痢血方

昔曹魯公痢血百餘日國醫無能療者陳應之取鹽水梅除核研一

枚合臘茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相在蕭梁公亦痢血應之

曰此挾水穀當用三物散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉竈

心土等分為末臘茶清調下食前服

治下痢純血 經檢方

黃柏 條炙令香黃色一兩

一右為末每服三錢空心溫漿水調下

一方 治血痢

用地錦草不以多少晒乾碾為細末每服二錢空心米飲調下

一方 治腸風血痢

用鯽魚一以固破開去腸膽臘白礬二錢燒灰存性為末米飲調服

○以上數方治痢疾下血者之劑

地榆散

治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白少

或下鮮血果急後重小便不利

地榆炒

乾葛

各半斤 乾姜 二兩

當歸 三兩

茯苓 去皮

赤芍藥

甘草

各四兩

罌粟殼

蜜炒

右為末每服一錢用溫熱水調下不拘時服若下痢純白及紫黑血

并腸滑不禁者不可服之

地榆芍藥湯

治泄痢膿血乃至脫肛

芍藥

地榆

各二兩

芍藥

各三兩

右以咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口服

痢疾

五運書卷之六

七五二

阿膠湯 按考 治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連 炒二兩 梔子 五錢 阿膠 始炒 黃蘗 去皮去

右以咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服食前

大黃湯 按考 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈

者用此微利

大黃 一兩

右用好酒二鍾浸半日煎至一鍾去大苦只將酒分二服如未止再服

以利為度復服芍藥湯和之痢止再服芍藥黃芩湯以微其毒也

芍藥湯 按考 下血調氣洩而使膿血知止行而血止行血則便自愈

調氣則後重除

芍藥 二兩 當歸 黃連 黃芩 各半兩 肉桂 二錢半

按榔 大黃 各三錢 甘草 炙 木香 各二錢

右以咀每服半兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服如痢不減漸加大黃

右父咀每服半兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服如痢不減漸加大黃
如汗後臟毒加黃柏半兩

芍藥黃芩湯抄粹方治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪疾者及下

痢膿血稠粘

黃芩

芍藥各一

甘草各半兩

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣通口服食前

芍藥皮丸抄粹方治便膿血

圖

芍藥

黃蘗皮等分

右為末醋糊丸如梧桐子大米欬送下

專治赤痢秘方

黃連二兩

木香

甘草各二兩

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前先一日服五苓散三點次

痢疾

芍藥皮丸

二五〇

日早服此藥即止如神

又方

用連白青韭一大握多要取汁和煮酒一盞溫飲之極驗又治婦人

心痛有效散氣行血故也

解毒金花散經驗方治下痢膿血熱毒

黃芩

白朮

赤茯苓

赤芍藥各半黃連

黃蘗各一兩

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前如腹痛加枳子

仁二枚同煎

一方 治熱痢不止

用車前葉搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服

黃連烏梅丸聖惠方治濕熱痢不瘥

黃連烏梅丸 聖惠方治口燥熱刺不瘥

高梅丸 黃連 各四兩

右烏梅煨蜜丸梧子大每服二十丸米飲下食煎

芍藥藥皮丸 子方治一切濕熱西 兩頓併瘥痛無問膿血

芍藥 黃蘗 各一兩 當歸 黃連 各半兩

右烏梅水丸小豆大溫水下三四丸等服忌油膩生冷一切熱物

○已上數方治濕熱傷血赤痢之劑

戊巳丸 和劑方 治脾經受濕泄痢不 固米穀不化臍腹刺痛

黃連 去鬚 吳茱萸 去核 白芍藥 各三兩

右為末麩糊丸梧子大每三十九丸飲空心下日三服

升陽除濕防風湯 按游方 如大便閉 裏急後重致至 固而不能便或

少有白膿或少有血慎勿利之升其陽則陰氣自降矣

蒼朮 四兩米 防風 三錢 白朮 蒼朮 一錢 白芍藥 一錢

治水治 痢疾

右以咀每服一兩除蒼朮另作片子木一碗半煮至二盞納諸藥同

煎至一盞去滓稍熱空心食前服

升陽益胃湯 治脾虛濕勝陽氣下陷 伏瀉 見內傷類

胃風湯 治風入腸胃作痢或白或赤或三之汗 見胃風類

錢氏白朮散 治氣血俱虛神弱之人或治 或痢或吐

人參 白茯苓 白朮 不香 甘草

藿香 各一兩 乾姜 辛兩

右為粗末每服三錢水一鍾煎七分食前 服

一方 治白痢

酸石榴皮 半箇 草果 一箇 陳皮 三片 烏梅 一箇 甘草 一寸

乾姜 一塊

右以咀都作一服水二鍾煎至一鍾去滓 食前溫服

一方 山藥 炒 大豆 大一 半 五 豆 炒 熟 一 半 生 用 為 細 末 米 飲 調 下

左吹咀都依一服水二鐘煎至一鐘去滓入水煎溫服

一方 山藥剉如豆大一半瓦罈炒熟一半生用為細米飲調下

○已上數方治濕熱傷氣白痢之劑

噤口痢

石蓮肉 日乾

館

右為米每服二錢陳倉米調下便覺思食仍以日照東方壁土炒真橘皮為末姜煎零煎佐之

一方 治噤口痢

圖

用黃連半斤吹咀生姜四兩以作片與黃連同炒待姜焦黃色去姜只取黃連為細末同陳米飯一處搗爛丸如梧桐子大每服七八十丸赤者陳米飲下白者陳皮湯下赤白相參者陳米橘皮湯下

一方 用獨子肥皂一枚去核用鹽實其內火燒存性為細末先煮白米粥用少許入在粥內食之立効

痢疾

卷之六

二六

一方 梨一枚去心入好蜜 匙煨過食之

○已上數方治寒 痢之劑

麩筋丸 治食積作痢

川芎

神麩

白朮

附子 炮等分

右為細末麩糊丸梧子大每服三五十九温米飲下此藥亦治殘泄

○廣按此治冷飲食作痢熱則開散之理

木香丸 治痢疾

木香 三錢

豆豉 一兩

巴豆 四十九粒

去殼對等 研

右為末豆豉為丸蒸 每天每服三九紅法利甘草湯下白痢乾姜湯下

木香不二丸 治痢疾 或赤或白或赤白六九雜

木香 不見火

肉豆

寇 柯子

煨過取

巴豆

一兩去殼 池另研

淡豆豉末

一錢半

一 半入

右為末淡豆豉末不同麩打糊為丸如黃豆大小兒如黃豆大且厚六小

右為米淡豆豉末同麵打糊為丸如黃豆大小兒如菜豆大且大小
虛實每服只許一丸切忌服二丸食前或臨臥冷湯下亦剉地榆湯
下白痢乾姜湯下赤白交雜耳草湯下服此藥後多行二三次即住
○廣按此二方用巴豆即通因通用之理然於傷冷飲食暴痢用之
庶乎可也殊不知痢本因水穀停積濕而生熱濕熱為病但有傷
氣傷血為白為赤之分餘無寒冷之義經曰苦寒除濕熱用大黃
以推蕩乃是正治也

聖餅子 治積滯作痢

黃丹二錢 定粉三錢 密佗僧二錢 船上硫黃二錢 輕粉少許

右為細末入白麵四錢滴水和為丸指尖大拾作餅子陰乾食前漿
水磨化服之大便黑色為妙

蘇感丸 治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟大每五丸淡姜湯空心下

蘇合香丸

見中風

感應丸

見傷食

○已上數方治積滯作痢之劑

治赤白痢

吳茱萸

揀淨

黃連

去須各等分

左為一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾為末糊丸如梧桐子
大赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下白痢用茱萸丸三十粒乾姜湯
下赤白痢各用十五粒相合併甘草乾姜湯下

聖藥丸 劑方治一切下痢無問冷熱

阿膠

搗碎粉以知母子為末以醋四合熬成膏一兩半

黃連

去須二兩

當歸

去芦一兩半

乾姜

炮一兩

右為末以阿膠膏丸如梧桐子每服二十九食前米飲下

阿膠梅連丸

宣明方治下痢血閉久新赤白青黑寒痛諸証

全升阿膠明白

赤茯苓

烏梅肉去核

赤芍藥

黃柏制炒

黃連去頂

乾姜炮

當歸焙各葉

右為細末入阿膠研

勻水丸棗子大濕米飲下十九食前連夜五六

服小兒丸如菘豆大

忌油膩脂肥諸物

三味黃九子煎方寸

諸痢

黃連八兩

枳殼

黃柏四兩

右為細末麴糊為丸

梧子大空心每服下二三十丸如裏急後重加

枳殼湯下

香連丸 治一切痢

黃連五兩

枳殼制

粉渣

木香研碎

不見火

右先將草連用蜜水

畧泮濕安在鉢中重湯薰之良久取出晒乾再

依工法薰之得空

九燥九炒再晒十分乾與木香一處為末水煎

痢疾

力梧子大每服三九食前酒下或米飲下

又方 治一切痢

黃連 一兩

甘草 各一兩

烏梅 各半兩

右咬咀每半兩水煎空心服忌魚豬肉油生冷菓子

遇仙立效散

治諸惡痢或赤或白或膿液相雜裏急後重臍腹結滯

或下五色或如魚目日夜無度或口噤不食不問大人小兒虛弱老

人產婦並宜服之

嬰粟殼

去蒂

當歸 各一兩

甘草

赤芍藥

酸石榴皮

地榆 各一兩

右咬咀每服水二鍾半煎空心溫服忌生冷油膩之物

神效參香散

治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下

鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急

後重日夜頻無間新久並能治之

後重日夜頻無節新久並能治之

白扁豆炒

人參去芦

木香各二兩

茯苓去皮

肉豆蔻

每各四兩

陳皮去白

罌粟殼去罌名

官

右為末每服三大錢用溫米飲下不拘時服

水黃大香丸和劑方治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼去穢二兩八錢

白皮去白二兩四錢

甘草炙二兩

當歸去芦

訶子

煨去核

木香

不見火

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九水一鐘煎化至六分空心或食

前服

真人養臟湯和劑方治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦

藶裏急後重臍腹痠痛如脫肛墜下酒毒便血並治之

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙

人參去芦

當歸去芦

四生丸

痢疾

八法行論卷之六

五

四生丸

訶子去核一兩 木香三兩四錢 肉豆蔻百裏煨半兩

白芍藥一兩 甘草一兩八錢 官

左咬咀每服四錢水一鍾煎服臍寒者加附子

一方 治一切痢

罌粟殼蜜制 黃蘗炙 乾姜 當歸 枳殼去白

甘草炙各

右用薤白十數根水二鍾煎不拘時服

固腸湯三方 治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼去蒂蓋三兩醋炙

白芍藥各二兩 當歸 甘草各一兩

陳皮 訶子 白姜各一兩 人參 木香各三錢

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

三豆蔻固腸丸舊藥方 治脾胃虛弱臍臍痛下痢赤白

木香

赤石脂

乾姜

枳殼

厚朴

木香

赤石脂

乾姜

續砂

厚朴

肉豆蔻

藥最燥
各三兩

右為末 麴糊丸梧子大每

服五十丸 空心米飲下

勝金丹

秘方

乾姜

黃蠟

等分

右銀石器化蠟入姜末勻

丸如芥子大每服七丸或三九白痢酒

下赤并花水下

又方

烏梅

白梅

陳皮
各七兩

右件去梅核搗碎爛同

乳香末少許丸梧子大以茶末為衣每服

二十丸茶湯下食煎

石榴皮散

經方治暴瀉

不止及痔瘡白

痢疾

江圖書館

用酸石榴皮燒存性下不多少空心米飲調下二錢

一方 治白瘰癧

用白石脂需米醋糊丸

小豆大每服十九空心米飲送下日三服

秘方痢疾方

粟穀去穢宜陳皮

甘草炙五錢

乳香

沒藥各二錢

右吹咀水二鍾煎至一鍾

去滓入酒沒食前服如白痢熱服紅痢冷

服如痢不止加青皮四水煎

白朮安胃散按秘方治一切

痢無問膿血相雜裏急瘕痛日夜無

度又治男子小腸氣痛婦人臍下虛冷并產後兒枕塊痛亦治產後

虛弱寒熱不止

茯苓去皮

白朮

車前子各一

五味子

烏梅各半兩

嬰粟穀各一

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

朴連湯經方治下痢久不瘥

厚朴姜製 黃連等分

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

神効丸一名當歸丸治休心痢膿血不止疼痛困弱

當歸 烏梅肉 黃連等分

右為細末以生蒜汁和為丸每服二十九粒空煎

厚朴湯下加至五十九粒方加阿膠一方煉蜜丸甚者鎔鐵丸

一方 止休息痢

縮砂為末空心米飲下一錢

木香散本事方治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香 黃連各半 甘草一兩 罌粟殼 生姜各半

同炒

右為夫人壽香少許每服二錢米飲下

固腸丸 見婦人帶下類 可搗成丸

白朮黃耆湯 按粹方 服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮 一兩 黃耆 七錢 甘草 三錢

右咬咀每服一兩水二鍾前一鍾去滓通口服食前

白朮黃耆湯 按粹方 服前藥痢疾雖除更宜服此補養

白朮 一兩 黃耆 七錢 甘草 三錢

右咬咀每服一兩水二鍾前一鍾去滓通口服食前

機要白朮芍藥湯 服藥痢疾雖除宜用此補脾胃又治老人奉養

過飲食傷脾時或瀉痢

白朮 各一兩 其芍藥補脾炒用治後用腹滿炒用酒浸炒尤妙

甘草 炙半兩

小承氣湯

大承氣湯

俱見傷寒

三一承氣湯

見溫病

玄音丸

宣明方

治下痢勢急頻併塞痛或久愈諸藥不能止頃可下之

以開除濕熱痞悶積滯而使氣液運行者宜以此逐之兼宣利積熱

酒食積黃瘦中滿水腫腹脹瘰癧元氣虧損積熱乳癰諸証泄瀉勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

大戟

各五錢

牽牛

四兩取末二兩

青黛

一兩

輕粉

一錢

右為末水丸小豆大初服十九每服十九空日午臨臥各一服

以利為度後常服十五二十九數以後得食以病未全除者再加取

利利後却常服以意消息病除為度

○已上數方通用之

○廣按痢疾所因有二或因其月煩渴飲食瓜豆不生冷肉傷腸胃

○廣按痢疾所因有二或因暑月煩渴縱食瓜果不生冷肉傷腸胃成
因夜卧失被早起入水寒濕外襲肚腹二者以冷飲水穀不化鬱而
生熱則為濕熱濕熱傷氣則成白痢濕熱傷血則成赤痢氣血俱
傷則成赤白痢其証肚腹疼痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血
或下白膿或赤白相雜或如豆汁或如魚腦或如屋溜水稟急後
重頻欲登廁日夜無度不可遽用罌粟殼醋骨肉豆寇調子赤石
脂葶收澁病邪則淹纏而不已也其法痢疾初得一二日間元氣
未虛以推逐為美失之於初五日以後脾胃已虛以消導為散為
佳所用之藥不過辛苦寒涼之劑以開除濕熱鬱積行氣和血使
氣血宣行而已病久極虛又當以滋補氣血收澁滑脫甘溫辛熱
之藥兼之則萬舉萬全而無一失也矣 又嘗論之濕熱傷氣成
白痢者宜調氣理濕為主而兼清熱濕熱傷血成赤痢者宜涼血

清熱為主而兼理濕至於氣血俱傷成赤白痢者則相兼而治觀
丹溪節齋之用藥可見矣

痢疾治例

出明醫雜著

館

王節齋曰痢是濕熱食積三者別赤白青黃黑五色以屬五臟白者
濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黃者食積治法
瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下之下
後未愈隨証調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與
寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩

炒二
分半

黃連

炒一
錢半

白芍藥

炒二
分

已上

三味

痢疾必用之藥

木香

枳殼

炒各一
分半

檳榔

炙甘草

三分

若腹痛加當歸

一分半

縮砂

一分

再加木香芍藥

各五分

若後重加滑石一分 若再加枳殼檳榔 若再加木香芍藥

若後重加滑石各一錢再加枳殼各三錢枳殼用再煎

黃芩條實者亦加五分

若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一錢初欲下之再加大黃五錢

兼食積加山楂子枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢初欲下之再加大黃五錢

若紅白相雜加當歸川芎桃仁各一錢以理血滑石陳皮各一錢以

理氣有食積亦如山楂枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減芍藥各七錢加白朮一錢

黃耆茯苓陳皮各一錢縮砂五分去換柳枳殼再加八錢姜五分

若紅痢入胃弱血虛或下後未愈減芍藥各五錢加當歸川芎熟地黃

阿膠珠陳皮各一錢白朮一錢

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澀短少加木通五錢瀉茯苓各一錢

痢疾

三十四

山梳子 炒五分以分利之

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各一錢

久不愈成茶連

分去檳榔枳殼再加阿膠珠炒側柏葉

各一錢以黑乾姜一錢白朮

一錢半陳皮一錢

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用條實黃芩加升

麻一錢以升提之

圖

若嘔吐食不得下加軟石膏一錢半陳皮一錢山梳子五分入生姜

汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者用四物湯加入參白朮陳皮黃連黃芩阿膠

之類以補之而痢自止

有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮砂厚朴肉桂之

類

若得痢而誤服瀉劑止瀉之藥則難久亦宜用前法以下之

若得痢而誤服溫熱止澁之藥，則積久亦宜用前法以下之。後方調之。

若得痢使用前正法下之而未愈，又用前調理法治之而久不愈，此屬虛寒而滑脫，可於前虛補寒一條擇用更加龍骨、赤石脂、罌粟殼、烏梅肉等收澁之藥。

浙江圖書館

卷之七

三十三

浙江圖書館

Vertical columns of faded text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and ghosting.

丹溪心法附錄卷之七

休寧東山古菴方廣約之類集

濕門

痞二十

圖書館

丹溪心法

○痞者有食積兼濕 東垣有法有方 心下痞須用枳實炒黃連

如稟受兒實面蒼骨露氣實之人而心下痞者宜枳實黃連青皮陳皮

枳殼 如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白朮山查麩

藥陳皮 如肥人心下痞者乃是實痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石

如瘦人心下痞者乃是鬱熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻 如食後
感寒飲食不化心下痞宜藿香薷草薤吳茱萸砂仁 痞挾血成窠囊
用桃仁紅花香附大黃之類

入方

吳茱萸

三兩湯浸
黃少時

黃連

八兩

粥糊為丸每服五七十九白木陳皮湯下

玉液丸

軟石膏

不拘多少 又云火煨紅出火毒

右為末醋糊丸如菽豆大服之專能瀉胃火併治食積 痰火

附脈理

脈訣舉要白曾痞脈滑為有痰結弦伏亦痞瀉則氣劣

附諸方

治痞消食強胃

枳實丸 論

治痞消食強胃

枳實

二種 炒 色一兩

白朮

去 二兩

右同為

細末 荷葉 暴燒 飯為丸 如梧桐子大 每服五十九 多用白湯

下無時

曰 木者本意不取其食 使化但令人胃氣強 不復傷也

橘皮枳木

丸 脾胃論

治老幼元氣虛弱 飲食不消 臟腑不調 心下痞悶

枳實

炒 云 攘

橘皮

一兩 上 名

白朮

二兩

右件為

細末 荷葉 燒飯為丸 如梧桐子大 每服五十九 溫水送下 食

遠夫內

陽用藥之大法 所貴服之強人胃氣 令胃氣益厚 雖猛食多

一食重食

而不傷 此能用食藥者也 此藥久久益胃氣 令不復致傷也

○廣按

上古用一藥治一病 至漢張仲景先生用群藥治一病 雖然

用群

藥治一病 亦不通三五味而已 其間君臣佐使分兩不同 主

治引

經秩然有序 非若後世之效驗者 一方用至二三十味 尤未

已也丹溪云予每效仲景立方效東垣用藥處乎品味少而藥力
專精也此枳朮丸乃易老張先生之所依觀其用白朮二兩以補
脾用枳實一兩以消痞至東垣李先生加陳皮一兩以和胃一補
一消簡而又當宜得立方之指趣也

橘連枳朮丸 白朮方 補脾和胃瀉火消痰

白朮 三兩 去陳 枳實 一兩 去 陳皮 一兩 黃連 一兩 酒

一右為末荷葉煮湯打米糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後服

○廣按易老張先生定枳朮丸方用白朮二兩以補脾枳實一兩以

消痞取其補多而消少至東垣先生加橘皮一兩以和胃各橘皮

枳朮丸則補消相半也予今用白朮三兩枳實一兩陳皮一兩黃

連一兩名橘連枳朮丸仍補多消少又兼清熱也丹溪云心下痞

須用枳實炒黃連是矣

平補枳朮丸 古方調中補氣血消痞清熱

平補枳朮丸 古處方 調中補氣血消痞清熱

白朮 三兩

白芍藥 一兩半

酒浸炒

陳皮

枳實 各半

黃連 各一兩

酒浸炒

人參

木香 各半

兩

右為細末荷葉煮鹽湯打米糊為丸如梧桐子大每五十丸漸加至六七十丸食遠米兩下

○廣按此方用白朮三兩以補脾氣為君用白芍藥一兩五錢以補

脾血為臣用陳皮兩以和胃枳實兩以消痞炒黃連兩以清熱為

佐用人參半兩以補元氣木香半兩以調諸氣為使如此平補氣

血均去痰火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣

枳實消痞丸 治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實

黃連 各五

乾生薑 二

半夏麴 三

厚朴 四

人參 三

甘草 二

白朮 三

茯苓

麥芽 各二

痞悶

公...

三

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大三十五丸温水下

消痞丸 按辨方治一切心下痞悶及積年久不愈

黃連炒六 神麴炒五 黃芩制黃色六 姜黃六 白朮略一

人參和四 甘草炙二 縮砂仁三 橘皮和四 乾生姜二

枳實炒黃五 猪苓二 一方加澤瀉厚朴各三 半夏湯泡七

右為細末湯浸餅為丸如梧子大每服五七十九至百丸白湯下

黃連消痞丸 按辨方同前

黃連炒一 黃芩炒三 枳實二兩 乾生姜三 茯苓五

白朮焙五 甘草炙五 片姜黃一 陳皮半錢 澤瀉錢一

半夏洗一兩 猪苓二 砂仁三錢 厚朴製五

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸温白湯送下

瓜蒌實丸 治胸痞痛微苦 急妨胸

瓜蒌實別研枳殼去穢

炒

半夏湯洗

八

桔梗炒

一兩

右為末姜汁打糊為丸如梧桐子大每服五十九食後淡姜湯下

○廣按此方瓜蒌仁潤肺降痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥濕桔梗開

膈乾藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動加黃連尤妙丹溪云

胃中痞須用枳實炒黃連是也

泄瀉二十一

圖

丹溪心法

○泄瀉有濕火氣虛痰積食積濕用四苓散加蒼朮甚者

蒼白二朮同加炒用燥濕并滲泄火用四苓散加木通黃芩伐火利

小便痰積宜豁之用海粉青黛只容神麩糊丸服之在上者用吐

泄瀉

...

...

提 在下陷者宜升提之用升麻防風 氣虛用人參白朮炒芍藥赤

麻 食積二陳湯加澤瀉蒼朮白朮山查神麩川芎或吞保和丸 瀉

水多者仍用五苓散 久病大嘔氣泄用熟地黃半兩炒白芍知母各

三錢升麻乾姜各二錢炙甘草一錢為末粥丸服之仍用艾炷如麥粒

於百會穴灸三壯 脾瀉當補脾氣健運復常兩炒白朮四兩炒神麩

三兩炒芍藥三兩半冬月及春初用肉蔻代之或散或湯作餅子尤佳

食積作瀉宜再下之神麩天黃作先子服 脾泄已久大腸不禁此

脾已脫宜急澁之以赤石脂肉豆蔻乾姜之類

戴云凡瀉水腹不痛者是 濕飲食入胃不住或完谷不化者是氣虛

腹痛瀉水腸鳴痛一陣 一陣是火或瀉時或不瀉時或多或少是

痰積腹痛甚而瀉瀉後 瀉減者是食積

又方

老人 虛弱 飲食 傷脾 泄瀉 不止 脾氣 虛弱 是 脾泄

二老人奉養太過飲食傷脾常泄瀉亦足脾泄

黃芩 炒半兩 白朮 炒二兩 白芍 酒并炒 半夏 炮各半 神麴 炒

口查 炒各一兩半

右為末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯下

治痛泄

炒白朮 三兩 炒芍藥 二兩 少陳皮 半兩 防風 一兩

久瀉加升麻 六錢

右剉分八貼水煎或丸服

止瀉方薑麴丸

隔年陳麥麴作麴 二兩必云六兩 茴香 五子 生姜 二兩又云一兩

右為末或丸每服五七錢湯下

又方

泄瀉 五

肉豆蔻

五兩

滑石

夏二兩半 秋二兩 春冬二兩 錢半

右為末飯丸或水調服

青六丸

去三焦濕熱世瀉多與清化丸他丸同行并不單用蒸治產

後腹痛并自利者以補脾血藥送之亦治血痢甚効

六一散

一料 紅麴 炒半兩

右為末陳倉米飯丸梧子大每五七十丸白湯下又加五靈脂一

兩名靈脂丸能行血

又方 治泄瀉或吐嘔

右以六一散生薑汁湯調服

五苓散

六一散 候凡溫熱

附錄

麻訣舉要曰夏月泄瀉脈應暑濕決而數洩脈必虛極治暑濕瀉分利

小便虛脫固腸固或不益

脈訣舉要曰夏月泄瀉厥應暑濕洪而散洩脈必虛極治暑濕瀉分利

小便虛脫固腸固或不痊

附諸方

六和湯 治脾胃不調氣不升降嘔吐或致泄瀉寒熱交作小便赤澀

加味五苓散 治伏暑發熱及胃濕泄瀉或煩渴小便不利 並見中暑

胃苓湯 治感暑夾食泄瀉煩渴即平胃散五苓散相合

蒼朮

陳皮

厚朴 姜製

甘草

白朮

茯苓

豬苓

澤瀉

桂

右剉水煎入鹽少許 如作末藥湯服亦可

來復丹 治伏暑泄瀉

見中暑

聖惠方 紅丸 治大人小兒冷熱不調吐逆不定霍亂煩燥吐瀉不止

其効如神

明信

朱砂 研各半 乾胭脂 二斤 巴豆 七箇去

世編

小治時疫

六

右研勻溶蠟二錢入油七點旋丸大人菘豆大小兒麻子大每服一丸濃煎槐花甘草湯冷下食前一服定

○已上數方治傷暑泄瀉之劑

藿香正氣散

治感濕世瀉

見胃藥

戊巳丸

治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀下化宜升陽除濕湯送下

白朮芍藥湯

治太陰脾經受濕水泄注下體重嘔滿困弱無力不欲

飲食暴洩無穀水穀不化俱見瀉類

升陽除濕湯

按粹方

治脾胃虛弱不思飲食嘔吐鳴腹痛泄瀉無度小便

黃色四肢困弱

升麻

柴胡

防風

神麩

澤瀉

猪苓各半兩

蒼朮一兩

陳皮

甘草炙

大麥芽麵各三錢

右作十服水煎飯後熱服胃寒腸鳴加益智仁半夏各半兩薑棗

右作十服水煎飯後熱服
煎非腸鳴不用

胃寒腸鳴加益智仁半夏各半兩芩藜

○已上數方治感濕

脾濕泄瀉之劑

芥麻湯蘇併方治一日大便二

四次澹而不多有時瀉腹中鳴小便黃

黃芪三錢甘草二錢

芥麻六分柴胡三分橘皮三分

益智當歸身各三分

紅花少許

右以咀分作二服每服水二

盞煎至一盞去滓食前溫服

錢氏白朮散治脾胃氣虛

吐或瀉見痢類

參苓白朮散治脾胃氣虛

食不進或致吐瀉

和平散和脾胃止泄瀉並見

補脾胃

益胃湯蘇併方治頭悶勞動則

微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱短氣口

不知味腸鳴大便微澹黃色

身體昏悶口乾不喜飲冷

黃芩 甘草 半夏 各二分 黃芩 柴胡

人參 白朮 益智 各三分 當歸 稍 升麻 各二分

陳皮 半錢 蒼朮 一錢 半

右作一服水盞半煎八分食前通口服

○已上數方治脾胃氣虛泄瀉之劑

理中湯 治臟腑停寒泄瀉不止 見中寒

八味湯 治內寒泄瀉惡食

吳茱萸 去核湯 炮七次 陳皮 木香

肉桂 丁香 參 當歸 洗焙各

右剉每四錢水一盞煎七分服

大藿香散 百一選方 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹脹痛如泄瀉不

已最能取效

陳皮 去白 厚朴 姜汁 青皮 炒 白芍

藿香葉洗 兩

陳皮去白

厚朴姜汁

青皮去白

木香

人參去芦

肉豆蔻煨

良姜炒

大麥蘖炒

神麴炒

訶子煨

白茯苓去由

甘草炒

白乾姜炮

為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔噎

苦水用水一大盞煨生薑

半塊鹽一捻煎服

水泄滑泄腸氣臌毒

陳米飲入鹽熟調下赤

白痢苦草黑豆湯下

脾胃虛冷宿滯酒

食痰風作暈入鹽少許嚼

姜棗湯熱服

胃氣逆生姜自然汁

呷入鹽點服此藥大能消

食順氣利隔開胃

養胃湯

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹

嘔腸鳴泄瀉

見脾胃

調中散

治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉

藿香葉

砂仁

蓬朮炮

乾姜炮

肉桂去粗皮

茴香炒

草菓

麥芽炒

益智仁

橘紅各一分

瀉瀉

心平身安

△

蒼朮炒

神麴炒

桔梗各一錢半

甘草炙三分

右用水二盞生姜三片棗一箇煎至一盞去滓入鹽少許溫服

海藏神應丸 治因一切冷物冷水及童乳酪水所傷腹痛腸鳴泄瀉

米穀不化 則宿食難

○已上數方治脾胃虛寒食積泄瀉之劑

香連丸 治熱瀉糞色赤黃肛門焦痛糞出穀道猶如湯流煩渴小便

不利宜五苓散吞此丸 見源療

酒蒸黃連丸 治傷於酒每晨起必瀉宜生薑理中湯加乾薑吞此丸

黃連半斤 酒二升浸以瓦器置甑上蒸至爛取出晒乾

右為末滴水丸梧子大每五十九食前白湯下

神聖香姜散仁存方一名 治晨泄

白黃連四兩 新水 生薑四兩 切散

右同一瓶淹一宿銀石器內同炒姜去黃連色為度去姜不用將黃連

右同一處淹一宿銀石器內同炒姜黃黃色為度去姜不用將黃連
為末每服三錢茶清調下

○已上數方治脾胃實熱酒法滯瀉之劑

五味子散 有每日五更初洞瀉服止藥並無效此名脾胃泄宜服

此藥或四苓散送下二神丸或椒附丸

五味子二兩 吳茱萸半兩細粒炒

右二味炒香熟為細末每服二錢陳米飲下

○廣按腎司閉藏今縱欲致虛而腎失職故有此病也

四苓散 五苓散去桂方見溫病

二神丸

破故紙四兩 肉豆蔻二兩

浙

右為末以大肥棗四十九箇生姜四兩切同煮棗爛去姜取棗肉研

泄瀉

心法卷之三

二

膏入藥和丸梧子大每五十丸鹽湯下

椒附丸 泄瀉久重其人虛甚

椒紅炒

桑螵蛸炙

龍骨

山桑子肉

附子炒

鹿茸酒蒸焙

右為末酒糊丸每六十九空心米飲

當歸厚朴湯 治肝經受寒面色青慘

當歸炒

厚朴製各

官桂三

良姜五兩

右剉每三錢水煎食前服

○廣按經曰腎司閉藏肝司疏泄肝腎氣虛為病泄瀉何也蓋腎者

所處在下大小二便之門戶而肝者又為門戶約束之具肝腎氣

實則能閉能束故不泄瀉肝腎氣虛則閉束失職故泄瀉也又肝

者脾之賊肝經正虛邪盛未能越土亦作泄瀉此當歸厚朴湯所

以實肝而止瀉也

以實肝而止瀉也

香茸丸 治日久冷瀉

麻茸 五錢酒浸

乳香 三錢

肉豆蔻 一兩每箇作兩片入

乳香在內煨燥

石為細末陳米飯丸每服五十九空心米飲下

一方 治泄瀉不止

用肉豆蔻一箇剉碎入乳香少許麩暴燥蒸去麩研為末作

心陳米飲調下或單用豆蔻紙暴燥去油為末和麩作楮服

金鎖正元丹 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之證

之 見夢遺類

〇已上數方治脾腎肝虛泄瀉之劑

實腸散 直補方 治泄瀉不止

肉豆蔻

訶子 炮

宿砂

陳皮

蒼朮

炒

世編

...

...

服法 並治

茯苓 各一兩
木香 半兩
甘草 四錢
川厚朴 製一兩半

右次咀每服三錢 姜煎服 手足冷者加乾姜

止瀉方

人參 去芦
白朮
乾姜 炮
甘草 炙
茯苓 去皮

木香
藿香 去二
訶子 去核
肉豆蔻 麩暴燥 分

右次咀每服一兩水二盞煎至一盞 去滓 通口服

補腎丸 百一選方 治滑泄不禁

白朮
赤石脂
肉豆蔻 麩暴燥
麥蘖 炒

川厚朴 姜製
川白姜 炮各二兩
神麩 炒
麥蘖 炒

附子 炮去皮臍 各半兩

右為不醋糊丸 如梧桐子每服五十九空心米飲下

四柱散 和劑方 治元臟氣虛真陽耗散 臍腹冷痛泄瀉不止

四柱散 治元氣虛其陽耗散 脘腹冷痛 泄瀉不止

白茯苓 去皮

附子 炮去皮

木香 煨

一方加肉豆蔻 訶子 各六柱散

右等分 吹咀 每服四錢水一盞 姜五片 棗小許 煎七分 空心温服

麩齋丸 治臟腑受風濕 泄瀉不止 見前

肉豆蔻散 和劑方

治脾胃虛弱 腹脹滿 水飲不消 臟腑滑泄

蒼朮 水泔水浸 切八兩

乾姜 炮

肉豆蔻 煨

厚朴 去皮 製

甘草 炙

陳皮 去白 各四兩

茴香 炒

肉桂 去皮

川烏 炮去皮 附

訶子皮 各二兩

右為末 每服二錢水一盞 姜三片 棗一枚 煎八分 温服

厚腸丸 百一 治泄瀉不止

白龍骨

乾姜 炮

附子 炮去皮

厚朴 姜製

訶子 炮去核

肉豆蔻 煨

陳皮 各等分

世醫

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸米飲下

豆附丸 和劑方 治腸胃虛弱肉受風冷水穀不化泄瀉注下

肉豆蔻 麵煨 木香 不見火 白茯苓 去皮 乾姜 炮

肉桂 香二兩 附子 炮去皮脐 丁香 不見火

右為末姜汁麵糊丸如梧子大每服五十丸米飲下

訶梨勒丸 濟生方 治大腸虛冷泄瀉不止腸脈引痛飲食不化

訶梨勒 麵煨 附子 炮 肉豆蔻 麵煨 吳茱萸 去核炒 龍骨 生用

草撥 白茯苓 去皮 木香 不見火

右為末姜汁黃糊丸如梧子大每服十丸空心米飲下

禹餘糧丸 濟生方 治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石 煨 赤石脂 煨 龍骨 訶子 麵煨

乾姜 炮 肉豆蔻 麵煨 附子 炮去皮

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸米飲下

本為細木醋糊為丸如梧桐子大每服七十九空心米飲下

○廣按已上諸方皆是止瀉之劑蓋因久瀉腸胃虛脫不得已而用

之若夫新泄瀉不可使用止瀉邪得捕而愈盛惟當以分利小便

導去濕氣為上又論治泄瀉用藥不可太苦太甘蓋太苦則傷脾

太甘則生濕惟當以淡劑利竅為最

○已上數方治腸胃虛脫滑泄不禁之劑

○廣按泄瀉之証雖分濕火寒虛痰食六者之殊必以滲濕燥脾為

主而隨証加藥焉濕則導之火則清之寒則溫之虛則補之痰則

豁之食則消之是其治也雖然六証既明而三虛不可不察三虛

者何脾虛腎虛肝虛也脾虛者飲食所傷也腎虛色慾所傷也肝

虛者忿怒所傷也飲食傷脾不能運化色慾傷腎不能閉藏忿怒

傷肝木邪剋土皆令泄瀉然腎泄肝泄間忽有之而野瀉恒多爾

泄瀉

心法附錄卷之三

十一

蓋人終日飲食一或有傷脾胃便致泄瀉也必矣又嘗論之泄瀉
初起同乎一原多由暑月脾胃氣虛飲食傷積所致飲食絕傷便
作則為泄瀉為輕飲食停積既久則為瘧痢為重而瘧痢又有
分別飲食為痰充于胸脇則為瘧疾飲食為積膠乎腸胃則為痢
疾古人有言曰無痰不是瘧無積不是痢良有以也今之醫者不
能究病之源而徒執古人之方各徧試之欲其病愈也胡可但哉

泄瀉治例 出明臣雜著

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時念分
寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣
用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

白朮二錢 白茯苓 白芍藥 炒各一巴上三味世為必用之藥

陳皮一錢 炙甘草五分

陳皮 一錢
炙甘草 五分

若傷食泄黃或食積加神曲大麥芽各一查手各一錢炒黃連 七分消

之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實各五分

若小便赤澀短少加澤瀉猪苓木通各一錢以分利之夏月再加茵陳

七分炒山桅仁 四分

若口渴引飲加乾葛 一兩半 入參桑門各一錢 升麻湯 各四分

烏梅肉 二箇

若夏秋之間濕熱大行暴逆水泄加炒黃連蒼朮澤瀉各一錢升麻

木通 各五分 發熱燥渴加乾葛蒼朮各一錢黃疸小便黃赤加茵

陳皮 一錢 此枳木通 各五分

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連各一錢茵陳乾葛各一錢木香五分

神曲 麥芽 各八分

若寒月溼瀉清冷腹痛或傷生冷飲食加神曲麦芽炙乾姜各一宿

砂益智不香各七分

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加人參黃耆各一以補

中氣升麻紫胡各四分以升提之再加羌活防風葉本白芷等風

藥各三四分助風以平之更加炙乾姜五分以固之

若久泄脾胃虛弱食少難化加炙甘草人參各一錢神曲麦芽各二

分木香煨過乾姜各五分

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻一錢訶二小皮赤石脂各一煨木

香炙乾姜各五分

浙

丹溪心法附餘卷之七 終

丹溪心法附餘卷之八

本草綱目卷之七 廣納之類集

休寧東山古庵方廣約之類集

濕熱

館

廣按濕熱

風熱所因不同為病亦異濕熱者因濕而生

熱也痰熱者因

痰而生熱也風熱者因火而生風風則蒸乎

熱也火性炎上

凡頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥

舌乾牙宣齒腫

之類皆風熱之所為也水性潤下凡泄瀉下

痢水腫鼓脹遺

白濁疝痛腰痛脚氣之類皆濕熱之所為

也痰生於脾土

居中火凡咽喉閉膈噎膈痞瘕癩頭狂

悸怔忡健忘恍惚

之類皆痰熱之所為也經曰治病必先其

本此風熱痰熱濕熱逆病之根本也

吞酸

二十二

消痰

丹溪心法

○吞酸者濕熱鬱積於肝而出伏於脾胃之間必用攝食蔬菜自養

宜用炒吳茱萸順其性而折之此又佐之法必以炒黃連為君 二陳

湯加茱萸黃連各炒隨時令送 其位使蒼朮茯苓為輔佐冬月倍茱萸

夏月倍黃連湯浸炒餅丸如小丸吞之 劫救以攝食蔬菜自養并戒忿

怒即安

戴云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱滯遏其食不得傳化故作酸

也如穀肉在器則易為酸也

也如數肉在器則易為酸也

朱萸 一兩去枝投漿少一陳皮 一兩 蒼朮 一兩

黃連 一兩陳壁土 黃芩 一兩

或加桔梗一兩茯苓一兩

右為末神麴糊丸棗豆大每服二三十丸時時啜液下食後服

黃連 清化丸

黃連 一兩 吳茱萸 浸炒 桃仁 陳皮 一兩 半夏 一兩

右為末神麴糊丸棗豆大每服百丸姜湯下

參黃丸 治濕而帶氣者濕熱甚者用之為向導上可治吞酸下可治

自利

六一散 一升 吳茱萸 一兩梨汁

左為末飯丸 六一散 見濕熱

香散

...

...

回令元 馮汗火行濕為之反佐開痞結治肝邪可助補脾藥

東連 六兩 吳茱萸 一兩

右為末粥丸 一方名左金丸治肝火茱萸或半兩水丸白湯下

淋瀝賢論

或問前溪曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也答曰吐酸與吞

酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成

積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積之於久不

能自涌而出伏於脾胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則肉

熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行

亦得新鮮非寒而何素問言熱者言其六寸也東垣言寒者言其不也

附方

妙丸 治中脘宿食胃飲酸楚心宿食 吐清水

仲地 治中脘宿食胃飲酸楚心宿食 吐清水

仲越 沙三 兩 蒼朮 一兩半 陳皮 一兩

右為 不生 姜汁 煨 神越 為 左 牙 七 九 藥 藥 平

加味 平胃 散 治 吞酸 或 宿食 不化

蒼朮 陳皮 石 芍 甘草

麥芽 炒

右 吹 咀 每 服 五 錢 生 姜 三 片 水 煎

透膈 湯 治 脾胃 不和 中 脘 痞 滿 胸 膈 滯 悶 噎 塞 不 通 噎 氣 吞 酸 脇 肋

刺 脹 嘔 逆 痰 涎 食 飲 不 下

木香 白豆蔻 宿 砂 枳 殼

厚朴 半夏 青 皮 陳 皮 甘 草

大黃 朴 硝

右 各 等 分 每 服 一 兩 水 二 盞 生 姜 二 片 棗 子 一 枚 煎 至 一 盞 去 滓

三口飯食後

丹溪心法

○暖氣 胃中有火有痰

入方

南星

半夏

軟石膏

香附

一本有炒梔子

右作丸或作湯服之蓋胃中有痰沃膈上有稠痰故也

○軟石膏丸亦可服 本方痰下云噫氣吞酸此係食積有熱火

氣衝上黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛

痼 二十三

丹溪心法

直下用分其五同是濕熱... 小量中凡... 重者大...

丹溪心法

○疸不用分其五同是濕熱如蠶麩相似輕者小温中丸重者大

温中丸熱多加苓連濕多者茵陳五苓散加食積藥濕熱因倒胃

氣脹下藥大便下利者參芪加山梔茵陳甘草

戴云五疸者周身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者量入虛實下

其食積其餘但利小便為先小便利白其黃則自退矣

入方

小温中丸 治疸又能去食積

蒼朮

川芎

香附

神麩

針砂

醋炒紅

春加芎夏加苦參或黃連冬加吳茱萸或乾姜

大温中丸 治食積與黃腫又可借為制肝燥暍之用脾虛者以參朮

芍藥陳皮甘草作湯使

黃疸

心法附錄卷之八

四

一

陳皮

蒼朮

厚朴

三棱

蓬朮

青皮 各五兩

香附 一斤

甘草 二兩

針砂 二兩醋炒紅

右為末醋糊丸空心姜鹽湯下午後飯食可酒下忌大肉菜菜

附脉理

脉訣舉要曰五疸實熱脉必洪數其或微瀯證虛弱

附諸方

茵陳五苓散

右用五苓散五分茵陳蒿朮十分和勻先食飲後服方寸匕日三服

五苓散

見温熱

當歸白朮湯

三因方

治酒疸發黃結聚飲癖心白壅滿不進飲食小便

黃赤其脉弦瀯

茯苓 三兩

當歸 一兩

白朮 三兩

黃芩

一兩

半夏

二兩半湯泡七次

茵陳 一兩

甘草 二兩

枳實 二兩

杏仁 二兩

前胡 二兩

各二兩

欬散 三兩 當歸 一兩 白朮 三兩 黃芩 一兩 半夏 三兩 湯泡七次

茵陳 二兩 甘草 炙 一兩 枳實 炒 一兩 杏仁 炒 一兩 前胡 各 二兩

右以咀每 四錢水一盞煎七分食後溫服

加減五苓散 生方治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

茵陳 赤茯苓 法炙 情苓 去皮 白朮 澤瀉 各等分

右以咀每 四錢水一盞煎八分溫服不拘時

黃耆散 治黃汗

黃耆 下蜜 赤芍藥 茵陳 二兩 石膏 四兩 麥門冬 云心

一兩 甘草 炙 半兩

右以咀每 服四錢水一盞姜五片煎至八分溫服不拘時

茵陳散 治瘡疽

瓜蒌 石膏 一兩 甘草 炙 半兩 茵陳 白朮 通

旋子仁 各 一兩 大黃 炒 半兩

黃芩

右吹咽每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服

葛根湯 治酒疸

枳實 白 梔子仁 豆豉各一兩 甘草 炙 芍藥一兩

右吹咽每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

秦光散子 治五疸溲瀝口炎因乾熱微寒

秦光 當歸 去芦 芍藥 白木 官桂 去皮不

陳皮 茯苓 去皮 熟地黄 酒蒸 半夏 湯洗 小草 係遠志

川芎 各一兩 甘草 炙 半兩

右吹咽每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

茵陳湯 治時行發熱在裏將蒸不散通身發黃

茵陳 大黃 梔子仁 各

右吹咽每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

治無名腫毒 治黃疸通身如金色

猪藥瓜蒂散 按華方 治黃疸通身如金色

瓜蒂 二錢 毋丁香 一錢 黍米 四十九粒 赤小豆 半錢

右先將瓜蒂為末次入三味再碾至夜令病人先食水一口次將藥

半字搗入鼻內待下或吐去水便睡至半夜或次日取下黃水宜候

利水止即服黃連散或茵陳五苓散病解者五日病重者半月見效

黃連散 按華方 治黃疸大小便秘澀臟腑壅熱

黃連 二兩 川大黃 二兩好醋炒 黃芩 去黑心 炙甘草 各一兩

右為極細末每服二錢食後溫水調下日三服

必效散 直指方 黃疸通用

葶藶 隔布炒 龍膽草 山梔子 茵陳 黃芩

右等分每服一兩水二盞煎至一盞溫服不拘時

一清飲 危氏方 治疸証發熱諸熱通用

黃連

柴胡 三兩

赤茯苓 二兩

桑白皮 炒

川芎 各一兩

甘草 炙 半兩

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎至一盞食前服

山茵陳散 直指方

施子

茵陳 各一兩

枳實 各一兩

茯苓 各一兩

澤瀉 各一兩

甘草 各一兩

每服一兩水二盞姜三片煎至一盞食前適口服

茯苓 參濕湯

治黃疸寒熱嘔吐渴飲冷水身體面目俱黃小便不利

白茯苓 五分

茵陳 六分

澤瀉 各三分

黃連

黃芩

枳子

漢防己

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳實 炒

右每服水二鍾煎至一鍾去粗食前服

一方 治黃腫及積滿浮腫

皂莢 各一兩 膠 各一兩 水 各一兩 胃 散 四兩

皂礬辛斤 醃炙乾 膠棗二斤 黃去皮 平胃散四兩

右用棗礬爛入礬丸如梧桐子大以平胃散為衣每服三五十九歸

臥溫酒送下

一方 治遍身黃不浮腫手足怠惰

針砂水攪淨 醋煮 陳皮去白炒 蒼朮米泔浸去 根皮焙乾

百草霜炒 三稜煨 莪朮煨各 二兩

青皮去白炒 各四兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸米湯溫酒下

一方

用絲瓜全者燒灰為末如病因如傷麵湯下因酒傷酒調下效照

水腫

浙

哥溪心法

○水腫因脾虛不能制水水漬妄行當參苓補脾使脾氣得實則自
 捷運自能升降運動其樞機則水自行非五苓神佑之行水也宜補中
 行濕利小便切不可下用二陳湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥
 門冬炒梔子制肝木若腹脹少佐以厚朴氣不運加木香木通氣
 若陷下加升麻柴胡提之隨病加減傷損補中行濕二陳治濕加升提
 之藥能使大便潤而小便長產後必須大補血氣為主少佐蒼朮茯
 苓使水自降用大劑白朮補脾若壅滯用半夏陳皮香附監之有熱
 當清肺金麥門冬黃芩之屬一方用山梔子土皮取仁炒槌碎米湯
 送下一抄若胃熱病在上者帶皮用治熱水腫山梔子五錢小香
 錢半白朮二錢半吹咀取急流頓水煎服水脹而大戟香薷
 成膏丸去暑利小水大戟為末棗肉丸十九泄水切快實

戴...水腫者通身皮膚光腫如泡者且...也以健脾決水利小便進飲

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者且也以從脾決水利小便進飲
食元氣實者可下

附脉理

脉訣舉要曰水腫之證有陰有陽紫脉微色問證須詳陰脉沉遲其色
青白不渴而瀉小便清澀脉或沉數色赤而黃燥囊赤溺黃濁為陽

附諸方

麻黃甘草湯清生方 治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃去根節 四兩

甘草 二兩

右以咀每服三錢水一盞煮麻黃再沸後入甘草煎七分取汁慎肩

風老人虛人不可輕用

五苓散方見溫病 加木香薑陳 治少氣從腰以下俱腫以此湯利小

便 仲景曰腫以下腫宜利小便腰以上腫宜發汗也

五皮散 濟方 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿

心腹膨脹上氣促急

官

五加皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

茯苓皮

右取每服三錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷油膩

硬等物澹寒去五加皮地骨皮用陳皮赤白皮

等差末香散 蘇頌方 治暑熱傷脾水腫五臟小便赤大便滑

葶藶 二錢半

木香 五分

茯苓 二錢

肉桂 二錢

滑石 三四

猪苓 去皮二錢半

澤瀉 二錢

木通 二錢

甘草 各半

白朮 一兩

右為末每服二錢白溫平不拘時候

三因黃連散

水腫之去多由腎水不能攝心火心火不能養脾土脾

土不能制水水氣急逆腎氣閉塞滲變經絡發為浮腫之証心腹堅

脹喘滿不安

木香

赤茯苓

當歸

桂心

木通

白朮

木香煨

赤茯苓

當歸洗

桂心

木通

赤芍藥

牡丹皮

檳榔

陳皮

白木各等分

右吹咀每服二錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分温服

加味腎氣丸

消生方

治脾胃有虛損腰重脚腫小便不利

白茯苓

去反

附子

炮二兩

澤瀉

官桂不見火

川牛膝

去芦酒浸

車前子

酒蒸

山藥

山茱萸

牡丹皮

去木各二兩熟地黄半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

高良散消生方

治陰水痰腫用此先實脾土

厚朴去皮

白木

木瓜去穢

木香不見火

乾姜炮各一兩

草薹仁炒 大腹子

白茯苓

去皮

甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎不均時

白木香散

宣明方

治喘嗽腫滿欲變成水病者不能臥不能食小便

水腫

下未寸餘卷之八

九

砂者

白木

猪苓 去皮

甘草官

澤瀉

赤茯苓

各半

木香

檳榔 各三錢

陳皮 白

兩去

官桂 二錢

滑石

二兩

右咳咀每服一

兩半生薑二片水三盞煎至一盞去滓通口服

聖靈丹 救神方

治脾肺有濕喘滿風盛小便赤澀

芒葶藶

四兩

防己 二錢

赤茯苓 炙炒

檳榔

木通

人參 各一錢

右為末麩肉為丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下

道氣通經湯 救神方

治脾氣有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮

去白

桑白皮

白木

木香

茯苓

去皮各

右咳咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時

霖雨時加

沉香海金沙丸 救神方 治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋身瘦惡

沉香 二錢

海金沙 半錢

輕粉 一分

黑丑 末

沉香二錢

海金沙半錢

輕粉一錢

黑丑末一兩

右用獨蒜泥丸每服三十九丸前打心通草湯下空心量大小虛實

續隨子丸 按辨方 治通身虛腫喘悶不快

人參

防己

赤茯苓 面炒 木香

檳榔

續隨子

海金沙 砂另炒各石五錢

苦葶藶 四兩

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十九丸桑皮湯下

退腫榻氣散 聖惠方 治積水驚水或飲水過多停積於脾故四肢而身

熱宜用藥內消其腫自退

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草 炙各五錢 木香 炮二錢半

右吹咀每服一兩生姜三片棗子一枚水二錢煎至一盞服食前

○已上數方治陰水浮腫之劑

十棗丸 治水氣浮腫上氣喘急大小便不通

水腫

甘遂

大戟

芫花 各等分

右為末 棗煮熟去皮核 杵爛為丸 如梧桐子大 每服四十九丸 清晨熟湯下 以利去黃水為度 不利次日再服

順氣丸 又名氣寶丸 聖惠方 治腰脇俱病 如抱一甕 肌膚堅硬 按之如

鼓 腳腫不能伸屈 白頭不王 腫中瘦 脊露骨 胸膈痞滿 四肢無力

木香 不見火 茴香 炒

羌活 酒

木瓜

川芎

當歸 酒浸各

黑牽牛 二兩

地骨皮

檳榔

陳皮 炒各一

大黃 一兩半 皂角 四兩

右為細末 熬皂角膏 丸如梧桐子大 每服五六十丸 溫湯下 食前一

方無木瓜 用生姜 灯心煎湯下 治一切氣血凝滯 風毒熾盛 腳氣走

注作腫 或大便秘 脚氣入 腹滿悶 寒熱往來 狀如傷寒 並宜服之

三花神佑丸 宣明方 治中滿 腹脹喘欬 淋瀝 一切水濕 脹滿 濕熱 腸垢

沉積變生疾病久疢不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥
鬱支體麻痺走注疼痛風痰延軟弱自旋運瘧疾不巳癥瘕積聚堅
滿痞悶酒積食積一切痰飲唾逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問
赤白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或沉
常只為轉動之藥惡為久新腰痛并一切下痢及小兒驚疳積熱乳
癰腫滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

澤瀉

牽牛

大黃

一兩為輕粉一錢

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三
服加至快利後却常服病去為度設病愈後老弱虛人平人常服
保養宣通氣血消滯酒食及痞悶極甚者便多服則頓攻不開轉加
痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻

本種

去時

一

一子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

二方 治水腫腹脹

大戟 甘遂 芫花 巴戟 桑白皮

續隨子 各等分

右為末每服一匙空心茶清湯下忌生冷油膩酸鹹等物

一方 治水腫數服

苦葶藶 甘遂 芫花 商陸根 大戟 各二錢

大黃 芫花 各三錢 輕粉 黑牽牛 頭末 一兩

右為細末入輕粉再研每服二錢溫蜜水調下忌生冷鹽醬之物取

下黑黃臭水為驗

○已上數方治陽水浮腫之劑

田鷄五神散 治十腫水氣鼓脹

芫花根以水

烏柏根取黃土肉一寸

木香

青木香

右各等分晒乾為末每服二錢如人弱服一錢半飽卧臘酒調下至

寅卯時利下水氣辰時以白粥調之若病深日三服病深隔日一服

服五六日後服金丹

金丹

蒼木一錢半

草烏二兩

山豆一錢半去皮心

杏仁十一箇去尖

右為末麩糊丸如梧桐子大每服十一丸臨卧生薑湯送下忌食

房事發病之物一百日此藥極驗

方用赤小豆兩陸白者根各等分以雄猪肚一箇裝藥在內以

箬封其口於瓦罐肉煮爛取出藥乘熱食猪肚宜食五七日見效

水腫

公法附錄卷之八

十二

一方 周黑雄猪肚一箇先以茶湯清油洗淨用土蝦蟆三箇每箇口
內放銅錢一枚銅錢上安胡椒末少許將蝦蟆口活裝入肚內兩頭
俱紮住勿令走氣以文武火煮一日次日五更取出蝦蟆去皮腸肝
不用餘肉連猪肚一同搗碎食盡以好酒厭下日並將舊鷄鵝魚麩羊
肉滯氣之物宜食猪肉鴨肉

一方 於五月五日取蜈蚣不拘多箇不可見日焙乾凡一病以七箇
為度先用七箇頭研為末治上次用既研為末治中再用足研為末
治下每服食前好調下

商陸散 治十種水氣

商陸汁一盞 甘遂一錢 土狗汁

右為末以商陸汁調空心服日午利下水品並

一方 治水鼓

周商陸根亦有神效... 治... 水鼓... 凡... 治... 水鼓... 凡... 治... 水鼓... 凡...

周商陸根赤者杵爛貼臍心以
藥帛縛定病自小便出

又方 以商陸白根同生薑二兩煮粥服之忌赤者殺人

分水散 治面水浮腫

土狗 一箇 輕粉 二分

館

右為細末每用少許搗鼻下其黃水從鼻中出

塗臍膏 治水腫小便澀少

猪苓 地龍 生研

針砂 散

甘遂 各等分

右為末用葱搗爛取汁研成膏敷臍中約一寸高以帛縛之水從小

便出為度日二次易之

煨腎丸 治脾虛邪水流注經絡腿膝草患四肢腫痛

寸遠 生半兩

木香 一兩

右為末每服一錢以猪腰一枚剝開去筋膜揆藥在內用薄荷葉定

水腫

心法附錄卷之八

十三

外用紙四五層再柔以水濕於火內煨熟貼臥細嚼溫酒嚥下利去

黃水為度

一方 治水腫

黑牽牛 研末

橫痃 研末

右為末每服三錢好酒空心調下初去水三五次其腫自消忌葷食

生於一百日取虫積沙糖水下

圖

牽牛湯

治腹中濕熱氣足脛微腫中滿氣急咳嗽痰喘小便不利

牽牛 研末一兩

厚朴 五錢姜製

右為末每服二錢姜棗湯調下或以水為丸亦可

一方 治腫脹自去水

用真水銀粉二錢巴豆去油四兩生硫黃一錢同研成膏作餅子先

以新餅一片鋪臍上次以藥餅當臍掩之外用帛縛定約人行五里

自然消下惡水待三五次腫去藥消神效之方是者隔日取水

自然瀉下惡水待三五次除去藥渣粥補之久患者隔日取水

一方 治鼓脹氣滿

用苦丁香為末桑肉為丸如梧桐子大每服三十九空心棗湯下三

服見效

一方用青木香為末水調一錢服後得吐則效

一方 治水腫

用白商陸細切一升羊肉六兩水十升煮至六升去滓將肉和葱豉

作膾食之

○已上數方治腫脹切奪之劑

○廣按水腫之証蓋由脾虛胃熱勝氣閉滲道不得通故邪水隨氣流

注經絡之中則一身浮腫公薄而尤平按成窞舉手即滿也先當

補中榮濕使脾得健運次白開其滲道以決邪水則體用兼該標

水腫

二夫寸...

一

本兩蓋病之不愈者鮮矣今之醫者徒知決水而不知補脾故醫
消而隨腫何益之有哉古人治病之扶虛有先攻而後補者有先
補而後攻者有攻補兼施者何嘗一於攻也又嘗論之水腫鼓脹
之病忌用甘溫之藥蓋腫脹屬濕甘溫之藥能生濕熱而又助病
邪經曰甘能作中滿是也惟用苦溫苦寒之藥以治之則愈蓋苦
寒瀉濕熱苦溫除濕寒也又宜用風藥風能勝濕也

鼓脹 二十五

丹溪心法

○鼓脹又名單鼓 宜大補中 行濕此乃脾虛之甚必須速育樂斷

厚味大劑人參白朮佐以陳皮 有血虛者用四物湯

行血藥 有脈實者天壯盛者可攻之便可收洽用參不為主 凡

補氣必帶厚朴寬滿 厚朴治腹脹因味辛以氣聚於下焦故也須用

姜汁製之 如肥胖之人腹脹者宜平胃五苓共服之 如白人腹脹

者是氣虛宜參木厚朴陳皮 如瘦人腹脹者是熱宜黃連厚朴香附

白芍 如因有故畜血而腹脹者宜抵當丸下死血 如因有食積而

腹脹者有熟用木香檳榔丸有寒用木香厚朴丁香砂仁神麩香附

如因外寒鬱內熱而腹脹者用藿香麻黃升麻乾葛桂枝 因大怒而

腹脹者宜青皮陳皮香附木香炮子仁蘆會 實者按之不堅不痛冷

溼實者下之消之次補之 虛者溫之升之補為要 朝寬暮急血虛

暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛 腹脹不覺滿者食肉多以黃連一

兩阿魏半兩醋浸蒸餅為丸同溫中丸白朮湯下 食肉多腹脹二補

丸料內加香附半夏麩蒸餅丸服

鼓脹 卷之八 三

心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃

遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精

四布五經並行天脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽

降腎肝之陰升而成天地交之泰是為無病今也七情內傷六淫外

侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不

能運化故陽自下陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞

鬱而為蒸熱留為濕已熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖

堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若魚侵蝕

之義理宜補脾又瀉養肺金以制木使脾無賊邪之患滋腎水以制

火使肺得清化却厚味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛實急

於作效病者望於服藥急喜行利藥以求通快不知寬得一日半日其

進愈其病邪其矣而氣傷矣古方惟禹餘糧丸又名紫金丸制肝補

脾效為功當

脾珠為切當

四物湯

見補損

平胃散

見中濕

五苓散

見濕熱

溫中丸

見積聚

三補丸

見補損

附脉理

脈訣舉要曰脹滿脈弦脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒浮為虛滿緊則中實浮則可治虛則危急

附諸方

平肝飲子 濟生方 專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈

嘔逆脉來浮弦

岐長

江圖書館

防風去芦 桂心不見火 枳殼

赤芍藥

桔梗去芦沙

甘草炙 木香不見火 人參官

檳榔

當歸去芦酒

川芎 陳皮半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時服

紫蘇子湯濟生方 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣

走瀆漉有聲大小便不利脉虛緊而瀉

見氣滯

調中順氣丸 治怒氣傷肝三焦壅滯水飲停積脇下產滿或時刺痛

見腹痛

木香順氣湯按粹方 治濁氣在上則生腹脹及七情折傷

陳皮 厚朴各四分 當歸五分 甘草豆蔻
面裹煨

蒼朮米泔 木香各三 青皮 元胡智仁 白茯苓去皮

澤瀉 乾生姜 半夏湯洗七 吳茱萸 升麻

柴胡

摘皮湯

直指方

治七清所傷中脘不快腹脇脹滿

香附米

炒半夏

摘皮

各二兩

甘草七錢半

右吹咀水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞通口服

○已上數方治氣脹之劑

大半夏湯

三因方

治肝氣大盛勝剋於脾胃六能運化結聚涎沫閉塞

臟腑胃冷中虛遂成脹滿之疾其脉多弦逆

半夏

湯洗七次

桂心

各五兩

附子

炮去皮臍

枳實

燒炒

茯苓

甘草

炙

厚朴

美炒

當歸

各三兩

人參

一兩

川椒

炒去毒去合口者入百粒

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎空心服

強中湯

濟生方

治食啖不化過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞滿

鼓脹

有妨飲食甚則腹痛

乾姜七兩

白朮各二兩

青皮去白

人參

丁香各三兩

草果仁

附子炮去皮臍

厚朴姜炒

甘草炙各半兩

右以咀等服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時嘔者

加半夏或食麵脹滿加薑豈子各半兩

中滿分消湯按科方治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢

厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

益智仁

半夏

木香

茯苓

升麻各七錢

川烏

人參

青皮

當歸

生姜

柴胡

乾姜

草澄茄

黃連各半兩黃芩

吳茱萸

草豆蔻

厚朴各半錢

一方有麻黃澤瀉各二錢

黃蘗半兩

右吹坦每服一兩水二盞煎至一盞溫服火忌房勞濕麵生冷硬物
木香分氣丸按辨方再治脾胃不和心腹脹兩脇膨脹胸膈注滿痰嗽

喘急刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有效

木香

換柳

青皮

蓬莪朮炮

乾生薑

當歸

姜黃

玄胡

白朮

枳殼麸炒

荆三稜

濕毒暴
煨香

赤茯苓

陳皮去皮

肉豆蔻各等

秋冬加丁香炒

右為末白麵糊丸小豆大每服三五十九生薑湯下忌生茄馬齒莧

禹餘糧丸 治水腫鼓脹上氣喘滿一切水氣脹氣脹

蛇含石

大者三兩以缺鈿盛入炭火中煨藥典鈿子一

真針砂

五兩先以水淘淨控乾更以缺鈿子炒乾入禹餘糧一處

子

入一打炭火中煨令通赤針出鈿子

子

煨於淨磚地上煨令研極細

禹餘糧

三石月入銀砂內

已上三物為主其次量人虛實入下項藥味

木香

牛膝酒浸

蘇木炮

白茯苓

桂心

川芎

白豆蔻

土茴香炒

三稜炮

羌活

茯苓

乾姜炮

青皮白

附子炮

陳皮

當歸

酒浸

圖

右各半兩虛人老人全用半兩實壯之人隨意減之

右為末拌勻以湯浸蒸餅濾去水和藥再搗極勻丸如梧桐子大每

服五十九空心溫酒下最忌食塩否則發疾愈甚

○廣按此方乃劑也然腫脹乃寒濕痞閉積滯非此藥之熱燥而能

開發流通之乎雖用此藥而能去腫脹然腫脹少退即當服補氣

補血補脾藥以繼之可以免於後患也夫抵腫脹之病多屬十衰

三花以攻決惟壯實者可用非虛老人辨指而此藥但宜開胃

三花以攻次惟壯實者可用非虛老人所宜而此劑但取開散寒濕痞滯故宜於虛老人也

○已上數方治寒脹之劑

中滿分消丸 投料方 治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹 不冷寒脹

人參 去芦

白朮

姜黃

黃芩 去腐剉碎

甘草 炙

猪苓 去黑皮

黃連 去刺

白朮 去皮

縮砂仁

乾生薑 各二

枳實 炒黃

半夏 湯洗七次

厚朴 姜製一

知母 剉碎

澤瀉 三升

陳皮 三升 不去

右細碎茯苓澤瀉生姜各為末力秤外共為末和入上三味和白酒

浸証餅為丸如梧桐子大每服一百丸熱白湯送下寒因熱用故焙

熱服之食遠量人虛實加減

沉香交泰丸 投料方

治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸為腹脹

鼓脹

治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸為腹脹

七

沉香

白木

陳皮各三斤

枳實去穢

吳茱萸湯洗

白茯苓去皮

澤瀉

當歸酒浸

木香

青皮去白

大黃酒浸

厚朴美製

有為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十丸溫白湯送下食

前微利即止

廣茂漬堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥不安大小

便澀滯上氣喘促遍身虛腫

厚朴

黃芩

益智

草豆蔻

當歸各五斤

黃連六斤

半夏七錢

廣茂

赤麻

紅花酒浸

吳茱萸各二

甘草生

柴胡

澤瀉

神麴炒

青皮

陳皮各三

沿若何葛根

右等服七錢生薑三片煎服

針殊木香枳實丸

昔草

吳茱萸

紺珠木香換柳丸

木香 換柳 當歸 黃連 枳殼

青皮 黃柏 各一兩 黃芩 陳皮 三稜

香附 丑末 各二兩 莪朮 大黃 各四兩

右為末 麵糊丸 梧子大 每服五七丸 臨臥至 湯下 尋常消道開胃

只服三四十丸

○已上數方治熱脹之劑圖

抵當丸

水蛭 七箇石 虻虫 八箇 梗 桃仁 七箇 大 只一兩

右為末 分作四丸 水一盞 煎一丸 取七分大 服當下 血未下 再服

人參 芎歸湯 治血脹 煩燥 漱水不噤 迷忘 小 次多 大便 異或 虛厥 逆

婦人多有此証

攻脹

當歸 半夏七錢半 川芎一兩 蓬朮 木香

砂仁 白芍 甘草 人參 桂

五靈脂 炒各二

右吹咀生姜三片棗一箇紫蘇四葉水煎服

一方 治血鼓腹如盆脹

三稜 煨 莪朮 乾漆 炒烟尽 牛膝 去芦 酒洗 各等分

琥珀 肉桂 硃砂 水蛭 石灰 大黃 各等分

左為末用生地黄自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十九

空心温酒送下童便下亦可

鷄屎醴散 宣明方 治旦食不能暮食痞滿

大黃 桃仁 去皮尖 雞屎醴乾者

右等分為末每服一錢生姜三片煎調食後臨卧服

○已上幾方治血脈凝滯

○已上數方治血脹之劑

○廣按水腫鼓脹皆因脾虛所致然水腫輕而鼓脹重不可不知也
何則水腫則飲食如常鼓脹則飲食不及常也治水腫則惟補脾
導水而已治鼓脹則補脾導水善以消穀糜乎可也雖然鼓脹有
氣血寒熱四者之殊多由心氣傷肝木邪尅土所以脾病而不能
運化水穀故爾又要養肺金以制肝木使脾土得其平則運化行
而水穀消矣以此觀之治鼓脹之法必以補脾制肝導水消穀為
主者所挾而兼用藥馬挾氣則散氣挾血則破血挾寒則溫寒挾
熱則清熱其施治一一清之如此則藥無不投而病無不愈也又
按鼓脹之病多不治者何也此脾虛之極真臟病也如翻胃勞瘵
亦然皆真臟病也凡人之病真臟病則五行相生相制以遺於
平雖不服藥而自愈者如入極傷金則有水以制之有土以生之

如木極尅土則有金以制之有火以生之所謂亢則害承是制也
雖然亦有惡藥急醫而誤
一負火則病劇正脫而不
退正復也有病不服藥可
乎不用醫可乎

赤白濁

丹溪心法

○濁主濕熱 有痰 有虛

堅凝熱則流通 大率皆是

白木燥去其濕 赤者乃是

瘡根 白皮滑石青黛作丸藥

江

圖

赤屬血 白屬氣 淋帶同治 寒則

加痰流注宜燥中宮之濕用二陳加蒼朮

傷血也加白芍藥以用珍珠粉丸加臭

虛勞用補陰藥大藥不宜熱 化活藥

肥白人必多痰以二陳湯去其濕熱 胃弱者熱用人參以柴胡升

麻升其胃中之氣 丸藥用黃柏炒褐 乾姜炒微黑滑石蛤粉青黛

糊丸服 胃中濁氣下流為赤白濁用 二陳加柴胡升麻蒼朮白朮

丸藥用糯米末蛤粉炒乾姜炒黃柏 胃中濁氣下流滲入膀胱青黛

蛤粉 肝脉弦者用青黛以瀉肝 又炒黃柏一兩生栝一兩滑石

三兩神麩半兩為末滴水丸 燥濕痰 有星非夏蛤粉青黛為末神麩

糊丸青黛為衣 有熱者青黛滑石黃柏之類水丸 張子元氣血兩

虛有痰痛風時作陰火間起小便白濁 方在痛風類 一人便濁經年

或時寢遺形瘦作心虛主治用珍珠粉丸和定志丸服 一婦人年近

六十形肥奉養膏染飲食肥美中焦不滑濁氣流入膀胱下注白濁白

濁即濕痰也用二陳去痰加升麻柴胡升胃中濁氣加蒼朮去濕白朮

補胃全在活法服四貼後濁減大半如覺胃滿因柴胡升麻升動胃氣

瀉濁

法法法法法

二二二

痰阻滿悶又用本湯加炒麴白朮香附素無痰者雖不動不滿也

入方

青黛

蛤粉

椿根皮

滑石

乾姜

黃柏炒褐色

右為末神麴糊丸仍用前燥濕痰丸子亦治帶下

法曰黃柏治濕熱青黛解鬱抗蛤粉蠶寒入腎滑石利竅乾姜味苦

欬肺氣下降使陰血生乾姜堅利

又方

黃柏炒黑

生栢二兩

生栢

浙

麴三兩

神麴半兩

右為末水丸服

附味理

按訣舉要曰貴精白濁當發於外既動緊三變之病

附諸方

定志丸

遠志去心

石菖蒲各二兩

白茯苓各三兩

右為末蜜丸梧子大朱砂色衣每服七丸加至二十九空心米湯下

半夏丸 治白濁神效

半夏燥濕

猪苓分水

肝脈弦加青

黛

○二陳湯治濁能使大便潤而小便長

濁氣只是濕痰 有白

濁人服玄兔丹不愈服附子八味丸即愈著不可不知 有小便

女常停久統方凝濁

茯苓丸

治思慮太過心腎虛損使溺餘瀝小便白濁身寒頻泄

芡絲子五兩

白茯苓三兩

石蓮肉二兩

右為末酒糊為丸如梧子每三十九空心鹽湯下

珍珠粉丸 治白淫高泄遺精及滑出而不收

真蛤粉 一斤 黃柏 一斤 炒研末

左為細末滴米丸梧子大每服一百丸空心温酒下

法曰陽盛陰虛故精泄也黃柏降心火蛤粉鹹而補腎陰

導赤散 治心虛熱小便赤澀遂成赤濁

葉氏定心湯 理心氣不足禁血裏少遺事多驚心神不守夢中遺精

白濁不已

葉氏鎮心爽神湯 理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺精 苦夏補者

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁有沙膜 丸淋頭

喘蓮丸 濟生方 治思慮傷心小便赤濁

白茯苓 去皮石蓮肉 炒去龍腦 生用天門冬 洗去心

梧子仁 炒別為細末 去苦 酸 洗去 茶石炭 以酒七

遠志黃去心乳香

龍齒各一

右為末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服七十丸空心温酒桑湯下

豆蘚分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度尿白如油

光彩不定淡脚澄下疑如膏糊

館

益智仁

川草薢

石昌蒲

烏藥各等分

右到每服五錢水煎入益一捻食前服

一方加茯苓甘草

桑縹蛸散經方

專治男子小便日數十次稠如木泔或赤或白心神

恍惚瘦悴減食此說多因房勞過度耗傷真氣得之

桑縹蛸鹽水

遠志甘草湯煮

五

菖蒲鹽炒

龍骨煅研

人參去芦

茯神去木

當歸酒洗

龜甲燻炙各

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

猪苓丸即前半夏丸

治年壯氣盛動所顛不得意燥於外身遺白濁

獨活

心去財

二十四

右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半夏黃色不

令焦地上空出火毒半口取半夏為末如梧子候乾更用煎猪

苓末二兩炒藥微裂同於沙甌內藏之在心温酒壺湯下四十九

一方治心經伏暑小便赤濁

人參 白木 赤茯苓去皮 香薷 澤瀉

木猪苓去皮 蓮肉 麥門冬去心

方吹咀每服四錢水一盞煎服

一方治小便白濁出髓條

酸棗仁炒 白木 人參 白茯苓 破故紙

益智洗淨 大茴香 左顧牡蠣

右為末加青鹽酒為丸如梧子六每服三十丸温酒米飲任下

秘精丸 濟生方 專治下虛胞寒小便白濁或如米泔如凝脂

壯陽 鹿茸 龍骨 五未子

韭子炒 白茯苓去皮 白石脂燒 桑螵蛸酒炙各

右為末酒糊丸如梧桐每服七十九空心鹽酒下

韭子丸濟生方 治膀胱腎冷小便白濁消數無度

赤石脂煨 韭子炒 川牛膝去芦上一錢 覆盆子酒浸

附子炮去皮 桑螵蛸酒炙 鹿茸酒蒸炒 肉桂香 龍骨生各一

雞臙臙燒灰 沉香不見火

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯任下

附子八味丸 治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛脚膝緩弱夜多漩瀉

淋瀝白濁 見補損類

○廣按赤白濁雖多屬濕熱然亦有老小因虛寒而致之者已上三

方乃治虛寒濕寒之劑也

另濁 心法針灸卷之八

遠志丸 濟生方 治因事有驚心神不定夜夢驚隨小便白濁

遠志去心炭 石菖蒲各二 茯神去木 白茯苓去皮 人參

龍齒各一

右為末煉蜜丸梧子大以辰砂為衣每七十九粒熱湯下

葉天育神散 簡易方 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁見驚類

妙應丸 治赤白濁

真龍骨 辰砂 石蓮肉 縮砂各一 桑螵蛸瓦土 川練子取肉 白茯苓

益智仁

兔絲子酒浸一宿

右以山藥碎以為糊丸如梧桐子大每服五十九粒間日煎人參酸棗

仁湯下臨臥粳米飲湯下

丹溪心法附錄卷之八

丹溪心法附錄卷之九

本草東山古庵方廣約之類集

丹溪心法附餘卷之九

休寧東山古庵方廣約之類集

痰門

館

痰

二十七

附痰執書

丹溪心法

圖

○脉浮堂

久得脉濡平難開也必費調理

大凡治痰用利藥過

多致脾氣虛則痰易生而多

濕痰用蒼朮白朮

熱痰用青代黃連

芩

食積痰用神麩麥芽山查

風痰用南星

老痰用海石半夏瓜

菱香附五倍子作丸服

痰在膈上必用吐法瀉亦不能去

風痰多

痰飲

心法附餘卷之九

一

見竒証 濕痰多見倦怠軟弱 氣實痰熱結在上者吐難得出 痰

清者屬寒二陳湯之類 膠固稠濁者必用吐 熱痰挾風外証為多

熱者清之 食積者必用攻之 蕪氣虛者用補氣藥送 痰因火盛逆

上者以治火為先 白朮黃芩軟石膏之類 內傷挾痰必用參朮白朮

之屬多用姜汁傳送或加半夏虛甚加竹瀝 中氣不足加參朮 痰

之為物隨氣升降無處不到 脾虛者宜清中氣以運痰降下二陳湯

加白朮之類兼用升麻提起 中焦有痰則食積胃氣亦賴所養平不

便虛若攻之盡則虛矣 痰成塊或吐咯不出蕪氣鬱者難治 氣實

痰熱者難治 痰在陽胃開者可下而愈在經絡中非吐不可吐法中

就有發散之穢為假如癰病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也血

氣入任舍而拒其神不能歸馬 血傷必用姜汁傳送 黃芩治熱痰

假其下大也 竹瀝滑痰非姜汁不能行經絡 五倍子能治老痰佐

他藥大治頑痰 二陳湯一劑

痰都治常如要下行加引下藥在土

加引上藥 凡用吐藥宜升提其

氣便吐也如防風山柅川芎枳椇

茶生薑蘆汁之類或用瓜蒂散

凡風痰病必用風痰藥如白附子天

麻雄黃牛黃片苓姜蚕諸子皂

類館 諸吐法另見于後

○凡人身中下有塊者多是痰 其平日好食何物吐下後方用藥

許學士用蒼朮治痰成寒囊 邊行極妙痰痰痰血遂成寒囊 眩暈

嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山柅子黃連黃芩之類 噫氣吞酸此

食鬱有熱火氣上動以黃芩為君 兩星半夏為臣橘紅為使熱多加青

黛 痰在脇下非白芥子不能達 痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不能

導達 痰在四肢非竹瀝不開 痰結核在咽喉中燥不能出入用化

痰藥加鹹藥軟堅之味瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐朴硝以姜汁

蜜和丸為服之 海粉即海石熟痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能

消可入光于末于不可入煎藥

叔實馮痰能衝墻壁

小胃丹治膈

上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之不宜多

○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用瓜蒂葶藶氣實

必用荆瀝 天花粉大能降膈 上熱痰 痰在膈間使人顛狂或健忘

或風痰皆用竹瀝亦能養血與荆瀝同功治積重能食者用此二味效

速穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以姜汁 薑汁治

血滯不行中焦有欲自然汁冷喫兩三銀盞必胃中煩燥不寧而後愈

參夏丸能消痰 見吞酸類

入方

青礞石丸 鮮食積去濕痰重在風化硝

南星二兩切作片用白土 煎一二月

片黃芩 姜汁炒一兩

青礞石 煅切作片

茯苓

叔實

法製硝磺
硝磺內風化硝和五錢或只風化亦可又云一兩

礞石
二兩搗碎煅硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之
鐵線縛定鹽泥固濟和乾火煨紅候冷取出

右為末神麩糊九梧子大每眼三五十九白湯下

一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使

一本礞石南星各一兩無枳實

又方

半夏二兩 白朮一兩 茯苓七錢 黃芩 礞石一兩

風化硝二錢

右為末同煎

潤下丸 降痰甚妙

南星一兩 半夏二兩各依橘紅製 黃芩 黃連各一兩

橘紅半斤以水化鹽五錢
拌令得所煮乾烘燥

痰飲
心法

三

右為未蒸餅丸如蒸一且大每服五七十九白湯下

一方單用陳皮半斤鹽半兩水拌煮陳皮候乾焙燥為末入甘草末

一兩炊餅同上丸亦好去胸膈有痰無嗽上熱加青金有濕加蒼沙

或加參蓂者虛實作湯使

又方 治濕痰喘急止痛

半夏一末不拘多少

右為末粥丸梧子大每服三五十九姜湯下

又方

黃芩 香附 半夏姜制 貝母

已上治濕痰加瓜蒌仁青黛作丸子治熱痰

又方 燥濕痰亦治白濁因痰者

南星 半夏各一兩 蛤粉二兩

右為末神麩糊

八如梧子大青黛為衣每服五十九姜湯下

濕痰

加蒼朮 食積

痰加神麩麥芽山查 熱痰加青黛

中和丸 治濕痰 氣熱

蒼朮

黃芩

半夏

香附 各分

右為末粥丸如

梧子大每服五七十九姜湯下

又方 治痰嗽

苦琴 酒洗 一兩

貝母

南星 各一兩 滑石

白芥子 各半

風化硝 二兩 半取共

右為末湯泡 餅丸服

導痰湯

南星 炮 一兩

橘紅 去白 一兩

赤茯苓 去皮 一兩

枳殼 去穢 一兩

甘草 炙 一兩

半夏 四兩 云四錢

廣散

心水甘余卷七

日

人

南星 半夏 各一兩 給粉二兩

水煎生薑五片食前服

千縷湯 治喘

半夏土箱泡製每

皂角去皮炙甘草炙一寸

右咀作一服生薑如指大煎

書

小胃丹

芫花

等醋拌勻過一宿瓦器不

圖

甘遂

溫水浸長一晝夜五日或水浸亦可

大戟

水浸一晝夜

大黃

溫水浸一晝夜

黃柏三兩

右為末粥丸麻子大每服二三十九臨卧津液吞下或白湯下

下取甘高上之濕痰熱積以意消息之飲利則空心服

又方甘遂大戟各三分之一味砂為衣每服七八粒至十九止

石酒痰

青黛

瓜蒌

右為末姜蜜丸嚕化痰肺

治齶痰

白殭蚕

杏仁

瓜蒌仁

訶子

貝母

五倍子

右為末糊丸梧子大每服五十丸白湯下

導痰丸

莫茱萸

二丞制

茯苓

黃連

半兩

滑石

七丞半

蒼朮

兩 泔浸一

右為末糊丸梧子大每服八九十九丸姜湯下

茯苓丸

出千金方有一選方同

半夏

四兩

茯苓

二兩

枳殼

一兩

風化硝

半兩

...

...

五

右為末蒸餅或神麩姜汁糊丸梧子大每服二十九姜湯下 此方

治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有效

又方 治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菜豆大每服二十九白湯下

又方 治陰虛內多食積痰

川芎 七錢

黃連

瓜蒌仁

白朮

神麩

麥芽 各一兩

青黛 半兩

人中白 三錢

右為末姜汁蒸餅丸服

又吐痰喘

杏仁 去皮尖

來復丹 炒

右等分為末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

浙

圖

書

傳

黃連化毒丸

即黃連清化丸

半夏一兩

黃連一兩

吳茱萸

湯洗一錢半

批仁筒研

陳心半

右為末麩糊丸棗豆大每服一百丸姜湯送下

白玉丸

巴豆三十箇
去油

南星

半夏

滑石

輕粉各三

右為末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸姜湯下

黃瓜萎丸

治食積破壅滯喘急

瓜蒌仁

半夏

山查

神麩炒各等分

右為末瓜蒌水丸姜湯竹瀝送下二二十九

又方

瓜蒌仁

半夏一兩

蒼朮二兩

香附二兩

黃芩

痰飲

心法附錄卷之九

六

黃連 干兩

又方

瓜蒌仁 黃連 半兩 半夏 一兩

右為末 糊丸 梧子大 每服五十九

抑痰丸

瓜蒌仁 一兩 半夏 二錢 貝母 同錢

右為末 餅丸 如麻子大 每服一百丸 姜湯下

清膈化痰丸

黃連 黃芩 一兩 黃柏 山梔 半兩 香附 一兩

蒼朮 二兩

右為末 餅丸 白湯下

搜風化痰丸

人參

槐角子

蠶 養

白礬

陳皮

人參

槐角子

僵蚕

白礬

陳皮 去白

天麻

荆芥 各一

羊屎 四兩

辰砂 半兩

辰砂 半兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸辰砂包衣服四十九姜湯下

墜痰丸

治痰欬

黑豆 頭末

枳實 炒

白芷 三錢

朴硝 二錢

枳殼 炒

猪牙皂角 一錢

酒炒

右為末用蘿蔔汁丸每服五十九鷄鳴時服初則有臭次則有痰

治濕痰

蒼朮 三錢

白朮 六錢

香附 三錢

白芍 二錢

酒浸炒

右為末蒸餅丸服

治肥人濕痰

苦參

半夏 各一

白朮 三錢

陳皮 一錢

痰散

下

心

心

右理作一服姜三片竹瀝半盞水送服速吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬 一兩

防風 二兩 川芎

猪茅皂角

藜蘆 各一兩

蜈蚣 二條用赤脚黃脚各一條

右為末蒸餅丸梧子大每二十九丸食前茶湯下春以芭蕉湯探吐

上焦風痰

瓜蒌

黃連

半夏

牙皂

姜汁浸法餅丸

痰氣方

片苓炒

半夏 半兩

白木

白芍 一兩

茯苓

陳皮 三錢

右為末姜汁泡蒸餅丸服

利隔化痰丸

南星

蛤粉一两

半夏

瓜蒌仁

貝母

去心白粉

香附半斤

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎末一碗半煮杏仁去皮尖一兩

水將乾去皂角搗杏仁如泥入煎藥和再入姜汁泡蒸餅丸如菜

豆大青黛為衣每服五十九丸姜湯下

清膈丸

黃芩

半斤 油

南星

四兩 生用

半夏

湯泡

右為末姜汁打糊丸

清痰丸 專清中脘熱痰積

烏梅

桔梗

黃芩

蒼朮

陳皮

滑石炒

青皮

枳實各半兩

半夏

病例

心

村

八

八

神效妙

山查

乾生薑

香附各一

右為末湯浸蒸餅丸服

充按得溪治病以痰為重諸病多因痰而生故前諸方間有別出者亦莫平日常用故不另關於附方觀者詳焉

附論

劉宗厚曰痰之為病仲景論四飲六淫無擇叙內外三因俱為切當蓋

四飲則叙因痰而發者證者三因則論其因有所傷而生痰者也唯

王隱君論人之諸痰悉出於痰此發前人所未論可謂深識痰之情

狀而得其真者天製痰藥一方終治斯疾固為簡便較之仲景三

因有表裏內外而分汗下溫刺之法則疎濶矣况又有虛實寒熱之

不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因

風寒暑濕而得者有因氣而得者有因酒飲而得者

有因食積而得者有脾不能運化而生者有腎虛不能降火而生者若熱痰則多煩熱風痰多成癱瘓奇證冷痰多成骨痺濕痰多倦急軟弱驚痰多成心痛痞滿其為病狀種種惟石王隱君論中頗為詳及李者但察其病形脈證則知所挾之邪隨其表裏上下靈實以治也若夫子和謂飲無補法必當去水故用吐下之三法治人常愈又論熱藥治痰之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之證不用固不論夫久痰凝結膠固不通狀若寒疑不用溫藥引導必有拒格之患况有風寒外束痰氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四肢百骸發為諸病理宜導去痰瀉必當漸接兼行又難拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲食雖少胃氣卒不便虛故也亦

痰飲

卷之六

痰飲

山

一

有治痰用峻利過多則脾氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣則痰自然運下此乃治本之法也謂醫中之王道者正此類也

附脈理

脈訣舉要白偏室為飲或沉弦滑或結或伏痰飲中節

脈理提綱曰痰脈弦滑

書圖

附諸方

金沸草散和濟方治外感風寒痰氣內壅咳嗽相粘

麥蘇飲和劑方亦治外感風寒痰飲得積胸膈咳嗽氣促言語不能相

續者並見傷風類

小青龍湯和劑方治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘滿不得安臥者

見咳嗽類

消飲化痰健脾順氣

法製半夏 御藥院方 消飲化痰健脾順氣

右用大半夏以湯泡洗一遍去脐再泡洗如此七遍焙乾用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬各一兩半研細溫水化浸半夏止留水兩指許頓放浸冬月於暖處焙乾放浸五日夜取出焙乾再用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通前七日盡取出再用舊水放慢火內者勿令滾候漿水極熱取出焙乾於銀石器或磁器內收貯每服一二粒食後細嚼生薑湯下 又 法依前製成半夏每一兩用龍腦半錢研極細同飛過硃砂於半夏上再為衣却鋪上灯草一層約厚一指單排半夏於上再用灯草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器內收貯每服一二粒細嚼食後溫水下或冷水送下 橘皮半夏湯 宣明 痰嗽又不已者 淋

橘皮 去白 半兩 半夏 二錢 湯

夜食 公大對 卷之七

右為未分作二服每服水一盞半入生姜十片同煎六分温服

茯苓半夏湯 治停痰留飲胸膈滿悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓去皮三兩

半夏湯泡七次伍兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎六分空心服

大半夏湯御藥院方 治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

茯苓各半

右咬咀水二盞生姜二錢半煎至八分去滓食後温服

三陳湯和劑方 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或因食生痰飲

酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯洗七次去滑衣

橘紅陳皮去白者

白茯苓去皮三兩

甘草炙一兩半

右咬咀每服四錢水一盞生姜七片烏梅一箇同煎至六分熱服

○廣按此方半夏... 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或因食生痰飲

○廣按此方半夏

豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓降氣滲濕甘草補

脾和中益補脾

則不生濕燥濕滲濕則不生痰利氣降氣則痰消

鮮可謂體用兼

以標本兩及之藥也今人但見半夏性燥便以他

藥代之殊失立

之旨若果血虛燥症用姜汁製用何妨抑嘗論

之二陳湯治痰之

主藥也如寒痰加附子姜桂濕痰加蒼白二木

食積痰加麩蘖小

香熱痰加本連梔子風痰加南星皂角燥痰加

瓜蒌青黛薄痰加

枳殼香附老痰加海石朴消乃合其宜

丁香半夏丸 和劑方

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噎氣心腹

痞滿不思飲食

肉豆蔻

木香

丁香

人參

陳皮 去白各

藿香葉 半兩

半夏 半兩

溫酒泡七次
並入製三兩

右為末以生姜汁煮糊丸如小豆大每服二三十丸姜湯下

痰食

心法可除痰之七

十一

一

○已上數方治寒痰之劑

平胃散 治有濕痰倦怠 軟弱嗜臥 沉困無力 方見中溫

五苓散 治臍下有悸 停飲 癰眩吐涎沫 方見溫熱

化痰丸 本事方 治停痰宿飲

半夏湯泡 人参 去心 桔梗 細切 姜 白朮 枳實

香附子 白茯苓 前胡 去芦 甘草 各半

右為末 用半夏姜汁煮 杏仁如梧桐子大 每服四五丸 姜湯下

檳榔散 消生方 治胸膈停滯 痰飲腹中虛鳴 食不消化 時或嘔逆

杏仁 去皮 旋覆花 半夏 湯洗 枳殼 各一 甘草 五各

桔梗 去芦 白朮 略炒 人参 五各 乾姜 炮 橘紅 各

右以明每服四錢水一盞 半姜五片煎至六分 溫服

半夏湯 瑞竹堂方 順陰陽 痞病消酒化痰

半夏去毒

橘紅去白

桔梗去苦

枳實去穢

右吹咀每服四錢水一盞

平生寒五片煎至七分半饑半飽熱服

海藏五飲湯

按方一四飲

心下二癢飲臨下三癢飲胃中四溢飲膈

上五流飲腸間凡此五飲

酒後淫寒飲冷過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

桂枝

前胡

桂心

芍藥

甘草各等分

右剉每兩分四服水二

盞半姜半片同煎至六分取清溫服不拘時

候忌食肉生冷滋味

物因酒有飲加葛根花砂仁

獨飲枳實丸

按方逐飲

消痰導滯清膈

枳實去穢

半夏

陳皮

厚朴

枳實

右為末水煮麵糊為

丸如梧桐子大每服五十九生薑湯下食後

葛花解醒湯 治

飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞

戰慄飲食減少小便

不利 凡傷食者

一方 治痰飲流注疼

用大半夏二兩湯浸

芩米鳳尾朴硝二兩生薑自然汁糊丸如梧桐

子大每服五丸姜湯

痛在上脘卧服痛在下空心服

○已上數方治濕痰食積痰之劑

清氣化痰丸 古方清

自涼膈化痰利氣

半夏 湯泡七次二兩 陳皮

茯苓 去皮各一兩半 薄荷葉

荆芥穗 各五

黃芩 酒浸炒 連翹

梔子仁 炒 桔梗 去芦

甘草 炙各一兩

右為末姜汁煎水打

丸為丸如梧子大每服五

丸食後臨卧各一

服如腸胃燥實加酒炒

入黃芒硝各一兩

○廣按此方即一陳湯

不涼膈散相合是也蓋痰因火動故作

治痰飲流注疼

右清頭目昏眩今因三以豁痰利氣涼膈以降火散風熱何者
之不瘳哉

痰癆丸 御藥院方 治三焦氣 痰飲不利胸膈痞滿咳嗽稠粘面目熱

赤肢體倦怠不思飲食常 服升降滯氣清膈化痰

木香 換梅 青皮 去白 陳皮 去白 京三稜 煨

枳殼 去穢 煨 半夏 洗七 各一 天黃 二兩 黑牽牛 煨炒 二兩

右為末水糊丸梧桐子大 服四五十九羹湯食後下

利膈丸 按方 治風勝痰實 而滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛 炒四 兩 半夏 洗 皂角 去皮弦酥炙各二兩 青皮 去白

槐角子 炒 木香 各二 兩 乾榔 各半 大黃 兩

右為末生姜糊圓如梧桐 子大每服七十九生薑湯下食後

開結枳實丸 御藥院方 宣道 氣消化痰飲升降陰陽通行三焦

疾每 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

脾胃流暢大小腸開道腰

胃主胃中痞逆惡心嘔噦飲酒不消宿

食停積兩脇膨脹咽嗝不

利上氣喘嗽黃疸等症

枳實炒 白朮

半夏製 南星炮 白礬枯

苦苈炒 大黃

青皮去白各 木香三 黑牽牛頭末

大皂角炙去

旋覆花各

右為末生薑汁糊為丸梧

下大每服五十九丸姜湯下無時婦人乾血

氣膈實腫泄或大便不通

小便不利生薑葱白湯下

王隱君滾痰丸

括口甕裏翻身甲掛金子

牛頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煨青

礞倍若沉十七兩中寒半

閃水丸桐子意常斟子般恠証如神效水

瀉奴身却不任

大黃酒蒸

黃片各

沉香半兩

沉香半兩

礞石 一兩 煨碎 磁石 一兩 用入小神爐內 煨之

一方加硃砂二兩 研為細末為水

右為細末水丸梧子大每服四五十九量虛實 減服茶清溫水任

下臨臥食後服

按此以大黃黃芩為君大為陽明濕熱之藥礞石以墜痰沉香則引

諸氣上而至天下而至泉為使也

大和膈丸 按神方 主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

不香 七錢 枳榔 七錢半 厚朴 一兩 人參 五錢 藿香葉

當歸 甘草 枳實 大黃 酒浸焙

右為末水浸蒸餅丸如梧子大每服五十九溫水下食後或臨臥服

○已上數方治熱痰之劑

辰砂化痰丸 和初方 治風化痰安神定志利咽隔滯頭目

痰飲

五寶丹

十一

白礬一兩 辰砂一兩 半夏一兩 南星一兩

右以白礬半夏一兩 天南星一兩 為末和勻生薑汁煮

用辰砂為衣每服二十九食後姜湯下

半夏利膈丸每服一丸 治風痰壅盛頭疼自眩因膈不利涕唾稠粘

治過酒停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏三兩 白朮一兩 白朮去皮 白礬一兩 人參去

滑石一兩 貝母一兩 白附子一兩 天南星一兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服二十九食後

葉氏分涎方簡易方 治風痰留滯膈間滿惡心

東皮老白 棟參 枳實 苦

半夏一兩 天南星一兩 為末和勻生薑汁煮

夫為虛熱外熱則吐酸

右吹咀每服一錢水一盞姜十片同煎後服

右吹咀每服二錢水一盞姜十片同煎

靈砂白丸子 濟家方 治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂 青州白丸子末

右為末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子大每服三十丸

空心入參湯或薑湯下

大人參半夏丸 宣明方 化痰墜涎止欬定喘治諸痰不可盡述

茯苓 去皮 人參 去芦 天南星 薄荷葉 各半 乾生姜

半夏 白礬 生 寒水石 蛤粉 二兩 藿香葉 二兩

右為麵糊丸如小豆大生姜湯下二三十九丸食後溫水亦得一丸

黃連半兩黃蘗一兩水丸取效愈速治酒病調和臟腑尤宜服之

治風痰不下 聖惠方

荆芥 四兩 白礬 生 一兩 槐角 生 二兩 陳皮 半夏 各二兩

漢 漢 漢

右為末水糊為丸如梧桐子大每服四

十九生薑湯下

辰砂祛痰丸 聖惠方 治酒食過多酸醜作

成痰飲聚於胸中凝則嘔逆

惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深

則左癱右瘓淺則蹶然因地

此藥神效

硃砂一兩水糊一升

半夏四兩

槐角炒

陳皮

白礬生

荆芥各一兩

生薑四兩

餅陰乾

右為末姜汁打糊丸如梧桐子大每服

二十丸生薑湯皂角子湯佳

忌動風動氣物食後溫服

化痰丸 瑞竹堂方 快脾順氣化痰消食

半夏淨洗

皂角切碎

天南星

皮生薑

白礬

右件各四兩用砂鍋內同水煮至八兩且

無白點為度揀去皂角不用

將半夏天南星生薑切細晒乾如入無口色慢火焙乾加後藥

青皮

陳皮

乾葛

蘇子

神麩

麥蘖

蘿蔔子

山查

香附子

杏仁

一方加必買茯苓

右子味各

一兩合煎藥碾末黍米餅打糊丸如梧桐子大每服五

七十丸食

後服卧茶酒任下

利膈化痰丸

白木

皂角

生半夏

生白礬

右將皂角

搽水半碗浸半夏白礬春五夏三秋七冬十日不用皂角

晒乾為末

姜汁糊為丸如梧桐子大每服三十九丸姜湯下

○口上數方治風痰之劑

四七湯

治七情氣鬱結聚成癰狀如破絮或如梅核在因喉之

間咯不出

不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

痰飲

...

...

半夏

茯苓

紫蘇

厚朴

右咬咀每服四

錢水

一盞半生薑七片棗子一枚煎至六分熱服

人有孕惡阻亦服之但半夏用姜汁製過男子因氣而小便白濁

用此湯下青州白丸子有效

三仙丸

中皖氣滿胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星

生薑洗七次各五兩為末用生薑自然汁和

是五六

香附子

磨去毛五兩

右為末麵糊丸

如梧子大每服四十九丸食後姜湯下機要去香附加

攝紅名王粉丸

氣痰

沉香和中丸

証同前

陳皮

去

枳殼

檳榔

木香

黃芩

香

礞石

大黃

沉香

滑石二兩

墨牽牛頭末二兩

二兩

右為禾滴水為丸如梧子大每服五十九茶清下臨卧

節齋化痰丸

論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清蓋蒸成而聚而變為痰烏痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用二味以為治痰通用者所以實脾燥濕治其標也然以之而治濕痰寒痰痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱結成粘塊凝滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成歲月積久根深蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰等痰痰飲痰涎之比也故湯藥難治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南星等

痰飲

痰飲

痰飲

痰飲

藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而消化凝結之痰緩以
治之庶可取效今製一方于后

天門冬去心黃芩酒炒海粉另研瓜蒌仁另研橘紅去白

桔梗去芦香附子炮碎淡鹽水浸炒連翹另研青黛另研

芒硝三錢另研

右為極細末煉蜜入生姜汁少許和勻末杵極勻丸如小龍眼大噙
化一九或嚼爛清湯細嚥之或丸為細丸如黍米大淡姜湯送下五
六十九

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃脘皆受
火邪故鬱滯而成此方用天門冬黃芩清世肺火也海粉芒硝鹹以
軟堅也瓜蒌仁潤肺降痰香附米開胃降氣連翹開結降火青黛
解鬱散痰皆不用辛燥之藥

○已上數方治轉痰老痰之劑

蘇子降氣湯和劑方 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

川當歸去 甘草炙 前胡去 肉桂炙 厚朴去皮姜制

半夏麩 紫蘇子各五 陳皮白

右攻咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

俞山人降氣湯和劑方 治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾不利并

治脚氣上攻煩渴引飲



前胡去 五加皮炙 黃芪 肉桂 當歸去

半夏麩 紫蘇子 陳皮白 厚朴去皮姜制

桔梗 羌活去 甘草炙 乾姜炒 附子去

人參去

右攻咀每服五錢水一盞半紫蘇三葉姜三片棗一枚煎服

痰嗽

痰嗽

痰嗽

黑錫丹 和劑方 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭及婦人血

海久冷無子或赤白帶下並皆服之

肉桂 去皮 半兩

沉香

附子 去一

蒟蒻巴 酒浸

破故紙

茴香 船 上 考 砂

肉豆蔻 炮 炒

陽起石 水 淘

金鈴子 蒸 去 皮

米香 各 兩

硫黃

黑錫 去 毒 各 一 兩

右用黑蓋或新鉄鉢內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火盡研令

極細餘藥並杵羅為末一處和勻自朝至暮必研令黑光色為度酒

糊為丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十粒空心鹽

姜湯下 女人艾棗湯下

砂丹 和劑方

治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮降陰陽安和

五臟扶助元氣

水銀

硫黃

右用新鉄鉢內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火盡研令極細餘藥並杵羅為末一處和勻自朝至暮必研令黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十粒空心鹽姜湯下 女人艾棗湯下

右用新鉄鈹炒成砂有烟以醋酒候研細入水火鼎醋調赤石脂
封口鉄線孔縛晒乾盜沉固濟用炭二十斤煨如鼎裂筆蘸赤石脂
頻抹火盡為度經宿取出研為末糯米糊為丸如麻子大每服二十
粒空心棗湯米飲入參湯任下

○廣按已上四方並係類聚溫熱之藥而出證皆云治上盛下虛氣
不升降蓋謂盛者即心火之炎虛者即腎水之弱火炎水弱則有
升無降故津液湧而為痰稠粘膠固凝滯於會膈之間非金石丹
藥溫熱香燥之劑而能流通開散之乎書云重可以去怯正所謂
劫劑也用此劫劑之後又當用兼補兼消之藥繼之如六味地黃
丸之類是也

金匱腎氣丸 即六味地黃丸 治腎虛有飲故用此藥補腎逐水 見補劑

○廣按腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而為痰痰用此劑補

腎逐水乃端本之藥也前出錫丹等劑溫脾劫痰乃治標之藥也

六君子湯 治脾虛不進飲食嘔吐痰水 方見調補脾胃

白朮湯 蘇并方 治胃中虛損及痰吐者

半夏麩兩 白朮錢 檳榔半 木香 甘草各

茯苓錢

右為末每服二錢生姜湯調下食前服

八味丸 治脾腎兩虛痰唾而不咳者 方見補損

○已上數方治虛痰之劑

○廣按痰本津液因熱而成熱則津液薰蒸而稠濁故名為痰也痰

之為物隨氣升降無處不到或在臟腑或在經絡所以為病之多

也若夫寒痰濕痰熱痰則且勿治至於風痰燥痰老痰則難治也分

而治焉寒則溫之濕則燥之熱則清之風則散之燥則潤之老則

軟之燥而治焉用入參甘草以補脾胃半夏白朮以燥濕陳皮青皮

軟之總而治焉用人參甘草以補脾半夏白朮以燥濕陳皮青皮以
以利氣茯苓澤瀉以滲水是舉其綱也如寒痰加以附子姜桂濕
痰加以蒼朮厚朴食積痰加以麩麥山查熟地加以岑連梔子風
痰加以南星皂角燥痰加以瓜蒌杏仁鬱痰加以根殼香附老痰
加以海石芒硝是張其目也雖然痰證又有虛者不可不加補
藥焉如挾氣虛加以四君血虛加以四物脾虛加以六君腎虛治
以六味分其表裏上下審寒熱虛實而施治之未有不中其情者

痰飲治例

出明醫雜者

王節齋曰痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之由或七情飲食所傷
以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或疑滯如日隔或留聚腸胃或
流注經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不到其為病也為喘為痰
為惡心嘔吐為痞隔壅塞關格異病為泄為眩且為博雜怔忡驚悸

痰飲

心去付余卷之七

二

為癩狂為寒熱為痛腫或胃間轉轉有聲或背心一點常如冰冷或
四肢麻痺不仁皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新
久輕重之殊新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠
粘凝結效之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰
生於脾胃宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先分道痰之又氣升
屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之薄痰則
開之頑痰則軟之食積痰則消之在上者吐之在下者下之又中氣
虛者宜固中氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣

主方二陳湯

橘紅

半夏

湯泡

白茯苓

甘草

生姜

右方摠治一身之痰如要下行加引下藥上行引上藥

濕痰多軟如身體倦怠之類如蒼白木

痰病寒熱中位如半夏宜有九麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛

寒痰痞塞胃中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏

風痰加南星枳殼白附子天麻姜蚕猪牙皂角之類氣虛者更加竹

瀝氣實加荆瀝俱用姜汁

包

熱痰加黃芩黃連痰因火盛逆上降火為先加白木黃芩軟石膏黃連之類眩暈嘈雜者火動其炎也亦加山梔黃連黃芩

血虛有痰者加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝姜汁 滯血者更

加黃芩白芍藥桑白皮 血而不行中焦有飲者取竹瀝加生姜

菲菜自然汁吃三五銀盞必有中燥煩不寧後愈

氣虛有痰者加人參白朮 脾虛者宜補中虛以運痰降下加白朮

白芍藥神麩麥芽兼用升麻提超 內傷挾痰加人參黃耆白朮

之類姜汁傳送或加竹瀝尤妙

食積痰加神曲麥芽山楂炒黃連實以消之甚者必用攻之宜丸
藥兼血虛者用補血藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養
卒不便虛若攻之盡則虛矣

老痰用海石半夏瓜蒌仁香附米連翹之類五倍子佐他藥大治頑
痰宜丸藥 喉中有物咯不出嚥不下此痰結也用藥化之加醋
藥軟堅之類宜瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝姜汁
煉蜜和丸噙服之脉脉滴者難開必費調理氣實痰熱結者吐
難得出或成塊吐咯不出氣滯者難治

痰在膈上必用吐法瀉之不吐膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰
在經絡間非吐不可吐中就發散之義凡用吐藥宜升提其
氣便吐如防風川芎桔梗 蒼生姜薑汁之類或瓜蒂散凡吐用
布緊勒肚於不連風處行走

痰在腸胃間可下而愈故實甘遂巴豆大黃枳實之類凡痰用利藥
過多脾氣易虛則痰易生而多

痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非葶苈竹瀝不可入在四肢非竹瀝不開在經絡中

亦用竹瀝必佐以生薑韭汁膈間有痰或癲狂或健忘或風痰俱

用竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

凡人頭面頸項身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處

用藥消之

痰痰丸攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰息驚風痰盛者最為要藥常

宜合備但須量入虛實而用之

○痰熱新増

痰飲

心法附錄卷之九

二十一

附諸賢論

劉宗厚曰夫痰熱之反有因熱而生痰者有因痰而生熱者按因熱而生痰者熱則蒸蒸津液而成痰因痰而生熱者痰則阻碍氣道而

附諸方

四神丸 起痰良方 治痰涎壅盛頭昏目眩有背拘急手足頑麻

天麻六者 南星除湯 防風 去蘆各薄荷葉 半兩

右為末酒糊為丸如菉豆大每服二十丸荆芥生薑湯下食後

龍星丹 治諸風熱壅痰盛

解毒雄黃丸 治上膈壅熱痰涎不利 並見中風

鵝砂散 和劑方 治大人小兒風痰壅塞喉閉生瘡鼻衄出血

山藥 六生 腦子 元兩 牙硝 一分 甘草 二十 射香 一分

鵬砂 二十

一右為末每服半錢好茶點服

上清丸 治膈間痰熱口舌生瘡

見風熱

喉腫痛咳喘滿煩燥不安

哮喘 二十八

丹溪心法

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋不用涼藥須常帶
表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者 一法用二陳湯加蒼朮黃芩
作湯下小胃丹看虛實用

入方 治寒包熱而喘

哮喘

圖書

半夏

枳殼炒

桔梗

片苓炒

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

右水煎服

天寒加桂枝

治哮喘積方

用雞子一箇畧敲殼損膜不損

湯朱缸內三四日夜取出煮熟喫之

効蓋雞子能去風痰

圖

紫金丹 治哮喘三年後可用

用精猪肉二十四兩

一作三兩

切作散子塊用信

一兩明者研極細末拌

在肉上令勻分作六分用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾却用白炭

火於無人處煨青烟出盡為度取出地上一宿出火毒研細以湯浸

蒸餅丸如菜豆大食前茶湯下大人

二十丸小兒七八丸量大小虛

實之

喘而二十九

丹溪心法

館

○喘病 氣虛 陰虛 有痰 凡久痰之証未發宜扶正氣為主已發用攻邪為主 氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加干縵湯有痰亦短氣而喘陰虛自小腹下火起衝於上喘者宜降心火補陰 有火炎者宜伸心火清肺金 有痰者用降痰下氣為主 上氣喘而躁者為肺脹欲作風水証宜發汗則愈 有喘急風痰上逆者大全方干縵湯佳或導痰湯加干縵湯 有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火 諸喘不止者用劫藥一二服則止劫之後因痰治痰因火治火劫藥 椒目研極細末一二錢凡姜湯調

喘痰

六十一卷

二

一

下止之氣虛不用 又法薤白子永熟為君皂用燒灰等分為末生薑
汁煉蜜丸如小豆大服五七十丸噤口止之 氣虛者用人參蜜炙
拍麥門冬地骨皮之類 氣實人因服則民過多而喘者用三拗湯以
瀉氣 若喘者須用阿膠若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子以
補之 若新病氣實而發喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火火主喘痰喘者凡喘便有痰
聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩頓項喘而不
休火炎上喘者乍進乍退得合則減食已則喘大槩胃中有實火腸
上有稠痰得食入因墜下稠痰而即止稍久食已入胃反助其火痰
再沐上喘久大作俗 不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也
葉都督患此諸醫作 胃虛治之不愈後尊水丸利五六次而安

入方

痰喘方

南星 半夏 杏仁 蘇子 香附

陳皮去 皂角炭 蘇子

右為末神麩糊丸每服六七十丸姜湯下

又方

蘿蔔子蒸半 皂角半 海粉兩 南星兩 白礬子半姜

右用瓜萎仁姜蜜丸噉化

切喘藥

好銅青細研 號丹少許炒

右為末每服半錢醋調空心服

附諸賢論

王節齋曰喘與脹二症相因必皆小便不利喘必生脹脹則必生喘

喘疾

心法

二五二

浙江圖書

葉都叔曾患此諸醫作胃虛治之不愈後谷道水丸利五六次而安

但更識得標本先後先喘而後脹者主於肺脹而後喘者主於脾

何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通於水道下輸膀胱又曰

勞說者州都之官津液藏焉氣化則能出矣目不使之行由於肺氣

之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小便澀短以

致水溢皮膚而生腫滿焉此則喘為本而腫為標治當清金降氣為

主而打水次之脾土惡濕外主肌肉土能剋水若脾土受傷不能制

水則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不得降而生喘

矣此則腫為本而喘為標治當實脾行水為主而清金次之苟肺症

而用燥脾之藥則金得燥而喘愈如脾病而用清金之藥則脾得寒

而脹愈甚矣近世治喘脹者但知實脾行水而不知分別肺脾二症

予故為發明之

附脉理

論曰凡此證脈滑而手足溫者一脈瀉而四肢寒者死

袖珍方論曰凡此證脈滑而手足溫者生一脈滑而四肢寒者死

附諸方

三拗湯 和劑方 治感冒風寒鼻窒聲重語音不出咳嗽喘急

生甘草

麻黃

不去節

杏仁

各等分

右吹咀每服五錢水一盞姜五片煎服以得汗為度

華蓋散 和劑方 治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得聽息或聲

音不出者

小青龍湯 和劑方 治感寒咳嗽喘急不得聽息

蘇沉九寶湯 簡易方 治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不

已咳嗽乳啼夜不得睡 並見咳嗽

分氣紫蘇散 和劑方 治脾胃不和氣逆喘促

五味子 去梗

桑白皮

茯苓 去皮

甘草 炙

草薢仁

大腹皮

陳皮去白

桔梗各二

右艾咀碎二兩入淨紫蘇一兩五錢搗碎同一處拌勻每服四錢水

一盞姜三片入盞少許同煎空心服

紫蘇子湯

治因憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹及喘促煩悶

治因憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹及喘促煩悶

馮氣走流瀉有聲大小便不利脉虛數而瀉

見氣辨

杏仁半夏湯宣明方治肺氣不足喘咳救不已并傷寒往來寒熱

杏仁去

桔梗

陳皮去

茯苓去

漢防已

桑白皮

白礬各二

猪牙皂角

薄荷葉各一

甘草二寸

右為末作二眼水一盞生姜三斤煎至六分食後溫服

蒸產散

治過食煎燔或飲酒過度致肺壅喘不得安臥及肺癆

治過食煎燔或飲酒過度致肺壅喘不得安臥及肺癆

相燥不渴渴嘔腥臭

甜葶藶

桔梗去

瓜蒌仁

川升麻

薏苡仁

桑白皮炙

葛根各一兩

甘草五

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

定肺湯直指方治上氣喘嗽

紫苑

五味子

橘八錢

甘草炙

紫蘇子炒

杏仁去皮尖炒

桑白皮炒

半夏炒

枳殼炒

右吹咀每服一兩生姜五片紫蘇五葉水一盞煎至一盞食後溫服

○已上數方攻邪之劑

人參潤肺湯宣明方治肺氣不足喘急咳嗽不已往來寒熱自汗

見咳嗽

蘇子降氣湯和劑方治虛陽上攻喘促咳嗽見痰類

杏蘇飲直指方治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉一兩五味子

大腹皮

烏梅去核

杏仁去皮尖

陳皮去白

桔梗

麻黃去節

桑白皮炒

阿膠炒各七錢半

紫苑

甘草各一兩

右咳喘每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

至華散五方

治咳嗽上喘調順肺金清利咽膈安和神氣

甜葶藶焙

桑白皮炒

天門冬去心

馬兜鈴

半夏製

紫苑

杏仁去皮

貝母炮

百合

人參各五錢

百部

甘草各二錢半

右咳喘每服一兩水二盞生薑四片桑子三枚煎至一盞去滓食後

溫服一方無生薑煎

杏參散方

治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息寢卧不得

○已上數方半攻半補之劑

神秘湯三因方治上氣喘急不得卧者

橘皮法 桔梗 紫苑 五味子 人參 各藥分

橘皮去白

桔梗

紫蘇

五味子

人參各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎六分食後服

知母茯苓湯宣明方治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗見肺痿

五味子湯活人方治喘促脉伏而數者

五味子半兩 人參 麥門冬去心 杏仁去皮 生姜

陳皮各半 棗子三枚

右吹咀作二服每服水二盞煎至一盞食後溫服

寧肺湯楊氏家方治痰衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰壅稠黏

見咳嗽

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接見發熱

○已上救方補虛之劑

人參理肺散按方治喘不止

補痰

治喘

補虛

救方

麻黃去節炒 木香各一兩 罌粟殼三兩 人參二兩 杏仁三兩

當歸兩

右艾咀每服八錢水一盞半煎至八分去查食後温服

紫參散救時方 治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黃 桔梗 五味子 甘草炙 紫參各一兩

罌粟殼二兩 炒黃也

右艾咀每服一兩水一盞半煎至八分温服食後

○已上三方止瀉之劑

惡心 三十一

浙

冊溪心法

○惡心有痰 有熱 有虛 皆用生薑 吐酸 吐苦 吐酸 吐苦

○惡心有痰 有熱 有虛 皆用生薑

藥佐藥

戴公惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心

經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也

附諸方

大半薑湯

半薑

陳皮

茯苓各二錢半

右以咀水二盞生薑二錢半煎八分食後服

小半薑茯苓湯

半薑五兩

茯苓三兩

右以咀母服八錢用水一盞半煎至一盞入生薑自然汁投藥中更

煎一二沸熱服無時 或用生薑半兩同煎

加味一陳湯

惡心

小

一

心法中論卷之九

丁香

橘紅

茯苓

干姜

黃連 姜汁炒

二更 姜汁炒 各

右研一服水二鍾姜五片煎八分溫服

知味 主姜理中湯

參

白朮

生姜

甘草

平夏

木皮 各等分

右煎服

嘔吐 三十一

丹溪心法

凡有聲有物謂之嘔吐 有聲無物謂之噦

胃中有熱者上為嘔 胃中

二陳湯加炒山梔黃連生薑 有人病嘔者胃虛不納穀也用人參生

浙江圖書

二陳湯加炒山施黃連生薑 有久病嘔者胃虛不納藥也用人參生

姜黃芪白朮香附之類 嘔吐未奉以半夏橘皮生薑為主 劉河

間謂嘔者火氣炎上此特一二 嘔耳 右痰膈中魚食不得下者 有氣

逆者 有寒氣鬱於胃口者 有食滯於心肺之分而新食不得下而又

出者 有胃中有火與痰而嘔者 吐藥忌山藥杏仁桃仁蘿蔔子

山施皆要吐丸藥帶香藥行 散不妨 注船大吐渴飲水者即死宜便

飲之最妙

附脈理

脈訣舉夏曰滑數為嘔代有霍亂微滑者生瀯數凶斷

附諸方

香薷飲 和劑方 治伏暑而嘔 見中暑

四君子湯 按粹方 治久病胃虛而嘔

卷上

本草綱目卷之六

卷上

茯苓

白朮

人參

黃芪

白朮每服一兩水二盞姜五片煎一盞去滓溫服

錢氏白朮散 治症同前 見痢類

加味理中湯 和劑方 治胃感寒嘔吐不止

人參

白朮

乾姜

甘草

丁香

石炭溫生姜十片水煎服

大蘆香散 治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈

滿不進飲食

藿香葉

半夏

白朮

人參

木香

茯苓

枳椇

枳殼

橘皮

甘草

古為米每服五錢水一盞薑五片煎六分溫服棗一枚

養胃湯 治脾胃虛冷不思飲食嘔吐泄瀉

白豆蔻仁

人參

丁香

積砂仁

肉豆蔻

白豆蔻仁 入心 丁香 宿砂仁 內豆蔻

附子炮 甘苦下 沉香 橘紅 麥芽

神麴各二錢

右為細末每服二錢姜盞湯下

旋覆花湯清生方治中脘伏痰吐逆

旋覆花去梗 半夏湯炮七次 橘紅 乾姜炮 枳實

人參去芦 甘草炙 白朮炒

右以咀每服四錢水一盞姜七片煎藥不拘時

加味二陳湯 治停痰結氣而嘔

半夏 橘紅各五 白茯苓三 甘草炙一 砂仁

丁香五 生薑三四 右水煎服

霍香養胃湯各五 治嘔吐不已

霍香 養胃 湯 治嘔吐不已

藿香葉一兩 半夏二兩 陳皮一兩 甘草二兩 厚朴二兩

蒼朮三兩 湯浸

右為粗末每服二錢水一盞半生姜五片棗一枚同煎至半溫服

生姜橘皮湯 治乾嘔或致手足厥冷

橘皮四兩 生姜半斤

右咬咀水七盞煮至三盞去滓逐旋溫服

澤生竹茹湯 治熱嘔或因飲酒過度而嘔者

葛根 半夏湯泡七次二兩 甘草炙一兩

右咬咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯 治發熱而嘔

柴胡二錢 半夏湯洗一錢 黃芩 人參 甘草炙各七

竹茹一兩 橘皮一兩

石岐咀水一盞生姜七片煎六分溫服

石咬咀水一盞生薑七片煎六分温服

三一承氣湯

宣明方

治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不暴快

時覺腹痛滿者或下利赤白而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而

不通上為嘔吐隔食前熱入前細察脈

○廣接三因方言嘔吐証忌用利藥此言其常然大小腸膀胱熱結

而不過上作嘔吐隔食若不用利藥開通後世則嘔吐何由而止

或只嘔吐而大小便不秘澀者此利藥又當所忌也

吐虫而嘔方

黑鉛炒成灰槐樹末等分米飲調下

欬逆

三十二

浙

欬逆

三十一

三十一

丹溪心法

○痰逆有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之其詳在格致條論

不足者人參白朮湯下大補丸 有餘并有痰者吐之人參麩之類

痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃燥痰不出 痰者陳皮半夏

虛人參白朮 陰火黃連黃柏滑石 痰逆自刷者滑石甘草

白芍人參白朮陳皮加竹瀝服

戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多

附諸方

半夏生薑湯 治咳逆欲死

半夏一兩二錢 生薑一兩

在公水二盞煎八分去滓分作二服

稀糜湯 治胃膈痰瀉咳逆不止

浙江

柿蒂

丁香

右咬咀每服三錢水

薑五片煎服

菟活附子散

濟生方

治吐

利後胃寒

菟活

附子

去

茴香

炒

乾姜

炮

木香

去

棗少許

右咬咀每服二錢水

一盞豆少許煎至半盞溫服不拘時一方去

木香用丁香三因方二香並用

圖

橘皮湯

齊生方

治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮

去白

人參

甘草

炙

右咬咀每服四錢水

一盞竹茹一小塊生姜五片棗二枚煎七分溫

服不拘時

○廣按欬逆之症乃胃

以蒸薑津液成痰凝滯於胃膈之間阻碍氣

欬逆

欬逆

欬逆

道所以咳逆也

二方治吐利後胃寒胃熱咳逆然吐利後胃

熱咳逆者常多而用

吳咳逆者于百中而一二也

人參白朮湯

人參

黃芩

柴胡

乾姜

梔子仁

甘草各二兩

白朮

防風

半夏炮

五味子

右次咀每服四錢姜三片煎

圖

桂苓白朮散宣明方

消痰

咳逆散痞塞開堅結痛悶進飲食調和

臟腑

棟桂

乾生姜各二兩

茯苓去

半夏各一兩

白朮

陳皮去白

澤瀉各半

右為末麵糊丸如小豆生

湯下二三十九日三服病在上食後病

在不食前在中不拘時一方

加黃連半兩黃柏二兩水丸取效

灸法 見溫病

灸法 見溫熱

大補丸 見補換

翻胃 三十三

丹溪心法

○翻胃大約有四 血虛 氣虛 有熱 有寒 兼病 必用童便

汁竹瀝半羊乳生薑汁 氣虛人四君子湯右手脈無力 血虛人四

物湯加童便左手脈無力 切不可用香燥之藥若服之必死宜薄

味 治反胃用黃連三錢生薑汁浸炒山查肉二錢保和丸二錢同為

末糊丸如麻子大胭脂為衣入參湯入竹瀝再煎一沸下六一丸有

痰二陳湯為主寸關脈沉或伏而大 有氣結宜開滯道氣之藥可開

麻沉而瀉 有內虛陰火上炎而反胃者作陰火治之 年少者四物

湯清胃腕血燥不潤便故滋格致餘論甚詳 年老雖不治亦用參朮

關防氣虛胃虛 氣虛者四君子湯加薑根童便或參苓白朮散或並

汁牛羊乳或入駝駝尿 又有積血停於內而致當消息逐之六便澀

者難治常令食兔肉則便利 翻胃即膈噎 膈噎乃翻胃之漸 發

揮備言 年高者不治 耆如羊屎者斷不可治大腸無血故也

戴云翻胃血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛

者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者

脉滑數二者可治血虛者四物為主氣虛者四君子為主熱以解毒

為主痰以二陳為主

入方

用馬剝宛燒灰存性一錢炒米肉平胃散二錢

右知力溫酒調服食即可不熱後隨症調理

用馬刺兒燒灰存性一錢好酒內平胃散二錢

右和勻溫酒調服食即可下然後隨病源調理

又方

茱萸

黃連

貝母

瓜蒌

牛膝

治翻胃

韭菜汁二兩牛乳一兩

右用生姜汁半兩和勻溫服效

治翻胃積飲通用

益元散生姜自然汁澄白脾丸小九子時時服

溫清丸 治翻胃伐肝邪

乾姜

滑石

甘草

右為末丸服

附諸方

調胃

心胃氣痛丸

三

浙江圖書館

撞氣阿魏丸 和劑方 治五種噎疾九般心痛痰癖氣塊腹中痞

酸水丈夫小腸氣婦人血氣並治之

見諸氣

木香通氣散子 治一切氣噎塞痰飲不下

青皮

木香

蓬萊米

煨榔

陳皮

蘿蔔子

養香葉

甘草

人參

枳殼

香白芷

石為末每服五錢水二盞煎八分溫服

瓜蒌實丸 濟生方

治胸痞痛微背屬喘急妨悶膈壅翻胃

方是

死類

人參利膈丸 在粹方

治胸中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯推陳致

新治

膈氣聖藥

木香

煨榔

人參

當歸

薑黃

甘草

枳實

大黃

厚朴

石為末滴水為丸梧桐子大每服五十九丸

右為末滴水為丸梧桐子大每服三十丸
水送下

棗肉平胃散 開胃進食

厚朴 姜制

陳皮 去白各三

山豆 草

紅棗

生薑 各二

蒼朮 泔浸一宿

館

方加扶苓人參

右剉拌勻以水浸過面上半寸許曬乾焙
為末每服二錢薑湯送

心點服

保和丸 消食開胃

兒積

圖

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

道寧純陽丹 治痰涎聚於中脘不能得導

坐見調補脾胃

○已上數方消道之劑

白朮和胃丸 治脾胃虛弱不能運化

和中散 同前

和胃

心後計...

三...

八珍湯 同前

參茸白朮散 同前 假見潤補脾胃

○已上救方補虛之劑 館

燒針丸 此藥清鎮專主狂逆

黃丹 不以

右研細用去皮小棗肉丸如鷄頭子大每用一丸對餐於燈上燒灰

為末乳汁下

神仙奪命丹 專治噎食

烏梅 十三兩水

硃砂 二兩

麝香 一分

百草霜 五錢 菜豆

黑豆 九粒

右將烏梅汁爛前藥并豆為末入梅再搗和勻丸如彈子大以乳香少加珠砂為衣陰乾每服一丸空心嚼化待藥盡烙熟餅一箇壓碎

入熱茶泡食之無礙 煎過三五日依法再服一丸即愈極有神效

入熱茶泡食之無碍

竅過三五日依法再服一九即愈極有神功

治膈氣經驗方

用大鯽魚白死者活

者不効剖去腸留鱗用大蒜去皮薄切片填之

魚腹內仍合魚用濕

紙包定次用麻縛之又用熟黃泥厚厚固日微

乾炭火慢慢煨熟

出去鱗刺骨用平胃散研丸如梧桐子大日晒

乾瓶收勿令泄氣

服空心米飲下三十九

槿花散

治翻胃

圖

以千葉白槿花

為京陳米湯調下三五口不轉丹服

一方 治轉食

用翻翅鷄一隻煮

聖善骨入人參常歸並各五錢為細末每煮取與

食之勿令人共食

一方 治翻胃不閉

切久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆
天用清油一斤瓦瓶浸虎脂一月厚綿紙封口

勿冷氣泄每用清
一兩入無灰好酒一大鍾調勻不拘時溫服服

盡病減其虎脂再
油再浸再可治三人若一時無虎指只用珠子

硫黃細研半兩水
二錢半入研黃末研至無水銀星再研如墨煤

色每服三錢生薑
兩取自然汁入好濃酒一鍾盪熱調空心服享

象蓋再當自足趾
汗出遍身皆汗透吐當立止不止再服此藥輕

浮難調須先滴酒
許以指緩緩研之旋添酒調

一方 治噎食

用確甬上細糠蜜丸

如彈子大每服一丸嚙化津液嚥下

一方

用白麵二斤半蒸作土

罌頭一箇頂上開口取空樽皂罌裝藥滿用新

瓦四箇護罌頭蓋泥

封固却乞土釜好故以文武火燒一晝夜候

紅色取出研為細末聚肉丸如
四桐子大每服二十九空心酒湯送

紅色取出研為細末，蜜肉丸如下忌酒白。

四桐子大每服二十九空心酒湯生

○已上數方專治之劑

館

四君子湯

俱是補扶

四物湯

二陳湯

見痰類

書

○廣按膈噎翻胃之証因火而

其未有新病源不一有因思慮過

度而動脾火者有因忿怒過

而動肝火者有因久食煎炒而生

胃火者有因淫慾忘返而起

火者蓋火氣炎上薰蒸津液成痰

初則痰火未結咽膈乾燥飲食

不得流利為膈為噎久則痰火已

結胃之上脘不開飲食雖進

滯膈間須臾便出謂之嘔吐至於

胃之下脘不開飲食雖進停

胃中良久方出謂之翻胃丹溪云

年高者不治蓋少年氣血未土用藥劫去痰火病不復生老氣
 血已虛用藥劫去痰火雖得愈其病復作所以然者氣虛則不
 能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也丹溪又云此証切
 切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味其局方尤用香燥之
 藥豈合宜乎夫証屬熱燥固不宜用香燥之藥又香散氣燥耗血
 而滋味助火而生痰也予益
 者一人則吐瀉以去積血一人則吐瀉以去積痰俱獲病安思食
 而彼二人俱不能窳戒隨
 云病去而脾胃尚弱肥甘
 所謹哉知所懼哉 若用
 天膏吐瀉後宜用人參煉膏補之

天膏

見綱目法

人參膏

見疑類

丹溪心法

官

○嘈雜是痰因火動治痰為先姜炒甘運入痰藥用炒山梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛書嘈雜此乃食齋有熱炒梔子姜炒黃連不可無 肥人嘈雜一陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子嘈雜若濕痰氣鬱不喜食三補丸加白朮不信香附子 醫按蔣氏子條云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白朮下七八十九丸數服而止 又云眩運嘈雜是火動其痰一陳湯加梔子蒼連之類

戴云此則俗謂之心嘈也

三補丸

見補損

浙

二陳湯

見痰類

嘈雜

三十四

閉格 三十五

館

毋溪心法

書

○閉格必用吐提其氣之橫格不必在出痰也 有痰宜吐者二陳湯吐之吐中便有降 有中氣虛者蓮者補氣藥中升降 寒在上熱在下脉两手寸俱盛四倍以上

戴云閉格者謂胸中覺有所礙欲升不升欲降不降飲食不食此為氣之橫格也

浙

癩氣 三十六

丹溪心法

○瘦氣先須斷厚味

入方

海藻一兩

黃連二兩一云黃連

館

右為末以少許置掌中時時紙之蒸下如消三分之二止後服

附諸方

海藻丸 治瘦氣久不消者

圖

海藻

貝母

青皮

陳皮

右各等分為末煉蜜丸如彈子大每服一九食後嚥化

一方

海藻

海藻

昆布

廣茂

青蓋

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食後嚥化

開格

破結散 濟生方 治石瘕氣瘕筋瘕血瘕肉瘕等證

海藻 洗

龍膽草

海蛤

通草

昆布 洗

礬石

松蘿 焙七

麥麩 炒

半夏 湯洗七次

貝母 去心炒

右為末每服二錢酒服為甘草御魚鱗肉五辛生菜等物

毋溪心法

○結核或在項在脛在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

入方 治耳後項間各一塊

姜蚕 炒

酒大黃

青蔥 洗

牛膽南星

右為末蜜丸噙化

又方 治項頸下生痰核

二陳湯

大黃

連翹

桔梗

柴胡

右以水煎食後服

又方 治臂核作痛

二陳湯加連翹

蒼朮

防風

酒黃芩

右以水煎服

川芎
皂角刺

浙江圖書館

丹溪心法附錄卷之十

一

浙江圖書館

本心水滸明

卷之十

二東風

一西風

初風

丹溪心法附錄卷之十

浙江圖書館

丹溪心法附錄卷之十

痰熱門

瘧 三十七

丹溪心法

○瘧切不可作風治兼用風藥

帶補 多是氣虛有火兼痰宜

附論

○廣按瘧症發作則通身而

休寧東山古菴方廣約之類集

館

書

圖

大率與癩病相似比癩為甚為虛宜

川人參竹瀝之類

淋

○棹皆因氣虛挾痰火所致正猶火炎

而旋轉也火能燥物而使
風藥風能勝濕是不足之
治燥治了火時風燥了未
潤燥何風燥之有哉此瘥

癩 三十八

丹溪心法

○驚與痰宜吐 大率行痰為
多分少治之無不愈者 分痰
者必用吐藥吐後用東垣安神
藥胡川芎之類 龍會丸正宜服

肌液之不足世人多諳誤認為風而用
中而又見損也至賈金鑰曰休治風休
入為風燥之本能治其火則是散風而
症所以宜補氣液而兼散痰火也

圖

江

主用黃連南星瓜萎半夏尋火尋痰分
與熱有熱者以涼藥清其心 有痰
凡 大法宜吐吐後用平肝之劑黃芩
之 且如癩因驚而得驚則神不守舍

公六二而痰聚也

含空而痰聚也

戴云癰者俗曰猪癰風者是也

附脉理

脉訣舉要曰癰癰之脉浮洪大巨

附諸方

通泄散 治風逆暴作氣塞倒仆

苦丁香為末三錢

右加輕粉一字水半合調勻

下咽延出

墜痰丸 治風癰

天南星九蒸九晒

右為末姜汁糊為丸如梧桐子

大每服二十九人參湯薑蒲麥門冬

浙 江 圖 書 館

芝良久延自出如未出含砂糖一塊

痰疾

心法時錄卷之十

海寧縣立圖書館

湯任下

一方治遠年近日風癩心恙風狂中風涎潮牙關不開破傷風搐者

用皂角不蛀肥者一斤去皮剉切碎以酸漿水一碗浸春秋三四日

夏一二日冬七日搽去滓將汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐柳枝搗

成膏取出攤厚紙上陰乾收頓用時取手掌大一片以溫漿水化在

盞內用竹筒灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服溫鹽湯一

二口便止忌雉魚生硬濕麵等物

五癩丸 揚氏方治癩癩發作不問新久並宜服之

全蠲去毒二錢炒皂角四兩雄一斤升特半夏湯泡七南星炮一兩

烏蛇一兩酒浸白兩子炮半雄椎黃一錢半白礬一兩

蜈蚣半條去頭朱砂二錢半射石三錢白姜一兩半炒

右為末姜汁煮麵糊丸如梧桐大每三十九丸姜湯下

控涎所濟生方治諸癩久不愈者頑涎結聚變生諸症並宜治之

控涎所濟生方治諸癰久不愈者頑延結聚變生諸症並宜治之

全錫二錢 煨粉二錢 甘遂二錢 半夏半斤 生川烏去皮

姜蚕二味 少至碎生薑汁浸一夕 各半兩

石為末姜汁打丸如菘豆大硃砂為衣每服十五丸食後送湯下

忌甘草

遂心丹 治風疾如癰婦人心風血邪

甘遂一錢 堅取不銹者

右為末用猪心一取管血三條和日遂末將心批作兩邊甘遂末入在

內令線縛定外用皮紙裹慢火煨熟不可焦取末細研入辰砂末一

錢和勻分作四丸每服一丸將煨猪心煎化下大便下惡物為效

鬱金丹 治癰疾

川芎二兩 防風 鬱金二兩 猪牙皂角 明礬各一兩

真寒

一法有...

...

蜈蚣黃脚赤 附名一条

右為細末蒸餅丸如梧桐子大空心茶清下七五丸

建風丹 治風痲及破傷風暗風

川芎 二兩 細辛 六錢 半夏 湯泡七 桔梗 附子 炮去皮

薄荷葉 川烏 白附子 各二 魚鱔 人參 去芦

硃砂 另研 白芍 炮裂去皮屑 射香 淨四錢另研

蜈蚣 四條 頭赤 南星 三錢 大蝎尾 去鉤二錢生用

右為末生薑汁和劑為錠每服一錠溫酒化下以汗出為度

引神歸舍丹 選方 治心氣不足并治心風

附子 一箇 重七錢以上者炮去皮臍 朱砂 一兩 水飛

大天南星 重去處取二兩生用

右為末用煉心血并麩糊為丸如梧桐子大煎甘草根湯下子平之

右為末不用... 心血并煎糊為丸如梧桐子大前嘗言草根湯下子平之

交各一服 止五十九

驚氣丸 和劑... 治心受風邪涎潮壅塞牙關緊閉醒則精神若痴及驚

憂積氣並治之

紫蘇子 二兩 附子 去反麻 天麻 去苗半 橘紅 二兩 白姜 炒 半

麻黃 去根 附 兩 南木香 一兩 朱砂 兩 南星 浸洗薄切 姜汁 浸 一

白花蛇 酒濕 炙熟去皮 骨 半兩 乾蝮 去針尾毒 微炒 一錢

右為末入... 少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一九用金

錢薄荷湯化下 或溫酒化下亦可

○廣按痼症本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方皆用附子何

也蓋痼 痰結於心竇之間每遇大動則發非附子熱性走而

不守而能通 通結滯開散頑痰可乎此從治之法乃劫劑也不得

已而用之亦 猶中風之證本風火陽邪而用烏附類也丹溪前條

商... 附子...

云痼症尋火等瘵分多分少則此三方只宜施之於肥白多痰之

人用諸藥而不效者若夫黑瘦多火之人不宜用也

追風祛痰丸 治諸風痲暗風

防風 二麻

僵蚕 炒去

白附子 煨各

全錫 炒去毒

木香 各半兩

砂另為衣猪牙皂角 炒一兩

白礬 炒

白礬 炒

半夏 湯泡七次 用生薑汁

研為末秤六兩分作三分一分作

南星 三兩 炮一

作化白丸米浸一半皂角漿各一宿

右為細末姜糊

丸如梧桐子大每服七八十九食遠臨臥用淡姜

湯或蓮荷湯下

○廣按此方用

之膏製藥之精無過不及用之豈有不效者

○已上此方溫脾化痰之劑

鎮心丹

治諸

好辰砂不物多

好辰砂 不拘多少

右為細末 猪心血和勻 以蒸餅裹劑 蒸熟取出 丸如梧桐子大 每服
一九 食後臨臥 人參湯下

參砂丸 治風痲

館

人參

蛤粉

珠砂 各等分

右三味為細末 猪心血為丸 如梧桐子大 每服三十九 食遠金鐵薄
荷湯下

歸神丹 治癩癩諸疾 驚悸神不守舍

顛塊砂 二兩 猪心血酒蒸

金箔 二十片 白茯苓 酸棗仁

羅參 當歸 各二兩

銀箔 二十片 琥珀 遠志 制

龍齒 各一兩

右為細末 酒煮糊為丸 如梧桐子大 每服二三十丸 麥門冬湯下 炒

白茯苓

心經神餘卷之十

五

酸棗仁湯亦可

寧神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻 人參 陳皮 白朮 歸身

茯神 荊芥 獨活 遠志 去心

犀角 麥門冬 去心 酸棗仁 炙 辰砂 各五錢 半夏

南星 石膏 各一兩 甘草 炙 白附子 川芎

藜蘆 牛黃 各三錢 珍珠 三錢 生耆 黃連 各五錢

金箔 三十片

右為末酒糊丸每服五十九白湯下

牛黃清心丸 和劑方 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少時常發

狂癲言語錯乱 見中風

六珍丹 三因方 治風癱卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪嗥等聲

臟腑相引氣爭掣然吐沫流涎久而方醒

六珍丹三用方 治風癱卒然暈倒或作牛乳熱喘雞鳴等症
腑臟相引氣爭掣繼吐沫流涎久而方醒

通明雄黃 葉子雄黃 朱鍤 真珠各一兩

丹砂半兩

水銀一兩半 黑鉛一兩 熬成屑

右為末研令極細蜜和杵二三匙下如梧子大每服五丸姜棗湯下

龍腦安神丸 按秘方治男子婦人五淋癩癩無問遠年近日發作無時

茯苓二兩 人參

地骨皮 甘草各兩兩

麥門冬去心

龍腦別研

射香各五錢 牛黃五錢

朱砂 牙硝各三錢

桑白皮

明犀末一兩 金箔十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫水化下夏月

凉水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進三服

朱砂安神丸 按秘方治心煩懊懣心忪怔忡胸中氣亂心下痞悶食入

夜吐出

痼疾

去附餘卷之十

六

朱砂四錢研黃連五錢 生甘草二錢

右為末蒸餅丸如黃米大每服十九嚥津送下

虎睛丸 楊氏家藏方 治痼疾發作 潮搖搦精神恍惚時作謔語

犀角屑一兩 虎睛一對微炒 大棗六一兩 梔子仁半兩 遠志一兩

右為末煉蜜丸如菽豆大每服一十九酒溫食後送下

公灰丸 治腸熱太甚作痢 見類

龍會凡 治肝火太甚作痢 見類

○已上數方清心降火之劑

古方三癩丸 治小兒百二十種癩

荆芥穗三兩 白礬一兩半生半炒

右為末麵糊為丸黍米大朱砂為衣姜湯下二十九如慢驚用茶送

丹急驚三癩丸食癩醒脾丸可也

本草人參散 治小兒風神昏痰厥

丹急效... 三補丸... 食癩... 醒脾丸... 可也

平事人參散 治小兒受肝風神昏痰盛

人參 半兩

真白大南星

一兩四片以生薑汁并滾水各半陰燻

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作

兩三次灌下

來復丹

見中書

醒脾丸

見

顛狂 三十九

丹溪心法

○癩屬陰狂屬陽癩多善而狂多怒脉虛者可治實則死大率多因痰結於心育間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者則以治邪法

血... 卷之廿

江圖書

治之原病或所論尤精蓋為世所謂重陰者癲重陽者狂是也大槩是
熱一癲者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如
心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癲哭呻吟為邪所
憑非狂也燒蠶帝酒水下方寸匕 卒狂言鬼語針大指甲下即止
風癲引腦痛發則耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服方寸匕 癲
疾春治之入夏自安曾動心氣之藥回陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂
狂病宜大吐下則除之

入方 治癲風

麻仁四升

右以水六升猛火煮六人牙生去滓煎取七合旦空心服或發或不發
或多言語勿恠之口一人摩手足須定凡進三劑愈
又方 治狂邪發盡則拔頭大叫欲殺人不避水火

苦參 不以多少

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸煎薄荷茶

附勝理

脉訣舉要曰顛癩之脉浮洪大長滑大堅痰蓄一狂又曰乍大乍小

乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

書

附諸方

控涎丹 治痰迷心竅時作癩狂狂言如有所見

甘遂 去心

紫大戟 去皮

白芥子

真者各等分

石為末煮麩糊丸如梧桐子大晒乾臨臥淡姜湯或熱水下三十九

以下利去痰飲為愈

追風祛痰丸 治痰迷心竅顛狂妄語

見癩類

葉氏清心圓 簡易方 治心受邪熱精神恍惚狂言吐叫睡卧不寧

真本

去前卷之十

人參

錫箔

箭金

生地黄

天麻

天南星

為末入膏牛胆內令吹乾臘月燒要用滾取各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九人參湯下

龍星丹

治胃膈停痰蓄熱頭任流汗

見中風類

滾痰丸

治痰熱攻心顛狂唱哭

方見中風類

○已上數方下痰寧志之劑

牛黃清心丸

治心氣不足神志不定驚恐悸煩

煩少睡常發狂煩

言語錯亂

見中風

牛黃瀉心湯

治心經邪熱狂語精神不爽

腦子

牛黃

朱砂

大黃

右州為末每服三錢涼生姜蜜水調下

葉氏雄朱丸

簡方

治丈夫婦人因驚憂矢心或思

慮過多氣結不散

挂續成痰延留在心包攘塞心竅狂心女語叫呼奔走

積成痰涎留在心包穰塞心竅狂心妄語叫呼奔走

顆塊朱砂一錢 石半

白附子一錢 煇黃 明亭者 一錢半

右為細末和勻以猪心血和丸如梧桐子大則用硃砂為不每服三

粒用人參湯煎湯下常服一粒能安魂定魂補心益氣

朱砂安神丸 治症同前

書

龍腦安神丸 治症同前

並見淵類

牛黃膏 聖惠方 治婦人熱入血室發狂不認人者

牛黃二錢 半

硃砂

鬱金

腦子

甘草各一錢

牡丹皮三錢

江

右為細末煉蜜為丸如宅子大每服一丸新水化下

偏心膏

大全良方

治婦人因失血過多心神不安言語不常不得睡卧

辰砂研

酸棗仁炒

人參

白茯禪去木

頭年

...

...

琥珀各七錢半 滴乳香江一錢

右為末和勻每服一錢濃煎心棗子湯空心調

一方無茯神琥珀蜜丸如彈子大薄何湯化下一丸

茯神散 大全良方 治婦人心虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神一兩 茯苓 人參 石菖蒲各二兩

赤小豆半兩

右以阻每服八錢水一盞半煎至八分通口食前服

○已上數方清心除熱之劑

敬馬悸怔忡四十 浙

丹溪心法

○驚悸者血虛驚悸者特以朱砂安神丸 痰迷心膈者痰藥皆可定

○驚悸者血虛驚悸其特以朱砂安神丸 痰迷心膈者痰藥皆可定
志丸加琥珀麝香 怔忡者血虛怔忡無時血少者多 有思慮便動
屬虛 時作時止者痰因火動 瘦人多血少 肥人屬痰 尋常
者多是痰 真覺心跳者是血少四物朱砂安神之類 假如病因驚
而得驚則神出舍舍空則痰生也 書

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人持捕者是也

附諸賢論



心法附錄曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚
悸怔忡之所肇端也曰驚悸曰怔忡豈可無辨乎心虛而驚則耳
聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕傷之狀
是則為驚悸心虛而悸水則胃中滲瀉虛氣流動水既上乘心火惡
之心不自安使人有怏怏之狀是則為怔忡治之之法驚悸者與之

驚悸

豁痰定驚之劑怔忡者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心
血和平心氣而已

附脉理

脉訣舉妄曰心中極悸脉必代結飲食之停沉伏動滑

附諸方

茯苓飲子 消生煎 治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓 去心 半夏 湯洗七次 茯神 去木 麥門冬 去心 橘皮 去白各

沉香 不見火 甘草 枳實 各五分

右咬咀每服八錢生姜五片煎至八分食後溫服

加味四七湯 治心氣鬱滯諸痰散驚

半夏 二兩 白茯苓 厚朴 各一兩半 茯神

紫蘇 二兩 遠志 炒 甘草 炙

右每服四錢生姜五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

右每服四錢生薑五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

葉氏育神散簡易方 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

赤石脂別研細 臨時入 白茯苓 甘草 遠志去心

乾姜炮 當歸酒洗 龍骨另研如粉 臨時入 紫苑茸

桂心去皮 白朮神去水 防風書 人參去芦 赤芍藥

白朮各一兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食後溫服

龍齒湯簡易方 理心下怔忡悸懷憂慮神思多驚如墮險地小便或赤

或濁

官桂一兩 半夏二兩 湯泡 人參去芦 白茯苓去皮 枳殼去穢

甘草炙 當歸 龍齒研 桔梗 遠志去心

茯神去木 黃芪蜜炙各一兩

龍澤

以清酒煎之

右為末每服二錢水一鍾姜三片棗一枚粳米百粒煎六分温服

養心湯 治憂愁思慮傷心驚悸不寧

黃芪 蜜炙 白茯苓 茯神 半夏麴 當歸

川芎 各半兩 甘草 炙四錢 遠志 去心姜汁炒 辣桂 栝子仁

五味子 酸棗仁 各二錢 人參 各半

右每服三錢水煎姜三片棗一箇食前服 治停水怔忡加檳榔赤

茯苓

加味定志丸 治痰迷心膈驚悸怔忡

遠志 二兩 人參 一兩 菖蒲 二兩 白茯苓 三兩

琥珀 鬱金

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服二十九米湯下

○已上諸方消痰利氣之劑

四物湯

見捕損

朱砂安神丸

治血虛心煩懊惱驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂五錢水飛

黃連酒洗

甘草炙二錢半

生地黄一錢 當歸二錢

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣服三五十九津下

牛苗清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡夢寐紛紜

歸神丹 治驚悸怔忡神不守舍

並見雜類

真珠丹 治肝經因虛內發風邪則魂散不守時或驚悸怔忡

柏子仁 人參

酸棗仁各一兩 熟地黄

當歸各一兩

犀角

茯神

沉香

龍齒各半

真珠母三錢

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五十九金錢薄荷湯下

鷹屎

公方村余卷下

三

益榮湯 濟生方

治思慮過度耗傷心血天君不寧怔忡恍惚夜多夢寐

小便赤白濁

當歸 酒去

黃芪 去

小 草 館

酸 棗 仁 炒

柏 子 仁 炒

麥 門 冬 去

扶 神 去

白 芍 藥

紫 石 英 各

木 香 不

煨 火

人 參

甘 草 各

書

右 咀 每 服 四 錢 水 一 鍾 姜 五 片 棗 二 枚 煎 七 分 服

○ 已 上 數 方 補 血 安 神 之 劑

健 忘 由 十 一

丹 溪 心 法

○ 健 忘 精 神 短 少 者 多 亦 有 痰 者

戴 天 健 忘 者 為 事 有 始 無 終 言 談 不 知 首 尾 此 以 為 病 之 名 非 此 生

○是忘精神短少者多亦有成者

戴天健忘者為事有始無終言談不知首尾此以馬病之名非此生
成之愚頑不知人事者

附諸方

寧志膏 和劑方 治心神恍惚一時健忘 見補遺

走志丸 治心氣不定恍惚多忘 書

遠志 各二 人參 一兩 白茯苓 五兩

右為末煉蜜丸如梧子朱少為衣服二十九米湯下

壽星丸 和劑方 治心膽被食神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄言如

有所見

天南星 一斤先用炭火三十斤燒地坑通紅土

內候滲酒盡下南星在坑內以盆覆之 朱砂 另研 琥珀 另研

右用生薑汁麩糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸煎石

健忘

十三

首痛人參湯下

歸脾湯

濟生方

治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白木

茯神去木

黃耆去芦

龍眼

酸棗仁

去核

人參

兩

木香

半兩

甘草

半

右

咬咀

每服四錢水

一鍾

姜五片

棗一枚

煎七

分溫服

朱雀丸

百一選方

治心神不

是事多

健忘

茯神

一兩

沉香

半兩

右

為細末

煉蜜丸如小豆大

每服三十九

人參

二丹丸

治健忘

養神定志

和血內以安神

外藥

人參

遠志丸

聖惠方

治氣不足

驚悸健忘

神思不

天門冬

去心

白茯苓

各半

首痛

各七

人參

酸棗仁

黃芪

各半

桔梗

一

丹砂

官桂

去皮

各半

遠志

去心

勿下食後

理

方見中國

右為朱雀丸如豆大每服二十九至三十九丸米湯下

右為末蜜丸如豆大每服二十九至三十九米湯下

纏喉風喉痺

附日痛咽瘡

舟溪心法

○喉痺大槩多是痰熱 重者用桐油探吐 一方射干逐流水吐之

又方李實根皮一片割口內更用李實根研水敷項上一週遵用新

中者纏喉風屬痰熱戴云謂其咽喉裏外皆腫者是也用桐油以搗

探吐 又法用灯油脚探吐 又用球志去心為末水調傳項上一

立效亦可吐 咽喉生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制客於咽

喉也用人參刺芥蜜炙黃柏 虛火用人參竹瀝 血虛四物加竹瀝

實熱者黃連荆芥薄荷硝蜜姜汁調嚙化 治喉痛用倒滴刺根淨

洗入少好酒同研滴入喉中痛立止 喉痺風熱痰先以千縉湯後

以四物加黃柏知母養陰煎火降 又方猪牙皂角為末和霜梅噙

又方木鱉子用盞苦水浸又噙一丸 又方藟草一兩作一服降血中

之火 又方焰硝半錢枯礬半錢硃砂一錢為末杜牛膝搗汁調 喉

閉或有中垂一絲結成小血珠壅在咽喉中用杜牛膝根即鼓提草直

而獨條者搗碎用好米醋 西小和研取汁三五滴滴在鼻中即破 喉

痛必用荆芥陰虛火炎上 必用玄參 又喉痺陳年白梅入槧細冷化

噙梅於口中

入方

雄黃解毒丸 治纏喉 喉風雙腮腫痛湯藥不下

雄黃二兩 巴豆 十 鬱金 一錢

右為末醋糊丸如菜一 且大就茶清下七丸吐出頑涎即甦大效如口

右為... 大鏡... 吐... 效如口

藥以物乾問灌之下咽無有不活者

潤喉散 治氣鬱夜熱咽乾硬塞

桔梗二錢 粉草一錢 紫河車四錢 香附三錢

百樂煎一錢

右為末傳口內

又方 喉痛

鴨砂 膽礬 白礬 陳獨梅

右為末和噙

附諸方

奪命散 秘方 治急喉風

白礬枯 姜蚕直者炒 鴨砂 皂角末

右等分為末少許吹入喉中痰出塵

浙 江 圖 書

如聖散 三四方 治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急不省人事

或時氣纏喉風並用

雄黃 細研

白礬 枯

藜蘆 二者去皮心不可生

猪牙皂角 去皮炙二

右為末用一字搗入鼻內吐痰為愈

治咽喉牙關緊閉 經方

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上却以此

紙作筒搦子點灯吹滅以煙薰入鼻中一霎時口鼻涎流牙關開矣

治走馬咽喉 張子和方

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如右左俱有者

用二枚塞左右鼻中

○愚按已上三方皆用巴豆蓋巴豆乃斬關奪門之劑熱則流通之

理雖是以熱攻熱不妨碍也

○愚按已上三方皆用巴豆蓋巴豆乃斬開奪時之何熱則流通之

理雖是以熱攻熱不妨碍也

吹喉散 治咽喉腫痛急慢喉閉懸瀝乳蛾嘔物不下

訶子 一兩醋浸 高去核晒乾 黃芩 酒浸一匙 炒乾 膽礬 一錢

明礬 一錢 半 牛勞子 甘草 生 薄荷 各五錢

一方有百藥煎

書

右為末先用好生姜擦舌上每用藥一錢差管吹入喉中吐出涎痰

便用熱茶喫下再吹第二次便用熱粥三次再吹用熱茶或熱粥乘

熱食之加朴硝末少許如口舌生瘡用藥吹之口中立去痰涎為妙

奪命丹 秘方 治咽喉一切腫毒木舌雙乳驚喉痺等証

紫荷車 蜜陀僧 各半 砂仁 管仲

姜蚕 直者 烏魚骨 茯苓 生 射香 少許

右為細末麵糊為丸如彈子大陰乾用一丸無根水浸一時頻食一

喉痺

心法附錄卷之十一

十一

九作二服神效

奪命筋頭散

聖惠方

治急喉痺咽候腫痛堵塞氣不得通欲死之狀

膽礬 四錢

草烏 四錢

綠礬 六錢

雄黃 一錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎沫立應次以大黃甘草等分俱為麤末每服三錢水一鍾半煎至一鍾去滓化乳香一粒溫服務去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

治咽喉腫痛

秘方

山豆根

射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺

秘方

喉痺為急病

源更命不通

急研新艾水

入口便和同

臍內無新艾

貼臍腹內燒

入口便和同

內無新艾

燒

其烟總入口

此病一時消

一方 治喉痺

青黛 五分

猪牙皂角 去皮弦 五分

館

膳礬 熟者一錢半

右為細末醋薄糊為丸如櫻桃大每用

丸以熟絹裹在筋頭上用

好醋潤透將藥點在口內喉瘡上咬著其涎如水即解後服防風

通聖散

七寶散

殭蚕 白直者十箇

猪牙皂角 一搥去皮

王

全蠍 十箇頭角全者去毒

硼砂

雄黃

明礬 各一錢

膳礬

右為細末每用一字入喉中即愈

碧雲散

治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰二錢 硼砂一錢

快

右研為細末用鴉翎管吹入喉中立效

噙化三黃丸 秘方 治咽喉痛大效

山豆根 一兩 鵬砂 二錢

龍腦 少許

射香 少許

右為末用青魚膽為丸如菘豆大每服三五丸噙化津熱下

碧玉丸 御藥院方

治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘡

瘡重舌木舌並宜服之

青黛

盆硝

蒲黃

甘草 未各一兩

右同研勻用沙糖為丸每兩作五十九每服一九噙化或用乾藥末

搽咽喉內亦好

龍腦散

御藥院方

治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒蘊滯胃脘不

利故發疼痛急喉痺閉塞腫痛飲難

鵬砂

腦子

朱砂 各一分

滑石 細末三錢

石膏水飛 甘草生取末炒小

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾搽喉津亦得

龍腦破毒散御藥院方 治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

盆硝研細 白僵蚕微炒去蒂 甘草生 青黛八錢

馬勃末三錢 蒲黃半兩 腦子一錢 麝香一錢

右同研令勻細用葱合子收如有病證每服用藥一錢用新汲水小

半鍾調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈知不是喉痺自然消

散也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下無聲如是小

兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

甘桔湯活人方 治少陰咽痛

桔梗 甘草各等

右咬且每服五錢水一鍾半煎至八分通口服

桔梗湯 御藥院方 治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗 炒五錢 半夏 湯洗七遍切 二錢半 人參 去蘆 更 甘草 炙各一錢半

右吹咀每服一兩水一鍾煎七分去滓溫服食後

利膈湯 本事方 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

鮮蘇葉 荆芥穗 防風 書 桔梗

人參 牛蒡子 炒 甘草 各一兩

右為末每服二錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

通氣湯 應驗方 治喉痺疼痛閉塞不通氣水漿不下痰涎壅盛

牽牛 頭末一兩 半生用 鼠粘子 二錢 防風 一錢七分

枳殼 一錢二分 甘草 一錢二分 半生用

右為細末每服三錢沸湯點服

甘露內消丸 應驗方 治咽喉腫痛不利咽乾癢上壅壅滿口舌生瘡

薄荷葉 一兩 川芎 三錢 桔梗 去蘆 甘草 一錢

薄荷葉 一兩 川芎 三錢

桔梗 去花頭 三錢 甘草 一錢

人參 柯子 各半斤

右為細末煉蜜為丸如皂角 十大珠砂為衣每服一丸嚙化下無時

上清連翹散 精義 治諸瘡腫毒 咽喉疼痛煩渴大便自利虛熱不寧

連翹 山梔子 甘草 防風 各二錢

右用水二鍾煎至八分去滓溫服食後

王鑰匙 大成 治風熱喉閉及經脈風

焰硝 一錢 半 鵬砂 半錢 山梔子 少許 白僵蚕 一厘 半

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

鵬砂散 端效方 治咽喉疼痛腫閉塞不通

硼砂 白僵蚕 山豆根 盆硝

薄荷 紫荷車 川芎

喉痺

右為細末大人每服半錢小兒一字入淡烟中或水調服

三黃丸 大成 治丈夫婦人三焦燥熱喉腫胸心膈燥煩小便赤澀大

便秘結並宜服之 見大類

加味三黃丸 秘方

大黃 黃芩 芒硝 各二兩 黃藥子 一兩

白藥子 各一兩 山豆根 各一兩 苦參 各一兩 京墨 三錢

麝香 少許 片腦 一錢半 冬加知母

右為末猪膽調攤瓶內蒸三次後入片麝礪為丸豆大噙化

剉黃湯 大成 治臟腑實熱咽候腫痛大便便秘結咽候之證多是風熱上

壅然後成之非實熱不可服 見風熱

佛手散 應驗 治咽候腫痛生瘡 熱喉痺腫塞

薄荷 二兩 盆硝 一兩 甘草 七錢 桔梗 五錢

蒲黃 五錢

青黛 三錢

右為細末每用少許乾搽又用以管吹咽喉內噙化下時時用之

絳雪散 大成 治咽喉腫痛噎物悶口舌生瘡

龍腦 半錢

鵬砂 一錢

朱砂 三錢

馬牙硝 半錢

寒水石 二錢

右研勻每用一字搽於舌上津

人參清肺散 御藥院方 治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛噎物妨礙宜

服此藥

連翹 三錢

黃芩

川大黃

薄荷 各一錢

人參

甘草

施子

盆硝 各一錢

白附子 七分

黃連 半錢

右用水一鍾半煎至一鍾去渣溫服食後

牛蒡子湯 大成 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡有如肉腐

牛蒡子 二錢

玄參

丹麻

桔梗 去芦

春厚...

...

犀角

黃芩

大

通去皮

甘草

各三錢

右用水二鍾生姜三片煎至一

鍾去滓溫服食後

涼膈散

大成

治大人小兒臍膈

熱并右生瘡癢實不利咽喉燥多

渴腸胃秘澀小便不利一切

熱並皆治之

方見湯煎

大青湯

端效

治咽喉唇腫口舌

爛疔惡口瘡

大青葉

升麻

黃芩

各二錢

生地黃

三錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓服食後微利止

嗽口地黃散

御藥

治脾肺風熱

上攻咽喉腫痛生瘡閉塞不通或生

黃芩

四錢

甘草

一錢二分

刺楸穗

一錢

薄荷葉

半錢

右取明用水一鍾半煎至一

鍾去滓熱嗽冷吐不拘時

一方治喉痺

用射干即菡竹根也 液取新

米拘多少搗爛取汁吞下或動大脘

詳或用醋同研取汁飲引山延更妙又名野薑

用射干即補骨根也 痰取新去 米拘多少 雷爛取汁吞下或動大膽

鮮或用醪醋同研取汁嚙引出涎更妙又名野萱花

桑累年喉痺舉發

男左女右以手大指甲第一節灸三三小壯

針喉閉

針少商出血立愈穴在兩手大指內側去爪甲角韭葉許三按針

針之 針合谷二穴在虎口針五分 針尺澤二穴在臂中橫

紋出血妙

四物湯 見補損

千縉湯 見醫方

○廣按纏喉風喉痺之証其人膈間素有痰涎或因飲酒過度

或因忿怒失常或因房室不節而發作也何則飲酒過度是胃

火動也忿怒失常是肝火動也房室不節是腎火動也火動痰

積痺

上而為痰熱燔心壅塞於咽嗑之間所以內外腫痛而水漿不
入也其証可謂急且急矣治療之法急則治標緩則治本治標
用九散以吐痰熱以熱治本用湯藥以降火補虛已上方劑其於治
標已詳悉矣其於治本尤缺畧也諸方出証但云治風熱而未云
治痰熱但云治肺火而未云降肝腎火子雖不敏贅以管見如
痰痰加以瓜蒌子夏或干縷湯之類如挾肝火加以柴胡黃連
或小柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黄黃柏或四物湯
加知母黃柏之類未知賢哲以為何如又常論之胃肝腎三經
之火各有所因而生富貴之家醇酒厚味多生胃火婦人隱憂
不發多生肝火田子勞勞致虛多生腎火人之五臟六腑皆有
火不如此三經之火常變見而為病之多也

明漢心法附錄卷之十



浙江圖書館

浙江圖書館善本


甲登記號 010940

一九 年 月 日



浙江圖書館

colorchecker CLASSIC



xrite



colorchecker CLASSIC

